


DIOSCORIDIS
LIBRI OCTO GRÆCE
ET LATINE.

Castigationes in eosdem libros.

Κεφάλαιον τῶν ἐν ζώῃς.



Imperium mortis & vitæ.

PARISIIS,
Apud Petrum Haultinum, via Iacobææ,
sub signo caudæ Vulpinæ.

1 5 4 9

Cum priuilegio Regis, ad sexennium.

Εκ τῆς Γαληνῆς ἐν τῷ περὶ ἀπλῶν
φαρμάκων διωάμεως.

Ὁ δὲ ἀναζαρβεὺς Διοσκορίδης ἐν ἡ βιβλίῳ τῷ χηΐσιμον ἀπο-
σαν ὕλην ἔγραψεν ἐβοταλῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ δένδρων, καὶ καρπῶν καὶ
χυλῶν καὶ ὀπῶν· ἐπὶ τὲ τῶν μεταλλευομένων ἀπαύτων, καὶ τῶν ἐν τοῖς
ζώοις μορίων μνημονεύσας· καὶ μοι δοκεῖ τελεωτὴ τῶν παύτων εἶπαι ὅτι
περὶ τῆς ὕλης τῶν φαρμάκων παραγματούς ποιῆσαι. πολλὰ μὲν γὰρ
τοῖς ἐμπεροσιν ὑπὸ αὐτῶν γέγραπται καλῶς, ἀλλ' ὑπὸ ἀπαύτων εἰ-
πως οὐδενί.

Εκ τῆς Δεικασίης ἐν τῷ 1ῷ τῶν
ἰατρικῶν συμαγωγῶν.

Ἡ γυνῶσις τῶν ἀπλῶν φαρμάκων καὶ τῶν ἐν αὐτοῖς διωάμεων οὕτως
ἀναγκαστάτη καθέστηκεν, ὥς μὴ δ' οἷόν τε εἶναι χωρεῖς ταύτης ἰα-
τρικῆς οὐδὲν. ἅμα τε γὰρ εὐπορίας τ' ὅτι καὶ κατὰ πᾶσαν καρδίαν δεί-
ξασιν εὐχερῶς εὐεσκόμιστα, καὶ εἰς τὰς ἐπιχρίσεις τῶν συμαγωγῶν δι-
ωάμεων εὐχερῶς ἢ γυνῶσις· ἐπὶ δ' εἰς τὰς εὐρέσεις αὐτῶν καὶ τὸ
τεχνικόν ἐπιφαίνει παρὰ πᾶσιν ἢ τέττε εἰδησις.

Πρὶ τοῖς τε Διοσκορίδῃς ὡς
πινὲς ὑπολαμβάνουσι.

Εκ τῶν Σουΐδα.

Διοσκορίδης ἀναζαρβεὺς ἰατρὸς ὁ ἐπικληθεὶς φανῆς, διὰ τὸν ἐπὶ
τῆς οὐραίας φακούς. συνῶν ὁ Κλειοπάρεα ἐπὶ Ἀντονίον, καὶ γέγραπται αὐ-
τῷ βιβλία κ'. τὰ πάντα ἰατρικὰ θεωροῦντα.



VM DEI Opt. Max. benignitate con-
 quutus essem, vt hæ literarum formæ, quas
 exculpfi, multis probarentur, hoc mihi studiū
 fuit, vt optimum quenque librum in quam-
 plurima exemplaria hac scribendi ratione
 transfunderem. Initium itaque huius rei à sa-
 cris mihi faciendum putavi: quas veluti primitias cū Deo
 persoluissem, alios huius linguæ auctores præsertim bonos
 exprimere aggressus sum. Quam ad rem cū aliorum etiam
 doctorum & nobis amicorū hominum, tum Iacobi Goupyli
 medici opera ac iudicio vsi sumus, qui nobis vt Dioscoridis
 libros ita exprimeremus, vt in angustum quoddam spatium
 contraherentur, consilium dedit, benignissimèque pollicitus
 est se ea diligentia, quam maximam adhibere posset, effectū-
 rum, vt hic auctor ex multorum veterum codicum fide e-
 mendatus in manus hominum perueniret. Quod vt præsta-
 ret exemplaria ab aliis excusa cum multis veteribus libris ma-
 nu scriptis contulit, locosque omnes, qui peruersè descripti,
 aut deficientes essent, asterisco annotauit, vt eos postea resti-
 tueret. (ea enim libros castigandi ratio potior ei visa est, quàm
 vt ea, quæ iam recepta essent, induceret) Id autem quanta
 fide ac diligetia ab eo sit præstitum videbitis in castigationi-
 bus, quas is in hunc auctorem scripsit: vos igitur his nostris
 laboribus interim fruimini, dum vobis expressam imaginem
 plantarum, de quibus in hoc opere tractatio est appa-
 ramus. Valete:



ΠΕΔΑΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙΔΟΥ ΠΕΡΙ

ὑλης ἰατρικῆς λόγοι ἕξ.

Τὸ αὐτὸ καὶ ἰοβόλων, ἐν οἷς καὶ λυσσῶντος κυνὸς, σημείωσίς τε τῶν
ὑπο' αὐτῶν δηχθέντων, καὶ διερρηγμένων.

PEDACII DIOSCORIDIS

de materia medica libri sex.

Eiusdem de venenatis animalibus libri duo, in quibus tra-
ctatio est de cane rabido, & de notis, quib⁹ agnoscimus eos,
qui ab animalibus venenum relinquentibus icti sunt.

ΠΙΝΑΞ ΕΚ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝ-

εχούτων ἐν τῷ παρόντι βιβλίῳ. ἐν ᾧ ὁ μὲν πρῶ-
τος ἀειδὺς τὸ βιβλίον, ὁ δὲ δεύτερος, τὸ κατέ-
λαιον ὑποδεικνύει.

Α



Βρότονον	γ. κδ.	δος δεδιγμύων	η. ια.
ἀλάλοχον	α. κα.	αἶρα	β. ρκβ.
ἀλαϊκόν	γ. α.	ἀλακάλις	α. ριδ.
ἀλῆρατον	δ. οθ.	ἀκακία	α. ρλδ.
ἀλρος	α. ρλς.	ἀκαλύφει	δ. σδ.
ἀλριελία	α. ρλκ.	ἀκαθδα	γ. ιδ.
ἀλριόμην	α. ρξδ.	ἀκανδα ἀγρία	γ. κ.
ἀλριοείφανον	γ. λδ.	ἀκανδα ἀραβικὴ	γ. ιε.
ἀλρωσις	δ. σς.	ἀκανδα λευκή.	γ. ιδ.
ἀλρωσις ἢ ἐν παρνασῶ	δ. ηβ.	ἀκαθιδιον	γ. ιη.
ἀλρχουτα	δ. κγ.	ἀκινος	γ. ιθ.
ἀλρχουσα ἑτέρα	δ. κδ.	ἀκόννη	ε. ρξη.
ἀλρχουτα τείτη	δ. κς.	ἀκόνιτον	δ. οζ.
ἀδαρκις	ε. ρλζ.	ἀκόνιτον	ε. ζ.
ἀδιαντον	δ. ρλς.	ἀκόνιτον ἑτερον	ε. ρνβ.
ἀείζων τὸ μέγα	δ. ηδ.	ἀκορον	ε. ροδ.
ἀείζων τὸ μικρόν	δ. ρς.	ἀκρίδες	ε. ρος.
ἀείζων ἑτερον	δ. θβ.	ἀκτὴ	ε. ρπ.
ἀθήρα	β. ριδ.	ἀλεκτοεῖς	δ. ροζ.
ἀλριερς	α. ριδ.	ἀλεκτοεῖδος	ε. ροβ.
αἰγίλωφ	δ. ργθ.	ἀλες	ε. ροε.
αἰδοῖον ἄρρενος ἐλάφης	β. δγ.	ἀλθαία	ε. ροδ.
αἰδάλη λιβανωτὸ	α. πε.	ἄλιμος	β. οε.
αἰδιοπίς	δ. ρε.	ἄλισμα	β. ιη.
αἰλουρι	β. κδ.	ἄλισμα	β. ρξζ.
αἶμα	β. κη.	γγίδιον	γ. ρ.
αἶμα πούρειον	ε. ρλς.	γλαύκιον	δ. ρμα.
Πρὶ Αἰμόρρε	β. κδ.	γλαῦξ	γ. λς.
Πρὶ πῶν ὑφ' Αἰμόρρε καὶ	β. ξς.	γλήχων	γ. λς.

ΠΙΝΑΞ.

ἄλος ἄνθος	ε. ρκθ.	ἀντίποδα	ε. ρις.
ἄλος ἄχνη	ε ρκζ.	ἀνωγίς	γ. κα.
ἄλσινη	δ. πζ.	ἄξος	ε. ως.
ἄλυπον	δ. ροζ.	ἄπαείνη	γ. σς.
ἄμβροσία	γ. ρλ.	ἄπος	α. ρξη.
ἄμμι	γ. α.	ἄπτος	δ. ρο.
ἄμιος	ε. ρζ.	ἄπόκνον	δ. πα.
ἄμμιωνιακόν	γ. σδ.	ἄπόπατος	β. ση.
ἄμόρμη	α. ρλε.	ἄράχνη	β. ξη.
ἄμπιλόπρασον	β. ρς.	ἄρχιμώνη	β. σση.
ἄμπελος ἀγρία	δι. ρπ.	αἰείσφον	β. σση.
ἄμπελος ἀγρία	ε. β.	ἄεισολογία κληματίτις	γ. ς.
ἄμπελος λευκή	δ. ρπα.	ἄεισολογία μακρά	γ. ε.
ἄμπελος μέλαινα	δ. ρπβ.	ἄεισολογία στογγύλη	γ. δ.
ἄμπελος οἰνοφόρος	ε. α.	ἄρκειον	δ. ρζ.
ἄμυγδαλή	α. ροζ.	ἄρκευδής	α. ρδ.
ἄμυλον	β. ρκγ.	ἀρκτηον	δ. ρς.
Πρὶ Ἀμφισβείνης	ζ. ια.	ἄρνόγλωσσος	β. ργγ.
Πρὶ τῶν ὑπ' Ἀμφισβείνης δε-		ἄρεν	β. ρςζ.
δουλεύον	η. δ.	ἄρσενικόν	ε. ρκα.
ἄμωι	α. ιδ.	ἄρτεμισία λεπτόφυλλος	γ. ρκθ.
ἄν	β. σδ.	ἄρτεμισία πολύκλως	γ. ρκη.
	γ. ρνα.	ἄσπερον	α. δ.
	β. σγ.	ἄσβετος	ε. ρκδ.
	β. ρνα.	ἄσβόλη	ε. σπε.
	γ. ροδ.	ἄσκληπιός	γ. ρζ.
	γ. ρνα.	ἄσπερον	γ. ρογ.
	β. σιζ.	ἄσπάλαιδος	α. ιθ.
	γ. ξζ.	ἄσπείρατος	β. ρνβ.
	γ. ρνε.	Πρὶ Ἀσπίδος	ζ. ιη.
		Πρὶ τῶν ὑπ' Ἀσπίδος δευτέρων	η. ιε.
		ἄλκων	γ. ρνβ.
		ἄπτικός	δ. σκ.
		ἄμαλος	δ. ξβ.
		ἄσπράμαλος	ἄσπράμαλος

ΠΙΝΑΞ.

ἄσφαλος υἱός	β. ξβ.	βέωρησις	ς. γ.
ἄσφαλος	α. ς.	βούτυρος καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς λιγνύς.	
ἄσποδελος	β. ςθ.	β. πα.	
ἄσπακτυλὶς	γ. ςζ.	βέφθαλμον	γ. ρνς.
ἄσφαξίς	β. ρμε.	βρετανική	δ. β.
ἄσφακη	β. ροη.	βρύον θαλάσσιον	δ. σδ.
ἄσφονιβον	ε. σκα.	βεῶμος	β. ρις.
ἄχιλλεῖος	δ. σις.	βεῶμος ἡ πόα	δ. ρμ.
ἄχρᾶς	α. ροθ.	Γ	
ἄψινδιον	γ. κς.	Γάλα	β. οε.
ἄψινδιον θαλάσσιον	γ. κζ.	γάλα γυμακτεῖον	β. οη.
ἄψινδιον σαρδώνιον	γ. κη.	γάλα ἐμπυπταδέν	ς. κς.
		γάλα χερσόν	β. οζ.
Β			β. κζ.
Βάνχαις	β. να.	γαλὴ κατοικίδιος.	δ. σε.
βάλανοι	α. ρμδ.	γαλίοψις	δ. σς
βάλανος μυρεψική	δ. ρξ.	γάλλιον	β. λδ.
βαλαύσια	α. ρνε.	γάρρος	γ. γ.
βαλλωτή.	γ. ςιζ.	γλυπανή	γ. ρλα.
Πρὶ βασιλίσκη	ζ. ιδ.	μεράνιον	ε. ςο.
Πρὶ τῶν ὑπὸ βασιλίσκου δι-	η. ις.	γῆ	ε. ρπα.
χθέντων	δ. λζ.	γῆ ἀμπελῆτις.	ε. ροα.
βάτος	δ. λη.	γῆ ἐρετειᾶς	ε. ροθ.
βάτος ἰδαία	β. σς.	γῆ ἡ ἐκ τῶν καμίνων	ε. ρος.
βαβάζιον	β. κη.	γῆ κιμωνία	ε. ρπ.
βαβάζιοι	ς. λ.	γῆ μηλιάς	δι. ροζ.
βδέλλα	γ. ςκς.	γῆ πνιγῆτις	ε. ροβ.
βέηχιον	ε. ςγ.	γῆ σαμία	ε. ροε.
βλήπταν	β. σα.	γῆ σελινοσία	ε. ροδ.
βολβός	β. σ.	γῆ χία	β. οε.
βολβός ἐδώδιμος	γ. ρλ.	γῆς ἔντερα	β. ιη.
βόβις	δ. ρκη.	Γῆρας ὄφρας	β. ςξζ.
βούλοισαν	β. ςλς.	γγιδιον	γ. ρ.
βουσίον	δ. ρκδ.	γλαύκιον	δ. ςμα.
βέωρησις	β. ξς.	γλαυξ	γ. λς.
		γλήχων	γλυκύρ-

ΠΙΝΑΞ.

γλυκύριζα
 γναφάλιον
 γογγύλη
 γογγύλη ἀγρία
 γύψος

γ. ζ. α. λα. κ
 γ. ρλβ. ἔλαιον ἀμαράκινον
 β. ρλδ. ἔλαιον ἀμυγδαλινον.
 β. ρλε. ἔλαιον ἀνήθιον
 σ. κδ. ἔλαιον βαλάνινον
 ἔλαιον γλεύκινον
 ἔλαιον δάφνινον
 ἔλαιον ἐλάπνον.
 γ. πγ. ἔλαιον ἱερινον
 α. ρζ. ἔλαιον καρύινον
 δι. ρμζ. ἔλαιον κίκινον
 δ. ρμη. ἔλαιον διὰ τῷ κινδύνου κόκκου.
 γ. πδ. α. μδ.
 γ. πει. ἔλαιον κνίκινον
 ε. ιγ. ἔλαιον κοινόν.
 γ. λζ. ἐλάαι κολυμβάδες
 γ. λδ. ἔλαιον κρόκινον
 β. ιγ. ἔλαιον κύπρινον
 ζ. ισ. ἔλαιον λευκόν
 δ. σε. ἔλαιον μασίχινον
 σ. σ. ἔλαιον μεγαλινον
 β. ρωζ. ἔλαιον μελάνθιον
 β. ρςς. ἔλαιον μύλινον.
 β. ιε. ἔλαιον μυρσίνινον
 ζ. ιβ. ἔλαιον ναρκίστινον
 π. ι. ἔλαιον οἰνάνθιον
 δ. ρπδ. ἔλαιον ῥόδινον
 α. ρμγ. ἔλαιον σαμψύχινον
 ἔλαιον σπασμύλινον
 α. ρλ. ἔλαιον πικυώνινον.
 α. β. ρλθ. ἔλαιον σινάπινον
 α. λζ. ἔλαιον σούστινον
 α. ζα. ἔλαιον θάρινον
 ἔλαιον τήλινον

α. ρμα.
 α. ξθ.
 α. λθ.
 α. ξβ.
 α. μ.
 α. ξη.
 α. ν.
 α. νε.
 α. ξζ.
 α. μβ.
 α. λη.
 α. με.
 α. λ.
 α. ρμ.
 α. ξε.
 α. ξς.
 α. λβ.
 α. νδ.
 α. ο.
 α. μζ.
 α. νς.
 α. μθ.
 α. ξδ.
 α. νζ.
 α. μς.
 α. νδ.
 α. νθ.
 α. μα.
 α. λγ.
 α. μη.
 α. ξγ.
 α. να.
 α. νη.
 ἔλαιον

Δ

Δάκρυον ἐλαίας αἰθιοπικῆς.

α. ρμβ.
 δαῦκος
 δάφνη
 δάφνη
 δαφνοειδές
 δελφίνιον
 δελφίνιον ἔπερον
 δευτερία
 δίκταμος
 δίκταμος ὁ κρητικός
 δίψακος
 Πρί Διψάδος
 δορύκινον
 δορύκινον
 δράκη
 δρακόντιον
 δράκων θαλάσσιος
 Πρί Δρυίνε
 Πρί τῶν ὑπὸ Δρυίνε δεδηγμε-
 νων.

δρυς
 δρυς

Ε

Εβενος
 ἐλαία
 ἐλαϊόμελι
 ἔλαιον ἀβροτόνινον,
 ἔλαιον ἐκ τῆς ἀγρίας ἐλαίας.

ΠΙΝΑΞ.

ἔλαιον ὑοσκυδάμινον	α. μυ. ἐφήμερον	ς. ς.
ἔλαιον ὠκίμινον	α. ξ. Περὶ Εὐχίδνης.	ζ. ι.
ἔλαιον ὠμοτειβέες.	α. κθ. Περὶ τῶν ὑπὸ Εὐχίδνης δεδηγ-	
ἔλαιον σέλιγον	γ. σε μύρων	η. η.
ἔλατῆριον	δ. ρνε ἔχον	δ. α.
ἔλατῖνι	δ. μ. ἐχῖνος θαλάσσιος	β. α.
ἔλαθ' ἔοσκον	γ. π. ἐχῖνος χερσαῖος	α. β.
ἔλαφου κέρας	α. ξγ. ἐχον	δ. κζ.
ἐλελίσφακον	γ. μ.	Ζ
ἐλέριον	α. κζ. Ζεῖα	ρ. ρια.
ἐλένιον αἰγύπτιον	α. κη. ζιγρίβει	ρ. ρπ.
ἐλέφας	β. ξα. ζύδος	β. πη.
ἐλίχρυσον	δ. νζ. ζωμὸς νεαρῶν ἰχθύων	β. λη.
ἐλλέβορος λευκός.	δ. ρν. ζώπασα	α. σθ.
ἐλλέβορος μέλας	δ. ρνα.	Η
ἐλξίνη	δ. λθ. ἠδύοσμος ἄγριος	γ. με.
ἐλξίνη	δ. πς. ἠδύοσμος ἡμερος	γ. μα.
ἐλυμὸς	β. ρκ. ἠδύσαρον	γ. ρμς.
ἐμβρυον φθόριον	ε. ςζ. ἠδύχρυσον	α. οα.
ἐμπετρον	δ. ρπα. ἠλιοσκόπιος	δ. ρξδ.
ἐπίθυμον	δ. ροθ. ἠλιοτρόπιον τὸ μέγα	δ. ρςγ.
ἐπιμήδιον	δ. ιθ. ἠλιοτρόπιον τὸ μικρόν.	δ. ρςδ.
ἐπιπακτίς.	δ. ρθ. ἡμεροκαλλίς.	γ. ρλζ.
ἐρίβητος	β. ρκς. ἡμιονίτις	γ. ρνϛ.
ἐρείκη	α. ρη. ἡπαρ αἰγός.	β. μζ.
ἔρεια	β. πϛ. ἡπαρ αἰθύας	β. ν.
ἔρεια κεκτυμῶνα	β. πγ. ἡπαρ κάπρου	β. μη.
ἔεινος	δ. κθ. ἡπαρ ὄνειον	α. σλ.
ἔρπυλλον	γ. μς. ἡρυγέρων	δ. ςζ.
ἔρυθρόδανον	γ. ρξα. ἡείργιον	γ. κδ.
ἔρύσιμον	β. ρπη.	Θ
εὐζωμιον	β. ρο. Θαλασσίμελι	ε. κ.
εὐταπόριον	δ. μα. θαλικτρον	δ. ση.
εὐόρβιον	γ. σς. θαψία	δ. ρνζ.
ἐφήμερον	δ. πε. δεῖον	ε. σκδ.
		δεῖμος

ἄριστος ἡμερος καὶ ἄριστος β. ρλβ.	ἰωποφάας	δ. ρξε.
ρλγ.	ἰωπόφαισον	δ. ρξγ.
θηλυπῖεῖς.	ἱεις	α. α.
θῆλῃς	δ. ρξε. ἰσάπῃς ἀγρία	β. σις.
θλάσσι	β. ρπς. ἰσάπῃς ἡμερος	β. σιε.
θρίδαξ ἄριστος	β. ρξς. ἰσόπυρον	δ. ρκα.
θρίδαξ ἡμερος	β. ρξε. ἰτέα	α. ρλζ.
θύμβρα	γ. με. ἰχθυοκόλλα	γ. ρβ.
θυμελαία	δ. ρογ	Κ
θυμοξάλημη	ε. κδ. Κάγκαμον	α. κγ.
θύμος	γ. μδ. κάγκησ	γ. ωη.
	καδμεία	ε. πδ.
I	δ. μδ. κακαλία	δ. ρκγ.
Ιδαία ρίζα	δ. ξα. καλαμάχρωστς	δ. λα.
ἱερὰ βοταήη	γ. οβ. καλαμίνθη	γ. μγ.
ἱεράκιον τὸ μέγα	γ. ογ. κάλαμος	α. ριε.
ἱεράκιον τὸ μικρόν.	δ. ξβ. κάλαμος ἀρωμαπικός,	α. ιζ.
ἱερβοταήη	ς. κα. κάμπαι	β. ξδ.
ἱξίας	γ. ρδ. κανθαεῖς.	ς. α.
ἱξός.	η. α. κανθαεῖδες	β. ξε.
ἡ Κοινὴ τῶ ἰαβόλων θεραπεία.	δ. ρκβ. καήναις ἀγρία	γ. ρξς.
ἰον	β. ς. καήναις ἡμερος	γ. ρξε.
ἰόνια	γ. ζγ. καπνός	δ. ρι.
ἱξός	ε. σα. κάππαεις	β. σδ.
ἰος ξησός.	ε. σγ. κάρδαμος	β. ρωε.
ἰος σιδήρου	ε. σβ. καρδάμων	α. ε.
ἰος σιλικός	β. π. κάρς	γ. ξς.
ἰωπάκη	δ. ρλβ. καρκήνος χερταῖος	β. ιβ.
ἰωπόγλωσσον	β. γ. κάρυα βασιλικά.	α. ροδ.
ἰωπόκαμπος	β. ρμα. κάρυα ποντικά.	α. ρπ.
ἰωπολάπαθς	γ. ωβ. καοσία	α. ιβ.
ἰωπομάραθρον	β. κε. κάσανα	α. ρμς.
ἰωποποτάμου ὄρχης	β. οη. κάσους ὄρχης	β. κς.
ἰωποσέλιγον	δ. μς. κατανάγκη	δ. ρλ. δ.
ἰππουεῖς	δ. μζ. καπύματα	β. να.
ἰωπουεῖς ἐτέρα		καμ-

ΠΙΝΑΞ.

καυκαλῖς.	β. ρξθ.	κόλλα	γ. ρα.
Πεεὶ τῶν ὑπὸ Κερχιδίου διηχθέν		κολοκυνθα	β. ρξβ.
των.	η. ιγ.	κολοκυνθίς.	δ. ρον.
κέγχρος	ς. ις.	κολχικόν.	δ. πδ.
Πεεὶ Κέγχρου	ζ. δ.	κόμαρος	α. ρος.
κέδρος	α. ρς.	κονδρίλλη	β. ρξα.
κενταύειον τὸ μέγα	γ. η.	κονία συκῆς	α. ρπζ.
κενταύειον τὸ μικρόν.	γ. θ.	κόνυζα	γ. ρλς.
κεράσια	α. ρνη.	κοράλλιον	ε. ρλθ.
Πεεὶ Κεράσιου.	ς. ιζ.	κόρεϊς οἱ ἀπὸ κλίνης	β. ρς.
Πεεὶ τῶν ὑπὸ Κεράσιου διηχθέν		κρείον	γ. σα.
των.	η. ιδ.	κόρειον	ς. δ.
κεράσια	α. ρθ.	κόρις	β. λς. γ. ροδ.
κέρρον	δ. α.	κορυδαλλός	β. νθ.
κηκίς.	α. ρμζ.	κορωνάποις	β. ρνη.
κηπαία	γ. ρξη.	κόσος	α. ιε.
κηρός.	β. ρε.	κοτυληδών.	δ. σβ.
κήρυκες	β. ε.	κοτυληδὼν ἑτέρα	δ. σγ.
κίχι	δ. ρξδ.	κουβαείδες	β. λρ.
κιννάβαρι	ε. ρθ.	κοῦρμι	β. ρ.
κιννάμωμον	α. ιδ.	κοχλίας χερσαῖος	β. ρα.
κίρκια	γ. ρλδ.	κράμβη ἄγριος	β. ρι.
κίρτον	δ. ριθ.	κράμβη ἡμερὸς	β. ρι.
κίδος	α. ρκζ.	κράμβη θαλασσία	β. ρα.
κίσηεις	ε. ρκε.	κρανία	γ. ρα.
κισός.	β. σι.	κραταιόγονον	ε. ρβ.
κληματῖς.	δ. ζ.	κριδί.	ς. ιβ.
κληματῖτις.	δ. ρθ.	κρίθμον	δ. ζ.
κλιναπόδιον	γ. ρι.	κρίνον	δ. ζ.
κλύμβρον	δ. ιγ.	κρίνον	δ. ζς.
κλυδέλαιον	α. μδ.	κροκοδείλιον	ς. ια.
κνικέλαιον	α. με.	κροκόμαγμα	δ. ξδ.
κνίκος	δ. ρς.	κρόκος	α. ρξ.
κοκκιμηλέα	α. ροε.	κρόμμουα	β. ρκθ.
κόκκος βαφικῇ.	δ. μη.	κύαμος αἰγύπτιος.	β. ρκη.
			κύαμος

ΠΙΝΑΞ.

κύαμος ἑλληνικός.	β. ρκζ.	λεοντοπέταλον	γ. ρε.
κυανός.	ε. ρς.	λεοντοπόδιον	δ. ρλα.
κυκλάμινος	β. ρςδ.	λεπίδιον	β. σε.
κυκλάμινος ἑτέρεα	β. ρςε.	λεπίς.	ε. πθ.
κύμινον	γ. ξή.	λεπίδος στόμαμα	ε. ς.
κύμινον ἄρειον	γ. ξθ.	λευκάκανθα	γ. κβ.
κυνόγλωσσον	δ. ρκθ.	λευκὰς ὄρεινή	γ. ργγ.
κυνοκράμει	δ. ρςβ.	λεύκη	α. ρε.
κυνόσβατον	α. ρκδ.	λευκόιον	γ. ρλη.
κυπαρισία	δ. ρξε.	λευκὸν ὠοῦ	β. νε.
κυπάριτος	α. ργ.	λιβανώτις.	γ. πζ.
κύπριος	α. δ.	λιβανώτις ρουσμαεῖου	γ. πδ.
κύπριος	α. ρκ.	λίβανος	α. πθ.
κυπρίς.	α. ργγ.	λιβαίου φλοιὸς	α. πγ.
κύπριος	δ. ργγ.	λινὴ ἢ ἐξ ὑγρας πίσης	α. ςζ.
κύφι.	α. κδ.	λινύος σκευασία	α. πς.
κύων λυσῶν	β. μδ.	λινυτικόν.	γ. γη.
Σημεῖα κυνὸς λυσῶντος καὶ τῶν		λιθάργυρος	ε. ρθ.
ἢ Κ. τῶν αὐτῶν δεδηγμένων.	ζ. β.	λιθάργυρος πεδῆσα	ς. κζ.
ἢ Κ. Διάττης τῶν ὑπὸ κυνὸς λυσ-		λιθοκόλλα	ε. ρξδ.
ἰον	ζ. δ.	λίδος ἀεπίτης	ε. ρξα.
ἰονία	β. πεία	λίδος αἵματίτης	ε. ρμδ.
ἰξός	ζ. γ.	λίδος ἀλαβασρίτης	ε. ργγ.
ἰος ξη.	β. λβ.	λίδος αἰμίαντος	ε. ρνς.
ἰος σιδῆ	δ. οδ, ἢ ς. ια.	λίδος ἀρχαϊκός.	ε. εμβ.
ἰος σκώλη		λίδος ἀρμύριος	ε. ρε.
ἰσπακίη	β. ς.	λίδος ἄσιος	ε. ρμβ.
ἰσπόγλη	β. ιθ.	λίδος γαλάτης	ε. ρμς.
ἰσπόκαμπος	δ. ιζ.	λίδος γαλακτίτης	ε. ρν.
ἰσπολάπαδος	α. ρκθ.	λίδος γλώδης	ε. ρξθ.
ἰσπομάραθρον	δ. ρξθ.	λίδος θρακίας	ε. ρμζ.
ἰσποποτάμου ὄρε-	β. ρμ.	λίδος θυίτης	ε. ρνδ.
ἰσποσέλινον	β. ρμβ.	λίδος ἰασις	ε. ρξ.
ἰσπουρις	δ. ις.	λίδος ἰνδικός.	ε. ρζ.
ἰσπύριον	β. με.	λίδος ἰουδαϊκός.	ε. ρνε.
ἰσπύριον			λίδος

λίθος μαγνίτης
λίθος μελιτίτης
λίθος μεμφίτης
λίθος μοικιδδεϊδής
λίθος μόροχθος
λίθος οφρακίτης
λίθος οφίτης
λίθος πυείτης
λίθος ὁ ἐν τῇ σαμία γῇ
λίθος σάπφειρος
λίθος σελωίτης
λίθοι οἱ ἐν τοῖς ἀπόργοις
λίθος χιζός.
λίθος φρύγιος
λίθοπερμον
λιμνιαὶ γῆ
λινόζωσις
λίνον
λογίτης
λογίτης ἑτέρα
λυγκούριον
λύκιον
λύκοψις
λυσμάχον
λυγίς ἀγρία
λυγίς σεφανωματική.
λωπὶς ἄγριος
λωπὶς αἰγύπτιος
λωπὶς ἡμερῶς.

M

Μανίδες
μάκερ
μαλάβαθρον
μαλάχη
μανδραγόρας

ε. ρμη. μανδραγόρας
ε. ρνα. μανδραγορείτης
ε. ρνη. μαύνα λιβαίου
ε. σε. μάραθρον
ε. ρνβ. μάρον
ε. ρξε. μέιον
ε. ρξβ. μελανθιον
ε. ρμγ. μέλαν
ε. ρογ. μελανθηεία
ε. ρνζ. μέλι καδόλου
ε. ρνθ. μέλι τὸ ἐν ἡρακλείᾳ
ε. ρξγ. μέλι πυγτικόν
ε. ρμε. μέλι σακχάρου
ε. ρμα. μέλι σαφῶν
γ. ρνη. μελία
ε. ριγ. μελίκρατον
δ. ρσα. μελίλωτον
β. ρκα. μελίμικλα
γ. ρξα. μελιωτέφυλλον
γ. ρξβ. μινδύσιον
β. ρ. μέσπιλα
α. ρλγ. μέσπιλα ἑτέρα
δ. κς. μετώπιον
δ. γ. μινδικύ.
γ. ριε. μήδιον.
γ. ριδ. μήκων
δ. ριβ. μήκων
δ. ριδ. μήκων ἀφρώδης
δ. ρια. μήκων ἡμερῶς
μήκων κερατίτις
β. λα. μήκων κερατίτις
α. ρια. μήκων ροϊαῖς
α. ια. μνηία
β. ριδ. μνηόμελι
δ. ος. μῆλα ἀρωματικά.

ς. ις.
ε. πα.
α. πδ.
γ. πα.
γ. μη.
α. γ.
γ. συ.
ε. ρπγ.
ε. ρη.
β. ρα.
ς. η.
β. ργ.
β. ρδ.
β. ρε.
α. ρθ.
ε. ιζ.
γ. μη.
α. ρξε.
γ. ρα.
α. ογ.
α. ρε.
α. ροα.
α. οη.
β. ρα.
γ.
μ.
ς. η.
δ. ζι.
δ. ξε.
δ. ξς.
ς. α.
δ. ξδ.
α. ρξ.
ε. κθ.
α. ρξς.
μῆλα

ΠΙΝΑΞ.

οἶνος θυμελαΐτης	ε. οη.	οἶνος τερεμίνθινος	ε. λθ.
οἶνος θυμῆτης	ε. νθ.	οἶνος βρασειανίτης	ε. νε.
οἶνος χαλαμινδίτης ἢ ἑτεροί.ε. ξβ.	ε. ξβ.	οἶνος ὑσσωπίτης	ε. να.
οἶνος καπορχίτης.	ε. μα.	οἶνος φοινικίτης	ε. μ.
οἶνος κέδρινος	ε. με.	οἶνος χαμαιδρυίτης	ε. να.
οἶνος καθρίτης	ε. μζ.	οἶνος χαμαιπτύινος	ε. π.
οἶνος κερσίτης	ε. νδ.	οἶνος χαμαιλαΐτης	ε. οθ.
οἶνος κονυζίτης	ε. ζγ.	οἶνος οἶσους	β. πδ.
οἶνος κρυωνίτης	ε. κη.	οἶνος ὀλέσιον	δ. ια.
οἶνος κισσουργίτης	ε. πα.	οἶνος ὀλυνδοί	α. ρπς.
οἶνος κισσουργίτης ἢ ἀνήθινος.ε.οε.	ε. οε.	οἶνος ὀλυρα	β. ργγ.
οἶνος μελίτης	ε. ιε.	οἶνος ὀμφάκιον	ε. σ.
οἶνος μυρσινίτης	ε. λζ.	οἶνος ὀμφακόμελι	ε. λα.
οἶνος μυρτίτης	ε. λς.	οἶνος ὀνάχρα	δ. ρη.
οἶνος ναρδίτης	ε. ξζ.	οἶνος ὀνῆπης	γ. λγ.
οἶνος ὀδιδάτῃ ἀγρίας νάρδε.ε.ζθ.	ε. ζθ.	οἶνος ὀνοβρυχίς	γ. ρο.
οἶνος νεκταίτης	ε. ξς.	οἶνος ὀνοσμα	γ. ρμζ.
οἶνος ὀμφακίτης	ε. ιβ.	οἶνος ὀνυχες	β. ι.
οἶνος ὀρειανίτης	ε. ξα.	οἶνος ὀνυχες αἰγῶν	β. με.
οἶνος παλακίτης ἢ οἶνος ἀκοείτης.	ε. οβ.	οἶνος ὀνυχες ὀνῶν	β. μδ.
οἶνος πικρίτης	ε. μη.	οἶνος ὀξάλμη	ε. κγ.
οἶνος πικροσίτης	ε. νη.	οἶνος ὀξος	ε. κς.
οἶνος ρητινίτης	ε. μγ.	οἶνος ὀξος σικλητικόν	ε. κε.
οἶνος ροδίτης	ε. κε.	οἶνος ὀξος σιχαδικόν	ε. νγ.
οἶνος ροίτης	ε. λδ.	οἶνος ὀξυάκανθα	α. ργγ.
οἶνος στελμωίτης	ε. οδ.	οἶνος ὀξύμελι	ε. κβ.
οἶνος σκαμμωνίτης	ε. πγ.	οἶνος ὀπὸς καρπάσου	ε. ργ.
οἶνος σικλητικός	ε. κς.	οἶνος ὀρεοσέλινον	γ. ος.
οἶνος ἐκ σμύνης ἢ ἄλλων	ε. ξε.	οἶνος ὀρείανον	σ. λβ.
οἶνος ἐκ τῇ ἀγρίας σαφυλῆς.ε. ιδ.	ε. ιδ.	οἶνος ὀρμινον ἢ μερον	γ. ρμε.
οἶνος σιχαδίτης	ε. νβ.	οἶνος ὀρμιδογαλον	β. ροδ.
οἶνος σποβιλίτης	ε. μδ.	οἶνος ὀρεβάκμη	β. ροβ.
οἶνος σφυκομοείτης	ε. μβ.	οἶνος ὀρεβος	β. ρλβ.
οἶνος θανίτης	ε. λη.	οἶνος ὀρρὸς γάλακτος	β. ος.
οἶνος τε-	οἶνος τε-	οἶνος ὀρεζα	β. ριζ.
		οἶνος ὀρχας	οἶνος ὀρχας

ΠΙΝΑΞ.

ὄρχις
ὄρχις ἑτερες
ὄσρακα
ὄσσεις
οὔα
οὔεν

Π

Παγκράτιον
παμονία
παλιούρες
παύακες
παύακες ἀσκληπιοῦ
παύακες χειρώνιον
πάπυρος
παρθέμιον
παρωνυχία
πεντάφυλλον
πέσσει
πεπλῖς
πέπλος
πέπων
πεπασίτης
περικλύμενον
περιτερέων.
περσέα
πετροσέλινον
πευκίδατος
πήχανον
πύχανον ἄγειον
πίσσα ξηρά
πίσσα ὑγρά.
πισάκια
πισάελαιον
πιθήσφδης
πιτύα λαγωῦ

γ. ρμα.	πτύιδες	α. ων.
γ. ρμβ.	πτυσκάμπη	ς. β.
ε. ρον.	πτύουσα	δ. ρξς.
δ. ρμγ.	πίπυς	α. πξ.
α. ροδ.	πλάτανος	α. ρκ.
β. σθ.	πνεύμων ἀλώπεκος	β. μα.
	πνεύμων θαλάσσιος	β. λθ.
β. σγ.	πνεύμων χοίρειος κὺ ἀρνεῖος κὺ ἀρ-	
γ. ρνξ.	κειος	β. μ.
α. ρκβ.	ποιότητες τῶν οἴνων ἐκ τῆς ἡλι-	
γ. νε.	κίας	ε. ζ.
γ. νς.	ἐκ τῆς χροίας	ε. η.
γ. νξ.	ἐκ τῆς γεύσεως κὺ τῶν μεμιγμέ-	
α. ρις	νων	ε. θ.
γ. ρνε.	πολεμώνιον	δ. η.
δ. νδ.	πίλιον	γ. ρκδ.
δ. μβ.	πελύγαλον	δ. ρμβ.
β. ρπθ.	πολυζόνατον	δ. ς.
δ. ρξθ.	πολύζονον ἄρρεν	δ. δ.
δ. ρξη.	πολύζονον θῆλυ	δ. ε.
β. ρξδ.	πολύκνημον	γ. ρη.
δ. ρη.	πολυπόδιον	δ. ρτη.
δ. ιδ.	πομφόλυξ	ε. πε.
δ. ξ.	πορφύρα	β. δ.
α. ρπη.	ποταμογείτων	δ. ρα.
γ. οξ.	ποτήριον	γ. ιξ.
γ. σβ.	ποράσιον	γ. ριθ.
γ. νβ.	ποράσον κεφαλωτόν.	β. ροθ.
γ. νγ.	πορεύπλις	β. ρς.
α. σβ.	πάρμικη.	β. ρςβ.
α. σς.	πείλεα	α. ριβ.
α. ρον.	πῆεις	δ. ρπς.
α. ςς.	πυκνόκομον	δ. ρςς.
α. ρα.	πύρεθρον	γ. πς.
β. πε.	πυρεῖ	β. ρξ.

ΠΙΝΑΞ.

Ρ

Ρᾱ

ῤάμπος
ῤαφανίς
ῤαφανίς ἀγρία
ῤητίνη ῤανίνη
ῤητίνη ὕψα πτυίνη καὶ πευκίνη. α. σγ
ῤόα
ῤόδα
ῤοδία ῤίζα
ῤοδίδες
ῤοῖς
ῤύπος βαλανείων
ῤύπος γυνασίων
ῤύπος ἐκ τῆς παλαίφρας

Σ

Σαράπτηον

σαλαμάνδρα
σάμψυχον
σανδαράχη
σαφείτης ξύλων
σαρδόνια πῶα
σαρκοκόλλα
σάξ ἐχιδνῆς
σατύειον
σατύειον ἐρυθρόνιον
σαύρα
σέλινον
σέεις ἡμεροί
σέτελι αἰθιοπικόν.
σέτελι μααθαλεωπικόν
σέτελι πελοποννησιακόν.
σιπάα
σιπαιμοειδὲς τὸ μέγα
μικρόν.

γ. β.

α. ρκ.
β. ρλζ.
ε. ρλη.
α. ζα.
α. ρβ.
α. ρλα.
δ. με.
α. ρλβ.
α. ρμη.
α. λδ.
α. λς.
α. λε.
γ. σε.
ε. δ.
γ. μζ.
ε. ρκβ.
α. ργγ.
ε. ιδ.
γ. σθ.
β. ιζ.
γ. ρμγ.
γ. ρμδ.
β. ξθ.
γ. οδ.
β. ρξ.
γ. ξα.
γ. ξ.
γ. ξβ.
β. κγ.
δ. ρνβ.
ργγ.
σῆσαμος
σῆψ.
σιδηρίτις
σιδηρίτις ἐτέρα
σιδηρίτις τείτη
σίδια
σίκκος ἡμεροί
σίλυσον
σίλφι
σίλφιον
σίνηπι
σίον
σίσαρον
σίσύμβριον
σίσύμβριον ἑτερόν
σίτων
σκαμμωνία
σκαῦδυξ
σκήκος
σκήλλα
σκολοπένδρα
Πεεὶ Σκολοπένδρα
Πεεὶ τῶν ὑπὸ σκολοπένδρου δε-
δηγμένων.
σκόλυμος
σκόροδιον
σχορδόπρασσον
σκόροδα
σχορποειδέα.
Πεεὶ Σχορπίου
Πεεὶ τῶν ὑπὸ σχορπίου δεδηγμέ-
νων
σχορπίος θαλάσσιος
σχορπίος χερσαῖος
σχωρία ἀργύρου

ε. ρκα.

ε. ο.

γ. λγ.

γ. λδ.

γ. λε.

α. ρνδ.

δ. ρνδ.

δ. ρνδ.

ε. λη.

γ. σδ.

β. ρπδ.

β. ρνδ.

β. ρλθ.

β. ρνε.

β. ρνς.

γ. ξδ.

δ. ρσα.

β. ρξη.

β. οα.

β. σβ.

β. ις.

ζ. ε.

η. δ.

γ. ις.

γ. ρκε.

β. ρργ.

β. ρρβ.

δ. ρσε.

ζ. ζ.

η. ε.

β. ιδ.

β. γγ.

ε. ρα.

bb σκωεία

ΠΙΝΑ Ξ.

σκωεία μολίβδου	ε. ζζ.	σοιβή.	γ. ιβ.
σκωεία σιδήρου	ε. ςδ.	σραπώτης	δ. ςβ.
σμαείδες	β. λ.	σραπώτης ὁ χιλιόφυλλος	δ. ςγ.
σμίλαξ	β. ρος.	σρόβιλοι	α. πθ.
σμίλαξ	ς. ιβ.	σρούδιον	β. ςςγ.
σμίλαξ λεία	γ. ςμε.	σρύχρος ἀλικύκαβος	γ. οβ.
σμίλαξ τραχεία	γ. ςμδ.	σρύχρος κηπαῖος	γ. οα.
σμίλαξ	γ. π.	σρύχρος μαρικός.	γ. οδ.
σμίρεις	ε. ςξς.	σρύχρος ὑπονωτικός.	γ. ογ.
σμίρνα	α. οκ.	σύραξ	α. π.
σμίρνα βοιωτική.	α. οθ.	συπληεία	ε. ρκγ.
σμίρνον	γ. οθ.	συκὴ ἀγία	α. ςπε.
σόκρος	β. ςνθ.	συκόμορον	α. ρπβ.
σπαρταῖον	γ. κα.	σῦμα	α. ρπδ.
σπαρτίον	δ. ρση.	σῦκον κύκωριον	α. ςπγ.
σπόγγος	ε. ρλη.	σύμφυτον πετρεῖον	γ. θ.
σαφίς.	ε. δ.	σύμφυτον ἄλλο	γ. ι.
σακτὴ.	α. οδ.	χίνος	α. ις. καὶ δ. νβ.
σαφίς ἀγία	δ. ςμς.	χίνος τὸ δένδρον	α. ς.
σαφυλή.	ε. γ.	ὡδὲ Θεραπείας τῶν ὑπὸ σφηκῶν	
σαφυλῖνος ἀγίος	γ. νθ.	καὶ μελισσῶν δεδιγμένων	κ. β.
σάχως	γ. ςκ.	σφόνδυλον	γ. ς.
σέαρ καθόλου	β. πς.	σῶρυ	ε. ςιθ.
σέαπων δυνάμεις	β. ςδ.		
σέαρ πῶς ἀρώμαπτεον	β. ςα.	Τεκτονικὴ.	ε. ςιβ.
σέαρ πῶς σαμψυχίζεται	β. ςβ.	τελλῖναι	β. η.
σέαρ βόειον	β. πθ.	τέρμινδος	α. ςβ.
σέαρ ταύριον καὶ παρδάλειον, καὶ		τέπληγες	β. νς.
λεόντειον	β. ς.	τεύκριον	γ. ςια.
σέαρ τράχειον καὶ περβάτειον καὶ		τεύτλον	β. ςμθ.
ἐλάφειον	β. πη.	τέφρα	ε. λε.
σέαρ ὕειον καὶ ἄρνειον	β. πζ.	τηλέφειον	β. σιζ.
σέαρ χυμῖον, καὶ ὀρνίθειον	β. ςγ.	τῆλιν	β. ςκδ.
σίμμοι	ε. ςθ.	τίταπος	ς. κθ.
σιχάς	γ. λα.	πιδυμάλλων ἐπὶ ἀείδῃ	δ. ςξ.

ΠΙΝΑΞ.

πορδελιον	γ. ξγ.	ὑποκιδίς.	α. ρκη.
τραγάχανθα	γ. κγ.	ὑσώπον	β. λ.
τραχμον	δ. μθ.		Φ
τραχμον ἄλλο	δ. ν.	Φακός	β. ρκθ.
τραρπώγων	β. ρογ.	φακός ἐπὶ τῶν τελευμάτων	δ. πη.
τραρρείανον	γ. λε.	φαλάγγιον	γ. ρκβ.
τραρρς	β. ριε. καὶ δ. να.	πρὶ Φαλαγγίων	ζ. ε.
τείβολον	δ. ιε.	πρὶ τῷ ὑπὸ Φαλαγγίων διεθγμένῳ	
τείγλη	β. κδ.	νων.	η. γ.
τειπόλιον	δ. ρλε.	φάλαρις	γ. ρνθ.
τείφυλλον	γ. ρκγ.	φασόλος	β. ρλ.
τειχυματίς.	δ. ρλζ.	Φηρός.	α. ρμε.
τρυγών θαλασσία	β. κ.	φιλλυρέα	α. ρκς.
πρὶ Τρυγόνος θαλασσίας.	ζ. η.	φίνις	β. νη.
πρὶ τῶν ὑπὸ Τρυγόνος θαλασσίας		φλοιὸς λιβαίου	α. πγ.
διεθγμένων	η. ε.	φλόμος	δ. ρδ.
τρυξ.	ε. ρλβ.	φοίνιξ	δ. μγ. καὶ α. ρμθ.
τυρὸς νεαρός.	β. οθ.	φοίνιξ ἢ καὶ ἐλάτη	α. ρνα.
τύφη	γ. ρλγ.	φοίνικες θηβαϊκαί.	α. ρν.
		φοῦ	α. ε.
Τάκινθος	δ. ξγ.	θυμός	ε. λα.
ὑδνον	β. ροε.	ὑψος θαλάσσιον	δ. ρ.
ὑδράργυρος	ε. ρι.	φυλίτις	γ. ρκα.
ὑδράργυρος ποδείσα	ς. κη.	φύλλον	γ. ρμ.
ὑδρόμηλον	ε. λ.	φύτευμα	δ. ρλ.
ὑδροπέπρι	β. ρσα.		Χ
πρὶ Τδρου	ζ. ιε.	Χαθβάνη	γ. ρζ.
πρὶ τῷ ὑπὸ Τδρου διεθθέντων	η. ιβ.	χαλκανθον	ε. ριδ.
ὑδωρ	ε. ιη.	χαλκίτις	ε. ριε.
ὑδωρ θαλάσσιον	ε. ιθ.	χαλκὸς κεκαυμένος	ε. πζ.
ὑδωρ ψυχρόν.	ς. λδ.	χαμαδάκτη	δ. ρσε.
ὑσκήαμος	δ. ξθ.	χαμαδάφη	δ. ρμθ.
ὑσκήαμος	ς. ιε.	χαμαίδρις	ς. ριε.
ὑψικόν	γ. ροα.	χαμαίκοτος	δ. ρκς.
ὑψήκοον	δ. ξη.	χαμαλεύκη	δ. ρκζ.

ΠΙΝΑΞ.

χαμαιλέον ὁ λευκός.
 χαμαιλέον ὁ μέλας
 χαμαιπίτυς
 χαμαιπίτυς ἑτέρεα
 χαμαισύκη
 χαμελαία
 χελιδόνες
 χελιδόνιον τὸ μέγα
 χελιδόνιον τὸ μικρόν
 χιμοί.
 χοκὴ
 χόνδρος
 χευσανθεμόν
 χευσόγονον
 χευσσκόλη
 χευσσκόμη

γ. ι. Ψ
 γ. ια. Ψευδοβούνιον
 γ. ροε. Ψευδοδικταμος
 γ. ρος. Ψευδοκρασία
 δ. ρο. Ψευδοκιννάμωμον
 δ. ροβ. Ψιμίδιον
 β. αξ. Ψιμίδιον
 β. σια. Ψύλλιον
 β. σιβ. Ψύλλον
 β. θ. Ψωεικόν.
 β. σς. Ω
 β. ρη. Ωκιμοειδές.
 δ. νη. ὠκιμον
 δ. νς. ὠμοτάειχος
 ε. ρδ. ὠόν.
 δ. νε. ὠρχα

δ. ρκε.
 γ. λη.
 α. ιγ.
 α. ιε.
 ε. ργ.
 σ. κβ.
 δ. ο.
 σ. ι.
 ε. ρις.
 δ. κη.
 β. ροα.
 β. λχ.
 β. νδ.
 ε. ρη.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΟΣ.

INDEX OMNIUM QUÆ IN DIO-

SCORIDE CONTINENTVR.

Prior numerus librum, poste-
rior caput indicat.

A



Brotonum	3.29	Ærugo rasa	5.91
Absinthium	3.26	Ærugo scolecia	5.92
Absinthium ma-		Æs vstum	5.87
rinum	3.27	Æthiopis	4.105
Absinthium San-		Aëtites lapis	5.161
tonicum	3.28	Agallochon	4.21
Acacalis	1.119	Agaricum	3.1
Acacia	1.134	Ageraton	4.59
Acanthus	3.19	Agnus	1.36
Acanthus sylvestris	3.20	Aiuga	3.175, 176
Acanthium	3.18	Alabastrites	5.153
Acetum	5.21	Alcea	3.164
Acetum mulsum	5.22	Alcyonium	5.136
Acetum scillinum	5.25	Alisma	3.169
Acetum è stoechade	5.53	Allium	2.144
Achillea	4.36	Aloë	3.25
Achras	1.169	Alfene	4.87
Acida muria	5.23	Althæa	3.139
Acinos	3.50	Althæa	3.163
Acorum	1.2	Alumen	5.72
Aconitum	4.77, 78, 6.7	Alumen scissile	5.72
Adarces	5.137	Alysson	3.105
Adeps omnis	2.86, 94	Ambrosia	3.129
Adeps sampsuchi odore im-		Amiantus lapis	5.156
buitur	2.92	Ammi	3.70
Adianton	4.136	Ammoniacon	3.98
Ægilops	4.139	Amomum	1.14
Æris squamma	5.89	Ampelitis terra	5.181
Æris flos	5.88	Ampeloprason	2.180

bb iij Amphif-

INDEX.

Amphisbana ictus notæ eius		Aqua multa	5.17
curatio	8.9	Arabicus lapis	5.149
Amurca	1.135	Araneus	2.150
Amygdalæ amaræ	1.177	Arbutus	2.176
Amylum	2.123	Arcion	4.107
Anagallis	2.209	Arction	4.106
Anagyris	3.167	Arcturon	4.106
Anchusa	4.23, 24.25	Arena	5.16
Andrachne fyluestris	2.151	Argemone	2.208
Androsaces	3.150	Argenti recrementum	5.101
Androsamon	3.173	Argenti scoria	5.101
Anemone	2.207	Argenti spuma	5.102, 6.27
Anethum	3.67	Argentum viuum	5.110, 6.28
Anguim fenectus	2.18	Arisarum	2.198
Anisum	3.65	Aristolochia	4.5.6
Anonis	3.21	Armeniaca mala	1.166
Anserinus adeps	2.93	Armenius lapis	5.105
Anthemis	3.154	Aron	2.197
Anthericum		Arrhenogonon	3.120
Anthillis	3.153	Artemisia	3.127.128
Antipathes	5.140	Arundo, vide Harundo.	
Antirrhinon	4.133	Asarum	1.19
Antispoda	5.86	Asclepias	3.106
Aparine	3.104	Ascyron	3.172
Aphaca	2.178	Asius lapis	5.142
Apiastrum	3.118	Aspalathus	1.19
Apios	4.177	Asparagus	2.152
Apium	3.74	Asplenon	3.151
Apocynon	4.81	Aspidis ictus notæ curatio,	
Apollinaris	4.69	7.18, 8.15	
Apri iecur	2.39	Aster Atticus	4.120
Apum ictus curatio	8.2	Astragalus	4.62
Aqua	5.18	Athamanticum	1.3
Aqua frigida	6.34	Athera	2.114
Aqua marina	5.19	Atractylis	3.107
		Atra-	

INDEX.

Atramentum librarium	5.183	Bunion	4.124
Atramentum futuriū	5.114	Buprestis	6.3
Atriplex	2.145	Buphthalmos	3.156
Auellana nux	1.180	Butyrum	2.81
Auena	2.116	Butyri fuligo	2.81
Auricula muris	2.214	C	
Auripigmentum, siue arseni- con	5.121.6.29	Cacalia	4.123
B		Cadmia	5.84
Baccæ lauri	1.90	Cæcilie ietus notæ curatio	
Baccharis	3.51	eadē quæ vipere morsus	7.11
Balaustium	1.155	Calamus odoratus	1.16
Ballote	3.117	Calamintha	3.43
Balsamum	1.18	Calcifraga	4.181
Barbula hirci	2.173	Calx viua	5.133
Basilisci ietus notæ eius cura- tio	7.19	Cancamum	1.23
Bdellium	1.81.8.16	Canchris	3.80
Beta	2.149	Cancri	2.12
Betonica	4.1	Canis rubus	1.124
Bitumen	1.100	Canis rabiosi signa	7.2
Blatta pistrinaria	2.24	curatio morsus eius	7.3
Bliton	2.143	ab eo morforum victus ra- tio	7.4
Botrys	3.130	Cannabis	3.165.166
Brassica	2.146	Cantharides	6.1
Brassica marina	2.148	Capnos	4.110
Brassica sylvestris	2.147	Capparitis	2.204
Britanica	4.2	Cardamomum	1.5
Bromus	4.140	Cardamina	2.120
Bryon	1.20	Carduus	3.16
Bubulum saxum	2.89	Carpasi succus	6.13
Buccina	2.5	Cariotæ	1.125
Buglossum	4.128	Carum	3.66
Bulbus esculentus	2.200	Caseus recens	2.79
Bulbus vomitorius	2.201	Caseus equinus	2.80
		Cassia	1.12

INDEX.

Castanea	1.146	Chia terræ	5.174
Castorium	2.122	Chrysanthemon	4.58
Catanance	4.134	Chrysocolla	5.104
Caucalis	2.169	Chrysocome	4.55
Cedrus	1.106	Chrysogonon	4.56
Celticum nardum	1.7	Cicadæ	2.43
Cenchri ictus notæ remedia		Cicer sativum	2.126
7.16, 8.13.		Cicer arietinum	2.96
Centaurium magnum	3.8	Cicer sylvestre	2.96
Centaurium minus	3.9	Cichorion	2.125
Cepa	2.181	Cici	4.145
Cepæa	3.168	Cicuta	4.79, 6.11
Cera	2.105	Cimices	2.36
Cerasia	1.158	Cimolia	5.176
Cerastæ ictus notæ curatio.		Ciparissias	4.165
7.17, 8.14.		Cinis farmentinus	5.135
Cerui genitale	2.35	Cinnabaris	5.109
Ceruinum cornu	2.50	Cinnamomum	1.13
Ceruinum sævum	2.88	Cionia	2.6
Cerussa	5.103, 6.22	Circæa	3.134
Cestron	4.1	Cirsium	4.119
Chalcitis	5.115	Cistus	1.127
Chamæ	2.9	Citria mala	1.131
Chamæacte	4.175	Clematis	4.7.182
Chamæcissos	4.126	Clinopodium	3.109
Chamædaphne	4.149	Clymenon	4.13
Chamædrys	3.94	Cnicus	4.190
Chamæleo albus	3.10	Coagulum	2.85
Chamæleo niger	3.11	Coccum gnidion	4.154
Chamæleuce	4.127	Coccum infectarium	4.48
Chamæpitys	3.175	Cochleæ	2.11
Chamæsyce	4.170	Coeruleus	5.106
Chamælea	4.172	Colchicon	4.84
Chelidonium	2.211	Colocynthis	4.178
Chelidonium minus	2.212	Colymbades oleæ	1.140
		Conyza	

INDEX.

Conyza	3. 136	Cyphi	1. 24
Corallium	5. 139.	Cypirus	1. 4
Coriandrum	3. 71. 69.	Cytinus	1. 153
Coria veteramentaria	2. 51.	Cytifus	4. 113.

Coriarius frutex 1. 124

Coris 3. 174

Coronopus 2. 138

Cornus 1. 173

Corruda 2. 117

Cos Naxia 5. 168

Costus 1. 15

Coronea mala 1. 161

Crateogonum 5. 139

Crithmum seu crithamon.

2. 157.

Crocodilum 3. 12

Crocemagma 1. 26

Crocum 1. 25

Croton 4. 245

Cucurbita 9. 162

Cucumis sativus 2. 163

Cucumis sylvestris 4. 154

Cuminum sativum. 3. 68

Cuminum sylvestre 3. 69

Cunila 3. 28

Cupressus 1. 103

Curmi 2. 110

Cyclaminus 2. 294

Cyclaminus altera. 2. 195

Cydonomeli 5. 18

Cynia 4. 270

Cynocrambe 4. 192

Cynoglosson 4. 129

Cynosorchis 3. 121

Cyparissias thymalus. 4. 156

D

Damascena pruna 1. 137

Damafonion 3. 144

Daphnoides 4. 148

Daucus 3. 83

Delphinium 3. 84. 85

Dendroides tithima 4. 165

Deuteria 5. 13

Dictamum. 3. 37

Dictamnus Cretense. 3. 39

Diphryges 5. 120

Dipsacum 3. 13

Dipsadis morsus notæ eius cu

ratio 7. 14. 8. 11

Dorycnion 4. 75. 66

Draba 2. 187

Draco marinus 2. 15

Draconis marini ictus reme

dia 6. 40

Dracunculus 2. 196

Dryini ictus notæ curatio.

7. 12. 8. 10.

Dryopteris 4. 189

Dulcis radix 3. 7

E

Ebenus 1. 130

Ebulum 4. 155

Ebur 2. 48

Echinus 2. 1

Echinus terrestris 2. 2

Echium 4. 27

Elapho-

INDEX.

Elaphoboscon.	3. 80.	Ferula	3. 91
Elaterion	4. 155	Festuca	4. 139
Elatine	4. 40	Fibrini testes	2. 26
Electrum	1. 93	Ficus	1. 183. 184
Elæomeli	1. 37	Ficus sylvestris	1. 185
Eleoselinum	3. 75	Ficus lixiuim	1. 187
Elichryson	4. 57	Filicula	4. 188
Empetron	4. 181	Filix	4. 186
Ephemeron	4. 85. 6. 5	Filix foemina	4. 187
Epimedium	4. 19	Fimum	2. 98
Epimelis	1. 133	Flos æris	5. 88
Epipactis	4. 109	Flos salis	5. 129
Epirotica mala	1. 131	Flos punicæ	1. 127
Equisetum	4. 46. 47	Flos sylvestris punici	1. 127
Eretria terra	5. 171	Foeniculum erraticum	3. 82
Erica	1. 118	Foenum græcum	2. 124
Erinaceus	2. 1	Fraxinus	1. 109
Erinei	1. 146	Fuligo è myrrha, resina, sty-	1. 86
Erinus	4. 29	race.	1. 86
Eruca	2. 170	Fuligo liquidæ picis	1. 97
Eruca olerum	2. 51	Fuligo pictoria	5. 182
Eruca pinorum	6. 2	Fuligo resinæ	1. 94
Eruum	2. 131	Fuligo thuris	1. 85
Eryngium	3. 24	Fumaria	4. 110
Erysimon	2. 149.	Fungi	4. 83. 6. 23.
Eupatorium	4. 41	G	
Euphorbium	3. 96.	Gagates lapis	5. 146
F		Galactites lapis	5. 150
Faba	2. 127	Galbanum	3. 97
Faba ægyptia	2. 128	Galla	1. 147
Fæx	5. 132	Gallina	2. 41. 51
Fagus	1. 145	Gallinæ cerebellum	2. 53
Farina crassior	2. 112	Gallinaceus adeps	2. 93
Fel	2. 95	Garum	2. 34
Ferri rubigo	5. 93	Genitale cerui	2. 36
		Gentiana	

INDEX.

Gentiana	3. 3	Hedera	2. 210
Geramion	3. 131	Helenium	1. 27
Geodes lapis	3. 159	Helenium alterum	1. 28
Gingiberis	2. 190	Helioscopius	4. 165
Gingidion	2. 167	Heliotropiū magnum	4. 193
Gith	9. 3	Heliotropiū paruum	4. 194
Gladiolus	4. 20.	Helleborum album	4. 133
Glans	1. 144	Helleborum nigrum	4. 134
Glans Iouis	1. 122	Helxine	4. 39. 86
Glans fardiana	1. 122	Hemerocallis	3. 137
Glans vnguentaria	4. 160	Hemionitis	3. 152
Glaſtum fatium	2. 215	Herba Sabina	1. 105
Glaſtum ſylueſtre	2. 216	Heriacium magnum	3. 72
Glaucium	3. 100	Heriacium paruum	3. 73
Glaux	4. 141	Hippace	2. 63
Gluten piſcium	3. 102	Hippocampus	2. 3
Glutinum	3. 101	Hippogloſſon	4. 132
Gnaphalion	3. 132	Hippolapathon	2. 141
Gnobiſ	2. 32	Hippophaës	4. 162
Gramen	4. 30	Hippophæſton	4. 163
Gramen arundinaceū.	4. 31	Hippopotami teſtes	3. 25
Gramen parnaſi	4. 32	Hippofelinon	3. 78
Groſſi	1. 186	Hirci herbula	3. 78
Gypſum	5. 134. 6. 24.	Hircinum ſæuum	2. 88
H		Hirculus	1. 7
Hæmatites	5. 144	Hirundines	2. 57
Hæmorrhoi notæ eius cura-		Hirudo	6. 32
tio	7. 13. 8. 11	Hordeum	2. 108
Halica	2. 118	Horminum	3. 145
Halicacabon ſolanum	4. 72	Hyacinthus	4. 191
Halimus	1. 121	Hydromeli	4. 671
Harundo	1. 151	Hydromelon	5. 30
Harundo cypria	1. 115	Hydropiper	2. 191
Harundo vallatoria	1. 115	Hyofciamus	4. 69. 6. 15
Haſtula regia	2. 199	Hypecoon	4. 68
		Hypociftis	

INDEX.

Hypocistis	1. 128	Lapathum	2. 140
Hysopum	3. 30.	Lasér	3. 94.
I		Laséripitium	3. 94
Iaspis	1. 1. 5. 160	Lathyris	4. 167
Iberis	1. 180	Lauer	2. 154
Idæa radix	4. 144	Laurus	1. 108
Ilex	1. 145	Laurus Alexandrina	4. 147
Indicum	5. 107	Lauri baccæ	1. 90
Inguinalis	4. 120	Lemnia terra	5. 113
Intybus	2. 150	Lens	2. 29
Irio	2. 188	Lens palustris	4. 88
Iris	1. 1	Lentiscus	1. 90.
Ifopyron	4. 121	Lentiscina resina	1. 91
Iudaicus lapis	5. 155	Leontopelaton	3. 110
Iuncus	4. 52	Leonum pinguis	2. 90
Iuncus odoratus	1. 16	Leontopodion	4. 133. 110
Iuniperus	1. 104	Lepidium	2. 205
Ius piscium	2. 35	Leptocarya	1. 142
Ixia	6. 21.	Lepus marinus	2. 20. 6. 30
L		Lepus terrestris	2. 21
Labrum Veneris	3. 13	Leucacantha	3. 22.
Labrusca	5. 2	Leucanthemon	3. 131
Lac	2. 75	Leucas	3. 113
Lac coagulatum	6. 26	Leucoion	3. 138
Lac humanum	2. 78	Lichen	4. 53
Lac muliebre	2. 78	Lignorum marcor	1. 113
Lactuca fatiua	2. 165	Ligusticum	3. 58
Lactuca sylvestris	2. 166	Ligustrum	1. 25
Ladanum	1. 129	Lilium	3. 116
Lagopus	4. 17	Lilium sylvestre	3. 137
Lampfana	2. 142	Limonion	4. 16
Lana	2. 82	Lingua bubula	4. 128
Lana cremata	2. 83	Linozostis	4. 169
Lanaria herba	2. 193	Linum	2. 125
Lappa	4. 138	Lithocolla	5. 164
		Locuste	

INDEX.

Lithospermon	3. 158	Mandragora	4. 76 6. 16
Lolium	2. 122	Manna thuris	1. 72
Lonchitis	3. 161, 162	Marcor lignorum	1. 96
Lora	5. 13	Maron	3. 49
Lotus arbor	1. 172	Marrubium	3. 110, 119
Lotus Ægyptia	4. 114	Marrubium nigrum	3. 110
Lotus sylvestris	4. 112	Mastiche	1. 75
Lotus vrbana	4. 111	Meconium	6. 17
Lupinus	2. 132	Medica mala	1. 177
Lupinus sylvestris	2. 133	Medion	4. 18
Lychnis coronaria	3. 14	Medulla	2. 95
Lychnis sylvestris	3. 15	Mel Ponticum	2. 103
Lycium	1. 133	Mel	2. 101
Lycopsis	4. 26	Mel saccharum	2. 103
Lygos	1. 116	Mel Sardou.	2. 102
Lyncis vrina	2. 110	Mel heraclion	6. 8
Lyfimachia	4. 3	Melampythium	5. 69
M		Melantaria	5. 118
Macer	1. 111	Malanthium	3. 93
Mænæ	2. 31	Melia terra	5. 180
Magnes	5. 148	Melilotos	3. 48
Malabathrum	1. 11	Melimela	3. 162
Malicorium	1. 154	Melissophyllon	3. 99
Malua	2. 144	Melittites lapis	5. 156
Malum	1. 160	Melomeli	5. 29
Malum Armeniacum	1. 166	Memphites	5. 158
Malum cotoneum	1. 161	Mentha	3. 41
Malum dulce	1. 131	Mentastrium	3. 42
Malum Epiroticum	1. 131	Meon	1. 3
Malum Medicum	1. 131	Mercurialis	4. 191
Malum orbiculatum	1. 131	Mespilus	1. 170. 171
Malum Persicum	1. 131	Milium.	2. 119
Malum præcox	1. 131	Millefolium	4. 115
Malum punicum	1. 152	Millepedæ	2. 33
Malum sylvestre.	1. 164	Misy	5. 117
		Mituli	

INDEX.

Mituli	2. 7	Nasturtium	2. 185
Moly	3. 54	Natricis ictus notæ eius cu- ratio	7. 15. 8. 12
Molybdæna	5. 100	Nepeta	3. 34
Molybdoides lapis	5. 98	Nitrum	5. 130
Morochthus	5. 152	Nitri spuma	5. 131
Morus	1. 181	Nux auellana	1. 180
Mullus	2. 24	Nux iuglans	1. 179
Mulsum	5. 16	Nux pinea	1. 74
Muria	5. 128	Nymphæa	3. 14 8. 149.
Mures	2. 74	O	
Muris auricula	2. 175	Ochra	5. 107
Murus araneus	2. 73	Oeimastrum	4. 28
Muris aranei ictus notæ eius curatio	7. 9. 8. 7.	Oenanthe	3. 135. 5. 5
Muscus	1. 20	Oesypum	2. 8
Muscus Marinus	4. 99	Olea	1. 139
Mustela	2. 27	Olea sylvestris	1. 138
Myagron	4. 117	Oleaster	1. 130
Myofotis	2. 175	Oleæ æthiopica lachryma.	
Myrica	1. 117	1. 142	
Myrrha	1. 78	Olei vires	1. 27
Myrrha Boeotica	1. 179	Oleum amygdalinū.	1. 139
Myrrhis	4. 116	Oleum balaninum	1. 40
Myrtydanum	1. 157	Oleum candidum	1. 32
Myrtus fatiua	1. 156	Oleum carynum	1. 42
Myrtus sylvestris	4. 129.	Oleum cicinum	1. 38
N		Oleum gnicinum	1. 46
Naphtha	1. 102	Oleum commune	1. 50
Napus	2. 136	Oleū è gnidio grano	1. 44
Narcaphthon	1. 22	Oleum hyoscyaminū.	1. 35
Narcissus	4. 161	Oleum laurinum	1. 50
Nardi genera	1. 6	Oleum lentiscinum	1. 51
Nardum Celticum	1. 7	Oleum mastichinum	1. 52.
Nardum montanum	1. 8	Oleum melanthinum	1. 47
Nardinum vnguentum.	1. 74	Oleum myrtheum	1. 49
Nasturtiū.		Oleum	

INDEX.

Oleū oliuæ syluest. l. 131. 141.	Palma elate	1. 151
Oleum omphacinum l. 67	Palma Thebaicæ	1. 150
Oleum picinum	Panaces Aesclepij	3. 56
Oleum raphaninum l. 46	Panaces Chironium	3. 57
Oleum sesaminum l. 41	Panaces Herocleum	3. 55.
Oleum Sicyonium l. 33	Pancration	2. 203
Oleum sinapinum l. 48	Panicum	2. 120
Omphacium l. 29. 5. 6	Papauer corniculatū	4. 66.
Omphacomelites	6. 18.	
Onagra	Papauer erraticum	4. 64
Onitis	Papauer satium	4. 65
Onobrychis	Papauer spumeum	4. 67
Ononis	Papyrus	1. 116
Onosma	Pardorum pingua	2. 90
Onyx	Paronychia	4. 54
Ophioscorodon	Parthenium	3. 15
Ophites lapis	Pastinaca herba	3. 59
Opium	Pastinaca marina	2. 22
Opobalsamum	Pastinacæ marinæ ictus no-	
Opopanax	ta eius curatio	7. 8. 8. 6
Orbiculata mala	Peplis	4. 169
Oreoselinon.	Peplos	4. 168
Origanum	Pepo	2. 164
Origanum syluestre	Periclymenon	4. 14
Ornithogalum	Persea	1. 188
Orobanche	Perfica mala	1. 165
Oryza	Personata	4. 107
Ostracites	Petalites	4. 10
Osyris	Petroselinum	3. 77
Othonna	Peucedanon	3. 92
Ouillum sæuum	Phalangium	3. 122
P	Phalangij morsus notæ eius	
Pæonia	curatio	7. 5. 8. 3
Paliurus	Phalaris	3. 159
Palma	Phasioli	2. 130
	Phoenix.	

INDEX.

Phoenix	4. 43	Portulaca	2. 150
Phrygius lapis	5. 141	Potamogeton	4. 101
Phu	1. 10	Poterion	3. 17
Phycus marinus	4. 100	Propolis	2. 106
Phyllitis	3. 121	Prunus,pruna	1. 175
Phyllon	3. 142	Pseudobunion	4. 125
Phyteuma	4. 130	Psoricon	5. 116
Picea	1. 87	Psyllion	4. 70. 6. 10
Pinguia	1. 90. 91	Ptarmica	2. 192
Pinorum cruce	6. 2	Pulegium	3. 36
Pinus	1. 87	Pumex	5. 125
Piper	2. 189	Purpura	2. 4
Pissasphaltos	1. 101.	Pycnocomon	4. 176
Pistacia	1. 178	Pyrethrum	3. 86
Pityides	1. 88	Pyrites	5. 143
Pityufa	4. 166	Pyrorum genera	1. 168.
Pix liquida	1. 95	Q	
Pix sicca	1. 98		
Plantago	2. 153	Quercus	1. 143
Platyphyllos	4. 165	Quinque folium	4. 42
Plumbago	5. 100	R	
Plumbum elotum	5. 95		
Plumbum vftum	5. 96	Radicula	2. 193
Pnigitis terra	5. 177	Radix	2. 137
Polemonia	4. 8	Rana	2. 28
Polion.	3. 24	Rana palustris	6. 31
Polycnemon	3. 108	Ranunculum	2. 206
Polygala	4. 142	Rapum	2. 134
Polygonaron	4. 6	Recrementum argenti	5. 101
Polygonon	4. 4	Resinae variae	1. 93
Polypodion	4. 188	Rha	3. 2
Pompholyx	5. 85	Rhamnus	1. 120
Populus alba	1. 110	Rhaphanus	2. 137
Populus nigra	1. 114	Rhaphanus sylvestris	2. 138
Porrum capitatum	2. 179	Rhodia radix	4. 45
		Rhododendron	4. 8
		Rhus	1. 148
		Ricinus	

INDEX.

Ricinus	4. 164	Sanguis tauri	6. 25
Rosa	1. 131	Sapphirus	5. 157
Rosei pastilli	1. 132	Sarcocolla	3. 99
Rosmarinus	3. 187	Sardianæ glandes	1. 122
Rosmarinum coronarium.		Sardonja	6. 14
3. 89.		Sarmentitius cinis	5. 135
Rubeta	6. 31	Satureia	3. 45
Rubia	3. 160	Satyrium	3. 143
Rubigo ferri	5. 93	Satyrium erythronio.	3. 144
Rubrica fabrilis	5. 112	Scammonia	4. 171
Rubrica Sinopica	5. 111	Scandix	2. 168
Rubus	4. 37	Schistum lac	2. 77
Rubus canis	1. 124	Schistos lapis	5. 145
Rubus Idæus	4. 38	Scilla	2. 202
Rumex	2. 140	Scolopendra	2. 16
Ruscum	4. 146	Scolopendræ ictus notæ &c	
Ruta	3. 52	eius curatio	7. 6. 8. 4
Ruta sylvestris	3. 53	Scordion	3. 125
S		Scorodoprasum	2. 183
Sacra herba	4. 61	Scoria ferri	5. 94
Sagapenum	3. 95	Scoria plumbi	5. 97
Sal	5. 126	Scorpioides	4. 195
Salis flos	5. 129	Scorpius marinus	2. 14
Salis spuma	5. 126	Scorpius terrestris	2. 13
Salamandra	6. 4	Scorpij ictus notæ eius & cu	
Salix	1. 137	ratio.	7. 7. 8. 5
Salvia	3. 40	Securidaca	3. 146
Sambucus	4. 174	Sedum magnum	4. 89
Samia terra	5. 172	Selenites lapis	5. 159
Samius lapis	5. 173	Selinusia terra	5. 175
Sampfuchum	3. 47	Semperuium	4. 89. 91
Sandaracha	5. 122. 6. 29	Semperuium minus	4. 90
Sanguinaria	4. 4	Senecta anguium	2. 19
Sanguinaria foemina	4. 5	Senecio	4. 97
Sanguis	2. 97	Sepia	2. 23
		ec	Sepa

INDEX.

Seps	2. 70	Sory	5. 119
Seris	2. 160	Sparganion	4. 21
Serpillum	3. 46	Spartion	4. 158
Sertula campana	3. 48	Spondylion	3. 90
Serum lactis	2. 76	Spina acuta	1. 123
Sesama	2. 12	Spina alba	3. 14
Sesamoides	4. 152. 153	Spina Arabica	3. 15
Seseli	3. 60	Spongiæ	5. 138
Seseli Æthiopicum	3. 61	Spongiarum lapides	5. 163
Seseli Creticum	3. 63	Spuma nitri	5. 131
Seseli Peloponnesse	3. 62	Spuma salis	5. 126
Sicyonium oleum	1. 35	Spuma argenti	5. 102
Sideritis	4. 33. 34. 35	Squamma æris	5. 89
Sidion	1. 154	Squamma ex acie decussa.	
Siligo	2. 113		5. 90
Siliquæ	1. 159	Stachys	3. 120
Silurus	2. 29	Stactæ	1. 74
Silybum	4. 159	Staphis agria	4. 156
Sinapi	2. 184	Stibium	5. 99
Sion	2. 154	Stimni	5. 99
Siser	2. 139	Stoebe	4. 12
Sison	3. 94	Stoechas	3. 31
Sisymbrium vtrunque	2. 155.	Stomoma	5. 90
	156.	Stratiotes	4. 102
Smarides pisces	2. 30	Stratiotes millefolium	4. 103
Smilax	2. 176	Strigmenta balnearum.	1. 34
Smilax aspera	4. 144	Strigmenta gymnasiorum.	
Smilax laevis	4. 145		1. 36.
Smyris lapis	5. 166	Strigmenta palæstrica.	1. 35
Smyrnion	3. 79	Strobili	1. 84
Solanum hortense	4. 71	Struthion	2. 193
Solanum manicum	4. 74	Styrax	1. 80
Solanum somniferum.	4. 73	Suillus adeps	2. 87
Soncus	2. 159	Suillus pulmo	2. 40
Sorba	1. 174	Sulphur	5. 124
	Sory	Syco-	

INDEX.

Sycomorus	1. 182	Tragos	2. 115. 4. 51
Symphyton	4. 9. 10	Tribubus	4. 15
T			
Taxus	4. 80. 5. 12	Trichomanes	4. 137
Tauri sanguis	2. 6	Triphyllon	3. 123
Taurorum pinguis	2. 90	Tripollium	4. 135
Telephion	2. 217	Triflago	3. 112
Tellinæ	2. 8	Triticum	2. 107
Terebinthus	1. 92	Tuber	2. 375
Terra	5. 170	Tussilago	3. 126
Terra fornacum	5. 179	Typha	3. 133
Testæ	5. 178	V	
Testiculus canis	3. 141. 142	Venenata	7. 2
Teucrion, Teucris	3. 111	Veneris umbilicus	4. 92. 93
Thalassomeli	5. 20	Veratrum album	4. 150
Thalictron	4. 98	Veratrum nigrum	4. 151
Thapsia	4. 157	Verbascum	4. 104
Thlapsi	2. 186	Verbenaca	4. 60
Thracias lapis	5. 147	Vermes terreni	2. 72.
Thunnus	2. 33	Vesparum ictus curatio	8. 2
Thus	1. 82	Vini natura	5. 7. 9. 10. 11.
Thuris cortex	1. 83	Vinum absinthites	5. 49
Thuris fuligo	1. 105	Vinum acorites	5. 73
Thuris manna	1. 84	Vinum adynamon	5. 13
Thyites lapis	5. 154	Vinum album	5. 8
Thymelæa	4. 173	Vinum anethinum	5. 75
Thymoxalme	5. 24	Vinum apiites	5. 32. 74
Thymus	3. 44	Vinum aromatites	5. 64
Tilia	1. 126	Vinum asarites	5. 68
Tichymali	4. 165	Vinum è betonica	5. 54
Torpedo piscis	2. 17	Vinum bunites	5. 56
Toxicon	6. 20	Vinum calaminthites	5. 52
Tragacantha	3. 23	Vinum catorchites	5. 41
Tragium	4. 49. 50	Vinum cedrinum	5. 45
Tragoriganum	3. 35	Vinum cedrites	5. 47
		Vinum cestrites	5. 53

INDEX.

Vinum chamædrytes	5.51	Vinum refinatum	5.63
Vinum è chamælæa	5.79	Vinum rhodites	5.35
Vinum chamæpityinū	5.80	Vinum rhoetes	5.34
Vinum è conyza	5.63	Vinum saluiatum	5.71
Vinum cydonites	5.28	Vinum è satureia	5.69
Vinum daucites	5.70	Vinum scammonites	5.83
Vinum dictamnites	5.57	Vinum scillinum	5.26
Vinum ex foeniculo	5.75	Vinum stoechadites	5.52
Vinum è flore falis	5.76	Vinum strobilites	5.44
Vinum helleborites	5.82	Vinum è sycomoris	5.42
Vinum hyssopites	5.50	Vinum è Syriaca nardo, Cel-	
Vinum ex iride	5.65	tica, malabathro	5.67
Vinum iuniperinum	5.46	Vinum terebinthinum	5.39
Vinum lentiscinum	5.38	Vinum thymites	5.59
Vinum mandragorites	5.81	Vinum è thymelæa	5.78
Vinum marathrites	5.75	Vinum tragoriganites	5.55
Vinum marinum	5.27	Viola alba	3.138
Vinum è marrubio	5.55	Viola purpurea	4.122
Vinum melites	5.51	Viperæ ictus notæ & eius cu-	
Vinum melitites	5.15	ratio	7.10, 8.8
Vinum melomeli	5.29	Viperinæ carnes	2.18
Vinum è myrrha	5.65	Virulentorum ictuum cura-	
Vinum myrsinites	5.37	tio	8.1
Vinum myrtites	5.36	Viscum	3.103, 8.1.
Vinum è nardo sylvestri	5.69	Vitex	1.136
Vinum nectarites	5.66	Vitis alba	4.184
Vinum oenanthinum	5.33	Vitis nigra	4.185
Vinum omphacites	5.12	Vitis sylvestris	4.183
Vinum origanites	5.61	Vitis vinifera	5.1
Vinum palmeum	5.40	Vlmus	1.112
Vinum panacites	5.72	Vmbilicus veneris	4.92.93
Vinum phthorion	5.77	Vnguentorum ratio	5.3
Vinum picatum	5.48	Vng. abrotoninum	1.61
Vinum pineum	5.65	Vng. amaracinum	1.69
Vinum è pipere	5.65	Vng. anethinum	1.62

Vng. cin-

INDEX.

Vng. cinnamominum	1.75	Vng. fampfuchinum	1.59
Vng. crocinum	1.65	Vng. fufinum	1.63
Vng. cyprinum	1.66	Vng. telinum	1.58
Vng. elatinum	1.55	Vnguis odoratus	2.10
Vng. gleucinum	1.68	Vrina	2.99
Vng. hedychroon	1.71	Vrfinus adeps	2.87
Vng. irinum	1.67	Vrtica	4.94
Vng. malabathrinum	1.77	Vua	5.3
Vng. megalinum	1.70	Vua paffa	5.4
Vng. melinum	1.56	Vulpinus pulmo	2.41
Vng. mendefium	1.73	X	
Vng. metopion	1.72	Xanthion	4.138
Vng. narcifinum	1.64	Xyris	4.22
Vng. nardinum	1.76	Z	
Vng. ociminum	1.60	Zea, feu femen	2.111
Vng. oenanthinum	1.57	Zopiffa	1.99
Vng. rofaceum	1.54	Zytum	2.109

INDICIS FINIS.



AGNA profectò habenda gratia, & benè
præcandum his hominibus est, qui operam,
studium, cogitationes deniq; omnes eò con-
ferunt, vt veteres scriptores enarrent. Ab his
enim non minus beneficiũ accepimus, quàm
si ὡς ὁ νεκρομαντὶς πνὶ eos nobis excitarent, à

quibus ad omnem humanitatem informaremur: cum nihil
aliud sit audire eum, qui Hippocratis, Platonis, Aristotelis, &
Galenì scripta ita enarret, vt mentis eorum sensum aperiat,
quàm eos loquentes adhuc audire: quod Iac. Syluiũ Lutetiæ
professorẽ Regium, Ioan. Schironium, Anto. Saportam, Guill.
Rondelletium, Petr. Guichardum Monspess. medicos eximios
facere quotidie experimur. Quibus Iacobũ Goupylum an-
numerandũ putamus, qui Socratis illud apud Xenophontem
probè tenens τὸ μὲν ἐργάτην εἶναι, ὠφελίμῳ τε ἀνθρώπῳ καὶ ἀγαθὸν
εἶναι τὸ δὲ ἀργὸν, βλαβερόν τε καὶ κακόν, præterquam quòd bonos
auctores nobis interpretatur, diligentissimè etiam conquisitis
vetustis exemplaribus, eorũ scripta magna fide ita emēdat, vt
in eis tutò versari possimus. Cuius rei fidẽ facit Dioscorides,
ita ab eo suo nitori restitutus, vt de alio nõ melius, quẽ ad ma-
teriam medicam pertinent, discere possimus. Itaque hos bo-
nos, & doctos viros amemus, colamus, & obseruemus: atque
tandem non opinione, sed firma persuasione imbuamur, vt
ab iis pendeamus, qui vetustate quandam auctoritatem præ-
se ferunt, & certa scribēdi ratione rectissimè nos informant.
Dioscoridem igitur verissimum fidelissimũque plantarum
descriptorem, tam bene castigatum, pulchrẽq; expressum dili-
gēter legamus, eiũsque perdoctum explanatorem beneuolẽ
attentẽque audiamus. Bene Valete. Ex Lutetia Parisiorum
ad I II. Cal. Augusti.



PS A quæ nunc dicetur herbarum claritas medicinæ tantum gratia gignente eas tellure, in admirationem curæ priscorum diligentiaque animum agit. Nihil ergo intentatum inexpertumque illis fuit. Nihil deinde occultatum quod non prodesse posteris vellent. At nos elaborata iis abscondere atque suppressere cupimus, & fraudare vitam etiam alienis bonis. Ita certe recedunt, qui pauca aliqua nouere, inuidentes aliis: & neminem docere, in auctoritatem scientiæ est. Tantum ab excogitandis nouis, ac adiuuanda vita mores absunt. Summumque opus ingeniorum diu in hoc fuit, ut intra unumquemque recte facta veterum perirent. At hercule singula quosdam inuenta deorum numero addidere, omniumque vitam clariorem facere cognominibus herbarum, tam benigne gratiam memoria referente. Non æquæ hæc cura eorum mira esset in his quæ satum blandiuntur, aut cibo inuitant, sed culmina quoque montium inuia & solitudines abditas, omnisque terræ fibras scrutati inuenire, quid quæque radix polleret ad quos usus herbarum folia pertinerent, etiam quadrupedum pabulo intacta ad salutis usus vertentes. Minus hoc quam par erat, nostri celebrare, omnium utilitatum & virtutum rapacissimi. Primusque & diu solus idem ille M. Cato, omnium bonarum artium magister, paucis duntaxat attigit, bouum etiam medicina non omissa. Post eam vnus illustrium tentauit C. Valgius, eruditione spectatus, imperfecto volumine ad diuum Augustum, inchoata etiam præfatione religiosa, ut omnibus malis humanis illius principis potissimum semper medicetur maiestas. Antea condiderat solus apud nos, quod equidem inueni, Pompeius Læneus, Magni libertus, quo primum tempore hanc scientiam ad nostros peruenisse animaduerto. Nanque Mithridates maximus sua ætate regum, quem debellauit Pompeius, omnium ante se genitorum diligentissimus vitam fuisse argumentis præterquam fama intelligitur. Vni ei excogita-

tum, quotidie venenum bibere, præsumptis remediis, vt consuetudine ipsa innoxium fieret. Primò inuenta genera antidoti, ex quibus vnum etiam nomen eius retinet. Illius inuentum autumant, sanguinem anatum Ponticarum miscere antidotis, quoniam veneno viuerent. Ad illum Asclepiadis mendendi arte clari, volumina composita extant: cum sollicitatus ex vrbe Roma, præcepta pro se mitteret. Illū solum mortalium vigintiduabus linguis locutū certum est, nec de subiectis gentibus vllum hominem per interpretem appellatum ab eo annis LVI. quibus regnavit. Is ergo in reliqua ingenij magnitudine medicinæ peculiariter curiosus, ab hominibus subiectis, qui fuere pars magna terrarū, singula exquirēs scrinium commentationum harum & exemplaria, effectusq; in arcanis suis reliquit. Pompeius autē omni regia præda positus, transferre ea sermone nostro libertum suum Lenæum, grammaticæ artis doctissimum, iussit: vitæq; ita profuit non minus quàm reipublicæ victoria illa, præter hos Græci autores medicinæ prodidere, quos suis locis diximus. Ex his Euax rex Arabum, qui de simplicium effectibus ad Neronem scripsit: Crateuas, Dionysius, Metrodorus, ratione blâdissima, sed qua nihil penè aliud quàm rei difficultas intelligatur. Pinxere nanq; effigies herbarū atq; ita subscribere effectus. Verū & pictura fallax est, & coloribus tam numerosis, præsertim in æmulatione naturæ, multum degenerat transcribentium fors varia. Præterea parum est singulas earū ætates pingi, cum quadripartitis varietatibus anni faciem mutant. Quare cæteri sermone eas tradidere. Aliqui ne effigie quidem indicata, & nudis plerūque nominibus defuncti, quoniam satis videbatur potestates vimque demonstrare quærere volentibus. Nec est difficile cognitu, nobis certè, exceptis admodum paucis contigit reliquas contemplari scientia Antonij Castoris, cui summa authoritas erat in ea arte nostro æuo, visendo hortulo eius in quo plurimas alebat, ceterisimū ætatis annū excedens, nullum corporis malum expertus, ac ne ætate quidem memoria aut vigore concussis, & cæt.

Π Ε Δ Α - P E D A N I I

ΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙ-
ΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕ-
ΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙ-
ΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

DIOSCORIDIS
Anazarbeide medicinali ma-
teria libri primi præfatio,

Io. Ruellio Sueßionēsi interprete.

10



ΟΛΛΩΝ ἔμo-
νον ἀρχαίων, ἀλ-
λὰ καὶ νέων σω-
ταξάμενών περὶ
τῆς τῶν φαρμά-

15

κων σκευασίας τε καὶ δυνάμε-
ως, καὶ δοκιμασίας φιλῶντες Ἀρεῖ-
πειράσομαι σοὶ παραστήσαι μὴ
κενῶν, μὴ δὲ ἄλογον ὀρμὴν ἐχθ-
κέναι πρὸς τήνδε τιμὴν θεωρημα-
τεῖαν. διὰ τὸ τὸν μὲν αὐτῶν, μὴ
τετελειωκέναι, τὸν δὲ ἐξ ἰσοείας
τὰ πλείστα ἀναγράψαι. Ιόλας μὲν
γὰρ ὁ βιθυνὸς καὶ Ηρακλείδης ὁ
τάραντινος, ἐπ' ὀλίγον ἤλθοντο τῇ

20

αὐτῆς θεωρηματεῖας. τίμω βο-
τανικῶν παντελῶς εἰδόντες πα-
ράδοσιν, οὐ μὲν ἔδδ' τῶν μεταλ-
λικῶν, ἀρχαίων πάντες ἐμπη-
μόνευσαν. * Κρατεύας δὲ ὁ ῥίζο-
τόμος, καὶ Ἀνδρέας ὁ ἱατρός,

25

οὗτοι γὰρ δοκοῦσιν ἀκριβέστερον
τῶν λοιπῶν περὶ τοῦτο τὸ μέρος
ἀνεγράψαι, πολλὰς ῥίζας εὐχρη-
στοτάτας, καὶ πινὰς βοτάνας ἀπα-
ρασημειώτους εἰδόντες. πολλὴν τοῖς
μὲν ἀρχαίοις μαρτυρητέον μετὰ

τῆς



Vanquā amicissi-
me Aree, complu-
res nō veterū mo-
dō, sed recetiorū

quoq; de medicamentorū cōpo-
sitione, virib⁹ atq; probatione
cōmētati sunt: nobis tñ nec va-
nū, nec à ratiōe abhorretē im-
petū animi ad hoc op⁹ incessif-
se, tibi ostēdere tētabim⁹: q̄ eo-
rū nōnulli absolutū nihil edide-
rūt, alij q̄ plurima, q̄ auditu per-
cūctādo didicerāt, scriptis tra-
diderūt. Siq̄ dé Bithin⁹ Iolas &
Heraclides Tarentinus, omīssa
pr̄fusherbarū tractatiōe, ré fa-
nē q̄ paucis perstrīxerūt. Neq;
verò oēs illi de metallicis quic-
q̄ reb⁹ aut odoramētis memō-
riæ prodiderūt. Crateuas autē
herbari⁹, & Andreas medic⁹, q̄
cæteris diligētius hac in partē
versati vidētur, radices multas
apprimē vtileis, herbāsq; haud-
quaquā adnotatas, reliquerūt:
Veruntamen pr̄scorū subscri-
bere oportet sentētias: quos et si

a paucā

DIOSCORIDIS

pauca ipsis referatur accepta, magnā tamē impēdisse diligen-
tiā cōstat. Iunioribus minus af-
fentiendū: ē qbus Iulius Bassus,
& Niceratus, & Petronius, Ni-
ger, & Diodotus, Asclepiadæ
omnes, medicinalē materiā ver-
naculā cognitāq; vulgò, dignā
cēfuerūt quę ab ipsis literis ex-
actē mādaret: & vt medicamē-
torū vires pbatōnēsq; cursim
cōplexi, sic nullo experimento
eorū effectus colligētes, inani
verò reddēdarū causerū studio
verba fundētes, alia p aliis scri-
ptitādo, rē in aceruū cōgeriēq;
cōtrouerfiarū extulerūt. Siqui-
dē qui inter eos egregius habe-
tur Niger, euphorbiū, nascētis
in Italia, chamelæ succū esse
cōtēdit: androsāmōnq; eandē
herbā cū hyperico esse. quin-
etiā aloē in Iudæa fofsilē na-
sci, & pleraq; his similia expo-
nit, reclamāte euidētia, q̄ pro-
fus veritati refragāt. Quibus cō-
iectura colligi potest, ea nō o-
culata fide sed narratiōe poti⁹
ab aliis accepisse. In ordine iudē
ipsi aberrarūt, partī eorū discre-
pātis nullāq; cognatione cō-
iūctas vireis collidētes: partī p
elemēta literarū scripta ī ordi-
nē digerētes, quò facili⁹ memo-
rię mādaretur, genera & eorū
effectus

τῆς ὀλιγότητος τῶν παρεδοξέ-
των, καὶ τὴν ἀκρίβειαν περὶ
παρελαβοῦσι. τοῖς μὲν τοι νέοις
οὐ συγκαταδετέον, ὅν ὅτι Βά-
σος ὁ Ἰουδαῖος, καὶ Νικηράτος,
καὶ Πιτρώνιος, Νίγερτες, καὶ Διό-
δοτος, ἀσκληπιάδαι πάντες. οἱ
τὴν μὲν πᾶσι σύμφυλλον καὶ
γνώριμον ὕλην, ἠξίωσαν ἐπὶ
ποσὸν ἀναγραφεῖς ἀκριβοῦς· τὰς
δὲ τῶν φαρμάκων δυνάμεις καὶ
δοκιμασίας ἐξ ἐπιδρομῆς πα-
ρέδωκαν, οὐ τῇ περὶ τὴν ἐνερ-
γειαν αὐτῶν κληρονομοῦντες. τῇ δὲ
τῆς αἰτίας κενοφωνία, εἰς ὅν
κον διαφορὰς ἐκάστου αὐτῶν ἀ-
ναφέροντες μετὰ τοῦ καὶ ἄλ-
λα αὐτὰ ἄλλων ἀναγράφειν. ὁ ἰς
γρῶν διαπερὶς δόκων εἶναι ἐν
αὐτοῖς Νίγερ, τὸ ἐφόρειον φη-
σὶν ὅπῃ εἶναι χαμελαίας, γη-
νωμῆν ἐν ἰταλία. καὶ τὸ ἀν-
δρώσαιμον, τῶν τὸν ὑπόρχην
ὑποκῶ, ἀλόλῳ δὲ ὁ ρυκτίῳ ἐν
Ιουδαίᾳ γηνοῦσθαι. καὶ ἄλλα
τούτοις ὅμοια πλείστα παρὰ τὴν
ἀλήθειαν ἐκπίπτει ψευδῶς. ἅ-
πτερ ὅτι τεκμήρια οὐκ αὐτοψίας,
ἀλλὰ τῆς ἐκ παρακουσμάτων
ἰσορείας, ἡμαρτον δὲ καὶ περὶ τὴν
τάξιν. οἱ μὲν ἀσυμφύλλους, δυ-
νάμεις συγκεράσαντες, οἱ δὲ κα-
τὰ σοιχεῖα ἀναγράφαντες.
διὰ ζεύξαν τὰς ὁμογενείας, τὰ
τε γῆν καὶ τὰς ἐνεργείας αὐ-
τῶν,

τῶν, ὥς διὰ τοῦτο ἐμνημό-
 νευτα γίνεσθαι. ἡμεῖς δ' * ὥς ἐ-
 σιν εἰπεῖν ἐκ περὶ τῆς ἡλικίας,
 ἀλλήκτον πινὰ ἔχοντες ἐπιθυμίαν
 περὶ τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ὕλης, καὶ
 5 πολλὰ γὰρ ἐπελδόντες. εἶδα
 γὰρ ἡμῖν στραπωτικὸν τὸν βίον, συ-
 ναμῶχα μὲν τὴν θεωρηματικὴν
 ἐν ἐξ βιβλίοις σὲ θεωρεῖσθαι μὲν,
 ὧς καὶ τὴν σύνταξιν ἀναπείσαι μὲν,
 εὐχαρίσον ἐκπληροῦντες πάθος.
 10 δι' ὧς ἔχεις πρὸς ἡμᾶς διάδε-
 σιν, φύσει μὲν πρὸς πάντας τοὺς
 ἀπὸ παιδείας ἀναρροῦντες οἰκτι-
 ρητός, μάλα δὲ πρὸς τοὺς ὁμο-
 τέχοις, ἰδιαιτέρον δὲ πρὸς ἡμᾶς,
 εἰς μὲν δὲ ἐσμικρόν τ' ἐν σὲ κα-
 15 λοκαγαθίας, καὶ ἡ γὰρ κρατίστου Λι-
 κινίου Βάσου πρὸς σὲ διάδεσις,
 ἣν ἐρωτῶμεν συνδιόχοντες ὑμῖν,
 ἀξιολόγων τὸ παρ' ἀμφοτέρων
 ὑμῶν πρὸς ἀλλήλους εὐνοίᾳ ὁ-
 ρῶντες, παρεκκαλοῦμεν δὲ σε καὶ
 20 τοὺς ἐντευξομένους τοῖς ὑπομνή-
 μασι, μὴ τὴν ἐν λόγοις ὑμῶν δύ-
 ναμιν σκοπεῖν, ἀλλὰ τὴν ἐν τοῖς
 θεωρήμασι μετ' ἐμπειρίας ἐπι-
 μέλειαν. μετὰ γὰρ πλείστης ἀκρί-
 βείας τὰ μὲν πλείστα δι' αὐτοψίας
 γνόντες, τὰ δὲ ἐξ ἰσορείας συμφώ-
 25 ρου τοῖς πᾶσι καὶ ἀνακρίσεως τῶν
 παρ' ἐκείνοις ἐπιχωρίων ἀκριβώ-
 σωντες, θεωροῦμεν καὶ τῇ τάξει
 διαφόρῳ χρησάμεν, καὶ τὰ γῆνη καὶ
 καὶ διωάμεν ἐκείνου αὐτῶν ἀνα-
 γρά-

effect⁹ à sua cognitiōe dissiūgē-
 tes. Nos verò ab icūte, vt ita di-
 cā, iuēta iugi desiderio cogno-
 scēdæ materiæ allecti, p multis
 regiōib⁹ peragratis (nec. n. ne-
 scis nos militarē vitā exegisse)
 tuo hortatu cōmētationē ī sex
 libros cōtulimus. quod op⁹ tibi
 dicamus, Aree, animi gratitudi-
 ne obsequētes, ob eū quo nos
 psequeris affectū. Etenim natu-
 ra cū in omneis eruditione ex-
 cultos, tū verò in eos qb⁹ cū tū
 bi eiisdē artis necessitudo īter-
 cedit, pn⁹ ad amicitia eē soles:
 in nos etiā aliquāto peculiari⁹.
 Enimuerò nō parū pbet tuæ
 pbitatis argumētū, optimi viri
 Licinij Balsi singularis erga te
 amicitia: quā vnā nobiscū degē-
 tes nouimus, cū mutuā īter vos
 bñuolētiā emulatiōe dignā in-
 tueremur. Admonitū aut te ve-
 lim, eōsq; qui in hosce cōmēta-
 rios incidēt, ne ī verbis faculta-
 tē nostrā æstimeris, sed potius
 adhibitā reb⁹ cū peritia curā.
 Etenī prurima visu ipsi exactif-
 simē cognouim⁹: quēdā etiā ex
 ea, de qua īter oēs cōuenit, hi-
 storia pcūctatiōēq; rerū apud
 singulos vernacularū diligēter
 accepim⁹. Dabimus igit operā,
 vt differēti ab aliis ordine tradi-
 to, genera medicinarū virēsq;
 a ij. descri-

describāt. Quòd aut̃ necessaria
 sit medicamētōrū ratio nemo
 est fermè q̃ ignoret, q̃ ea & to-
 ti arti cōiūcta sit, vniuersisq; e-
 ius partib⁹ efficax administret
 auxiliū. Quare per medicamē-
 tōrū cōpositiones atq; mistu-
 ras, & facta in morbis pericula
 extēdi, & incremētū capesce-
 re potest, q̃ plurimū conferēte
 singulorū medicaminū cogni-
 tiōe. Quinetiā vernaculā fami-
 liarēq; materiā cōplectemur,
 vt p̃fecta sit quæ à nobis relin-
 quet̃ doctrina. Verū imprimis
 curā impēdere oportet, vt suis
 tēporib⁹ singula & demetātur
 & recōdātur. certè p̃ horū ra-
 tione aut valēt virib⁹, aut eua-
 nido nullōq; munere fūgūtur.
 Serena igitur coeli cōstitutiōe
 demetēda sūt. Magni siq; dé re-
 fert iter colligēdū, si vel squalo-
 res vel ibres infesti sint: quēad-
 modū si loca, in q̃b⁹ prodeūt,
 cliuosa, & vētis exposita sint &
 p̃flata, frigidāq; & aquis carē-
 tia: in his. n. locis vires eorū lō-
 gè validiores intelligūtur. Cō-
 trà, quæ in cāpestribus, riguis,
 & opacis, cæterisq; locis à vē-
 to filētibus enascūtur, plerūq;
 degenerāt, & min⁹ virib. valēt,
 multōq; magis, si nō suo tēpo-
 re nec opportunè colligantur,
 aut

χράσασθαι. Οτι γὰρ μὲν ἀναγκά-
 σος ὑπάρχει ὁ πρὸς φαρμάκων λό-
 γος, παντὶ που δῖνον, σωε-
 ζευγμένος ὅλη τῇ τέχνῃ, καὶ τὴν
 ἀπ' αὐτοῦ συμμαχίαν ἀήτη-
 τον παντὶ μέρει παρεχόμενος. 5
 καὶ διότι δυνάται αὐξέσθαι κα-
 τὰ τε τὰς σκευασίας καὶ τὰς μί-
 ξεις καὶ τὸν ἐπὶ τῶν παθῶν
 πειρασμοῖς, πλείστα συμβαλλο-
 μένης τῆς πρὸς ἔκαστον τῶν φαρ-
 μάκων γνώσεως. περὶ αὐτῶν ἔτι 10
 ψόμεθα δὲ καὶ τὴν σωήτην καὶ
 σύμφυλλον ὕλην, ἵνα ἡ γερὰν
 γήνηται τελεία. περὶ πάντων
 οὖν φερντίξην τῆς ἀπερίσεως
 καὶ συλλογῆς ἐκάστου κατὰ τοὺς
 οἰκείους καιροὺς προσήκει. πα- 15
 ρὰ γὰρ δὴ τούτοις ἢ ἐισργεῖ,
 ἢ ἐξίτηλα γίνεται τὰ φάρμα-
 κα. αἰθρίου γὰρ ὄντος τοῦ κα-
 τασήματος συλλέγειν δεῖ. με-
 γάλῃ γὰρ * καὶν τούτῳ ὑπάρχει
 διαφορὰ, * τῶν ἀνυχμῶν ἢ ὁμ- 20
 βρων γηρομενῶν τὴν συλλογὴν
 ποιέσθαι. ὥς περ καὶ τὸ ὀρενοῖς
 καὶ ὑψηλοῖς καὶ διαπνευμένους
 καὶ ψυχροῖς καὶ ἀνύδρους εἶ-
 ναι τοὺς τόπους * ἰσχυρότεροι γὰρ
 εἰσιν αἱ διωάμεις αὐτῶν, αἱ δὲ 25
 ἐν πεδινοῖς καὶ χαλδύρχεις καὶ
 χατασκίοις καὶ μὴ διαπνευμέ-
 νοις, ἀτογώτεροι κατὰ τὸ πλεῖ-
 σον, καὶ μᾶλλον αἱ μὴ κατ'
 ὥραν ἐνκαίρως συλλεγέσθαι, ἢ
 δι'

δι' ἀδυναμίαν ἐφθικῆν. καὶ ἀγρο-
 τέον μὲν τοι ὅτι πολλάκις, ταῦ-
 τα παρὰ τῆς ἰδιότητος τῆς χώρας,
 καὶ παρὰ τὴν σύγκρασιν τῆς ἔτους,
 τὰ χρόνῳ ἢ βράδιον ἀκμάζει. ἔνια
 5 δὲ καὶ παρὰ τὴν ἑαυτῶν ἰδιότητα,
 ἐν χειμῶνι αὖθις τε καὶ φύλλα φέ-
 ρει πνῆα δὲ καὶ δὴς τῆς ἔτους αὐτο-
 φορεῖ. τὸν δὲ βελούμονον ἐν τούτοις
 ἐμπειρίαν ἔχειν, δεῖ κατὰ γε τὴν
 ἀρπυγὴν βλάστησιν ἐν τῆς γῆς, ἀκ-
 10 μάζουσι καὶ παρὰκμάζουσι παρὰ
 τυχαίαν. οὔτε γὰρ ὁ τῆς βλάστη ἐν
 τετυχηκὸς μόνον, διὸ αὖ τὸ ἀκ-
 μάζον γινώσκειν, οὔτε ὁ ἑωρακὸς
 τὰ ἀκμάζοντα, τὸ ἀρπυγὴς ἐπι-
 γινώσκει. παρὰ γὰρ τὸς μετὰ τὴν
 15 πρῶτον τῆς φύλλων, καὶ τὰ μετὰ τὴν
 τῶν καυλῶν καὶ αὐτῶν καὶ καρπῶν,
 καὶ τῶν ἄλλων ἰδιότητος, μετὰ τὴν
 πλάην γίνεσθαι ἐπὶ ἑνίοις τοῖς μὴ ἔ-
 τω τὴν θέαν ποιηταμύοις. παρὰ
 ταύτην γοῦν τῆς αἰτίας, τινὲς τῆς ἀ-
 20 ναρχαφάντων ἐπλανήθησιν, εἰπόν-
 τες πνῆα μὴτε αὐθις μὴτ' καυλὸν
 μὴτ' καρπὸν φέρειν. καὶ δά τ' ἐπὶ τῆς
 ἀρχώσεως καὶ βηχίης καὶ πενταφύλ-
 λεο δὲ πολλάκις ἐν τετυχηκὸς
 αὐτοῖς καὶ ἐν πολλοῖς τοῖς μάλι-
 25 στα τῆς ἐπιγνώσεως ποιήσας, καὶ μὲν
 τοι εἰδέναι ὅτι μόνον τῶν βοτανικῶν
 φαρμάκων ἐπὶ πολλὰ ἔτη δια-
 μύει, οἷον ἐλλέβορος ὁ λευκὸς καὶ
 μέλας, τὰ δὲ λοιπὰ μέχρι βιτιάς
 ἐπιτοπλεῖσιν εἶσιν * αὐχισα.

aut si per imbecillitatem inta-
 buerint. Neq; ignorandum, sa-
 pe pro peculiari loci natura,
 aut anni clemétia, maturi⁹ aut
 feri⁹ adolescere. Nónnulla pro-
 pria vi, hyeme florent & folia
 pariūt: quēdā bis anno florife-
 ra. Quare cui in animo est ho-
 rū peritiā assequi, necesse est eū
 prima germinatiōe solō emer-
 gentibus, adultis & senescenti-
 b⁹ adesse. Nā qui pullulāti her-
 bę dūtaxat adstiterit, adultā co-
 gnoscere nō potest, neque qui
 adultā tantū inspexerit, nuper
 erūpentē noscet. Quo fit, vt p-
 pter mutatā foliorū faciē, cau-
 liū proceritates, florū seminisq;
 magnitudinē, & id genus alias
 peculiares notas, nōnulli q. olī
 has rerū varietates nō pspexe-
 rūt, magno in errore versētur.
 Quæ causa etiā nonnullis scri-
 ptorib⁹ iposuit, q. herbas quas-
 dā, verbi gratia, gramē, q. nque-
 folium, & tussilaginé emittere
 florē, fructū & caulē, negāt. Er-
 go qui sapius ad visendas her-
 bas & earū natales se contule-
 rit, earū cognitionē maximē cō-
 sequet. Scire etiam nū cōuenit,
 sola ex herbaceis medicamini-
 bus veratri genera, nigrum, in-
 quā, & cādīdū multis edurare
 annis: reliqua à trimatu iutilia.

DIOSCORIDIS

Quę vero fruticosa sunt, sicut
 stœchas, trixago, poliū, abrotē
 nū, seriphū, absinthiū, hyssopū,
 & alia id gen^o, semine pregnā-
 tia demetāt. flores quoq; antea,
 q̄ spōte sua decidāt. fruct^o autē,
 vt maturi decerpāt necesse est:
 & semina, vbi siccari coeperūt,
 priusq̄ defluāt. Herbarū succus
 & foliorū elici debet, germinā-
 tib^o tū primū cauliculis. Lac &
 lachrymæ excipiātur, iciso per
 fummū adolescētieg vigorū cau-
 le. Radices, & liquamēta, corti-
 cēsve vt recōdanē, eximere cō-
 uenit cū herbę suis foliis exuū-
 tur. Siccātur etiā expurgatę ini-
 bi, locis asperginē nō redolēti-
 b^o: sed quę luto aut puluere sūt
 oblitæ, aqua elui debēt. Flores
 & omnia quę iucundū odorē
 efflāt, arculis tiliaceis, nullo situ
 obductis, reponātur. Nōnunq̄
 charta aut foliis semina, vt per-
 ennēt, aptē iuuoluūtur. Liqui-
 dis medicaminibus dēfior ma-
 teria, argentea, vitrea, aut cor-
 nea cōuenit. Fictilis etiā, si mo-
 dō rara nō sit, accōmodatur: &
 lignea, præsertim ē buxo: sed
 enea vasa oculariis medicamē-
 tis liquidisq;, & oīb^o iis quę ace-
 to, pice liq̄da, aut cedria cōpo-
 nūtur. Adipē autē & medullas
 stagnēis vasis recōdi cōuenit.

Iris.

* ἡ ἰρίς ἐν ἐνώβῃ ἐστὶ, σιχὰς, χα-
 μαῖδρις, πέλιον, ἀβρότονον, σέρι-
 φον, ἀψίνθιον, ὕσσωπον, καὶ τὰ ὁ-
 μοῖα τούτοις, συλλέγειν δεῖ, ἐγκύ-
 μονα τ' σπερμάτων. ἀνθὴ δὲ πρὸς
 τὸ ἀποπλώσεως αὐτ' τοῦ δὲ καρ-
 ποῦς πεπεῖρις ὄντας, καὶ τὰ σπέρ-
 ματα δὲ ἀρχόμενα ξηραίνεσθαι
 πρὸς τὸ ἀπορρεῖν, χυλίζειν δὲ καὶ
 τὰς βοτάναις, ἀρτιβλάστων ὄντων τ'
 χαμλῶν, ὁμοίως καὶ τὰ φύλλα, ὁ-
 ποῖς ὅ καὶ δάκρυα λαμβάνειν, τέ-
 μνοντας ἐν ἀκμῇ, * ἐπὶ τοῖς χαμ-
 λοῦς, τὰς δὲ εἰς ἀπόδεσιν ῥίζας
 καὶ χυλίσματα καὶ φλοιούς ἀφα-
 ρεῖν ἀρχομένων φυλορρεῖν τ' βο-
 τανῶν, καὶ τὰς μὲν καθαράς αὐτόθι
 ξηραίνειν ἐν τόποις ἀνοήτοις, τὰς
 ὅ μετεχούσας γῆς ἢ πηλῆς, πλύνειν
 ὕδατι. ἀποτίθειαι δὲ καὶ ἀνθὴ, καὶ
 ὅσα ἐνώβῃ τυγχάνει ἐν κισσίοις
 φιλλυεῖνοις ἀνοήτοις, ἐστὶ δὲ ὅτε
 καὶ ἐν χέρταις ἢ φύλλοις χηρσί-
 μως θεωρεῖται πρὸς διαμονὴν τ'
 σπερμάτων, πρὸς ὃ τὰ ὑγρὰ φάρ-
 μακα ἀρμόσει ὕλη πᾶσα ἢ πυκνὴ
 ἐξ ἀργύρου ἢ ὕδατος ἢ κεράτων γέλην
 μύνης, καὶ ὄσρακινῃ ὃ ἢ μὴ ἀεὶ αὐ-
 θετος. * ξυλίνων ὅσα ἐκ πύξος κα-
 τισκευάζει. τὰ ὅ χαλκῶ ἀλεῖται, καὶ
 ἀρμόσκει πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ * φάρ-
 μακα καὶ ὑγρὰ, καὶ ὅσα δι' ὄξους ἢ πύ-
 σος ὑγρὰς ἢ κεδείας κατασκευά-
 ζει. τεύαται ὅ καὶ μυθῆς, ἐν κασι-
 τερίνοις ἀγλείοις ἀποτίθειαι δεῖ.

Περὶ

Πρὶ Ἰεῖδος. Κεφ. α.

Ris ἀπὸ μὲν τῆς κατ'

I ἕραν ἑμφερείας ὠνόμασται, φύλλα δὲ φέρει

ὁμοία ξιφίῳ, μείζονα δὲ καὶ πλα
 5 τύτερά, καὶ λιπαρώτερά. ἀνθὴ δὲ
 ἐπὶ καυλῷ παρ' ἄλληλα, ἐπιχαμ-
 πῆ, ποικίλα· ἢ γὰρ λευκὰ ἢ ὠχρὰ
 ἢ μέλινα ἢ πορφυρεὰ ἢ κυανίζον-
 τα ὁρᾶται· ὁ δὲν διὰ τὴν ποικι-
 λίαν ἀπειχάδῃ ἰεῖδι τῇ οὐρα-
 10 νίᾳ, ῥίζαι ὕψιστοι γνατώδεις, σε-
 ρεαὶ, ἐνώδεις, αἳ δεῖ μετὰ τὴν
 τομὴν ξηράναι, ἐν σκιᾷ καὶ
 δειράναι λινῷ, ἀποτίθεσθαι. ἐστὶ
 δὲ βελτίων ἢ ἰλλυρικὴ καὶ μακε-
 δονικὴ καὶ ἐν ταύταις αἰεὶς ἢ
 15 πυκνόρριζος, καὶ ὑποκόλορος, καὶ
 δύσθραυστος, καὶ τῇ χροᾷ ὑπό-
 κυρτός, καὶ σφόδρα ἐνώδης καὶ
 τῇ γούσει πυρωτέρα. τὴν τε ὁ-
 σμὴν εἰδικρινῆς, καὶ μὴ νοτίζε-
 σαι. πικρὰ μὲν τε ἐν τῷ κόπτε-

20 θῆναι κινῶσα. ἢ λιβυκὴ δὲ λευ-
 κὴ κατὰ χροᾶν, πικρὰ πρὸς
 γεῦσιν δευτερεύουσα τῇ δυνάμει,
 παλαιούμεθα ὅτι τερηδονίζον. ἐ-
 νωδέσεται μὲν τοι τότε γίνον. δυνάμει
 ὅτι ἐχρῶσι πᾶσαι θέρμαν
 25 πικρῷ, λεπτιωτικὴν ἀρμόζουσαν
 πρὸς βίην, καὶ τὰ δυσανάγωγα
 ὑγρὰ λεπιοποιούσαι. καὶ δαίρουνσι
 δὲ * χολὰς ποτιζόμεθα μεθ'
 ὑδρομελιτος, ὅλκῃς < ζ'. εἰσὶ ὅτι
 καὶ ὑποποιοί, καὶ διακρυποιοί.

καὶ

Iris. Cap. I.

I Ris à coelestis arcus si-
 militudine nomé acce-
 pit. Folia fert gladioli,

sed maiora, latiora, & pinguio-
 ra. Flores in caule equalib' in-
 ter se spatijs distant, incurui, va-
 rij: siquidē cādidi, pallētes, lu-
 tei, purpurei, aut coerulei cōspi-
 ciūtur: qua diuerfi coloris spe-
 cie quædā coelestis arcus ima-
 go representari videtur. Radi-
 ces subiacēt geniculatæ, duræ,
 odoratæ, quæ frustatim disse-
 ctæ, in vmbra siccantur, & tra-
 iectæ lino recondūtur. Melior
 est Illyrica, & Macedonica: &
 inter has laudatissima, quæ pu-
 mila ferè & densa cōstat radi-
 ce, frangenti cōtumax, subrufo
 colore, gustu amaro, odore p-
 quā syncero, ita vt nullū pror-
 fus sitū redoleat: quæ dum tū-
 ditur sternutamēta mouet. Se-
 cundum locum habet Africa-
 na, candicans, gustūq; amara.
 Teredines in vetustate sentiūt,
 tūc tamē odoratiores reddi so-
 lēt. Vis omnib' excalfactoria,
 extenuās, cōtra tussim efficax:
 humorū q' ægrè reijciunt cras-
 sitiem digerūt, bilē crassāque
 pituitam ex hydromelite dra-
 chmis septem epote purgāt, so-
 mnū cōciliāt, lachrymas ciunt,
 a iijj tormini-

DIOSCORIDIS

torminibus medentur. Eadem potæ ex aceto, auxiliatur serpentiū iētib⁹, lienosis, cōuulsis, pfriktionibus, horrorib⁹, & quibus genitura effluit: menses ex vino potæ pellūt. Decoctū earū, foeminarum fotibus vtiliter imponit, ad emolliēdos locos, laxandāq; in eis venarū spiracula, ischiadicis infundit, fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle glādis modō subditæ, part⁹ extrahūt: quīetiā coctæ & illitæ, strumas, veterēsque duritias emolliūt. Siccæ quoque vlcera replēt, & cū melle purgāt: nudata ossa corpore operiūt: dolorib⁹ capitis, cū aceto & rosaceo magna vtilitate illinunt. Admotæ cū albo veratro & duab⁹ mellis partib⁹, lētigines & vitia cutis in facie à sole cōtracta emaculat: pēssis, malignatis, & acopis inserūtur. In vniuersum, magni ad oīa vsus.

Acorum. Cap. II.

Acorū folia iridis habet, angustiora tamē: radices non difsimiles, complicatas, nō in rectum sed obliquum actas, & summo cespite sparsas geniculis interceptas, albicātes, gustu acres, odore nō ingratas. Optimum est densum, candidū, plenū, carie nō exesum, odoratū, cuiusmodi

ἡ σφόδρα ἰών. μετ' ὅς τις ὁ πινόμεναι θηριοδύκτοις ἀρήροισι, καὶ πλινθηκοῖς, καὶ σπομύροις, καὶ αἰσχυρομύροις ἢ ῥιγῶσι, καὶ τοῖς ἰόνον περὶ ἐμύροις· συνὸ οἶνω δὲ ποθεῖσαι, ἀγχοῖν ἐμμύλω, καὶ τὸ ἀπό- 5 ζεμα δὲ αὐτῶ, πρὸς γυναικείας πυείας εὐδαιμον, μαλάσσον τὸς τόπους καὶ ἀναστομοῦν, ἰσχάδος τε εἰς ἐκλυσμα, καὶ στείγων καὶ κόλπον σαρκαπτικόν. περὶ δεῖται δὲ 10 ὡς κολλύριον μετ' μέλιτος, ἐμβρυά καταπαῶσι, μαλάσσει ὁ χοιρᾶδας καὶ σκίρρώματα παλαιὰ ἐφθαί καὶ ἀπλαθεῖται, ξηραὶ ὁ πλεῖστον ἔλκη, καὶ ἀνακαθαίροισι μετ' μέλιτος, καὶ τὰ ἐψλωμύρα τ' ὅσε- 15 ὦν σαρκεῶσιν ὠφελοῦσι ὁ καὶ κεφαλαγίας, συνὸ ὅς τις καὶ ῥοδίνω καταπλαθεῖται. φακὺς τε καὶ ἐφάλευ ἀποκαθαίρει, συνὸ ἐλλεβορώ λευκῶ καὶ διπλασίονι μέλιτι καταπλαθεῖται, μύγων ὁ καὶ πεσ- 20 στίς καὶ μαλάσμασι καὶ ἀκόποις, καὶ κατὰ τοῦ εἰσὶ πολλὸν χρῆσται.

Πρὶ Ακόρυ. Κεφ. β.

Ακορον τὰ μὲ φύλλα ἔχει ἐμφθῆ ἰεῖδι, σενώτρα δὲ καὶ τὰς ῥίζας ἐκ ἀνομών, διαπεπλεγμένας ὁ καὶ ἐκ εἰς ἐνθὺ πεφυκῆας, ἀλλὰ 25 πλάγας καὶ ἐξ ἐπιπολῆς, γόνασι διελκυσμέναις, ὑπολευκῆς, δριμύτης τῇ γένει, καὶ τῇ ὁσμῇ ἐκ ἀνδρῶν. διαφέρει ὁ τὸ πυκνὸν καὶ λευκὸν, ἄβρωτον τ' καὶ πληρὸς εὐωδίας. 30

ἔστο δὲ ὅτι τὸ ἐν χαλκίδι καὶ τῇ
γαλατία ἀσπλήτιον λεγόμενον.
Διῶται δ' ἔχει ἡ ῥίζα θέρμαντι-
κὴν, πινόμενον δ' τὸ ἀφέλημα ἀν-
τὶ ὕδατος κινεῖται μύζον πρὸς πλε-
ρας πόνον καὶ θώρακος καὶ ἡπατος,
σφόδρους, ῥήγματα, σπασματα·
ασπλήννας τήκης, ὧφ' ἔχει καὶ σπαιλου-
ριδωντας, θηριοδόνκτους, καὶ εἰς ἐκχέ-
δισμα ὡς ἱρίς πρὸς τὰ γυναικεία,
ὅ δ' ὅχιλος ἡ ῥίζη ἀποκαθαίρει τὰ
ἐπισκοῖν' ἡ δ' ἡόρας, μύζον δ' καὶ
τοῖς ἀντιδότοις ἡ ῥίζα χρυσίμως.

Περὶ Μείου. Κεφ. γ'.

Μείον τὸ καλέμενον Ἀθαμαν-
τικόν, γινώσκται πλείστον ἐν μακε-
δονία καὶ ἰσπανία, ὁμοίον χαλκῷ καὶ
τοῖς φύλλοις ἀνήδω, παχύτερον δ'
τῷ ἀνήδω. δέπηχ' πτυ ἀναβαίνον,
ταῖς ῥίζαις ὑπερσπαιρμύον λε-
πταῖς πλαγίαις, καὶ ἐνδείαις, μα-
κράις ἐνώδεσι, δερμαίνουσας δ'
γλῶτταν, αἱ τινες ἀποξεοδεῖται
μεδ' ὕδατος ἢ καὶ λείπει δίχα ἐ-
ψίσεως ποδεῖται, τὰ στεγὰ πε-
ρὶ κύστην καὶ νεφροὺς πάθῃ παρη-
γορεῖται, καὶ δυσουείας ἀμύ-
ζοισι. σωμαχοῦ τὸ ἐμπνευματώ-
σεσι καὶ σφόδρους, ὕστερ' ἔχει δὲ δι-
άσεις, ἀφθρον πόνοις, θώρακι ρευ-
ματιζομένῳ σὺν μύζῃ λείπει ἀν-
τι ἐκλεκτῇ βοηθεῖται, αἷμα τὸ ἀ-
ίσει δὲ ἐμμύων ἀποξεοδεῖται εἰς
ἐκχέδισμα. παιδίων δὲ κατὰ πλά-
θεῖται ἐφελκυστὶς οὐρα ἀροισιν,

cuiusmodi Colchidicū & Ga-
laticum, quod aspletion dicūt.
Radici vis calfactoria. Deco-
ctum potu vrinā cit: prodest la-
teris doloribus, & iocineris at-
que thoracis: itē torminibus,
vulsis, ruptis: lienē absūmit, vri-
næ stillicidio & serpentum icti-
bus auxiliatur, insidentibus ad-
muliebres affect' iridis modo
vtiliter imponitur, oculorū ca-
ligines succo discutit, antidotis
radix magno vfu cōmiscetur.

Meum. Cap. III.

Meon, quod Athamanticum
vocāt, in Macedonia & Hispa-
nia plurimum gignitur, anetho
foliis & caule simile, sed eo cras-
sius. binūm fermē cubitorū al-
titudine attollitur, sparsis ī obli-
quum rectumq; radicibus, lon-
gis, tenuibus, odoratis, linguam
excalfacientibus. Quæ feruefa-
ctæ ex aqua, vel tritæ citra co-
ctionē, præcluserum renū vesti-
cæq; farctæ vitia potu leniunt,
vrinæ difficultati medetur, sto-
machi inflatiōes discutiūt. Tor-
minibus, affectæ vuluæ, articu-
lorū dolorib', atq; fluxionibus
pectoris, tritæ cum melle in e-
clegmate auxiliatur, sanguinē
per mēstrua pellūt, discelsioni-
bus feruefactæ: infantib' autē
illitæ imo vētri, vrinās mouēt:
quod

DIOSCORIDIS

¶ si plus quàm deceat ex his bibatur, caput dolore afficiūt.

Cypirus. Cap. IIII.

Cypirus, quem aliqui erysi-
sceptum, vt aspalatum appel-
lant, folia fert porraceis pro-
xima, sed longiora & exilio-
ra: caulem odorati iunci, cubi-
talem aut maiore, angulosum,
in cuius cacumine minuta fo-
lia cum semine exoriuntur: ra-
dices, quarum in medicina est
usus, cohærentes inter se oleis
oblongis similes, aut rotundæ,
nigro colore, suaui odore, ama-
ro gustu. In lacunosis, palustri-
bus & cultis nascit. Optima est
grauissima, defra, fractu contu-
max, plena & aspera, odoris cū
quadā acrimonia iucūdi, qua-
lis est Cilicia, Syriaca, & quæ a
Cycladibus insulis petit. Huic
calida vis inest. Venarū spiracu-
la laxat, vrinam ciet, ad calcu-
los aquamq; subter cutē utilif-
simè bibitur, aduersus scorpio-
num ictus remedio est, perfri-
ctionib⁹ vuluæ & p̄clusionib⁹
fotu p̄dest, pellit mēses. Cōtra
vlcera oris etiā si depascāt vo-
rētq; farina ei⁹ efficax est. Ma-
lagmatis calfaciētib⁹, & vngue-
torū spissamētis bene adijci so-
let. Aliud cypiri gen⁹ tradūt in
India nasci, gingiberis effigie,
quod

ἐστὶ δὲ καὶ κεφαλαλγίης πλεῖον
ἢ δειπινόμῳ.

Πρὶ Κυπείρου. Κεφ. δ'.

Κυπείρου, οἱ δὲ ἐρυσίσκη-
πτον ὡς τὴν ἀσπάλαδον καλοῦ-
σι, φύλλα ὅ ἔχει ὁμοία πρῶτον, &
μακρότερα ὅ καὶ ἰσχυρότερα, καυ-
λὸν δὲ πυκνόν, ἢ καὶ μείζονα.
γωνιάδῃ, ὁμοιον χίνῳ, οὗ κατὰ
κορυφῇ φύλλα εἰὼν ἐστὶν ἐκφυσις
μικρῶν καὶ σπέρματος. ρίζαι δ'
ὑπαισιν ὧν καὶ ἡ χελὴσις, ἐπιμή- 10
κῃς ὡς πρὸς ἐλάϊας συναφείς ἐαν-
ταῖς, ἢ καὶ στρογγύλαι, μέλαναι,
ζυώδεις, ἐμποικροί, φέεται δὲ ἐν
τίποις ἐργασίμοις καὶ τελεματώ-
δεσιν. αἰεὶς δὲ ἐστὶν ἢ βαρυτάτη
καὶ πυκνὴ καὶ ἄδρα, δύσδρα- 15
στος, τραχεῖα, ζυώδης μετὰ πινος
δειμύτητος. τοιαυτὴ δὲ ὅστις ἢ*
κίλικις, καὶ ἢ συριακὴ, καὶ ἢ ἀπὸ τῆς
κυκλάδων νήσων. δυνάμεις ὅ ἐστιν
αὐτῇ θερμαντικὴ, ἀγασμοπι- 20
κὴ, διουρητικὴ καὶ διώσκει καὶ ὑδρω-
πικοῖς πινόμενῃ βοηθεῖ, καὶ σκορ-
ποδιήκτοις, καὶ ταῖς πρὸς μύ-
τραν δὲ κατὰ φύξιν καὶ μύσεις
πυριωμένη* ἀρμόζει, ἀγρυσσά
ἐμμύα ποιεῖ δὲ καὶ τοῖς ἐν σό- 25
ματι ἔλκεσι καὶ νεκρομένοις ξηρὰ
λεῖα μύγνυται καὶ μαλάγματα
θερμαντικοῖς, καὶ εἰς τὰ στίγματα
τῶν μύρων ζυδετέει. ἰσορεῖ ὅ καὶ
ἕτερον εἶδος κυπείρου ἐν Ἰνδία
χρυνώμανον, προσποιεῖς ζιγύβρι-
δι δὲ

ὁ διαμαρτυρῆν* κροκῶδες ἢ π-
κρὸν εὐείσκειται, καὶ αἰχιδιὲν δέ,
παρὰ χεῖμα φιλοῖ τὰς τείχας.

Πρὶ Καρδαμώμη. Κεφ. ε.

Καρδάμωμον αἰσον τὸ ἐν
5 τῆς κομαγενῆς καὶ ἀρμενίας καὶ
βοσπόρου κομιζόμενον. θυνᾶ-
ται δὲ καὶ ἐν Ἰνδία καὶ ἀραβία.
ἐκλέγου δὲ τὸ δύσδραυτον, πλῆ-
ρες, μεμικρὸς, τὸ γὰρ μὴ ποιῶντον,
ἐξωρὸν ὅστις, καὶ τὸ τῇ ὁσμῇ πλῆ-
10 κτικὸν, γένουσι δὲ δειμὺ καὶ ὑπό-
πικρον, διωάμην δὲ ἔχει δερμα-
πικρὺ. ποιεῖ δὲ μετ' ὕδατος π-
νόμῳ πρὸς ἐμπληπτικοὺς, βίτ-
τοντας, ἰσχυαδικούς, καὶ παρὰ λισιν,
ρήγματα, ἀσάσματα, σρόφους,
15 καὶ ἑλμινθὰ πλατεῖαν ἐκβάλλει,
μετ' οἴνου δὲ πινόμῳ, νεφει-
κοῖς, δυσουρεῦσι, σκορπισοπλή-
κταις, καὶ πᾶσι τοῖς ἰοβόλοις ἀρ-
μύζι, μετὰ τῇ δούφνης ῥίζης φλοι-
οῦ ποτὲν ὅσον < λίθοις θρύπτει,
20 φθείρει καὶ ἑμβρυα ὑποδυμώμε-
νον, καὶ ψάρας ἐξαίρει συν ὅξει
καταχρῶμενον, μύζνται δὲ καὶ
εἰς τὰς τῶν μύρων εὐφραϊς.

Πρὶ Νάρδε. Κεφ. ς.

Νάρδε ἐστὶ δύο ἡνιῶν μὲν, γάρ
25 πρὸς καλεῖται ἰνδική· ἢ δὲ συριακή.
ἔχῃ πρὸς ἐν σεία εὐείσκει. ἀλλ'
ὅτι τὰ ὅρα ἐν τῇ θυνᾶται, τὸ μὲν
πρὸς σείαν τέτραπται, τὸ δὲ
πρὸς Ἰνδούς, καὶ τὸ λεγομένης συρι-
ακῆς, ἐστὶ βελτίων ἢ πρὸς σείαν,
καὶ

quod māducatū croci vim red-
dit, gustu amaro sentit, & illitū
presentē psilothi vim exhibet.

Cardamomum. Cap. V.

Cardamomū optimū est, qđ
ex Comagene, Armenia, Bo-
sphorōq; deuchit: in India quo-
que & Arabia puenit. Eligi de-
bet plenū, frangenti cōtumax,
occlusum, farctūmq; (qđ enī
huiusmodi non est, exoletū iu-
dicatur) & gustu acre, subama-
rum, & odore caput tentās. Ex
calfactoriā vim habet potūm-
que ex aqua facit ad comitia-
les, ischiadicos, tussiles, neruorū
resolutionē. Itē ad rupta, vulla,
tormina: latas vētris tineas ex-
cutit. Ex vino autē potū, reni-
bus, difficultati vrinæ, à scor-
pione ictis, neq; non omnibus
venenū vibratibus, auxilio est.
Cū cortice radicis lauri epota
drachma calculos comminuit,
partus suffitu enecat, scabiē ex
aceto illitum adimit. Et ad vn-
guentorū spissamenta additur,

Nardum. Cap. VI.

Duo nardi genera: vnū In-
cum, alterum Syriacū appo-
tur, non qđ in Syria prouenit
sed quod mōtis in quo oritur,
pars vna ad Syrios, pars altera
ad Indos flectitur. Ex hoc Sy-
riaci genere precipuū est recēs

DIOSCORIDIS

& leue, largā gerēs comā, flauū colore, perquā odoratum, ac cyperum redolens, breui spica, amaro sapore, linguā ficcante, quod diu in sua odoris gratia permaneat. Ex Indicis aut nar dum quoddā Gangitis vocat, à fluuio Gange, apud quē ena- scitur, montē præterfluente: qđ genus ob multā loci, in quo p- dit, viginem, viribus infirmius est, atq; proceri⁹ adolescit, plu- res ferens spicas ab vnica radi ce comofas, vnāq; conuolutas, ac grauiter olētes. Montanum autē odoratius, spica breui ac mutila, odore cypero vicino, ceteras habēs Syriaci dotes. Est & genus quoddā cui Sāphari- tico nomen locus indidit, fru- tice breui, ī magnas se spargēs spicas candidiore interim me- dio caule, hircorū virus supra modū redolente: quod impro- batur. Madefactū vēdi solet: qđ virium ex eo deprehenditur, qđ cādida sit spica, & squālida, nul- lōq; puluere obsita. Adultera- rī stilbio cum aqua aut pal- vino, inspissationis ponde- rē; causa inspirato. Intueri au- rem oportet si lutū radicibus infideat, & in cerniculo pulue- rem excutere, eluēdis manib⁹ vtilem. Vim habēt excalfacto- riam,

ὅτι κέρη, πολύκομος, ξανθὴ τ' ἡ χρο-
αν, ὑπόδης ἄγαν, καὶ μετ' ἧς κυπρί-
ζεν ἐν τῇ ὁσμῇ, μικρὸν ἔχουσα τ'
σάχυν, πικρὰ τ' γεῦσιν, καὶ ἰλῶστος
ἀναξήραντικὴ, ἐπιμυρόουσα τε τῇ
ὑπόδω ἐφ' ἱκανόν. τ' ὅτι ἰνδικὴς ἡ
μύρτις λέγεται γαγγίτις. ἀπὸ πινος
ποταμὸς παρὰ ῥέοντος τ' ὅρους γὰρ
γὰρ καλυμμένη, παρ' ὧ φύεται. ἀδεν-
εῖρα καὶ δυνάμειν ἔσται διὰ τὸ ἐφ'
ὑδατοδῶν τύπων εἶναι καὶ ἐπιμυ-
κασέεσθαι, πλείονας τε ἔχουσα τῶν
σάχυν, ἀπὸ τ' αὐτῇ ῥίζης καὶ πολλο-
κέρως καὶ περιπεπλεγμένως, βρομώ-
δεις καὶ τ' ὁσμώ. ἡ δ' ὁρενοτέρε-
ὑπόδω εἴρεσθαι, κολοβόσαχυν κυπρί-
ζουσα καὶ τ' ὑπόδω. ἔχουσα τ' καὶ
ἄλλα ἐν αὐτῇ, ὅσα παρ' ἡ συρία-
καὶ λεβομόρη. καλεῖται δὲ τις καὶ σαμ-
φάρτικη, σφόδρα κολοβή, ἀπὸ χρο-
εῖου ὠνομασμένη, μεγαλόσαχυν,
λευκότερον καυλόν, ἔσθ' ὅτε μέσον
ἔχουσα, ὑπερβαλίζοντα τῇ ὁσμῇ, ἢ
δεῖ ἀπεκλέμεσθαι. πεπεράσκειται δὲ
καὶ ἀποθεβερεμένη, ὅπως γινώσκειται
ἐν τ' λευκὸν εἶναι τ' σάχυν καὶ ἀμ-
χυμερὴν, καὶ μὴ ἔχειν τ' χυμὸν. δολί-
ζοισι δὲ αὐτ' ἐμφουστῶντες σίμ-
μι μετ' ὑδατος ἢ οἶνου φοινικίτης,
πρὸς τὸ συμπλοῦσθαι αὐτῶν, καὶ
βαρυτέραν γίνεσθαι. ἐπὶ δ' ἡ χρο-
ας ἀφαιεῖν δεῖ, εἰ περ σείη τ' ῥί-
ζας πηλός, καὶ σὺθην χροεῖζοντα τ'
κοινωστόν. ὑπερκαύεται εἰς χειρὸν
πρὸν. δύναιται δ' ἔχουσι θέρμαν-
τικῶν.

ῥῆν, ξηραντικὴν, ὑριτικὴν, ὅθεν κοι-
 λίαν τὴν ἐσῆσι πνομήναι, καὶ τὰς
 ἐκμύβας ῥύσας περὶ στήθεσιν, καὶ
 ἰχῶρας σέλησι. βοηθεῖ δὲ καὶ ναυ-
 τίας, συνήχων ὕδατι πνόμε-
 ναι καὶ καρδιωμοῖς, καὶ ἐμπνευμα-
 τικαῖς, ἡπατικοῖς τε καὶ ἐκτερι-
 κῶς καὶ νεφριτικοῖς, ἐναφεισθεῖ-
 σαι δὲ ὕδατι, καὶ πνευματοῖς, εἰς
 ἐκκρίσιν φλεμοναῖς μύβας ἰσχυ-
 ραίνει καὶ πρὸς τὰς ἐν ὀφθαλ-
 μοῖς μυδρίδας τῶν βλεφαρῶν, εὐ-
 φρεσιν καὶ διασύνεσιν τὰς βλεφα-
 είδας, καὶ ὑπερβολὰς τὴν σῶμασι διά-
 πασμα, μίγνυν δὲ καὶ ἀντιδοτοῖς.
 ἀποτίθεν δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικά, ἐν
 ἀλγέῳ κενῷ ἀκονίτῳ, ληοξισθεῖ-
 σαι συνὸν οἶνω καὶ ἀναπλαθεῖσαι.

Πρὶν Κελτικὴς Νάρδος. Κεφ. ζ'.
 Ἡ δὲ κελτικὴ νάρδος, ἡν ἂν ᾶν
 ἐν τοῖς κελτικαῖς ἀλπεσιν ἐπι-
 χωρίως ὠνομασμένη* ἀλβέγνια.
 ἡν ἂν ᾶν δὲ ἐν τῇ ἰσπρία. ἐστὶ δὲ θα-
 λήκη μικρὸς συνὸν ῥίζαις, εἰς
 δέσμας ἀναλαμβάνοντος χει-
 ροπαλθεῖς. ἔχει δὲ φύλλα ὑπομή-
 κη, ὑπόξανθα, αὐθὺς μύλλον, μύ-
 νωνι δὲ τῶν κλωνῶν ὅτι καὶ τῶν ῥιζῶν ἡ
 ῥιζὴν καὶ ἡ ὕλη δία. ὅθεν δεῖ πρὸ
 μίας ἡμέρας καταρράσαντας ὕδα-
 τι τὰς δέσμας, καὶ χαλεκίζοντας τὸ
 γὰρ δὲς, πένειν ἐπὶ ἑδάφους νο-
 ττροῦ, περὶ ὑποκλήμους χαρτίου, τῇ
 δὲ ὑπεραία καὶ αἰσθητῇ, οὐ γὰρ συν-
 ὑποκαταίρεται τῷ ἀκονίτῳ καὶ
 ἀλλοτρίῳ

riam, & exiccantē. Vrinam mo-
 uent, aluum potu sistunt, vuluæ
 profluuia, saniemque apposita
 supprimūt. Nauseæ ex aqua fri-
 gida auxiliantur, & stomachi
 rosionibus, inflationi, iocineri,
 regio morbo, renum vitijs. A-
 quæ autē incoctæ fotu ad in-
 fessum, vuluæ inflammationibus
 medentur: ad glabras oculorū
 genas valent: siquidem eas ad
 densiorē pilum reducunt, per-
 fusis humore corporib⁹ inspar-
 guntur. Miscentur antidotis, &
 in fictili nouo non picato ad
 ocularia medicamenta recō-
 duntur, trita in farinam, & cū
 vino in pastillos coacta.

Nardū Celticū. Cap. VII.

Celticum nardum nascitur
 in Liguriæ Alpibus, salium-
 ca patrio nomine appellatum,
 prouenitque in Istria. Exiguè
 fruticat, & cum radicibus in
 manuales fasciculos compo-
 nitur. Folia habet oblonga,
 colore in flauum languido, flo-
 rem luteum. Cauliculorum &
 radicum duntaxat vsus est, &
 odoris suauitas: vnde pridie
 fasciculos aqua abluerē expe-
 dit, & exempta terra pauito so-
 lo atq; humeti subiecta char-
 ta reponere, postridie repur-
 gare, siquidē vtile, cū acroto
 alienoq;

DIOSCORIDIS

alienoq; propter humoris vim, non excutitur. Adulteratur imposita herba simili, quæ hirculus vocatur, ab odoris grauitate: sed facilis cognitio. nanteque herba candidioreft, sine cauliculo, minoribus folijs, radice neque amara, neque odorata, vti verum nardum eft. Itaque radices atque cauliculi, abiectis folijs triti fecernuntur, vino excipiuntur, digerunturque in pastillos, & ita fictili nouo diligenter operto, afferuari debet. Laudatur maximè recens, iucundi odoris, radice numerofa cohæres, plenû, nec fragile. Ad eadem, quæ Syriacû pollet: fed vehementius vrinam cit, & ftomacho vtilius eft. Inflammationibus iocineris, & felle fuffufis auxiliatur. Contra ftomachi inflationes, cum abfinthij decocto bibitur: item aduerfus lienem, renum & veficæ vitia & venenatos ictus, ex vino. Additur in malagmata, potiones, & calfacientia vnguenta.

Mótanû nardû. Cap. viii.

Montanum nardum, quod ab aliquibus thylacitis, & niris appellatur, in Cilicia, & Syria nascitur, furculo & folijs eringio fimilibus, minoribus, minime

ἀλλοτεῖω τὸ εὐχρηστον, διὰ τὸ ἐκ τῆ ἱκμάδος ἐντονίαν. δολίζε-
 7) τὸ συναποπιλομένης αὐτῆς, πό-
 ας ἐμφρῶς, ἣν διὰ τὸ πλεῖ-
 μὴν βρομῶδες, βάσιν καλεῖσιν. ἐν-
 χρης τὸ ἢ ἐπὶ πῶσις, ἀκμυλός γάρ 5
 ὅστις ἢ πῶα καὶ λευκότερα, καὶ ἢ πῶν
 ἐπιμήκη τὰ φύλλα ἔχει, καὶ δὲ τὸ
 ῥίζαν πικρὰν ἢ ἀρωματίζουσαν
 ὡς ἐπὶ τῇ ἀλιδινῇ ἔχει. ἀπο-
 κρίνας ἔν τῇ καυλῷ καὶ τὰς ῥί-
 ζας, τὰ δὲ φύλλα ῥίψας, εἰ βέλει 10
 δ' ἀποτίθεσθαι, ἀναλαμβαίνων
 λεῖα οἶνω, καὶ βόχσις ἀναπλά-
 σας φύλατῃ ἐν ὀσρακίῳ ἀγγεῖῳ
 κλεινῷ, πομάζων ἐπιμελῶς. αἰεί
 ση δὲ ὅστις ἢ πρὸς σφάτος καὶ ἐνώ-
 δης, πολὺ ῥίζος, οὐκ εὐδρυπτός, 15
 πλήρης. διῶα) τὸ ὅσα καὶ ἢ σκεῖα
 καὶ διεσπικνότερα, τὰ καὶ ἐν σωμα-
 χωτέρα. ὠφελεῖ τὸ καὶ τὰς πλεῖ-
 ἢ παρ φλεγμονάς, καὶ ἰκτεϊκὰς καὶ
 πνευματώσεις σωμαχικὰς, καὶ ἀφε-
 ψήματος ἀψινθίου πινόμεν. ὁ- 20
 μοῖως καὶ σπληνῶα, καὶ τὰ πλεῖ-
 κῶσιν καὶ νεφρὰς. καὶ πρὸς τὰ ἰσθ-
 λῶν δόματα συνὸ οἶνω, καὶ εἰς τὰ
 μαλάγματα μίβν) καὶ πόσιμα
 τα, καὶ χρίσματα δερματικὰ.

Πρὶ ὀρενῆς Ναρδῆς. Κεφ. ix.

Η δὲ ὀρενὴ νάρδος, καλεμέ-
 γη δὲ ἐπὶ πηγῶν καὶ θυλακίτις καὶ
 νῆεις, θηγᾶται ἐν καλικίᾳ καὶ
 σκεῖα. φύλλα καὶ καυλοὺς ὁμοίᾳ
 ἡδυνγίῳ ἔχουσα, μικρότερα μὲν,
 καὶ μὲν

οὐ μὲν πρᾶχέα καὶ ἀκανθώδη.
ρίζαι δὲ ὑπαισι μέλαιναι ἐνώ-
δεις δύο, ἢ καὶ πλείους, ὥσπερ
ἀσφοδέλου, ἰχνοτέραι καὶ μι-
κρότεραι πολλῶ. οὔτε δὲ χα-
λόν, οὔτε καρπὸν, οὔτε αἶθος φέ-
ρει. ποιεῖ δὲ ἡ ρίζα πρὸς ὅσα καὶ
ἡ καλπικὴ νάρδος.

Πρὶ Ἀσάρου. Κεφ. θ'.

Ἀσάρου, οἱ δὲ, νάρδον ἀγρίαν
καλοῦσι πᾶσα ἐνώδης σεφανώμα
πικρή. φύλλα ἔχει κισσῶ ὁμοία,
10 μικρότερὰ δὲ πολλῶ καὶ στρο-
γυλώτερὰ. αἴθνη μετὰ τῶν
φύλλων πρὸς τῇ ρίζῃ, πορφυ-
ρᾷ, ἐνώδῃ, ὑοσκυάμω κυτίνω
ἐμφερῇ, ἐφ' οἷς τὸ σπέρμα ἐοι-
κὸς μὲν ἄρτω. *ρίζαι ὑπαισι πολ-
15 λαί, ῥονατώδεις, λεπταί, πλά-
ται ὁμοίαι ἀγρώσει. ἰχνοτέραι
μὲν τοὶ πολλῶ καὶ ἐνώδεις διε-
μαίνουσιν καὶ δάκνουσαι λίαν
τὴ γλῶσσαν. δύναμις δὲ αὐτῶν
20 διουρητικὴ διεσμαπνική, ἀρμό-
ζουσα ὑδρωπικοῖς, ἰσχυρὰ τοῖς
χρονίοις, ἀριστὶ δὲ καὶ ἐμπίνα
μετὰ μελικράτου ποδεῖται αἰ-
ρίζαι πλῆθος < 5. καὶ δάμερυ-
σιν ὡς ἐλλέβορος λευκός. μύρρον
25 δὲ καὶ μύρις, φύεται ἐν ὑποσχί-
οις ὄρεσι, πλείω δὲ ἐν πόντῳ καὶ
φρυγίᾳ καὶ ἰλλυρίῳ, καὶ *ἰουσί-
νῃ τῆς ἰταλίας.

Πρὶ Φῦ. Κεφ. ι.

Φῦ, οἱ δὲ, καὶ τὸ αἶμα
νάρδου

nimè tamen spinosis, asperisq;
Radicib⁹ binis nititur, aut plu-
rib⁹, nigris, odoratis, ceu bastu-
læ regiē, sed longè graciliorib⁹,
& lōgè minoribus. Neq; cau-
lem, neque fructum, neq; florē
profert. Ad eadem ad quæ Cel-
ticum efficax.

Asarum. Cap. IX.

Asarum, quod & ipsum ali-
qui sylvestre nardum appellāt,
hedera folijs minoribus mul-
tò, rotundiorib⁹que, floribus
cytino hyoscyami similibus,
purpleis, inter folia proxime
radicem emicantibus, odora-
tis, in quibus semen acinosum.
gradices numerosas, genicula-
tas, tenues, obliquas, grami-
ni non dissimiles, longè tamen
graciliores, odoratas, excalfa-
ciētes, & quæ linguam vehe-
menter mordent. Excalfacto-
riam vim habet: vrinā cit, hy-
dropicis & vetusto coxendi-
cum dolori prodest. Radices
senis drachmis ex aqua mulsā
potē, menses trahunt, & vera-
tri albi modo purgant. In vn-
guenta additur. Vmbrosis mō-
tibus puenit, sed plurimum in
Pōto, Phrygia, Illyrico, & Ita-
liæ Iustinienfi agro.

Phu. Cap. X.

Phu, quod & aliqui sylvestre
nardum

DIOSCORIDIS

nardum appellant, nascitur in Ponto, folio olusatrici, aut elaphobosci, caule cubitali, aut altiore, leui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto, floribus narcisso proximis, maioribus, tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo villosa in nigri veratri aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem cōtextis, flauescens, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum æmulantibus. Excalfacit, vrinā mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem præstare potest. ad lateris etiam dolorem efficax, menses cit, antidotis inferitur. Adulteratur radice rusci ammixta: sed maleficium deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine vlla odoris gratia.

Malabathrum. Cap. XI.

Malabathrum arbitratur aliqui esse Indici nardi folium, falsi quadam odoris cognatione: permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, niris. secus autem res se habet. Nanque malabathrum foliū sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris

ναρδον καλεῖσι, γηνᾷ δὲ ἐν πόν-
τῳ, φύλλα δὲ ελαφοβόσκῳ ἢ ἱππο-
σελίνῳ παρὰ πλήσια ἔχει, καυλὸν
πικρυαῖον, ἢ μείζω, λεῖον, τρυφρὸν
ἐμπόφυρον, μεσόκοilon, διελημι-
μῆρον. γένεσθαι αὖθις πρὸς τὰ τοῦ
ναρκίσσου, μείζω δὲ καὶ τρυφρώτε-
ρα, καὶ ἐν τῷ ὑπολεύκῳ διαπέ-
φυρα. ῥίζα δὲ ἢ μὲν ἀνωτέρω, πρὸς
δακτύλου μικροῦ τὸ πάχος, πλά-
για δὲ ἐπὶ ῥίζῃ ἔχει κατὰ περ-
σῆνος ἢ μέλας ἐλλέβορος, ἀλλή-
λοις ἐπιπεπλεγμένα, ὑπόξαντα,
ἐν ᾧ δὲ, ναρδίζοντα τῇ ὁσμῇ, με-
τά τινος βάθους βερμώδους. δύ-
ναται δὲ θερμαίνειν, οὐρα κινεῖν
ἐκπρὸς ποτιζομένη, καὶ τὸ ἀπό-
ζημα δὲ αὐτῆς, τὸ αὐτὸ διώεται
ποιεῖν, καὶ πρὸς πλευρὰς πόνον, ἐμ-
μηνῶ τε αἵματι καὶ ἀντιδότοις μι-
γνύται. δολοῦται δὲ ὀξύμυρσίνης
ρίζαις παρεμυγνυμένη. ἐν χειρὶ
δὲ ἢ ἐπὶ γήωσις αὐτῆς ὅτι σκλη-
ραὶ γὰρ εἰσιν αὐταὶ καὶ δύσθραυ-
στοὶ δίχα ἐκωδίας.

Περὶ Μαλαβάθρου. Κεφ. ια.

Μαλαβάθρον ἐνίοι ὑπολαμ-
βάνουσιν εἶναι τῆς Ἰνδικῆς ναρ-
δου φύλλον. πλανώμενοι ἀπὸ
τῆς κατὰ τὴν ἑσπερίαν ἐμφερείας
πολλὰ γὰρ ὅμοια τῇ ὁσμῇ
ναρδῳ, ὡς τὸ φού, ἄσπερον, νή-
εις. οὐκ ἔχει δὲ οὕτως. ἴδιον
γὰρ ὅτι γῆρος φυτόμερον ἐν τοῖς
Ἰνδικαῖς τέλμασι, φύλλον ὃν ἐπι-
νῆξ-

ἡ γὰρ ὁ μύρον τῷ ὕδατι, καὶ δάπερ ἢ
 ἐπὶ τῶν τελμάτων φακῇ. ῥίζαν
 ἔχον, ὅπως συλλέγοντες, ἐν θέ-
 ως διαπείρουσι λίνῳ, καὶ ξηρὰν α-
 ντὶ ἀποτίθενται. φασὶ δὲ καὶ τὴν
 5 δερμαίαν ἀναξήραν δέντρος τῶ ὕδα-
 τος, καὶ ἐκταί φρυγάνοις τὴν γῆν,
 μήλοιο μύρον γὰρ τέτα μὴ κέπαι φύε-
 δαι. ἐστὶ δὲ καλὸν τὸ πρὸς σφατον
 καὶ ὑπολευκόν, ἐν τῷ μελανίζῃ
 10 ἀδραυσὸν τε καὶ ὀλοκλήρεν, πλη-
 κτικὸν τῇ ὀσμῇ, καὶ ἐπιδιὰ μύρον
 τῇ ἐνωδία, νάρδιζον δὲ τῇ γεύ-
 σει μὴ ἀλμυρίζον. τὸ δὲ ἀδρα-
 νὲς καὶ τὸ λεπτοκοπή μύρον, ἐν ῥω-
 πῶσαν ἔχον τὴν ἀποφόρον, φαῦ-
 λον, διώαμιν ὅ ἔχει τὴν αὐτὴν
 15 τῇ νάρδι. ἐν ῥήγεσιν δὲ ἐκείνη
 πᾶν τα ποιεῖ. διερρητικώτερα μύ-
 ροι καὶ ἐν σωμαχῶτέρα ἐστὶν, ἢ τῶ
 μαλακῶ ἀδρόν διώαμιν, καὶ πρὸς
 τὰς ὀφθαλμικὰς φλεγμονὰς ἀφ-
 μύζει ἀναξήρεν ἐν οἴνῳ καὶ λεῖον
 20 ἐπὶ χρομύρον. ὑποτίθεται δὲ καὶ
 γλώσση πρὸς ἐνωδίαν σόματος,
 καὶ σὺν ἱματίοις τίθεται ὑβρωτῇ
 γὰρ καὶ ἐν ὧδιν ταῦτα τηρεῖ.

Περὶ Κασσίας. Κεφ. ιβ΄.

Κασσίας δὲ ἔστι πλείονα εἶδη,
 25 πρὸ τῶν ἀρωματισφόρων ἀραβίαν
 γυνώμυρα. ἔχει ὅ ῥά βδον παχύ-
 φλοιον, φύλλα ὅ ὡς πεπέρεως. ἐκ-
 λέγει ὅ τὴν ἑγκύρην, ὡς ἔχον, κορα-
 λίζουσαν, σερπὺν λίαν, μακρὰν καὶ
 παχύναν, τοῖς συνελγίοις ὁλκήρεν,
 30 δὴ καὶ τὴν

lustris modo innatans aquis,
 sine radice. Id collectum sta-
 tim lino transluitur, & sicca-
 tum reconditur. Tradunt sic-
 catis æstiuo feruore aquis, hu-
 mum aridis fruticib⁹ vri: quod
 ubi non euenerit, ne amplius
 quidem renasci. Laudatur re-
 cens, ex candido nigricans,
 integrum, nec fragile, odore
 caput feriens, quod diu in sua
 vi odore permaneat, & nar-
 dum sapore imitetur, nullo fa-
 lis gustu. Infirnum verò & mi-
 nutim contusum, præsertim si
 cariosum virus olet, vitiosum
 est. Easde nardo fortitur vires;
 sed efficacius omnia præstat.
 Vrinam vehementius ciet, ac
 stomacho magis pdest mala-
 bathri vis, Lippitudinibus, inflā-
 mationibusq; tritū & in vino
 feruefactum cōmodè illinitur:
 subditū linguæ, oris halitū &
 suauitatem cōmedat. Vestium
 quoque odorem interpositum
 feruat, & ab erosione tuetur.

Cassia. Cap. XII.

Cassia, cuius complura sunt
 genera, iuxta odoriferam Ara-
 biam gignitur, crassi corticis
 farmento, folijs piperis. Elige-
 da est fuluescēs, pulchri colo-
 ris, coralli æmula, perquā an-
 gusta, longa, crassa, & fistulosa,
 35 gustu

DIOSCORIDIS

gustu mordens, & cū aliquan-
to feruore astringens, aroma-
tica, vinoso odore, cuiusmodi
est, quæ ab incolis, achy appel-
latur, ab Alexandria negotia-
toribus, daphnitis. Huic præferi-
crassa, purpurea & nigricans,
Zigir cognomine, quæ rosam
odore imitatur, præcipui in me-
dicina vsus. Secundum locum
tenet antedicta. Tertia, cui Mu-
seletico blasto, id est germi-
ni, cognomen est. Reliquæ viles,
& quæ aphemum dicitur, ni-
gra, infuavis, cortice tenui, ac-
rimoso: & quæ darca, & citto
vocatatur barbaro nomine. Si-
milior huic est pseudocassia,
quàm vt. explicari possit, quæ
gustu coarguitur, cū nec a-
cris, nec odorata sit, hærentēq;
medullæ corticē habeat. Inue-
nitur etiam lata quædam fistu-
la, mollis, levis, furculosa, q̄ an-
tedictæ præfertur. Damnatur
candicans, scabra, hircinum vi-
rus redolens, & quæ tenui fi-
stula, & scabra cute sit. Vim
obtinet calfaciēdi, vrinam ci-
endi, ficcandi, & leniter astrin-
gendi. Cōuenit ad medicamē-
ta oculorum, quæ præstandæ
claritatis gratia cōcinnātur, &
ad malagmata. Lētigines tollit
cum melle illita, menses trahit,

cōtra

σηκτικὴν ἐν τῇ γούσει, καὶ εὐφρο-
σαν μὲν πολλῆς πυράσεως, ἀρω-
ματίζουσαν, οἰνίζουσαν τῇ ὀσμῇ, ἥ
δὲ τοιαύτη ὑπὸ τῶν ἐπιχαιρών
ἄχρῳ καλεῖται, δαφνίτις δὲ πω-
ραγορεύεται ὑπὸ τῶν ἐν ἀλεξάν-
δρεια ἐμπόρων. πρὸς δὲ ταύτης
ἐστὶν ἡ μέλαινα καὶ ἐμπόρνευτος πα-
χεῖα, ζίγρις καλεομένη, ῥοδιζουσα
τῇ ὀσμῇ μάλιστα πρὸς τὴν ἰατρει-
κὴν χρῆσιν εὐθετος. δευτερεύει δ'
ἡ πωρενημένη. τρίτη δὲ ὅστις ἡ κα-
λαμύνη* βλάκτος μεσολήτης. αἱ
δὲ λοιπαὶ ἐντελεῖς, ὡς ἡ καλου-
μένη ἀσπρήμων, μέλαινα καὶ ἀν-
δρὴς καὶ λεπτόφλοιος, ἡ καὶ φλοιορῥα-
γὴς ὡς καὶ ἡ κητὴ καὶ* δάκαρ κα-
λαμύνη. Ἔστι δὲ τις καὶ ψευδοκασ-
σία ἀφάτως ἐμφρὴς, ἥτις ἐλέγ-
χεται τῇ γούσει, ὅτι οὐσα δριμύεια,
καὶ δὲ ἀρώμα τῶνδης, πωρενὴ χόμ-
νόν τε τὸ φλοιὸν ἔχει τῇ ἐντεριώ-
νῃ. εὐερίσκεται δὲ καὶ πλατεῖα συ-
ειγξ, ἀπαλὴ, κήφη, ἐνεργὴς, δια-
φύρουσα δὲ τὸ ἄλγος. ἀποδοκί-
μαζε δὲ πλὴν ὑπόλευκον καὶ ψω-
ρώδη, τραγίζουσαν ἐν τῇ ὀσμῇ, καὶ
πλὴν μὴ ἔχουσαν δὲ πλὴν σφειγῆ
παχεῖαν, ψωρώδη δὲ καὶ λεπτὴν.
δύναμιν δὲ ἔχει πωρεμαντικὴν καὶ
οὐρμητικὴν, ξηραγωγικὴν, εὐφροσαν
παραφύσεως. ἀρμύζει δὲ εἰς τὰ πρὸς
ὀφθαλμοὺς ἐφθαλμικά καὶ μαλα-
γματα φανέει τὸ αἶμα μὲν μέλιτος
καταχρῖσθαι, καὶ ἐμμηνα ἄγει,

καὶ

καὶ ἐχρόδ' ἵκτοις βοῦδεῖ πιγυέ-
τη, καὶ πρὸς τὰς ἐντὺς φλε-
γμοναῖς πάσας ποδεῖσα καὶ πρὸς
νεφροῦς . εἰς ἔγκαθάρματα τε
καὶ ὑποθυμιάματα γυναιξί,
πρὸς ἀνευρυσμὸν μύσσεας. διπλά-
σιον δὲ αὐτῆς μισθύνει τῷ τοῖς
φαρμάκοις, εἰ μὴ παρέῃ κιννά-
μων, τὸ αὐτὸ δρᾷ, ἄλλα δὲ
ἔστι πολὺ χρηστός.

Περὶ Κιννάμωνος. Κεφ. γ'.
10

Κιννάμων ἐστὶ πλείονα εἶδη,
ὀνομαζόμενα ἐπὶ χωρίοις . Δια-
φέρει δὲ τὸ μόνυλον, διὰ τὸ σῶ-
σεν ποτὶς ἐμφέρειαν, πρὸς τὴν
μοσυλίτην καλεσμένην καυσίαν. καὶ
τούτου πρὸς τὸ πρὸσφατον, τῇ
15 χροῖᾳ μέλαν, τεφρίζον ἐν τῷ οἴνω
δεῖ, λεπτὸν δὲ τοῖς ῥαβδόχοις καὶ
λεῖον, ὅζοις συνεχέσι κεχρημένον,
σφόδρα ἐνὸδες. χροδὸν γὰρ ἢ τοῦ
αἵσου κράσις ἐστὶ πρὸς τὸ ἐν τῇ
ἐνωδίᾳ ιδιότητι. ἐνείσχεται γὰρ
20 μὲν τὸ αἷον καὶ ἰδιάζοντος, ἢ
ὁσμὴν πηκνίζουσα ἢ καρδαμώμου
ἐμπορῆς. ἐπὶ καὶ δριμύτι καὶ δηκτι-
κὸν τῇ γένεσι, καὶ ὑφαλμυερίζον
μὲν δερμασίαις, ἐντε τῇ παρθε-
νείᾳ μὴ ταχέως διασυνόμενον, καὶ
ἐν τῷ θραύεσθαι χροῖδες καὶ λεῖον
25 ἔχον τὸ μεταξὺ τῶν ὀζων. δοκι-
μαζεῖ δὲ ἀπὸ μιᾶς ῥίζης λαμ-
βάνων τὸν θαλλόν. ἐν χερσὶ γὰρ ἢ
τοιαύτη δοκιμασία. τὰ γὰρ θραύ-
σματα, μίγματα τυγχάνει,
καὶ

cōtra viperarū īctus pota auxi-
liat, aduersus ītestinas inflāma-
tiones omneis & renum vitia,
pota proficit. Fœminis in folio
desidētib⁹, aut suffimētis, pdest
ad dilatationē vuluæ. Ea duplo
pondere medicamentis mixta
cinnamomi vicē supplet, si ip-
sum desit: nā eodē effect⁹ præ-
bet, ad plurima perquā utilis.

Cinnamomū. Cap. XIII.

Cinnamomi genera plura,
patrium sibi nomen vendicā-
tia. Præfertur tamen mosyliti-
cum, quodd cassiæ, cui Mosyliti
nomen est, aliquam referat ef-
figiē. Sed in eo genere recens,
nigrum, ex vinofo in cinerium
vergens, læue, tenuibus ramu-
lis, ac frequentibus nobis cin-
ctum, perquā iucundè olēs.
Optimi ferè indicium, iucundi
odoris proprietate cōstat. In-
uenitur enim cū optimo, eoq;
quod peculiare est, odor rutæ
aut cardamomo pxim⁹. Insup
acre, mordēs, & cū calfactiōe
quadantenus falsum, quod nō
citò confricanti asperum, aut
frianti lanuginosum, leuib⁹ ta-
men internodij apparet. Si
certior fieri voles, vellito ab ra-
dice furculū. facilis est huiusce
modi probatio: nāq; fragmēta
miscellanea qdā esse vidētur.
b ij Quæ

DIOSCORIDIS

Quæ autē melius spirāt, suo ha-
litu cū nares primū cōsulūtur,
olfa ctū explentia, deterioris di-
gnotionē impediūt . Est etiam
montanū, crassum, pumilū, ful-
tescens admodū. Tertiū à Mo-
sylvitico, perquā suauiter olet,
nigrū, fruticosum, paucis inter-
cedētibus geniculis. Quartum,
fungosum, cādicās, aspectu tu-
berosum, vile, ac friabile, ma-
gnā habēs radicē, quæ calsiam
planē representat. Quintū ge-
nus, odore nares feriens, subru-
fum, & cortice fuluæ calsiæ si-
mile, tangēti firmū, minus ner-
uosum, densa radice firmatum.
Iis quæ thuris, calsiæ, myrti, aut
amomi odorem spirant, minus
suauitatis inest. Deligito sca-
brum, albū, rugosum: at læue,
& lignosum circa radicem, vt
inutile reijcito . Est etiamnum
simile aliud, cui pseudocinna-
momo cognomē est, vile, inua-
lidi odoris, solutarūq; viriū. Vo-
catur etiam Zingiber, cū tamē
sit xylocinnamomum, præbēs
quandam cinnamomi faciem.
Est aut lignosum cinnamomū,
farmēta lōga robustaq; ferens,
odore lōgē cinnamomo infe-
riore. Sūt qui xylocinamomū,
à cinnamomo genere differre
dicāt, q̃ à natura ei⁹ abhorreat.

Cinna-

ἢ κατὰ τὴν παρὰ τὴν δοκιμα-
σίαν τὰ κρείττονα φερόμενα ἢ
πληρωῦτα τὴν ὁσφρησίν, ἐμπο-
δίζουσι τὴν τῆς ἡπτόνος ἐπίκρισιν. ἔστι
δὲ ἢ ὀρεγνόν, παχὺ, κολλοῦν, σφό-
δρα ὑποκίρρον ἢ χροῖαν. ἢ τε-
τον παρὰ τὸ μόσυλον, μέλαν καὶ
λίαν ὑψώδεις, ὑψιπῶδεις δὲ ἢ οὐ
πολυγόνατον. τέταρτον, λευκόν,
χαλκόν, ὀκτώδεις, ἐξέσθῃ ἢ ὑπε-
λῆς, εὐθραυστόν τε καὶ μεγάλῃ
ἔχον ῥίζαν κασιόζυσαν. πέμπτον
τῆς ὁσμῆς πικρὸν, ὑποκίρρον ἢ
καὶ περὶ σφῆρες κασιόζα πυρᾶ,
περὶ τὴν ἀφίαν δὲ στερεόν, ἢ πα-
νυ ὑψώδεις, παχὺ ῥίζον, τέτων δὲ
τὸ πᾶν λιθαιώτῃ ἢ μυρσίνης ἢ
κασιόζας ἢ ἀμώμης, ὑψώδεις ἢ πῶν
ἔστιν. ἀπολέρου δὲ τὸ λευκόν καὶ
τὸ ψαρώδεις, καὶ τὸ ῥυατόκαρπον
ἢ λεῖον, ἢ τὸ ξυλῶδεις δὲ κτ' ἢ
ρίζαν ὡς ἀχρεῖον παρῃ τῷ. ἔστι
δὲ π ἢ ἄλλο ὁμοῖον τὸ καλόν-
μυρον ψευδοκιννάμωμον ὑπε-
λῆς ἐκ εὐτόνων τῆς ὁσμῆς, ἐκ λευ-
κόρον δὲ ἢ τῆς δουλίμης. καλεῖ-
ται δὲ ἢ ζιγγίβερ ξυλοκιννάμω-
μον ὄν. ἔχον δὲ τινα ἐμφέρεαν
κιννάμωμω. ἔστι ἢ ξυλῶδεις κιν-
νάμωμον, ἔχον ῥαβδούς μακράς
καὶ ῥωμαλέας καὶ τὴν ὑψώδεις
πολὺ κατὰ δεξιέρους. λέγεται δὲ
ὑπὸ ὀνίαν καὶ κατὰ γῆρας δια-
φέρειν τοῦ κιννάμωμου τὸ ξυλο-
κιννάμωμον ἑτέρας ὄν φύσεως.
δύναμιν

5 *δυναμὴν δὲ ἔχει πᾶν κιννάμω-
 ριον θερμαστικὴν, οὐρητικὴν, μα-
 λακτικὴν, πεπτικὴν. ἄγει δὲ καὶ ἔμ-
 μένω καὶ ἔμβρυα πινόμενον καὶ
 10 *περὶ τὸν μέντρον καὶ σμύρνης, καὶ ἰο-
 ῶδους, θηρίων καὶ σαλασμοῖς
 ἁρμόζει· καὶ τὰ ταῦς κόραις ἐπι-
 σκοποῦντα ἀποκαταίρει, θερμαί-
 νει τὸ καὶ λεπτιώει, καὶ ἐστὶ διερχτι-
 κόν, φακὲς τε καὶ ἐφίληις ἀποκα-
 15 *ταίρει μετὰ μέλιτος ἐπιχρίδεν·
 ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς βήχας· καὶ κα-
 τάρρεας, ὑδρώπας, νεφρίτιδας, δυ-
 σσυνείας, μύζην· ὅ καὶ τοῖς πολυ-
 τελέσι μύεσι· καὶ κατὰ τὸν ἐστὶ πο-
 λύχρητον. ἀποτίθει· δὲ εἰς δια-
 20 *μνην λείον οἶνον ἀναλαμβάνόμε-
 νον, καὶ ξηρανόμενον ἐν σκιά.****

Πρὶ Ἀμώμου. Κεφ. ιδ΄.

1 *Ἀμωμόν ὅστις θαμνίσκος οἶον ἐ-
 βόρεις, ἐν ξύλῳ ἀντεμπεπλεγμέ-
 νος ἐαυτῷ· ἔχει δὲ τι καὶ ἄνθος μι-
 κρόν, ὡς λευκοῖς, φύλλα δὲ βρυ-
 20 *νία ὁμοία· κάλλιστον δὲ ὅστις τὸ ἀρ-
 μέμιον, χρυσοῖον ἢ χρυσοῦ, ἔχον τὸ
 τὸ ξύλον ὑπόκυρτον, ὑψώδες ἰκα-
 νῶδες. τὸ ὅ μνηδικόν διὰ τὸ ἐν πε-
 δίοις καὶ ἐν ἐφύδροις τόποις φύε-
 σθαι, ἀθωα τώτερον. ἐστὶ δὲ μέγα
 25 *καὶ ὑπόχλωρον, καὶ πρὸς τὸ ἀφω-
 ἀπαλόν, καὶ ἰσώδες τοῖς ξύλοις,*
 πηγαίνον τῇ ὁσμῇ. τὸ δὲ ποντι-
 κόν ὑπόκυρτον, οὐ μακρόν, οὐ δὲ
 δύσδρασον, βοτρυνῶδες, πλῆρες
 30 *καρπῶν, καὶ τῇ ὁσμῇ πλεονεκτικόν.****

Cinnamomum omne ex calfa-
 cit, emollit, & concoquit, urinā
 ciet, tā mēses, quā partus po-
 tum aut ex myrrha impositum
 pellit, contra bestias, quæ virus
 ei aculatur, venenāq; cōuenit:
 caliginē pupillis oculorū ob-
 uersantem discutit, crassitiem
 extenuat, lentigines, & vitia cu-
 tis in facie ex melle illitū deter-
 git: cōtra tusses, defluxiones, a-
 quam subter cutē fusam, renū
 vitia, & urinæ difficultatē effi-
 cax est, vnguentis preciosis in-
 feri solet: & in summa, magni
 ad omnia vsus. Tritū vino ex-
 cipitur, vmbraq; siccatum, quod
 diutius eduret, reconditur.

Amomum. Cap. xiiii.

Amomum exigue fruticat,
 ex ligno se conuoluēs in race-
 mi modum, flore, ceu candi-
 dæ violæ, paruo: folijs vitis al-
 bæ similibus. Laudatur quā-
 maximē Armeniacū fuluo au-
 ri colore, ligno subrufo, val-
 de odorato. Medicum, quo-
 niam in campestribus, & a-
 quosis enascitur, infirmius esse
 constat. Est autem magnum,
 subuiride, tactu tenerum, fru-
 tice venoso, odore origani.
 Pōticum verò subrufum, par-
 uum, fragile, racemosū fructu
 turgens, & odore nares feriēs

DIOSCORIDIS

Deligito recens, candidum vel
fubrubrum, quod nec atri-
ctum cohæreat, nec conuol-
uatur, sed solum diffunda-
tur, feminis plenum, vis par-
uis simile, graue, valde odora-
tum, modo cariem non con-
traxerit, acre, gustu mordens,
simplici colore non euarian-
te. Vim habet calfaciendi, a-
stringendi, exiccâdi. Somnum
allicit, & illitum fronti, doloris
sensum aufert, inflammatio-
nes, & meliceridas conco-
quit, discutitque: iuuat quos
scorpius percussit, ex ocimo
illitum, & podagricis confert,
inflammationes oculorum, vi-
ficerumque lenit ex vna passa,
ad vuluarum vitia, in pennis, aut
infectionibus vtile est. Deco-
ctum iocineri, renibus, po-
dagræ, potu conuenit. Anti-
dotis immiscetur, & preciosis-
simis vnguentis. Adulteratur a-
momum herba simili, quæ a-
momis vocatur, sed sine odo-
re, sine fructu. Nascitur in Ar-
menia, flore origani. Quare in
huiusmodi probationibus fra-
gmēta fugienda sunt: eligenda
autem, quæ ab vna radice in-
tegros furculos emittunt.

Costus. Cap. XV.

Præcellit Arabicus, cādīdus,
leuis,

ἐκλέγε δὲ τὸ πρῶτον καὶ λευ-
κὸν ἢ ὑψύθρον, ἐπεπλημένον ἢ
συμπεπλεγμένον, λευκὸν δὲ καὶ
διακεχυμένον, σπέρματος πλῆ-
ρες, ὁμοιον βοῦθροισι, * βαρὺ, σφό-
δρα ἐνὶ ὄστει, δὲ χα ἐν ὄστει, καὶ
δριμύ, δάκνον τὸ γένει, ἀπὸ λου-
τῆ καὶ ἡδονῆ καὶ ἐπιπικρὸν. διδάμν-
ει ἔχει δερμαγνικὴν, συπτικὴν, ξη-
ραντικὴν, ὑπνοποιὸν, ἀνώδυον ἴσ-
μετώπῳ κατὰ πλάσιν, φλε-
γμονὰς δὲ καὶ μελικερίδας πεπαί- 10
νει καὶ διαφρεῖ. σκορπιόπληκτοισι
τὸ μὲν ὠκίμῃ κατὰ πλάσιν ὠφε-
λεῖ, ποδαγρικοῖς συμβάλλει, καὶ
ὠφελεῖ, καὶ παραγορεῖ, καὶ ὀφθαλ-
μῶν φλεγμονὰς καὶ τὰς ἐν σπλά-
χνοις. σὺν σαφίδι, πρὸς δὲ τὰ
γυναικεῖα καὶ ἐν πρῶτοις καὶ ἐν
ἐσχάτοις καὶ χροῖσι, ποδὲν δὲ
τὸ ἀφέντημα αὐτῆ ἀρμόζει ἡπα-
τικοῖς, νεφρικοῖς, ποδαγρικοῖς.
μύζονται δὲ καὶ ἀντιδότοις, καὶ
τοῖς πολυτελεσάτοις τῶν μύρων. 20
δολίχοισιν δὲ πινεσὶ τὸ ἄμωμον
τῇ λεγόμενῃ ἄμωμίδι, ἐμφρεῖ ἔ-
σθ' ἄμωμῳ ἀνὸσφι μὲν τοὶ καὶ
ἀκέρπῳ, ἡνωμένη δὲ ἐν ἀρμε-
νίᾳ, αὐτὸς ἐχέσθ' ἐμφρεῖς ὀρεγ-
νῳ. δεῖ δὲ ἐν ταῖς τὸ τοῖσιν δο- 25
κιμασίαις τὰ δρασμάτα ἐκ-
φύγειν. ἐκλέγου δὲ τὰ ἀπὸ μιᾶς
ρίζης ἔχοντα * κλάδας τελείους.

Πρὶ Κόστου. Κεφ. 15.

Κόστου διαφέρει ὁ ἀραβικὸς, λευκὸς,
ἢ

5 ὢν ἢ κῆφος, πλείων ἔχων ἢ ἡ-
 δειαν ἢ ὄσμιν. δευτερεύς ὃ ὀν-
 δικὸς ἀδρὸς ὢν ἢ κῆφος ἢ μέ-
 λας ὡς νάρθηξ. τρίτος δὲ ὅστις ὁ
 10 στυλινός, βαρύς, ἢ χροῖαν πυξώ-
 δης, αἰσθητικὸς τῇ ὀσμῇ. ἄριστος
 δὲ ὅστις ὁ περὶ σφαιρίος, λευκός, πλέ-
 ρης δίολε, πυκνός, ξηρός, ἀτερηδόν-
 νιστος, ἀβρωμος, γούσει δηκτικός,
 15 ἢ πυρώδης. δύναμις ὃ ἔχει θερ-
 μαιπικὴν, διερεπικὴν, ἐμυλίων
 ἀγωγὴν ἢ τὴν περὶ ὑσέραν παδῶν
 ἀρωγὴν, ἐν περὶ δέμασι καὶ κα-
 τὰ τὰ μέμους ἢ πυελιάσεις, πινό-
 μος δὲ ἐχρὸς δίκτοις βοηθεῖ ἐγ-
 γίας β. πλῆθος, ἢ περὶ δὲ δώρα-
 20 κος πίνος ἢ σπασμάτα, ἢ πνευ-
 ματώσεις μετ' οἶνου ἢ ἀλινδίας,
 ἢ ἀφροδίσις παρ' ἐρμῶ μετ'
 οἶνο μελιτος, ἀγχι δὲ καὶ ἐλμινδα
 κατατεῖαν μετ' ὕδατος, σύγχρη-
 σιὰ τε ῥιζοῦσι μετ' ἐλαίου περὶ
 25 τῆς ὀπσημασίας, καὶ περὶ λυπ-
 30 κοῖς, καὶ αἰσθάνει δὲ ἢ ἐφ' ἡλιν κατὰ
 χροῖαν μετ' ὕδατος ἢ μελιτος.
 μύνηται δὲ ἢ μαλάσματος καὶ
 ἐν πιδότοις, μύνηται δ' ἐν τοῖς πα-
 ρωμελεωτάτοις τοῦ κομμαλίου
 ἐλενίς ῥίζας, δολοῦντες ἀντὸν,
 35 ἐν χερσὶ δὲ ἢ διάγνωσις, ἢ τε γὰρ
 περὶ τὴν γούσιν τὸ ἐλέγιον, ἢ τε
 τὴν ἐν δόξαν αὐτοῖον ἢ πλῆκτι-
 κὴν παρέχει.

Περὶ Σχίνου. Κεφ. 15.

Σχίνος, ἢ μὲν πρὸς γίνεσθαι ὡς λίβη,
 ἢ δὲ

leuis, eximia odoris suauita-
 te. Secundum locum sibi ven-
 dicat Indicus, leuis, vber, vt fe-
 rula niger. Tertius est Syria-
 cus, grauis, colore buxeus, &
 odore feriens. Optimus est re-
 cens, albus, abundè plenus, dé-
 fus, aridus, à teredinibus non
 erosus, sine graueolentia, gu-
 stu calidus ac mordens. Vis ei
 ex calfactoria, yrinam ciet, μέ-
 fes pellit, vitijs quæ vuluā ma-
 lè habent, tam impositu quàm
 fotu & suffitu auxiliatur. Cō-
 tra viperarum morsus sextan-
 tem bibere prodest: item ad-
 uersus pectoris dolores, con-
 uulsa, inflationesque, ex vino
 & absinthio: venerem ex mul-
 so stimulat, latas ventris ti-
 neas ex aqua pellit, horri-
 bus ex oleo, ante febrium ac-
 cessiones, & neruorum reso-
 lutionibus oblitur: vitia cu-
 tis in facie, cum aqua vel mel-
 le illitus emendat. Additur in
 antidota & malagmata. Sunt
 qui admistis helenij comage-
 ni præduris radicibus, adulte-
 ré, quod deprehensu facile est:
 siquidem neq; gustu feruet he-
 lenium, neque validū odorem
 vibrat, vt caput tentare possit.

Odorat' iūcus. Cap. XVI.

Odoratus iuncus, in Africa

b iij. &c

DIOSCORIDIS

& Arabia nascitur. Laudatissimus ex Nabathæa : proximus Arabicus, quem aliqui Babylonium cognominant, alij teuchitin : pessimus ex Africa. Eligendus est rufus, recens, floribus refertus, tenuis, rubentibus fragmentis, qui manibus confricando rosæ odorem emittit, igneæ mordacitatis ad linguam. Floris, culmorum, radicisq; est usus. Vim urinae ciundæ habet, menses pellit, discutit inflationes, caput aggruat, modicè astringit, comminuit, excoquit, ac venarum spiracula laxat. Flos eius in potu utilis sanguinem reiicientibus, doloribus stomachi, pulmonis, iocineris, & renum, miscetur antidotis. Radix astringentior est : ideo fastidijs stomachi, hydropicis, conuulsis, drachma vnâ cum pari pondere piperis, per dies aliquot datur. Decoctum vuluæ inflammationibus, ad desidentium fetus vtile est.

Calam^o odoratus. Cap. XVII.

CALAMVS odoratus in India nascitur: melior est fuluus, dense geniculatus, & qui assulose frangitur, plena araneorum

ἡ δὲ, ἐν ἀραβίᾳ. ἐτέρα δὲ ἐν τῇ ἀβαθαίᾳ λεγεμένη· ἥ τις ἐστὶ κρατῖς. δευτερεύει δὲ ἡ ἀραβικὴ, ὡς ἐνιοὶ βαβυλωνιον καλοῦσι, οἱ δὲ, τευχίτην. ἡ δὲ λιβυκὴ ἄχρηστος. ἐμλέγε δὲ τῷ πρὸς φαινον, ἐμπύρεον, πολυανθὴν, χαλκομύλων καὶ ἐμπόρφυρον καὶ λεπτήν, καὶ ῥοδίζουσαν τῇ εὐωδίᾳ· ἐπειδὴ δὲ διατείνεται τῷ χροσὶ, καὶ δάκνεται τῷ γλῶσσον μὲν πολλῆς πυρώσεως, καὶ σις δὲ τῷ ἀνδρὶ καὶ τῷ καλὰ μὲν καὶ τῆς ῥίζης. δύναμιν δὲ ἔχει διερεπτικὴν, ἐμυλῶν ἀγωγὸν, πνεύματων διαλυτικὴν, κεφαλῆς καρνηκαρικὴν, ὑποσύφουσαν μετέως, ἐπὶ καὶ βυπτικὴν, πεπτικὴν, καὶ ἀνασομωτικὴν. τὸ μὲν οὖν ἄνδρος αὐτῆς, ποτίσματος χρήσιμον πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς καὶ πόνους σωμαχοῦ, πνεύμονος, ἥπατος, νεφρῶν, μύζονται δὲ καὶ ἀντιδότοις, ἡ δὲ ῥίζα συπτικώτερα. διὸ καὶ τοῖς ἀσθένεσι σωμαχοῖς δίδεται ὑδροπῶσι τε καὶ ἀσθμασὶ μετὰ ἰσχυρῶς πεπέρως πρὸς ἡμέρας πινάς. τὸ δὲ ἀπόζημα αὐτῆς, τῷ πρὸς μύζαν φλεγμοναῖς εἰς ἐγκράτισμα ἀρμόδιον.

Πρὶ Καλὰμ. Κεφ. 17.

Κάλαμος ὀρεμαπικὸς, οὗτος μὲν ἐν Ἰνδία· ἐστὶ δὲ αὐτῷ χαλκίτος ὁ κερρός, πυκνόγονος, καὶ εἰς πολλὰ σκινδαλμούς θραυόμενος, γέμων ἀραχνίων

ἀραχνίων ἢ σύριγγα, ὑπόλευκος,
 ἐν ᾗ τῇ διαμωσῇ γλίχρος συ-
 πτικός, ὑπόδριμς, διυά) ἢ ἔρα-
 κινεῖν ποδεῖς. ὁθεν ἀρμόζει μεί-
 αλῶσεως ἢ σελίνου σπέρματος ἀ-
 5 φελιδεῖς καὶ ποδεῖς, ὑδρωπικοῖς,
 νεφειπκοῖς, σραγγειῶσι, ῥήγμα-
 σι. ἄγει δὲ καὶ ἐμυλῶνα πινόμενος
 καὶ πρεσβυτέρως, βήχας τε ἰά-
 ται ὑποδυμώδης καὶ ἐαυ-
 τόν, καὶ συν ῥητίνῃ τερεβινθίνῃ, ἢ
 10 χαπύῃ διὰ σύριγγος ἐλκομένη πῶ-
 σάματι, ἀφέλεται δὲ καὶ εἰς ἐγκυ-
 λίσματα γυναικεία, καὶ ἐκλύσμα-
 τα, μύγνυται δὲ καὶ μαλάγμασι,
 καὶ θυμιάμασι πρὸς ἐνὸς ἑαυ-
 τῶν.

Περὶ Βελγιάμου. Κεφ. ιη.

15 Βάλσαμον τὸ μὲν δένδρον κα-
 τὰ μέγεθος λευκοῦ ἢ πυρε-
 καΐνης βλέπεται, φύλλα ἔχον
 ὅμοια πηλῶν λευκότερα, δὲ
 πολλῶν καὶ ἀειδαλλέστερα, γυ-
 νώδηρον ἐν μόνῃ ἰουδαίᾳ, κα-
 20 τὰ πᾶσι ἀνθρώποις καὶ ἐν αἰγύ-
 πτῳ, διαφέρειν αὐτὸ ἐαυτῷ πρᾶ-
 χύτην καὶ μήκει καὶ ἰσχύτην,
 λέγεται γὰρ τὸ λεπτόν καὶ πε-
 χύδες τοῦ δάμνου διεξόν. ἴσως
 διὰ τὸ ἐν χειρὶν διεξέσθαι ἰσ-
 25 χυὸν ὄν. Τὸ δὲ ὀποβάλαμον
 λεγόμενον ὀπίσκειται ἐν τοῖς ὑπο-
 κωῖα καύμασι, ἐν τε μωμῶν
 σιδῶν ὄνυξι τοῦ δένδρου, ῥεῖ
 δὲ ὀλίγον, ὡς καὶ ἔχασον ἑ-
 τος μὴ πλεον ἢ ἑξ ἢ ἑπτὰ

ζώας

araneorum fistula, albicans,
 lentus in mandendo, & astrin-
 gens, ac cum aliquanta acrimonia
 amarus. Vrinam potu
 ciet: quare cū graminis, aut apij
 semine coctus, in aquæ subter
 cutē fusæ morbo, renum vitiis,
 fillicidio vrinæ, ruptisq; cōmo
 dè bibitur: menses & potu & ap-
 positu pellit. tussi suffitu mede-
 tur per se, aut ex resina terebin-
 thina, hausto per arundinē fu-
 mo: ad muliebres infessus deco-
 quitur, & clysteribus imponi-
 tur. Suffitionibus, malagmatif-
 que odoris gratia cōmiscetur.

Balsamū. Cap. XVIIII.

Balsamū, arbor albæ violæ, ly-
 cij, siue pyracathæ magnitudi-
 ne cōspicitur. Foliū rutæ proxi-
 mū, lōgè cādidius, perpetuò vi-
 rens: in Iudæa solū quadā valle
 & Ægypto nascēs. his differēs
 modis: scabritia, pceritate, gra-
 cilitate. Quod igit tenui & ca-
 pillacea coma est, theristū vo-
 cant quasi demessile: fortassis
 quoniam ob gracilitatē facile
 demetatur. Æstiuus sub ortu Ca-
 nis ardoribus, arbor vnguibus
 ferreis inciditur, manátque è
 plaga succus, quem Opobalsa-
 mum vocant: sed tam exiguo
 stillatu, vt annis singulis, ne plu-
 res quidē quàm seni septē mve
 congi

DIOSCORIDIS

congiij cōgantur, inibiq; pōdus
 duplo repēditur argēto. Succī
 probatio est, vt sit recēs, validi
 odoris, syncerus, non ad acorē
 vergēs, dilui facilis, læuis, astrin-
 gēs, ac modicē mordēs gustu.
 Sed variē vitiatur, misto ab ali-
 quibusterebinthi, cypri, lētisci,
 balani vnguēto: itē fusino, me-
 topio, melle, aut Cypri cera li-
 quida. quod maleficium facilē
 deprehēditur. Nanq; merus in
 laneam vestē fufus, neq; macu-
 lā facit, neq; si eluatur notā re-
 linquit: vitiatus autē inheret: &
 lac instillatus coagulat, quod
 adulterat⁹ nō efficit. Quinetiā
 syncerus in aqua aut lacte ce-
 lerrimē liquatur, colorēq; la-
 etescit: vitiat⁹ verò olei modo
 innatat, se conuoluens, aut in
 stellæ modū diffundēs. Synce-
 rus senescens crassescit, dete-
 riórq; redditur. Hallucinantur,
 qui aqua concretū pessum ire,
 & ad ima fidere arbitrātur, po-
 stea dissipatū supernatare. E li-
 gni genere, quod xylobalsa-
 mum vocant, probatur recēs,
 farmento tenui, fuluum, odo-
 ratum, quadāmtenus opobal-
 samum spirās. Necessarius etiā
 feminis erumpit vsus: quare e-
 ligatur flauum, plenum, gran-
 de, pōderosum, mordēs gustu,
 feruēs

χρᾶς συναθροίσεαι, πολέϊ) ὃ ἐν
 τῷ τόπῳ σαθρόν ἐστὶν αὐτῆς πρὸς δι-
 πλῆν ἀργύριον. ἔστι ὃ πῆς χαλδῆς ὁ
 παρὲς φάτος, τῇ ὁσμῇ εὐτονος καὶ
 εἰλικρινῆς, καὶ μὴ παροξίζων, εὐδι-
 ατος, λεῖος, εὐφών καὶ δάκνων με-
 5 τείως ἢ γλῶσσαν. δολεῖται ὃ ποι-
 κύως, οἱ μὲν γὰρ χρίσματα μύσκει-
 σιν αὐτό. ὡς τὸ τερεβίνθινον, κύ-
 ωρινον, κρίνινον, σέκτινον, βλαάνινον,
 μετώπον, μέλι, κηρὸν ἢ κυρσίνην ἢ
 κυρσίνην ὑγρὰν, λεῖαν. ἐλέγχε) ὃ 10
 εὐχερῶς ὁ τοῖστος ἐπισαγείς γὰρ ὁ
 ἀκέραιος εἰς* ἐρεῖν ὕψος, καὶ ἐκπλυν-
 θεῖς, κηλίδας ἔποιεῖ ἐδὲ σπύλον. ὁ
 ὃ δεδολωμένος προσμένει καὶ γάλα
 κτι ὃ ἐπισαγείς πήγνυσι τὸ ὅσῳ
 δεδολωμένος ἔδρα, ἔτι ὁ ἀκέραι-
 15 ος ἐπυχθεῖς γάλακτι ἢ ὕδατι χρί-
 ται ταχέως καὶ γαλακτεῖ) ὃ ὃ δε-
 δολωμένος ἐπιπλεῖ καὶ δάσῳ ἔ-
 λαιον, συσπρόμενος ἢ διαχρόνιος
 ἀσπερόδωτος, τῷ μὲν τοι χροῖον καὶ ὁ
 ἀκέραιος παχυνόμενος, εἰαυτὸ χρί-
 20 ρων γίνε) . πλανῶν) ὃ ἢ νομίζον-
 τες τὸν ἀκέραιον ἐπισαγῆναι ὁ-
 δατι εἰς χωρεῖν εἰς βάθος πρῶτον.
 εἴτα ἀναπλεῖν εὐδιάχυτον. * Τὸ
 ὃ ξύλον ὁ καλεῖ) ξυλοβάλαμον,
 δόκιμόν ἐστι τὸ πρόσφατον καὶ λε-
 25 πτόχερον, καὶ πυρρὸν εὐώδες, βρα-
 χύ πνέον ὁποδυσάμε. τὸ ὃ καρπῶς,
 καὶ γὰρ τέταρτον ἢ χεῖρσις ἀναγκάει.
 ἐκλέγου τὸν ξανθόν, πλήρη, μέ-
 30 γαι, βαρυὴ, δάκνωντα τίμω γούσιν
 καὶ

καὶ πυρεῦντα, μετέως παραπνεύ-
 οντα τῷ ὀποδυσάμου, φέρεται δὲ
 π ἀπὸ τῆς πέτρας, ὧ δολίχοισι καὶ
 καρπὸν, σπέρμα ὑπερβολῶς ὁμοιον.
 ὁ δὲ γνώση ἐν τῷ μείζον π εἶναι
 καὶ κενὸν καὶ ἀδύναμον, πεπείζον
 τῇ γένεσι. Δυνάμιν δὲ ἔχει ἐν-
 γεσάτω ὁ ὀπὸς, θερμαντικώτα-
 τος ὢν, σμήχων τὰ ὀπισκοτουῦ-
 τα ταῖς κόραις, καὶ τὰς περὶ μή-
 τραν ἰσχυρὸς ἰσχυρὸς, πρὸς δὲ με-
 10 νος μὲν ῥοδίνης κινεωτῆς, ἀγχι καὶ
 ἐμμύα, καὶ δευτέρα, καὶ ἐμβρυα,
 καὶ ῥίγη συγχρισθεὶς λύει, καὶ αἰσ-
 θὲ καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἐλκῶν. ἔστι δὲ
 καὶ πεπλικὸς καὶ οὐρητικὸς πινόμε-
 νος, δυσπνοῶσιν ἀρμόζων, καὶ τοῖς
 15 ἀκόνιτον πεπωκόσι μετὰ γάλα-
 κτος, καὶ θηριοδύκτοις. μύνηται
 δὲ καὶ ἀκόπις, καὶ μαλαγμάσι
 καὶ ἀντιδότοις, καὶ καδούλου δρασι-
 κωτάτω ἔχει καὶ δυνάμιν ὁ ὀπὸς
 τῷ βδυσάμου, δευτέρα δὲ ὁ καρ-
 20 πὸς, ἐλαχίστην δὲ τὸ ξύλον. ὁ δὲ καρ-
 πὸς πινόμενος, ἀρμόζει πλεου-
 ρητικῶς, ἀσπνευμονικῶς, βήσσυ-
 σιν, ἰσχυρῶς, ἐπιληπτικῶς σκω-
 τωματικῶς, ὀρθοπνοικῶς, σρο-
 φουμῶς, δυσουρεῦσι, θηριοδύ-
 25 κτοις, καὶ εἰς τὰ γυναικεία δὲ ὑ-
 ποδυμιάματα ἐνδείξει, καὶ εἰς ἐγ-
 κατίσματα ἀσθενήματος ἀνασο-
 μοῖ καὶ μύραν, καὶ ἐπασσῶν ὑπερ-
 σίαν. Τὸ δὲ ξύλον καὶ αὐτὸ ἔχει δύ-
 ναμιν τῷ καρπῷ, ἡρώγα μύρτοι
 βουδῆ

feruens in ore, modicè opobal-
 samum olés. Adulteratur semi-
 ne hyperico simili, quod à Pe-
 tra oppido defertur. Sed coar-
 guitur magnitudine, inanitate,
 virium ignavia, sapore piperis.
 Efficacissima vis inest succo, &
 quàm maximè calfaciens: ab-
 stergit quæ tenebras oculorū
 pupillis offundūt, medetur per
 frictionibus vuluæ cum rosa-
 ceo cerato appositus: menses
 quoque, secūdas & partus ex-
 trahit, horrores illitu discutit,
 vlcera fordida expurgat &
 cruda concoquit, vrinam po-
 tu ciet, ægrè spirantibus pro-
 dest: datur in lacte contra a-
 conitum haustum, aut serpen-
 tium ictus: miscetur acopis,
 malagmatis, & antidotis. In
 summa, præcipua autoritas
 succo, secunda semini, mini-
 ma ligno. Semen commodè
 potui datur doloribus lateris,
 pulmonum vitiis, tussi, ischia-
 dicis, comitialibus, vertigi-
 nosis, orthopnoicis, vrinæ dif-
 ficultati, torminibus ac fer-
 pentum moribus: ad mulie-
 bres suffitus perquàm vile est:
 vuluam aperit in defectionib;
 balnearū decoctum, & humo-
 rem euocat. Lignū easdem ha-
 bet vires, aliquantò minores.

DIOSCORIDIS

Ex aqua potum cruditatibus, torminosiſ, vulſis, venatorum iſtibus opitulatur, vrinam cit, ad capitiſ vulnera cum ſicca Iri cōuenit, ſquammas oſſium extrahit, & ad vnguentorum ſpiſſamenta additur.

Aspalathus. Cap. xix.

Aspalathus, aliis eryſiſceptrum, frutex eſt ſurculofuſ, multis ſpinis horrens. naſcitur in Iſtro, Nifyro, Syria, & Rhodiorum inſula: quo ad vnguentorū ſpiſſamenta pigmen-
tarij vtuntur. Optimuſ eſt grauiſ, detracto cortice rubenſ, aut in purpuram vergēſ, denſuſ, odoratuſ, guſtatu amaruſ. Eſt & alteruſ genuſ candiduſ, lignoſuſ, ſine odore: quod deteriuſ habetur. Vim caſſaciēdi cum aſtrictione obtinet. vnde decoctum cum vino ad tetra-oriſ vlcera colluenda conuenit, ad nomas genitalium, & ſordida vlcera infunditur: ſubiectum in peſſo, partuſ extrahit; aliuuſ ſiſtit eiſ decoctum: & ſanguiniſ reiectionē potu cohibet, vrinæ difficultatem inflationēſque diſcutit.

Muſcuſ. Cap. xx.

Bryon, id eſt muſc², à quibuſdam ſplachnon appellatur: in cedro

βοηθεῖ δὲ ἀφελήδεν ὕδατι καὶ πινόμενον ἀπεψίας, σφόδρις, θηριόνητοις, σπασμύοις, ἔρατε ἀγει, καὶ πρὸς τὰ ἐν κεφαλῇ βλάβματα μετὰ ἑίδος ἀρμόζει ξηραῖς, ἀνάγει δὲ καὶ λεπίδας, πηγνύται δὲ καὶ εἰς τὰ τῶν μύρων σύμματα.

Περὶ ἀσπαλάθου. Κεφ. ιθ'.

Ἀσπάλαθος, * οἱ δὲ ἐρωσιῶσιν πλεον, δάμνος ἐστὶ ξυλῶδης, ἀκανθὰς πολλὰς κεκτημένος, θυνώμενος ἐν ἴσθῳ καὶ νισέῳ καὶ συνίῳ καὶ ῥόδῳ, ὃ καλεῖται οἱ μυρεῖοι εἰς τὰς τ' μύρων σύμματα. ἐστὶ καλὸς ὁ βαρὺς, καὶ μετὰ τὸ θεριφοιδεῖν ὑπόφυδρος ἢ πορφυρίζων, πυκνὸς, εὐώδης, πικρίζων ἐν τῇ γούσει, ἐστὶ δὲ πικρὸν καὶ ἔτερον εἶδος αὐτοῦ λευκὸν, ξυλῶδες, ἀνοσμον, ὃ δὲ καὶ χεῖρον καλεῖσθαι. Δυνάμειν δὲ ἔχει δερματικῶν μετὰ σύμματος. ὅθεν πρὸς τε τὰς ἀφθὰς ἐφελήδεις μετ' οἴνου καὶ διακλυζόμενος ἀρμόζει * καὶ πρὸς τὰς ἐν αἰσθήσει καὶ νομῇ καὶ ἀκαθαρσίᾳ ἐγκλυζόμενος, καὶ πρὸς τὰς ὀζύνιας, ἐμβρυά τε καὶ πασσῶ. μινύμενος πασσῶ, τὸ δὲ ἀφελήμα αὐτοῦ κοιλίαν ἱσσοι * καὶ αἵματος ἀναγωγῇ ποδῶν, δυσουείαν τε καὶ ἐμπνευμάτωσιν λύει.

Περὶ βρύου. Κεφ. κ'.

Βρύον, ὑπό πινων δὲ σπλάγχνον καλεῖται, σφριπόμενον ἐπὶ δένδρων

ἐν δ' ἑὸν κεδρίων, ἢ λευκίων ἢ
δριάων διαφέρει ὅ τ' κεδρίον.
δεύτερον ὅ τ' λευκίον, ἔστι ὅ αὐτῷ
τὸ εὐωδέστερον, καὶ λευκὸν χαλόν, τὸ
ὅ μελανίζον χεῖρον. Διώαμιν ὅ
ἔχει συμπικνύ ποιούτα πρὸς τὰ
πρὸ μίτην ἐν ἀφελήμασιν εἰς
ἐγκύσισμα, μίγνεται δὲ καὶ μύ-
ροις βαλανίοις καὶ χεῖσμασι διὰ
τὸ ἐν αὐτῷ συμπικνόν, καὶ εἰς θυ-
μιάματων δὲ καὶ ἀκόπων σκευα-
10 σίαν ἐστὶν εὐδετον.

Περὶ Ἀγαλλόχου. Κεφ. κα'.
Ἀγαλλόχον ξύλον ἐστὶ φερέ-
μενον ἐκ τῆς Ἰνδίας, καὶ ἁ-
ραβίας θυῖνης, ὀστυμύρον, εὐω-
δες, παρὰ φύον ἐν τῇ γούσει μύ-
15 ποτῆς πικρίας, φλοιὸν ἔχον δερ-
ματώδη, καὶ ὑποπόικιλον. ποιεῖ
δὲ διαμαστόμυρον καὶ διακλυ-
ξόμυρον τὸ ἀφελήμα πρὸς εὐω-
δίαν σώματος, καὶ διάπασμα ὅ
ὅλου τοῦ σώματος ὅστις θυμιά-
20 ται δὲ ἀντὶ λεβανωτοῦ, ἢ δὲ ῥί-
ζα αὐτῆς ὀκλή πινυμένη, σο-
μάχου πλάσθον καὶ ἀτονίαν
καὶ καύσωνα παρηγορεῖ τοῖς
τε ἀλγούσι πλεονέχον καὶ ἥπαρ
ἢ δυσεντερικοῖς ἢ σφοδρῶς
25 τοῖς ἀρήγει πινυμένη
μεθ' ὕδατος.

Περὶ Νασκάφθου. Κεφ. κβ'.
Νασκάφθον, οἱ δὲ νάρκαφθον, καὶ
ἄλλο ἐκ τῆς Ἰνδικῆς κομίζεται. ἔστι ὅ
φλοιῶδες, συχρύνει λεπτομάλειον
καὶ,

cedro arbore, populo alba, &
quercu inuenitur. Optimum
est cedrinum, proximum po-
pulneum : in quo genere can-
didum & odoratius præstat, ni-
gricans improbatur. Astringen-
di vim habet. Decoctum in-
fidentium vuluis vtile: vnguen-
to balanino, oleisque inspif-
fandi gratia inseritur, thymia-
matum, acoporūque compo-
sitionibus conueniens.

Agallochum. Cap. XXI.
Agallochū, lignum est quod
ex India atque Arabia depor-
tatur, thuiæ ligno simile, ma-
culatum, odoratum, gustu a-
stringens, cum quadam ama-
ritudine, cute verius quàm cor-
tice vestitur, aliquantulum ver-
ficolore. Manditur, aut deco-
ctō os colluitur, commendan-
di halitus gratia. Sudores arcet
toto corpori insparsum : pro
thure ad suffimenta substitui-
tur. Radix epota drachmæ vni
pondere, humida stomachi vi-
tia, & imbecillitatē, feruorē-
que mulcet, si lateris, iocineris
ue dolor excruciat, si dysente-
riæ, aut tormina infestant, ex
aqua bibere prodest.

Narcaphthum. Cap. XXII.
Narchaphthū ex India deferit,
corticofum, simile sycomori li-
bro:

DIOSCORIDIS

bro quod iucūdi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis : constrictionibus vuluæ suffitu prodest.

Cancamum. Cap. XXIII.

Cancamum Arabici ligni la chryma est, mirrhæ quodammodo similis, virosi gustus, quā ad suffimenta vsurpant. Vestes eo, additis styrace & myrrha, suffiūtur. Vim proditur obtinere extenuādi obesos, si ternū obolorum pōdere ex aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur, lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis: menses cum aqua mulsa pellit, oculorū cicatrices confestim emēdat, vino madefactū medetur eorūdem hebetudinibus, aduersus gingiuas humore pręgnanteis, dolo resq; dētiū, nō aliud efficacius.

Cyphi. Cap. XXIII.

Cyphi odorati suffimēti cōpositus est. dicata diis, qua abū de Ægyptij sacerdotes vtūtur. In antidota misceri solet, suspiriosis datur in potu. Permultæ componendi rationes, quarū vna hæc est: Sumito cyperi dimidiū sextarium, cū pari baccharum iuniperi adultæ modo: vuæ passæ pinguis, exēptis vinaceis, minas duodecim: resinæ repurgatæ minas quinq; calami

κός, θυμιάμνον διὰ τὸ εὐωδίαν, καὶ μινυάμνον τοῖς σκευασοῖς θυμιάμασι, ὡφθῆν καὶ μήτραν ἐσθγῶν μύλῳ ὑποθυμιαδέειν.

Περὶ Καλχάμου. Κεφ. κγ'.

Κάλαμον δάκρυόν ὄσιν ἀφ' ἑκοῦ ξύλου σιμύρη* παρσεοικὸς, βρομῶδες ἐν τῇ γύσει, ὡσπ' ὡς θυμιάματι χεῶνται. ὑποκαπνίζοισι δὴ καὶ τὰ ἱμάτια μὲν σιμύρης καὶ εὐρεῖας. δυνάμει δὲ ἰσορεῖται ἔχειν, ἰχθυαντικὴν τῶν κατὰ τὰ μέλη, τειροδόλου πλῆθος πινόμνον, συνὺδατι ἢ ὀξύμελιτι ἐφ' ἡμέρας ἡμέρας, δίδεται καὶ σπληνικοῖς, καὶ ὀπληπτικοῖς, καὶ ἁδματικοῖς ἐμμύλῳ τ' ἀγρίῳ συνμελικράτῳ, καθάρει δὲ καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς τυχέως οὐλας, καὶ ἀμυγδαλίας ἰᾶται, διεθέν οἶνον πρὸς τε μυδίσσεις οὐλῶν καὶ ὀδονταλγίας, ὡς οὐδὲν ἕτερον ποιεῖ.

Περὶ Κύφειας. Κεφ. κδ'.

Κύφι θυμιάματις ὄσι σκευασία καχεαισμένη θεοῖς. χεῶνται δὲ αὐτῷ κατακόρως οἱ ἐν αἰγύπτῳ ἱερεῖς. μίγνυται δὲ καὶ ἀντιδότοις, καὶ ἁδματικοῖς δίδεται ἐν ποτίσμασι. σκευασία δὲ αὐτοῦ ἐμφέρονται πλείονες, ἐν αἷσι δὲ καὶ αὐτῇ κυπεῖρα ἡμῶν ξέρον, ἀφ' ἐκείνης ἀδρεῖς τὸ αὐτό· σαφίδων λιπαρῶν ἐκ γαργαρισμένων μετὰ ἰβ' ῥητίνης ἀπικαθαρυμένης μετὰ ἐκάλου μου

μόν ἀρωματικοῦ, ἀσπυλάδου, λami & iunci odoratorum, & χίνου, ἐκάστου μῶν ἄ. σμήρ- aspalathi, singulorum minam: νης < 16'. οἴνου παλαιοῦ ξέσας myrrhæ duodecim : vini vete- θ'. μέλιτος μῶν β'. ἐκμηχα- ris sextarios nouem, cum dua- τίσας τὴν σαφίδα κόψον καὶ λε- bus mellis minis: vnam passam 5 ανον μετ' οἴνου καὶ τῆς σμύρ- detractis vinaceis tufam, cum νης, καὶ τὰ ἄλλα κόψας καὶ σή- vino & myrrha subigito: cæte- σας, μίξον τούτοις, ἑασόν τε συμ- ra tufa & cribrata adicito, die πιεῖν ἢ μέραν ἄ'. εἴτα ἐψήσας τὸ vno humorem cōbibere fini- μέλι ἄχρι κολλώδους συστάσεως, to, dein mel coquito dum sibi μίξον ἐπιμελῶς τὴν ῥητίνην τε glutinis asciscat crassitudinem, 10 τηκῆαν· εἴτα τὰ λοιπὰ σιμωνα- eliquatā resinam accuratè per- τείας ἐπιμελῶς ἀποπίψοις εἰς tritis, & in fictile vas recōdito. ἄγγελιον ὁσράμνον.

Περὶ Κρόκου. Κροκ. κέ.

Κρόκος ἐστὶ κρόκιστος ἐν ἑαρι- Crocum. Cap. x x v. κῇ χρίσει, ὁ κορύκκος, πρὸς σφατός vfu coryceū, recēs, & boni co- 15 ἢ καὶ εὐχρῶς, ὀλίγον τὸ λευκὸν ἔ- loris, paulū candidi gerēs in ca- χον ἐπὶ τῆς ἑλικος, ἐπιμήκης, ὁ- preolo, oblongū, omnibus suis λομελής, ἄδραυστος, * ἀνελει- partibus cōstās, nō fragile, ple- πής, παλῆρης, βάπλων ἐν δίδειται nū, à quo detractū est nihil, qđ τὰς χεῖρας, οὐα εὐρωπιῶν ἢ ἰκ- madefactū manus inficit, nec μάζων, ἐπακτικὸς δὲ ἐν τῇ ὁσ- fitū redolet, aut cariem sentit, 20 μῇ καὶ δειμίσ· ὁ γὰρ μὴ τοιοῦτος subacre: sin hui⁹ generis nō est, ἢ παλαιός ὅστιν, ἢ βεβρεγμῆτος. aut vetus, aut humore perfusū creditur. Secūdus locus datur δευτερεύει δὲ ὁ ἐκ τῆς πρὸς λυ- Coryceo, ἐ tractu Lyciæ con- χίαν κορυκίου, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ λυ- termino. Tertius Lycio, ἐ μό- κιακοῦ ὀλύμπου. εἴτα ὁ ἐξ αἰγῶν te Olympo. dein ex Ægibus 25 τῆς αἰτωλίας, ὁ δὲ κυρλωαῖκός ὁ Ætoliæ. Cyrenaicū & Céturi- ἐκ κεντοείας, πάντων τῶν κα- pinū inter Sicilica omnia viri- τὰ τὴν σικελίαν, ἀδένης κατὰ bus infirmius est. Omniū natu- δυνάμιν, λαχαρώδεις ὄντες παί- ra oleracea. Itali tamē ob suc- ρες. διὰ μὲν τοι τὸ πολύχυλον καὶ ci copiā, & coloris venustatē, εὐχρῶν οἱ ἐν τῇ ἰταλίᾳ τὴν θύ- tingēdis mortariis dicauerunt, 30 αν βάπλοντες, τούτῳ χρῶνται. quibus πολλοῦ

lami & iunci odoratorum, & aspalathi, singulorum minam: myrrhæ duodecim : vini vete- ris sextarios nouem, cum dua- bus mellis minis: vnam passam detractis vinaceis tufam, cum vino & myrrha subigito: cæte- ra tufa & cribrata adicito, die vno humorem cōbibere fini- to, dein mel coquito dum sibi glutinis asciscat crassitudinem, eliquatā resinam accuratè per- misceto cū reliquis diligēter cō tritis, & in fictile vas recōdito.

Crocum. Cap. x x v.

Crocum optimū in medēdi vfu coryceū, recēs, & boni co- loris, paulū candidi gerēs in ca preolo, oblongū, omnibus suis partibus cōstās, nō fragile, ple- nū, à quo detractū est nihil, qđ madefactū manus inficit, nec fitū redolet, aut cariem sentit, subacre: sin hui⁹ generis nō est, aut vetus, aut humore perfusū creditur. Secūdus locus datur Coryceo, ἐ tractu Lyciæ con- termino. Tertius Lycio, ἐ μό- te Olympo. dein ex Ægibus Ætoliæ. Cyrenaicū & Céturi- pinū inter Sicilica omnia viri- bus infirmius est. Omniū natu- ra oleracea. Itali tamē ob suc- ci copiā, & coloris venustatē, tingēdis mortariis dicauerunt, quibus

DIOSCORIDIS

quibus de causis magno venditur, Vtilissimū in medicina quā antē descripsimus. Adulteratur immisto crocomagmate tuso, atque etiam sapæ sublitu: contrita, quod pondus adiciatur, simul argēti spuma, aut plūbagine: sed maleficiū declarat insidens puluis, præsertim si defrutum in odorādo subolet. Thefsalus ipsam tantum odoratū esse voluit. Alij exitiosum, tribus drachmis ex aqua potis. Proculdubio vim coquendi, emolliendi, atque substringendi habet: vrinam cit, elegantem colorem præstat, qui ex passio bibent, crapulam non sentient: oculorum fluxiones illitū cum humano lacte, cohibet: additur in potiones, quæ interaneorū causa téperantur: ad vuluē etiā sedisq; cataplasmata, vtiliter inditur: venerē stimulat, vergētes ad ignē sacrum inflāmationes mulcet, auriculariis collectionibus vtile. Quod facilius cōteratur, in calido fictili sole ficcari oportet, celeritēq; versari. Vrinam mouet radix ex passio pota.

Crocomagma. Cap. XXVI.

Fit etiam expressis vnguenti crocini odoramentis, & in formas digestis, quod crocomagma vocant

πολλὸν δὲ πωρᾶσκέται διὰ τὸ το. εἰς δὲ τὰ φάρμακα, ὃ πωρᾶσθευμένοις ἐστὶ χρῆσιμος. δολῶται δὲ μίξει κροκομάγματος κεκομμένου, ἢ δὲ ἐψημάτος ὑποδακμῶνος συντεταμιμένου, εἰς τὸ βαρυσυθμίσει, λιθαργύρε ἢ μολυβδαίνῃς. πολλοὶ δὲ ταῦτα τό, τὸ ἐντρέχον κοινὸρ τῶδες, καὶ τὸ ὁσμῶν ἐψημάτος διὰ πυρκαίνειν. * Ἐχει δυνάμιν πεπληκὴν, μαλακτικὴν, ὑποσυφουσαν, οὐρητικὴν, 10 παρέχει εὐχρῶσαν, καὶ ἀκράτῃας λός ὅστι μετὰ γλυκέος πινόμηνος ῥεῦμά τε ὑποδακμῶν ἐπιχρίομενος σέλλει συνὶ γάλακτι γυναικείῃ. μύρυσται δὲ καὶ τοῖς πωρῶς τὰ ἐντὸς ποτίσμασι χρῆσιμος, 15 καὶ πωρῶδεσσι καὶ καταπλάσμοσι τοῖς πωρῶς τινὲ μύρταν καὶ δακτύλιον, παείνησι δὲ καὶ πωρῶς ἀφροδίσια, τὰς τὴν ἐρυσιπτελατώδεις φλεγμανάς πωρᾶνει καταχρίομενος, καὶ εἰς τὰς ὀπικὰς χρῆσιμὸς. 20 φασὶ δὲ καὶ ἀναρεπτικὸν αὐτὸν εἶναι μὲν ὑδατος πινόμηνον πλεῖστος < γ'. πωρῶς δὲ τὸ ἐυλέαντον αὐτὸν γίνεσθαι, δεῖ ἐν ἡλίῳ ψύχειν ἐν ὁσρακίνῳ θερμῶ ταχέως ὅ δεῖ σφίρειν, καὶ ἡ ρίζα δὲ αὐτῆς πινόμηνος 25 ἢ συνὶ γλυκεῖ, οὐρα κινεῖ.

Περὶ Κροκομάγματος. Κεφ. κς'.

Τὸ δὲ Κροκόμαγμα γίνεται ἐκ τοῦ κροκίνου μύρου, τῶν ἀρωμάτων ἐκπεδέντων, καὶ ἀναπλαδέντων;

δέγνων, ἐστὶ δ' αὖτ' τὸ ἐν ὧδες κα-
 λὸν, μέσως κατὰ σμυρνον, βα-
 ρύ, μέλαν, ἄξυλον, ἐν τῷ διε-
 δῶμαι ἱκανῶς, κερκῶδες τινὶ
 χροῶν, λεῖον, ὑποκίρρον, βάπτον
 ἢ ἰχυρῶς τοὺς ὀδόντας καὶ τινὶ
 γλῶσσαν, ἐπιμύρον τέ συχνὰς ὀ-
 ρας.* Διῶαμιν δὲ ἔχει σμηκπι-
 κλῶ, τῶν ἐπισκοτούτων ταῖς κό-
 ραις. οὐρητικῶ, μάλα κτικλῶ,
 πεπτικῶ, θερμαντικῶ. ἀνα-
 10 λογεῖ δὲ κατὰ πρὸς τῇ τοῦ
 χροῦ διῶαμιν. πλεί-
 σον γὰρ τούτου με-
 τεῖληθεν.

Πεεὶ ἑλενίου. Κεφ. κζ'.

ἑλενιον φύλλα ἔχει φλόμω τῷ
 15 σενόφύλλῳ παρὰ πλῆστα, τραχύ-
 τερα δὲ καὶ ἐπιμήκη, χαλκὸν δὲ
 οὐκ ἀνίσχιν ἐν τοῖς τόποις· ῥίζαν
 * ὑποκίρρον, ἐν ὧδι μέγαλιν, ὑ-
 ποδείμιν, ἀφ' ἧς εἰς τινὶ φύ-
 τεσιν καὶ δάσρ ἐπὶ τῶν κρίνων ἢ
 20 ἀφ' ὧν λιπαρὰ παρὰ φυάδες λαμ-
 βάονται. γίνεταί δὲ ἐν ὄρεινοῖς καὶ
 συκίοις καὶ ἀνίκμοις τόποις. ὀρύσ-
 σεται δὲ ἡ ῥίζα δέξας, καὶ τεμ-
 νομένη ξηραίνεται, κινεῖ δὲ τὸ ἀ-
 φέλημα αὐτῆς πινόμενον οὐρα
 25 καὶ ἐμυλῶ αὐτὴ δὲ ἡ ῥίζα λαμ-
 βάνομένη ἐν ἐκλεκτῷ μετὰ μέ-
 λιτος, ἀμύζει βηξίν ὀρδοπνοί-
 αις, ῥήγμασι, ἀσάστιασιν, ἐμ-
 πνευματώσεσι, θηείων δήγμα-
 ση καὶ δόλε θρμαρτικῇ ὑπάρχουσα.
 τὰ δὲ

vocant. Optimum est odora-
 tum, modicè myrrham olens,
 graue, nigrum, ligni expers, læ-
 ue, subamarum, quod madefa-
 ctū croci colorem reddit, gu-
 statumque vehemèter dentes
 ac linguam inficit, multis du-
 rās annis, quale est quod à Sy-
 ria defertur. Habet suas vires
 ad delenda quæ caliginem oculo
 obuerfant: vrinā cit, calfacit,
 cōcoquit, & emollit. vires cro-
 ci proportionē quadamtenus
 repræsentat, quandoquidē plu-
 rimam croci partem sibi cro-
 comagma vendicat.

Helenium. Cap. XXV II.

Helenium folia habet ver-
 basci angustioris folij, aspe-
 riora, oblonga: caulem qui-
 busdam in locis non emittit:
 radicē subalbidam, interdum
 subrufam, odoratam, subacrē,
 vegetam, magnam, ex qua a-
 gnate propagines liliorum aut
 ari modo feruntur. Montibus
 in vmbrosis, ficcōq; solo pro-
 uenit. Foditur æstate radix, par-
 ticulatimque dissecta siccatur.
 Potum radicis decoctum men-
 ses & vrinæ ciet. ipsaq; in ec-
 legmate ex melle prodest tuf-
 si, orthopnoæ, ruptis, cōuulsis,
 inflationibus, & serpentiū mor-
 sibus. In summa excalfaciens.

C Folia

Folia ex vino cocta vtiliter ifchiadicis illinuntur. Heleniū ſto macho vtile in paſſo cōditū: ſiquidem ſalgamarij paululum ſiccataſſam radicem, mox decoctum, & frigida aqua madefactam, in ſapam coniiciunt, & ad uſus recondunt. Trita potaque ad cruentas excreationes efficax eſt.

Heleniū Aegyptiacum.

Cap. XXVIII.

Alterū helenij genus in Aegyptio gigni Crateuas tradit: herba eſt cubitalibus ramulis, ſerpilli modo per humum repentibus, foliis lenticulae circa ramos, ſed longioribus crebriſſique, radice pallida, digiti minoris craſſitudine, per ima tenui, ſupernè craſſiore, cortice nigro. Naſcitur in maritimis collibūſque. Radix vna in vino epota, contra ſerpentium ictuſ auxiliatur.

Omphacium, oleūmq;

Cap. XXIX.

Oleū quod ex immaturis oliuis exprimitur, ad multos uſus rectè valētibus accommodatiſſimū: omphacinū id appellatur. Praeſtat recēs, odoratum, quod non mordeat. Tale vnguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Stomacho vtile

τὰ δὲ φύλλα αὐτῆς ὀππλάττειται ἀφελθέντα μετ' οἶνε, ἰσχυροῖς ὠφελίμως· ἐπὶ δὲ καὶ ἐνδομαχος τειχευδεῖσα ἐν γλυκεῖ ξηροῖς παντί· καὶ αὐτὴ ἐπὶ ὀλίγον οἱ ἀλμυραὶ, εἴτα ἀφελήσονται, ἀποβρέχουσιν ὕδατι ψυχρῷ· εἴτα βάλλοντες εἰς ἑλμα, ἀποτίθενται εἰς χυτῶν, ποιεῖ δὲ λεία πνομήν, αἰμοπηκοῖς.

Περὶ Ἑλενίου αἰγυπιαίου.

Κεφ. κβ.

10

Ἑλένιον ἄλλο ἰσχυρὸν κρατεῖας χυτῶν ἐν αἰγυπία· πῶς δὲ ὅτε κλωνας ἐχουσα πηχυαῖα, ἐπὶ γῆς ἐρριμμένοις ὥσπερ τὸ ἐρπυλλον. φύλλα δὲ τοῖς τοῦ φακοῦ ὅμοια, μακρότερα δὲ καὶ πολλὰ πλεονεχῶς τοῖς κλωνίοις, ῥίζαν ὠχρὰν, πάχος δακτύλου μικροῦ, κάτωθεν λεπτήν, ἀνωθεν δὲ παχύτεραν, φλοιὸν ἐχουσαν μέλανα. φέεται ὅτι ἐν παρθεναγαυαίοις τόποις καὶ γεωλόφοις. Δύναμιν ὅτι ἔχει μετ' οἶνε πνομήν, μίαν ῥίζαν, θηριοδίκητις βοηδεῖν.

Περὶ Ἑλαίου αἰμοτειβοῦς.

Κεφ. κβ.

Ἑλαιον πρὸς τὴν ἐν ἰγείᾳ χυτῶν αἵματι τὸ αἰμοτειβές· ὃ καὶ ὀμφάκιον καλεῖται· τούτου διαφέρει τὸ νέον. ἄδνηκτον ἐν ὧδε, χηρίσμον δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ εἰς πλὴν τῶν μύρων κατασκευήν. ἐπὶ δὲ καὶ ἐνδομαχόν διὰ

διὰ τὸ σύφειν· καὶ οὐλῶν σάλπιγγον·
καὶ ὁδόντων κρατυπικόν, κρατού-
μυον ἐν τῷ στόματι. καὶ ἰδρώτων
ἐφεπικόν.

Περὶ ἑλαίου κοινῆς. Κεφ. λ'.

Τὸ δὲ καὶ παλαιότερον καὶ λιπαρώ-
τερον, εἰς τὴν τ' φαρμάκων χρῆσιν
εὐθέως κοινῶς δὲ πᾶν ἔλαιον, θρ-
μαπικόν ἐστὶ καὶ μαλακτικόν γα-
στρός, δι' ἀπερίψυκτον φυλάσσειν τὸ
σώμα, ἐτοιμώτερον πρὸς τὰς ἐν-
8 γείας ποιεῖν. ἐστὶ δὲ καὶ συκοίλιον καὶ
μαλακτικόν, ἀμβλύνον τε τὰς τ'
ἐλκόντων φαρμάκων δυνάμεις ἐν
τῇ μίξει, δίδω· δὲ καὶ πρὸς τὰ δα-
νάσιμα συνελθὼς πινόμενον καὶ ἐξε-
μέμενον. καθάρεται δὲ ὅσον κοτύλιον
15 σὺν πίτανης ἰσῶ χυλῷ ποθὲν ἢ ὑ-
δατι. σφοδμενέοις τε ἐν πόλῳ, ὡφε-
λίμως δίδω· καὶ πηγάς ἐψηθὲν
* κινάδων ἐξ πλῆθος, ἐλμυθαί τε
ἐκβάλλει, καὶ ὀλεται δὲ τὸ αὐτὸ,
20 πάλαιον θρμαπικώτερον καὶ δια-
φορητικώτερον· πρὸς ὁξυδροκίαν
τὲ ὑπάλκιμμα, μικρόν δὲ εἰ μὴ πα-
ρεῖν πάλαιον ἔλαιον ἔτω, * κατὰ κε-
ράτας εἰς ἀγχείον τὸ παρόντος τὸ
κρεῖσσον, ἐπεὶ ὥς ἔχει μέλιος πά-
35 χος καὶ χεῖρ τ' γὰρ αὐτὴν τῷ προ-
σημῶ εἰσφέρεται διώαμιν.

Περὶ ἑλαίου ἐν τ' ἀγείας

ἐλαίας. Κεφ. λβ'.

Τὸ δὲ ἐν τῇς ἀγείας ἐλαίας ἔ-
λαιον, * συπληρώτερον, πρὸς μὲν
40 τῷ

utile est, quod astringat: gin-
guas contrahit, dentes firmat,
si contineatur in ore, sudores
cohibet.

Oleū cōmune. Cap. XXX.

Et quod vetustius ac pingui-
us, eō ad medicamenta aptius
est. Et (vt reliqua in commu-
ne dicantur) omne oleum cal-
facit, emollit ventrem, à per-
frictionibus corpus tuetur, ip-
sumque promptius ad obeun-
da munera reddit, aluū emol-
lit, vlceratium venenorum vi-
res permistum hebetat, contra
venena datur, assidue potū red-
ditumque vomitionibus, soluit
aluū heminae mensura cū pa-
ri ptisanæ succo aut aqua po-
tum, ad tormina calidum si-
mul decocta ruta tribus sexta-
riis in potu datur, ventris ani-
malia pellit, idem maximè ilei
intestini morbo laborantibus
infunditur. Vetus magis calfa-
cit & vehementius discutit, oc-
ulorum claritati sublitū con-
fert. Si vetusti non sit occasio,
in vase decoquitur ad mellis
crassitudinem, vt vetustatē re-
præsentet.

Oleum sylvestris oliuæ.

Cap. XXXI.

Oleū qđ sylvestres oliuæ fun-
dūt, vehemēter astringit, & ad
c ij fano-

DIOSCORIDIS

fanorū vſus ſecundū ſibi locū
vêdicat. In dolorib⁹ capitis vti-
liter ꝑ roſaceo ſubſtituitur, fu-
dores arcet, defluêtes capillos
inhibet, furfures, vlcera capitis
manâtia, ſcabiê leprâſq; abſter-
git: tardius canitiê ſentiūt, qui
eo quotidie perunguntur.

Oleū candidū. Cap. XXXII.

Candidum oleū fit hoc mo-
do: Album colore, nec annicu-
lo vetuſtius, in nouum fictile
oris patuli funditur, centum he-
minarum menſura, & ſub ſo-
lem media quaque die cōcha
refunditur: ex altōque demitti-
tur, vt aſidua deuolutiōe, ictū-
que agitatū reſpumet: octaua
die foenum græcū mūdū quin-
quaginta denariorū pondere,
calida aqua madefactū donec
emolleſcat; in ſupradictū oleū
deiicitur, ita ne extillet aqua:
poſtea tedæ præpinguis piceæ,
aſſulatiſſimæ æquale pondus
adiicitur, & tráfactis octo die-
bus, oleū cōcha mouetur. Vbi
candorê contraxerit, in vas no-
uū vetere vino aſſuſum recōdi
debet, ſubſtratis ſertulæ Cāpa-
næ corollis drachmas vndecim
pédentibus; cū pari iridis pon-
dere: ſin minus, rurfus ſoli mā-
dandū, & idem munus obeun-
dum, vſque dum inalbeſcat.

Sicyoniū.

ἐν ὑγείᾳ χρῆσθαι, δευτέρον. κεφα-
λαλχοῦσι δὲ ἀντὶ ῥοδίνης ἀμύζει,
ἐπέχον καὶ ἰδρῶντας καὶ τείχας ῥε-
ούσας, ἀποσμήχει δὲ καὶ πύρεα,
καὶ ἀχῶρας, καὶ ψώρας, καὶ λέπρας·
βραδίον τὸ πολλοὶ καὶ ἐκείνην ἡ-
μέραν ἐπαλαφόμενον.

Ελαιον λευκόν. Κεφ. λβ΄.

Λευκαίνε· ὃ ἐλαιον ὅττω λαβὼν
τὸ τῇ χροῇ μὲν λευκόν, τὸ ἡλικίαν δὲ
μὴ πλέον ἐνιαυτοῦ, ἔχει εἰς κερα-
μεῖν ἀγχεῖον πλατύσομον, καλὸν, 10
ἔσω δὲ ὃ μέτρω κοίταλαι ρ'. εἴτα θείς
ὑφ' ἥλιον, ἀνάχει κόλχαι καὶ ἐκεί-
νην ἡμέραν κατὰ τὸ μέσον ὑψόθι τῇ
καίφορᾳ χρώματος, ἵνα τῇ συνε-
χεῖ κυλήσῃ καὶ πληρῇ μελαβάλῃ
καὶ ἀφρίσῃ. τῇ δὲ ὀσδῇ ἡμέρας βρέ- 15
ξας τέλειος καθαράς < ν'. ἐν ὕδατι
θρῆνός, ἐμβάθῃ μαλακὴν γυμνομένην
εἰς τὸ παρρημένον ἐλαιον χωρὶς
τὸ σπαιγγίσαι τὸ ὕδωρ προσσπόδος
ὃ καὶ δαλὸν πιτύνῃς ὥς ὅτι λιπα-
ρώτατον καὶ εἰς λεπτὰ κατεργασμέ- 20
νον τὰς ἴσας ὑλίας, καὶ ὅπως ἔασον
ἄλλας ὁκλῶ ἡμέρας διχθεῖν· κατὰ
ταύτας ἀνάχει τὴν κόλχαι τὸ ἐλαι-
ον. τότε λοιπὸν εἰ μὴ εἴη τὸ τέλειος
τετευχὸς, εἰς καλὸν ἀγχεῖον παρ-
εκλυσμένον, οἶνω παλαιῷ καίκαε 25
ράσας, ἀποτίθεσο προῦπεσρωμέ-
νων μελιώτων σφρανίσκων ἀλί-
σκων ὀγκῶν ἰά. καὶ ἵρεως τὸ ὅσης· εἰ
δὲ μὴ, πάντων ἐν ἡλίῳ θείον ἀντὶ καὶ
ἐργαστέον ἄχρῃς ὃ λευκὸν γήνηται.

Περὶ

Περὶ Σικυωνίου ἐλαίου.

Κεφ. λγ.

Εἴνεστι ὃ καὶ σικυώνιον τὸ προση-
 γνημένον οὗτω σκευάζεται· εἰς λέβη-
 τα κεκοσμημένον, παλῦστο-
 5 μόν, ἐγχέας νέου ἐλαίου ὡμοτε-
 τοῖς καὶ λευκοῦ χράα. καὶ ὕδατος
 ἡμίχρυν, ἐπεὶ κούφῳ πυρεὶ κινῶν
 πρᾶξας· ὅταν δὲ ἀναζέσῃ δις, ὑ-
 πόσπασον τὸ πῦρ καὶ ψύξας ἀπο-
 κόνχυσον τὸ ἐλαιον, εἴτα ἄλλο ἐ-
 10 πιδοὺς ὕδωρ, συνανάξῃσον αὐτῷ καὶ
 τὰ λοιπὰ ποιήσας καθὼς σοι ὑ-
 πόδει δεικνύται, ἀπόθεν σκευάζεται
 δὲ τοῦτο μάλιστα ἐν σικυωνίᾳ σι-
 κυώνιον καλούμενον. Διῶαμιν δὲ
 ἔχει ποσῶς θρῆμαντικὴν, ἀρμύζον
 15 ἐν πυρετοῖς καὶ τοῖς περὶ νεύρα
 πάθεισι. χεῶνται δὲ αὐτῷ καὶ γυ-
 ναῖκες, ἐπὶ τῷ* σιλοτόρῳ.

Ρύπος βαλανείων.

Κεφ. λδ.

Ὁ δὲ ἐπὶ τοῖς βαλανείοις συνα-
 20 ῥόμενος, διῶαται θρῆμαίνην, μα-
 λάσσειν, διαφορεῖν, ῥαχίστι τὲ καὶ
 κονδυλάμασιν ἐν διαχρίσι.

Ρύπος ἐν τῇσ παλαίστραις.

Κεφ. λε.

Ὁ δὲ ἐπὶ τῇ παλαίστραις πρᾶσ-
 25 ειληφὼς πλὴν κόνιν, εἰοικὼς δὲ
 ῥύπῳ, τὰς περὶ τοὺς κονδύ-
 λους συστροφὰς ἐπιπιδέρματος ὡ-
 φελεῖ· καὶ ἰχθυαδικούς· δερμὶς
 αὐτὴ μαλάγματος ἢ πνεύας ἐ-
 πιπιδέρματος.

Sicyonium. Cap. XXXIII.

Sicyonij componendi ratio
 hæc est: In lebetē oris lati stan-
 no inductum, funditur olei al-
 bi quod crudæ oliuæ reddide-
 runt, congius vnus, aquæ semi-
 congius: leui id igne coquitur,
 leniter mouendo: at vbi bis ef-
 ferbuit, & subtracto igne refri-
 xit, innatans oleū concha de-
 capulatur, & adiecta noua a-
 qua cōferuescit, & reliquis vt
 diximus peractis reponitur. In
 Sicyonia maximè fieri cōsue-
 uit, Sicyonij inde accepto co-
 gnomine. Calfactoriā ad quen-
 dam vsq; modum vim habet.
 Febri ac neruorum vitiis pro-
 dest. foemine ad commendan-
 dum faciei nitorē eo vtūtur.

Strigmenta balnearum.

Cap. XXXIIII.

Strigmenta à balneis calfa-
 ciunt, molliunt, discutiunt: ad
 fēdis rimas & condylomata
 illinuntur.

Strigmēta palæstrica.

Cap. XXXV.

Illa verò quæ ex palæstris
 puluerē sibi ascuerunt, in for-
 dis speciem redacta, articulo-
 rum nodos imposita adiuuāt:
 ischiadicis in fōtus aut mala-
 gmatīs locum, calida commo-
 dè sufficiuntur.

Ρύπος

B iij Strigmen

DIOSCORIDIS

Strigmēta gymnasiōrū.

Cap. XXXVI.

Deraſe gymnasiōrum parietibus simulacrūque sordes, calfaciunt: tubercula, quę ægrē ad coctionem perducuntur, disſipant: desquammatiſ & viceribus ſenum profunt.

Elæomeli. Cap. XXXVII.

In Palmyris Syrię, quod elæomeli vocant, ex quodā caudice manat, oleum inelle craſſius, ſapore dulci. Bilem, cruditateſq; detrahit, ſextario cū vna aquę hemina dato. Sed qui ſumpſere, torpeſcunt & viribus deſiciuntur: quod minime vereri oportet, verū crebro excitare, ne veterno preſſi ſomnos captent. Fit & oleum ē pinguitudine furculorum oleę: optimum vetuſ, craſſum, pingue, non turbidum. Calfacit, priuatimque caliginibus oculorum illinitur: lepras, neruorūque dolores illitum emendat.

Cicinum oleum.

Cap. XXXVIII.

Cicinum oleū hoc modo tēperatur: Maturi ricini quales quātitate torrido ſole flacceſcunt, & vuarū more inſtrati tātiſper inſolātur, dū veſtię cortex

Ρύπος γυμναſίων.

Κεφ. λς.

Καὶ ὁ ἐν τοῖς τῶν γυμναſίων τοῖς τοῖς ρύπος, καὶ ὁ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν, δερμαίνῃ τε καὶ διαχεῖ τὰ δύσπεπτα φύματα, καὶ πρὸς ἀποσύρματα καὶ πρὸς ἑλκὲς περὶ σφύζονται.

Πεὶ ἐλαομέλιτος.

Κεφ. λς.

Ελαομέλι καὶ παλμυρῶν τὸ συρίας ἐκ πινος τελέχοις, ἐλαιον μέλιος παχύτερον εἶναι, γλυκὺ τῇ γούρῃ, ὅσῳ πνόμιον πλῆθος κυάδων β' μτ' κοτύλης μιᾶς ὕδατος, ἀγει κατὰ κοιλίαν ὡμὸν καὶ χολῶδες ἐννοῶντο ὅτι γίνονται καὶ ἐκλυτοὶ οἱ λαμβάνοντες, ὅσῳ δὲ εὐλαβεῖται, διεγείρειν δὲ αὐτοὺς μὴ ἐώντας κατὰφέρειν. σκευάζεται δὲ καὶ ἐκ τῶν λίποις τῶν θηρῶν ἐλαιον· ἐστὶ δὲ αὐτῶν καλλίστην καὶ παλαιὴν, καὶ παχὺ καὶ λιπαρὴν, οὐ τεθλαμμένην· δερμαίνει δὲ ἰδίως ποικίλως πρὸς τὰ ἐπισκοτουῦντα ταῖς κόραις ἐπιχειρόμενον, καὶ λέπρας καὶ ἀλγύματα πρὶν νεύειν ἐν χειρὶ μόνον ὡφείδει.

Πεὶ κικίνου ἐλαίου.

Κεφ. λς.

Κικίνον ἐλαιον σκευάζεται τούτω τῷ τρόπῳ· λαβὼν ὠρίμων προτῶνων ὅσον αὐτῇ δόξῃ, καὶ ἰσχυρὰς εἰς ἥλιον, κατὰ σφύρας θηλοπέδου τρέπον ἕως αὐτῷ περικείμενος φλοιὸς

φλοιὸς ἀπορραγείς ἐκπέσει, συνα-
 ραγὼν δ' ὑπὸ καυτῶν εἰς ὄλμον
 καὶ κόψας ἐπιμυθεύς εἰς λέβητα κα-
 καυσιτερωμένον βάλε, ὑδωρ ἔχον-
 τα, καὶ ἀνὰ βρασμον ὑποκάων, ὅταν
 5 ὁ ἀνὴρ δ' ἐν αὐτοῖς ὑγρότητα πα-
 σαν, ἄρας δ' ἐκλέβητα ἀπὸ τοῦ πυ-
 ρὸς, ἀποψαμύσαι τὸ ἐπιπλέον ἑ-
 λαμιον καὶ ἀποτίξῃσιν. οἱ δὲ αἰγύ-
 πτιοι διὰ τὸ θαψιλῶς χρῆζεν, ἐ-
 τέρως αὐτὸ σκευάζουσιν, μὲν γὰρ τὸ
 10 καδάρας εἰς μύλην ἀποδιδόντες
 τοὺς κρότους, ἀλλήλους ἐπιμε-
 λῶς· εἶτα εἰς σφύρας ἐμβάλλον-
 τες τὸ ἀληλεπτόνον, δι' ὀργάνου ἐκ-
 θλίβουσιν, ὥς μοι δὲ εἶσιν οἱ κρό-
 τες, ὅταν ὑπὸ τῶν περὶ χόντων
 15 αὐτὸς σφαιρίων ἀπολύων. ποιεῖ
 δ' ἐν τῷ κίβινον περὶ αὐτῶν καὶ ψά-
 ρας καὶ τὰς ἐν ἔδρα φλεγμονὰς,
 πρὸς τῇ ὑστέρας μύσει καὶ διασπο-
 φάς· ἐπὶ δ' οὐλὰς ἀπορεπείας καὶ ὠ-
 τιδίαιας, ἐμπλάσσει τὸ μύλον, ἐμ-
 20 περικτοτέρας αὐτὰς ἐργάζει. ἄ-
 γει δὲ καὶ κατὰ κοιλίαν ὑδακτῶδες
 ποδῶν, ἐκκρίνει δὲ καὶ ἐλμυνθας.

Περὶ Ἀμυγδαλίνου ἔλαιου.

Κεφ. κθ.

Ἀμυγδαλινὸν ἔλαιον ὃ πινες
 25 μετόπιον καλεῖσιν σκευάζεται οὕ-
 τως· Ἀμυγδαλῶν πικρῶν* χδβ'.
 καδάρας καὶ ξεράνας, κόψον
 ὑδωρὸν λίνον ἐν ὄλμῳ κούφῳ
 μέγας μᾶζα γίνηται, ἐπιχέ-
 ρεις τὸ ζεστοῦ ὕδατος κοτύλας β'.

cortex fractus decidat. Caro
 colligitur, & coniecta in pi-
 lam diligenter tunditur: po-
 stea in lebetem stanno illito,
 qui aquam habeat, demitti-
 tur, subiectoque igni ferue-
 scunt: & vbi insitum prorsus
 humorem reddiderunt, subla-
 to ab igni vase, innatans o-
 leum concha tollitur, & re-
 conditur. Sed in Aegypto, vbi
 largior increbuit usus, longè
 secus fieri solet. Nam repurga-
 tos ricinos molæ mandant, &
 accuratè molitos per sportu-
 lam torculo exprimunt. Tum
 quidem ematuruerunt ricini,
 cum continentibus orbiculis
 exuuntur. Ad pforas, & vlce-
 ra capitis manantia valet: pro-
 dest sedis inflammationibus,
 vuluis conuersis atque præ-
 clusis: item indecoris cicatrici-
 bus, & aurium doloribus: em-
 plastra efficaciora reddit ad-
 ditum, potu aquâ aluo extra-
 hit, ventris animalia pellit.

Amygdalinû. Cap. XXXIX.

Amygdalinum oleum, quod
 aliqui metopium vocant, hoc
 fit modo: Semodius ex ama-
 ris nucibus repurgatis siccatis-
 que, in pila ligneo pistillo leni-
 ter tunditur in offas, aque quæ
 ferbuerit sextarius adiecitur,

DIOSCORIDIS

& ubi dimidia hora humorem hauserit, vehementius quam antea tunditur, mox tabellis premitur, & quod digitis hæsit, concha excipitur. Pressis nucibus rursus hemina aquæ inspergitur, & postquam ebi-berint: idem opus profequen- dum. Singulas heminas red- dunt singuli modij. Contra vulvarum dolores, strangula- tus, conuersiones, & eorundē locorū inflammationes, & ef- ficax est: vitiis renum, calcu- losis, difficili vrinæ, suspirio- sis, lienosisque proficit: dolo- res capitis, grauitatem audi- tus, sonos incertos, tinnitūque discutit: maculas & vitia cu- tis tollit è facie, & eam erugat cū melle, radice lilij & Cypria cera aut rosaceo cerato: & o- culorū hebetudines emendat, vlcera capitis manātia & fur- fures cum vinō abstergit.

Balaninum.

Cap. XL.

Simili modo fit Balaninum oleum, quod repurgat macu- las, lentigines, varos, & cicat- rices nigras. Aluum soluit, sto- macho aduersatur, contra au- rium dolorem, sonos, & tinni- tus auxilio est, cum anserino adipe instillatum.

Sesla-

ἔα συμπιεῖν ἡμώριον, ἃς ἥς πα-
λιν βιαίωτερον τείβε, εἴτα απο-
θλίβων πρὸς πλάκα ἐξίπου, καὶ
τὸ ἀπὸ τῶν δακτύλων εἰς μύα-
κα ἀναλάμβανε. εἴτα πάλιν εἰς
τὸ ἀποτεθλιμμένον κοτύλιον ὕ-
δατος μίαν ἐπιχέας, καὶ συμ-
πιεῖν ἑάσας, τὸ αὐτὸ ποιεῖ. ἀ-
ποδίδωσι δὲ κοτύλιον ἅ τὸ τε-
τραχόινικον. ποιεῖ δὲ πρὸς τὰς
ἐν μύτῃ ἀλγηδόνας καὶ πνίγας 10
ὑστερινὰς, διαστροφάς τε καὶ φλε-
γμονὰς τῶν αὐτῶν τόπων. ἐπι-
δὲ κεφαλαλγίας καὶ ὤτων πό-
νοισι, καὶ ἥχοις καὶ σειγμοῖς ὠ-
φελεῖ δὲ καὶ νεφριτικοῖς, καὶ δι-
σσειῶντας, καὶ λιθιῶντας, καὶ 15
ἀδματικούς, καὶ σπληνικούς.
αἶρει δὲ καὶ στίλους ἐν προσώ-
πῳ, καὶ ἐφῆλεις καὶ ῥυτίδας, μέ-
λιτι μυχρὸν καὶ κρίνου ῥίζῃ καὶ
κυνωρείῃ ἢ ῥοδίνῃ κηρωτῇ, καὶ ἀμ-
βλυωπίας δὲ ἐστὶν ἀνασκευαστικόν. 20
συνὸ οἶνον δὲ ἀχῶρας καὶ πίνυ-
ρα σμῆχει.

Πεεὶ Βδαγίνου ἐλαίου.

Κεφ. μ.

Εοικότως δὲ καὶ τὸ βδαγίνον
σκευάζεται. διώαμιν δὲ ἔχει κα-
θαρτικὴν στίλων, φακῶν, ἰόνδων, 25
οὐλῶν μελανίας, κοιλίας καθαρ-
κτικὴν, ἐστὶ ὃ κακοσμάχον ἀφμά-
ζει καὶ ὠταλγίας, καὶ ἥχοις, καὶ συ-
ειγμοῖς, μετὰ χυμίου σέατος
ἐν χερόμηνον.

Ελαιον

Ελαιον σπασίμιον. Κεφ. μα΄.

Ομοίως δὲ σκευάζεται τοῖς
πρωιημέροις, τῷ τε σπασίμιον
ἐν τῷ σπασίμου.

Ελαιον καρύινον. Κεφ. μβ΄.

5 Καὶ τὸ καρύινον ἐκ τῆ βασιλικῶν
καρύων συνπιπτόμενον. δύναμιν ὅ
ἔχεις τὸ αὐτὸν τῷ βαλανίνῳ.
Πρὶ Ισοκαμίμιν ἐλαίῳ. Κεφ. μγ΄.
Καὶ τὸ ὑποκαμίμιον δὲ σκευά-
ζει ὅπως λαβὼν τὸν λευκὸν καρ-
10 πὸν ξηρὸν πρὸς σφατον καὶ κόψας,
ὑδατι θερμῷ φύρα ὡς πρωιη-
ται ἐπὶ τῷ ἀμυγδαλίῳ. ἡλιάζων
δὲ τὰ ὑπὸ χεῖρα ξηρανόμενα
αὐτῷ μέρη, τῷ ὅλῳ ἀνὰ μισθῷ καὶ
τὸ αὐτὸ ποιεῖ ἄλλοις ἀνὰ μελανθῇ
15 καὶ δυοῶδες γλήνη ἔϊτα διηθήσας
καὶ ἐκθλίψας ἀποτίθεται. ποιεῖ δὲ
καὶ πρὸς ὠταλγίαις, καὶ πρὸς τῷ
γινεται μαλακτικὸν ὄν.

Πρὶ Κνιδελαίῳ. Κεφ. μδ΄.

Ομοίως δὲ καὶ τὸ διὰ τῷ κνι-
20 δίου σκευάζεται καὶ κόκκῳ λεπιδέν-
τος καὶ κοπέντης, καὶ παρπηκῇ. δὲ
ἔχει δύναμιν κοιλίας πνέμενον.

Πρὶ Κνικελαίῳ. Κεφ. μέ.

Ὡς αὐτῶς ὅ καὶ τὸ κνίκον σκευά-
ζει. δύναμιν ὅ αὐτὴ τῷ διὰ τῷ
25 κνιδίου κόκκῳ, ἀνὰ μένῃ ὅ μάλλον.

Πρὶ Ράφανελαίῳ. Κεφ. μς΄.

Τὸ ὅ ραφάνιον σκευάζεται ἐν τῷ
αὐτῷ σπέρματος ὡς πρὶ καὶ τὰ λοι-
πά. τοῖς ἐν νόσῳ ὅ φθειρεῖται ἀρ-
μύζῃ, καὶ ταῖς φθέραις τὸ πρὸς σφατον
σημῇ χει

Sesaminum. Cap. XLI.

SIMILIS sesaminij ra-

tio.

Caryinū. Cap. XLII.

Fit etiā è nuce iuglāde oleū,
quod caryinū vocant. Eādem
vim habet quam Balaninum.

Hyofscyaminū. Cap. XLIII.

Hyofscyaminum sic fit: Semē
candidum, recens ac ficcū tū-
datur, & calida aspergit aqua,
ut in amygdalino diximus, dū-
que insolatur, siccata, quæ sub
manu sunt, partes cum reliqua
massa permisceantur: hoc autē
fieri oportet dum nigrescat &
grauiter oleat: mox pressū atq;
excolatum reconditur. Ad au-
rium dolores efficax est, pesisis
miscetur, ad emolliendū vtile.

Gnidicū oleū. Ca. XLIII.

Fit & è grano gnido pur-
gato & tuso. Vis ei aluum fol-
uere potu.

Cnicinū oleū. Cap. XLV.

Non fecus cnicinum oleū
temperatur: cui facultas ea-
dē est quæ facta è gnido gra-
no, verum inualidior.

Oleū Raphanicū. Ca. XLVI.

Raphaninum è raphani
semine fieri solet, cæterorum
more. Phthiriasis mala vale-
tutine contractas tollit, sca-
britias

DIOSCORIDIS

britias cutis in facie emendat. Ad obsonia vtuntur Ægyptij.

Melanthinum oleum.

Cap. XLVII.

Melanthinum idem quod raphaninum potest.

Oleū Sinapicū. Cap. XLVIII.

Tritū sinapis semē, & calida aqua madefactū, adiecto post ea oleo exprimit, id ad diuturnos dolores efficax est, trāsfert humores q̄ in aliqua parte cōcreuerūt. Mirteū. Cap. XLIX.

Myrtei faciūdi ratio hęc est: E myrto nigra fyluestri, aut fatiua, foliorū molissima queque tusa premunt: succo pares omphacini olei portiones adiiciūt, subiectisq; carbonib⁹ iferuefcūt donec cōcoquant, innatās oleū deradiūt. Sed lōgē faciliior hęc cōpositio: Tenera folia cōtusa coquūt in oleo & aqua, & qđ inatat eximit. Priuatim alij deiecta ī oleū folia ī sole macerāt: alij pri⁹ oleū īspissant malicorio, cupresso, cypiro et iūco odorato. Efficaci⁹ est amarum gustu & oleofū, viride, translucent, & olens myrtū. Astringit ex indurat, idēd medicamentis miscetur quæ cicatricē obducunt: prodest vlceribus in capite manantibus, ambustis igni

σηήχει τραχύτητα. χρώνται δὲ αὐτῶ οἱ ἐν αἰγύπτῳ τοῖς περὶ σι-
νήμασι συνέχοντες αὐτό.

Πρὶ Μελανθελαιῶν. Κεφ. μζʹ.

Καὶ τὸ μελανθινον δὲ τίνω αὐ-
τῷ ἔχει δύναμιν, καὶ σκευασίαν εἰς
τῷ ραφανίνῳ.

Πρὶ Σιναπελαίων. Κεφ. μηʹ.

Τὸ ὃ σινάπνον σκευάζει, λεαινο-
μένῃ τῇ σινηπέως καὶ βρεχθιμύρῃ ὕδα-
τι. Ἰνὸν χροῖον ἔπειτα μίγνυμι καὶ ἐλαί-
ον, καὶ συνεκθλιβόμενόν ποιεῖ ὃ πρὸς ἰο-
τὰ χροῖα ἀλγύματα μετ' οὖ-
νῳ. Πρὶ μυρσιναιῶν. Κεφ. μθʹ.

Μυρσίνιον δὲ σκευάζεται οὕ-
τως: λαβὼν τὰ ἀπαλὰ φύλλα τῆς
μελαιῆς μυρσίνης ἢ ἀγρίας ἢ ἡ-
μέρου, κόπῃ πιέζων ἴσον δὲ τῷ ἰσ-
χυλῷ, ἐλαίου ὁμοφαίνε μίσχων,
χλῆαινε ἐπ' ἀνδράκων, ἕως ἂν
συνεψῇ τὴν αἶσιν τὸ ἐπιστάμενον.
Εὐκοπώτερά δὲ σκευασία, τὰ ἀ-
παλὰ τῶν φύλλων κόψαντα, ἐ-
ψῃ μετ' ὕδατος, καὶ ἐλαίου, καὶ τὸ εἰς
ἐπιστάμενον ἀποψῇ, ἰδίως ὃ τὰ
φύλλα κατέντα εἰς ἥλιον, ἐν ἐ-
λαίῳ ἀποβρέχειν. ἔνιοι ὃ περὶ σφύ-
φοισι τὸ ἐλαιον σιδήοις, κυπαρίσ-
σῳ, κυπέρῳ, ῥάνῳ. ἔστι δὲ ἐμπερε-
κτικώτερον τῇ γένεσι πικρίζον, καὶ
ἐλαιῶδες, χλωρόν, διαφανές ὅσον
μυρσίνης. Δύναμις δὲ αὐτῆς συ-
πτικὴ, σκληρωτικὴ, διὸ καὶ ποιεῖ
μυγνύμενον ἀπουλωτικῆς, καὶ
πρὸς πνεύμασι, ἀχῶρας, πίτυ-

&c

εα,

ρᾶ, ἐξανθήματα, παρατίμματα, ραγάδας κονδυλώματα ἄρδρα καχλασμένα· ἰδρωτας σέλλει, καὶ ὅσα σύφωτος ἢ πυκνώσεως ἔχει χεῖραν.

5 Περὶ Δαφνελαίου.

Κεφ. ν'.

Τὸ δὲ δάφνινον σκευάζει διὰ τῶν δαφνίδων, ὅταν ὥσι δρυοπέτεις, ἐφορμύων μὴ ὕδατος· ἐν γὰρ τῷ περικειμένου λέποις, ἀνί-
 10 ηπιν λιπαρίαν πινά, λιῦ· διακόψαντες χερσὶν εἰς κύανας ἀναλαμβάνουσιν. ἐνιοὶ δὲ ὁμφάκινον ἔλασαν πρὸς σύψαντες, κυπείρω, καὶ κρίνω καὶ καλάμῳ καὶ μὲν ταῦτα δάφνης φύλλα ἀπαλλὰ βαλόν-
 15 τες, σπινέφουσι. οἱ δὲ, καὶ δαφνίδας ἕως ἀν' ἱκανὸν γίνονται τῇ ὁσμῇ. ἐνιοὶ δὲ καὶ σύραχα μίσχουσι καὶ μυρσίλῳ. αἰεὶς δὲ πρὸς σκευασίαν ἢ ὀρεῖνῃ καὶ πλατύφυλλος δάφνη. διαφέρει δὲ τῷ
 20 δαφνίνῳ τὸ πρὸς φαρμακόν, χλωρὸν τῇ χροῇ, πικρότατον, δριμύ. Δύναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, ἀνασώματικὴν, κόπων λυτικὴν. ἀρμόζει καὶ τοῖς περὶ τὰ νῦνα πάθεισι πᾶσι, καὶ ὠταλγί-
 25 ας, καὶ καταρροῖς οὐλοῖς· ἐστὶ δὲ καὶ ναυτιῶδες ποτὲν.

Περὶ Σχινελαίου. Κεφ. νά.

Τὸ δὲ σχίνινον ὁμοίως ἐκ τοῦ καρποῦ πεπείρου σκευαζέται, ὡς τὸ δάφνινον, πρὸς φαρμακόν.

ὕψιζ

& papularū eruptionib⁹. Facit ad attrita & furfures, sedis rimas, cōdylomata, articulos laxatos, corporis sudores cōpefcit, & omnia quæ astrictionē inspissationemq; desiderant.

Laurinum. Cap. L.

Laurinū fit hoc modo: Lauri baccæ cum maturæ sunt, in aqua coquuntur: siquidem ex obducto cortice quandā pinguitudinē reddunt, quæ manibus subacta, cōcha excipitur. Alij omphacinū prius oleū cypro, iūco odorato, & calamo inspissant, deinde tenera lauri folia cōcoquūt. alij etiam baccas, donec oleū odorē cōtraherit. alij styracē & myrtū addunt, Optima laurus ad id latifolia & montana. Oleū laurinū vtilius quod recēti⁹, quoq; viridius colore: amarissimū, & acre. Vis ei excafactoria, emolliens: venarū spiracula aperit, lassitudines discutit, omnibus neruorū vitijs, algoribus, destillationib⁹, auriū dolorib⁹, malis renum frigore cōtractis, illitū non aliud iuuantius: attamen potum nauseam parit.

Lentiscinum. Cap. LI.

Similis lētiscini ratio. Nā ē maturo fructu téperat⁹, factis prius spissamētis, vt ī laurino dixim⁹.

Ηος

DIOSCORIDIS

Hoc scabiem iumentorum canūque sanat, vtilissimū pefsis, acopis, & leprarum medica mētis: sudores cohibet. Nec fecus terebinthinum fieri solet, quod refrigerat & astringit.

Mastichinum. Cap. LII.

Mastichinum è trita fit mastiche, quod contra omnia vuluæ mala efficax est: mediocriter calfacit, astringit, & emollit. Aduersus prominentes stomachi duritias, coeliacorum, dysentericorumque cruciatus vtile: faciē emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio insula componitur.

Vnguentorum cōpositio.

Cap. LIII.

De ratione vnguentorū cōsequēter tractādū existimaui-
mus, quādoquidē ea in nōnul-
lis corporū vitijs, aut medica-
mētis mista, aut corpori perfu-
sa, aut narib⁹ obiecta, plurimū
profunt. in quorū probationi-
bus cōsulere nares oportet, an
ea oleāt ex quibus téperātur.
Optimū huiuscemodi iudiciū,
qđ in qbusdā planè obseruari
nō potest, ppter ea q admiscēt
odore ceteris pualētia: vt in a-
maracino & crocino, telino et
plerisq; alijs, q crebra circa hec
mēditatiōe experiri cōueniet.

Rosaceū.

ὕψιζαι ψώρας κτηνῶν καὶ κυνῶν
καὶ εἰς πτεροὺς καὶ εἰς ἄκοπα καὶ
λεωφικὰ ἐπιτηδείως μύχεται.
τέλει δὲ καὶ ἰδρωτας, καὶ τὸ τερε-
βινθινον δὲ ὁμοίως σπενάζεται.
ψύχει δὲ καὶ σύφει.

Πρὶ Μαστιχαίν. Κεφ. νβ'.

Τὸ δὲ μασίχινον, ἐκ τῆς μα-
σίχης λείας σπενάζεται. ποιεῖ δὲ
πρὸς τὰ ἐν ὑστέρα πάντα, ἡπίως
δερμαῖνον, σύφον, μαλάκον, καὶ
πρὸς τὰ πρὸ τὸν σῶμαχον ἐπὶ-
ρίπτόμενα σκιρτώματα καὶ κοι-
λιακά, καὶ δυσεντερικά, καὶ τὰ ἐπὶ
τῷ πρὸς τοῦ κατὰ ἐξον, καὶ εὐ-
χρίαν ποιοῦν συνήδετα ὅ ἐν
χρὶ τῇ νήσῳ χάλισον.

Συνέσεις πρὸς Μύρων. 19

Κεφ. νγ'.

Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ μύρα εὐδε-
τεῖ ἐπὶ ἐρίων παθῶν καὶ μυγνύ-
μενα φαρμάκοις καὶ ἐμβρεχόμε-
να καὶ ὁσφρανόμενα, ἀκόλουν ἢ
γούμενα καὶ τῶν τέτων παράδου-
σιν ποιήσασθαι, ἃ δεῖ δοκιμάζον-
τας ἐπιβλέπειν, εἰ ἀφ' ἧς ἡ κράσις
ἐστὶ τῷ μύρῳ, ἐκείνο ποιεῖ καὶ ὅ-
σφρησιν. αἰεὶς δὲ ὅστις ἢ τοιαύ-
τη* κρίσις· ἐπ' ἐρίων μὲν τοι οὐ
φυλάττει τὸ τοῖστον δι' ἐπικρά-
τειαν μυγμάτων σφοδρότερον
ὥς ἐπὶ ἀμαράκινου καὶ κροκίνου
καὶ τηλίνου καὶ ἄλλων πνέων αἰ-
πρὸς ἐκ τῆς πρὸς αὐτὰ* γυμνασίης
δοκιμασίον.

Πρὶ

Πρὶ Ρόδων σκευασίας. Κεφ. νδ'.

- Ρόδιον ἔλαιον γίνεται οὕτω·
 ἔλγε λίβας ἑ. ἔγγίαις ἢ. ἐλαίου λί-
 πρας κ'. ἔγγίαις ἑ. κόψας καὶ φουρά-
 σας ὕδατι, ἔψε ἀνακινῶν· εἴτα ἀ-
 5 πιθίσας εἰς τὰς κ'. λίβας καὶ ἐγ-
 γίαις ἑ. ἐλαίου, βάλε ρόδων ἀβρό-
 χων ἀριθμῶ χίλια πέταλλα* καὶ
 τὰς χεῖρας μέλιτι χρίσας, ἀνα-
 κίνει πλεονάκεις ὑπερλίθων ἡρέ-
 μα· ἔπειτα εἰσάσας τὴν νύκτα ἐκ-
 10 θλίψε, ὅταν δὲ τὸ τρυγῶδες ὑ-
 ποση· ἀλλὰ ἔξον τὸ ὑποδεχόμενον
 ἀγγεῖον· ἀποτίθεισο δὲ εἰς κρα-
 τῆρα μέλιτι κατακεχρισμένον.
 βαλὼν δὲ εἰς λευθεῖδιον τὰ ἐξι-
 πωθέντα ρόδα, ὅπῃ καὶ λίβας ἢ.
 15 οὐγγίαις γ'. τῆ ἐξυμμέρου ἐλάει,
 καὶ πάλιν ἐξίπτου. ἔσαι δὲ σοι
 τοῦτο δευτέρου, καὶ βουληθῆς
 ἄχρι γ'. ἢ δ'. ἀποθερῆς ἐ-
 πιχεων ἐξίπτου. γίνεται γὰρ τὸ μὲν
 α'. τὸ δὲ β'. τὸ δὲ γ'. τὸ δὲ δ'
 20 μύρον. ὁσάκις δ' ἂν ποιῆς, τὸν
 κρατῆρας, περικατάχρει μέλι-
 τι. εἰ δὲ θέλεις δευτέρου ἐμ-
 βολῶν ποιῆσαι, εἰς τὸ περὶ τὸν
 ἐξιπωθέν ἔλαιον, τὸν ἴσον ἀριθ-
 μὸν περσφάτων ρόδων ἀβρό-
 25 χων ἐμβαλε καὶ ἀνακινῶν ταῖς
 χερσὶ περσδευμέραις μέλιτι,
 ἐκπίεζε, καὶ ποιεῖ τὸ δευτέρου
 καὶ τρίτον καὶ τέταρτον ὁμοί-
 ως ἐκθλίβων. καὶ ὁσάκις δ' ἂν
 ποιῆς τοῦτο, νεαροὶ ὀνυχίδων
 περὶ ὑβਾਲε

Rosaceum. Cap. LIII.

Rosaceum sic fit: Lunci odo-
 rati quinque libras & bessem
 tundito, et subactas aqua in vi-
 ginti olei libris & quincunce
 subinde mouedo, coquito: dū-
 que percolaueris, in olei libras
 viginti & quicuncem, adicito
 rosas non madefactas numero
 mille, & manib⁹ melle perun-
 ctis, identidem moueto, inter-
 diu premens, finito nocte tota
 macerari, postea exprimito: &
 vbi recremētum pessum ierit,
 mutato vase, in craterē melle
 illitū recondito. Ceterum ro-
 sas quæ antea pressæ fuerunt,
 in tabellum demittito, & affu-
 sis octo libris & quadrāte spif-
 fati olei, iterum premito, erit-
 que secundarium oleum: Quod
 si tertias vsq;, quartāsve perfu-
 siones infundēs exprimere vo-
 les, secundarium fiet, tertiarium,
 & quartarium vnguētum. Sed
 quoties id feceris, vasa melle
 oblini debent. Si verò secundā
 infusionem instituere libet, in
 expressum oleum, numero pa-
 ri recētes rosas, nullo humore
 imbutas inijcito: manib⁹ melle
 premadefactis, agitās p̄mito: &
 iterum, tertio aut quarto simili
 modo exprimēs facito, totiesq;
 recētes rosas detractis vnguib⁹
 immituto

DIOSCORIDIS

immittito : fiet enim ita oleum multò validius: nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Presum melle perúgatur, oleum à succo diligenter fecerni oportet: nam si minimnm quid relinquatur, vnguentum corrumpet. Alij autem detractis vnguibus, rosas tantum oleo macerant in sole hoc modo: Rosæ quæ selibram pondere æquant in sextario olei diebus octo madesunt, & vsque tertiam perfusionem quadraginta diebus insolantur, & sic oleum reconditur. Alij calamo, aut aspalatho prius olei spissamenta faciūt. Alij coloris causa anchusam admiscunt, & falem, quò minus oleat. Vim astringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplasmatibus vtile. Potú soluit aluum, stomachi ardorem restringit, vlcera caua replet & mulcet, quæ cacoëthe vocantur: vlceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perfunditur, detes inter initia doloris collui pdest, ad genarum duritias illitū efficax est, ad lacescita interanea & concitatas vulnas vtilissimè subiicitur.

Elatinū.

πρὸς βαλε ρόδα, διωαμικῶτερον γὰρ γίνεται· ἄρχει δὲ ἐβδόμης ἐμβρεχῆς, ἐπιδέχεται τὸ ἐλαιον* τὴν ἐμβολὴν τῶν ρόδων, ἔπειτα δὲ οὐκέτι. κεχρίσθω δὲ καὶ ἡλιωδὸς μέλιτι, δεῖ δὲ ἐπιμελῶς τὸ ἐλαιον τῇ χυλοῦ χωρίζειν· ἀπολιφθὲν γὰρ τοῦλάχιστον, τὸ μύρον φθείρει. ἔνιοι δὲ αὐτὰ μύρα τὰ ρόδα οὐχ ὀύσαντες καὶ ἡλιάσαντες, ἐναποβρέχουσι τῷ ἐλαίῳ ἔχοντα σαθρὸν οὐγγίαν 10 ε'. εἰς μίαν ξέσω ἐλαίου, καὶ ἀλλάσσοντες, ἡμέρας ἢ καὶ ἡλιάζοντες ἐπὶ ἡμέρας μ'. ἄρχει τῆς ἐμβρεχῆς, οὕτως ἀποτίθενται. ἔνιοι δὲ πρὸς σύφοισι τὸ ἐλαιον, καὶ αμρον καὶ ἀσπάλαντον ἐμβάλλουσιν· οἱ δὲ, καὶ ἀγχοῦσαν 15 ἐνέκην ἐν χροίας, καὶ ἄλλας πρὸς τὸ μὴ φθείρεσθαι. διωαμικῶς δὲ ἔχει συπληκῶς, φυκτικῶς, οὐδέποτε εἰς ἐμβρέγματα καὶ καταπλασμάτων μίξεις· λυεῖ δὲ καὶ 20 κοιλίαν ποτιζόμενον, καὶ καῦσον σβέννυσσι σωμαίου. ἐστὶ δὲ καὶ θρεπτικὸν κοιλῶν ἐλκῶν, καὶ τῶν κακοήθων περὶ σπληνικόν, ἀχάρον καὶ ἐκζέματων ἐπάλειμμα. καὶ κεφαλαλγίας ἐμβρέγμα· ἐν ἀρχῇ 25 ὁδοντολγίας διὰ κλυσμα· περὶ δὲ καὶ πρὸς βλέφαρα ἐσκληρυμμένα ἐγχερίσμενον, πρὸς τε ἐντέρων ἐρεθισμοὺς καὶ ὑστέρας ἐγκλυζόμενον χρήσιμον.

Πρὸς

Πρὶ Ἐλατίνης σκευασίας. Κεφ. γέ.

Ελάτῳ θλάσῃ καὶ διακί-
σας, ἐμβάλε εἰς λουτῆρα καὶ ἐ-
πίχρῃ ὀμφάκινον ἔλαιον ἐπὶ ἡμέ-
ρας γ'. ἀνελόμενός τε εἰς σπυρί-
δα ἐξίπνυ. ἔσω δὲ ἐκάτερα ἰσό-
σταθμα, εἴτα ἀποδέμενός ἐν χει-
δαρῷ ἀγγεῖω, χροῖ. Διῶαμιν δὲ
ἔχει ἀναλογῶσαν τῷ ῥοδίῳ, κοι-
λίαν δὲ ἐμαλάσσει.

Πρὶ μύλινης σκευασίας. Κεφ. γς'.

10 Ἐλαιον μύλινον σκευάζει τὸν
σπόπον τὸν ἑλαῖον ἕξας ε'. ὕδα-
τος ἕξας ι'. μύξας, περὶ σέμβαλε
λαπάθης τεθλασμένης οὐγγίας
γ'. ὄρνυ οὐγγίαν α'. καὶ ἑάσας ἡμέ-
ραν μίαν, ἐψέσον, εἴτα ἀπὸ θήσας
15 τὸ ἔλαιον, βάλε εἰς ἀγγεῖον παλα-
τύρομον, ἐπιθεῖς τε εὐπον ἐν χει-
λάμου, ἢ φοῖαδον* ἀραιάν, ἄνω-
θεν τε ἐπιθεῖς κυδωνία μύλα καὶ
περικαλύνσας ἱματίοις, ἑάσον ἡ-
μέρας ἑκατὰς ἕως ἂν ἐπισπάσῃ-
20 ται τὸ ἀπὸ τῶ μύλων διῶαμιν τὸ
ἔλαιον, ἐνιοὶ δὲ τὰ μύλα περικαλύν-
οντες ἱματίοις ἐπὶ ἡμέρας ἑκα-
τὰς καὶ μὴ διαπνέειν ἢ ἐναι-
δίαι, μετὰ ταῦτα ἀποβρέχουσι τῷ
ἑλαίῳ ἡμέρας β' καὶ νύκτας. εἴτα
25 ἐξέπιώσαντες ἀποτίθεν. Διῶα-
μιν δὲ ἔχει σπυρίκιν, ψυκτικὴν
ποιεῖν πρὸς τὰ ψωρῶδη ἔλκη καὶ
σπίτυρα, χύμειλα, ἔρπητας, καὶ πρὸς
τὰς ἐν ὕστερα ἐλκώσεσι ἐγχυμα-
τιζόμενον, οὐ γὰρ τε ἡρετισμένηα
τέλλει

Elatinum. Cap. LV.

Fracta elate tusa & scarifica-
ta, in labellū deiicitur: ompha-
cinū oleum triduo infunditur,
mox per sportulā exprimitur:
verū pares esse debēt vtriuf-
que portiones, dein mūdo va-
le ad vñsus reconditur. Viribus
rosaceo pportione respōdet:
aliū tamen non mollit.

Melinum. Cap. LVI.

Melinum hoc modo tēpe-
ratur: Olei congius decē aquæ
sextariis admiscetur. Adiicitur
elata palmarum fractæ qua-
drans, & iunci odorati vñcia:
quæ die vno macerata coquū-
tur, mox in vas oris patuli oleū
excolatur, & indita arundina-
cea crate, aut vetusta tegete,
cotonea mala superponuntur,
& vestimētis operta tantisper
inibi residēt, dum malorū vi-
res ad se oleum alliciat. Aliqui
cotonea, decem dierum spa-
tio operimentis inuoluunt, vt
contineat odoris suauitas, nec
evanescat: postea biduo mace-
rata oleo exprimūtur, oleumq;
recōditur. Id vim refrigerato-
riam & astringentē habet. Cō-
tra scabiosa vlcera & quæ ser-
punt, ac furfures, perniūculōs-
que effectū prębet: exulceratis
vuluis infunditur, citatā vrinā
sistit

DIOSCORIDIS

fistit infusum, sudores cohibet, contra cantharidas, bu-
prestim, pinorum erucas, bi-
bitur. Laudatur maximè quod
cotonea mala olet.

OEnanthini compositio.

Cap. LVII.

OEnanthe è labrusca, opti-
mè olens postquam emarctuit,
deiecta in omphacinū oleum
mouetur, voluiturque: & cum
biduo manserit, exprimitur, &
reconditur. Astringit, proxi-
mum rosaceo effectum præ-
bens: sed alium non resoluit,
aut mollit. Probatissimum est,
quod odore cœnāthen refert.

Telini componendi ra-

tio. Cap. LVIII.

Fœnigræci libræ quinque,
calami libra vna, cypiri libræ
duæ, olei libris nouem, septe-
nis diebus macerantur, quo-
tidie ter mouetur, postea pre-
muntur, & reponuntur. Aliqui
pro calamo cardamomū sub-
stituūt, & cypiri loco xylobal-
samum macerāt. Alij oleo an-
tea his odoribus spissato fœ-
nigræcum macerantes expri-
munt. Hoc telinum abscessus
emollit, & concoquit, omni-
bus vuluarum duritiis magno-
pere cōuenit, fœminis difficilè
pariētibus subiicit, vbi præ ex-
cretis

ἐλλει ἐγκλυζόμενον, καὶ ἰδρωτὰς
ἐφίσησι, πίνεται δὲ καὶ πρὸς κα-
θαρίδας, βουπρήσεις, * πιτυο-
καμπήλω. ἔστι δ' αὐτῆς δοκιμονὸν τὸ
κυδωνίων ὄζον μύλον.

Πρὶ Οἰγανθίνης σκευα-

σίας. Κεφ. νζ'.

Οἰγανθίνῳ τὴν ἐν σαφυλῆς
ἐνώδη μαράνας, βάλε εἰς ὀμφά-
κινον ἔλαιον, καὶ κίνει μεταστέ-
φον, ἑάσας ἢ ἡμέρας δύο, ἐξίπνε,
καὶ ἀποτίθρεσθ. Διῶαμην δὲ ἔχει
συπληκὴν, ἀναλοζεύσαν τῇ τῆς ῥο-
δίνης ἐκ τὸς τῆς τὴν κοιλίαν λύειν
καὶ μαλαάσκειν. καὶ τέττε δὲ ὅστι
δοκιμώτατον, τὸ ἐμφαίνον ἐν τῇ
ὁσμῇ τὴν οἰγανθίνῳ.

Περὶ Τηλίνης σκευασίας.

Κεφ. νθ'.

Τήλεως λίβας ε'. ἐλαίῳ λίβας
θ'. καλὰ μιν λίβαν ἀ. κυπεύρε λί-
τρας β'. ἀπὸ βρεχέ τῷ ἐλαίῳ ἐπὶ
ἡμέρας ζ'. κινῶν ἐκάστης ἡμέρας
τεῖς· εἴτα ἐξίπνου καὶ ἀποτίθρεσθ. καὶ
οἱ δὲ, ἀντὶ μὲν καλὰ μου καρδία-
μων, ἀντὶ δὲ τῆς κυπεύρε, ξυ-
λοβάλλα μιν σίωα περέχσαν. οἱ
δὲ, πρὸς ὅφρα τὸ ἔλαιον τούτοις,
καὶ μετὰ ταῦτα τὴν τήλην ἀπο-
βρέχοντες ἐξίπνουσι. Διῶαμην καὶ
δὲ ἔχει μαλακτικὴν ἀποσημά-
των, πεπληκὴν. μάλιστα δὲ ἀρμό-
ζει τοῖς πρὸς μῆτραν πάσι σκλη-
ρώμασι. δυσκολεύσας τὴν ἐγχυ-
ματίζεσθαι ἐπειδὴ κατὰ τὴν
ταῖς πρὸς

τὰ δὲ τῶν τόποις γίνονται, πρὸς
 εκκρίσεων τῶν ὑγρῶν, πρὸς τε
 τὰς ἐν* δακτυλῷ φλεβμονὰς, καὶ
 ἐγκλύζεται ἐπὶ τῶν τεινεσμῶν
 ἀφελίμως, πῖτυξαι τε καὶ ἁλῶ-
 ς εἰς σμήχει, καὶ πρὸς κατακλύ-
 ματα καὶ χύματα ποιεῖ μετὰ κη-
 ρῶ, σμήχει τε ἐφιδίδας· καὶ
 εἰς σιελώματα μύρνται. ἐκλέ-
 γου δὲ τὸ πρὸσφατον καὶ μὴ λίαν
 παρεμφερὲς τῷ τῆς τήλεως ὁ-
 10 σμῶ, σμῆχον τὰς χεῖρας. γλυ-
 κύπικρον ἐν τῇ γλύσει, τὸ γὰρ πύ-
 οῦπν κάλλιστον.

Πρὶ Σαμψυχίνης σκευα-
 σίας. Κεφ. ιθ'.

Ερπύλας, χαοτίας, ἀβροτόνης, σι-
 15 συμβρίας αἰθούρας, μυρσίνης, πετά-
 κων σαμψύχης, ἐλάσης λαμβάνων
 στοχασμῶ, πρὸς τῷ ἐλάσει αὐτῶν
 δυνάμιν ἀποβλέπων, κόπτει ἐν
 τῷ αὐτῷ πατά, καὶ ἐπὶ χειρὶ ἐλαίου
 ὀμφακίνης ποσῶτον, ὥς τε μὴ κα-
 20 τακράτῃσιν τὴ δυνάμιν τὴ ἐν αὐ-
 τῷ βρεχρῶδυν, καὶ ἑασον ἡμέρας
 τέτταρας καὶ ἐκθλίβει, καὶ πάλιν τὸ
 αὐτὸ πλῆθος τὴ αὐτῶν πρὸσφά-
 των, ἀπὸ βρεχρῆ τὴ ἴσον χρονον, καὶ
 ἐξίπνεσται γὰρ ἐντονώτερον. ἐκλέ-
 25 γου δὲ τὸ μέλαν χλωρὸν τῇ χροά-
 σάμψυχον, ἐπιπολὺ ὄζον, μετεί-
 ως δρημύ. Δυνάμιν ὅτι ἔχει θερ-
 μαντικὴν, λεπτωτικὴν, δριμύτιαν,
 ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς μύσιν καὶ δια-
 στροφῶν ὑστέρας, ἐμμηνά τε καὶ ἐμ-
 βρυά

cretis humoribus loci ficcita-
 tem cōtraxerunt, sedis inflam-
 mationes lenit, tenesmo subdi-
 tum prodest, vlcera capitis ma-
 nātia surfuresq; expurgat, am-
 bustis, & pernionibus addita
 cera proficit, vitia cutis in facie
 emēdat, pigmētis ad cōcilian-
 dum faciei nitorē inserit. Eligi
 oportet recens, quod nō vhe-
 menter foenigraci odorē prae-
 se ferat, & manus abstergat, sa-
 pore ex dulci in amarū incli-
 nato: tale enī optimū iudicat.

Sampfuchini cōpositio

Cap. LIX.

Serpilli, cassiae, abrotoni, flo-
 rum sisymbrij, frondiū myrti,
 sampfuchi singulae portiones,
 quadā pro viribus ipsorū con-
 iectatione, vnā tundunt, atque
 is omphacini olei modus adij-
 citur, qui madentium vires nō
 euincat: hēc post quadriduum
 exprimūtur. Denuo noua alia,
 simili mēsurā, & equali tēpore
 macerata pmūtur: ita enī vali-
 dius reddi solet. Eligi oportet
 sampfuchū colore ex atro vi-
 ridi, plurimum redolēs, medio-
 criter acrem. Vim habet acrem,
 calfactoriam, extenuātem, ad-
 uersus vuluā praeclusiones cō-
 uersionesque efficax est, mēses
 & secundas & partus extrahit,
 d vuluā

DIOSCORIDIS

vulvæ strangulatus recreat, huiusmodi inguinumque dolores lenit : sed cum melle uti eo præstat, quandoquidem vehementi astrictione locos induratur. Lassitudines illitum diffundit, in opisthotomicorum, vulsorumque, cataplasmata utilissimè additur.

Ocimini compositio.

Cap. LX.

Ocimum oleum fit ut cyprinum : Ocimi folia decem librae, unde decem, & besis pondo, die nocturne viginti olei libris macerato, premito,colato : cumque exhaustis quallum, rursus parem olei modum fundito, & exprimito. Vocatur autem id secundarium: nam tertiæ perfusionis non est capax. Deinde recens ocimum æquali pondere, ut in rosaceo diximus, rursus maceratur, & cum tanto temporis spatio maduerit, exprimitur, & oleum recunditur. quod si in animo fuerit ter aut quater madefacere, semper ocimum recens addes. Potest ex omphacino confici: sed illo modo melius.

Idem quod sampsuchinum potest, sed inefficacius.

Abroto-

βρωα ἐπισπῶν, καὶ πνίγας ὑπὲρ καὶ ἀγκυλῶν ὀσφύων τε καὶ βαλῶνων ἀλγύματα παρῶναι, συν μάλιστα δὲ αὐτῷ χυλῷ βέλπιον, ἐπειδὴ τῇ σφοδρῇ συψεί σκληρυῖ τὰς πόπας, λύνει καὶ κύπας συγχυόμενον, εἰς τε τὰ ἐπὶ τῷ ὀπίσθιον καὶ καταπλάσματα, ὅππῃ θείως μύρνῃ, καὶ τῷ ἄλλως σωματῶν.

Πρὶν ὠκίμινου σκευασίας. Κεφ. ξ.

Λαβὼν ἐλαίου λίτρας κ'. ὅτε καμῶν σαδμῶν λίτρας ια'. οὐγγίαις η'. ἀποφυλλίσας, ἀπὸ βρεχυνύκτα καὶ ἡμέραν ἐν τῷ ἐλαίῳ, εἴτα ἐξίπου καὶ ἀποτίθης· ἐκκενώσας δὲ τὰ ἀπὸ τῆς κυρπίδος, ἐπιχει πάλιν τὸ ἴσον πάλιν τῷ ἐλαίῳ καὶ ἐξίπου. καλεῖται δὲ τὸ δευτερεῖον· τρίτῳ γὰρ οὐκ ἐπιδέχεται βρεχυνύ. εἴτα παρῶσφαιον ὠκίμον λαβὼν ἴσον, πάλιν ἀπὸ βρεχυνύ ὡς ἐπὶ τῷ ῥοδίνῳ εἴρηται, τὸ δὲ ἥδη ἀπὸ βρεχυνύ ὅππῃ ἐπὶ χέων καὶ ἔων πὺν αὐτὸν χυλόν, ἐκδιδῶ καὶ ἀποτίθης. καὶ τρίς δὲ ἢ τετράκις θείης, ἀπὸ βρεχυνύ, παρῶσφαιον αἰὲν ὠκίμον ἐμβάλλων. διδάται δὲ καὶ ἐν τοῦ ὀμφακίνου σκευάζεσθαι· βέλπιον δὲ ἐκείνως. διδάται δὲ τὰ αὐτὰ τῷ σάμψυχνῳ ἐλαττον ἐν μύρνῃ.

Πρὶν

Πρὶς Ἀβροτονίνου σκευά-
σις. Κεφ. ξα΄.

Ἀβροτονίνον ἐκ τῆς εἰς τὸ κύ-
πριον ἡρώμαλισμέας ἐλάνης λίτρας
θ'. οὐγγίας ε'. ἄβροτίνης φύλλον λί-
τρας η'. ἐμβαλὼν καὶ ἀποβρέξας,
νύκτα καὶ ἡμέραν ἐξίπου. πολυ-
χρόνιον δ' εἰ βέλῃ ποιῆσαι, ἐμβα-
λὼν τὰ πρῶτα φύλλα, ἐμβαλεῖ
ἕτερα φύλλα, καὶ ἀποβρέχων
ἐκ πίεζε. Δυνάμειν δὲ ἔχει δρε-
ματικὴν, ποιοῦσαν πρὸς τὰς ἐν
ὑστέρας μύσεις καὶ σκληρίας, ἄρον
ἐμύμια καὶ δεύτερα.

Πρὶς Ἀνήθινου σκευά-
σις. Κεφ. ξβ΄.

Ελαίου λίτρας η'. οὐγγίας θ'.
ἀνήθου ἀνδρῶς λίτρας ια'. οὐγγίας
η'. ἐναπόβρεχε τῷ ελαίῳ ἡμέ-
ραν α'. εἶτα ἐκπίεζε ταῖς χερσὶ
καὶ ἀποτίδεσο. ἐὰν δὲ δέλῃς διὰ
βροχὸν ποιῆσαι, πρῶτον ἀνήθου
ἀνδρῶς ὡσαύτως ἀποβρέχε. δύ-
ναται δὲ μαλάσσειν τὰ περὶ μύ-
την καὶ ἀγασμοῦ, ἀρμόζον
πρὸς τὰ περὶ διὰ ῥίγη θερμαῖ-
νον καὶ κόποις λυόν, καὶ ἀκμήμα-
τα ἀρδρῶν ὠφελού.

Περὶ Σουσίνου σκευά-
σις. Κεφ. ξγ΄.

Τὸ δὲ σουσίνον, ὃ ἐννοί-
ασι καλοῦσιν, οὕτω σκευ-
άζεται. ἐλαίου λίτρας θ'. οὐγ-
γίας ε'. χαλάμου λίτρας ε'. οὐγ-
γίας γ'. σμύρνης οὐγγίας ε'.
φουράσις

Abrotonini compositio.

Cap. LXI.

Olei cyprini odoribus im-
buti libris notem & quincun-
ce, foliorum abrotomi libras
octo die noctūque mades-
ctas, premito. Quod si in lon-
gum tempus oleum velis as-
feruari, eiectis prioribus foliis
nova appones, & macerata
exprimes. Calfacit, ad vuluæ
duritias præclusionesque effi-
cax est, menstrua & secundas
pellit.

Anethini compositio.

Cap. LXII.

Olei libris octo & dodrate,
florū anethi libras vndecim &
besslem, maceratas in oleo die
vna, manibus premito & reco-
dito. Quod si iterū perfundere
velis, recētes anethi flores cōs-
militer madesfacito. Vulvarum
duritias emollit, venarū spiracu-
la laxat, cōtra horrores febriū
circuitū redeūtes auxiliat: calfa-
cit enī, & lassitudines discutit:
prodest articulorū doloribus.

Susinum.

Cap. LXIII.

Susinum, quod alij liliū
appellant, sic temperatur: Olei
libræ nouem cum quincunce,
calami libræ quinque & qua-
drans, myrrhæ vnciæ quinque,
d ij permixto

DIOSCORIDIS

permixto odorifero vino decoquuntur & colato oleo, cardamomi tusi & cœlesti aqua madefacti libræ tres, & semis macerantur, premunturque, tres libræ cum semisse spissati olei assumuntur, mille lilia decerptis foliis, in latum, non tamè profundum, labellum demittuntur: iniectum oleum, manibus melle peructis agitur: die noctuque conquiescunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleum, protinus ab aqua, quæ simul expressa fuerat, colo icerni oportet: (nō enim, ut rosaceum, moram tolerat: nam concalfactum feruet & cōputrescit: quare sæpius decapulandum) vasa melle illinenda tenuis sal inspargendus, & si qua sordes vasis faucibus hæsit, eximenda. Odoramentis iam expressis ex quasillo in labellum transfusis, rursus olei prius odoribus imbuendi, quod primum pondus æquet, & cardamomi tusi drachmæ decem coniunguntur. Hæc manibus scitè pressa interiecta breui mora exprimuntur: quod profluit, repurgatur. Tertio eadē infunduntur, adiecto cardamomo, & sale, & manibus melle madefactis.

Longè

φουράσας οἶνω ἐνὶ ὡδεῖ, εἴτα ἀποκηθήσας τὸ ἐλαιον, ἀπὸ χειρὸς καρδαμώμης κεκομμένῃ καὶ βεβρεγμένην ὕδατι ὁμβρίῳ λίβας γ' ἐλίβας δ' ἢ ἐλάσας βραχυλῶς, ἀποθλίβει καὶ λαβὼν ἐν τῷ ἐστυμένῳ ἐλαίῳ τετίς καὶ ἡμισυ λίβας, κρίνα ἀφ' ἰδιῶν χίλια, ἀποφύλλισας, δις ἐν λυθῇι πλατῇ εἰ μὴ βαθεῖ ὅπως χέας τὸ ἐλαιον, ἀνακίνει ταῖς χροῖς μέλιτι κεχρισμένῃς ἐλάσας δὲ ἡμέραν μίαν καὶ νύκτα, πορὶ 10 ἐνελομήνους εἰς πυξίδα ἐξίπτε, τὸ δὲ φρόνηρον ἀπὸ δεξιῆς ἀπὸ τοῦ συνεκθλιβέντος ὕδατος τῷ ἐλαίῳ ὃ γὰρ ὑπομύρει ὡς τὸ ῥόδι νον, συνδεσμαινόμενον δὲ ἀναζεῖ καὶ σὺπερ, μετὰ γίγει δὲ πολλὰ 15 κίς εἰς ἔτερος ἀγγεῖα μέλιτι κατακεχρισμένα πορὶ πάσων ἀλλὰ λεπτόν, καὶ τὴν συλλεχόμενῳ ἀκαθάρσιαν ὀπιμελῶς ἀφαιρῶν, μελ' ἀκαθάσας ἢ ἐν τῇ κυβίδι τὸ ἐξίπτε δὲν ἄρωμα εἰς τὴν λυθῇα, 20 πάλιν ὀπίχει τὸ ἡρώματισμένου ἐλαίου τὸ ἴσον πληθὺς τῷ πορτέρω, καὶ καρδαμώμου κεκομμένου συνέμβαιλε ὀληθὲς ἰ. καὶ ἀνακαίνισας χησόμεως ταῖς χροῖς, καὶ ὀπταρὸν μικρὸν, ἐξίπτου, τὸ ἀπορρέον ἀποκαθαίρων. καὶ τρίτον ἐπιχέας πάλιν τὸ αὐτὸ ποίη, πορὶ 25 ἐπεμβάλλον καὶ τὸ καρδάμωμον καὶ τοὺς ἄλλας ὁμοίως, καὶ ταῖς χροῖς βρέχων τῷ μέλιτι θλίβων. καὶ

καὶ ἔσαι τὸ μὲν πρῶτον ἐκπεδῶν
 ἄριστον ἐχρόμῳρον ὃ τὸ ἐξῆς· τείτον
 ὃ τὸ τελευταῖον· καὶ πάλιν λαβὼν
 κρίνα κρίνα καὶ ἀποφυλλίσας διὰ
 5 τῆς καὶ ἐπιχέας τὸ πρῶτον ἐξίπω
 καὶ μὲθόθεν, τὰ αὐτὰ ποιῶν ὥς
 πρὸς ἐπίσης ἐπὶ τῷ πρῶτῳ, καρδά-
 μωμον παραμύσων, εἴτα ἐξίπων,
 ποίῃ τὰ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῷ δευτέρῳ
 καὶ τείτε ὥς εἴρη·). πρὸς μεβάλ-
 λων καὶ τὸ καρδάμωμον· εἴτα ἐξί-
 10 πω καὶ ποίῃ τὰ αὐτὰ, ὅσακις δ' ἂν
 ἀποβρέξῃς νεαρά κρίνα διωαμι-
 κώτερον ἐξέεις τὸ μύρον. ἐπὶ τέλει
 ὃ ὅταν αὐτὰ ῥῆκος ἔχῃν σοι δοκῇ,
 μίσγε ἐκάστη σκευασία σμύρνης
 15 χρυσῆς < ὀβ'. χρόκι < ἰ. καρ-
 δαμώμω < ὀβ'. οἱ δὲ χρόκι καὶ κιν-
 ναμώμω τὸ ἴσον κόψας ἐμβαλε
 εἰς τὴν λετήρα μὲν ὕδατος, καὶ ἐπι-
 χρεῖ τὸ πρῶτον ἐκπεδῶν μύρον·
 εἴτα ἐάσας μικρὸν, ἀναλαμβάνει
 εἰς ἄλγεια μικρὰ ξυρὰ πρὸς κεκλυ-
 20 σμένα κόμμι ἢ σμύρνην, καὶ χρόκι
 καὶ μέλιτι μὲν ὕδατος διερμύροις.
 τὰ δ' αὐτὰ ποίῃ καὶ ἐπὶ τῷ δευτέ-
 ρῳ ἐκπέσματος καὶ ἐπὶ τῷ τρίτῳ.
 ἔνιοι δὲ τὸ ἀπλοῦν ἐξ ἐλαίᾳ βα-
 λανίνης καὶ κρίνης ἢ ἄλλης ἐλαίᾳ σκευ-
 25 ἄζωσι. δοκεῖ ὃ διαφέρειν τὸ ἐν φοι-
 νίκη, καὶ ἐν αἰγυπῷ γινόμενον. ἄρι-
 στον δὲ αὐτῶ τὸ ὅζον κρίνον. Διῶα-
 μιν δὲ ἔχει δερματικὴν, μακα-
 κτικὴν, ἀναστομωτικὴν, τῶν περὶ
 μήτρας μύσεων καὶ φλεγμονῶν.

καὶ

Longè optimū erit, quod prius
 exprimitur: secundum quod se-
 quitur: tertium locum sibi ven-
 dicat, quod nouissimum pro-
 dit. Denuo in mille lilia euulsis
 foliis expressum primo oleum
 infunditur: tum eadem ratio-
 ne proseguendum, idemq; fa-
 ciendum, vt prius, addito carda-
 momo, dein expresso: & quò
 frequentius recentia lilia ma-
 ceraueris, eò validius vnguen-
 tum efficies. Denique cū factū
 abundè videbitur, singulis cō-
 positionibus miscere conuenit
 myrrhæ q̄ optimæ duas & se-
 ptuaginta drachmas, & croci
 decem, cardamomi quinq;, &
 septuaginta: croci verò & cin-
 namomi pares portiones tun-
 duntur, & cribrate in lutrā cū
 aqua demittūtur, expressumq;
 primò vnguentum infunditur,
 & paulò post excipiūtur vascu-
 lis siccis, myrrhā aut gūmi an-
 teā perfusis, & croco, melle &
 aqua madefactis. Eadē fiunt in
 altera aut tertia expressione.
 Aliqui simplex ex balanino, a-
 liòve oleo, & liliis componūt.
 Optimū esse cōstat in Phoeni-
 ce, mox Ægypto factū. Sed cū
 primis laudat, qđ lilia redolet.
 Excalfacit, emollit, vuluæ præ-
 clusiones, et collectiōes aperit.

d iij vtilissi-

DIOSCORIDIS

utilissimū ad muliebria mala: ulcera in capite manātia, feruidas eruptiōes, varos, furfurēsque emēdat: vibices cicatricēsque celerrimē ad colorē reducit, ita ut sæpe fallāt. In summa extenuat, potū bilē per aluū extrahit, urinam ciet: sed stomacho alienum est, & nauseam parit.

Narcissinum.

Cap. LXIII.

Narcissini olei spissamenta ita fiūt: Sex librę aspalathi cum sextate tūdunt, olei eloti librę septuaginta cū vnciis quinque assumūtur. Aspalath⁹ aqua madefact⁹ in tertia olei parte coquit: quo exēpto, calam⁹ quinque libris, & besse adiicitur, cū myrrhæ gleba cōtundit, cribrataque ac vino veteri odorato immitta, decoquitur: simul ac autem cū ijs efferbuerit, eximit: refrigeratū oleū excolatur, cuius portio in labellū mittitur, flores narcissi quāplurimi cōijciūtur: qui bidui spatio (ut in fusino dictū est) permoti expriunt. Oleū subinde decapulādum, siquidē celerrimē putredinem sentit. Valet hoc ad emolliendas vuluæ duritias, ꝑclusiōnēsque: sed capitis dolores facit.

Crocinum. Cap. LXV.

Cū crocinū cōponere voles, prius

καὶ καὶ δόλυ πάντων ἐστὶ χροσμοτατον πρὸς τὰ γυναικεία ἀρμόζει δὲ καὶ πρὸς αἰσώρας, ἰόνδοις, πύτυρα: ἐκζέματα, μώλων πάς τὴν χροσ μελαβάλλει καὶ ὁμοχρως πειεῖ. καὶ καὶ δόλυ ἐστὶν ἀφαιωτικόν, ἀλλ' ὅτι καὶ χολὴν καὶ κοιλίαν πνόμενον: κινεῖ δὲ καὶ ἔρσην. ἐστὶ δὲ καὶ κακοδόμαχον, καὶ ναυτίας ποιητικόν.

Πρὶ Ναρκισσίνου σκευασίας. Κεφ. ξδ'.

Ελασιν ναρκισσίνον σύφεται ἰοσώτας· ἐλαίου πεπλυμφοῦ λίτραις ὁ οὐγγίαις εἰ. ἀσπαλάδου λίτραις εἰ. οὐγγίαις β'. κόψας καὶ βρέξας ὕδατι, τῷ τεύχε τῷ ἐλαίου μίξας, ἔψε. εἴτα ἐξελὼν τὸν ἀσπαλάδον καλάρμου βάλε ἰς λίτραις εἰ. οὐγγίαις η'. καὶ σμύρνης χόνδρον κόψας καὶ σίτας, φέρεσθαι οἶνω παλαιῷ ἐνώσει, καὶ μίξας ἔψε. ὅταν δὲ καὶ μετὰ τούτων ἀναζέσῃ, ἐξελὼν ἀπείδει τὸ ἐλαίον ἡνῆρ. εἴτα λαβὼν ἐκ τῷ ἐλαίου εἰς λουτήρα, ἀπὸ χει, καὶ τοῦ ναρκισσοῦ ὡς ὅτι πλείστον ἔμβαλε τὸ ἄνθος, ἐπὶ ἡμέρας β'. κινῶν. ὡς ἐπὶ τῷ σουσίμου, ἐξίπου τὴν καὶ μετὰ γινεῖ πικρῶς, καὶ γὰρ τῷ σήπεται. ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ ἐν ὕσέρε. μαλ' αὖτος τὰς πρὸς αὐτῷ σκληρίας καὶ μύσεις· ἐστὶ δὲ κεφαλαιόγος.

Πρὶ χροκίνου σκευασίας. Κεφ. ξε.

Κρόκινον δὲ σκευάζων, πρὸς ὕλη

5 ἄλς ἰδ' ἐλαϊον ὡς εἴρη) ἐπὶ τ' οὐσί
 νης, πλὴν δὲ καὶ συσταθῆναι τῇ αὐτῇ
 λαβὼν ὃ ἐκ τ' ἐσυμμένε εὐλαίε εἰς
 τὸ σέσινον λίβας βεῖς ἡμισυ βάλει
 κρόκος < ἢ καὶ ἀνακίνη πολλάκις
 10 τ' ἡμέρας, ποιῶν τ' το συνεχῶς ἐπὶ
 ἡμέρας ἐ. τῇ ὃ ἐκλῆ ἀπὸ χει τὸ ἐ-
 λαϊον ἀπὸ τ' κρόκος καθαιεώς, ἰδῶ
 δ' αὐτῷ κρόκῳ ἐπὶ χυτὸ ἴσον πλῆ-
 15 ρος τῶ εὐλαίε καὶ ἀνακίνη ἡμέρας
 ἰδ'. εἰς αὐτὸ ἀποχέας τὸ ὀσμύζον σμύρ-
 νης κεκομμένης καὶ σεσησμένης <
 μί καὶ κίνη ἐν ὀλμῳ χρυσίμῳ, εἰ-
 20 πα ἀπὸ θυσ. ἐνιοὶ δὲ τὸ ἴσον εἰς κύ-
 τωρον ἡρωματισμένε εὐλαίε καὶ εἰς
 τὸ κρόκινον χεῶνται. ἔστι δ' αὐτῶ
 κρόκινον, τὸ κατὰ κράτος κρόκος πνέ-
 25 ον, ὅπως εἰς τ' ἰατρικὴν χρῆσιν ἀρμό-
 ζει, δευτέρον δ' τὸ ἰὴ σμύρνη παρε-
 μφέρον. Διωάμιν δ' ἔχει θρῆμαντι-
 κὴν, ὑπνωτικὴν, ὅθεν πλάττει ἐπὶ
 φρενιτικῶν ἀρμόζει καὶ αἰσχρομέ-
 30 νον, ἢ ἀποσφραγίζον, ἢ καὶ κατ'
 μωξίῃ ἥσαν διαχρυσίμενον ἔστι δ' καὶ
 πυσσοπλόν, καὶ καθαρκτικὸν ἐλκῶν, καὶ
 35 πρὸς ἰατρὴν ἐν μήτρᾳ σκληρίας καὶ μύ-
 σης καὶ τὰ ἐν αὐτῇ κακοήθει, σμύ-
 κινῶ καὶ κρόκῳ καὶ μυελῷ καὶ εὐλαίῳ
 διωλασίονι. συμπτέπει δ' καὶ μα-
 40 λάσσι καὶ ὑγρῶν καὶ τραυῶν ποιεῖ
 καὶ πρὸς ἰατρὴν ἀπολαυνώσας μὲθ' ὑ-
 δαίος ὑπαλκόμενον. ἀναλῶει δ'
 αὐτῷ καὶ τὸ λεβόμενον βετύρνον καὶ
 45 ἐνύχνον, καὶ συράκινον, τοῖς ὀνό-
 μασι μόνος διαφέρων ἰατρῇ μὲν ἰοί-
 σκευασία

prius olei, vt in fusino dixim⁹,
 spissamenta facies, eisdem πο-
 deribus, & mensuris: cuius o-
 lei libras treis & semissem, cro-
 ci vnciam vnā assumes, idē-
 tidem quotidie moueto, & se-
 xta die, quā hoc assiduo p-
 egeris, oleum á croco colis
 incernito, eidem croco pa-
 rem olei modum adiicito, mo-
 ue triduo, dein contusæ myr-
 rhæ atque cribratæ drachmas
 quadraginta permisceto, & in
 pila agitatum recondito. Ali-
 qui oleo aromatibus ad cy-
 prinum imbuto in crocini cō-
 positione vtuntur. Optimum
 est, quod abundè crocum spi-
 rat, in medendi vsu expeti-
 tum. Proximum, quod myr-
 rhā refert. Calfacit, somnum
 allicit, quare persæpe phreni-
 tics subuenit, perfusum, aut
 naribus admotum, aut illitum:
 pus mouet, vlcera purgat, con-
 tra vuluæ duritias atque præ-
 clusiones, & vlcera, quæ ca-
 coëthe vocantur, prodest cum
 croco, cera, medulla, duplicato
 olei pondere. Concoquit enī,
 emollit, humectat, & permul-
 cet: ad oculorū glaucitates ex
 aqua illinitur. Huic autē ppor-
 tionē respōdēt butyrinū, ony-
 chinū & styracinum: quæ etsi

DIOSCORIDIS

nomini- bus distant, viribus & compositione cognata sunt.

Cyprini spissamentum.

Cap. LXVI.

Olei omphacini eloti pars vna, aquæ coelestis tantundem cum semisse, cui⁹ vna parte oleum diluitur, altera adiciēdis odoramentis admiscetur: dein assumptis aspalathi libris quin q;, & semisse, calami libris sex, & semisse, myrrhæ libra vna, cardamomi libris trib⁹, & do- drâte, olei libris nouem, & vnciis quinque. Aspalathus tusus, & aqua affusus decoquitur in oleo donec conferuescat, myrrha autem vino vetere odorifero subacta, contususq; simul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto aspalatho immit- tūtur: & vbi efferbuerint, sub- lato ahenō, oleum percolatur.

Cardamomū tusum reliqua a- qua aspersum infundit, spatha agitat, nulla, dū refrixerit, iter- pellatione. Post hæc collato o- leo, in viginti octo libras olei, floris ligustri, qđ cyprū vocāt, sex & quadraginta libræ cum besse instillant, q̄ sufficiēter ma- defactæ per sportulā exprimū- tur. Quod si copiosi⁹ desidere- tur, idem recentium florū pō- dus iniectū simili modo p̄mat.

&

σκευασία καὶ τῇ δυνάμει ὅγ-
τα παρόμοια.

Πρὶ Κυπρίνης σύψευος καὶ
σκευασίας ἐλαίου. Κεφ. ξς'.

Ελαίου ὀμφακίνου πεπλυ-
μῆον μέρες 4, ὕδατος ὀμβρίου 5
μέρες ας'. τὸ μὲν ὀπίχει τῷ
ἐλαίῳ, τὸ δὲ φύρα σὺν τοῖς ἐμ-
βληθῆσι μύροις ἀρώμασιν· εἴτα
λαβὼν ἀσπλάθου λίτρας 5, ἥμισυ χαλάμου λίτρας 5, ἥμισυ ἰο-
σμύρνης λίτραν 4. καρδαμώμου
λίτρας γ'. οὐγγίαι δ'· καὶ ἐλαίου
λίτρας δ'. οὐγγίαι 4, τὴν ἀσπλά-
θον κόψας καὶ βρέξας ἐν ὕδα-
τι ἐμβολῶν, ἔψα μετὰ τῷ ἐλαίῳ
ἕως ἂν σιναναρίσῃ, τὸ δὲ σιμύρι-
σαν, διεῖς οἶνω παλαιῷ ἐνώσει
τὸν χαλάμον κεκομμένον σὺν
ἀναφύρα μετὰ τῆς σιμύρνης, καὶ
ἐξελὼν τὴν ἀσπλάθον, ἐμβα-
λε τὸ φύραμα τῷ χαλάμῳ· ὁ-
ταν δὲ μετὰ τούτου ζέσῃ, καθε-
λὼν ἀπὸ θήσων τῷ χαλκοῦ τὸ ἐ-
λαιον, καὶ κατὰ χειρὶ κατὰ τῷ καρ-
δαμώμου κεκομμένου καὶ πεφυ-
ραμῆος τῷ λοιπῷ ὕδατι, καὶ κίνη
σπάσῃ, ἕως ἂν ψυχῇ μὴ διαλεί-
πων. εἴλα ἀπὸ θήσας τὸ ἐλαιον, ἐμ-
βαλεῖς εἰς τὰς κη'. τῷ ἐλαίῳ λίβρας 25
ἄσθες κυπεύρε λίβρας μς'. ἰγγίαι
ἢ ἐάσας τὴν ἀποβραχυῶσαι, ἐξίπα-
σον διὰ συρίδος. εἰὰν δὲ πλείω
θέλῃς, τῷ νεαροῦ ἄνδρος τὸ ἴσον.
ἐμβολῶν πλείους ὁμοίως ἐξίπα-
σαι.

ἐάν τε δέδροχον· ἐάν τε τείδροχον
βούλη ποιῇν· διωαμικώτερον γὰρ
γίνεται. ἐκλέγεσθαι δὲ δεῖ τὸ χη-
ρὸν καὶ μετ' ἐνωδίας πλῆκτικόν.
ἐνιοὶ δὲ καὶ κιννάμωμον μίσχου-
σι. Διῶαμιν δὲ ἔχει δερματι-
κῶν, μαλακτικῶν, ἀναισθησι-
κῶν, ἀρμόζουσιν τοῖς πλεῖστοις μύ-
τραι καὶ νύκτα παύσει, καὶ πλε-
υρτικοῖς καὶ κατάρμασι, καὶ ἐ-
καστὸ καὶ κηρωτῇ μινυμένον, μί-
10 γνυται ὃ καὶ μαλάγμασι τοῖς ἀρ-
μόζουσιν, ὀπισθοτονικοῖς σωμα-
χικοῖς, βουβώνων φλεγμονῇ, καὶ
ἐκκόποις.

Περὶ Σπύσματος Ιρίνου.

Κεφ. ξζ'.

15 Σπάθης λίτρας ε'. οὐγγίας
ή. ἐλαίου λίτρας ογ'. οὐγγίας ε.
κόψας ὡς λεπτότατα, μέζον ὕ-
δατος κοτύλας ε. καὶ βαλὼν
ἐς χαλκῶν, ἔφε μέχρις αὐτοῦ
πλὴν ὀσμίνῃ ἀναλάβοι· εἶτα ἀ-
20 πίνει εἰς κρατῆρα μέλιτι κα-
τακεκριμένον· ἐκ τούτου τοῦ
ἡρωματισμένου ἐλαίου, τὸ πρῶ-
τον ἰρίνον σκευάζεται, ἀναπο-
βρεχομένης τῷ ἐσυμμένῳ ἐλαίῳ
ἱρεως ὡς ὑπογέγραπται, ἢ οὐ-
25 τως· ἐλαίου λίτρας δ. οὐγγί-
ας ε. ξυλοβαλσάμου λίτρας ε.
οὐγγίας β. κόψας ὡς εἴρηται,
συνέφε· εἶτα ἐξελὼν τὸ ξυλο-
βάλσαμον, προσέμβαλε κα-
βάμου κεκομμένου λίτρας θ'.
οὐγγίας

& iterū aut tertio si quis velit,
mafacere poterit, & ita red-
detur efficacius. Eligi oportet
bonum, quod cum odoris sua-
uitate nares feriat. Aliqui cin-
namomum addunt. Calfacit,
emollit, ora venarum adape-
rit, vulvæ neruorumque vi-
tiis conuenit, pleuriticis, fra-
ctisq; per se vel cerato im-
mistum: malagmatis imponi so-
let, quæ opisthotonicis, angina
laborantibus, inflammationiq;
inguinum opitulantur: item in
acopa adiicitur.

Irini spissamentum.

Cap. Lxvii.

Spathæ quàm minutissimè
contusæ sex libras cum besse,
in tribus & septuaginta libris,
& quincunce olei, æreo va-
se, additis decem aquæ hemi-
nis incoquito, quoad odorem
acceperit: postea in capulam
melle oblitam colato: ex eo
aromatibus imbuto oleo, iri-
num primò temperatur, irine
ex oleo inspissato macerata,
vt scripsimus. Sed alia est com-
ponendi ratio: In olei septua-
ginta libris & quincunce, xy-
lobalsami (vt dictum est) con-
tusi, libras quinque & sextan-
tem excoquito, postea detra-
cto xylobalsamo nouè libras,
&

DIOSCORIDIS

& dextantem adiicito, & myr-
rhæ glebam vetere vino odo-
rato perfusam, & in olei ita o-
doribus imbuti quatuordecim
libris, totidem tusæ iridis, binis
diebus ac noctibus madefaci-
to, strenuè & vehementer di-
stringito. Quòd si vis validius
fieri, par pondus iterum ac ter-
tio similiter maceratum expri-
mito. Lōgè optimum est quod
solā irin olet, quale est in Per-
ga Pamphiliæ, & Elide Achaia
natum. Vim habet calfacto-
riam atque emolientem, cru-
stas adimit, fordida vlcera &
putrida purgat, confert foe-
minis vuluæ causariis. Item in-
flammationibus eiusdem at-
que præclusionibus, partus e-
iicit, hæmorrhoidas recludit,
contra aurium sonitus ex ace-
to, ruta & amaris nucibus, pro-
dest: diuturnis destillationi-
bus, naribus illitum, & con-
tra graueolentia earum vlce-
ra, quas ozænas vocant, au-
xiliatur: aluum purgat cyathus
epotus, facit ad ilei cruciatus,
vrinam mouet, difficileis vo-
mitiones adiuuat, perūctis eo
digitis & immisis, vel iis quæ
ad vomitum ciendum indun-
tur: anginae etiam illinitur, aut
ex aqua mulsa gargarizatur:

item

οὐγγίας ἰ. σπύργης χόνδρον οἶνω
παλαιῷ ἐμβρέχων ἐνώδει· εἴτα
λαβὼν ἐν τῷ ἐσυμμένῳ ἐλαίου
ἢ ἡρωματισμένου λίτρας ἰδ'. ἐν-
απόβρεχε, ἱερώς κακομένης ἴσον
τῷ σαθμῷ, ἐὼν ἡμέρας β'. καὶ
νύκτας β'. εἴτα ἐξίπτου βιαίως καὶ
νεανικῶς. καὶ εἰ βούλει διυναμι-
κώτερον εἶναι, τὸν ἴσον σαθμὸν
καὶ δις καὶ τρεῖς ὁμοίως ἐναπο-
βρέχων ἐξίπτου. κράππον ὃ ὑπάρ-
χει τὸ ἐν ὀσφρῇσει μηδενὸς ἄλλου, ἰθ
μόνης δὲ τῆς ἱείδος ποιῶν. τοῖς
τον δὲ ὅστι τὸ ἐν πύργῃ τῆς παμ-
φυλίας, καὶ ἐν ἡλιδι τῆς ἀχαιίας
χυνώμῃον. Δυνάμιν ὃ ἔχει μα-
λακτικὴν, δερμαστικὴν, ἐσχάρας
τὲ καὶ σκπεδύνας καὶ ρυπαρίας ἰθ
ἀνακαθαίρει, καὶ ταῖς περὶ μῆ-
τραν διατέσσειν ἀρμόζει, φλεγ-
μοναῖς τε καὶ μύσειν, ἐμβρυά
τε ἐκβάλλει, καὶ αἰμορροΐδας
ἀνὰ σφοδρῶς, πρὸς τε ἡγροῖς ὥτων
συνὸ ὅξει καὶ πηγρῶ καὶ σπικροῖς ἰθ
ἀμυγδαλοῖς, καὶ πρὸς κατάρ-
ροισι χρονίζοντας, διαχρισμύων
τῶν μωξωτήρων, καὶ πρὸς ἐξάι-
νας· καθαίρει δὲ καὶ τὴν κοιλίαν,
κυνάδου πλῆθος ποθέν. ποιεῖ καὶ
πρὸς εἰλεώδη, κνεῖ καὶ οὐρα. 2θ
καὶ ἐπὶ τῶν δυσχερῶς ἐμωύτων,
διαχρισμύων τῶν δακτύλων, ἢ
τῶν ἐμεσθειῶν, καὶ ἐπὶ σωμαγ-
χικῶν διαχρισμύων ἢ ἀναγρ-
χαιζόμενον συνὸ μελιεράτω.

καὶ

ἢ πρὸς τραχύτητα ἀρτηρίας. δίδοται ἢ τοῖς κώνειον ἢ μύκητας ἢ κόρειον πεπωκόσιν.

Περί Γλευκίνου σκευασίας. Κεφ. ξβ.

5 Γλευκίνον δὲ σκευάζεται τὸ ἀπλουῶν, ἕκτε ἐλαίου ὀμφακίνου, ἢ κρίνου, ἢ χαλάμου, ἢ νάρδου καλπικῆς, ἢ σπάθης, ἢ ἀσπαλάθου, ἢ μελιλώτου, καὶ κόσου, ἢ γλεῦκοις συμπιεστέμενων τῶν σεμ-
10 φύλλων τῶν ἔχοντι ἀγρίω τὰ ἀρώματα ἢ τὸν οἶνον, ἢ τὸ ἐλαιον. κινεῖται δὲ ἐπὶ ἡμέρας λ'. δις τῆς ἡμέρας, καὶ μετὰ ταῦτα ἐκπίπτει, ἀπὸ τῆς τοῦ. Δυνάμει δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν,
15 κὴν, ἀντιπικρὴν· ποιεῖται πρὸς τὰ ῥήγια ἢ τὰ νευρικά πάθη, καὶ τὰ ἐν ὑστέροις παθὲς δὲ ἀκόπου μάλ-
λον ὠφελεῖ μαλακτικὸν ὂν.

Περί Αμαρακίνου. Κεφ. ξγ.

Αμαρακίνον δὲ ἐν κυζίκῳ χαλ-
20 λισον γίνεται σκευάζεται δὲ διὰ τὸ ὀμφακίνου ἐλαίου ἢ βελανίνης συφομύων ξυλοβαλσάμῳ, * κρίνω, χαλάμῳ, ἢ θυμοκάρῳ δὲ, ἀμαράκῳ, κόσῳ, ἀμώμῳ, νάρδῳ, καρποβαλσάμῳ καὶ σμύρῃ. οἱ
25 δὲ πολυτελέστερον αὐτὸ ποιοῦντες, μίσχουσι καὶ κινάμωμον. παραλαμβάνεται δὲ μέλι καὶ οἶνος εἰς τὴν τῶν ἀγρίων χυ-
σιν καὶ φύρασιν τῶν κακομένων ἀρωμάτων. ἔστι δὲ θερμαντικὸν, καρ-
καρω-

item cōtra arteriæ scabritiem. datur etiam iis qui cicutâ, coriandrum, aut venena fungorum hauserunt.

Gleucinum. Cap. LXVIII.

Gleucinum absolutè constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, celtica nardo, spatha, aspalatho, fetula campana, costo, & musto: circumdatis interim vineis vasi, quod aromata, vinum & oleum cōceperat. Tricenis diebus, his in die movetur postea expressum oleū reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horribus & nervorum vulnæque vitiis auxiliatur, omni acopo iuuatius: quippe quod emolliat.

Amaracinum.

Cap. LXIX.

Amaracinum longè optimū in Cyzico fieri solet ex omphacino & balanino, spissamentis è xylobalsamo, iunco odorato, & calamo factis, conditisq; amaraci, costi, amomi, nardi, cassiæ, carpobalsami & myrrhæ odorib⁹. Aliqui, quod preciosius fiat, cinnamomum addūt. Mel autem & vinum assumuntur: hoc in vasorum illitione, illud ad cogendas tusorum aromaticum offas. Amaracinū calfacit, sopor-

DIOSCORIDIS

foporem mouet, venarū spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, vrinam cit, putrilaginibus ac fistulis per quā vtile: nec non humentibus herniis, postquam medica manus operam suam impenderit, crustas, & tetra vlcera, quæ theriomata vocant, rumpit: difficili vrinæ, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, vuluæ subditum menstruos cursus euocat, duritias ac vuluæ tumores discutit, vulneratis nervis, & musculis confert, lano centunculo modicè madafactum & impositum.

Megaliniū. Cap. LXX.

Factitabatur olim megaliniū, sed nunc compositio exoleuit & prorsus oblitterata est. Cuius ad historiæ complementū meminisse non fuit alienum. Mistura cum amaracino eadem erat, sed resina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leuiter emollit. Resina vnguentis, neque tutelæ neque voluptatis gratia adiicitur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper coquitur, dum definat olere: cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de resina differemus.

Hedy-

καρωτικόν, ἀνασφωμικόν, μαλακτικόν, πυρωτικόν, οὐρητικόν, ἐνχρηστικόν εἰς τε τὰς σήπας καὶ σύειγας, καὶ ὑδρεκλήλας μετὰ τὰς χειρουργίας περὶ ῥήσσει τε τὰς ἐχάρας καὶ τὰ τεθνηκυῖα ἀλλήλη· πρὸς τε δυσουρίαν ἀρμόζει περιχειρισμοῦ τοῦ δακτύλου· καὶ πρὸς τὰς φλεγμονὰς αὐτοῦ, καὶ πρὸς αἰμορροΐδων ἀνασφωμωσιν περιχειρισμόν· ἐμμηνιά τε κινεῖ πρὸς δέμνον τῇ μήτρᾳ, σκληρίας καὶ οἰδήματα ἐν ὑτέρᾳ διαφορεῖ, καὶ πρὸς τὰ νευρίτωτα καὶ μυώτωτα, συμφέρει ἐν παλινίᾳ ἀραιῶς βρεχόμενον καὶ ἐπιδέμνον.

Περὶ μεγαλείου. Κεφ. δ.

Τὸ δὲ μεγαλεῖον καλούμενον, πάσαι μὲν ποτε ἐσκευάζετο, ἐκλέλοιπε δὲ νῦν. πρὸς ἐκπλήρωσιν δὲ τῆς ἰσοείας, οὐκ ἔστιν ἄτοπον ἐπιμνησθῆναι. καὶ τοῦτου δὲ σκευασία ἡ αὐτὴ τῷ ἀμαρᾶκινῳ, πλεονάζει δὲ τῇ ῥητίνῃ, καὶ ταύτῃ διαφέρει. ἔστι δὲ μαλακτικόν ἡπίως. ἡ μὲν τοῖς ῥητίνῃ μίγνυται τοῖς μύρεσι, οὗτε θυμακῆς οὗτε ἡδονῆς χάριν, χρώματος δὲ καὶ πάχους ἕνεκα μίγνυται δὲ ἡ τερεβινθίνη ἀποφορμῇ, ἧς αὖ ἄοσμος γίνυται. δηλωθήσεται δὲ ἐν τοῖς περὶ ῥητίνης ἡ ἐφεύς αὐτῆς.

Περὶ Ἡδύ-

Περὶ Ἡδύχρου. Κεφ. οά.

Καὶ τὸ καλέμυρον δὲ ἡδύχρον,
σκευαζόμενον ὅθεν καὶ τῆς αὐτῆς.
ἔχεται θυάμεως τε καὶ σκευασί-
ας τῷ ἀμαρακίνῳ, ἐνωδύσειεν
5 δὲ πυγχαίνει.

Περὶ Μετωπίου. Κεφ. οβ'.

Σκευάζεται δὲ καὶ ἐν αἰγύπτῳ
μύρεν, ὅπως χερίως ὑπ' αὐτῶν κα-
λούμενον μετώπον, διὰ τὴν τῆς
χαλδαίης μίξιν· τὸ γὰρ ξύλον ἐξ
10 οὗ ἡνῶται ἡ χαλδαίη, μετώ-
πον καλεῖται. δι' ἀμυγδαλῶν
δὲ πικρῶν καὶ ἐλαίου ὁμφα-
κίνου καὶ καρδαμύμου, χίνου
τε καὶ χαλάμου καὶ μέλιτος καὶ
εἰῖνου καὶ σμύρνης καὶ βαλσάμου
15 καρποῦ καὶ χαλδαίης καὶ ῥη-
τίνης συντίθεται. δόκιμον δὲ
ὅστι τὸ βαρύσμον καὶ λιπαρὸν
ἐμφαῖνον μᾶλλον τοῦ καρδαμύ-
μου καὶ τῆς σμύρνης, ἢ τῆς
χαλδαίης. σφόδρα δὲ θερμαί-
20 νει καὶ πυρετὶ καὶ ἀναστομῇ, ἐ-
πιπᾶται τε καὶ καθάρει ἐλ-
κυστῆρας τε νεύρα καὶ μύας δια-
κοπύντα ποιεῖ, ὑδροκήλης τε συν-
σπᾶται. μίγνυται δὲ καὶ μαλά-
γμασι καὶ κηρωταῖς. πᾶσι τε ῥή-
35 γη καὶ ὀπίσθοτονικῶς πωρομένοις
χρησιμεύει· κινεῖ δὲ καὶ ἰδρω-
τας, καὶ ἀναστομῇ τὰ πρὸ ὕε-
ραν, καὶ σκληρίας τὰς πρὸ αὐ-
τῶν χαλὰ καὶ κατόλου μαλακτι-
κὴν ἔχει τὴν δύσιν.

Περὶ Μετ-

Hedychroum. Cap. LXXI.

Quod hedychroon vocant,
in Co fieri solet: eisdem præ-
ditum viribus & misturis, qui-
bus amaracinum, sed suavius
spirat.

Metopium. Cap. LXXII.

Fit in Ægypto vnguentum,
quod metopion patrio nomi-
ne appellatur, propter galbani
mistonem: nā lignum in quo
galbanū enascitur, metopion
vocāt. Cōstat amaris nucibus,
omphacino oleo, cardamomo
odorato iunco, calamo, melle,
vino, myrrha, balsami semine,
galbano & resina. Probatur
pingue, graui odore, quod ma-
gis cardamomum & myrrhā,
quām galbanum respiciat. Cal-
facit vehementer, & adurit, at-
que extrahit, ora vera venarū
aperit, vlcera purgat, extrahit-
que: ad præcisos neruos, & mu-
sculos, ad hernias humore con-
tractas, cum erodentibus me-
dicamentis efficax est: ceratis &
malagmatis inseritur: horri-
bus, conuulsisq; præsertim qui-
bus ceruix in scapulas deiecta,
& retrorsum cōtracta est, vti-
le habetur: sudores ciēt, vuluæ
spiracula recludit, & eiusdem
duritias laxat: in summa mol-
liendi naturam habet.

Men-

DIOSCORIDIS

Mendesium. Cap. LXXIII.

Mendesium constat balanino oleo, myrrha, casia, & refina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exiguum addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullam exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multo.

Staete. Cap. LXXIII.

Staete vocatur pinguitudo recetismyrrhe cum exigua aqua tuse, & organo expressæ. Ea per quam odorata, ac preciosa est: atque vnguentum per se facit, quod staete nominatur. Maximè probatur, quæ nullam olei mistionem admittit, cuius minima portio composita est virium plurimarum. Vini calfactoriam myrrhæ & calidis vnguentis respondentem habet.

Cinnamominum. Cap. LXXV.

Cinnamominum confit è balanino oleo, & xylobalfami, calami, runci odorati spissamentis, atque cinnamoni, & seminis balsamini suauitate conditur, quadruplaque myrrhæ ad cinnamomum portione, mel ad cogenda omnia adiicitur. Laudat non acre, molli odore, planè myrrham redolens, crassum, odoratum, gustu perquam amaro.

Id

Περὶ Μενδισίου. Κεφ. 73.

Καὶ τὸ μενδίσιον δὲ λεγόμενον, ἐκ τοῦ βδελανίνου ἐλαίου καὶ σμύρνης καὶ κασιᾶς* καὶ ῥητίνης σκευάζεται. ἔνιοι δὲ καὶ τὸν καταθμισμὸν, κιννάμωμον μικρὸν προσεπιβάλλουσιν ἀνωφελὲς οὐκ ἐκδίδωσι γὰρ τὰ μὴ συνειληγμένα τὴν δυνάμιν. ἐμφερὴ δὲ ἔχει τὴν ἐνέργειαν τῷ μετώπῳ, ἥ τινα μὲν τοι.

Περὶ Στακτῆς. Κεφ. 84. 10

Στακτὴ δὲ καλεῖται προσότου σμύρνης τὸ λιπαρὸν, κεκομμένη μὲν ὕδατος ὀλίγη, ἀποτεθιμίου μέρους τὸ δὲ ὄργανον. ἐνώδης τὴν λίαν καὶ πολυτελὴς ἐστὶ καὶ καθ' ἑαυτὴν ἔσσαν μύρον τὸ καλέμενον στακτή. δοκιμος δὲ ὅστις ἡ ἀμικτὴ ἐλαίῳ καὶ ἐν ἐλαχίστῳ πλείστη δύναμιν κεκτημένη, οὗ δὲ δερματικὴν, ἀναγορεύσαν τῇ σμύρνῃ καὶ δερμαίνουσι τῶν μύρων.

Περὶ κινναμώμου. Κεφ. 85. 20

Κινναμώμον δὲ ἐκ τε ἐλαίου, βαλανίνου καὶ συμμάτων ξυλοβασάμου, καλάμου, ῥίνου, ἡδυσμμάτων δὲ, κινναμώμου, βελγιάμου καρπῶν, σμύρνης τετραπλασίονος παρὰ τὸ κιννάμωμον σκευάζεται. κατὰ γινύται δὲ καὶ μέλι εἰς τὴν φύεσιν. δοκιμον δὲ ὅστις τὸ δριμύ, μαλακὸν δὲ τῇ ὁσμῇ, καὶ παρρηφαῖον σμύρνης, παρὰ τε καὶ ἐνώδης, ἄγαν δὲ τῇ γέσσει πικρόν. τὸ γὰρ

τὸ γὰρ τοῦτον ἐκ ἐκρήτινης, ἀλλ' ἐκ σμύρνης ἔχει τὸ πᾶχος· ἢ γὰρ ῥητίνη οὐ πρὸς δίδωσι πικρίαν, οὐ δὲ ἐνωδίαν. Δυώμιν δὲ ἔχει σφόδρα δριμεῖαν καὶ θριμαντικὴν καὶ πικράν. ἀνὰ τοῖς μοῖς τοῦ θριμαίνουσα καὶ διαφορεῖ, καὶ διαχεῖ, καὶ ἐκπασσάται ὑγρὰ, καὶ πνεύματα· ἐστὶ δὲ καρπερεῖον, ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ περὶ μήτραν (ὡς ἐλαίῳ διπλασίονι καὶ κηρῷ, καὶ μυζῶντι) τὸ ἀποβάλλει τὸ πολὺ τῆς δριμύτητος, καὶ γίνεται μαλακτικόν. ἄλλως γὰρ συγχύει καὶ σκληρύνει βασιότατα παύτων τῶν πᾶχων μύρων· ποιεῖ καὶ πρὸς σύεγγας καὶ σήπτας ἐναργῶς· καὶ πρὸς ὑδροκίλλας καὶ ἀνδριανὰς καὶ γαγγράνας οὖν καρδαμόμω· πρὸς τὴν ῥητίνην τὰ περὶ διὰ καὶ πρὸς τρεμῶς, καὶ τοὺς ἀπὸ τῶν ἰοφόλων θηρίων δακτυλοῖς ἐν συγχρίσματι, ἐπὶ δὲ μὲν τε σιλορποπλήκτοις καὶ φθαγγροδύκτοις.*

Περὶ ναρδίνου μύρου. Κεφ. σς'.

Ναρδίνον μύρον ποικίλως σκευάζεται διὰ τῆς μαλαθεαδρῆνης φύλλου καὶ δίχα τούτου ὡς τὸ πολὺ δὲ μύγνυται τῷ βαλανίνῳ ἐλαίῳ, ἢ ὀμφακίνῳ· πρὸς μὲν τὴν ἐν τῷ τοῦ ἐλαίου ῥήγος· πρὸς δὲ τὴν ἐνωδίαν καὶ σμύρνα, ἀμύμον, νάρδον, σμύρνα, βάλαμον. ἐστὶ δὲ χρεσὶ ἢ λεπτὴ, μὴ δριμεῖα, ἔχουσα τὴν ἐνωδίαν τῆς ξηρᾶς νάρδου

Id nō à resina, sed myrrha crassitudine obtinuit: resina enim neq; amaritudinē præbet, neque vllā odoris gratiā adiecit. Vim habet admodū acré, amarā, & calfacientē. Itaq; ora venarum aperit, calfacit, discutit, diffundit, humores & spiritus attrahit, caput aggrauat, cōtra vuluæ vitia cū duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferè multū acrimoniæ exolefcit, & quædā emolliēdi vis contrahitur. alioqui adurit, & præ omnibus crassis unguētis indurat. Facit mirū in modum ad fistulas & vlcera quæ putredinis vitii senserunt: itē ad herenias humidiores, carbūculos, febriū horrores, tremores, gāgrasq; cū cardamomo: aduersus serpentiū morsus illinitur, scorpionū & phalangiorū ictibus cum tritis grossis imponitur.

Nardinum. Cap. LXXVI.

Ratio nardini faciendi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunq; autē balanino oleo, aut omphacino: iuncus odoratus spissamenti gratia adiecitur: sicuti propter odoris fixauitatem, costus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenuē, non acre, nardi aridæ aut

DIOSCORIDIS

aut amomi odorem referens. Vis ei extenuans, acris, expurgat, excalfacit, absterget humores, rarefacit. Hoc liquidū est, nec habet strigmenti crassitudinē, nisi resinā recipiat. Fit etiā simplex ex omphacino oleo, iūco, calamo, costo & nardo.

Malabathrinū. Cap. LXXVII.

Malabathrinum spissamenta nardini habet, insuper myrrhæ plusculū additur: qua de causa calfacit, crocino aut amaracino viribus respondens.

Myrrha. Cap. LXXVIII.

Myrrha lachryma est arboris, quæ in Arabia gignitur, Ægyptiæ spinæ non dissimilis: è cuius vulnere defluit lachryma in subiectas tegetes, alia circū caudicē concrefcit. Dicitur ex his aliqua pediasimos præpin-
guis, qua expressa, Staete emittitur. Alia gabirea pinguis-
sima, læto & pingui solo nascēs, ea copiosam fudat staecten. Omnium prima est, quæ troglodytica appellatur, accepto cognomine à loco, in quo provenit: splendens, subviridis, ac mordens. Quinetiam legitur tenuis quædam, quæ à troglodytica secunda est, bdellij modo mollis, verum odore grauiuscula, apricis nascens.

Alia

ἢ ἀμάμου. Διῶαμις δὲ ἀμ-
τῆς λεπιωτικῆ, δριμύτια, σμη-
κτικῆ, ἀραιωτικῆ ὑγρῶν, δερμα-
τικῆ. ὑγρὰ δὲ ὅτι καὶ οὐ γλοιώ-
δης, ἐὰν μὴ ῥητίνῳ ἔχη. σκευάζε-
ται δὲ καὶ λιτὴ δι' ὀμφακίνου ἑ-
λαίου καὶ χίνου, καὶ χαλάμου,
καὶ κόσου, καὶ νάρδου.

Περὶ Μαλαβαθρίνου. Κεφ. οζ'.

Τὸ δὲ μαλαβάθρινον, ἔχει μὲν
σύμμαίαια ἃ καὶ ἡ νάρδος, σμύρνης
δὲ πλεόν. διὸ καὶ γίνετ' δερματι- 10
κόν, ἀναλογοῦν τῷ κροκίνῳ καὶ ἀ-
μαρακίνῳ τὴν διῶαμιν.*

Περὶ Σμύρνης. Κεφ. οθ'.

Σμύρνα δάκρυόν ὅτι δένδρου
θωνωμῆρου ἐν ἀραβίᾳ, ὁμοίον τῇ
αἰγυπιακῇ ἀκακίᾳ· εὖ ἐγκοπτο- 15
μένου ἀπορρεῖ τὸ δάκρυον εἰς ὑ-
περωμῆρας ψάδασι· τὸ δὲ, ἐπὶ
τῷ στελέχει πεπιγυται· καὶ λέγε-
ται αὐτῆς ἡ μὲν τις πεδιάσιμος
λιπαρὰ, ἥς πεζομῆρης, ἡ σικτὴ
λαμβάνεται· ἡ δὲ τις γαβιρέα λι- 20
παρωτάτη, ἐν ὑψηλοῖς καὶ λιπα-
ροῖς τόποις θωνωμῆρη, ἢ καὶ πολλὴν
ἀνίσσι τὴν σικτιῶ. περφεύει δὲ
ἡ τρωγλοδυτικὴ χαλουμῆρη, ἀπὸ
τῆς θωνώσης αὐτῇ χώρας· ὑπό-
χλωρος καὶ δηκτικὴ οὖσα, διαυ- 25
γής. συλλέγεται δὲ τις καὶ λέ-
πῃ μετὰ τὴν τρωγλοδυτικὴν
αἰθιμουμῆρη, ἐνάπαλλος ὡς τὸ
βδέλλιον, ὑπερωμῆρος τῇ ὁσ-
μῇ, ἐν ὑψηλοῖς τοῖσις θωνομῆρη.
ἢ δὲ τις

ἡ δὲ τις καυκαλὶς λεβομβήνη, ὑψώ-
 ωρος, μέλαινα, κατόπιος. ἡ δὲ χει-
 εῖση ἐν ἀπάταις, ὀργασίμη κα-
 λείται, φαφασθὲ καὶ ἀληπὴς, δρι-
 μεῖα, κομμιζουσα τῇ ὀφει καὶ τῇ
 5 δυνάμει. καὶ ἡ ἀμνηῖα δὲ καλυ-
 μβήνη, ἀποδόκιμος. καὶ πείσμα-
 τα δὲ ἐξ αὐτῶν γίνονται ἀπὸ μὲν
 τῶν λιπαρῶν ἐνώδη καὶ λιπα-
 ρά. ἀπὸ δὲ τῶν ξηρῶν ἀλιπῇ
 καὶ οὐκ ἐνώδη, ἀτονός διὰ τὸ
 10 μὴ προσεληφέναι ἑλαϊον εἰς τὴν
 ἀνάπλασιν. δολιζέται δὲ κόμμι
 βραχύντι σμύρνης ἀποβρέγματι
 καὶ μύρμυρῳ. ἐκλέρου δὲ τὴν
 νέαν, ψάθυραν, κούφην, ὁμό-
 χροον παῖτα χόθεν, καὶ τὴν ἐν τῷ
 15 θαλαττῷ αἰένωδον, λευγὰς, ὄνυ-
 χονδεῖς, ἐχρυσὴ διαφύσεις, λείας,
 μικρόβωλόν τε, πικράν, ἐνώδη,
 δριμεῖαν, δερμαῖν πικλῷ. ἡ δὲ βρα-
 χεῖα καὶ τῇ χροᾷ ποσώδης ἐστὶν
 ἄχρηστος. Δωάμιν δὲ ἔχει δερ-
 20 μαῖν πικλῷ, καρωτῖν κλῷ, κολλυπ-
 κλῷ, ξηραν πικλῷ, συπτικλῷ, μα-
 λάσσει δὲ καὶ μήτταν μεμυκῆσαν
 καὶ ἀνίστομοι. ἄγει δὲ ἐμμύνα καὶ
 ἐμβρυα συντόμος, (ὡς ἀφινδῶ
 ἡ δερμῶν ἀποβρέγματι, ἡ πη-
 25 γανού χυλῷ προσεδεῖσθαι. λαμ-
 βάνεται δὲ ἀντὶ καταποτίε, μέ-
 γεδος κυάμου πρὸς βῆχα χρο-
 νιον καὶ ὀρεδόπνοιαν, καὶ πλευρὰς πό-
 νον καὶ πῶρακος, λύσιν τε κοιλίας.
 καὶ δυσεντερίας, λύει δὲ καὶ ῥίγι,

Alia caucalis cognominatur,
 præter modum exoleta, nigra, &
 retorrida. Omnium deterrima,
 quæ ergasima dicitur, pingui ca-
 res, cano situ obducta, acris ad-
 gummi imaginem vergens, & viri-
 bus eius proxima. Improbatur
 aminnea cognomine. Ex iis
 pastilli fiunt, sed è pinguibus
 pingues, & odorati: è sicciori-
 bus haudquaquam pingues, &
 inodorati: minus odore pol-
 let, quæ oleum non admiscit,
 cum in pastillos digerebatur:
 adulteratur macerato gummi-
 aqua, in qua myrrha madue-
 rit. Eligenda est recens, squal-
 lore obsita, levis, undique cõ-
 color, quæ cõfracta venas un-
 guium modo candidas & læ-
 ues ostendat, minutis glebis, a-
 mara, acris, odorata, calfaciēs:
 superuacua & inutilis est pon-
 derosa, coloris piceæ. Calsa-
 cit, cohibet, soporem gignit,
 glutinat, siccatur, astringit, vul-
 uam emollit, & præclusam a-
 perit: menses & partus cele-
 riter extrahit, cum absinthio,
 lupinorum cremore, vel suc-
 co rutæ admota: tuberculo fa-
 bæ deuorat in vetere tussi, or-
 thopnoea, in laterum pectorisq;
 doloribus, in alui profluvio, &
 dysenteria: horrores discutit,
 e duabus

DIOSCORIDIS

duabus horis ante febrium accessiones, fabæ magnitudine pota cum pipere & aqua: subdita linguæ liquatæque, scabritiem arteriæ expolit: obtusam vocem expedit, ventris tineas enecat, contra grauem oris halitum manditur, & aduersus aliarum tædia cum liquido alumine illinitur: gingiuas & dentes stabilit, colluto cum vino & oleo ore: vulnera capitis illitu glutinat, medetur fractis auribus ac ossib⁹ nudatis, peruncta cum cochleæ carnibus. Item purulentis auribus inflammatisque cum meconio, castorio, & glaucio: ad varos autem cum casia & melle illinitur, impetigines ex aceto purgat, defluentes capillos cum ladano & vino myrteo illita, firmat: diuturnas destillationes lenit, illitis penna naribus: oculorum vlcera complet, albugines tollit, caliginem discutit, scabritiem lænigat, Fit è myrrha, perinde atque thure, fuligo, &, vt positea ostendemus, ad eadem conueniens.

Myrrha Boeotica.

Cap. LXXIX.

Boeotica myrrha, dissecta radix est arboris cuiusdā ī Boeotia nascētis

πρὸ δύο ὥρων ἢ ἐπιβολῆς μὲν πέρεως καὶ ὕδατος τὸ μέγεθος καὶ με ποθείσα, ἀρτηρίας τε βαρύνει καὶ δασυσμὲς φωνῆς, ἀποκαθίστησιν ὑποπτερόν ἢ τῇ γλώτῃ καὶ ἀπὸ χυλίζου μὲν ἢ εἰς τὴν ἐλμύνθας, καὶ πρὸς δυσωδίαν σώματος διαμασάει· πρὸς δὲ μαχαλὼν πόνους, μὲν συνήκειας ὑγρὰς διαχρίεται· σὺν οἴνῳ δὲ καὶ ἐλαίῳ διακλυζομένη, ὁδόντας καὶ ὕλα κρατύνει· κολλὰ δὲ καὶ τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ βαίνοντα· ἐπιπαρομένη, καὶ τὰ τεθλασμένα ὥτα καὶ ψιλωμένα ὁσά, ἰάται· σὺν κοχλίας σαρκὶ ἐπιχρισμένη, καὶ τὰ πυορροῦντα τῶν ὠτων καὶ φλεγμαίνοντα, σὺν μηκωνίῳ καὶ κασσίῳ καὶ γλαυκίῳ· πρὸς δὲ ἰόνθας τὰ κατὰ τὴν κεφαλὴν ἐπιχρίσει· καὶ χυλῶς τε ἀποσμήχει σὺν ὄξει, καὶ τειχας ῥέουσας μὲν λαδανῷ καὶ οἴνῳ καὶ μυρσινίνῃ καὶ αἰχμῇ ῥώννυσσι· περὶ δὲ τὰς χροῖας κατὰ ῥῆσιν διαχρυσίζου ἢ περὶ τῶν μύκων καὶ ὁσῶν πικρῶν καὶ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ἔλκη, καὶ καταίρει τὰ λευκώματα καὶ τὰ ἐπισκοτουῦντα τῇ κόρῃ, καὶ βαρύνει τὰ σμήχει· γίνεται δὲ καὶ λιχνὺς ἐξ αὐτῆς ὁμοίως τῇ ἐν τῷ λιθαίνῳ, ὡς ὑποδείξομεν, ἀρμόζουσι περὶ τὰ αὐτά.

Περὶ Βοιωτικῆς σμύρνης.

Κεφ. οβʹ.

Ἡ δὲ βοιωτικὴ σμύρνα, ἐστὶ δένδρου πνύς ἐν βοιωτίᾳ χυνομένη

νοῦ ρίζα τετταμυρῶν. ἐκλέγου δὲ
 ἢ ἐμφρῇ συμύρῃ καὶ ἢ ἐνωδία.
 Διῶαμιν ὃ ἔχει δερμανοπικὴν, μα-
 λακοπικὴν, διὰχυτικὴν. μίγνυται ὃ
 καὶ θυμιάμασι χρυσίμωσι.

Περὶ σύρακος. Κεφ. π'.

Στύραξ δάκρυόν ἐστι δένδρου
 πρὸς ὁμοίου κυδωνίου. Διαφύρει ὃ
 αὐτὸ ὅξαν δὸς καὶ λιπαρὸς ῥητι-
 νώδης, θρόμβοις ἔχων ὑπολευ-
 κοῖς, ἐπιδιάμυρῶν τῇ ἐνωδία ὡς
 10 ὅτι πλείστον, καὶ ἐν τῷ μαλακώ-
 σθαι ἀνέις ὑγρασίαν πρὸς μελιτώ-
 δη τοιοῦτος δὲ ἐστὶν ὁ κατὰ βαλί-
 της καὶ πωσιδιακὸς καὶ κηλίκος.
 φαῦλος δὲ ὁ μέλας καὶ * ἰαδυ-
 ρὸς, καὶ πωσιρῶδης. εὐείσκει-
 15 ται δὲ καὶ δάκρυον κόμμι ἐοι-
 κὸς, διαυγὲς, συμυρνίζον ὀλίγον
 δὲ τοῦτο γινῶται. δολίζοισι δὲ
 αὐτὸ τοῖς ἐκ τοῦ δένδρου πορίσ-
 μασι. ἅπασιν ὑπὸ τῶν σκολήκων
 ἀναπτεῖται μύγνυμυρῇ καὶ μέ-
 20 λιπ καὶ ἱερῶς ὑποσάδμη, καὶ
 ἄλλοις πσίγ. ἐγγοῖ δὲ κηρὸν ἢ
 σέαρ ἀρωματίσαντες συμμιγνῶσ-
 σοισιν ἐν τοῖς ὀξυτάτοις ἡλίοις
 τῷ σύρακι, καὶ δι' ἡθμοῦ ἐρυ-
 τρήτου, ἐκδιλίοισιν εἰς ὕδωρ ψυ-
 25 χρὸν ποιοῦντες σκολήκια καὶ πω-
 λοῦσι, σκοληκίτην ὀνομάζοντες.*
 ἐγκρίνοισι δὲ οἱ ἄπειροι τὸν τοι-
 οῦτον ὡς ἀκέραιον, οὐ παρσέχον-
 τες τῇ κατὰ πλὴν ὁσμῇ ἐντονία,
 θριμὲς γὰρ λίαν ἐστὶν ὁ ἄδολος.

Διῶαμιν

tia nascentis, Melior est quæ
 myrrham odoris suavitate re-
 presentat. Vis ei calfactoria in-
 est, emollit discutitq; suffimen-
 tis commodissimè inseritur.

Styrax. Cap. LXXX.

Styrax lachryma est arboris
 malo cotoneæsimilis. Prefertur
 fordescens, flauus, resinofus, al-
 bicatibus grumis, quàm pluri-
 mū in sua odoris gratia perma-
 nēs: qui dū mollitur, melleū li-
 quorē reddit: qualis ē Catabal-
 lis, Pilsidia, & Cilicia deuehi-
 tur. Deterior niger, fursufosus,
 friabilis, canoq; situ obductus.
 Cæterum lachryma inuenitur
 gūmīū similitudine, perlucida,
 & myrthæ emula: verū perpau-
 ca manat. Adultera ligni sco-
 be, quā vermiculi erodētes ex-
 cusserūt, melle, & iridis sedimē-
 to, & quibsdā aliis. Alij cerā aut
 adipē odoribus imbutū, flagrā-
 tissimis solib⁹ cū styrace subi-
 gūt, & p laxa cribri foramina ī
 frigida aqua veluti vermiculos
 exprimūt, venūdantq; Styraçē
 hūc (quoniā vermiculorū spe-
 ciē cōtrahat) scholécitē cognō-
 minant, tanq̃ syncerū imperiti
 approbāt, nō animaduertētes
 ad præcipuam odoris fragran-
 tiā: siquidem acer admodū est,
 qui adulterationis vitio caret:

c ij Styraç

DIOSCORIDIS

Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur tussi, destillationibus, raucedini, grauedini, & interceptæ voci: vuluæ præclusæ duritiæve laboranti conuenit, cit menses potu appositique, aliu leuiter mollit, si exiguum cum resina terebinthina catapotij modo deuoretur. Misceatur vtiliter discutiëtibus maglarmatis, acopisque. Adoletur auté & igni torretur, vt fiat ex eo, veluti ex thure, fuligo, ad eadem conueniēs ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria styracinum oleum componitur, quod calfacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, adgrauátque, & soporem adfert.

Bdellium. Cap. LXXXI.

Bdellium alij bolchon appellant, alij madelcon: lachryma est saracenicæ arboris. Probaturn gustu amarú, translucidú, taurini glutinis in moré, intus pingue, liquefcens facile, ligni ac fordís expers, suffitu odoratum, vngui simile. Est etiam nú bdellij genus fordidum, nigrú, vberiorib' glebulis in offas cõuolutú, aspalathi odore, ex India aduectum. Defertur etiã à Petra oppido ficcú, resinofum, liuescēs, sed facultate secundú.

Adul-

Διούαμιν δὲ ἔχει δερματικῶν, μαλακτικὴν, πεπτικῶν · ποίων πρὸς βήχας καὶ κατάρρους, κορύζας, βράγχους, ἀπικοπὴν φωνῆς· ἀρμόζει καὶ πρὸς τὰς ἐν ὑτέρῳ μύσει καὶ σκληρίᾳ· ἐμυλῶν τε ἄγει πινόμενος καὶ πρὸς δέμενος, κοιλίαν τε κοῦφως μαλάττει κατὰ πινόμενος ὀλίγος μετὰ ρήτης τερεβινθίνης. μύνηται δὲ καὶ μαλάγματα διαφρηκτοῖς καὶ ἀκόποις χρυσίμω. καίεται δὲ καὶ ὁπῖσ' αὐτοῦ καὶ φώγεται καὶ δαλοῦται ὡς λίβανος· ἀρμόζει τὴν αἰθάλην πρὸς αὐτὴν καὶ τὴν λιβαίου. τὸ δ' ἐξ αὐτῆς σκευαζόμενον χρίσμα ἐν τῇ στείᾳ συρόμενον, δερμαίνει καὶ μαλάττει ἰσχυρῶς· καὶ φθάλμους μέντοι καὶ βαρὺ καὶ κρωπτικὸν κατέστηκεν.

Περὶ βδέλλιον. Κεφ. πα.

Βδέλλιον οἱ δὲ μάδελλον, οἱ δὲ βολχὸν καλοῦσι· δάκρυον ἐστὶ δένδρου σαρακηνικοῦ. δοκιμον δὲ ὅστιν αὐτῷ τὸ τῇ γεύσει πικρὸν, διαγνῆς, ταυροκολλῶδες, λιπαρὸν διὰ βάθους καὶ ὑμάλαιαν, ἀμυγρὸς ζύλων, καὶ ῥυπαρίας, ὑψῶδες ἐν τῇ θυμιάσει, εἰκότως ὀνυχι. ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερον ῥυπαρὸν καὶ μέλαν, ἀδρόβωλον, παλαδῶδες, κομιζόμενον ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς. φέρεται δὲ ἀπὸ τῆς πέτρας, ξηρὸν, ῥητινώδες, ὑποπύον, δευτερεύον τῇ δυνάμει.

δοκού

δοῦνται δὲ μὴνύμνον κόμμι·
 τὸ δ' αὖτις ἐχ' ὁμοίως πικραί-
 νει πλὴν γεύσιν, ἐν τε τῇ ὑποδυ-
 μιόσι, ἐχ' ὥπως εὐωδίας ἐστὶ. Δύ-
 ναμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μα-
 5 λακτικὴν, διὰ λυκτικὴν βρογχό-
 κληδὸν καὶ σκληριὸν καὶ ὑδροκκληδὸν,
 ἐνεθὲν πηλέω ἀσπίτου· ἀντιστοιχοῖ
 καὶ πλὴν μήτραν παρυστιόμνον καὶ
 ὑποδυμιόμνον, ἐφέλκεται δὲ
 καὶ τὰ ἐμέρια καὶ πᾶσαν ὑγρασίαν,
 10 δρῦπται δὲ καὶ λίθοις πινόμε-
 νον, καὶ οὖρα ἀγρίων, βηχικοῖς τε καὶ
 σπυροδύκτοις, ὡφελίμως δίδωται·
 ἀγρῶν δὲ καὶ πρὸς ῥήγματα,
 ἀσπίσματα, καὶ πλεονεξίας πόνον καὶ
 διαδρομὰς πνευμάτων· μίσγε-
 15 ται δὲ καὶ μαλάγμασι τοῖς ἀρ-
 μόζοις πρὸς τὰς σκληρίας καὶ
 δέσεις πῶν νέρων· κατεργάζεται
 δὲ κοπήμνον, παρὰ χειρὸς οἴ-
 νου ἢ ὕδατος θερμοῦ.

Περὶ λίθαινον. Κεφ. πβ'.

20 Λίθαινος ἁρπάζεται μὲν ἐν ἀραβίᾳ
 τῇ λίθαινοφόρῳ καλουμένῃ, παρ-
 τεύει δ' ὁ ἄρπην καλέμνος σαβονί-
 αι, σπογγύλος φισικῶς· ἐστὶ δ' ὁ τοῦ
 τοῦ ἀτομος λευκός τε καὶ θλασθεὶς
 ἐνδοθεν λιπαρὸς, ἐπιδυμαθεὶς δ'
 25 ταχέως ἐκκαίμνος. ὁ δ' ἰνδικὸς
 ὑποκίρρος τε ἐστὶ, καὶ πηλὸς πλὴν
 χροῶν, γίνεται δ' καὶ κατὰ πλὴν ἐπι-
 πήδεισιν σπογγύλος τέμνοντες γὰρ
 αὐτὸν εἰς τετραγώνια σχήματα καὶ
 βάλλοντες εἰς κεράμεια, κυλίσκον
 ἕως

Adulteratur gummi, sed ita vi-
 tiatum non perinde gustui a-
 maritudinem representat, nec
 usque adeò suffitionibus odo-
 ratum. Calfacit & emollit du-
 ritias, & turgentia guttura, hu-
 midasque hernias discutit, cum
 ieiuna saliva dilutum : vulvae
 spiracula laxat appositu & suf-
 fitu, & partus humiditates-
 que omneis extrahit, calcu-
 los potu comminuit, vrinam
 mouet tussientibus & à ser-
 pente percussis, vtilissimè da-
 tur : valet ad rupta, vulsa, la-
 terum dolores, & discursantes
 spiritus : malagmatis inseritur,
 quæ contra duritias & neruo-
 rum nodos profunt : contusum
 resoluitur affuso vino aut aqua
 calida.

Thus. Cap. LXXXII.

Thus in ea gignitur Arabia,
 quæ thurifera cognominatur.
 Primatū tenet í eo genere ma-
 fculū, stagonias appellatū, sua-
 pte natura rotundū : tale autē
 indiuiduum est, candidū, cūm
 frangitur, intus pingue, in suffi-
 tu statim ardens. Indicum ve-
 rò fuluescit, & colore liuet, sed
 rotundum industria factitant:
 nam in quadrangulares for-
 mas dissectū fictilibus versant,
 e iij donec

DIOSCORIDIS

donec rotunditatē contrahat: verūm huiusmodi thus tēpore flavescit, quod atomū aut syagrū appellāt. Secundū locū habet Arabicū, & ī Smilo nascēs, quod aliq. copiscū vocāt, min⁹ multò & fuluius. Est & genus aliud, cui amōmitæ cognomen est, alioqui cādīdum: quod dū mollitur, mastiches more digitiscedit. Adulteratur in itinere, pini resina & gūmi, quod facile deprehēdi potest: siquidē suffitū gūmi flammā nō eiaculatur, & resina in fumū euanescit, thus verò statim ardet: idē maleficiū odor prodit. Ad calfaciendū & astringēdū pollet, oculorū caliginē discutit, caua vlcera cōplet & ad cicatricem perducit cruenta vulnera glutinat, infrenatq; cūctas sanguinis eruptiones, etiāsi cerebri membranis effluat: vlcera quæ cacoēthe vocantur, & sedis & reliquarum partiū permulcet tritū cū eo & lacte linamentū: formicantes verrucas inter initia, impetiginésq;, ex aceto & pice illitū, tollit: ambusta igni pnionésq; cū suillo adipe aut anserino, & vlcera ī capite manātia cū nitro, si infricetur, sanat: paronychiscū melle auribus fractis cum pice, medetur:

ad

ἕως αὖ ἀπολάβοι τὸ στρογγύλον
 ῥήμα • χροῖν δὲ ὁ τοιοῦτος ξαν-
 δοῦται, ἄτομος ἢ σύαρος καλέ-
 μινος. δευτερεύῃ ὁ ἀραβίας καὶ ὁ
 ἐν σμίλῳ, ὃν ἐνίοι κοπίσκον καλέ-
 σι, μικρότερον καὶ κριότερον ὄν-
 τι. λέγεται δὲ τις καὶ ἀμωμίτης,
 ἄλλως μὲν λευκὸς· ἐν δὲ τῷ μα-
 λάσσει ἐν διδοῖς ὡς μασίχη. δο-
 λοῦν δὲ πᾶς λίβανος τῇ πικτυίνῃ
 ῥητίνῃ μεθοδεύομενος, καὶ κόμ-
 μι. εὐχερὲς δὲ ὅστιν ἢ διάγνωσις. 10
 τὸ μὲν γὰρ κόμμι οὐκ ἐκφυλοῦται
 θυμώμενον, ἢ δὲ ῥητίνη εἰς κα-
 πνὸν ἐκφυοῦται • ὁ δὲ λίβανος
 τὸς ἐξάπτεται. θυλοῖ δὲ καὶ ἡ ὁσ-
 μὴ τὸ τοιοῦτον. Διῶνται δὲ θερ-
 μαίνεσθαι, σφύειν, ἀποκαθαίρειν τὰ 15
 ἐπισκοτουῦντα ταῖς κόραις, καὶ
 τὰ κοῖλα τῶν ἐλκῶν πληθεῖν
 καὶ ἀπουλοῦν, κολλᾶν τε ἑ-
 ναιμα τραύματα, αἱμορραγᾶν
 τὲ πᾶσαι, καὶ τὴν ἐκ μύτης
 ῥινῶν ἐπέχειν • παρηγορεῖ καὶ τὰ 20
 περὶ δακτύλιον καὶ τὰ λοι-
 πὰ μέρη κακοήθη ἔμμοτος λεί-
 ος, σινὲ γάλακτι, καὶ τὰς ἐν
 ἀρχῇ μυρμηκίας καὶ λειχή-
 νας, (ὥν ὅστις καὶ πῶσις κατα-
 χροῖομενος αἶρει, καὶ τὰ πνεύ- 25
 καυτὰ δὲ ἔλκεα καὶ χύματα ἰά-
 νται σινὲ σέσιπ χολείῳ ἢ χυμῳ·
 ἀχῶρας δὲ σινὲ νίτρω σιμώμε-
 νος ἰᾶται. παρωνυχίας τὲ σὺν μέ-
 λιτι, ὧτων θλάσεις σινὲ πῶσι·
 30

ad

πρὸς δὲ τὰ λοιπὰ ἀλγύματα ὧτων, (ὡν οἶνον γλυκεῖ ἐγχέου-
 νος, μασοὺς τε τὰς ἀπὸ τοκατῶν
 φλεγμαίνοντας σὺν κισσολίᾳ καὶ
 ῥωδίνῳ καὶ αχρίδιδος ὠφρὺν) μί-
 5 γνυται δὲ καὶ τοῖς πρὸς ἀφθέραιαν
 ὠφρὺν, καὶ τοῖς σπασμωχικοῖς
 φαρμάκοις, αἰμοπτοικοῖς τε ὠφε-
 λεῖ πνόνιδος. μαριώδης δὲ ὅστις
 πνόνιδος ὑπὸ τῶν ὑμανόντων,
 πλεῖον δὲ μετ' οἶνου ποθεῖς καὶ
 10 κτείνει, καίεται δὲ λίβανος ἐπ'
 ὀδράκου καὶ δαρῶν τεθεῖς, ὑφα-
 πτόιδος ἥ ῥόνδρῳ ἀναφθέντι ἀ-
 πὸ λύχνου, ἄχρῖς αὖ ἐκκαῖ· δεῖ δὲ
 μὲν τὴν τελείαν καὶ σὺν πωμά-
 ζειν πῇ ἄχρῖς αὖ σβεδῇ· ἔτω γὰρ
 15 ἐκ ἐκτεφροῦται. ἐγίνοι δὲ πει-
 θέασι τῷ λοπαδίῳ ἀγρεῖον χαλ-
 κουῦν, κοῖλον καὶ μέσον τεβημμέ-
 νον, πρὸς ἐκκαῖν τῆς ληνύος, ὥς
 ὑποδείξομεν ἐν τῷ περὶ αἰδάλης
 λιβάνος λόγῳ. οἱ δὲ, εἰς ὧμὴν χύ-
 20 τσαν βάλλοντες καὶ πεπλάσσαν-
 τες πυλῶν, καίκοσιν ἐν καμίνῳ. φώ-
 γνυ' ὅ ἐπ' ὀδράκου καμνοῦ καὶ ἀν-
 θράκων διαπύρων, ἕως αὖ μιν κέ-
 τι πομφολυγίζη, μὴ δὲ λιπαρίαν
 πνὴ ἢ αἰμίδα ἀνίη. ἀρύπτεται ὅ
 25 εὐχερῶς μὴ κατακαυμυδός.

Πρὶ Φλοιῷ Λιβάνου. Κεφ. πγ'.

Φλοιὸς δὲ λιβάνου διαφέρει ὁ
 παρὺς καὶ λιπαρὸς καὶ εὐώδης,
 πρὸς σφατος, λεῖος καὶ μὴ λεωφώ-
 δης ἢ ὑμυμώδης. δολοῦται δὲ μι-
 γνυμένη

ad reliquos auriū dolores cum
 dulci vino iufunditur, inflam-
 mata à partu mamme cum ci-
 molia & rosaceo magna vtili-
 tate perungitur, additur ad ar-
 teriæ viscerumq; medicamen-
 ta, prodest sanguinis excrea-
 tionī potum: sed in secunda va-
 letudine haustum infantiā mo-
 uet, & largius cum vino po-
 tum interficit. In fictili mun-
 do thus crematur, flagrante
 glebula succensum à lucerna,
 donec exuratur: post perfe-
 ctam vstionem operire oportet,
 vsque dum restinguatur: sic enim in cineres non redi-
 gitur. Aliqui ollulam æneo va-
 se cauo circa medium perfo-
 rato cingunt ad excipiendam
 fuliginem, vt in eius mentio-
 ne mox ostendemus. Alij cru-
 do fictili luto oblito, & in for-
 nacem indito, cremant. Ficti-
 li etiam nouo viuacibus pru-
 nis torretur, dum non ampli-
 us bullet, aut pinguitudinem
 vaporémve emittat. facile e-
 nim comminuitur quod peru-
 stum non est.

Thuris cortex. Ca. LXXXIII.

Præfertur thuris cortex cras-
 sus, pinguis, odoratus, re-
 cens, leuis, minimè scaber, sine
 membranīs. Adulteratur ad-
 e iij misto

DIOSCORIDIS

missto pini aut nucis eius cortice, sed horū index ignis est: si quidem reliqui cortices suffiti nequaquā incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris verò cortex ardet, & cū odoris fragrantia vaporem eiaculatur. Thuris modo vritur, & vis eadem quæ thuri, sed validior astringentiōq;. Quare potu cruētis excreationibus, vulvis fluxione laborantibus in pefso confert, ad cicatrices oculorū, & caua sordésque efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

Māna thuris. Ca. LXXXIII.

Manna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini resina, ac polline, aut cortice thuris confusi adulterant: sed hæc igne deprehenduntur. Neque enim æquē suffitu aërium vaporem, sed fuliginosum & impurū expuit, & permistum suaveolentiæ halitus virus habet.

Thuris fuligo.

Ca. LXXXV.

Fuliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis accensas singulatim thuris glebas, in novam fictilem ollam cōcauam impo-

νομήνους αὐτῶ φλοιοῦ σροειλίνου ἢ πτυίνου, ἑλεγχος δὲ καὶ τούτων τὸ πῦρ· οἱ μὲν γὰρ λοιποὶ θυμιαθῆντες οὐκ ἀνάπτονται, καπνίζόμενοι δὲ δίχα ἐνωδίας ἐκτύφονται ὁ μὲν τοι τῆς λιβάνου φλοιὸς ἀπίνεται καὶ ἡ μέν ἐνωδίας ἐκθυμιάται καίεται δὲ καὶ οὗτος ὡς λίβανος. Δύναμιν δ' ἔχει ὡς καὶ ὁ λίβανος ἐν ῥέστερος ὢν καὶ συπικνότερος. ὁ δὲν ποδεῖς, αἰμοπικνοῖς μᾶλλον ἰα καὶ ῥοικοῖς ἀρμόζει ἐν περὶ δέ τω ποιεῖ καὶ πρὸς οὐλὰς ἐν ὁσθαλμοῖς, καὶ κοιλώματα καὶ ῥυπαείας· φωχθεῖς δὲ καὶ πρὸς ψωροσθαλμίας ποιεῖ.

Περὶ Μάννης Λιβάνου. Κεφ. πδ'. 15

Μάννα δὲ λιβάνου δόκιμὸς ὅστις ἡ λευκὴ καὶ καθαρά, ἐν χόνδρῳ. Δύναμιν δ' ἔχει ὡς καὶ ὁ λιβανωτὸς, ὑπαιεμύως δ' ἡ μᾶλλον. μίσγεται δ' ἐν τοῖς ἐορῶντες ῥητήνῃ πτυίνῃ τεσιμηρῇ καὶ γύρῃ, ἢ φλοιῳ 29 λιβανωτὸς κεκομμένου ἑλέγχεται καὶ ταῦτα τὸ πῦρ. ἔτε γὰρ καὶ ἴσον καὶ ἰσοτόνως θυμιαθήσεται ἀερίζονται τῷ αἰτμῷ, ἀσβολώδει δὲ καὶ οὐ καθαροῦ, ἢ τε ἐνωδία μικτὴν ἔχει τὴν ἀποφορὰν.

Περὶ Αἰθάλης Λιβανωτῶ. 25

Κεφ. τθ'.

Αἰθάλῃ δ' ἡ λιβανωτῶ ποιῶν ἄνω λαβιδῶ καθ' ἓνα χόνδρον τῆς λιβάνου ἀπὸν πρὸς λύχνον, ἐπιτίθει εἰς κοῖλον λοπάδιον ὁσράκων καμνόν.

ἡσυχόν· εἴτα περικάλυπον χαλκώ-
μα ἔγκοilon, τεβημυθόν κατὰ
μέσον καὶ ἑσμημυθόν ἐπιμελῶς,
* ἐπιπίθει τε κατὰ τὸ ἕτερον ἀν-
τὶ * μέρος ἢ ἀμφοτέρω. λιθάεια
5 ὕψι τεβραδακτυλιαῖα πρὸς τὸ
διαφαίνειν εἰ καί ἐστι· καὶ ἵνα χό-
ρα ἢ ὑποπιδέναι * ἐτέροις χρό-
νοις * αἰ. πρὸ τῆς τὸν πρῶτον
χρόνον ἀποσβεδύναι πατη-
λῶς, * καὶ τῆς τοιοῦτης, ἕως ἂν ἀν-
10 τάρκη λιγνυὴ δόξης συναμνοχέ-
ναι. συνεχῶς μὲν τοι ἀσπύργῳ ἐξ
ὑδατος ψυχρῆς πείμασσε τὰ ἐκ-
τὸς μέρος τῆς χαλκώματος· οὕτω
ἂν πρὸς πρὸς αἰσίζει πᾶσα λιγνός, μὴ
ἄλλαν αὐτῆς πυρρὸν μύρου· ἐπεὶ ἂν
15 ποπίπτεται διὰ τὴν κορυφήν, τῇ
μύρῳ τῇ τῆς λιθάνης ἀποδῶ.
ὑποψήσεις οὖν τὴν πρὸς τὴν
λιγνὴν, ποιεῖ τὸ αὐτὸ ἐφ' ὅσον ἂν
δοκῇ, ἀναμειβὴ δὲ καὶ τὴν ἐκ τῆς
καέντος λιθάνου ἀποδῶν ἰδίᾳ. Δύ-
20 ναμιν δὲ ἔχει πρὸς ὑντικλὴ τῶν
ἐν ὀφθαλμοῖς φλεγμασίων, σαλπ-
ικὴν ρευμάτων, ἀνακαταρτικὴν ἐλ-
κῶν, πλερωτικὴν κοιλωμάτων,
σαλπικὴν χαρκινωμάτων.

Πρὶς Δυσήους σκευα-

25 σίας. Κεφ. πς.

Τὸν αὐτὸν ὃ βόπον σκευάζει καὶ
ἐκ τῆς σμύρνης καὶ ἐκ τῆς ῥητίνης, καὶ
ἐκ τῆς σύρακος λυγρῆς ἀρμόζουσι ὃ
πρὸς τὰ αὐτὰ, καὶ ἐκ τῆς λοιπῶν ὃ
δακρύων ὁμοίως τῇ λιγνὴν λάμ-
βανει.

Πρὶς

imponito: & æreo vase in me-
dio perforato, deterfa diligen-
ter forde, obtegito : alteram
admoueto, ex altera eius par-
te aut vtraque, subiectis qua-
ternum digitorum altitudine
lapillis, quò facilius perspici
queat, si vrantur : & qua locus
capax fuerit, glebularum alias sup-
ponito, & antea quàm prorsus
prior gleba restinguatur,
aliam imponito: donec sufficiē-
tem fuliginem videaris coëgisse.
Continuò tamen externæ
æramenti partes spongia, aqua
frigida madefacta, abstergan-
tur: ita enim téperato æris fer-
uore, fuligo omnis inhærebit:
quæ alioqui per leuitatem de-
cidua, thuris cineribus admisce-
tur. Dersa itaque fuligine, ci-
nis cremati thuris seorsum sub-
strahédus est. Idem opus, quod
satisfactum tibi videtur, obeū-
dum. Oculorum inflammatio-
nes mitigat, fluxiones suspen-
dit, vlcera purgat, caua explet,
carcinomata sistit.

Fuliginis compositio.

Cap. LXXXVI.

Simili modo è myrrha, re-
sina, styrace, reliquisque
lachrymis, fuligo ex-
cipitur, ad eadem
conueniens.

Picca

DIOSCORIDIS

Picea & Pin⁹. Ca.LXXXVII.

Pinus & Picea generi eidem ascribuntur, sed quandam flagitat specierum distinctione, arbores vulgò cognitæ: quarum cortex astringit, prodest tritus & illitus intertrigini, vlceribus summum corpus occupantibus, ambustisq; cum spuma argenti & manna. Vlcera delicatiorum acrimoniam recusantium, cerato myrtino exceptum, ad cicatricem perducit: tritus cum sutorio atramento serpentina cohibet, suffitu partus & secundas eijcit, potus aluum sistit, vrinam mouet. Folia eorum trita & illita inflammatio nes leniunt, vulnera ab inflammatione vindicant, trita autem & decocta in aceto, feruenti collutione, dentium dolores mulcent: hepaticis vtilia sunt, drachmæ pondere in aqua aut mulla pota. Pineæ nucis cortex & folia potu idem præstant. Teda earum particulatim secta si in aceto coquatur, & decocto dens colluatur, dolores leuat. Ex his etiam fit spatha acoporum peforumq; compositionibus idonea. Quinetiam earum crematarum fuligo ad librarij atramenti cõfectionem excipitur:

εα

Πρὶ Πίτυος. Κεφ. πζ.

Πίτυς γινώριμον δένδρον ἔστι ὃ τ' αὐτ' ἁλῦς καὶ ἡ λεγομένη πύκη, εἶδει διαφέρεται. ἀμφοτέρων δ' ὁ φλοιὸς συμπικρὸς, ἀρμόζων πρὸς τε παραβιμματα λεῖος καὶ ταπλασσύμνος, καὶ πρὸς τὰ ἐπιπόλαια τῶν ἐλκῶν καὶ κεκαυμένων συνλιθαργῶν καὶ μαλὴν ἀναλκωθεὶς δὲ κερωτῇ μυρσίνῃ, ἀπουλοῖ τὰ ἐπὶ τῷ βυφροχρόϊων ἐλκῃ καὶ τὰ ἐρπυστικά ἐπέχει μὲν χαλκώδους λεῖος, ἐμβρυά τε καὶ δεύτερα ὑτέρα θυμιαθεὶς ἐμβαλλῶν, κοιλίαν τὲ ποθεὶς ἐφίσυσσι, καὶ ἔρακνῃ, καὶ τὰ φύλλα δὲ αὐτῶν καταπλαδέντα λεῖα, φλεγμονὰς παρηγορεῖ, καὶ τραύματα ἀφελίμματα διατηρεῖ, λειανθέντα δὲ καὶ ἐψηθέντα ἐν ὄξει, ὁδονταλγίας πρᾶννει διακλυζόμενα θερμά. ἀρμόζι δὲ καὶ ἡπατικαῖς τῷ φύλλων ὀλκῇ μία συνὺδαπὶ ἢ μελικράτῳ ποθεῖσα. ποιεῖ δὲ τὰ αὐτὰ καὶ ὁ τῆς σροεῖλου φλοιὸς καὶ τὰ φύλλα ποθέντα. καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν δὲ δαδῖον ὁδὸν εἰς λεπτὰ καὶ ἐψηθέν συνὺξ, ὁδονταλγίας πρᾶννει, κρατεμύρου τῷ ἀφεψήματος καὶ τῷ πεπονδότος ὁδόντος, καὶ ἀσάδη δὲ ἐξ αὐτῶν γίνεται εἰς ἀκόπων σκευασίας καὶ πρᾶντων ἐπιθήδεις. ἢ δὲ ἐξ αὐτῶν λιγνὺς καυομήρων, ἐκλαμβάνεται πρὸς μέλανος χροσικοῦ κατασκευὴν ποῖσα

ποῖσα

πιυῖτα· καὶ πρὸς καλλιβλέφα-
ρα καὶ καρποὺς βεβρωμέ-
νους, πρὸς τε πύλα
βλέφαρα καὶ ὀφ-
θαλμοὺς δα-
κρύοντας.

§ Πρὶ Πιτυίδων. Κεφ. πη.

Πιτυίδες ὅ καλουῖτο ὁ καρπὸς
τῶν πτύων καὶ τῆς πένυκς, ὁ σφρι-
σιόμορος ἐν τοῖς κώκοις. Διῶαμιν
δὲ ἔχουσι, συπληκὴν, θερμαίνουσιν
10 ποσῶς. Βρωθοῦσι δὲ βηξί καὶ τοῖς
πρὶ δάρα καὶ πάσει, καὶ ἑαυ-
ταὶ καὶ μετ' ἐκείνου λαμβανόμε-
ται. Πρὶ Στρόβιλων. Κεφ. πθ'.

Στρόβιλοι ὅ καὶ καρποὶ ἐκτόμε-
νοι, καὶ μετ' ἡλικίας καὶ στικῆς σπέρ-
15 ματος πινόμοροι, οὐρητικοί, ἀμ-
βλωπτικοί τῶν πρὶ κύστιν καὶ νεφρὲς
δριμυτήτων, παρηγόρῃσι δὲ καὶ σφ-
μάχων διήκεις, μετ' ἀνδράχνης,
χυλὸς λαμβανόμενοι ἐξ ἑρμίδουσι
τε ἀτονίαν σώματος, καὶ τὰς τῶν
20 χερῶν διαφθοράς ἐξαμβλωκοῖσιν.
ὅλοι δὲ οἱ στρόβιλοι ἀπὸ δένδρων
πρόσφατοι θλαδέντες ἐν γλυ-
κεὶ καὶ ἐμμένοντες, ἀρμάζουσι πα-
λαιᾶς βηξί καὶ φθίσεσι, καὶ τῶν ἐξ αὐ-
τῶν ὑγρῶν καὶ ἐκείνην ἡμέραν λαμ-
25 βανομένο καὶ δάτων τὸ πλῆθος βι-
βῶν. Πρὶ Σχίνου. Κεφ. ς'.

Σχίνος δένδρον γνῶριμον συ-
πληκὸν ὅλον, καὶ γὰρ ὁ καρπὸς αὐτῆς
καὶ τὸ φύλλον καὶ ὁ φλοιὸς τῶν κλά-
δων καὶ τῆς ρίζης ἰσοδυναμοῖ.
γίνετο

ea circūlitionib⁹ efficacissimè
imponit, quibus palpebras or-
nat, coloréq; mētiunt, callibre-
phara Græci vocāt: arrosis ocu-
lorū angulis, callosis glabrisq;
genis, & collachrymationibus
opitulat. Pityides. Cap. 88.

Pityides appellantur pino-
rum piceæq; fructus, qui in co-
nis inueniuntur. Vim astringe-
ntiam habent, & aliquātum ex-
calfacientem: tussi & pectoris
vitiis auxiliantur, per se, aut ex
melle sumpti.

Strobili. Cap. LXXXIX.

Nuces pineæ cū Strobili re-
purgatæ mādūtur, aut cū passo
aut cucumeris semine bibun-
tur, urinam ciēt: acrimonias in-
renibus & vesica hebetāt, sto-
machi rosiones leniunt: datæ
cum portulacæ succo, virium
infirmiorem roborant, corru-
ptorum quoq; humorū labem
obtundunt. Pineæ nuces inte-
græ recenter arboribus decer-
ptæ in passo fráguntur, & deco-
ctæ, vetustæ tussi ac tabitudini
conferunt, si quotidie ex eo li-
quore terni cyathi bibantur.

Lentiscus. Cap. XC.

Lentiscus nota arbor est, cui
toti vis inest astringendi: semi-
ni enim, folio, ramo, cortici, ra-
dicibúsq; cognatæ insūt vires.

Liqua-

DIOSCORIDIS

Liquamentum autē ita fieri so-
let: Folia, cortex & radix in
aqua coquuntur, & vbi abun-
dē cocta refrigeratāque sunt,
folia abiiciuntur: aqua denuo
coquitur, donec mellis habeat
crassitudinem. Lentiscus sua
sua astringendi dote, valet ad-
uersus sanguinis reiectiones,
alui profluvia, & dysenterias
in potu. Item contra eruptio-
nem sanguinis ē vulua, & e-
iusdem aut sedis prociden-
tia. In totum acaciæ & hy-
pocistidis vicem repræsentat.
Idem facit succus ē tritis fo-
liis. Decoctum fotu caua ex-
plet, & fracta ossa ferruminat,
vulvæ fluxiones sistit, nomas
arceat, vrinam pellit, motus dē-
tium collutione stabilit. Viren-
tes furculi calamulorum vice

dentibus repurgandis affri-
cantur. Fit ē semine
oleum, quod prodest
cūm quid adstrin-
gi opus est.

Lentiscus. Cap. XC.

Lentiscus resinam gignit,
quæ lentiscinā cognominatur,
& ab aliquibus, mastiche.
Pota utilis est sanguinem rei-
cientibus, & tussi veteri: sto-
macho auxiliatur, sed ructum
mouet. Additur in dentifricia,

&

γίνε⁹ ὃ καὶ χύλισμα ἐκ τῶν φλοιῶν,
καὶ τῆς ρίζης καὶ τῶν φύλλων ἐπιμέ-
νων συν ὕδατι ἐφ' ἰκανὸν· εἴτα
καὶ τὸ ἐπιθάλῃ τῶν φύλλων ῥιπτο-
μένων, τὸ ὕδατος δὲ πάλιν ἐφο-
ρῶν μέλει μελιτώδους συστάσε-
ως. ποιεῖ ὃ εὐφρων πρὸς αἵματος
ἀναγωγὰς καὶ ῥύσεις κοιλίας καὶ δι-
σεντερίας πινόμενος, καὶ πρὸς τὰς
ἐν μήτρᾳ αἱμορροΐδας, καὶ πρὸς
πλώσεις ὑστέρας καὶ δακτυλίτι· καὶ
καὶ ὅλη ἀντὶ ἀκακίας καὶ ὑποκυ-
σίδος ἐνεστὶν αὐτῷ χρῆσις. καὶ ὁ χυ-
λὸς ὃ τῶν φύλλων ἐκθλίβεντων
τὰ αὐτὰ ποιεῖ, καὶ τὸ ἀφέψιμα ὃ
αὐτῶν κατατλέμενον, τὰ ἀστυ-
πλήρωτα πλεῖστον, καὶ τὰ ἀπώρω-
τα πωρεῖ ὅσῃ, καὶ τὰς ἐν μήτρᾳ
ῥεύσεις σέλλει, καὶ τῶν νομῶν
ἀποτρεπτικὸν καὶ οὐρητικὸν ἐστίν,
ἵησι δὲ καὶ σιομενίοις ὁδόντας
διακλυζόμενον. τὰ δὲ ξυλάεια
χλωρὰ ἀντὶ καλαμῶδων παρ-
βιόμενα τοῖς ὁδόντι, σιμήχει τέ-
τοις. γίνεται δὲ καὶ ἐκ τῆς καρπῆς
αὐτῆς ἔλαιον συπτικόν, ἀρμόζον
πρὸς τὰ σύψκως δόμενα.

Πρὶ Ρήτινης ῥανίνης. Κεφ. σά.

Γεννᾶται δὲ καὶ ῥητίνη ἐξ αὐ-
τῆς ῥανίνης καλεμένη, ὥς ἐρίων
δὲ μασίχης. χρῆσιμύουτα πρὸς
αἵματος ἀναγωγὰς, καὶ πρὸς
παλαιὰ βήχα πινόμενη· ἐστὶ δὲ
ἐυσόμαχος ἐρευνκτική. μίγνυται
δὲ καὶ σιμήματα ὁδόντων.

καὶ

καὶ ὀπχρίσμασι προσώπῳ σπλ-
 βοποιοῦσα. ἀνακαλλᾷ δὲ καὶ τεί-
 χας ἐν ὀφθαλμοῖς, σῶμα τὸς τε
 εὐωδίαν περὶ διαμασσωμένη, καὶ
 οὐλῶν ἐστὶ σαλπικῇ. ἡγνᾷται δὲ
 5 καὶ καλλίστη καὶ πλείστη ἐν χίῳ
 τῇ νήσῳ. διαφέρει δὲ αὐτῆς ἡ
 λαμπυρεῖζουσα, καὶ τυρρηνικῇ κη-
 ρῷ ὁμοία τῇ λευκότητι, ἀδρά καὶ
 χαπτὰ καὶ εὐδρυεῖς καὶ εὐώδης.
 ἡ δὲ χλωρὰ ἡπίων. δολεῖται δὲ
 10 λιβαίου καὶ ῥητίνης σφοδρίνης μυ-
 γνυμένων αὐτῇ.

Πρὶ Τερμίνθου. Κεφ. εβʹ.

Τέρμινθος γνώριμον δένδρον,
 ἥς τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς καὶ ὁ
 φλοιὸς συμπικρὰ ὄντα ἀρμόζει
 15 πρὸς ἅ καὶ ἡ ῥίζη, σκευαζόμενα
 ὁμοίως καὶ λαμβανόμενα. ὁ δὲ
 καρπὸς αὐτῆς ὅστιν ἐδώδιμος, κα-
 κασόμαχος, οὐρητικὸς, θερμαντι-
 κὸς ἐστὶ δὲ αἰετος πρὸς ἀφροδί-
 σια, συνὸ οἶνω δὲ ποθεῖς, πρὸς
 20 φθαγγίων δυνάματα ἀρμόζει. ἡ
 δὲ ἐξ αὐτῆς ῥητίνη κομίζεται μὲν ἐξ
 ἀραβίας ἣ ἐν πέτρᾳ. ἡγνᾷται ὅ
 καὶ ἐν ἰουδαίᾳ καὶ συρίᾳ καὶ ἐν κύ-
 πρῳ καὶ ἐν λιβύῃ, καὶ ἐν ταῖς κυ-
 κλάσι νήσοις. ἡ δὲ καὶ διαφέρει
 25 διαγχετέρα οὔσα, λευκὴ, ὑαλί-
 ζουσα τῷ χρώματι καὶ κυανίζου-
 σα, εὐώδης τερμίνθου πνέουσα.
 πρὸς αἶμα δὲ πασῶν τῶν ῥητινῶν ἡ
 τερμινθίνη καὶ μετὰ ταύτῃ ἡ ῥη-
 τίνη, εἴτα ἡ πιτυίνη καὶ ἡ ἐλαπίνη.

& illitiones faciei, ad nitorem
 cuti conciliandum. Palpebras
 oculis incómodas replicat, má-
 ducata halitū oris commēdat,
 gingiuas contrahit. Optima &
 copiosissima in insula Chio p-
 uenit. Præfertur (nitedulę mo-
 do) resplendescēs, & candore
 Tyrrenicæ ceræ similis, adul-
 ta, retorrída, friabilis, odorata,
 stridoré ædens. Viridis auté in-
 ferior est. Adulteraí thuris, resi-
 næq; pineæ nucis mistura.

Terebinthus. Cap. XCII.

Terebinthus cognita ar-
 bor est, cuius folia, & semen,
 & cortex, adstringunt, & ad
 eadē ad quæ lentiscus con-
 ueniunt, simili parata modo
 sumptaque. Fructus esui aptus
 est, sed stomacho aduersatur:
 excalfacit, vrinam mouet, ve-
 nerem excitat, contra phalan-
 giorum morsus conuenien-
 ter in vino bibitur. Resina eius
 ex Arabia petræa defertur.
 Prouenit etiam in Iudæa, Sy-
 ria, Cyprio, Africa & Cyclá-
 dibus insulis: sed præualeat can-
 dida, perlucida, vitreo co-
 lore & in cæruleum vergen-
 te, odorata, terebinthum o-
 lens. Terebinthus resinas om-
 neis antecedit: proxima len-
 tiscina, & è pinu, & abiete:
 has

DIOSCORIDIS

has sequitur è picea & pineis nucibus refina. Natura omnibus calfacere, mollire discutere, expurgare. tussi ac tabi cõueniunt per se, aut in eclegmate ex melle, vitia pectoris expurgant, vrinam crient, cruda concoquunt, ventrem emolliunt, palpebras commodissimè replicant, lepras tollunt, cum ærugine ac lutorio atramento, nitroque: auribus saniem emanantibus cum melle & oleo, item in pruritu genitalium vtilis malagmatis, acopisque admiscuntur. La terù doloribus per se, illitu & appositu auxilio sunt.

Refinæ aliæ.

Cap. XCIII.

Liquida refina è pinu & picea, à Gallia & Hetruria conuehi solet, atque olim à Colophonie petebatur: hinc Colophonix sibi cognomentum vendicauit. A Gallia quoque subalpina: quã vernaculo nomine laricem appellant incolæ. Ea in linctu, & per se, magnopere prodest tussi veteri. Colore inter se distant: siquidem alia candida est, alia oleosa, alia mellei liquoris similitudine, vt laringa. Cupressus etiam liquidã fundit resinam, quæ

ῥηδ' ἀς ἀρεθμοῦ) ἢ τε πευκίνῃ καὶ ἢ σποδιλίνῃ. ἔστι δὲ πᾶσα ῥητίνη, μαλακτικὴ, θρῆματικὴ, διαχτυτικὴ, ἀνακαταρπτικὴ· βηξίν ἀρμόζουσα καὶ φθίσιον, ἐν ἐκλεκτοῖς καὶ δ' ἐαυτ' ἢ μὲν μέλιτος, ἀνακαταρπτικὴ καὶ τὰ ἐν θώρακος· ἔστι δ' καὶ ἄρητικὴ καὶ πέπτικὴ, κοιλίαν τε μαλακάζει ἐν τε ἀνακολλήσει βιζῶν ἀρμόζει τ' ἐν βρεφάροις, καὶ πρὸς λέπρας συν' ἰῶ χαλκοῦ καὶ χαλκαῖον καὶ νίτρω, πρὸς τ' τὰ ἰσχυρῶντα ὅτα συν' μέλιτι καὶ ἐλαίῳ, καὶ πρὸς κνησμὸν αἰδοῖς. μύζου δὲ καὶ ἐμπελάσσει, καὶ μαλακίμασι καὶ ἀκόποις, καὶ πλεονεξίας ἀλγύμασι βοηθεῖ καὶ δ' ἐαυτῶν ἐπιχειρεῖσα καὶ ἐπιπιδεμένη. 13

Πρὶ Πητίνης ὑγρᾶς Πητυίνης καὶ Πευκίνης. Κεφ. 57.

Γίνετ' ὅ ῥητίνη ὑγρὰ πητυίνη καὶ πευκίνη, κομιζόμεναι ἀπὸ γνησίας καὶ ὑρρήνειας, καὶ ἀπὸ κολοφωνος πάλαί ποτε ἐκομίζετο. εἶδεν καὶ δ' ἰσχυρῶν μίαν ἔχει κολοφωνία κληθεῖσα, καὶ ἀπὸ γαλατίας τῆς πρὸς ταῖς ἀλπεσι, ἣν ἐπιχωρίως οἱ δ' ἐποικοὶ λάρικα, ὀνομάζουσιν. ἐξόχως πείσσει. πρὸς ταῖς χρονίς βήχας ἐν ἐκλεκτῷ καὶ καὶ δ' ἐαυτῶν. διάφοροι δὲ εἰσι τῶν χρωμάτων καὶ αὐταῖ· ἢ μὲν γὰρ τίς ἐστι λευκὴ, ἢ δὲ ἐλαυδὴς, ἢ δὲ μέλιτι ὅμοιον ὡς πρὶν ἡ λάρικος. γίνεταί δὲ καὶ μπάειοσίνη ῥητίνη ὑγρὰ. ἢ τις

ἢς τις ποιῇ πρὸς τὰ αὐτά. τῆς
 αἰὲς τοι ἐκείνης, ἢ μὲν ὅτι σροβιλί-
 νη καὶ ἐλατίνῃ, ἢ δὲ πευκύνῃ, ἢ
 δὲ πτυλίνῃ. ἐκλέγου δὲ πασῶν
 τῶν ἐκείνων τῶν καὶ διανῆ καὶ
 μὴ καπυρῶν μὴ δὲ καὶ θυρῶν,
 καὶ ἐκείνῃ δὲ καὶ εὐδρυπῶν. δια-
 φέρε δὲ αὐτῶν ἡ πτυλίνη καὶ ἐλα-
 τίνη. ἐκείναι γὰρ εἰσι καὶ λιβα-
 νίζουσαι. κομίζονται δὲ διάφο-
 ροι ἐκ πτυσούσης τῆς νήσου, ἢ τις
 10 κείται κατὰ τὴν ἰσπανίαν. ἢ δὲ
 πευκύνῃ καὶ σροβιλίνῃ, καὶ κυπα-
 ρισίνῃ, ἐκείναι εἰσι, καὶ οὐχ
 ὁμοίως κέχλωται ταῖς δυνά-
 μεσιν ὥς ἐκείναι. παρακαμεί-
 νονται δὲ πρὸς ὅσα καὶ ἐκείναι.
 15 ἢ μὲν τοι χερίνῃ, ἀναλογεῖ. τῇ
 δεξιμίνῃ.

* Ἐπὶ λυγνύος ῥητίνης. Κε. 5 δ'.

Καίεται δὲ πᾶσα ῥητίνη ὑγρὰ
 ἐν τετραπασίονι ἀγρίῳ καὶ τὸ
 20 τὸ ἐκείνου ὑγρὸν ἀπὸ τοῦ δει-
 χῶν μὲν τῇ ῥητίνῃ, δὲ οὐχ ὡς
 ἐκείνῃ. ἐκείνῃ δὲ ἀνδράκων πρὸς, διπνε
 χῶς κυρτούτας ἀχρῆς ἢ ἀροστῶς
 ἢ ὡς καὶ εὐδρυπῶς καὶ καπυρῶς.
 καὶ ὡς τοῖς δακτύλοις ἐκείνῃ.
 25 πὸν δὲ ἰσπανίας εἰς κρᾶμευῶν
 ἀγρίον ἀκόνιτον, * τετέστιν ἀπὸ
 σωτον, ἀποτίθειται. γίνεσθαι δὲ ἐξ ὁ-
 χῶς λευκῆς, δὲ μὲν τοι πρὸς δι-
 νῆσιν πᾶσαν ῥητίνην τήκοντα
 ἵνα χωρίῃ τὸ ῥητίνης αὐτῆς.
 καίον)

que ad eadē pollet. Quæ verò
 aridarū generi ascribunt, quæ
 dā ex pineis nucib⁹, aliæ abie-
 te, aliæ picea & pinu exierunt.
 Eligi debet lógè omniū odo-
 ratissima, trās lucēs, nō retorri-
 da, neq; diluta, quādā ceræ faci-
 ciem præbēs, & friabilis. E pi-
 cea & abiete refinæ cæteras
 antecedūt: odoratæ enim sunt,
 atq; thus odore imitatur. Præ-
 stantiores à Pityusa insula defe-
 runt, quæ secūdū Hispaniā sita
 est. Sed q̄ è picea, nucib⁹ pineis
 & cupressō manarūt, nihil ad
 illas, nec tātis viribus potiūtur.
 Veruntamen eorundem gratia
 quorū & illæ sumi solēt. Lenti-
 scina terebinthinæ respōdet.

Fuligo refinæ. Cap. XCIII.

Vritur resina omnis liquida
 in vase quadruplæ capacitatis
 ad humore, qui infunditur: ita-
 que refinæ congius, in duobus
 aquæ pluviæ coquit, subiectis
 lentibus prunis, resina assidue
 mouet, donec omnis odor ab-
 oleatur, & friabilis & retorri-
 da reddat, ac digitis cedat. Ce-
 terū ubi rīfixit, in fictile non
 picatū, quod aconitū vocāt, id
 est non illitum, recōditur. Fiet
 etiam eximij cādoris, si resina
 omnis eliquata præcolet, quò
 fœculenta sordes excernatur.

Vritur

DIOSCORIDIS

Vruntur quoque sine aqua, pri-
mum lento igne : & vbi coire
coeperunt, maior carbonū stru-
es supponitur, & triduo citra
intermissionem discoquuntur,
vsque dum antedictas naturæ
suæ notas exuerint: mox, vt di-
ctum est, reponuntur. Aridas
vnius diei spatio decoxisse fa-
tis est. Vstæ odoratis malagma-
tibus, & acopis, & vnguento-
rum colorationibus magnope-
re vtilis sunt. E resina perinde
atq; thure fuligo excipitur, ad
circumlitiones idonea: quibus
palpebras fucant, & colorem
mentiuntur. Prodest glabris ge-
nis, collachrymationibus, ero-
sifq; oculorum angulis, ex ea
fit atramentum scriptorium.

Pix liquida. Cap. XCV.

Pix liquida, quam alij co-
num vocant, è pinguisimis pi-
ni piceæque lignis congrega-
tur. Optima est splendens, syn-
cera, lævis. Contra venena,
phthisin, purulentam excrea-
tionem, tusses, suspiria, & pe-
ctoris humores, qui difficile
extusuntur, efficax est, ecle-
gmate cyathi mēsurā cū mel-
le dato. Tonsillarum & vuæ in-
flammationes, anginaq; vtili-
ter perunguntur: purulētis au-
ribus infunditur cum rosaceo,

&

καίονται δὲ καὶ διχα ὕδατος ἐπ'
ἀνδράκων κύφως τοῦ ὄφθου· ὁ-
ταν δὲ μέλλωσι* συστέφειν ἀνδρά-
κας καὶ πολλὰς ὑποδείκνυνται τὸν ἀν-
δράκας, καὶ ἐν τῷ ἀδιαλήπτῳ
ἐφ' ἡμέρας καὶ νύκτας τρεῖς, ἃ-
ς ἂν τὸ περιεργασθῇ ἰδίωμα
ἀπολίπωσιν, ἀποτίθεται ὅπως εἰ-
ρηται. τὰς μὲν τοὶ ξηρὰς ἀρχέσει
δι' ὅλης ἡμέρας ἐξήσαντας ἀπο-
τίθεται. ὅταν ἡμεῖς δὲ καὶ αἱ κε-
καυμένοι, εἰς τε τὰ ἐνώδη τῶν
μαλαγμάτων καὶ ἀκοπῶν, καὶ εἰς
χρωματισμὸν μύρων. ἐκλαμβά-
νε' ὅ καὶ λιγὴς ῥητίνης ὥς πρὶν
τῷ λευκῷ ἢ τῷ χροσμένῳ πρὸς τε
καμιλέφαρα, καὶ περικελευμένους
καυδοὺς καὶ μωδῶντα βλεφάρων, καὶ
δακρύνοντας ὀφθαλμούς. γίνε' δὲ
ἐξ αὐτῆς καὶ μέλαν ὡς χροσμένον.

Πρὶ Πίσης ὑγρᾶς. Καθ. σέ.

Πίσα ἢ μὲν ὑγρὰ καὶ ἔστι
καὶ ὁ καλοῦσι, συνάγεται μὲν
ἐν τῷ λιπαρωτάτῳ ξύλῳ, πύ-
κνης καὶ πίπτος. ἐστὶ δὲ καλὴ ἢ σί-
λουτα καὶ λεῖα καὶ καθαρά. ποιεῖ
δὲ πρὸς θανάσιμα φάρμακα,
φθισικὰς, ἐμπυρρῆς, ἐν χυμῷ, ἀ-
ματὰ δυσανάγωγα τῷ ἐν θώρακι
ὑγρῶν, ἐκλεγχόμενῃ καὶ αὐτοῦ πλῆ-
θος μετὰ μέλιτος. ποιεῖ δὲ καὶ
πρὸς τὰς τῶν ταριδμῶν καὶ σαρ-
φυλῆς φλεγμονὰς καὶ συνάγ-
χας διαχρησόμενῃ· καὶ πρὸς τὰ
πυορρῶντα ὡς αὐτὸ ῥοδίνον.

καὶ

ἢ πρὸς ἐρπετῶν δ' ἵγματα συν
 ἅλοι λείοις καταπλασσομένη, κη
 ρῶ δ' ἴσῃ μίξεισα, λεπτέρως ὀνυ-
 χας ἀφίσῃσι, φύματά τε ὑγέρας
 καὶ σκληρείας δακτυλίου διαφρί-
 5 ρεῖ· συν κριδίῳ δ' ἐψηθεῖσα
 ἀλεύρω καὶ παιδὸς οὐρῇ, χοιρά-
 δας περὶράσῃ· μετὰ δ' εὐδαίμων
 ἢ πτύον φλοιῷ ἢ πτύρῳ, ἐρπη-
 τας ἐπέχει καταχρησσομένη· μαν-
 νῇ δ' καὶ κηρίῳ μίξεισα, τὰς ὑ-
 10 πεφραγὰς παρακολλᾷ, πρὸς τε
 τὰς ἐν ποσὶ καὶ δακτυλῷ ροιᾶ-
 δας ἀρμόζει καταχρησσομένη, πλη-
 ροῖτε τὰ ἔλκη, καὶ ἀποκαθαίρει
 συν μέλιτι, συν σαφίρῃ δ' ἢ μί-
 λιτι, ἀνδραγας ἢ σινπεδόνας πε-
 15 ριχαράσῃ· μίγνυται δ' καὶ
 σπῆλαις χρυσίμωσι.

Πρὶ Πιστέλαις. Κεφ. 55.

Τίνεῖ δ' ἢ πινέλαιον ἐκ τῆς
 πίπης, χωρίζοντες τ' ὑδαλώδεις
 αὐτ' ἐφίστα· τὸ τε τοῦ καδάσῃ ὀρ-
 20 ρὸς γάλακτι, ἢ ἐκλαμβάνεῖ δ' ἐ-
 ν ἡν ἐψησῇ τ' πίπης, ὑπεραιωρα-
 μένως ἐρεῖ κατὰρ, ὅσῃ ὅταν ἐκ τ'
 ἀναφρομένη ἀμὲν γλῶττι διαβρο-
 χον, ἐκθλίβεῖ εἰς ἀγγεῖον, καὶ τὸ
 γίνεῖ ἐφ' ὅσον ἀν χροόν ἢ πᾶσα
 25 ἐψηθῇ. ποιεῖ δ' πρὸς ὅσα καὶ ἡ ὑ-
 γρὰ πᾶσα, δασυῖ δ' ἢ ἀλώπε-
 κίας καταπλασσομένη μὲν κριδί-
 νη ἀλεύρω περὶ πύρ δ' ὅσο τοῦ καὶ ἡ
 ὑγρὰ πᾶσα, καὶ τὰ ἐπὶ τ' κτύων
 ἔλκη καὶ ψόφους ἐπιχρησσομένη.

Πρὶ

& illinif cū trito sale serpentium
 morfib⁹: adiecta vero paricera
 scabros vngues extricat, impe-
 tiginēsq; emēdat: vuluæ duriti-
 as ac sedis tubercula discutit:
 cū farinaq; hordeacea et pueri
 ipubis vrina decocta, strumas
 rūpit: cohibet vlcera q; serpūt,
 cū pineo cortice, aut sulphure,
 aut furfuribus illita. Cæterū cū
 thuris māna & cerato. pfūdos
 vlcerū sin⁹ cōglutināt, rimis fe-
 dis & pedū, magno auxilio illi-
 nit: vlcera replet, & cū melle
 purgat: quin & cū vua passa, et
 melle carbunculos, & putrida
 vlcera emarginat, disrumpitq;
 erodētibus medicamētis, quas
 septas vocāt, pbe immiscetur.

Picinū oleū. Cap. XCVI.

Epice fit quod pisselæon ap-
 pellāt, separato liquore aquo-
 so, qui supernatat pici, sicut fe-
 rum lacti. Nam expansa, quā-
 diu pix coquitur, supra cortis
 nam vellera pura madescunt,
 acceptoque halitu eius expri-
 muntur in vas. Quas pix liqui-
 da, præbet vtilitates. alopeci-
 as capillo replet cum farina
 hordeacea illitum, qui-
 bus & liquida pix mē-
 detur iumētorum
 vlcera scabiēm-
 que emēdat.

f Fuligō

DIOSCORIDIS

Fuligo liquidæ picis.

Cap. XC VII.

Fit hoc modo è liquida pice fuligo: In lucerna noua q̄ ellychnium habeat, nonnihil picis incendito, lucernáq; fictili vase in clibani speciem cōformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, vt clibani esse solent; operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore nouū infundito, quo ad sufficientem vfui fuliginem collegeris. Vis ei adstringēs, acrisq;. Vtui est ad pigméta quib^o palpebras linunt & venustant, & ad circūlitiones. Item vbi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lachrymofosq; oculos, insuper ad eorūdem vlcera non inutilis est.

Pix arida.

Cap. XCVIII

Liquida pix decocta in spissam coit, quā vocant aliqui palimpissam: quo in genere quedam visci modo lentescit, boscas cognominata: altera ficca est. Probat̄ pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæque simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula pannósque discutit, vlcera

Πρὶ Λιγνύος τῆς ἐξ ὑγρᾶς
πίσσης. Κεφ. 57.

Γίνεται δὲ καὶ λιγνὺς τῆς ὑγρᾶς πίσσης οὕτως· εἰς λύχνον καμνὸν ἐλλυχνιασμένον δοῦς τὴν πίσσης, ἄλφον καὶ πωμάσας τὴν λύχνον καμνὸν ἀγγεῖω κεραμέω κλισανοειδεῖ, ἀνωθεν μὲν πεφρεῖ καὶ σενῶ, κάτωθεν δὲ τρεῖς ἔχοντι καὶ δάπεροὶ κλισανοὶ, ἕα κλείεσθαι, ὅταν δὲ ἀναλοθῇ τὸ πεφρῶτον ὑγρὸν, ἄλλο ἐπιχέει, ἰσῆως ἂν αἰθαλώσης λιγνὺν αὐτάγκη, καὶ χεῶ. Διώαμιν δὲ ἔχει δριμύειαν καὶ συπτήκην. χησεὸν δὲ αὐτῇ, εἰς τὰ καλλιστέφαρα καὶ περὶ χεῖρας, καὶ ὅπου μωδηκότα βλέφαρα τειροφυῖσαι δεῖ, καὶ περὶ ἀδενέστερα καὶ σακρυρρόωντα· ἐπὶ δὲ εἰς ἐλκῶδη ὅμματα χησίσιμος.

Πρὶ Ξηρᾶς πίσσης.

Κεφ. 58.

Ἡ δὲ ξηρὰ πίσσις, ἐφορμῆς τῆς ὑγρᾶς γίνεῃ· καλεῖῃ δὲ αὐτὴ ἐπὶ ἐπίων παλίμπισσα. γίνεῃ δὲ αὐτῇ, ἢ μὲν τις ἐξώδης, βοσκαὶ καλαμῆνη, ἢ δὲ, ξηρὰ· ἐστὶ δὲ χαλὴ ἢ χαδαρά, καὶ λιπαρά, ἐνώδης τὴν καὶ ὑπομῆρρος καὶ ῥητινώδης. ταύτη δὲ ἐστὶν ἡ λιχιακὴ καὶ βρυτήια δύο φύσεων ἐχομένη πύσσης ἅμα καὶ ῥητίνης. Διώαμιν δὲ ἔχει δριμύτην, μαλακτικὴν, πνοοποιὸν, διαφρεστικὴν φυμάτων καὶ φυγέθλων, καὶ

καὶ πληρώσκειν ἐλκῶν, μύζην) δὲ
καὶ τραυματικοῖς χησίοις.

Πρὶ Ζωπίσσης. Κεφ. 58'.

5 Ζωπίσαν δὲ οἱ μὲρ, εἶπον τὴν
ἐκ τῶν παλαιοῶν ξυρομύλῳ ρητίνην
μετὰ τῷ κηρύ, καλοῦ μύλῳ ὑπὸ
ἐρίων ἀπόχυμα, οὕσαν διάχυ-
κὴν διὰ τὸ ἐν τῇ θαλάσῃ βρέ-
χεσθαι· οἱ δὲ, τὴν πτυνίλῳ ρητί-
νῳ ἔτιωσ ὠνόμασαν.

Πρὶ Ασφάλτου. Κεφ. 59'.

10 Ασφάλτος διαφέρει ἢ ἰουδαϊ-
κὴ τῆς λοιπῆς· ἐστὶ δὲ καλὴ ἢ πορ-
φυρεσθεῖδης σίλβουσα, αὐτόνος τῇ
ὀσμῇ καὶ βαρεῖα· ἢ δὲ μέλαινα καὶ
ῥυτωδὴς φάυλη. δολεῖται γὰρ
πίσσης μίγνυμύνης. ἡνυᾶται καὶ
15 ἐν φοινίκῃ, καὶ ἐν σιδόνι, καὶ ἐν
βαβυλωνί. καὶ ἐν ζακύνθῳ· γί-
νεται δὲ καὶ κατὰ τὴν ἀκραγαπεί-
νων χώραν τῆς σικελίας, ὑγρὸν ἔ-
πλην χρόμνον ἔκ κρήναις, ὃ χεῖν-
ται εἰς τοὺς κύκλους αὐτὴ ἐλαίου,
20 καλοῦντες αὐτὸ σικελὸν ἔλαιον,
παλαιώμενοι· ἐστὶ γὰρ ἀσφάλτου
ὑγρᾶς εἶδος.

Πρὶ Πιττᾶσφαλτου. Κεφ. 60'.

Καλεῖται δὲ τις καὶ πιττᾶσφαλ-
τος ἡνυᾶμένη ἐν ἀπολλωνία τῇ
παρὰ τὸν ἐπιδάυρων, ἢ τις ἐκ τῶν κηρύ-
25 νίων ὁρῶν συγκαταφέρεται, τῇ τῷ
ποταμοῦ ῥύμῃ, καὶ ἐμβράσσεται
κατὰ τὰς ἡϊόνας, βαλοεῖδως συμπε-
πηγυῖα, ὅζουσα πίσσης μεμύμε-
νης ἀσφάλτου.

ulcera replet, vulnerariis medi-
caminibus commodè permiscet.

Zopissa. Cap. XCIX.

Zopissam aliqui aiunt dera-
sam nauibus resinam cum ce-
ra, quam alij apochyma appel-
lant. Ea dissipandi naturam ha-
bet: quoniam marino sale ma-
cerata sit. Alij pineam resinam
hoc nomine vocauerunt.

Bitumen. Cap. C.

Bitumē Iudaicū cæteris an-
teponitur. Cuius probatio est,
ut purpuræ modo splendeat,
sitq; pöderosum, ac validū odo-
rem vibret. Nigrū autē & for-
didū, vitiosum est. Adulteratur
pice. Gignitur in Phœnice, Ba-
bylone, Zacyntho, & Sydone.
Liquidum inuenitur in Agra-
gantino Siciliæ, fontibus inna-
tans: quo utuntur ad lucerna-
rum lumina, olei vice. Halluci-
nantur, qui id Sicilicū oleū nō
minant: nanq; liquidi bitumi-
nis genus esse constat.

Pissasphaltum. Cap. CI.

Nascitur in Apolloniatarum
agro circa Epidaurum, quæ pis-
sasphaltos appellatur. Ea Ce-
rauniis montibus deuoluta, im-
petu fluminis rapitur, æstuque
in littus expuitur, illic coacta
in glebas, mistam bitumini pi-
cem redolet.

Πρὶ

f ij Naphtha.

DIOSCORIDIS

Naphtha. Cap. CII.

Naphtham vocant Baby-
lonij, bituminis colamen, co-
lore cādidum: inuenitur etiam
nigrum. Vis ei ignium rapax,
ita vt ex spatio protinus in
eam transfiliant. Ad suffusio-
nes oculorum, & albugines
vtilis. Bitumen omne discu-
tit, glutinat, emollit, ab inflam-
matione tuetur: vuluarum pro-
cidentia, strangulationesque
olfactu, suffitu, imposito, emē-
dat: comitiales morbos suffi-
tum deprehendit, gagatæ lapi-
dis more: purgationes mulie-
rum cum vino, & castorio po-
tum elicit, tussim veterem &
anhelitum adiuuat, serpen-
tium moribus, coxendicum
laterumque doloribus auxilia-
tur, datur coeliacis in catapo-
tio deuorandum, cum aceto
potum discutit sanguinem cō-
cretum, dysentericis cum pti-
fana liquatum infunditur, di-
stillationibus suffitione mede-
tur, mitigat dentiū dolores ob-
litum, cæterum pilos incōmo-
dos ficcū replicat, specillo im-
positum: cōcalfactum autem,
& cum farina hordeacea, ni-
tro & cera illitū, podagris, ar-
ticulorum doloribus, lethargi-
cisque prodest. Pissasphaltos
eadem,

Πρὶ Νάφθας. Κεφ. ρβ'.
Καλεῖται δὲ τις ἡ νάφθα, ὅθεν
ἐστὶ τὸ βαθυλωνίε ασφάλτε ὡς
ἡδιμα, τῷ χρώματι λευκόν· εὐ-
εῖσκέται δὲ ἡ μάλα. Δυνάμει
ἔχον ἀρπακτικὴν τῷ πυρὸς, ὥς τε
ἡ ἐκ διασθήματος ἀπάσιν ἴστος,
ὅθεν πρὸς ὑποχύσεις χροσμεύει
ἡ λευκώματα. Δυνάμει δὲ ἔχει
πάντα ἀσφαλτος ἀφλέγμαντον.
κολλητικὴν, διαφορητικὴν, μαλα-
κτικὴν, πεινῶσαν πρὸς πίνης ὥστε
εὐχὰς ἡ περιώσεις· περὶ σι-
μῶν ἡ ὁσφρανομῶν ἡ ὑποδυ-
μιωμῶν· ἐλέγχει δὲ ἡ ἐπιληπτι-
κοὺς ὑποδυμιαθεῖσα κατὰ τὸ
καὶ ὁ γαγῆτις λίθος· πνομῶν δὲ
μετ' οἶνε ἡ κασοεῖς ἐμμελῶνα
νεῖ ἡ βηξί χροσνίαις ἡ ἀσθματι-
κοῖς ἡ δυσπνοίαις βοηθεῖ, ἡ ἐρ-
πετῶν δύνμασι, ἡ ἰγρίων πόνοις ἡ
πλευρῶν· δίδεται δὲ ἡ κοινα-
κοῖς κατὰ πόπον, ἡ θρόμβους αἵ-
ματος διακλύει συν' ὅξει ποθεῖσα·
ἐγκλύζεται καὶ ἐπὶ δυσεντερι-
κῶν συν' ἡ σίανη τακεῖσα, ἡ κα-
τὰ ῥρους ὑποδυμιωμῶν διερα-
πύς, ἡ ὁδόν των ἀλγῆματα πε-
ριπλαθεῖσα πρὸς ὕναι, ἀνακολ-
λᾷ δὲ καὶ τείχαις ἡ ἐνερῶ διὰ
μυλωπιδος· διεμαρθεῖσα δὲ ἀ-
ρήγει π, καὶ ποδαγρικοῖς, καὶ ἀρ-
θρητικοῖς καὶ ληθαργικοῖς συν'
ὡμῇ λύσει ἡ κηρῷ ἡ νίτρω κατὰ
πλάθεῖσα· ἡ δὲ πηπῆ ἀσφαλτος
δυνάμει

διώεται ὅσα πῖστα καὶ ἄσφαλ-
τος μίχρτα.

Πρὶ Κυπαρίσσου. Κεφ. ργ'.
Κυπαρίστος εὐφει, ἡύχει ἥς τὰ
φύλλα ποθέντα μὲν γλυκεὸς καὶ
5 σμύρνης ὀλίγης, κύσει ρευματιζο-
μένη καὶ δυσουρίας βοηθεῖ. τὰ
δὲ σφαιρεία κοπέντα καὶ σὺν ὀ-
νῷ πινόμην, ἀρμυρῇ πρὸς αἵμα-
τος ἀναγωγῇ καὶ δυσεντερείαν,
καὶ κοιλίας ρευματισμὸν, ὁρδόπνι-
10 αν, βήχα καὶ τὸ ἀφελήματα αὐτῶν
τὸ αὐτὸ ποιεῖ. μαλάττει δὲ καὶ
σκληρίας κοπέντα μετὰ σύκου,
καὶ πολυπόδας πόνον ἐν μυκτῆρσιν
ἱάται, ἐμβαλλει δὲ καὶ λεωρῶν-
τας ὄνυχας, σὺν ὅξϊ καθεψηθέν-
15 τα καὶ λειανθέντα μετὰ δέρμων,
τέλλει δὲ καὶ ἐντερικήλας κα-
ταπλαθέντα. καὶ τὰ φύλλα δὲ
αὐτὰ ποιεῖ. δοκεῖ δὲ καὶ κώνωπος
διώκειν τὰ σφαιρεία μετὰ τῆς
κάουης θυμαθέντα, τὰ δὲ φύλ-
20 λα λεῖα καταπλαττόμενα, πρᾶύ-
ματα κολλᾷ. ἔστι δὲ καὶ ἰσχαιμα,
σὺν ὅξϊ δὲ λειωθέντα, πείχας
βάπτει, καταπλαστέται δὲ καθε-
αὐτὰ καὶ σὺν ἀλφίτῳ πρὸς ἐρυ-
σιπέλατα καὶ ἔρπητας, ἀνδραίχας,
25 καὶ πρὸς ὀφθαλμῶν φλεγμονάς,
κρητῇ δὲ μίχρτα, σωμαχὸν κρη-
τῷ ἐπιπδέμενα.

Πρὶ ἀρκυρῆδος. Κεφ. ρδ'.

Ἔστιν ἀρκυρῆς ἡ μὲν μικρὰ ἢ, ὅ
μεγάλῃ δριμύτι δὲ ἀμφοτέρω,
διερρη-

eadem, quæ pix & bitumen, si
misceantur, potest.

Cupressus. Cap. CIII.

Cupressus refrigerat, & a-
stringit. Cuius folia ex passio,
& exiguo myrrhæ pota, vesicæ
rheumatismis, & urinæ diffi-
cultati auxiliantur. Pilulæ au-
tem ex vino tuscæ in dysente-
ria, alui fluxione, tussi, & or-
thopnoea, aut si reiciatur san-
guis, conuenientissimè bibun-
tur: earum decoctum eosdem
præbet effectus: tuscæ cum fi-
co duritias emolliunt, narium-
que polypo medentur: in ace-
to coctæ, & cum lupinis de-
tritæ scabros yngues eiciunt:
hernias intestinorum prolapsu
erumpentes illitu reprimunt.
Folia eadem præstant. Pilulæ
cum arboris coma suffitæ, cu-
lices abigere existimantur. Fo-
lia trita & iposita, vulnera cō-
glutinant: sanguinem suppri-
munt, capillum ex aceto tin-
gunt, illinuntur per se, aut cum
pollenta ignibus sacris, vlceri-
bus quæ serpunt, carbunculis
& oculorum inflammationi-
bus, admota cū cerato stoma-
chum corroborant.

Iuniperus. Cap. CIII.

Iuniperi gña duo: altera maior
altera minor, vtræque acris est.

f iii Excal-

DIOSCORIDIS

Excalfacit, & vrinā mouet, accensa serpētes fugat. Baccarum nōnullæ nucis iuglādis magnitudine nōnūquā grandescere, aliæ nucē Pōticā æquare inueniunt: rotūdæ, odoratæ, in mādendo dulces, subamaræ, q̄ arceuthides etiā, id est baccæ iuniperi, nominant̄. Modicè calfaciūt: & astringūt, stomacho vtiles, cōtra pectoris viti, tussim, inflatiōes, tormina, & serpētiū ictus efficacissimè bibunt: vrinā ciēt, vnde ruptis, cōuulsis, & vuluæ strāgulatui subueniunt.

Herba Sabina. Cap. CV.

SABINA duorum generum est. Vna foliis cupressifolii similis, spinis horridior, grauius olens, acris & feruens: arbor est coactæ breuitatis, quæ sese magis in latitudinem fundit: huius foliis nonnulli pro suffitu vtuntur. Altera tamarici folio similis est. Vtriusque folia nomas sistunt, collectiones illitu mitigāt, & cum melle nigritias sordēsque repurgant, carbunculos cum vino, posita rumpunt, sanguinem per vrinam eliciunt, partus apposita extrahunt, & suffitu idem præstant, vnguentis calfacientibus immiscentur, & priuatim

διουρητικαὶ καὶ δερματικαὶ, θυμωόμεναι τε θηεῖα διώκοισιν, ὁ δὲ καρπὸς αὐτῶν ὁ μὲν τις χαρύου μέγιστος εὐείσκειται· ὁ δὲ χαρύου ποντικῷ ἴσος· στρογγύλος τὲ καὶ ἐνώδης καὶ γλυκὺς ἐν τῷ διαμασάσθαι, καὶ ὑπόπικρος, ἀρκευθὶς χαλούμενος, δερματικὸς μετέως καὶ συπτικὸς, ἐν σφύμαχος· πιδῶν περὶ τὰ ἐν θώρακι καὶ βλάχας καὶ πνευματώσεις καὶ σφοδρὺς καὶ θηεῖα πινόμενος· ἐστὶ δὲ ἰσχυρὸς καὶ οὐρητικὸς, ὁ δὲ καὶ σπασμῶσι καὶ ῥήγμασι καὶ ὑστερικῇς πνευμέναις ἀρμόζει.

Πρὶ Βράθυος. Κεφ. ρε'. Βράθυος, ἐνίοι βαράθρον καλεῖσθ' ἐστὶ τῆς εἰδὴ δύο. τὸ μὲν γὰρ αὐτὸ ἐστὶ τοῖς φύλλοις ὁμοίον κυπαρίσσω, ἀκαθιδόδεςρον δὲ καὶ βαρύτερον, δριμύ, πυρρῶτικόν· κολοβὸν δὲ τὸ δένδρον καὶ εἰς πλάτος μάλλον χεόμενον. χεῶν δὲ πινεῖ τοῖς φύλλοις ἀντὶ θυμάματος. Τὸ δὲ ἔτρον μυρίκη τοῖς φύλλοις ὁμοίον, ἀμφοτέρων δὲ τὰ φύλλα ἴσησιν νομάς, καὶ φλεμοναῖς καταπλατόμενα περὶ τῆς ἀποκαταίρεως τῆς μελανίας συνὲς μέλιτι καταπλασόμενα, καὶ τὰς ῥυπαρίας καὶ ἀνδραγμὰς περὶ τῆς συνὲς οἴνω περὶ τῆς καὶ αἵματι ἥρων ἀγρῇ, ἐμμενα τὴν ἐκ τῆς ἀγρῆς, περὶ τῆς καὶ ὑποθυμαθέντα, τὸ αὐτὸ ποιεῖ μέλιτι καὶ τοῖς θερμαστικοῖς χρίσμασιν,

σπ, ἰδίως δὲ τῷ γλευκίνῳ.

Πρὶ Κέδρου. Κεφ. ρς'.

Κέδρος δένδρον ἔστι μέγα, ἐξ ἧς
ἡ λεγόμενη κεδρία σπυράγι καρ-
πὸν δὲ ἔχει ὥς ἂν ἀφ' αὐτοῦ, * φέ-
5 ρουσα μέγιστος, μύρτις αὖτε φερρῇ.

Τῆς δὲ κεδρίας αἰεὶς ἡ παχεῖα
καὶ διαυγής, βαρεῖα τῇ ὁσμῇ· ἀπο-
χομένη δὲ καὶ σαλαγμούς ἐπι-
διαμένουσα καὶ μὴ διαχομένη.

Διώαμιν ὃ ἔχει σπηληκὴν μὲν τῶν
10 ἐμψύχων, φυλακτικὴν δὲ τῶν νε-
κρῶν σωματίων· ὁθεν καὶ νεκροῦ
ζωὴν πηγὴς αὐτὴ ἐκάλει· καὶ ἰμά-
τια ὃ καὶ δέρματα φέρει διὰ τὸ
θρῆσκον ἐπιτίλιμένης καὶ ξηραί-
νεν· ἐνδετεῖ ὃ εἰς τε ὀφθαλμικὰ

15 ὀφθαλμικὰ ἔσται ἐλκυσμένη, καὶ λευ-
κώματι, καὶ ἐλαὶ σμύχει, συν' ὅξφι
διακλυζομένη, σιρόληκας τὸν ἐν
ὥσιν κλίνει, ἡ γὰρ τε καὶ συριγμούς
παύει σὺν ὑπόπτεσσι ἀφελήματι ἐγ-
χομένη, εἰς τε ἐμβροήματα ὁδόν-

20 τῶν ἐν σαλαγέσσι, θραύει μὲν τὸν
ὁδόντα, παύει δὲ πλὴν ἀλγυδόντα,
συν' ὅξφι ὃ διακλυζομένη τὸ αὐτὸ
ποιεῖ, περὶ χυλιδεῖσα δὲ αἰδοῖω
περὶ τῆς σπυράγης, ἀπόκλον' ἔστι,
σπυράγκων τε περὶ χυλιδεῖσός ἔστι καὶ

25 παιδομίον φλεγμοναῖς βοηθεῖ,
φθεῖρας τε καὶ κόνιδας φθεῖρας πε-
ριχυιδεῖσα, καρδίου δὲ δύνιασι
συν' αἰσὶ καταπλασσομένη, ἀρῆ-
ξι, πρὸς τῇ λαβῶν θαλασσίῃ πόσιν,
ἐν γλυκεῖ λαμβανομένη βοηθεῖ,
ὁφελεί

priuatim gleucino.

Cedrus. Cap. CVI.

Cedrus arbor magna est, ex
qua picē colligunt, quæ cedria
vocatur: iuniperi modo bac-
cas parit, baccarum myrti ma-
gnitudine, rotundas. Cedria o-
ptima est crassa, perlucida, gra-
uis odoris: quæ dū effunditur,
guttatim nō dissipata coit. Cui
ea vis inest vt defuncta corpo-
ra conseruet, & viuentia cor-
rumpat, qua ex causa mortuo-
rum vitam aliqui appellauere.
Vestimenta quoque, & pelles
eximia calfaciendi, & ficcandi
dote, corrumpit: magni ad o-
cularia medicamēta vsus, quip-
pe illita oculis claritatem af-
fert, albugines cicatricēsq; de-
tergit, instillata autem cum a-
ceto vermes aurium neeat, cū
hyssopi decocto infusa soni-
tus sibilosque fedat, canis den-
tium indita eos frangit, & do-
lores leuat, idem facit cū ex
aceto colluitur: peruncto ante
coitū genitali abortiuum fieri
constat, anginae ea perungunt,
tonsillarum inflammationibus
auxilio est, lentes pediculosq;
illitu enecat, cērastra morsibus
cum sale imposita subuenit, cō-
tra hausta leporis marini vene-
na, in passo sumpta auxiliatur.

DIOSCORIDIS

in elephantia, aut linctu, aut perunctione proficit: pulmonum ulcera purgat, & si cyathus eius sorbeatur, per sanat: vermes & tineas subter inditaneat, & partus extrahit. Fit & oleum, à cedria separatū, dum coquitur, velleribus supra habitum eius expansis, vt in pice. Eiusdem ad omnia vsus: priuatim vehemēter perunctum scabiem quadrupedum, canū, boumque per sanat: inhærentes ricinos enecat, ulcera quæ ex tonsura acceperunt, ad cicatrices perducit. Cedrides cedri fructus vocantur. Calfactoriam vim habēt, stomacho aduersantur, auxilio sunt tussi, conuulsis, ruptis, stranguriæ: menses ciunt, ex polline piperis poti: contra haustum leporem marinum in vino sumuntur, serpentes fugantur, peruncto ex adipe ceruino aut medulla, corpore: in antidota adduntur. Fuliginem, quomodo ex pice, congeri oportet, quæ eandē, quam picea fuligo vim præbet.

Laurus. Cap. CVII.

Laurus quædam tenui folio constat, altera latiore. Vtraque ex calfactoriâ naturam habet, & emolliētē. Vnde decoctū earum

ώφελεῖ καὶ ἐλεφαντιῶντας ἐκλεχολύει, καὶ θάρι καὶ τὸ ἐν πνεύμονι ἔλκη, καὶ ἰσθται ὅσον κύαθος ῥοσφύει· συνώληκός τε καὶ ἀσκαρίδας ἐγκλυζόμεναι εὐθείρει καὶ ἐμβρυα κατὰ σπῆν. γίνεται δὲ καὶ ἔλαιον ἐξ αὐτῆς χρείζόμενον ἀπὸ τῆς κεδρίας δι' εἰς ὑδατομενέων ἐν τῇ ἐλπίσει ὡς ἐπὶ τῆς πίσεως, περιωὴ παρὲς ὅσα καὶ ἡ κεδρία. Δερμα πύρι δὲ πᾶσι τοῖς ἰδίοις καὶ τοῖς ἐπὶ τῆς πέρας ψώμι καὶ κυνῶν καὶ βοῶν ἀνδρικοῦ κατὰ χεῖρας ὁμῶς, καὶ πᾶσι ἐπ' αὐτῶν κρότωνας φθείρει, καὶ πᾶσι ἐπὶ τῇ περὶ γινούσας ἐλκώσεις αὐτῶν ἐπουλοῖ. τῷ δὲ λιγνῷ συνηκτέον ἰσ αὐτῆς ὡς ὅτι τῷ τῆς πίσεως δύνανται ἔχουσαι τὸ αὐτῷ ἐκείνη. *κεδρίδες δὲ καλουμένη οἱ ἐξ αὐτῆς καρποί. Διὸ αὐτὴ δὲ ἔχουσι δερματικὴν, κακοσόμαχον. βουδῶσι δὲ βηξί, πύσιν, ἀσκαρίδας, ῥοσφύας, καὶ ἐμβρυα ὅσοις μετὰ πεπέρως λείβονται, καὶ παρὲς λαγῶν θαλασσίαν πίσιν συνὸν λαμβάνονται. διόκοισι καὶ θηρίαι χρομύς τὸ σῶμα τοῦ συνὸ ἐλαφίως σέατι ἢ μυελῷ, μύρτυται δὲ καὶ ἀντιδότοις. 25

Πρὶ Δάφνης. Κεφ. ρζ'.
Δάφνη, ἡ μόνη τις ἐστὶ λεπτόφυλλος, ἡ δὲ, πλατυτέρα. Δερματικαὶ δὲ ἀμφοτέραι καὶ μαλακτικαί. ὅστις τὸ ἀφέψημα αὐτῶν

αὐτῶν εἰς ἐγκύσματα τὰ πρὸς
 μήτραν καὶ κύστιν ἀρμόζει. τὰ δὲ
 χλωρὰ τῶν φύλλων, ἡρέμα ὑποσύ-
 φει ὠφελεῖ δὲ λεία κατὰ πλάγην-
 τα, σφικτῶν καὶ μελητῶν πηλίας.
 5 Διῶνται ὅ καὶ πᾶσαν φλεγμονὴν
 παρῆνεν συνὶ ἀλφίτῳ καὶ ἀφ' ὧν
 κατὰ πλάγην, ποθένια ὅ παρῆν
 γει τὸν σόμαχον, καὶ ἐμέτοις κινεῖ.
 Αἱ δὲ διαφνίδες, δεξμαντικώτεραι
 τῶν φύλλων εἰς ποικίσιν οὖν ἐκ-
 10 λήχρῳμα λείαι σὺν μέλιτι ἢ γλυ-
 κεί, πρὸς φθίσιν καὶ ὀρθόπνοιαν καὶ
 τὰς πρὸς δώρα καὶ ρευματισμοὺς
 πίνονται δὲ συνὶ οἶνῳ πρὸς σκορ-
 ποπλήκτους, καὶ ἀλφούς δὲ
 σμύλκισι. τὸ δὲ πῆγμα αὐτῶν,
 15 ὠταλγίας καὶ δυσκοίαις βοηθεῖ,
 συνὶ οἶνῳ παλαιῷ καὶ ῥοδίνῳ ἐγ-
 χροδύμον. μέγνυται καὶ ἀκόποις
 καὶ συγχρίσμασι δεξμαντικοῖς καὶ
 διαφορτικοῖς. ὁ δὲ φλοιὸς τῶν ῥι-
 ζῆς αὐτῶν, λίθοις δρῦπτι καὶ ἐμ-
 20 βρυα κτείνει καὶ ἡπατικοῖς ὠφε-
 λεῖ, τειοβόλου παλῆδος συνὶ οἶνῳ
 εὐώδει πινόμενος.

Περὶ Πλαταίνου. Κεφ. ρή.

* Πλατάνε τὰ τερυφρὰ τῶν φύλ-
 λων ἐψηθέντα. ἐν οἶνῳ καὶ κατὰ
 5 πλάγην, σέλλῃ ρεύματι ἀφθαρ-
 μῶν, κουφίζει δὲ καὶ τὰ οἰδήματα
 καὶ φλεγμανάς. ὁ δὲ φλοιὸς ἐψηθεὶς
 ἐν ὄξει, ὀδονταλγίας ἐστὶ διάκλυσ-
 μα. τὰ δὲ σπαιρία χλωρὰ σὺν οἶ-
 νῳ ποθένια, ἐρπετοδύκτοις βοηθεῖ.

ἀγα-

earū in muliebres infessus ad-
 ditū, vuluæ & vesicæ vitiis con-
 uenit. Virétia folia sensim sub-
 stringūt, illita quoq; ac tritave-
 sparū apiūmq; ictib⁹ opitulā-
 tur, eadē cum polenta, & pane
 illita inflammationē omnē mi-
 tigāt, sed pota stomachū effun-
 dunt, & vomitiones mouent.
 Lauri bacce magis, q̃ folia cal-
 faciūt: ergo in eclegmate tritæ
 cū melle vel passo profunt, ta-
 bi, orthopnoeæ, & omnib⁹ tho-
 racis rheumatismis: cōtra scor-
 pionū ictus ex vino bibuntur,
 vitilignes emaculāt. Succ⁹ bac-
 carū vtilissimè auriū dolori, &
 grauitati instillatur, cū vino ve-
 tere, & rosaceo. In medicamē-
 ta aut̃ adiiciūtur, quæ neruorū
 lassitudines reficiūt, acopa vo-
 cant: & ad vnguēta, quæ calfa-
 ciūt, & discutiūt. Cortex radi-
 cis calculos rumpit, partus ne-
 cat, hepaticis prodest, tribus o-
 bulis in vino odorato potus.

Platanus. Cap. CVIII.

Tenerrima platani folia in
 vino decocta, mox illita, ocu-
 lorum fluxiones sistunt, tumo-
 res & inflammationes leuant,
 Decoctus cortex in aceto,
 dentes in dolore colluit. Viri-
 des pilulæ in vino potæ, ser-
 pētium morfib⁹ auxiliantur:

exce-

DIOSCORIDIS

exceptæ autem adipe, igni am-
busta sanant. infidēs foliorum
pilularumque lanugo, oculos
& aures offendit.

Fraxinus. Cap. CIX.

Fraxinus arbor nota est, cu-
ius foliorum succus, & ipsa per-
uncta, aut ex vino pota, vipe-
rarum ictibus auxiliatur. Cor-
ticis cinis ex aqua illitus le-
pras eximit. Ligni ramenta,
scobemq; potu perniciem af-
ferre tradunt.

Populus. Cap. CX.

Potus albæ populi cortex vn-
ciæ vnius pondere, ischiadicis
ac vrinæ stillicidio prodest. Ab-
ortiuum fieri tradunt, si cū mu-
lino rene bibatur. Folia quoq;
cū vino post purgationes po-
ta, idem præstare produntur.
Tepens foliorum succus vti-
liter aurium dolori instillatur.
Pilulæ, quæ primo foliorum
partu exiliunt, illitæ cum mel-
le, oculorum hebetudini me-
didentur. Memorix prodiderūt,
corticem albæ populi, & ni-
græ particulatim cæsum, & sul-
cis stercoreatis mandatum, o-
mni tempore anni edules fun-
gos proferre.

Macer. Cap. CXI.

Macer ex Barbaria aduehi-
tur, cortex flauescens, crassus,
gustu

ἀνδροφθέντα δὲ σέασι, πνείγου-
σα θραπτεύει. ὁ δὲ χυλὸς τῶν φύλ-
λων καὶ τῶν σφαιρίων, ἀκολῶ καὶ
ὄψιν ἐμπεσὼν, λυμαίνεται.

Περὶ Μήλιας. Κεφ. ρθ'.

Μήλια δένδρον ἐστὶ γνώριμον, ὃ
οὗ τ' φύλλων ὁ χυλὸς καὶ αὐτὰ σὺν
οἴνῳ πινόμῳ, καὶ καταπλοσμέ-
να ἐχρόνηκτις βοηθεῖ. ὃ δ' φλοιὸς
καὶ καταρριπτεῖς μὴ ὕδα-
τος, λείπρας ἀφίστησι. τὰ δὲ τορ-
νεύματα τῷ ξύλῳ ποθέντα, φα-
σὶν ἀναιρετικὰ εἶναι.

Περὶ Λεύκης. Κεφ. ρι'.

Λεύκη τῇ δένδρῳ ὁ φλοιὸς πο-
δεῖς ὅσον οὐγγία μία παλῆδος. ἰσ-
χάδας ὠφθεῖ καὶ σφαγγουείας. ἰ-
σορεῖται δὲ καὶ ἀτύκιος εἶναι, πο-
δεῖς μὲν ἡμίονο νεφρῶ. καὶ τὰ φύλ-
λα δὲ πινόμῳ μετὰ κέδαρσιν
συνὸ οἴνῳ, τὸ αὐτὸ δρᾶν λέγεται.
ὠφθεῖ καὶ ὠτῆγίας ὁ χυλὸς τῶν
φύλλων χλιαρὸς ἐστὶ ζόμῳ. τὰ
δὲ κατὰ τὴν ἐκβάλησιν τ' φύλ-
λων σφαιρία λεῖα μετὰ μέλιτος
ἐγχρομόμῳ, ἀμβλυωπίας δερα-
πύει. ἐνιοὶ δὲ ἰσορεῦσι τὸν φλοιὸν
τῆς λεύκης καὶ τῆς αἰγείρου τμη-
θέντα εἰς λεπτὰ μέγεθῃ καὶ σφα-
ρέντα παρασιᾶς κεκοπρισμέναις,
ἐν παντὶ καμῶ μύκητας ἐδωδι-
μοῖς φύειν.

Περὶ Μάκρης. Κεφ. ρια'.

Μάκρη, φλοιὸς ἐστὶ κομιζόμῳ
ἐκ τ' βαρβαρί, ὑπόξανθης, παχὺς
συφῶν.

εὐφών ἱκανῶς κατὰ πλὴν γούσιν·
 πίνεται δὲ πρὸς αἵματος πύ-
 σιν καὶ δυσεντερίας καὶ κοιλίας
 ρευματισμὸν.

*Περί Πτελέας. Κεφ. ριθ'.

- 5 Πτελέας τὰ φύλλα καὶ οἱ
 ἀκρέμονες καὶ ὁ φλοιὸς συπι-
 κά. ποιεῖ δὲ τὰ φύλλα πρὸς
 λέπραν λεῖα (ὡς ὅξιν ἐπιπλατ-
 τόμενα; καὶ τραύματα κολλᾷ,
 μᾶλλον δὲ ὁ φλοιὸς ἀντὶ ἐπι-
 10 δέσμου περιειλούμενος· ἐπὶ γὰρ
 ἰματιώδης. ὁ δὲ παχύτερος
 φλοιὸς (ὡς οἶνον ἢ ὕδατι* πο-
 δεῖς οὐγγίας α'. πηλίδος, ἄγει
 φλέγμα. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ
 τῶν φύλλων ἢ τοῦ φλοιοῦ τῶν
 15 ριζῶν κατὰ πλὴν γούσιν, ἄτα-
 μα πορεῖ τὰ χυλόν. τὸ δὲ ἐν ταῖς
 φύσιν κατὰ πλὴν πρὸς τὴν ἐκ-
 βάσιν ἐν εὐερίσκῳ ὕδατι,
 εἰλεῖ πρὸς ὥσπον ἐπιχειρόμενον,
 ξηρανόμενον δὲ τὸ ὕδρον τοῦτο,
 20 ἀναλύεται εἰς θηρία κλονοποι-
 εῖν. λαχανεύεται δὲ τὰ φέσφατα
 τῶν φύλλων ἐν γούσιν εἰς πρὸς
 οἶμα.

Περί Σαπρότητος ξύλων.

Κεφ. ριγ'.

- 25 Ἡ δὲ ἀπὸ τῶν παλαιῶν ξύλων καὶ
 πρὸς τὴν σαπρὴν πωσιπύρην ὡς
 πρὸς δέξιν κατὰ πλὴν γούσιν, ἀνα-
 καθαίρει καὶ ἀποκαθάρσει· τὰ δὲ
 ἐρπυσια ἐπὶ χειρὶ, σὺν ἰσῷ ἀνίστα
 πρὸς δέξιν καὶ οἶνον, ἐν ὁδῶναις τὴν
 καθεύδειν

gustu perquam astringens: qui
 contra cruentas excretaones,
 dysenterias, & alui fluxiones
 bibitur.

Vlmus. Cap. CXII.

Vlmi & folia & cortex &
 rami, vim habent spissandi. Fo-
 lia trita ex aceto ad lepras ef-
 caciter illinuntur, vulnera glu-
 tinant, sed multò magis cor-
 tices tilia, si fasciæ loco intor-
 queatur: nam in lori morem
 flecti potest. Crassior cortex
 in vino aut aqua frigida vncia-
 tim potus, pituitas trahit: fra-
 cta ossa celerius solidescunt,
 si decocto foliorum corticis
 aut radicis foueantur. Humor
 in folliculis enascès prima ger-
 minis eruptione, cuti illitus ni-
 torem inducit, faciémq; splen-
 didiorem præstat. Qui dum
 ficcatur, in animalia abit, quæ
 culicum formam gerunt. Fo-
 lia cum tenerescunt cocta, o-
 lerum more ad obsonia vsur-
 pantur.

Lignorum marcor.

Cap. CXIII.

Ex caudicibus lignisque ve-
 teribus caries congeritur, quæ
 farinæ modo illita, vlcera pur-
 gat, & ad cicatricem perducit:
 serpentia cohibet, si cum pari
 aniso & vino subacta, linteisq;
 impo-

DIOSCORIDIS

imposita illinatur.

Populus nigra. CXIIII.

Populi nigræ folia cum aceto illita, magna vtilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinā populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potū ex aceto comitialibus vtile est. Lachrymā populorum cōmemorāt, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinum, quod electrum vocant, alij chrysophorum. Id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur: tritum potūmque stomachi ventrisq; fluxiones sistit.

Harundo. Cap. CXV.

In harundinū genere quedā nastos id est farctior, vocat, ex qua sagittæ factitari solēt. Alia foemina, qua tibiariū ligulas efficiūt. Alia q̄ fistulis addicta sit, syringias: cui multū uest carnis, crebris cicta geniculis, ad librū cōscriptionē accommodata. Alia crassā, cōcaua, apd amnes nascēs, q̄ à qbusdā cypria, ab aliis donax appellat. Alia phragmites seu vallatoria, gracilis, cādicās, vulgo cognita: cui⁹ trita radix p se, aut cū bulbis suis illita, spicula aculeosq; corpe extrahit: luxata lūborūq; dolores cū aceto mulcet. Virentia folia tusa &c

καθεῖσθαι καὶ λεία καὶ ἀπλαστομήνη.

Περὶ Αἰγείρου. Κεφ. ριδ'.

Αἰγείρου· τούτο τὰ φύλλα μετ' ὅξους καταπλαττόμενα, ποδαγρῆ καὶ ὀδυνὰς ὠφελεῖ. ἡ δὲ ἐξ αὐτῆς ῥητίνη μίγνυται μαλάγμασιν. ὁ δὲ καρπὸς δὲ μετὰ ὅξους πινόμενος, ἐπιληπτικούς ὠφελεῖ. ἴσμεται δὲ ὅτι τὸ ἐξ αὐτῶν δάκρυον κατὰ τὸν ἡετανόν ποταμὸν καταχεόμενον, πηγνυται καὶ γίνεται τὸ χαλκόμενον ἡλεκτρον, 10 ὑπὸ ἐνίων δὲ χρυσοφόρον· ἐν ὧ δὲ ἐν τῇ παρθεσίῳ καὶ χρυσοειδὲς τῷ χρώματι, ὅπερ πινόμενον λείον, στομάχου καὶ κοιλίας ῥέυμα ἱσησι.

Περὶ Κηθάμου. Κεφ. ριέ'. 19

Κηθάμων δὲ ὁ μὲν τις καλεῖται νατὸς, ἐξ οὗ τὰ βέλη γίνεται. ὁ δὲ τις θῆλυς, ἐξ οὗ αἱ γλῶτται τοῖς αὐλοῖς κατασκευάζονται. ἄλλος ὃ σπειγγίας πελύσαρκος, πυκνόχοντος, εἰς βιβλιογραφίαν ἐπιτήδειος. ὁ δὲ τις παχὺς καὶ κοῖλος παρὰ ποταμοῖς φυόμενος, ὃς καὶ δόναξ καλεῖται, ὑπὸ πηγῶν δὲ κύπτεται. καὶ ἔτερος φραγματῆς, *λεπτὸς ὑπολευκὸς, πᾶσι γνώριμος, οὗ ἡ ῥίζα καταπλαττεῖται 29 καὶ λεία, καὶ κατ' ἐαυτὴν καὶ συνβολοῖς, ἐπισπᾶται σκόλοπας καὶ ἀκίδας· συν ὅξει δὲ σπέρματα καὶ ὀσφύος ἀλγήματα παρηγορεῖ. τὰ δὲ φύλλα χλωρὰ κοπέντα καὶ

καὶ ἐπιτείνετα ἐρισπίλατά τε καὶ
ταῖς ἁγῆας φλεγμοναῖς ἰᾷται. ὁ δὲ
φλοιὸς δὴ ὡπεκίας θεραπευέει καὶ
καὶ μετ' ὅξους καταπλαθεῖς. ἡ δὲ
αὐτὴ καὶ τῶν καλὰ μὲν ἐμπυρρῶσα
εἰς ταῖς ἀκοαῖς, κώφωσιν ἐργάζεσθαι.
δύναται ὅτι τὰ αὐτὰ καὶ ὁ κύπριος
λεγόμενος καλὰ μὲν ποιεῖν.

Περὶ Παπύρου. Κεφ. ρις'.

Πάπυρος γινώριμός ἐστι πάντων,
ἀφ' ἧς ὁ χάρτης κατασκευάζεται.
10 ὅστις δὲ πρὸς τὴν ἐν ἰατρικῇ
καὶ χημικῇ πρὸς ἀναισθησιν συ-
εργῶν σκευαθεῖται* διὰ βρογχί-
τις, πνευμονίτις καὶ ἄλλαι ἐνδοκρίσις.
συνεχὴς καὶ καὶ κατὰ μὲν, ἐμπύ-
πλεται ὑγρασίας, καὶ ἐξοιδρῶσα
15 διανοίγῃ ταῖς σύριγγας. ἔχει δὲ π
ἡ ῥίζα αὐτῆς καὶ τερφομῶν. Δια-
μασώμενοι γὰρ αὐτὴν οἱ ἐν αἰ-
γύπτῳ, ἀποχυλίζουσιν ἐκπιούσας
τὸ διαμάσθημα. καὶ ὅτι καὶ αὐ-
τὴ ἐξυλὼν αὐταῖς. ἡ δὲ κεκαμμένη
20 πάπυρος ἔχει τερφοσέως δύνα-
μις ἐπὶ χεῖν ταῖς ἐν στήματι καὶ
παντὶ μέρει. βέλτερον δὲ ὁ χάρτης
καὶ δὲ τὸ τοιοῦτον.

Περὶ Μυρίκης. Κεφ. ριζ'.

Μυρίκη δένδρον ἐστὶ γινώρι-
25 μόν παρὰ λίμναις καὶ τοῖς σα-
σίμοις ὑδάσι φύομενον, καρπὸν
ὡς περ αὐτὸς φέρεται βρυῶδες
κατὰ τὴν σύστασιν. Γεννᾶται
δὲ πρὸς αἰγύπτῳ καὶ σελίᾳ ἡμε-
ρος καὶ τὰ ἁγῆα ὁμοία τῇ ἀγρίᾳ
καρπὸν

tula & imposita ignibus sacris
medentur, & cæteris inflāma-
tionibus. Corticis cinere per-
unctæ cum aceto alopecię fa-
nantur, paniculæ lanugo si au-
res intrauerit, exfurdat. Eundē
effectum implet harundo quæ
cypria dicitur.

Papyrus. Cap. CXVI.

Papyrus qua chartę fiūt, nul-
lis non cognata, præcipuæ in
medicina vtilitatis, ad laxandas
fistulas: madefacta lino inuol-
uitur, vsque dum inaruerit, cō-
stricta enim atque immissa in
hiatū, humore cōpletur, & in-
tumescendo fistulas aperit. Ha-
bet nescio quid alimēti radix:
itaq; Ægyptij eā mandunt, suc-
cum tantū deuorantes, & man-
sam expuunt. Ipfis radicibus
pro ligno vtuntur. Crematæ
papyri cinis depascentia vlce-
ra cum omnium partium, tum
oris maximè, cohibet: ve-
rum melius id combusta char-
ta præstat.

Myrica. Cap. CXVII.

Myrica seu tamarix arbor
vulgo cognita est, cū apud pi-
gras, & stagnantes aquas ena-
scatur, fructū quasi florē ferens
compage muscosum. Ægyptus
Syriāque alteram gignunt mi-
tiorē, syluestri cætera similem.

Fructum

DIOSCORIDIS

Fructum parit gallæ proximū, inæqualiter astringentē gustu: quo conueniēter utimur vice gallæ in medicaminibus oculorū orisq;. Datur cruētæ excreationi in potu, & coeliacis, & cōtra profluvia foëminarū, regium morbū, & phalangiorū morfus: illitus tumores inhibet. Cortex in eosdē vsus adhibetur. Decoctum foliorū cum vino potum, lienem absomit: ad dolorem dentium in collutionibus salutare, & mulieribus fluxioni vuluæ opportunis in defessionibus, phthiriasi lendibusque circumfusum prodest, abundantiam foëminarū sistit impositus arboris cinis, potorios calices è caudice lienosis moliantur, quò datus in his potus proficiat.

Erica. Cap. CXVIII.

Erica fruticosa arbor, myricæ similis, longè minor: cūius flore apes reprobū mel efficiunt, tam flos quàm coma serpentium ictibus illitu medetur.

Acacalis. Cap. CXIX.

Acacalis fructus est nascentis in Ægypto fruticis seminis myricæ quadamtenus similis: cuius aqua in qua maduerit, ad

καρπὸν φέρουσα ἐμφερῆ κηκίδι, ἀνωμάλως σύφοντα καὶ τινὶ γευσιν ἄρμύζοντά τε αὐτὴ κηκίδος εἰς τὰ σωματικὰ καὶ ὀφθαλμικὰ, καὶ πρὸς αἵματος πύσεις ἐν ποτῶ, καὶ κοιλιακαῖς καὶ ῥοικαῖς γυναιξίν, ἰκτέρι τε καὶ φθίγγιοις οἰδύματά τε σέλλει κατὰ πλάσσει. καὶ ὁ φλοιὸς δὲ τὸ αὐτὸ ποιεῖ τῷ καρπῷ. τῶν δὲ φύλλων τὸ ἀφέψημα σὺν οἴνῳ ποθέν, σπληνική καὶ ὀδονταλγίας ἰσοδοθεῖ διακλυζώμενον, ἐγκάθιστό τε ῥοικαῖς, καὶ πείχεται τοῖς φθίγγας καὶ κύνιδας θυνώσιν ἐπιτίθειν, καὶ ἡ ἀπὸ τῶν ξύλων τέφρα προσεθείσα, βεύσιν ἐν μήτραις σέλλει. καταστυνάζουσι δὲ ἔνιοι καὶ κύλικας ἐν τοῦ σπέρματος αἷς ἐπὶ τῶν σπληνικῶν χεῶνται αὐτὴ ποθεινῶς. ὡς τοῦ δι' αὐτῶν πόματος ὠφελιμῶτος.

Περὶ Φρείκης. Κεφ. ρη.

Φρείκη, δένδρον ὅστις σαμνῶδες ὁμοίον μυρίκι. μικρότερον δὲ πηλῶ, οὗ τῷ αὐτῷ μέγισται χεῶμεναι, μέλι ἐργάζονται οὐ σπουδαῖον· ταύτης ἡ κόμη καὶ τὸ αὐδὸς καταπλαστέμενον, ἐπεὶ τῶν δόγματα ἰᾶται.

Περὶ Αἰθακαλίδος. Κεφ. ριθ.

Αἰθακαλὶς δάμνου καρπὸς ἐστὶ θυνώμενος ἐν αἰγύπτῳ, ἐοικὼς κατὰ τι τῷ μυρίκι καρπῷ· οὗ τὸ ἀπόβρεγμα μίγνυται

τα καλλυρίοις τοῖς πρὸς ὀξύδωρ-
κίαν ἀρμόζουσιν.

Περὶ Ράμνου. Κεφ. ρκ'.

Ράμνος δάμνος ὅστις παρὰ
μοῖς φυόμενος ῥάβδους ἔχων ὀρ-
5 θρῆας καὶ ὀξείας ἀκάνθας ὡς παρὰ
ἢ ὀξύακανθα, φύλλα μικρά, * ὑ-
πομήκη, ὑποκίπερα, μαλακά. ἔ-
στι δὲ καὶ ἑτέρα * λευκότερα. καὶ
τείτη μελαίντερά ἔχουσα τὰ φύλ-
λα, καὶ πλατύτερα σὺν τῷ ἡρέμα
10 ἐρυδραίνεσθαι, ῥάβδους μακράς πη-
χῶν ὡς πέντε, μᾶλλον ἀκανθώ-
δεις, ἥπιον δὲ σεραῖς καὶ ἐπ' ἀκμῇ
ἔχει τὰς ἀκάνθας, καρπὸς δὲ πλά-
γῃς, λευκός, λεπτός ὡς θυκακάδης,
ἑοικώς * ἀσφοδέλῳ. ποιεῖ δὲ πα-
15 σῶν τὰ φύλλα πρὸς ἐριστιπέλα-
τα καὶ ὀρθήτας κατὰ πλάσσομε-
να. λέγεται δὲ καὶ κλῶνας αὐ-
τῆς, δύραις ἢ θυεῖσι πρὸς τελέ-
ταις, * ἀποκρούειν τὰς τῶν φαρ-
μάκων κακουργίας.

20 Περὶ Ἀλίου. Κεφ. ρκβ'.

Ἀλιμος δάμνος ὅστις παρὰ γαί-
της, ὁμοίως ῥάμνῳ οὐκ ἔχων ἀ-
κάνθας. φύλλα δὲ ὕψαια παρὰ
πλήσια, πλατύτερα μύρτοι φύε-
ται ἐν παρὰ θαλασσίῳ καὶ φραγ-
25 μοῖς. λαχανύεται δὲ αὐτῆς τὰ
φύλλα ἐφόδια εἰς βρώσιν. τῆς
δὲ ῥίζης < α. ὁληὴ ποδείσα
συνὴ μελικράτῳ, σπασμάτα, ῥήγ-
ματα καὶ σφόδρως πρὸς τὴν καὶ
γάλα κατασπᾷ.

Περὶ

ad collyria additur, quæ ad ex-
citandâ oculorû acie cōueniūt.

Rhamnus. Cap. CXX.

Rhamnus fruticat in sepibus
ramos ferēs rectos & aculeos
in acutæ spinæ modum, foliis
paruis, oblongis, suppinguibus,
teneris. Alterum ei genus can-
didius. Tertium nigrioribus la-
tioribusque foliis constat, &
quadamtenus rubentibus: cu-
ius rami quinûm ferè cubitorû
longitudinem implent, spino-
fiores quidē sed infirmioribus
minûsq; rigentibus aculeis. Fru-
ctum ædit latum, candidû, te-
nuem, follicularij specie, verti-
cillo fimilem. Omnium folia
igni sacro, & serpentibus vlce-
ribus, efficaciter illinuntur. Fa-
ma est ramos huius valuis fe-
nestrisve impositos, veneficia
depellere.

Halimus. Cap. CXXI.

Halimus frutex est sepimen-
tis idoneus, similis rhamno, si-
ne spinis, foliis oleæ, sed latio-
ribus: nascitur in sepibus &
maritimis. Folia decoquuntur
ciborû gratia. Radix, conuulsa,
rupta, torminâque mitigat,
drachmæ pōdere in aqua
mulsa pota: eadem
lactis vberta-
tem facit.

Paliurus.

DIOSCORIDIS

Paliurus. Cap. CXXII.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, dur⁹, cuius semē pin-
gue & fuliginosum inuenitur:
quod potū tussi opitulatur, ve-
ficæ calculos cōminuit, serpen-
tiū ictibus aduersatur. Folia &
radix astrictoriam vim habēt:
quorum decoctū potu aluum
sistit, urinā trahit, contra vene-
na & serpentium morsus au-
xiliatur. Radix recentia tuber-
cula, tumorésque omneis di-
scutit, trita & imposita.

Acuta spina. Ca. CXXIII.

Acuta spina, quam pyrinam
aut pityanthen aliqui vocant:
arbor est pyraastro similis, spi-
nosa valde & minor, baccas
profert myrti, plenas, rubras,
fragiles, & intus nucleum: ra-
dicem multifidam, altè descen-
dentem. Huius baccæ potu
aut cibo, alui profluuium, &
abundantiam foeminarum si-
stunt. Radix illita aculeos &
spicula extrahit, abortum fie-
ri tradunt, si ter radice veni-
ter, aut sensim feriat, aut
perungatur.

Rubus canis Ca. CXXIII.

FRUTEX est arboris in-
star, rubo longè maior: fo-
lia fert multò latiora myrto,
robustis

Περὶ Παλιούρου. Κεφ. ρκβ.

Παλιούρος θάμνος ἐστὶ δάμνος,
ἀκανθώδης, στερεὴς, οὗ τὸ σπέρμα
λιπαρὸν καὶ λιγνυῶδες εὐείσκη⁹.
ὅσῳ πνιγμὸν βλάξιν ἀρήγῃ, καὶ τὰς
ἐν κύσει λίθους ἀρῶσθαι, καὶ πρὸς τὴν
ἐρπετῶν δόγματι ποιεῖ. τὰ δὲ
φύλλα καὶ ἡ ῥίζα συπιχθῆ, ὡς τὸ
ἀφελήμα ποδῶν, κοιλίαν ἰση-
σιν, οὗρά τε ἄγει καὶ θανάσι-
μοις καὶ θηριοδύκτοις βοηθεῖ, δια-
φορεῖ δὲ πάντα τὰ πρὸς φάρμακα
φύματα καὶ οἰδύματα ἡ ῥίζα,
λεία ἐπιπλασθεῖσα.

Περὶ Οξύακανθου. Κεφ. ρκγ.

Οξύακανθα οἱ τὸ πνεῖν ἀνὰ τὴν
πυτυάνθην καλεῖσσι, δένδρον ἐστὶ πα-
ραπλήσον ἀχράδι, μικρότερον
δὲ καὶ ἀκανθώδες ἄγαν· καρπὸν τὸ
φέρει μύρτω ἐμφερῇ ἀδρὸν, ἐμ-
δρὸν, οὗ ἔρυπτοι, ἐνδρὸν πυρρὸν
ἐχόντα, ῥίζαν πολυκλάδην καὶ βαθεῖ-
αν. τοῦτε ὁ καρπὸς διάρροιαν ἰση-
σι, καὶ ῥοιῶν γυναικῶν πνιγμὸς
καὶ ἐδιδυμῶς. ἡ δὲ ῥίζα καταπλα-
σθεῖσα λεία, σιόλοσπας καὶ ἀκίδας
ἐπιπᾶται. ἰσορεῖ δὲ διωάδα
πρὸς ῥίζαν, καὶ ἐκβωστὺς ἐργάζε-
ται τῆς κοιλίας ἡσυχίῃ τοῖς πλε-
χθείσις ἢ χροθείσις.

Περὶ Κυνοσβάτου. Κεφ. ρκδ.

Κυνοσβάτον οἱ δὲ οξύακανθα
καλεῖσσι· δάμνος ὅσῳ βάτε πολλῶ
μείζων, δένδρῳδης· φύλλα φέ-
ρει πολλῶ πλατύτερα μυρσίνης,
ἀκίδας

ἀκμάδας ὅτε τὰς ῥάβδους ἰο-
ρεῖς, αἷδος λευκὸν, καρπὸν ὀπι-
μήκη, πυρεῖν ἡγίας εἰκότα, ἐν
τῷ πεπαινεῶς πυρρὸν, τὰ δὲ ἐν-
τὸς εἰώδη. ἵσῃσι δὲ κοιλίαν ὁ καρ-
πὸς ξηρὸς· δίχα τοῦ ἐν αὐτῷ εἰ-
ωδούς· κακώτερον γὰρ τῆς ἀρ-
τηρίας τὸ ἀποζεννύμενον ἐν οἴ-
νῳ καὶ πινόμενον.

Περί Κύπρου. Κεφ. ρκβ.

Κύπρος δένδρον ὅτε τὰς
10 ῥάβδους φύλλα ἔχον ἡγία. πα-
ραπλήσια, πλατύτερα δὲ καὶ
μαλακώτερα καὶ χλωρότερα·
αἷδη λευκὰ βρυώδη, εὐώδη· σπέρ-
μα μέλαν ὁμοίον τῷ τῆς ἀκτῆς.
ἡγνᾶται δὲ αἰεὶ ἐν τῇ ἀσιά-
15 λωνι καὶ κενώπῃ. Δυνάμει δὲ ἔ-
χει τὰ φύλλα συνηκύν· ὅθεν δια-
μασσηθέντα ἀφ' ὧν ἰᾶται, καὶ τὰς
ἄλλας πυρώδεις φλεγμονὰς κα-
ταπλαθέντα ὠφελεῖ, καὶ αἷθρα-
χας· τὸ δὲ ἀφέλημα αὐτῶν, πυ-
20 ρεῖων καταντήματα, ξανθίζῃ
δὲ καὶ τεύχας σρουδίου χυλῷ τὰ
φύλλα λεῖα βραχύντα καὶ ἐγχε-
θέντα. τὸ δὲ αἷδος ὀππλαθὲν
τῷ μετόπῳ λεῖον μετ' ὅξους, κα-
φδαλγίας παύει· τὸ δὲ σκευάζο-
25 μένον ἐξ αὐτῆς χρίσμα κύπρινον
δερμαντικὸν γίνεται καὶ μαλα-
κτικὸν νεύρων.*

Περί Φιλλυρέας. Κεφ. ρκγ.

Φιλλυρέα δένδρον· ὅτεν ὁμοίον
κύπρῳ καὶ μέγεθος, φύλλα δὲ ἡγί-
ας ὁμοία,

robustis circa ramos spinis, flo-
re candido, fructu oblongo,
nucleo oliuæ simili: qui per
maturitatem fuluescit, & floccu-
los intus continet. Fructus
exemptis interioribus floccis
arefactus; aluum sistit: feruefa-
cti enim ij in vino, mox poti,
arteriam infestant.

Ligustrum. Cap. CXXV.

Ligustrum arbor est oleæ fo-
lis circum ramos similibus, la-
tioribus, mollioribus, & co-
lore viridioribus: flore can-
dido, muscoso, odorato: fe-
mine sambuci, nigro. Opti-
mum nascitur in Canope &
Ascalone. Folia astrictoriam
vim habent: quare comman-
ducata vlceribus oris meden-
tur, illita feruidis inflamma-
tionibus, carbunculisque pro-
sunt, decocto eorundem igni
ambusta fouentur capillum ru-
fant trita folia, quæ in radi-
culæ succo maduerint. Flos ex
aceto fronti illitus, capitis do-
lorem sedat. Cyprinum oleum
quod ex eo fit odoratum, ex-
calfacit, emollitque neruos: si
que feruēti natura prædita sint,
assumat.

Tilia. Cap. CXXVI.

TILIA arbor est ligu-
stri magnitudine, foliis oleæ,
g nigrio-

DIOSCORIDIS

nigrioribus & latioribus, fructu lentilci, nigro, subdulci, racematim cohæréte, asperis nascitur. Huius folia astringunt: ad eadem vtilia ad quæ oleaster, cum astrictione est opus: maximè ad oris vlcera, comanducata, aut si decocto coluantur: pota vrinam ac menses cient.

Cistus Cap. CXXVII.

Cistus, què aliqui citharon, aut cissaron vocant. ramosus frutex est, sed improcerus, foliosus, saxosis locis nascens, foliis rotundis, acerbis, hirsutis. flos masculo vt mali punicæ, foeminæ albet. Vis astringens: vnde flores in vino austero bis in die poti, profunt dysentericis, & nomas per se illiti cohibent, vetustati vlcerum, & igni ambustis cum cerato medentur.

Hypocistis. Cap. CXXVIII.

Hypocistis, orobethron, aut cytinus à nonnullis cognominata, iuxta cisti radices nascitur, floris punici similitudine. Quædam rufa, altera herbacea, tertia candida. Liqueatur acaciæ modo. Aliqui tamen exiccant, fractamque macerant, & incoquunt, reliquæque vt in Lycio prosequuntur.

Vires

ας ὁμοια, πλατύτερα δὲ καὶ μελαντέρα, καρπὸν δὲ ἔχει χρίνω ἐμφορῇ, μέλανα, ὑπόλευκον, ὡς ἐν βόρσι καὶ μόρον, ἐν βράχεσι δὲ τύποις γινώσκει. ταύτης τὰ φύλλα, εὐφραίνει ὡς ἀγριελία πικρῶνται, πρὸς τὰς συψήως δόξιν, μάστιγα τοῖς ἐντομοῖσι ἔλκεσι διαμάσημα καὶ διάκλισμα τὸ ἀφ' ἑλμῶνα, καὶ πινόμρον δὲ οὖρα καὶ ἐμμένα ἀγει.

Περὶ Κίστου. Κεφ. ρκζ.

Κίστος, ὃν ἔνιοι κίθαρον ἢ κίσ-
σαρον καλεῖσι. δάμνητος ὅστις ἐν πε-
τρῶδεσι τύποις φυόμενος, πλύ-
κλαδος, φυλλώδης, οὐκ ὑψηλός,
φύλλα ἔχων ἀειφορῇ, σφυγὰ, δα-
σέα. αἰσθῆται ὡς ὅρροιας, ἐπὶ δὲ τῇ
σπλάγχνος λευχία. Δυνάμειν δὲ ἔχει
συμπικρῆν ἔσθην τὰ αἰσθῆται* λεῖα π-
νόμρα δις τὴν ἡμέραν ἐν οἴνῳ αὐ-
στηρῶ, δις πεντεκαίδεκα ἀρμύρας, καὶ
αὐτὰ δὲ χαταπλάσθεντα, νομας
ἐφίσησι, σὺν κηρωτῇ δὲ πνεύμα-
τα καὶ παλαιὰ ἔλκεα ἰᾶται.

20

Περὶ Τυγκισίδος. Κεφ. ρκη.

Φύεται δὲ πρὸς τὰς ῥίζας τῆς
κίστου ἢ λεγομένη τυγκισίς. ὡς
ἐν ἰσθμῷ δὲ ῥόβηδρον, ἢ κύτινος κα-
λουμένη, ὁμοίον τι κύτινῳ ῥοιάς,
καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ κερρὸν. τὸ δὲ
χλωρόν, τὸ δὲ λευκόν ὅσον χυλί-
ζον ὡς ὅρ ἢ ἀκακία. ἔνιοι δὲ ξη-
ραναντες αὐτὴν, καὶ θλάσαν-
τες, βρέχοις τε καὶ ἑλμοῖσι, καὶ τὰ
ἄλλα πικρῶσι, ὡς ἐπὶ τῇ λυκίῳ.

Δυνά-

Δυάμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τῇ
ἀκακίᾳ, συπικωτέραν δὲ καὶ ξη-
ρανικωτέραν, ποιεῖσαν πρὸς κοι-
λιακοῖς, δυσεντερικοῖς, αἱμο-
ποικοῖς, ροῦν γυναικείον πνο-
μὴν καὶ ἐμπερὴν.

Περί Λαδανίου. Κεφ. ρκθ.

Ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερον εἶδος κίστου, κα-
λούμενον ὑπὸ ὀνίων λήδον, δά-
μνος κατὰ τὰ αὐτὰ φύσμενος τῷ
κίστῳ, μακρότερον δὲ τὰ φύλλα
ἔχει καὶ μελάντερον, λιπαρείας
πινὰς κατὰ τὸ ἔαρ ἐπὶ πώμῳ, καὶ
οὗ φύλλον ἢ δυάμις συπικὴ
κατέστηκε πιούσα πρὸς ὅσα καὶ ὁ
κίστος γίνεται δὲ ἐξ αὐτῆς τὸ λεγό-
μενον λάδανον· τὰ φύλλα γὰρ ἀ-
πὸ νεμόμενοι αἱ αἴγες καὶ οἱ τρά-
γοι τὴν λιπαρίαν ἀναλαμβάνου-
σι τῷ πώρῳ γινώσκοντες, καὶ
τοῖς μύθοις πρὸς πλάττονται
διὰ τὸ πυγμαῖον ἰξώδη, καὶ ἀ-
φαιρουῖτες ὑλίζοισι, καὶ ἀποτί-
θενται ἀναπλάσσοντες μαγίδας.
ἔτιοι δὲ καὶ ἄρνια ἐπισφροῖσι
τοῖς δάμνοις καὶ τὸ πρὸς πλάττον
αὐτοῖς λίπος ἀποξύναντες ἀνα-
πλάσσουσι. κράτιστον δὲ ὅστιν αὐτῆς
ἐνὶ ὄρεσιν, ὑποχλωρὸν, ἐν μάλα
κτον, λιπαρὸν, ἀμέτοχον* ψάμ-
μου ἢ ψαφείας, ῥητίνῳ δὲ τοι-
ούτων δὲ ὅστις τὸ ἐν κύμασιν ἡμ-
νώμενον· τὸ μὲν τοι ἀρβυκὸν καὶ
λιευκὸν ἐντελέτερον. Δυάμιν
δὲ ἔχει συπικὴν, θερμαντικὴν,
μαλα-

Vires acaciæ habet, verum ali-
quanto magis siccatur, & astrin-
git. Prodest dysentericis, calia-
cis, sanguiné excreantibus: foe-
minarum profluviū & pota &
indita.

Ladanum. Cap. CXXIX.

Est & alterum cisti genus, le-
don à nonnullis appellatum;
frutex simili modo nascens,
longioribus foliis & nigriori-
bus: quæ verno tempore quid-
dam contrahunt pingue. Fo-
liorum vis astringens, ac eor-
dem quos cistus effectus præ-
betis. Fit ex eò quod ladanum
dicitur. Siquidem cum cisti
frondes pascuntur capræ, hir-
cique, pinguitudinem conspi-
cuae barba capiunt, & suo len-
tore villosis cruribus adhære-
scentem reportant: quam de-
pectentes incolæ, colantef-
que cogunt in offas, & ita re-
condunt. Alij verò attractis fu-
niculis, insidentem fruticibus
lentorem abstergunt, conglom-
erantque in ladanum. Maxi-
mè probatur odoratum, subui-
ride, facile mollescens, pingue,
quod arenas non collegit nec
squalore oblitum est, resinofum
quale in Cypro gignitur. Ara-
bicum verò Libicumq; vilius.
Natura ei spissandi, calfaciendi,
g ij mol.

molliendi: ora venarum pate-
facit, capillum fluentem con-
tinet: addito vino, myrrha, &
myrteo oleo: cicatricibus de-
corem reddit, cum vino illi-
tum: medetur auriū doloribus,
cum hydromelite aut rosaceo
infusum: suffitu secundas eii-
cit, pelsis immistum vuluæ du-
ritiem sanat, in medicamen-
ta quæ dolorem tussimque fi-
niunt, & malagmata vtiliter
inferitur: aluum sistit cum vino
vetere potū, & vrinam ciet.

Ebenus. Cap. CXXX.

Ebenus optima habetur æ-
thiopica & nigra, nullos habēs
venarū discursus, factitij cor-
nus læuore: cum frangitur den-
sa apparet, mordens gustu, at-
que leniter astringens. Suffi-
tur iucundo odore supra car-
bones: sine fumi tædio. Recēs
autem ad ignē prolata, ob pin-
guitudinē accenditur, & trita
ad cotē rufescit. Altera est in-
dica, internatis segmētis cādi-
cātibus, & modicē fuluis, item
frequētibus maculis: cæterum
prior, bonitate antecedit. A-
pud quosdam sesamina, aut spi-
nea ligna confimilia pro ebe-
no vaneunt: quod discernitur
ex eo, quod fungosa sunt, & in
purpureas affulas resoluuntur,
nihil

μαλακπικὴν, αἰσθησιμὴν πικρὴν ἴση-
σι ὅ τας ῥέουσας τείχας, μὴ δὲ οἴ-
νω καὶ σιμύνη καὶ μυρσίῳ ὕδατος, οὐ-
λας τε ἐν περὶ σπέρματι πίει μετ'
οἴνου καταχειρόμηνον, καὶ ὡτληγί-
ας μὴ ὑδρομέλιτος, ἢ ῥοδίνῃ ἐγ-
χέομενον θεραπεύει· ὑπερδυσμῆν
δὲ καὶ πρὸς δευτέρῳ ἐκβολαῖς, καὶ
σκληρίαις θεραπεύει, τὰς ἐν μύρῳ
ἐν περὶ σπέρματι μὴ δὲ, καὶ τὰς αἰσθη-
σιμὴς καὶ βηχέας καὶ μαλάγμασι
χρησίμως μύχεται· κοιλίαν τε
ἴσησι σὺν οἴνω παλαιῷ περὶ σπέρματι
δὲ καὶ οὐρητικόν.

Περὶ ἐβένου. Κεφ. ρλ.

Εβένος κρατίζει ἢ αἰσθησιμὴν,
καὶ μέλαινα, καὶ μὴ ἔχουσα κτηδό-
νας, ἐμφερὲς, κέρατα εἰρησμένῃ
τῇ λειότητι, θαλασσίῃ δὲ πυκνῇ,
δυσπικρὴ ἐν τῇ γούσει καὶ ὑπερδύ-
σουσα· τεθείσα τε ἐπ' αἰσθη-
σιμὴν μετ' ὑπερδύας καὶ δίχα κα-
πνοῦ ἐκδυσμωμώμενη· ἢ ὅτε πρὸς πα-
τος διὰ πλὴν λιπαρίαν, αἰσθησιμὴν
συνεὶ περὶ σπέρματι τεθείσα, περὶ σπέρματι
ἐπ' ἀκόνιτος, ὑπερδύς γίνεται.
Εστὶ δὲ τις καὶ ἰνδική, ἔχουσα δια-
φύσεις λευκάς, καὶ κίττας, καὶ σπύ-
λοις ὁμοίως πυκνοῖς· πλεονὲς βη-
τίων ἢ περὶ σπέρματι. ἔνιοι δὲ τὰ σπέρ-
ματι ἢ ἀκαθάρτα ξύλα ἐμφερῆ ὄν-
τα, αὐτὰ ἐβένου πωλοῦσι· διαγι-
νώσκεται ὅτι ἐν τῷ χαλκῷ ἔστιν,
καὶ κατ' ὁρίδας μικρὰς ἀπολύε-
ται ἐμπορφεύει τῷ χρώματι,
μηδὲν

μηδὲν δὲ δηκτικὸν * ἐχούσας ἐν
 τῇ γένει, ἢ ἐν τῇ θυμιάσει ἐν-
 δει. Διότι μιν δὲ ἔχει, σμηκτικὴν
 τῶν ὀπισθοποῦντων ταῖς κόραις,
 * ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ παλαιὰ ρεύ-
 5 ματα καὶ φλυκτῖδας· εἰ δὲ τις ποιή-
 σαις ἐξ αὐτῶ ἀκόνιον χρῶτο εἰς τὰ
 κολλύρια, βέλπον ἐνδύσει. κατε-
 γάζει) ὅτι εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ τὸ το-
 ρευμάτων ἢ ῥηνιμάτων, βραχυμέ-
 νων ἐν οἶνῳ χῶν ἡμέραν καὶ νύκτα·
 10 εἴτ' ἀγοικεμένων ἐπιμελῶς καὶ εἰς
 κολλύρια ἀναπλαστομήτων. ἐνιοι
 ὅτι προτείναντες διηδούσῃ αὐτὰ,
 εἴη ἔτω τὰ λοιπὰ ποιούσι. πηγες ὅτι
 ἀντὶ οἶνου ὕδατι χρῶν). καίεται
 δὲ ἐν ὠκῇ χύτρα ἕως ἀν' ἀνδρα-
 15 κωδῆ· καὶ πωλίει) ὥς ὁ κεκαυμέ-
 νος μόλις δειξ, ἀρμόζει δὲ τὸ τοι-
 οῦτον πρὸς ξηροφθαλμίας.

Περὶ Ρόδων. Κεφ. ραά.

Ρόδον ψύχει καὶ σφει, τὰ
 δὲ ξηρὰ μάλλον. χυλίζει δὲ
 20 δει τὰ ἀπαλὰ ἀποφαλλίσαν-
 τας τὸν ὄνυχά χαλούμενον, ὅπερ
 ὄρετὶ τὸ λευκὸν τὸ ἐν τῷ φύλλῳ,
 τὸ δὲ λοιπὸν ἐκδύσει καὶ τεί-
 βειν ἐν σκιᾷ, ἐν δυνάει ἄχρως οὐ
 συσφαθῇ, οὕτω τε ἀποτιθεομαι
 25 εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς περὶ χύ-
 σεις. ξηραίνεται δὲ τὰ φύλλα
 ἐν σκιᾷ συνεχρῶς σφερόμενα ἵνα
 μὴ ἐνρωπιάσῃ. ποιεῖ δὲ τῶν ξη-
 ρῶν ἐψηθέντων ἐν οἶνῳ τὸ ἀπό-
 θλημμα, πρὸς ἄλγημα κεφαλῆς,
 ὀφθαλ-

nihil mordacitatis in gustu, nec
 redolentiae in suffitu præferen-
 tia. Caliginem oculorum ab-
 sterget, ad veteres destillatio-
 nes pustulasque mirum in mo-
 dum pollet: Si quis piā facta ex
 eo coticula collyriis vtatur,
 melius proficiet. Ad oculorum
 medicamenta efficax est, si sco-
 bes ramentave vino Chio die
 noctūque macerata, in colly-
 ria digerantur. Nonnulli præ-
 trita ipsa excolant, reliquaque
 eundem in modum peragunt.
 Alij pro vino aqua vtuntur.
 Vritur in fictili nouo, donec
 in carbones redigatur. Laua-
 tur plumbi vsti modo, & ita
 ficcis scabrisq; lippitudinibus
 conducit.

Ροσά. Cap. CXXXI.

Rosa refrigerat & astringit,
 sed sicca multò magis. Succus
 recetibus foliis exprimitur, de-
 sectis forfice vnguibus (sic ap-
 pellantur candidæ foliorū par-
 tes) reliquum in pila premi &
 teri debet in vmbra donec co-
 gatur, & ita ad oculorum cir-
 cumlitiones recundi. Siccatur
 etiamnum folia rosarum, cōti-
 nuò versata, ne muceāt, néve
 fitus in iis infideat. Aridis rosis
 & in vino decoctis expressus
 liquor, facit ad dolores capitis,
 g iij aurium,

aurium, oculorum, gingivarū, sedis, recti intestini ac vulvæ, penna illitus aut infusus. Eadē sine expressione tusa, præcordiorum inflammationibus, humidis stomachi vitiis, igni sacro illini prodest: ficcis ac tritis femina asperguntur. Misceri solent vulnerariis antidotis, atque compositionibus quas antheras vocant. Folia vruntur in calliblephara. Flos qui in medijs rosis inuenitur, ficcatus, gingivarum fluxionibus efficaciter inspergitur. Capita pota citam aluum, & cruentas reiectiones sistunt.

Rosei pastilli. Cap. CXXXII.

Pastilli quos rhodides vocāt, hac ratione conficiuntur: Rosarū viridiū, quæ nullo antea humore madefactæ extabuerint, drachmæ quadraginta, Indicæ nardi drachmæ decē, myrrhæ drachmæ sex, tritæ digeruntur in pastillos, q̄ triū obolorū pondus æquēt: ficcatisq; in umbra, in fictili nō picato, atq; obturato recodūt. Alij adiiciūt costi drachmas duas, iridis Illyricæ totidē, & vinū Chiriū cū melle miscēt. Mulierib; moniliū vice collo circūdato vsui sūt, ad retundendū grane sudoris virus. Tritis etiā vtuntur ad illitiones

ἐφ' ὁδάλμαῶν, ὀτῶν, οὐλῶν, δακτύλων, ἀπενδυσμένεσιν ἐντέρεσιν, μήτρας, πλεῖσθ' ἐγχειρόμενον καὶ προσκλυζόμενον. αὐτὰ δὲ διὰ τοῦ ἐκδιελύωαι, κοπέντα καὶ ἐπιπλασόμενα, ποιεῖ πρὸς ὑποχονδρίων φλεγμοναί, καὶ σωμαχοῦ πλάσθον καὶ ἐρισπύλατα. ἔξωθεν δὲ λεία παρὰ μηροῖς περισπασέτω, καὶ ἀνθηραῖς καὶ τραυματικαῖς ἀντιδοτοῖς μέλυσται. χρίεται δὲ καὶ εἰς χαλκιδέφερα. τὸ δ' ἐν μέσοις τοῖς ῥόδοις εὐεισκόμενον αὐτὸς πρὸς οὐλῶν ρευματισμοὺς ξηρὸν περισπασέτω ποιεῖ. αἱ κεφαλαὶ δὲ ποδεῖται, κοιλίαν ρέουσιν καὶ αἵματος ἀναγωγῇ ἐπέχουσιν.

Περὶ Ῥοδίδων. Κεφ. ρλβ'. ιθ

Καὶ αἱ λεγόμεναι δὲ ῥοδίδες, σκευάζοντι τὸν τρέπον τοῦτον ῥόδον χλωρῶν ἀβρόχων μεμασμένων < μ'. γὰρ δὲ ἰνδικῆς < ἡ σιμύρης < ε'. λεία ἀναπλάσσειται εἰς τροχίλοις τειοβολαίοις. 20 καὶ ἐν σιῇ ξηραίνεται, καὶ ἀποτίθεται εἰς κεραμεῖν ἀγρεῖον ἀκόνητον πελεσφλωμένον. ἔγροι δὲ περισπασέτω καὶ κόσου < β'. ἴρεως ἰλλυρικῆς τὸ αὐτὸ μίσχοντες καὶ οἶνον χῆον μετὰ μέλιτος. 25 χρίσι δὲ αὐτῶν ὅστιν, ἐπὶ γυναικῶν περιπτεμένων τῷ τραχέει ἀντὶ ὁρμῶν, ἀμειλύνουσαι τῶν ἰδρώτων δυσωδίαν. χρίονται δ' καὶ λείοις ἐν διαπλάσμασι καὶ

ἢ συγχρίσασθαι μετὰ τὸ λυττόν,
καὶ μετὰ τὸ ξυραγνύωαι, ἀπι-
κλύνονται ψυχῶ.

Πεὶ Λυκίου.

Κεφ. ρλγ.

5 Λύκιον, ὃ ἐνιοι πυξάκανθαν κα-
λεῖσι, δένδρον ὅτιν ἀκανθώδες, ῥά-
βδος ἔχον τειπέχεις ἢ ἢ μείζο-
νας· περὶ αὖ τὰ φύλλα πύξω ἁ-
μοια· πυκνά· καρπὸν δὲ ἔχει ὡς
πέπερ μύκανα, πικρὸν, πυκνόν,
10 λεῖον· ἢ τὸν φλοιὸν δὲ ὠχρὸν, ὁ-
μοιον τῷ διεξέντι λυκίῳ· ῥίζας δὲ
πολλὰς, πλαγίας, ξυλώδεις. φύε-
ται δὲ πανταχοῦ ἐν κατωπαδοκίᾳ
ἢ λυκίᾳ, ἢ ἐν ἄλλοις τόποις πολ-
λοῖς. τραχέα δὲ φιλεῖ χροεῖα. χυ-
15 λίζεται δὲ, τὰ φύλλον συν τοῖς δά-
κμοις θαλασσέντων ἢ βραχέντων,
ἐφ' ἱκανὰς ἡμέρας, εἴθ' ἐψιδέν-
των, ἢ τῶν μὲ ξύλων ῥιπτομένων,
τῷ δὲ ὑγροῦ πάλιν ἐφορμῶν μέ-
χρι μελιτώδους συστάσεως. δολυ-
20 ται δὲ ἀμόργης τῇ ἐψήσει ἅμα
μυρμιρῶν, ἢ ἀψινθίᾳ χυλίσμα-
τι ἢ βοεῖᾳ χολῇ· ἢ τὸ μὲ σπινθη-
ρόν ἀφρώδες ἐν τῇ ἐψήσει ἀ-
φρώδων, ἀπόδου εἰς τὰ ὀφθαλμικά·
τῷ δὲ λοιπῷ εἰς τὰ ὀφθαλμικά·
25 νεται δὲ ἢ ἐν τῷ καρπῷ ὁμοίως
χυλίσμα ἐκπιεζομένων ἢ ἡλια-
ζομένων. ἐστὶ δὲ κάλλιστον τὸ καμό-
μενον λύκιον, καὶ κατὰ πλὴν σβέ-
σσει τὸν ἀφρὸν ἐνερευθῆ ἔχον, ἔξω-
θεν μέλαν, διαρεθρὸν δὲ κερρόν
ἄλγος.

& diaphasmata, quæ fiunt ad su-
dore coërcendos, ita ut à bal-
neis inarescant corpora, dein
frigida aqua abluantur.

Lycium. Cap. CXXXII.

Lycium, quod aliqui pyxa-
canthan vocant, arbor est spi-
nosa, ramis trium cubitorum,
aut longioribus: foliis buxi,
densis: fructu piperis, nigro,
lævi, amaro, densoque: corti-
ce pallido, non dissimili lycio
madefacto: radicibus multis,
obliquis, lignosis. Nascitur plu-
rimum in Cappadocia, Ly-
tia, & plerisque aliis locis. A-
spira loca amat. Succus ex-
trahendi ratio hæc est: Rami
cum radiculis tusi & antè per
multos dies macerati coquun-
tur, tum abiectis lignis itidem
liquor, donec mellis crassitu-
do fiat. Adulteratur id lycium
adiecta decoctioni amurca,
aut absinthij succo, aut felle
bubulo. Innatans spuma in-
ter coquendum exempta, ocu-
lorum medicamentis additur:
reliquo ad aliavtuntur. Simili
modo fit lycium, semine ex-
presso & insolato. Optimum
quod vri potest, restinctum-
que rubentem spumam osten-
dit, glebis extrinsecus nigris,
intus, cum fregeris, rufis odo-

DIOSCORIDIS

re minimè viroso, cum amaritudine adstringēs, crocino colore (cuiusmodi indicum est) cæteris præstantius atque efficacius. Lycium adstringit, caliginem oculorum discutit, genarum scabiem, pruritus, veteresque fluxiones sanat: facit ad purulentas aureis, exulceratas gingivas, tonsillas, labiorum fissuras, sedis rimas, attritusque illitum: coeliacis, dysentericis, potum inditumque conuenit: datur sanguinem excreatibus & tussi, ex aqua: contra rabiosi canis morsus in catapotio deuoratur, aut in aqua bibitur: flauos facit pilos: reduiuis vlceribus quæ serpunt aut putrent, medetur: foeminarum profluuia appositum sistit: rabioforū ictibus ex melle potum, aut vice catapotij deuoratum, auxiliatur. Tradunt Indicū fieri lycium, ex frutice lóchitide appellato: ea spinarū generi ascribitur, ramos rectos habēs ternū cubitorū longitudine, maiorésve, rubo crassiores, à radice numerosos. Fractus cortex rubescit, folia oleæ familia. Herba í aceto decocta proditur lienis inflammationib⁹ & regio morbo mederi, & foeminarum purgationes elicere.

Assue-

ἀλσων, σύφον μὲν πικρίας χροματι χροκῶδες, οἷόν ἐστι τὸ ἰνδικόν, διαφέρον τῷ λοιπῷ καὶ δυναμικώτερον. Δύναμιν δὲ ἔχει συπλίκην, καὶ τὰ ἐπισκοιοῦντα τῇ κόρῃ καθαίρει, ψωριάσεις δὲ τὰς ἐπὶ τῇ βλεφάρῳ, καὶ κνησμοὺς καὶ παλαιὰ ρεύματα θεραπεύει· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ὧτα πυρρῶρουντα, πάλιν· ὁμα, ἔλα εἰληκωδύα, καὶ διερρα γότα χείλη, ῥαγάδας ἐν δακτυλί- 10 οῖς, καὶ παραβίμια ἐπιχειρόμενον· ἀρμόζει καὶ κοιλιακοῖς καὶ δυσεντερικοῖς, πτόμενον καὶ ἐγκυζόμενον. δίδω· ὅ καὶ αἱμοπτοικοῖς, καὶ βήτικαι σὺν ὕδατι καὶ τοῖς ὑπὸ λυσσῶντος κυνὸς διηχθεῖσι, κα- 25 ταποτίω ἢ σὺν ὕδατι ποτόν· ξανθίζει τὸ καὶ τείχας· παρωνυχίας τὸ καὶ ἐρπιτας, καὶ σπινθόνας ἰάται· ἴσσει καὶ ροῦν γυναικείον προσιδέμενον· βροχεῖ δὲ καὶ λυσσοδύκτοις ποδὲν μὲν γάλακτος, ἢ αὐτὴ 20 κατωποτίου λαμβανόμενοι. λέγεται ὅτι τὸ ἰνδικὸν λύκειον γίνεσθαι ἐν δάμνῳ, τὸ λεγόμενης λογχίπιδος· ἐστὶ δὲ εἶδος ἀκαθάρτης, ῥαβδίας ἔχουσα ὁρδᾶς βίπυχαις ἢ καὶ μέζοις πολλαῖς ἀπὸ τοῦ πυθνός, παχυτέρας βάρους φλοιὸς ῥαγεῖς ἐν ρευθῇ. τὰ δὲ φύλλα ὁμοία ἐλαία, ἥς ἢ πόα ἐν ὅῃ ἐψηθεῖσαι καὶ ποτιζομένη· ἰσχυρεῖται φλεγμονὰς σπληνός· καὶ ἰκτερον ἰάσθαι, καὶ κατάρσεις γυναικείας ἀγειν 25

καὶ ὁμῇ δὲ λεία ποθεῖσα, τὰ
αὐτὰ ποιῆν παρρηδίδεται τοῦ δὲ
σπέρματος μύσρα δύο ποθέντα,
ὕδα τῷ δὴ καὶ θάλλει, καὶ θανάσι-
μοις βοηθεῖ.

5 Πρὶ Ακακίας. Καρ. ελδ'.

Ακακία φύε' ἐν αἰγυπλίῳ ἄκρω
θα δὲ ὅστ' ἐν δρόωδης, θαμνοει-
δῆς, οὐκ ὀρθοφυῆς, αὐτὸς ἔχουσα
λευκόν, τ' ὃ καρπὸν ὥσπερ θέρμον
ἐν λοβοῖς κείμενον, ἐξ ἧς καὶ ἐκθλί-
10 βε' τὸ ἐρύκισμα. ξηραίνοντος
ἐν σιῶ, μέλαν μὲν ἐν τῷ πεπαισ-
καρπῷ, ὑπόκιρρον δ' ἐν τῷ ὠμῷ.
ἐκλέγῃ δὲ τὸ ἡμέμα ἐκκιρρὸν, ἐν ᾧ
δὲς, ὡς ἐν ἀκακίᾳ χυλίζουσι δὲ
πινες τὰ φύλλα σὺν τῷ καρπῷ.

15 καὶ κόμμι δὲ ἐν τῇ ἀκακίᾳ γη-
νᾷται. Δυάμιν δὲ ἔχει συπ-
κνῆ, ψυκτικῇ, ἀρμόζει δὲ ὁ χυ-
λὸς πρὸς τὰ ὀφθαλμικὰ καὶ ἐρυ-
σιπέλατα, ἔρπητας, χιμεδλα, πτε-
ρύγια, τὰ ἐν τῷ σώματι ἔλκῃ,

20 καὶ περὶ ὧσεις ὃ ὀφθαλμῶν κα-
δίσησιν, ἐπέχει δὲ καὶ τοῦ γυν-
αικείου, καὶ τὰς περὶ ὧσεις δὲ
τῆς ὑστέρας σέλλει, κοιλίαν τὴν
ρέουσιν ἐπέχει πνέοντος, καὶ ἐγ-
κλυζόμενος· μελαίνει δὲ καὶ τεί-

25 χας. πλυνέται δὲ καὶ εἰς τὰ
ὀφθαλμικὰ, τριβομένου μὲν ὕ-
δατος ἀποχομένου τῷ ἐπιπάγῃ
ἄχρῃς ἂν καὶ θάρον ἐφιστῇται τὸ
ὕδωρ, καὶ ὥτως ἀναλαμβάνει εἰς
τροχίσκοις. καίεται δὲ ἐν ὠμῇ

χρῶα

Asseuerant etiam crudam in
potu, eisdem effectus præsta-
re. Semen cyatho dimidio po-
tum, pituitam expurgare, vene-
nis quoque auxilio esse.

Acacia. Cap. CXXXIII.

Acacia in Ægypto nascitur
spina instar arboris, frutico-
sa, non se in rectum attollens.
Florem habet candidum, &
femen lupino simile in folli-
culis, ex quo succus expres-
sus ficcatur in vmbra, niger ex
maturo semine, subrufus ex
viridi. Eligatur modicè rufus
& odoratus, vt in hac arbore
esse potest. Aliqui exprimunt
ex foliis, & semine succum.
Manat & gummi ex ea spina.
Vis ei ad spissandum, refrige-
randumque efficax. Succus o-
culorum medicamentis utilis:
valet ad ignem sacrum, vlcera
quæ serpunt, perniones, ptery-
gia, & oris vlcera: prociden-
tes oculos reprimat, mensium
abundantiam sistit, procidua
vulnam cohibet: citam sup-
primit, aut potus aut subter in-
dutus: capillos denigrat. La-
uatur oculorum medicamen-
tis, trito in aqua, mox effuso
quod concreuerat, donec pu-
ra extet aqua: & ita cogitur in
pastillos. Vritur etiam in cruda
fidelia,

DIOSCORIDIS

fidelia, donec fictile fornaci-
bus percoquatur: torreturque
in carbonum halitu perflata.
Spinæ decoctum solutos artus
fotu committit. Præfertur eius
spinæ gummi, quod in vermi-
culorum speciem cotrahatur,
& vitri modo perluceat, ligni
expers: proximum est candi-
dum: sordidum verò ac resino-
sum inutile. Cutis meatus ob-
struit, & medicamentorū qui-
bus admiscetur, acrimoniā he-
betat, ambustis ex ovo illitum,
pustulas non patitur erūpere.
Alterum acaciæ genus in Cap-
padocia Pontoq; prouenit. Æ-
gyptiæ spinæ similitudine, lógē
min^a, tenerius, humile: aculeo-
rum vallo munitur, folia habēs
rutæ. Semē lécicula minus fert
autumno, in oculis connexis,
ternūm quaternūmūe capaci-
bus. Succus eius adstringit, vi-
rib⁹ inferior, & ocularib⁹ me-
dicamentis inutilis.

Amurca. Cap. CXXXV.

Armuca (expressæ oliuæ re-
cremētum) decocta in cupreo
vase ad crassitudinē mellis ad-
stringit, cæteros præbens lycij
effectus. Insuper dentium do-
lori & vulneribus, cū aceto vi-
no aut mulso commodè illinit:
addit in medicamēta ocularia,
&

χύρα μετ' κεράμεν ἐν χαμίνω ὁ-
πῖται δὲ ἐπ' ἀνδράκων ἐκφυσ-
σωμένη, τὸ δὲ τῆς ἀκακίας ἐψι-
μα κατατλέμενον, ἄρδρα λευ-
μυρά ἴσῃσι. Τὸ δὲ κόμμα τ' ἀκα-
κίας διαφέρει τὸ σκληροειδές, ὑε-
λίζον, διαυγές, ἄξυλον, εἴτα τὸ
λευκόν· τὸ δὲ ῥητινώδες καὶ ῥυπα-
ρὸν, ἄχρηστον. Δυνάμει δὲ ἔχει
παρεμπλαστικὴν, ἀμβλυωτικήν,
δριμύνην φαρμάκων οἷς μίγνυται.
Πυρίχλωτά τε καὶ ἐὰν φλυκταίνῃ-
ται καταχρίμενον μετ' ὕου.
Φύεται δὲ καὶ ἑτέρεα ἀκακία ἐν
καππαδοκίᾳ καὶ πίντω, παρεμφέ-
ρουσα τῇ αἰγυπτιᾷ. ἐλάττω μὲν
τοὶ παρὰ πολὺ καὶ χαμαΐζηλος, καὶ
στυφροτέρη* ἀσπυγέως δὲ ἀ-
κακίας σκολοπιᾶς, ὅνλα ἔχει
σα πηγὰς ὁμοία* τὸ δὲ σπέρμα
ἐν θηλάκοις συνελθὺς μύοις, τει-
χέρις ἢ τέτραρχοίς, ἐλάττω
φακοῦ. σύφει δὲ καὶ αὐτὴ χυλίζο-
μένη σύμπασα, πάλιν ἠπὼν τῇ
δυνάμει κατέστηκεν, εἰς τὰ ὀφ-
θαλμικὰ ἀνεπιτήδειος ἔσται.

Πρὶ Ἀμύργης. Κεφ. ρλζ.
Ἀμύργη ὑπερᾶθμι ὅστιν ἐλαίας
τ' ἐκθλιβομένης, ἢ πρὶ ἐψηθεῖσα
ἐν χαλκῷ κυτρίῳ μέχρι μελιῶ
δύς συστάσεως, σύφει πρὸς
καὶ τὸ λύκιον, ἐν πελαγοῦ δὲ καὶ
πρὸς ὀδονταλγίας καὶ βλάβματα,
ἐπιχρυσίμεν μετ' ὅξος ἢ οἴνου ἢ οἱ
νομάματος μίγνυται* καὶ ὀφθαλμικῶς
καὶ

καὶς διωόμεσι καὶ ἐμπλαστικαῖς·
 παλααιμὴν τὴν βελτίων γίνεσθαι
 κλυσιὰ τὴν ἔδρα καὶ αἰδοίαν καὶ μὴ
 τραῖς εἰληκωμέναις ὅτι χεῖρμος
 ἐκβάλλει καὶ τὸν ἐφ' αὐτῆς
 ὁδόντας σὺν ὀμφακίνῳ ἐψηθεῖσα
 ἄρχει μελιτώδεις συστάσεις, καὶ
 περὶ παλαιὰς φώρας τὴν κτηνῶν
 σὺν θερμῶν ἀφελήματι καὶ χαμαι
 λέοντος καὶ αἰχμημένην θεραπεύει.
 ἢ καὶ ἀνέψητος καὶ περὶ σφατος πο-
 10 δαρκυνὸς καὶ ἀρδρητικὸς ὠφελεί,
 δερμὴν καταπταίνουσα· ἐλχισμὸν
 ἢ εἰς κόδιον καὶ ἐπιπιδευμένην
 ἐπὶ τῷ ὑδροπικῶν σέλας τὸ ὄγκον.

Περὶ Ἀγνυ. Κεφ. ρλς.

Ἀγνος ἢ λύκος δαίμωνος ὅτι δειν-
 25 δρώδης, παρὰ ποταμοῖς βραχέσι
 τε τόποις καὶ χαράδραις φυόμε-
 νος, ῥάβδους ἔχων θυδραύσοις,
 μακρὰς φύλλα καὶ ὡς περὶ ἐλαίας,
 ἀπαλώτερα δέ. τὸ δ' αἶδος ἢ
 μὲν τις λευκὸν σὺν ὑποπορφυρί-
 30 ζοντι καὶ πορφυροῦ φέρει. σπέρ-
 μα καὶ ὡς περὶ Διῶαμιν καὶ ἔχει
 θερμαντικὴν, συπτικὴν. ὃ καὶ καρπὸς
 αὐτὸν πνέοντος, βοηθεῖ θηριοδύ-
 κησις, σπληνικοῖς, ὑδροπικοῖς καὶ
 ταπασί καὶ γάλα, καὶ ἐμβλινὰ ἀ-
 35 γει πνέοντος ὅσον ἄ. πλῆθος
 σὺν οἴνῳ ἐκλύει καὶ γυνὴν. ἀ-
 πτεῖ καὶ κεφαλῆς καὶ ἐν ἐπι-
 φέρων. τὸ δὲ ἀφελήμα τὸ πῶς καὶ
 σὺν σπέρματος, εἰς ἐγκαθίστα-
 τα ταῖς περὶ ὑστέραν διακρίσεις
 καὶ

& meatus inductu suo obstru-
 entia. Vetustate meliorem fie-
 ri constat. Vtiliter infunditur
 sedis, genitalium, ac vulvæ ex-
 ulcerationi. Si verò cum om-
 phacino recoquatur ad mellis
 crassitudinem, cariosos dentes
 extrahit: iumentorum scabiem
 cum decocto lupini, & chamæ-
 leōte illitu sanat. Cruda & re-
 centi amurca podagras articu-
 lariosque dolores foueri, vtilis-
 simum: peruncta in villosa pel-
 le, & hydropicis imposita, tu-
 moris molem reprimat.

Vitex. Cap. CXXXVI.

Vitex siue lygos frutex est in
 arborem assurgens, nascitur in
 fluminum ripis, asperisque locis,
 ac torrentium alueis: ramos ge-
 rit λόγος, fractu peruiaces fo-
 lia oliuæ sed molliora. Duo ge-
 nera eius, vna harum albū flo-
 rem mittit cum purpureo: alte-
 ra tantū purpureum, & semen,
 vt piper. Excalfactorias vires
 habet, & adstrictorias. Semen
 eius potum venenatis ictibus,
 aquæ quæ cutem subiit, lieno-
 sisque auxiliatur: lac euocat,
 menses ciet, drachmæ pōdere
 in vino potum: geniturā exol-
 uit, caput tentat, & soporē af-
 fert. Decoctū herbæ & seminis
 in desefsione, mulierib⁹ vulvæ
 malo

DIOSCORIDIS

malo opportunis opitulat̃, itē
inflammationibus: purgationes
mouet semē cū pulegio potū,
etiā suffitu vel appositu: capitis
dolorem dissoluit illitū, instilla-
tur cū aceto & oleo capiti in
Iethargo & phrenitide. Folia
suffitu aut substratu fugant ve-
nenata: illita quoq; serpētium
morsibus auxiliantur: testiu du-
ritias cum butyro & foliis vi-
tium emolliunt: rimas sedis se-
men cum aqua illitū mitigat,
& cum foliis medetur luxatis,
vulneribusq;. Virgā qui manu
teneat dum iter facit, negat̃ in-
tertriginē sentire. Agnū, quasi
dicas castū, vocāt Græci, quo-
niam matronæ in thesmopho-
riis Atheniēsium castitatē cu-
stodientes, foliis huius cubitus
sibi sternūt, & lygon quasi vi-
men, propter inuictam ferē ra-
morum flexilitatem.

Salix. Cap. CXXXVII.

Salix vulgò nota est: cuius
femen, folia, cortex & succus
spissandi vim habent. Trita fo-
lia cum exiguo pipere & vino
pota, ileosis subueniūt: sumpta
per se & cum aqua præstant
mulieribus ne concipiant. Sa-
lignum semen in potu sangui-
nem expuētibus prodest: cor-
tex eosdem præbet effectus.

Corticis

καὶ φλεγμαῖς ἀρήγει· πεδὺν δὲ
μετὰ ἱλήχωνος καὶ ὑποδυμιάδην
τὸ σπέρμα καὶ ποροσέθεν, ἐλάσσον
κινεῖ· λύξ δὲ καὶ κεφαλαλγίας κα-
ταπλαστέμενον, καὶ ἐπὶ ληθαργι-
κῶν τε καὶ φρενιτικῶν ἐμβέχεται·
συνὸς δὲ καὶ ἐλαίῳ. καὶ τὰ φύλλα
ὑποδυμιάδῳ τε καὶ ὑποσπώννῳ
μύρα, θηρίᾳ διώκῃ, καὶ χαλασασ-
σόμενα ἐπὶ τῇ θηριοδύκτων βοή-
θειᾷ, σκληρίας τὲ διδύμων μετὰ
ἐκτύρῃ καὶ φύλλων ἀμπέλου μα-
λάττει, ῥαγάδας τὲ τὰς ἐν δακτυ-
λίῳ συνὸς ὕδατι ἐπιπλασθέν τὸ
σπέρμα πρὸς αὐτῇ συνὸς τῶν φύλ-
λων, σπέρματα, τρυφάματα ἰᾷ.
δοκεῖ δὲ καὶ κωλυτήριον εἶναι ἐν
ὁδοιπορείᾳς παρεπιμύμων. εἰ
πὶ ῥάβδον αὐτῆς παρὰ χεῖρα
κρατῇ. ὠνόμασται δὲ ἄγριος, διὰ
τὰς ἐν τοῖς θησιμοφορίοις ἀγρευέ-
σας γυναικας, εἰς ὑπέρσωμα χεῖ-
ρται αὐτῇ, λύξ δὲ διὰ τὸ πρὸς
τὰς ῥάβδους αὐτῆς ἔυτονον.

Πρὶ Ἰτίας. Κεφ. ρλζʹ.

Ἰτα δὲν δρον ὅτι πᾶσι γινώ-
ειμων, ὅς ἐστι καρπὸς καὶ τὰ φύλλα
καὶ ὁ φλοιὸς καὶ ὁ χυλὸς. συπι-
κνύει καὶ δυνάμειν ἀρμόζει τὸ
φύλλον λεῖα μετὰ ὀλίγου πεπε-
ρεως καὶ οἷου ποθέντα εἰλεώδεσι,
καθ' ἑαυτὰ δὲ συνὸς ὕδατι λησθέν-
τα, ἀσπληνῆϊαν κατὰρξάτω. ὅς τ'
καρπὸς ποδεῖς, αἱμοποιοῦντες ὠφε-
λεῖ, καὶ ὁ φλοιὸς δὲ τὰ αὐτὰ δρᾷ.
καὶ εἰς

καὶς δὲ καὶ φυραδεὶς ὄξει, τύλας
 καὶ ἥλας αἰεὶ καταπλαθεῖς. ὁ δὲ
 ἐκ τῶν φύλλων καὶ τῶ φλοιῷ χυ-
 λός, ἐν καλύφῳ ῥόας δερμανθεῖς
 μετὰ ῥοδίνῃ, ὠταλγίας ἀρήγει καὶ
 5 τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν, κατὰ-
 τλημα ποδάγρας ἀριστὸν· σμύχει
 δὲ καὶ πίτυρα λαμβάνεται δὲ καὶ
 ὁπὸς ἐξ αὐτῆς ἐντερινοῦ τοῦ τῶ
 φλοιῷ καὶ τῷ αὐτῇ σιν, ἔστω γὰρ
 εὐρίσκεται σινεσῶς. Δυνάμειν δὲ
 10 ἔχει σμικτικὴν τῶν ἐπισκοποῦν-
 τῶν ταῖς κόραις.

Πρὶ Ἀρχειλαίας. Κεφ. εἰς.

Ἀρχειλαία καὶ ἐννοίη κόπινον κα-
 λούσιν, οἱ δὲ, αἰδιόπικν ἐλαίαν.
 ἔχει φύλλα συπληκὰ, λεῖα δὲ κα-
 15 ταπλαθέντα, ἐφεκτικὰ ὅστιν ἐρυ-
 σιπελάτων, ἐρπύτων, ἐπινυκτί-
 δων, ἀνδράκων, νομῶν, παρωνυ-
 χίων, περὶ χαρκατικὰ ἐξαρθῶν,
 σὺν μέλιτι καταπλασθῶντα,
 ἀνακαθαίρει δὲ καὶ τὰ ῥυπαρὰ
 20 ἔλκεα, διαφορεῖ καὶ φύγεθλα καὶ
 φλεῖμονας, σὺν μέλιτι καταπλα-
 σθέντα, καὶ δέσμα κεφαλῆς ἀπο-
 σπασθέν, παρὰ κολλᾶ ἴαται δὲ καὶ
 τὰ ἐν στόματι ἔλκεα καὶ ἀφθας δια-
 μασσηθέντα, καὶ ὁ χυλὸς δὲ αὐτῇ καὶ
 25 τὸ ἀφέψημα, τὸ αὐτὸ ποιεῖ ἐπι-
 χει δὲ καὶ αἰμορροαίαν, καὶ ῥοῦν
 γυναικείον φροσθήμενος ὁ χυλὸς
 καὶ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς σαφυλώ-
 ματα, καὶ φλυκταίνας. ἐπὶ δὲ ἔλκεα
 καὶ παλαιὰ ῥεύματα σέλει.

διὰ

Corticis cinis admisto aceto
 maceratus, illitu clauos & cal-
 los tollit. Ex foliis & cortice
 succus cum rosaceo in calyce
 punici calfactus, auriū dolori-
 bus auxiliatur. Decocto eorū
 podagras foueri vtilissimum:
 furfures purgat in corpore. Ex
 cipitur succus qui manat ex ea
 cū floret, exciso cortice: in pla-
 ga enim cōcretus humor inue-
 nitur, qui ad purgāda, quæ ob-
 stant oculis, suā vim præbet.

Syuestris olea. Ca. CXXXVIII.

Syluestris oleæ, quam Latini
 oleastrū appellant, alij Æthio-
 picam oliuam, folia astringūt:
 trita autem & imposita ignem
 sacrum, vlcera quæ serpunt: e-
 pinyctidas, carbunculos, redu-
 uias nomāsque cohibent: cru-
 stas emarginant: cum melle il-
 lita. Quinetiam sordida vlce-
 ra repurgant: inflammationes
 panósque cum melle imposi-
 ta discutunt: cutem à capite
 vulsam conglutināt: oris vlce-
 ribus, & priuatim infantium,
 cōmanducata medentur. Suc-
 cus & decoctum eisdem ha-
 bēt effect⁹: sanguinis eruptio-
 nes, ac muliebre profluvium,
 admot⁹ succus inhihet: vix o-
 culorū, pustulisq; prodest, vlce-
 ra & veteres defluxiones sistit,
 quapro-

DIO SCORIDIS

(quapropter in collyria additur.) ad genarū erosiones perquam utilis. Exprimitur succus tuis folijs, affuso vino aut aqua, siccatusque sole in pastillos digeritur: sed longè validior ad recondendum succus habetur, qui cum vino quàm cū aqua expressus est. Auribus subuenit, siue vlcerentur, siue pus effluat. Folia conueniēter coeliacis cum farina hordeacea illinuntur: vruntur cū floribus folia, vt ipodij vicē cinis præstet, in cruda olla, oblito ore luto, vsque dum figlinū percoquatur: restinctaque vino & rursus subacta, eodem modo vruntur, postremo cerusæ modo elota coguntur in pastillos. Huiuscemodi cinerē in medicamentis oculorū constat spodio non cedere, sed eisdē viribus præditū esse putandū est.

Olea. Cap. CXXXIX.

Foliorum fatiux oleæ eadē vis intelligitur, sed aliquāto inferior: vnde ocularibus medicamentis ob suam mitiorem vim conuenientior est. Sudor ligno virenti accenso manans, illitu sanat lichenas, furfures et & scabiem. Oleaginum semen illitū medetur furfuribus, & vlceribus quæ depascūt voratq; quod

διὸ καὶ μνηστὰ κολλυείοις πρὸς τὰς τῶν βλεφάρων διασείσεις ἐνδετεῖ, χυλίζοντας δὲ δεῖ κόπην τὰ φύλλα, καὶ περιχέοντας οἶνον. ἢ ὕδωρ ἐκθλίβειν, καὶ ξηραίνοντας ἐν ἡλίῳ ἀναπλάσσειν. ἔστι δὲ ἐν τοῖς νώτεροις, ὁ διὰ τοῦ οἴνου ἐκθλιβόμενος, καὶ εἰς ἀπύρετον μᾶλλον τῶ δὲ ὕδατος ἀρμόζει. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὸτα πυρρῶνται καὶ εἰλικωδῆα. τὰ δὲ φύλλα καὶ ἐπὶ κοιλακοῖς ἐνδετεῖ κατὰ πλάσσειν. ἰο
να συνὲ ὠμολύσει· κρίεται δὲ τὰ φύλλα μετὰ τῶν ἀνδῶν, καὶ ἀντὶ σπείου λαμβάνεται ἐν χύτρᾳ ὠμῇ περιπλασσομένη πολλῷ τῷ σόμα· μέχρις ὅπῃ σέως τὸ κεράμει ἔπειτα κατασέβνται οἶνον, καὶ πυρρῶνται πάλιν οἶνον, ὁμοίως κρίεται· ἔπειτα παλιν ὥς τὸ ψιμμίδιον καὶ ἀναπλάσει. δὲ καὶ δὲ ἡ τοιαύτη κρῆσις, μὴ λείπειται τὸ σπείον εἰς τὰ ὀφθαλμικά· ὅθεν καὶ τὸ δυνάμιν ὁμοίως ἡγήτεον. 20

Πρὶ ἐλαίας. Κεφ. ρλθ'. Δυνάμει δὲ τὰ αὐτὰ καὶ τὴν ἡμερου ἐλαίας φύλλα, λείπει δὲ τῇ δυνάμει ὅθεν πρὸς τὰ ὀφθαλμικά καὶ μᾶλλον ἀρμόζει διὰ τὸ ἐπιφέρετον. τὸ δὲ ἐκ χλωρῆς τῆς ξύλης κρημνὸς ἐκ κρημνῶν ὑγρὸν, πίπτει καὶ ψώρας καὶ λεχμῶας κατὰ κρημνῶν ἰσθται καὶ ὁ καρπὸς δὲ αὐτῶν καταπλαθεῖς, πίπτει καὶ νομᾶς δερεπύει. τὸ δὲ

τὸ δὲ ἐντὸς τοῦ πυρλῦος μετὰ
τέτατος καὶ ἀλεύρου, λεπτοῦς ὀ-
νυχας ἐκπινάσκει.

Πρὶ Κολυμβάδων ἐ-
λαιῶν. Κεφ. ριγ'.

5 Ελαῖαι κολυμβάδες λεῖαι κατὰ
πλάθειται, πυρίκλωτα ἐκ ἐω-
σι φλυκταίνουσι, καὶ ῥυπαρὰ ὅτι ἐλ-
κη καὶ αἵματι. ὁ δὲ ἐκ τῆς ἀλμυ-
χλὸς αὐτὴ διακλυζόμενος, οὐλα
τέλλει, καὶ ὀδόντας σειομύους κρα-
10 τῶν ἐστὶ δὲ ἢ μὲν ὑποκίρρος καὶ
περὶ σφραγὸς ἐλαία, δυσκολίος, ἐν
τόμαχος ἢ δὲ μέλαινα καὶ πέφ-
εως, ἐν διάφθορος καὶ κακοσμία-
χος, ὁφθαλμοῖς τε ἀνεπιτήδειος
καὶ κεφαλῇ, φρυγίσαι δὲ καὶ
15 κατὰ πλάθειται νομαῖς ἴσησι, καὶ
ἀνδραχας περὶ ῥήπει.

Πρὶ Ελαίης ἀγρίας ἐ-
λαιάς. Κεφ. ριγ'.

Τὸ δὲ ἐκ τῆς ἀγρίας ἐλαίας ἐ-
λαιον, διάκλυσμα ἔλοις μυδῶσι.
20 καὶ σαλπικὴν ὑποσάτων ὀδόντων
ἐστὶ, πυρία τε δὲ αὐτὴ δερμανο-
μύους καὶ διακλυζόμενος ἐπιτήδει-
ος ἔλοις ῥευματιζομύοις. δεῖ δὲ
ἔριον μικρὴν πεπιπνέντας ἀπο-
βάπτην εἰς τὸ ἐλαιον, καὶ περὶ σάπης
25 ὅτι τοῖς ἔλοις ἄχρει ἀν λευκὰ φα-
νῇ. Πρὶ Δακρύου ἐλαίας αἰ-
διοτικῆς. Κεφ. ριγ'.

Τὸ δὲ δάκρυον τῆς αἰδιοτικῆς
ἐλαίας, ἔοικε πῶς σκαμμωνία.
ἐγκίρρον, ἐκ μικρῶν σαρόνων
σύγκει-

quod autē intra nucleum est,
ex adipe & farina scabros vn-
gues excutit.

Colymbades oleæ.

Cap. CXL.

Colymbades tritæ & ambu-
stis illitæ pustulas gigni pro-
hibent, sordida vlcera purgāt,
murix succus collutas gingi-
uas contrahit, & motus den-
tium firmat. Oliua flaua & re-
cens stomacho vtilior est, ven-
tri difficilis: nigra autem &
maturā corruptioni opportu-
na est, stomacho aduersatur,
oculis non conuenit, capitis
dolorem mouet, arefacta illitu
depascentia vlcera fistit, & car-
bunculos emarginat.

Oleum syluestris oliuæ.

Cap. CXLI.

Oleum syluestris oliuæ gin-
guis putri vligine laboranti-
bus colluitur, dētium mobili-
tates stabilit, calfacti fatus gin-
guis fluxione laborātibus vti-
lis est: lanam enim specillo cir-
cumligatam oleo madefacere
oportet, & gingiuis admouere,
donec albæ spectentur.

Lachryma æthiopicæ

oleæ. Cap. CXLII.

Lachryma quā æthiopica o-
lea stillat, scāmonio similis qua
dāten^o est, fulua stillis exilibus
cōstās,

DIO SCORIDIS

constās, mordax: quæ autē am-
moniaci aut gūmi similitudinē
refert, colore nigricās, nec gu-
stu mordēs, superuacua est. No-
strates oleæ, oleastriq̃; similem
lachrymā sudāt, quæ cōmodē
ad oculorū hebetudines illini-
tur: cicatrices albuginesq̃; illi-
tu emēdat, vrinā & mēses ciet,
cavis dentiū impressa ad dolo-
res efficax est: inter venena scri-
bit̃: partus pellit, lepras & impe-
tigines sanat. Appellatur autē
æthiopica & agrestis olea.

Quercus. Cap. CXLIII.

Quercus omnis adstricto-
riam vim habet, præsertim li-
ber qui cortici & ligno in-
tercedit: quinetiam tunica pu-
tamini glandis subiecta. De-
coctum ex iis datur dysente-
ricis, coeliacis, sanguinem ex-
creantibus. Trita in pello, fœ-
minis fluxione vuluæ laboran-
tibus subiicitur.

Glandes. Cap. CXLIII.

Glandes eosdem effectus
exhibent: vrinam ciunt, capi-
tis dolorem & flatus in cibum
sumptæ pariunt, resistunt esi-
tata venenatorum ictib⁹. De-
coctum earū & corticis cum
lacte vaccino potum, prodest
contra toxica: intrita crudæ,
inflammationes illitu leniunt:
ad duritias

συγκείμενον, δηκτικόν· τὸ δὲ ἴ-
μοιον κόμμι καὶ ἀμμωνιακῶ, με-
λανίζον καὶ οὐ δηκτικόν, ἀχρεῖον.
φέρει δὲ τὸ τοῖστον καὶ ἡ παρ' ἡμῶν
ἐλαία, καὶ ἡ ἀγριελαία· πιεῖ δὲ
πρὸς ἀμελυνώσαν καὶ οὐλας καὶ
λευκώματα ἐγχεῖσθαι σμή-
χει, οὐδ' ἄν τε καὶ ἐμβρυα κινεῖ, καὶ
πρὸς οἰσύντων πόνοις ἐνεργεῖ, ἐν-
πιδέσθαι εἰς τὸ βροῦμα· ἀναχρά-
σεται δὲ καὶ ἐν τοῖς φθαρτικοῖς·
ἀγει δὲ καὶ ἐμβρυα καὶ λειψύνας 10
παραπύει καὶ λέπραν· χαλεπὴ δὲ
αἰθιοπικὴ ἐλαία καὶ ἀγριελαία.

Πρὶ Δρυός. Κεφ. ρμγ'.

Δρὺς πᾶσα συπικνύει καὶ
διώκει, μάλιστα δὲ αὐτῆς σύ-
φει τὸ μεταξὺ τῶ φλοιοῦ καὶ τῶ 15
πρόσθιου ὑμφορῆδός· ὁμοίως καὶ
τὸ πρὶ τῇ βάλανῳ ὑπὸ τὸ κέ-
λυφος. δίδεται δὲ τὸ ἀφέψημα
αὐτῶν, κεκλινοῖς καὶ δυσεντε-
ρικοῖς, καὶ αἰμοπυῖκοις· καὶ
ἐν πρῶτοις λείον πρὸς δίδεται ροῖ· 20
καὶ γυναιξίν.

Πρὶ Βαλάνων. Κεφ. ρμδ'.

Καὶ αἱ βάλανοι ὅτ' αὐτὰ πιεῖ-
σιν· εἰσὶ δὲ καὶ ἐρεπτικαί, καὶ κεφα-
λαλγεῖς, βίβρωσκόμοι, καὶ πνευ-
ματῶσαι· ἀγμύζουσι δὲ πρὸς τὰ 25
ιοβόλα ἐδιόσθαι, καὶ τὸ ἀφέψημα
δὲ αὐτῶν καὶ τῶ φλοιῷ, βοηθεῖ
τοξικῶ μὲν γάλακτος βοείης πινό-
μενον, ὡμαὶ δὲ κατὰ πλάθεισαι
λεῖαι, φλεγμονὰς παρηγορεῖσι,
συν

συνέαπ' δὲ χοιρεῖω ταιριχ-
 ρῶ, πρὸς χαλοήδεις σκληρίας, καὶ
 πρὸς πονηρευόμενα ἔλκη ἀρμό-
 ζουσιν ἰχυρότερά δὲ τ' δρυῖνων
 αἱ ὑπὸ τῇ δυνάμει εἰσίν.

πρὶ Φηροῦ καὶ ὑπὸ τῆς.

Κεφ. ρμϛ.

* Καὶ ἡ φηρὸς καὶ ἡ ὑπὸ τῆς εἰδη-
 ὄντα δρυὸς, εὐκότα ἐνδρῆ. τῆς
 ρίζης δὲ τῆς ὑπὸ τῆς ὀφλοῦς ἐν-
 δεις συνὺδαπ' ἄρχεις οὗ τακτι-
 10 ρος γίνονται, καὶ ἐπιπλαθεῖς νύ-
 κτα ὅλῳ, τείχας μελάνθ' ὑπε-
 αποσμηχθείσας κίμωνιά γῃ. ἀρ-
 μόζει δὲ τὰ φύλλα παύτων, κο-
 πέντα λεία οἰδήμασι, καὶ τὰ ἄτο-
 να δὲ μέρη κράτυψι.

15 πρὶ Κασάνων. Κεφ. ρμς'.

Αἱ δὲ σαρδαναὶ βάλαροι, ὡς π-
 νὲς λόπμα ἢ κασάνη χαλοῦσιν, ἢ
 μύοτα ἢ διὸς βαλάνοις, σύφουσαι
 καὶ ἀνταὶ τῶν ὁμοίων εἰσὶ δρασ-
 καὶ, καὶ μάλιστα οἱ μετὰ τὴν τῆς
 20 σαρκὸς καὶ τῆς λέπους φλοιοί. ἡ δὲ
 σαρξ καὶ τοῖς ἐφήμερον πεπωκό-
 σιν ἀρμόζει.

πρὶ Κηκιδῶν. Κεφ. ρμζ'.

Κηκὶς καρπὸς ὅτι δρυὸς.
 ἡ μὲν τις ὀμφακίτις καλεῖται
 25 μικρὰ καὶ κονδυλώδης, σιβα-
 ρὰ, ἀπὸ πηκτός. ἡ δὲ τις λεῖα,
 καὶ κόρυς καὶ τετρημύρη. ἐν-
 λέγεται δὲ δὲ τὴν ὀμφακί-
 τιν, ἐπεργασέσθαι οὖσαν. ἀμ-
 φότερα δὲ σύφουσιν ἰκανῶς,
 καὶ

ad duritias quas coëthe vo-
 cant, & malefica vlcera cum
 falsa axungia conueniunt. Ili-
 gneæ glandes viribus quernas
 antecellunt.

Fagus & ilex.

Cap. CXLV.

Fagus & ilex quercus gene-
 ri assignantur, & cōsimile mu-
 nus obeūt. Iligneæ radicis cor-
 tex cum aqua coctus, dū mol-
 litus intabescat, & tota nocte
 illitus, denigrat capillos, prius
 cimolia terra purgatos. Folia
 omnium tusa & trita tumori-
 bus profunt, & imbecillas me-
 brorum partes corroborant.

Castaneæ. Cap. CXLVI.

Sardianæ glâdes, quas aliqui
 castaneas, aut lopima, aut glâ-
 des Iouis appellant, adstrin-
 gunt, similisque effectus præ-
 bêt: præsertim tunica quæ car-
 nem & corticem media inter-
 cursat. Caro his qui ephemerū
 biberunt, conueniens est.

Galla. Cap. CXLVII.

GALLA fructus est quer-
 cus. Aliqua omphacitis appel-
 latur, parua quidem sed tu-
 berosa, solida, nullo foramine
 peruiua. Altera plana, leuis, per-
 forata. Eligi debet omphaci-
 tis, quæ efficacior est. Vtrius-
 que vis vehemēter astringere.

h Tritæ

Tritæ excreſcētia in carne,
fluxiones gingiuarum & vuæ,
atque oris vlcerationem co-
hibent. Nucleus dentium ca-
uernis inditus dolorem ſedat.
Crematæ carbonibus donec
igne flagrent, & vino aut ace-
to aut acida muria extinctæ,
ſanguinem ſupprimunt. Deco-
ctum quibus inſidere expedit,
efficax eſt, & contra vûluas
procidentes, fluxionésque. Ca-
pillis denigrant, aceto aut a-
qua maceratę: dyſentericis cœ-
liacisque cum vino aut aqua
tritæ conuenienter illinuntur,
aut bibuntur: obſoniis addi
debent, aut integræ in aqua
præcoqui, in qua nonnihil ex-
coquendum eſt, quod his af-
fectibus conferat. In ſumma,
his vtendum ad adſtringenda,
aut ſiccanda quæ opus ſunt.

Rhus. Cap. CXLVIII.

Rhus quæ obſoniis aſper-
gitur, ab aliquibus erithros ap-
pellata, ſemen eſt coriarij fru-
cticis, ſic vocati, quoniam co-
riorum infectores eo vtunt, ad
inſpiſſâdas pelles. Arbuſcula in
petris naſcens, binum ferè cu-
bitorû altitudine foliis oblô-
gis, ſubrubétib⁹, i ambitu ferra-
tis, acino vuarû graciliû dêſo,
magnitudine

καὶ τέλλοις λείαι ταῖς ὑπὸ σαρκὸς
σεῖς, ῥευματισμούς τε οὐλῶν καὶ
κονίδος, καὶ ταῖς ἐν σώματι ἀφ-
θασ. τὸ δὲ μέσον αὐτῶν, βρώμα-
τι ὁδόντων ἐντείνεν, παύειται δὲ
ὁ δύναι. γίνονται τε καὶ ἰχθυ-
μοὶ καεῖσαι ἐπ' ἀνδράκων μέ-
γχι πυρώσεως, καὶ κατὰ σβεδεί-
σαι ἢ οἶνω ἢ ὀξείῃ ἢ ὀξάλμῃ. τὸ δὲ
ἀπόζημα αὐτῶν ποιεῖ καὶ πρὸς
ἐγκηδίσματα, πρὸς πῶσεις ὑπέ-
ρας, τῆς ῥευματισμούς. μελαίνουσι 10
δὲ καὶ τείχας, ἀποβραχχεῖσαι ὅξει
ἢ ὑδατι. ἀρμόζουσι δὲ καὶ κοιλιακοῖς.
καὶ δυσεντερικοῖς ὀπιπκατῆρόνθαι
οἶνω ἢ ὑδατι λείαι καὶ πινόνθαι.
τοῖς δὲ πρὸς σφίμασι μελίνονθαι
ἢ πρὸς σφίμασι ὀλῶν ἐν τῷ ὑ-
δατι, εἰς ὃ μέλλει πῖνέσθαι τῷ
ἀρμόζοντι πρὸς αὐτούς. καὶ κα-
δόλου ὅπου δεῖ σύψαι ἢ σῆσαι ἢ
ἀναξήσθαι, παραλαμβάνεται
δεῖ τὴν χεῖρ αὐτῶν.

Πρὶ Ρόδ. Κεφ. εἰς. 20

Ρῆς ὅτι τὰ ὄψα, ὅν ἐνιοὶ ἐρυθρὰ
καλοῦσι, καρπὸς ἐστὶ τῆς χαλκευμένης
βυρσοδέψικης ρόδου, ἢ τις ὠνομά-
σῃ ἐκ τῆς τῆς βυρσοδέψικης αὐτῇ
χεῖρ, εἰς τὴν σύψιν τῆς δευμάτων. 25
ἐστὶ δὲ δένδρεον * φυόμενον ἐν
πέτραις ὡς δὲ πικρὴ ἐφ' ἧς φύλλα
ὀπιμύνη, ὑπὸ ὑδατος. τῷ πρὸς σφίμασι
ἐντετυμνόμενα πρὸς σφίμασι. καρ-
πὸς δὲ βόρυσθις ἐοικώς, πυκνός,
καὶ

καὶ τὸ μέγεθος τερεβίνθου, ὑπό-
 πλατυς, ὃ τὸ περικείμενον φλοιώ-
 δες, ὅστιν εὐχρηστον. Διὰ μὲν δὲ
 ἔχει τὰ φύλλα, συπικνὸν, πειού-
 σαν πρὸς ἃ καὶ ἡ ἀγκυρία· μελαί-
 3 νη δὲ τείχας τὸ ἀφέψημα, δυ-
 σεντερίας τε ὅστιν ἐγκλυσμα, καὶ
 πόμα, καὶ ἐγκάθισμα, καὶ ὥπων
 πυορροιών ἐγκλυσμα, πτε-
 ρύγια ἢ καὶ γαγγράνας ἐπέχει κα-
 ταπλασόμενά τὰ φύλλα, μετ'
 10 ὅξος ἢ μέλιτος· καὶ τὸ χύλισμα δὲ
 τῶν φύλλων ξηρῶν ἐφόμων συν-
 ὕδατι ὥσπερ τὸ λύκιον ἄχρι συ-
 σάσεως μελιτώδους, ἀρμόζει
 πρὸς ὅσα καὶ τὸ λύκιον· καὶ ὁ καρ-
 πὸς ὃ τὰ αὐτὰ ποιεῖ, ἀρμόζων ἐν
 15 πρὸς σήμασι κοιλιακοῖς, δυσεν-
 τεριοῖς, ἀφλέγμασι τε τηρεῖ,
 συνὺδατι καταπλαθεῖς, θλά-
 σματα, ἀποσύσματα, πελώμα-
 τα γλώσσης τε τραχύτητας σμή-
 χει σὺν μέλιτι καὶ λευκὸν ροῦν ἴση
 20 σιν, αἰμορροΐδας τε θεραπεύει μετ'
 δρυῖνου ἀνδράκος λείας ὅππιδε-
 μνός· καὶ τὰς δὲ τὸ ἀπόβεγμα
 ἐφόμων συνίστα, βέλτιόν πως
 ἢ καρπὸς ποιοῦν. Φέρει δὲ καὶ κόμ-
 μιν ὅση ὅππιδεται τοῖς βρώμασι
 τῶν ὀδόντων πρὸς ἀπονίαν.

magnitudine terebinthi, qua-
 dāmtenus lato: cuius corticosa
 tunica perquam utilis est. Folia
 vim habent adstringēdi, & aca-
 cie effectus præbent. Decoctū
 capillos denigrat, dysentericis
 infunditur, & in potus eorum
 ineffusq; adicitur, instillatur
 auribus purulentis. Gangrenas
 & pterygia cohibent folia ex
 aceto aut melle illita. Liqua-
 mentum fit ex aridis foliis, ad
 crassitudinem mellis in aqua
 decoctis, ad eadem, ut lycium,
 conueniens. Semen eosdem
 effectus exhibet: coeliacorum,
 dysentericorumq; obsonij in-
 spergitur: fracta, desquamma-
 ta, liuida quæ, illitum ex aqua,
 ab inflammatione vindicat: lin-
 guæ asperitates cum melle ab-
 stergit, cādida, foeminarū pro-
 fluvia sistit, hæmorrhoidas fa-
 nat, cum querno carbone in-
 trito admotū. Aqua in quo se-
 men maduit decocta, cogitur,
 coitq; efficacior ipso semine.
 Gummi defert, quod dentium
 cauis imprimitur ad dolores fi-
 niendos.

25 Πρὶ Φοίνικος. Κεφ. εμβ'.
 Φοινίξ ἐν αἰγύπτῳ γίνεται.
 ἤνθηται δὲ μεσοπορεύσης τῆς
 καὶ πῶ ὁπόθεν ἀκμῆς, παρεμ-
 φέρων τῇ ἀραβικῇ μυρσεαλάνῃ,
 πῶμα

Palma. Cap. CXLIX.
 Palma in Ægypto gignitur,
 Ea medio maturitatis vigo-
 re, autumnō decerpi solet;
 Arabici myrobalani similis,
 h ij pomatis

DIOSCORIDIS

pomatis cognomine, colore viridi, & odore mali cotonei: quod si ad maturitatem per-
tenuire sinatur, phoenicoba-
lanus fiet. Palma acerba est &
adstringens: contra alui foe-
minarumque profluuia, in vi-
no austero bibitur: hæmor-
rhoidas sistit, vulnera gluti-
nat illitur. Phoenicobalani re-
centes plus ficcis adstringunt,
capitis dolorem afferunt, co-
pioflores in cibo inebriant,
ficciores sanguinem excrean-
tibus, stomachicis, & dysen-
tericis vtilis in cibo: illinun-
tur cum cotoneo et cerato œ-
nanthino vesicæ vitiis. Cario-
tæ, præsertim esu, faucium aspe-
ritati medentur.

Palmæ Thebaicæ.

Cap. CL.

Thebaicarum decoctum
potu æstuationem sedat, vi-
res recreat cum hydromelite
veteri sumptum: cibo idem fa-
ciunt. Fit ex eis vinum ad ea-
dem conueniens. Decoctum
per se potu & gargarizatio-
ne magnopere adstringit, &
cohibet. Nuciei palmarum, cæ-
terorum more, cremati in cru-
do fictili, & vino restincti, ci-
nere loto, spodij vicem effi-
ciunt: miscenturque in calli-
blephara.

πῶμα δὲ λέγεται, χλωρὸν τὸ
χρῶμα, ἐμφθῆς κυδωνίῳ καὶ φ-
δοσιῶ· εἰ δὲ ἀφέψηθῇ πεποιητό-
μος, γίνεται φοινικοβάλανος.
ἔστι δὲ σφυγνὸς, συμπικρὸς, πινόμε-
νος συν ὀίνῳ αὐστηρῷ πρὸς διάρ-
ροισιν καὶ ροῶν ἡμικεῖον ἴσησι
δὲ καὶ αἰμορροΐδας, καὶ τραύματα
κολλητὰ κατὰ πλάσσειν. αἱ δὲ φοι-
νικοβάλανοι, συμπικρότεροι τυγ-
χαίοισι τῶν ξηρῶν, κεφαλαλγῆς
δὲ εἰσὶ καὶ πλείονες βρωθεῖσαι με-
θύσκοισιν· αἱ δὲ ξηραὶ ὠφελουσι
βιβρωσκόμοις αἰμοπεπτικούς, σο-
ματικούς, δυσεντερικούς, καὶ τὰ
πρὸς κύστιν, κατὰ πλάσσειν
κεῖσαι μετὰ κυδωνίῳ καὶ κηρωτῆς
οἶνον θῆναι. μάλιστα δὲ αἱ καρπώ-
πιδες ἐπιόμοιαι, ἀρτηρίων τρα-
χύτητας ἰσθύναι.

Πρὶ φοινίκων θησαϊ-
κῶν. Κεφ. ργʹ.

Τῶν ὃ θησαϊκῶν τὸ ἀφέψημα
πυθὲν, παύει καύσωνα, καὶ τὰς δι-
τάμεις ἀνακίᾳ, καὶ ὑδρομέλιος
παλαιῆ λαμβανόμενον· καὶ αὐτὰι
βρωθεῖσαι, τὸ αὐτὸ ποιεῖσι, γίνε-
ται καὶ οἶνος ἐξ αὐτῶν τὸ αὐτὸ διωά-
μος ἰὼ καρπῶν, καὶ καθ' ἑαυτὸ πο-
θὲν τὸ ἀφέψημα αὐτῶν καὶ ἀναγρ-
ταρίζομενον ἰκανῶς σύφι καὶ σέλην-
Οἱ ὃ πυρῆνες τῶν φοινίκων, καίον-
ται ἐν ὁμῇ γύρῳ, καὶ δάπτει καὶ τὰ δακ-
τύλια, εἴτα σθεδέντης οἶνῳ πλύ-
νον· καὶ ὥς ἀντίισοδα εἰς τὰ καθ-
λιβλέ-

ἀτελέφαρα χροσμεύουσιν καὶ μὴ
 αὐτάρκως κελῶσι, πάλιν τὸ αὐτὸ
 γίνεται. Διὸ αὖτις δὲ ἔχουσι συ-
 πτηκὴν, παρεμπλαστικῶς, ποιοῦ-
 σαν πρὸς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς φλυ-
 γὰς κτίδας, σαφυλώματα, μύλφας
 σὺν νάρδιῳ σὺν οἴνῳ δὲ σέλλε-
 σι καὶ ὑπερσαρκώματα, καὶ ἀπου-
 λῆσιν ἔλκεα. ἐνδετέροι δὲ μάλιστα
 οἱ ἀπὸ αἰγύπτου, οἱ ἐκ τῶν χα-
 μαιζήλων φοινίκων.
 10 Πρὶ φοινίκος ἐλάτης. Κεφ. ρνα.
 Φοινίξ ἡ ἐνιοι ἐλάτις ἢ σπά-
 θῳ καλεῖται, περικάλυμμά ἔστι τῷ
 καρπῷ τῷ φοινίκων ἀκμὴν ἀνθίν-
 των. χροῶν δὲ αὐτῶν οἱ μυρεφοὶ
 εἰς τὰς τῶν μύρων σύφας ἔστι ἡ αὐ-
 15 τῆς κρατίτης ἢ ἐνώδης, σύφουσα,
 βαρεῖα, μεμυκῆα, λιπαρὸν ἔχουσα
 τὸ ἐν τῇ. Διὸ αὖτις δὲ ἔχει συπτη-
 κὴν ἐφ' ἧς αὖτις τὰ νεμόμενα τῷ ἐλ-
 κῶν, χαλασμέας τῷ ἀφ' ὧν συνά-
 λη, λεία μαλάσσει μελέα καὶ κα-
 20 ταπλασμάσιν. ὠφελεῖ δὲ καὶ ὑπο-
 χόνδρια καὶ σόμαχον ἀπονοῦτα,
 καὶ ἡπατικὰς διαθέσεις, μυρμηδὴν
 τοῖς ἀφ' ὧν τοῖς κατὰ πλασμα-
 των μελαίνῃ δὲ καὶ βίχας τὸ ἀφέ-
 λημα αὐτῶν, σμυχνόμενον συνεχῶς.
 25 ποτίζόμενον δὲ νεφρικοῖς καὶ τοῖς
 περὶ κίστην καὶ σπλάγχνα ἀεμύζει,
 κοιλίαν τε καὶ ὑστέρα ρινμαπιζο-
 μένῳ ἴσησιν, ἀπαλὴ δὲ σὺν ῥη-
 τίνῃ καὶ κηρῷ ὀπτεδεῖται, καὶ ἐα-
 δεῖται ἡμέρας εἴκοσι, ἡμέρας ἰαῶν.
 καὶ

blephara. Quod si nō iustā vlti-
 onē acceperit, denuo cremādi.
 Vim adstringendi habēt, & spī-
 racula cutis obductu suo clau-
 dūt: cōtra oculorū vuā & pu-
 stulas, palpebrarū defluuia, cū
 nardo effectū prēbēt: corporis
 excrescētias cū vino reprimūt,
 vlcera ad cicatricē perducūt.
 Sed inter primas vtilēs ex pal-
 mis humilibus Ægyptiæ.

Palma elate. Cap. CLI.

P A L M A, quam aliqui
 elaten aut spathan appellant,
 fructus palmarum adhuc flo-
 rentium, inuolucrum est ca-
 lyxque, quo in spissamēta vn-
 guentarij vtuntur. Optima ha-
 betur odorata, adstringens,
 ponderosa, præclusa, intus pin-
 guis. Vis ei adstrictoria: fistit
 vlcera quæ depascunt, laxatos
 artus committit, trita misce-
 tur cataplasmatibus & malagma-
 tis: prodest præcordiis, im-
 becilli stomacho, & iocineri
 affecto, mista conferentibus
 cataplasmatibus. Eius decoctum
 subinde deterfum, capillos de-
 nigrat: datur bibendum con-
 gruè, renum, vesicæ, & visce-
 rum vitiiis: vuluæ ac ventris
 fluxiones fistit: scabiem cum
 resina, & cera sanat, si vigin-
 ti diebus recens apponatur.

h iij Inuolu-

DIOSCORIDIS

Inuolutusque in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam vocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathæ effectus præstat, non sic vnguentis expectit. Alba medulla caudicis recens in cibo, aut decocta eadē facit, quæ borassus.

Malū punicū. Cap. CLII.

Malum punicū omne boni succi est, stomacho vtile, perexiguum sufficiens alimētum. Dulcia stomacho vtiliora habētur, sed aliquantulū in eo calorem gignunt, inflationes pariūt, vnde in febris abdicantur. Acida adstringūt, æstuantī stomacho auxiliant, & multò magis contrahunt, ac urinā cient. Ora gingiuasq; lædūt. Vinosa verò mediā sortiuntur naturā. Nuclei acinorū acidi punici ī sole siccati, & obsoniis īparfi, cōcoctiue, fluentē aluū stomachūq; sistūt. Cœlesti aqua madescūt, bibūturq; cōmodē sanguinē excreatibus: ad desensus dysentericorū, foeminarūq; fluxione vuluæ laborantiū vtilēs sunt. Expresus nucleorū succo quāt cū melle, ad oris, virilitatis, et sedis vlcera, nomas, reducias, & ea q̄ ī corpore extuberāt, auriū dolores, & nariū vi-

tia:

καὶ ὁ ἀφαιρόμενος δὲ ἐκ τῆς αὐτῆς καρπὸς, ἐλάττει καλεῖται, ἐκ τῶν ἐνίων δὲ βόρακος· καὶ αὐτὸς συμπικρὸς ὡν τὰ αὐτὰ δρᾷ τῇ ἀπόδι, χαλκὸς δὲ ἐν τοῖς μύελαις ἐν χηρῇ, καὶ τὸ ἐγκαρδίον δὲ τῷ φρένι κενεῖ καὶ αὐτὸ ἀφαιρούμενον βίβρωσι δόμον καὶ ἀφαιρούμενον, ποιεῖ πρὸς ὅσα καὶ ὁ βόρακος.

Πρὶ Ροῦς. Κεφ. ρνβ'

Ρόα πάντα εὐχμος, ἐν σόμαχος, ἀπερὸς τούτων μὲν τοῖς ἰσχυροῖς ἐν σόμαχος, καὶ πνευματώδεις, ὅθεν ἐπὶ τῶν πυρεσόντων ὅθεν ἂν δὲ ὁξεία καυσυμῶν σόμαχος, βονδεῖ καὶ ἐστὶ σάλπιγξ καὶ οὐρυκτικώτερη· ἄσμος δὲ καὶ συμπικρὸς. ἡ δὲ οἶνώδης μέσσω ἔχει διώαμιν τῆς δὲ ὁξείας ὁ πυρελὸς ξηρανθεὶς ἐν ἡλίῳ καὶ ἐπιπαυσίμενος πρὸς σόμαχος καὶ σωματικός, κοιλίαν καὶ σόμαχος ῥῶμα ἵσησιν ἀποβραχεῖς δὲ ἐν ὁμβρίῳ ὕδατι, αἱμοποιοῦντες ὠφελεῖ πινόμενος, καὶ εἰς ἐγκαρδίσματα δυσεντερικῶν καὶ ροικῶν ἀμύζει. εὐχρηστον δὲ τὸ ἀπόθλιμμα τῶν πυρελῶν ἐν δέν καὶ μύελαις μέλιτι. πρὸς τε τὰ ἐν σόματι καὶ αἰδοῖν καὶ ἐδρᾷ ἔλκεα, καὶ πτερυγία τὰ ἐν δακτύλοις, νομᾶς τε καὶ ὑπόχλας καὶ ὠταλγίας καὶ τὰ ἐν μυκτῆρι,

καὶ

καὶ μάλιστα τῆς ὀξείας.

Πρὶ Κυτίνων. Κεφ. ργ'.

Τὰ δὲ ἀνθ' αὐτ' ἃ καὶ κύπνοι
καλοῦνται, καὶ αὐτὰ συπλικά καὶ
ξηραντικά καὶ κατασπλικά εἰσι,
καὶ ἐναιμῶν κολλητικά, ἀρμόζον-
τα πρὸς ἃ καὶ ἡ ῥόα. τὸ δ' ἀφέψη-
μα αὐτῶν ἔλεον πλαδόντων καὶ
ὀδόντων σειομένων διέκλυσμα,
ἀγαθόλημμά τε ἐντερεγκηλικόις
ἐν καταπλάσμασιν ἴσορροῦσι δέ
πνυες, μὴ ὀφθαλμῶν παρ' ὅλων
τὸ ἔτος τοῦ καταπόντας τρεῖς κυ-
πνυες, ὡς ὅτι ἐλαχίστοις χυλίζον-
ται δὲ ὡς ἡ ὑποκιδίς.

Πρὶ Σιδίων. Κεφ. ρδ'.

Καὶ τὰ λέπνι δὲ τῆς ῥόας ἃ π-
νυες σίδια καλοῦσι συπλικὴν ἔχον-
τα καὶ αὐτὰ διώαμιν, πρὸς ὅσα καὶ
οἱ κύπνοι ἀρμόζουσιν. τὸ δὲ ἀφέψη-
μα τ' ῥιζῶν, ἑλμυνθας πλατεί-
ας ποδὲν, ἐκπνάσας καὶ ἀποκλείνσας.

Πρὶ Βαλαυσίων. Κεφ. ρε'.

Βαλαυσίον ἐστὶν αὐτὸς ἀγρίας
ροῖας, εἶδ' ἡ δὲ ὅτιν αὐτὴ πλείον-
να εὐρίσκεται γὰρ καὶ λευκὸν καὶ
πυρρὸν καὶ ῥοδόχρουμα* εἶοικε δὲ
κυπίνῳ ροῖας, χυλίζεται δὲ ὡς ἡ
ὑποκιδίς. Διώαμιν δὲ ἔχει συ-
πλικὴν, πείσσαν πρὸς ἃ καὶ ἡ
ὑποκιδίς καὶ ὁ κύπνος.

Πρὶ Μυρσίνης. Κεφ. ρς'.

Μυρσίνη ἢ ἡμερς, πρὸς μὲν τὴν
ἰατρικὴν χρῆσιν, ἢ μέλαινα τ' λευ-
κὴς ἀρμόδιωτέρα, καὶ ταύτης
μᾶλλον

tia: præsertim acidorum.

Cytinus. Cap. CLIII.

Huius flores cytini vocan-
tur: qui adstringunt, siccant, co-
hibent: sanguinolenta glutinât,
quas punicum, præstât utilita-
tes: humida gingivarum vitia
mobilésq; dentes decocto col-
luuntur, herniam prolapsu inte-
stini erumpentem cataplasma-
te repellunt: memoriæ tradût,
qui tres, quâ minimos cytinus
deuorauerit, nullâ eo anno lip-
pitudinem passurum: eliquatur
hypocistidis exemplo.

Malicoriû. Cap. CLIII.

Malicoriû, asperû est mali pu-
nici putamé, qđ aliqui sidiô ap-
pellât. Id spissâdi vim habet, &
quos cytini, præbet vsus. Deco-
ctû radicis potu latas vétris ti-
neas pellit, & easdê euocat.

Balaustiû. Cap. CLV.

Balaustum sylvestris punici
flos est, cytino similis, cuius cõ-
plura genera reperiuntur: cã-
didû, fuluum, colore rosaceo.
Succus ex eo exprimit, hypo-
cistidis modo, cui adstrictoria
vis inest, eadem faciēs, quæ hy-
pocistis, & cytinus.

Myrtus. Cap. CLVI.

MYRTVS fatiua ni-
gra utilior est medicinæ quàm
candida, & in hoc genere
h iij multo

multò magis mótana: semé tamē imbecillius parit . Vis & myrti & feminis adstringit. Semen viride aut aridum in cibo datur sanguiné excreátibus, & vesicæ erosíonib⁹. Succus viré-
tibus baccis expressus eosdē effectus exhibet: stomacho utilis, vrinā cit: pdest cōtra phalágij morsum, & scorpionis ictus in mero: feminis decoctú capillū tingit, ius decocti in vino vlcera in extremis mēbris nata sanat, oculorú inflámationes illitum cum polline polétæ lenit, cōtra ægilopas illinitur, crapulam arcet p̄sumptum vinum, quod feruefacto aliquantú ei⁹ semine exprimatur: aliās enim acorem cōtraheret. Præstat idē feminis effectus. Vtile procidētix vuluarum in defesíonibus, sedis vitiis, & foeminis fluxione vulvæ laborantibus: purgat furfures, vlcera capitis manantia, atq; eruptiones papularú: fluentes capillos continet. Ad-
ditur quoque in medicaméta, quas liparas vocant, vti oleum quod ex folijs eius factum est. Decoctum foliorum ad defesíones balnearú cōuenit, & cōtra laxatos artus, & malē solide scētes. Eo fracta ferruminatiōni repugnátia vtilíssimē fouet,

vitili-

μαλλον ἢ ὀρίνην, ἢ μὲν τοι καρπὸν ἀπονώτρων ἔχει. διώκεις δὲ αὐτὴν καὶ τὸν καρπὸν συπλήκει. δίδοι δὲ ὁ καρπὸς χλωρὸς τε καὶ ξηρὸς ἐπιβόμβος αἱμοπλοικοῖς καὶ τοῖς δακνυμένοις τὸ κύστιν. καὶ ὁ ἐκ τῆς χλωρῆς ὁ μύρτων ἐκθλιβέντων χυλὸς, τὰ αὐτὰ ποιεῖ, εὐσώμαχος ὢν καὶ ἐρηλικοῖς ἀρμύζων, φασφαλμοδύκλοις καὶ σκορποπλήκτοις συνὸν ὄνω. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ τῆς καρπὸς βράπτει τείχας ἐψηθεῖς ὅτι συνὸν ὄνω, καὶ χαλασπασθεῖς, τὰ ἐν ἀκρωτηρίοις ἔλκη διεραπύει μετὰ πάλης δὲ ἀλφίτου χατασπασθεῖς, φλεγμανας τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς παρηγορεῖ, καὶ πρὸς αἰγίλωπα δὲ ὀπλάττεται, καὶ ὁ ἐξ αὐτῆς δὲ γινόμενος οἶνος ἐκθλιβέντος τῆς καρπύ, καὶ ὀπὶ ποσὸν ἀφεψηθέντος, ὀξίζει γὰρ ὁ μὴ οὕτω σκευασθεῖς, ἀκραίπαλός ἐστι πρὸς πινόμενος, πινὼν πρὸς ὅσα καὶ ὁ καρπὸς, ἐγχαθίσματα τε, μύζας, πρὸς πλάσεις, καὶ δακτυλίω, καὶ ροικαῖς ἀρμύζει, σμύχει δὲ καὶ πίτυρα. καὶ ἀχώρας, καὶ ἐξανθήματα, τείχας τηρέσας ἐπέχει μύζηνται δὲ καὶ λιπαράς, ὥς ὅτι καὶ τὸ ἐκ τῶν φύλλων αὐτῆς σκευαζόμενον ἔλαον. καὶ τὸ τῶν φύλλων δὲ ἀφέψημα, εἰς τε τὰ ἐγχαθίσματα ἀρμύζει, καὶ πρὸς τὰ χαλαρά, καὶ ἀσυμπύρωτα ἀεθρα καὶ πρὸς ἀσυμπύρωτα χετέα γότα, ὠφελίμως

ὡφθίμως καταπλεῖται, σμύχει
 δὲ καὶ ἀγρὸς, καὶ πρὸς ὧτα πυορ-
 ροῦντα ἐγκυματίζεται, καὶ μελα-
 σμοῖς τειχῶν, καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν ὃ χυ-
 λὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ· αὐτὰ δὲ τὰ
 5 φύλλα λεῖα καταπλασθήματα ἐν
 ὕδατι, ἀρμόζει τοῖς καδύργοις τῷ
 ἤκῳ, καὶ ῥευματιζομένοις τόποις
 πᾶσι καὶ κοιλιακοῖς· ἡ δὲ ὁμφακίνη
 γὰρ ἡ ῥοδίνου ὀλίγου καὶ οἴνου μεμι-
 γκνύου, καὶ ἐρεψις, καὶ ἐρισπέλας,
 10 διδύμων τὲ φλεγμοναῖς καὶ ἐπι-
 νυκτίσι καὶ κονδυλώμασι· ξηρὰ δὲ
 λεῖα παρωνυχίας καὶ πτερυγίαις,
 χρυσίμως καὶ ἀπλάττεται, καὶ κα-
 δύργοις μαγάλαις καὶ μερσίς, καὶ
 ἐπὶ καρδιακῶν σέλλει τὸν ἰδρῶ-
 15 τας· κεκανυμένα δὲ καὶ ὠμὰ με-
 τὰ κηρωτῆς, πυεῖκαντα καὶ πτε-
 ρύγια καὶ παρωνυχίας ἰᾶται. χυ-
 λίζεται δὲ τὰ φύλλα παρὰ χρο-
 μύρου οἴνου παλαιοῦ, ἢ ὕδατος
 ὀμβρείου, καὶ ἐκθλίβεται· ἢ δὲ
 20 χρῶσις αὐτῇ προσθάτε ὄντες, ξη-
 ρανθεὶς γὰρ εὐρωπῆα καὶ ἀδυναλεῖ.

Περὶ Myrtidanū. Κεφ. ρνζʹ.

Τὸ δὲ μυρτίδανον λερόμενον ἐ-
 πίφοις ὅστιν ἀνώμαλος καὶ ὀχθώ-
 δης καὶ ὁμώχοις· οἶονεὶ χεῖρες πε-
 25 ρεῖ τὸ τῷ μυρσίνης πρὸς μόνον· εὐφεί
 δὲ μᾶλλον τῷ μυρσίνης. ἀποτίθε-
 ται δὲ κοπὴν καὶ μυρὸν οἴνω ἀνση-
 γῶ ἀναπλαθεῖν τε εἰς τροχίσκας,
 ἐν σικῇ ξηραίνετε, δρασηκώτερον
 δὲ ὅστις τε καρπὸν καὶ τὰ φύλλα,
 μυρτι-

vitiliginem emendat, purulen-
 tis auribus infunditur, & ca-
 pillos denigrat. Succus eadem
 efficit. Trita folia, & ex aqua
 illita humidis vlceribus, & par-
 tibus omnibus fluxione labo-
 rantibus, coeliacisque profunt:
 & admisto omphacino oleo,
 aut exiguo rosaceo cum vino,
 ad vlcera serpentia, ignem fa-
 crum, testium inflammationes,
 epinyctidas, & condyloma-
 ta. Arentium foliorum fari-
 na vtiliter inspargitur parony-
 chiis, pterygiis, & contra ala-
 rum feminumque perfusiones:
 cardiacorum sudores cohibet.
 Folia cruda seu cremata cum
 cerato, ambustis, paronychis,
 pterygiisque medentur. Expri-
 mitur foliis succus adfuso ve-
 tere vino aut aqua cælesti, cu-
 ius recentis vsus est: nam exic-
 catus planè cariem sentit, &
 vires amittit.

Myrtidanum. Cap. CLVII.

Myrtidanū dicitur, adnatum
 inæquabile verrucosum intu-
 mescensq; & concolor: quod
 perinde quasi man⁹ myrti cau-
 dicæ amplectitur. Magis q̃ myr-
 tus adstringit: tusum addito au-
 stero vino reponit, coactūq; in
 pastillos ficcatur in vmbra: mul-
 tō efficacius, & folio & semine,
 cera,

DIOSCORIDIS

cerato, pefsis, infeflionibus, cataplasmatis admiftum, vbi adstringendum aliquid eft.

Cerafia. Cap. CLVIII.

Cerafia aluo vtilia funt, fi viridia fumantur: eadem ficcata, illá fiftunt. Gummi quod cerafi refudarunt, cum vino diluto tuffi vetuftę medetur: colorem cõmendat, vifum exacuit, appetentiã inuitat: idem ex vino potum calculofis auxilio eft.

Siliquæ. Cap. CLIX.

Siliquæ recentes ftomacho aduerfantur, aluum foluunt: eadem ficcata fiftunt, ftomachóq; vtiliores fiunt. Vrinam ciunt, fed præcipuè, quæ vinaceis condiuntur.

Mala. Cap. CLX.

Folia, flores, & germina cū omnis mali, tum maximè cotoneæ adstringunt. Pomis acerbis adstringendi vis ineft: maturis verò longè fecus. Ex iis verna bilem gignunt, nervos omneis lædunt, inflationes pariunt.

Cotonea mala.

Cap. CLXI.

Cotonea ftomachovtilia, vriná cient: verùm tofta mitiora habétur. Profunt coeliacis, dyfentericis, purulenta extufsiëtib⁹, cholericis, præfertim cruda,

Mace-

μηνύμνον κηρωτῇ καὶ πεποῖς, ἐγκαθίσματα τε καὶ καταπλάσματα τοῖς σύψως δερμάτοις.

Περὶ Κερασίων. Κεφ. ρη'.

Κεράσια καὶ αὐτὰ μὲν χλωρὰ λαμβανόμενα, εὐκοιλία τυγχάνει. ξηρὰ δὲ ἴσησι κοιλίαν. τὸ δὲ κόμμι τῶν κερασίων, ἔῃχα χροῖαν ἰσχυρὰ λαμβανόμενον μὲν κρέμαλος, εὐχροῖαν τε καὶ ὀξυδερκίαν καὶ ὀρεξίν ποιεῖ· ὥφθχει δὲ καὶ λιπιδώντας μετ' οἴγου πινόμενον.

10

Περὶ Κερατίων. Κεφ. ρηθ'.

Κεράτια χλωρὰ μὲν λαμβανόμενα, κακόςμαχα τυγχάνει, καὶ κοιλίας λυτικὰ, ξηρανθέντα δὲ ἴσησι κοιλίαν, εὐσώμαχότερα ὄντα καὶ διουρητικὰ· μάλιστα δὲ τὰ ἐκ τῶν σεμφύλλων συνπιζόμενα.

15

Περὶ Μιλέας. Κεφ. ρξ'.

Μιλέας πάσης τὰ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη καὶ οἱ βλαστοὶ, σύφοισι· μάλιστα δὲ τῆς κυδωνίας, καὶ ὁ καρπὸς ἔνωμος μὲν συπτικός κατέσθηκε· πεπαιδεῖς δὲ οὐχ ὁμοίως. τὰ δὲ τῶν ἑσπερίων ἀκμάζοντα μῆλα χολοποιὰ, ἄδεται τῷ νευρώδει παιπὶ ἐμπνευματουῦντα.

20

Περὶ Κυδωνίων μύλων.

Κεφ. ρξά.

25

Τὰ δὲ κυδωνία, εὐσώμαχα, οὐρητικὰ, ὀπλινθέντα δὲ πρεσνέστερα γίνεται, χρήσιμα κοιλιακοῖς καὶ τῷ δυσεντερικοῖς καὶ ἐμπυρκοῖς καὶ χολειῶσι μάλιστα ὡμόν,

καὶ τὰ

καὶ τὸ ἀπόβρεγμα δὲ αὐτῶν ἀρ-
 μύζει τοῖς σόμαχον ἢ κοιλίαν ρευ-
 ματίζουσιν ἐν ποτῶ. ὃ ὅχιλος
 ἐμῶν αὐτῶν λαμβανόμενος, ὁρ-
 δοποικοὺς ὠφελεῖ. τὸ δὲ ἀφέψι-
 5 μα, πρὸς κλυσθια δακτυλίου, καὶ
 ὑσέρας περιώσει. τὰ δὲ ἐν τῇ
 μέλιτος, καὶ αὐτὸ μὲν οὐρητικόν.
 τὸ δὲ μέλι τιμὴ αὐτῶν ἀναλαμ-
 βάνεται δυνάμιν· σερνωπικὸν γὰρ
 καὶ συμπικνὸν γίνεται. τὰ δὲ συν-
 10 τῶ μέλιτι ἐφόδρια, ἐν σόμαχα
 μὲν καὶ εὐσομα, ἢ πλὴν δὲ σερνω-
 πικόν. τὰ δὲ ὠμά καταπλάσματα
 σιμίζονται πρὸς σέρνωσιν κοιλί-
 ας, σομάχου ἀνατροπὴν, καὶ πύ-
 ρωσιν, μαστοὺς φλεγμαίνοντας,
 15 σπληνῶς ἐσπέρφουσιν, κονδυ-
 λώματα. Γίνεται δὲ καὶ οἶνος
 ἐξ αὐτῶν κοπιούρων καὶ ἐν-
 δολιγούρων, πρὸς διαμονὴν μι-
 γνουμένου τοῖς ἰσ'. ξέστας τοῦ χυ-
 λοῦ μέλιτος ξέσου ἐνὸς ἐπεὶ ὀξεί-
 20 ζει· ἀρμύζει δὲ πρὸς τὰ εἰρημέ-
 να πάντα, καὶ* χρίσμα δὲ ἐξ αὐ-
 τῆ σκευάζεται τὸ χαλούμερον μύ-
 λιον, ὃ χρώματα ὁπόταν συμπι-
 κοῦ ἐλαίου διενθώμεν. ἐκλέγε-
 σθαι δὲ δεῖ τὰ ἀλιδινα, μικρὰ δὲ
 25 ὅτι καὶ πεφεῖρη καὶ εὐώδη ταῦ-
 τα. τὰ δὲ λεγόμενα σρουδία καὶ
 μεγάλα ἢ πλὴν ὅτι εὐχρητα. τὰ δὲ
 αἰθὴ αὐτῶν ξηρά τε καὶ χλω-
 ρὰ καταπλάσματα εὐδετα,
 πρὸς τὰ σύψικας χρεῖαν ἔχοντα,
 καὶ

Maceratorū liquor commodè
 in stomachi aut ventris fluxio-
 nibus, potui datur. Succus cru-
 dorum assumptus orthopnoi-
 cis salutaris est. Decocto fo-
 uentur vuluæ, & sedes si proci-
 dant. Cotonea quæ melle con-
 diuntur, vrinam mouent: mel
 autem sibi constringentem il-
 lorum vim, & inspissantem ad-
 fiscit. Quæ cū melle coquun-
 tur, stomacho atque ori gra-
 tiora sunt, sed minus inspissant.
 Cruda cataplasmatibus adiūciun-
 tur, ad cohibendam aluum,
 aut si stomachus æstuet, aut
 in vomitiones effundatur, ad
 mammarum inflammationes,
 præduros lienes, & condylo-
 mata. Fit vinū ex ipsis tuis ex-
 pressisque: sed quò perduret,
 quindecim sextariis succi vnus
 mellis adiungitur, alioquin in
 acorem degenerat. Prodest ad
 omnia, quæ dicta sunt. Fit & o-
 leum ex iis, quod melinum vo-
 cauimus, quo vtimur quoties
 adstringēti oleo est opus. Eligi
 oportet vera, quæ sanè sunt ro-
 tunda, parua & odorata: quæ
 verò Struthia dicuntur, magna
 quidē sunt, sed mins vtilia: Flos
 & viridis & ficcus cataplas-
 matis imponitur: iis cōueniēs,
 quæ adstrictionem desiderant,
 inflam-

inflammationibus oculorum, reiectionibúsq; sanguinis. Cōtra citam aluum, & mensium impetus, in vino bibitur.

Melimela. Cap. CLXII.

Melimela ventrē molliunt, & ab eo animalia expellūt, stoma- cho negotiū exhibēt, Æstiosa. Ea multis dulcia malavocātur.

Epirotica mala.

Cap. CLXIII.

Epirotica mala, quæ Latinè orbiculata dicūtur, stomacho vtilia: sistunt aluum, vrinas e- uocant, malis tamen cotoneis inualidiora.

Syluestria mala.

Cap. CLXIII.

Syluestria mala similia sunt vernis, & adstringunt. Sanè in hunc vsum immatura omnia opus sunt.

Perfica mala. Cap. CLXV.

Perfica poma matura tam stomacho, quàm ventri vtilia sunt. Acerba aluum cohibent, sed sicca vehementius. Deco- ctum è ficcis alui stomachiq; fluxiones sistit.

Armeniaca. Cap. CLXVI.

Armeniaca, quæ à Latinis præcocia dicuntur, minora sunt supradictis, & stomacho vtiliora,

ἢ πρὸς ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς, ἢ πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς, κοιλίας τε ῥεῦσιν ἢ ἐμμελῶν φορὰν ἀρ- μόζει ἢ οἶνου πινόμενα.

Πεὶ Μελιμήλων. Κεφ. ρξβ'.

Τὰ δὲ μελίμηλα κοιλίαν μα- λᾶσει, ἢ θηρία ἐκπνέσει χα- κοσόμαχα, καύσει πικτικὰ, κα- λεῖται ὅ ἐκ πινων γλυκύμηλα.

Πεὶ Ἡπειρωτικῶν μή- λων. Κεφ. ρξγ'.

Τὰ δὲ ἡπειρωτικὰ λεγόμενα, ῥωμαῖσι δὲ ὀρεικουλάτα, ἐυσό- μαχα, κοιλίας σαλπικὰ, οὖρων περικλητικὰ, ἀτονώτερα μύτοι τῶν κυδωνίων ὄσιν.

Πεὶ ἀχειομήλων.

Κεφ. ρξδ'.

Τὰ ὅ ἀχεια ἔοικε τοῖς ἐαζοῖς εὐφρονται· δεῖ δὲ πρὸς τὰ εὐψε- ως χεῖζοντα, ἀερετέροις ἀτα- σι χεῖσθαι.

Πρὶ Πρσικῶν μήλων. Κεφ. ρξε'.

Τὰ δὲ πρσικὰ μῆλα ἐυσόμα- χα, ἐυκοίλια τὰ πέπτερα. τὰ ὅ ἐ- νωμα, σελνολικὰ κοιλίας, ξηρανθέν- τα ὅ, ἢ τερωπικώτερα γίνονται. ἢ τὸ ἀφέλημα δὲ αὐτῶν ξηρῶν λαμβανόμενον, σόμαχον ἢ κοι- λίαν ρευματιζομένην ἰσισιν.

Πεὶ Ἀρμερικῶν. Κεφ. ρξς'.

Τὰ δὲ μικρότερα καλούμενα δὲ ἀρμερικὰ, ῥωμαῖσι δὲ περικ- κόκια, ἐυσόμα χύτερα τῶν προ- ειρημένων εἰσιν.

Περὶ Μυδικῶν. Κεφ. ρξζ'.

Τὰ δὲ μυδικὰ λεγόμενα ἢ περ-
σικά, ἢ κεδρόμηλα, ῥωμαῖσι δὲ
κίτεια, πᾶσι γνώριμα. φυτὸν γὰρ
ᾧ καρποφορεῖν δι' ὅλου τοῦ ἐ-
5 τοῖς ἐπαλήθεως αὐτὸ δὲ τὸ μύ-
χον ἐπίμνηκε, ἔρρυτιδωμόρον,
χρυσίζον τῇ χροῇ, ὡς δὲ μετὰ
βάρους, σπέρμα ἔχον ἀπὸ ἐοι-
κός. Δυνάμει δὲ ἔχει ποδὲν ἐν
οἴνῳ, αὐτὴν ῥεῖν θανάσιμοις, κοι-
10 λίαν τὲ ὑπάρχειν, διάκλυσμα τὲ
ᾧ πρὸς ὑποδίαν σόματος τὸ
ἀφέψιμα καὶ ὁ χυλὸς αὐτῶν βι-
βρώσκεται ὃ μάλιστα ὑπὸ γυναι-
κῶν πρὸς τὴν κίαντα. φυλάττειν
δὲ καὶ ἱμάτια δοκεῖ, ἄβρωτα ἔ-
15 πιπιδέμενα κλωπίοις.

Περὶ Ἀπίου. Κεφ. ρξή.

Απίου δὲ πολλὰ εἶδη, πᾶσαι
δὲ σύφοισιν ὅθεν εἰς τὰ ἀποκρε-
στικά κατὰ πλάσματα ἀρμόζουσι.
τὸ δὲ ἀφέψιμα αὐτῶν ξηρανθεῖ-
20 σῶν, καὶ αὐτὰ λαμβανόμενα ὤ-
μαι, κοιλίαν ἰσάσιν βλάπτουσι δὲ
ἐδιδόμενα τὸς νήσεις.

Περὶ Ἀχράδος. Κεφ. ρξθ.

Ἡ δὲ ἀχράς εἶδος ὅστιν ἀχρεῖς
ἀπίου, βραδέως πεπαυγομέ-
25 νη. Δυνάμει δὲ ἔχει, συσπι-
κωτέραν ἀπίου. ὅθεν πρὸς τὰ
αὐτὰ ἀρμόζει. σύφει δὲ καὶ τὰ
φύλλα αὐτῆς. ἢ δὲ ἐκ τοῦ ξύλου
αὐτῶν τέφρα, βοηθεῖ ἐναργῶς
τοῖς ὑπὸ μυκήτων περιζωμένοις.

φασί

Medica mala. Ca. CLXVII.

Medica mala Perficæ aut
cedromela, quæ Latini citria
vocant, nemini non cognita.
Arbor ipsa omnibus annī tem-
poribus pomifera, aliis deci-
duis, aliis subnascentibus. Ma-
lum oblongum est, rugosum,
colore aurum imitans, cum
grauitate odoratum, semen ha-
bet pyri. Id in vino potum ve-
nenis resistit, aluum mouet, o-
ris suauitatem commēdat, de-
cocto eius colluto, aut suc-
co: estur in malacia mulierī-
bus: vestiariis impositum ab
erosionis vitio vestes vindica-
re existimatur.

Pyra. Cap. CLXVIII.

Pyrorum multa genera, quæ
tamē omnia adstringunt: pro-
inde adduntur conuenienter
in repellētia cataplasmata De-
coctum ē ficcis & cruda ipsa
aluum sistunt: ieiunos esitata
lædunt.

Achras. Cap. CLXIX.

ACHRAS pyrastri ge-
nus est, quod tardissimè ema-
turefcit. Vim pyro adstrin-
gentiorem habet, & ad ea-
dem conuenit: stringunt eti-
am eius folia. Ligni pyro-
rum cinis efficaciter his auxi-
liatur, quos fungi strangulant.

Aiunt

DIOSCORIDIS

Alunt fungos, si syluestria py-
ra cum eis coquantur, inno-
xios fieri.

Mespilus. Cap. CLXX.

Mespilus, quæ à nonnullis a-
ronia vocatur, spinosa arbor
est, folio pyxacanthæ: fert po-
mum suaue, exiguo malo non
dissimile, tribus intus ossicu-
lis: qua ex causa id nonnulli
tricocon appellauere. Tarde
maturescit, esu adstringit, sto-
macho gratum est, aluumque
supprimit.

Altera mespilus.

Cap. CLXXI.

Alterû mespili genus in Ita-
lia nascitur, quod aliqui seta-
nium, alij epimelida vocant.
Arbor foliis mali, sed minori-
bus: pomum fert rotundum
esui aptum, vmbilico latio-
re: quod adstringit, seroque
maturescit.

Lotus arbor. Cap. CLXXII.

Lotus arbor est vastę magni-
tudinis, ferēs baccā pipere ma-
iore, dulcē, cibis gratā, stoma-
cho facilē. Aluū sistit baccis. Ra-
mētōrū ligni decoctū siue po-
tu, siue infusione dysentericis
ac foeminis fluxione vuluæ la-
borātibus, auxilio est: rufat ca-
pillōs, citam aluum cohibet.

Cornus.

φασὶ δὲ πινεσ θ' ὅτι καὶ τὴν σινεψήσῃ
πὶς ἀρχάδας κύκκον, ἀβλαβεῖς
αὐτοῦ γίνεσθαι.

Περὶ Μεσπίλων. Κεφ. ρθ'.

Μεσπίλον τὸ δένδρον, ὃ παρ'
ἑλλοῖς ἀρώνια καλεῖται, ἀκανθώ-
δες ἔστιν, ὁμοιον τοῖς φύλλοις πυ-
ξακάνθῃ, καρπὸν φέρον μικρῷ μύ-
λῳ ὁμοιον ἡδυν, ἔχοντα τέσσα-
ράς ἐνδεδεν, ἀφ' ὧν καὶ τέττα-
κον πινεσ αὐτὸ ὀνομάζουσι. βρα-
δέως πεπαιγμένον, σύφει δὲ βί-
βρωσκόμνον, ἐυστόμαχόν τε ἔστι
καὶ κοιλίας στερητικόν.

Περὶ ἑτέρου μεσπίλου.

Κεφ. ροα'.

Μεσπίλος δὲ καὶ ἕτερος ἔστιν ἐ-
δος ἐν ἰταλίᾳ χυνώμνον. ὃ ἔνιοι
ἐπιμηλίδα καλοῦσιν. οἱ δὲ, σιτά-
νιον ὀνομάζουσι. δένδρον ἔστι μί-
κρῳ ἑμφερές τοῖς φύλλοις ἐπι μι-
κρότερον. ἔχει δὲ καρπὸν καὶ τοῦτο
σπογγύλον, βρώσιμον, πλατὺν ἔ-
χοντα τὸν πυθμῆα, ὑποσύφον-
τα, πεπαιγμένον βραδέως.

Περὶ Λωτοῦ. Κεφ. ροβ'.

Λωτὸς τὸ δένδρον, φυτὸν ἔστιν
εὐμέγεθες, καρπὸν δὲ φέρει μείζονα
πεπέρως γλυκὴν, βρώσιμον * ἐυ-
στόμαχον, κοιλίας στερητικόν. τῶν
δὲ ὑποσφύων τῶ ξύλου τὸ ἀφέ-
λημα πινόμενον καὶ ἐκλυζόμενον,
βοηθεῖ δυσεντερικαῖς καὶ γυναιξὶ
ροϊκαῖς. ξανδίσει δὲ καὶ τείχας, καὶ
ἐπὶ χειρὶ γαστέρα ρεοῦσαν.

Περὶ

Πεὲλ κρανίας. Κεφ. ρογ'.

Κρανία δένδρον ἔστιν ἄδρυν, καρπὸν φέρον ὡς ἐλαίας, ὀπμήκη, χλωρὸν τὸ πρῶτον, πεπαινόμηνον δὲ ξανθὸν, ἢ κί-
15 ρειδῆ, ἐδώδιμον, σύφορον, ἀρμόζοντα πρὸς κοιλίας ῥύσιν καὶ δυσεντερίαις, στυπιδέμηνον καὶ εἰς ἔλκημα, καὶ εἰς βρῶσιν, καὶ ἀλμυέται ὡς ἐλαία. ὁ δὲ τῶν χλωρῶν φύλλων ἰχώρ καίόμε-
10 νον, ἀρμόζει πρὸς λειχύδας κα-
ταχρίόμενος.

Πεὲλ Οὐών. Κεφ. ροδ'.

Οὐά τὰ μνηρίζοντα καὶ μή-
πω πέπυρα, τμηθέντα καὶ ξη-
ρανθέντα ἐν ἡλίῳ, σαλπικὰ γί-
15 νεται κοιλίας ἐπιτόμηνον, καὶ τὸ
ἐξ αὐτῶν δὲ δάκρυον ἀλεσθέντων
αὐτὴ δάφνιων λαμβανόμενον, καὶ
τὸ ἀφέλκημα δὲ αὐτῶν πινόμε-
νον, τὸ αὐτὸ ποιεῖ.

Πεὲλ Κοκκιμυλέας. Κεφ. ροε'.

20 Κοκκιμυλέα δένδρον ἔστι γινώ-
εμον, οὗ ὁ καρπὸς ἐδώδιμος, κα-
κοσόμαχος, κοιλίας μαλακτικός.
τῶν δὲ συεακῶν καὶ μάστιγα τῶν
ἐν δαμασίῳ γινωμμένων ὁ καρ-
πὸς ξηρανθεὶς, εὐσόμαχος καὶ
25 κοιλίας σαλπικός. τὸ δὲ ἀφέλκημα
τῶν φύλλων ἐν οἴνῳ σκευαζόμε-
νον καὶ ἀναγρῆσαιζόμενον, κινί-
δα καὶ ἔλα καὶ παείδμα ρευμα-
πιζόμενα σέλη. τὰ αὐτὰ δὲ πα-
ρέχει καὶ ὁ τῶν ἀγριοκοκκιμύλων
καρ-

Cornus. Cap. CLXXIII.

Cornus dura arbor est, bac-
cas ferēs oliuæ modo oblon-
gas, quæ primū virent, dein per
maturitatē rubescunt, aut ceræ
colorem repræsentant. In cibo
adstringūt, proflunio alui atq;
dysenterix salutare, siue in e-
dulio, siue in defruto exhibeā-
tur. Muria, vt oliuæ, condiūtur.
Sanies, quam virētia folia tor-
rendo resudarunt, impetiginī
conuenienter illinitur.

Sorba. Cap. CLXXIII.

Sorba colorem luteum re-
ferentia prius, quàm mature-
scant, dissecta & sole siccata
manduntur, aut aluum sistant.
Eadem est functio molitorum
farinæ, si polentæ loco sumat-
ur: quod & decoctum eorum
in potu præstat.

Prunus. Cap. CLXXV.

Prunus arbor est nota, cu-
ius pomum estur: sed stoma-
chum male habet, aluum mol-
lit. Syriaca pruna, & præci-
puè, quæ Damasci gignun-
tur, exiccata stomacho vti-
lia sunt, aluum adstringunt.
Folia pruni in vino decocta
collutione, & gargarizatu v-
uam, gingiuas, & tonsillas
fluxione laboranteis repri-
munt. Præstant idem syluestriū
pruno

prunorum baccæ, post maturitatem exiccata: cum sapa verò decoctæ, stomacho vtiliores redduntur, aluūmq; magis adstringunt. Gummi prunorū agglutinat, potū in vino calculos cōminuit: ex aceto quoq; illitum, lichenas infantiū sanat.

Arbutus. Cap. CLXXVI.

Arbut⁹ siue vnedo arbor est cōtoneæ malo non dissimilis, tenui folio: cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo: huic menæcylo cognomé est: maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus, stomacho aduersatur, capitisq; dolorem mouet.

Amygdalæ. Ca. CLXXVII.

Amyhdalæ amaræ radicum tritarum decoctum vitia cutis in facie corrigit: illitæ nuces idē inunus præstant, menses admoxtæ ciunt, capitis dolori auxiliātur, illitæ fronti aut temporibus cum aceto vel rosaceo: epinyctidas sanant ex vino, itē putrescentia vlcera, & quæ serpunt, & morsus canum cum melle: earum autem esu dolores finiuntur, aluum emolliunt, somnum faciunt, vrinam ciēt, cōtra sanguinis reiectiones cū amylo assumuntur, renū vitii, & pulmonū inflāmentationibus

ex

καρπὸς, πῶς περὶ ξηρανθεὶς ἐν ψηθεὶς δὲ μετὰ ἐψήματος, εὐσομαχώτερος καὶ σαλπιχώτερος κοιλίας γίνεται. τὸ δὲ κόμμι τῆς κοκκιμηλέας, ὅτι κολλητικόν, λίθων θρίπτικόν πινόμενον σὺν οἴνῳ· καὶ οὗ ὅξει δὲ ἐπιχειρόμενον, λειχθῆναι τὰς ἐπὶ παιδίων θειραπνεύει.

Περὶ Κομάρευ. Κεφ. ρς.

Κόμαρες δένδρον ὅτι, παρὰ τοῖον κυδωνία, λεπτόφυλλον, καρπὸν ἔχον ὡς κοκκιμύλου μέγεθος, ἀπύρνον· μεμάκνυται καλούμενον· πεπαχέντα δὲ ὑπόκιρρον ἢ ἐρυθρὸν, ἐδιόμενον ἀχυρῶδες, κακοστόμαχον δὲ καὶ κεφαλῆγες.

Περὶ Αμυγδαλῆς.

13

Κεφ. ρζ.

Αμυγδαλέας πικρὰς ἢ ῥιζὰ ἀφεψηθεῖσα λεία, ἐφάλης τὰς ἐν προσώπῳ ἀπικαταίρι καὶ αὐτὰ τὰ αμύγδαλα κατὰ πλάσθέντα, τὰ αὐτὰ πιεῖ, προσιδέμενα ἢ ἀγχει κατὰ μύδια, καὶ κεφαλαλγίας βοηθεῖ κατὰ πλάσθέντα μετώπῳ ἢ κροτάφοις μετ' ὅξους καὶ ῥοδίνης καὶ πρὸς ἐπινυκτίδας σὺν οἴνῳ· πρὸς δὲ σιπιδόνας καὶ ἐρυθρίας καὶ κυνόδηκτα, σὺν μέλιτι· ἐδιόμενα δὲ ὅτι ἀνώδυνα, κοιλίας μαλακτικὰ, ὑπνωτικὰ, οὐρητικὰ, καὶ πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν μετὰ αἵωλου* λαμβανόμενα· πρὸς δὲ νεφελικοὺς καὶ πειπνευμονικοὺς,

σὺν

συνὸν ὕδατι πινόμηνον ἢ ἐκλειχρό-
 μονον συνὸν ῥητίνην τερεβινθίνην δυ-
 σσινειῶσι δὲ καὶ λιθιδῶσι, συνὸν γλυ-
 κεῖ βοηδεῖ, καὶ ἡπάτικοις καὶ βηξὶ καὶ
 κώλου ἐμπνευματώδεσι, συνὸν μέ-
 λυτι καὶ γάλακτι ἐκλειχρόμηνον, κα-
 ρύου ποντικοῦ τὸ μέγεθος ἐστὶ δὲ
 καὶ ἀμείψουσα περσλαμβρόμηνον
 ὅσον ἐ. ἢ ζ. κτείνει δὲ καὶ δῆωπε-
 ρας βρωθέντα συνὸν τινι τὸν κόμ-
 μι αὐτῆς εὐφεί καὶ θερμαίνει, καὶ
 16 βοηδεῖ πρὸς αἱμάτος ἀναγνώλιν
 πινόμηνον · συνὸν ὅξει δὲ ἐπιχρῶ-
 μονον, λειχῶναι ἐπιπολάτοις αἰ-
 ρει ἰαταὶ καὶ βῆχα χροόνιον μετὰ
 κράματος ποθέν, λιθιδῶντας δὲ ὁ-
 φθαίει συνὸν γλυκεῖ πινόμηνον. ἢ δὲ
 25 γλυκεῖα καὶ ἐδάδιμος αἰωγδα-
 λὴ, καὶ ταπολὺ ἡσῶν ὅσων ὥς πρὸς
 ἐνεργείαν τῆς πικρᾶς. καὶ αὐτὴ
 δὲ λεπτοπικρὴ, οὐριπικρὴ, βρω-
 θέντα δὲ συνὸν πῶς λέπει τὰ ἀ-
 μύδαλα χλωρὰ, σομάχου πλά-
 20 θον ἀποκαθίστησι.

Περὶ Πισακίων. Κεφ. ροή.

Πισακία τὰ μὲν γινώμηνον ἐν-
 σεία, ὁμοία σροβίλοις, εὐσόμα-
 χα, ἐδιόμηνον δὲ καὶ πινόμηνον ἐν
 αἴνῳ λεῖα, εὐπετοδῆκτοις βοηδεῖ.

25 Περὶ Καρύων βασιλικῶν.

Κεφ. ροθ.

Κάρυα βασιλικὰ, ἃ ἐνιοὶ περ-
 σικὰ καλοῦσιν, ἐδιόμηνον, δύσπε-
 πτα, κακοσόμαχα, χολοποῖα,
 κεφαλαγῆ, βήσοισιν ἐναντία.

ῥοθ.

ex aqua in potu aut eclegma-
 te cū resina terebinthina dan-
 tur: calculosis difficilique vrinæ
 in passo auxiliantur, & illinctu
 cum melle, & lacte hepaticis,
 tussi, & inflationibus coli, nu-
 cis auellanæ magnitudine: qui-
 nis septenisve præsumptis ebie-
 tate non sentiunt potiores: vul-
 pes si cum quadam esca eas
 vorauerint, emoriuntur. Gum-
 mi eius calfacit, & adstringit:
 reiicientibus sanguinē, potum
 auxilio est: impetigines quæ
 summū corpus occuparunt il-
 litum cū aceto tollit: tussi ve-
 tustæ cū diluto vino potū me-
 detur: calculosis cū passo bibe-
 re prodest. E nucib⁹ græcis, dul-
 ces cibo idoneæ, sed multò mi-
 nus valēt in remediis, q̃ amaræ
 attamē extenuant, vrinā ciunt,
 recetiū cum suo putamine, hu-
 mida stomachi vitia emēdant.

Pistacia. Cap. CLXXVIII.

Pistacia, quæ cōstat in Syria gi-
 gni, pineis nucibus similia sunt,
 & stomacho amica: trita cū vi-
 no cōtra serpētium ictus pro-
 sunt, siue edantur, siue bibātur.

Nux iuglans. Ca. CLXXIX.

Nuces iuglādes, quas nōnulli
 Perficas vocant, sunt difficiles
 cōcōctu, stomacho inutiles, bi-
 liosæ, capitis dolorē inferētes,

i tussien-

tussientibus inimicæ, & vomituris ieiunis in cibo apte. Cum ruta verò & ficis præsumptæ, & à summo cibo, venenis resistunt: nec minus si à veneni haustu comedantur: largius effictæ tineas latas pellunt, illiuntur mammarum inflammationi, abscessibus, luxatiffique, cum mellis exiguo, & ruta: cum cepa autem, sale & melle, canis hominisque morfui proficiunt: tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum tritumque in oleo, & vino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, alopecias replet. Sistunt menses nucleis vsti, si triti ex vino admoveantur: iidem è veteribus, illiti carbunculis, gangrænis, & ægilopiis medentur: alopecis commanducati, & impositi præsentis sunt remedio. Nucibus tufis oleum exprimitur. Recentes stomacho innocentiores sunt, utpote suaviores: itaque alio mistæ eximunt acrimoniam. Liuioribus in corpore illitu tollunt.

Nuces auellanæ.

Cap. CLXXX.

Nuces auellanæ, quas & leptocarya vocant, stomacho infestæ

χρήσιμα ὅ βιβρωσκόμενα πρὸς ἐμέτους νήσι· καὶ θανάσιμων φαρμάκων ἐστὶν ἀντιφάρμακα, * πρεβερθέντα καὶ ἐπιβρωθέντα, σὺν ἰσάσι καὶ πηγαίῳ· παλαιοῖα ὅ βρωθέντα, πλατεῖαν ἤ μινδα ἐκπηλάσσει, ἐπιπλάσσει· ὅ καὶ μασοῖς φλεγμαῖνοισι, καὶ ἀποσῆμασι καὶ σπέρμασι σὺν ὀλίγῳ μέλιτι καὶ πηγαίῳ· μὲν δὲ χρόμιον καὶ ἀλὸς καὶ μέλιτος, πρὸς κωλύοντα καὶ ἀνδρὸς πύοντα ποιεῖ· πυρρῶντα ὅ σὺν τῷ κελύ- 10 φει, καὶ ἐπιτεθέντα τῷ ὀμφαλῷ, σφόδρα παύει· τὸ δὲ λέπυρον καὶ ἐν τειφθέν ἐν οἴνῳ καὶ ἡαίῳ, παιδίοις ἐπιχρίδεν, καλλίτερον ὅστι, καὶ δὴ ὡπεκίας διασωεί· καὶ ἐμύλω ἰσησι τὸ ἐν τῷ αὐτῷ λέον καὶ ἐν σὺν οἴνῳ πρεσβεύον· τῶν δὲ παλαιῶν καρύων τὰ ἐν τῷ καταπλαθέντα, μαγρεαίναν καὶ ἀνδρα καὶ αἰγίλωπας καὶ ἀλωπεκίας μασσηθέντα καὶ ἐπιτεθέντα ἰά- 20 ται σιωτόμως. * γίνεται δὲ καὶ ἐλαιον ἐξ αὐτῶν κοπιόμενον, καὶ ἐκδιδόμενον· τὰ δὲ χλωρὰ, ἢ ἴσον χακοσίμαχα, γλυκύτερον ὄντα· διὸ καὶ τοῖς σκορδαῖς μίζονται πρὸς τὸ τὴν δεινύτητι φελαρεῖν· αἶρει δὲ καὶ πελιδμά- 25 τα καταπλαθέντα

Περὶ Καρύων πογτικῶν.

Κεφ. ρπ.

Τὰ δὲ πογτικὰ ἃ ἐνιοὶ λεπτοκόρυα καλοῦσιν, ἐστὶ χακοσίμαχα,

χα, καὶ αὐτὰ δὲ λεία συν με-
κράτω πινόμενα, βῆχα παλαιὰ
ἴαται· φρυκτὰ δὲ ἐδιόμενα συν
πεπέρει ὀλίγω κατάρρουν πεποι-
νεί· ὅλα δὲ κάρντα λεία μετὰ α-
ξουγγίου ἢ σέαςτος ἀρκείου, ἀλω-
πεκίας ἐπιχειρῶντα διασωθεί·
φαπὶ δὲ ἐνίοι ὅτι μετὰ ἐλαίου τὰ
κελύφει κεκαμμένα καὶ λειοτε-
ρεῖντα, γλαυκοφθάλμων παι-
δίων μελαίνει τὰς κόρας ἐπιβε-
ρο χοιρίου τῆς βρέγματος.

Περὶ Μορέας. Κεφ. ρπα.

Μορέα ἢ συκαμινέα, δένδρον ἐ-
στὶ γνώριμον, ἥς ὁ καρπὸς κοτικὸς
κοιλίας, οὗδαρτος, κακοσόμαχος.
καὶ ὁ ἐξ αὐτῆς δὲ χυλὸς τὰ αὐτὰ
δρακὸν φηδεῖς· ἐν χαλκώματι ἢ
ἡλιαθεῖς, συμπιπώτερος γίνε· μι-
γρὺτος δὲ αὐτῷ ὀλίγου μέλιτος,
ποιεῖ πρὸς ρεύματα καὶ νομῶς καὶ
παείδματα φλεγμαίνοντα· ἐπιεί-
νε δὲ καὶ ἡ δύναμις αὐτῆς παρ-
μηγεῖστος συμπιπείας ἡσθῆς καὶ κηκί-
δος καὶ σμύρνης καὶ κρόκου· ἐπὶ δὲ καὶ
μυείνης καρποῦ καὶ ἰειδος, καὶ κα-
τανότα. τὰ δὲ ἄλλα μόρα ξη-
ρα κοπέντα, ἀντὶ τοῦτος τοῖς ὄφιοις
κίχνηται, καὶ κοιλιατοῖς ὀνίνησι. ὁ
τῆς ῥίζης ὁ φλοιὸς συνεφιδεῖς ὕδα-
τι καὶ ποθεῖς κοιλίαν λύει, καὶ πλά-
ττειν ἐλμίνδα ἐκτφάσκει, καὶ
τοῖς ἀνόνιον πεπωκόσι βροῖθει· τὰ
ὅ φύλλα λεία συν ἐλαίῳ κατὰ-
πλάθοντα, πνεύματα ἴαται,
ἐφ.

ita sunt: ipsa tamen trita, & in
aqua multa pota, tussi veteri
medentur: tosta & cum exiguo
piperis potu destillatione con-
coquunt, crematarum cinis cum
axungia aut adipis urfi perun-
ctus alopeciiis capillum reddit.
Aiunt nonnulli vasa earum puta-
mina, & in cineris speciem re-
ducta, cum oleo, caeciorum oculo-
rum pupillas infantibus deni-
grare, perfuso sincipite.

Morus. Cap. CLXXXI.

Morus arbor nota est, cuius
fructus alium soluit, stomacho
inutilis est, & facile corruptio-
ne sentit. Hoc idem praestat mo-
ri succus: decoctus autem aereo
vase atque insolatus, adstringen-
tior redditur. Facit ad fluxio-
nes, nomas, & tonsillarum in-
flammationes, addito mellis exi-
guo. Sed inolescit vis eius, adie-
cto scissili alumine, galla, cro-
co, & myrra: item myrica se-
mine, iri, & thure. Immatura
mori poma siccantur, tusaque aci-
norum rhois vice obsoniis mi-
scetur, ut coeliacos iuuat. Radi-
cis cortex decoctus in aqua &
potus alium resoluit, latas ven-
tris tineas excutit, his quoque
auxiliatur qui aconitum hau-
ferunt. Folia trita ex aceto il-
lita, ambustis igni medentur,

tinguntque capillū, vitiū & fici
nigræ frōdibus simul coctis in
aqua coelesti. Succus foliorum
cyathi mēsurā potuscōtra pha-
langiorum morsus auxilio est.
Feruefacti corticis & foliorū
iure dentes aptissimē in dolo-
re colluuntur. Radix circiter
messem incisa, facto in ambi-
tu scrobe, succum emittit, qui
postridie cōcretus inueniri so-
let. Is in dolore dentium effi-
cax est: tubercula discutit, &
aluum purgat.

Sycomorus. Ca. CLXXXII.

Sycomorū aliqui etiā fycami-
nū, id est, morū vocāt, cuius
fruct⁹ sycomorū etiā propter
inefficacem gustū appellatur.
Arbor est magna, fico similis,
frōdosa, multo lacte abūdās: fo-
liis mori, pomū ter aut quater
anno fert, nō ramis vt ficus, sed
caudice ipso, caprifico nō dif-
simile, dulcius grossis, sine gra-
nis interiorib⁹: quod nō matu-
rescit, nisi vngue aut ferro scal-
patur. Nascitur plurimū in Ca-
ria, Rhodo, locisq; nō multi tri-
tici feracibus: vbi prouētu fœ-
cundo restibiliq; iuuamentum
adfert, cū annonæ caritas pre-
mit. Pomum aluo vtile est, sed
per quā exilem præbet ali-
monia. Stomacho aduerfatur.

Succus

ἐκιδένται δὲ ἐν ὁμβρίῳ ὕδατι,
ὡς ἀμπέλου καὶ συκῆς. μελαί-
νης φύλλοις, βάπτει τείχας. ὁ δὲ
χυλὸς τῶν φύλλων, φθαρῆσι δὴ-
κτοῖς ἀρήγει, ποθεῖς κυάθου πλη-
θος. ἡ φλοιὸν δὲ καὶ τὸ φύλλον τὸ
ἀπόζεμα, διάκλυσμα ἐκιδέντων
ἔστιν. ὁδονδαλίας. ὁπίζεται δὲ
θεῖ τῶν πυραμιτῶν ἡ ῥίζης πε-
ριουρθεύσης καὶ ἐκκοπείσης, ἐν-
εῖσκειται. γὰρ τῇ ὑπεραίᾳ ἐπίπα-
ρός τις ὅς περὶς τε ὁδονδαλίας ἰσ-
ποιεῖ· καὶ φύματα διαφορεῖ καὶ
κοιλίαν καθαίρει.

Περί Συκομόρου. Κεφ. ρβʹ.

Συκόμορον, ἔνιοι δὲ καὶ τὸ
συχάμνον λέγουσι, καλεῖται δὲ
καὶ ὁ ἅπῃ αὐτῆς καρπὸς συκό-
μορον, διὰ τὸ ἄγονον τῆς γέν-
σεως. δένδρον δὲ ἔστι μέγα, ὁ-
μοιον τῇ συκῇ, πολύκομον σφό-
δρα, τοῖς φύλλοις ἑοικὸς μόρεα,
φέρει δὲ καρπὸν τρεῖς καὶ τετρα-
κίς τοῦ ἔτους, οὐκ ἀπὸ τῶν ἀκρε-
μόνων ὡς ἐπὶ τῆς συκῆς, ἀπὸ δὲ
τοῦ στελέχους ὁμοιον ἐεινέω. γλυ-
κύτερον ὀλιώδων, οὐκ ἔχοντα δὲ
κεγχραμίδας· μὴ δὲ πεπαιγμέ-
νον δίχα τοῦ ἐπιπυκνιδιῶαι ὀνυ-
χα ἢ σιδήρῳ. φύεται δὲ περὶ τὸν
ἐν καρδίᾳ καὶ πόδι, καὶ ἐν τοῖς
οὐ πεκνυπύροις τόποις· βονθεῖ δὲ
ἐν ταῖς σιτοδείαις, διὰ τὸ δίδω-
κεν τῇ καρπῷ. ἔστι δὲ συκοκίος ὁ
καρπὸς, ἄτροφος, κακοσμίαχος·
ὅτι

ὁπίζεται ὃ τὸ δένδρον ὡρὴν καρ-
ποφορήσει νεαρόν, τὸ φλοιὸν ἐξέπι-
πολῆς λίθω θλωμῶς βαδύτερον
γὰρ θλαδεῖς, οὐδὲν ἀγίησι. συλλέ-
γεται δὲ ἀπὸ γῶ ἢ εἰώ τὸ δά-
5 κρυον, καὶ ξηρανθέν κ' ἀναπλα-
θέν ἐν ἀγγεῖῳ ὁσρακίνῳ, ἀποτί-
θεται. Διούαμιν δὲ ἔχει ὁ ὅπτε
μαλακτικὴν, κολλητικὴν τραυ-
μάτων, διαφορητικὴν τῶν δι' ἀπεί-
πλων, πίνεται ὃ κ' συγχρίει πρὸς
10 ἐρπετῶν δῆγματα κ' ἐσκιρρώμε-
νοις σπλήνας, σωμαχοῦ τ' ἐδῆγ-
ματα κ' φεικίας. ταχέως δὲ τε-
ξηδονίζεται ὁ ὅπτε.

Πεὶ Σύκου ἐν κύπερ.

Κεφ. ρπγ.

15 Γίνεται δὲ κ' ἐν κύπερ εἶδει
διαφέρειν, πλεονα γὰρ οὔσα, συκα-
μῖνῳ τὰ φύλλα ἔοικα, τὸν δὲ καρ-
πὸν κ' τὸ μέγεθος κοκκιμύλων,
κ' γλυκύτερον, τὰ δὲ ἀνὰ πᾶν τα-
ῖς ὁμοίᾳ τοῖς περὶ τερνύροις.

20 Πεὶ Σύκου. Κεφ. ρπδ'.

Σύκα πέπρεα τὰ ἀπαλά, κακο-
σώμαχα, κοιλίας λυτικὰ· ῥαδίως
ὃ ἐξ αὐτῶν ρευματισμοὶς ἰσάται.
ἐξ ἀνθημάτων κ' ἰδρώτων περ-
κλητικὰ ἄδιθα ὃ κ' σβεστικὰ δερ-
25 ματίων. τὰ δὲ ξηρὰ τρέφειμα, δερ-
ματικὰ, διψικώτερα, εὐκοιλία,
ἔδετα ὃ ρευματισμοὶς σωμαχοῦ
κ' κοιλίας βέγγω δὲ κ' ἀφθεία
καὶ κύσει καὶ νεφροῖς ὥδετα, κ' τοῖς ἐν μακρονοσίᾳ κακοχεροῖσι
κ'

Succus primo vere tenera ar-
bore, anteq̃ fructū ferat, eximi-
tur, lapidis ictu summo cortice
desquamato : si enim altiore
plaga violetur cortex, nihil ef-
fluet. Spōgia aut velle lachry-
ma excipitur, quæ siccata & in
pastillos coacta fictili vase re-
ponit. Vis succi emollit, vulne-
ra cōglutinat, discutit collectio-
nes coctioni repugnātes, bibi-
tur etiā aut illinitur cōtra ser-
pentiū morsus, duratos lienes,
stomachi dolores & pfrictio-
nes. Celerimè teredinē sentit.

Ficus Cyprea.

Cap. CLXXXIII.

Gignitur & in Cyprio arbor
genere distans, quæ cum sit vl-
mus, prædita tamē est foliis sy-
comori, fructu pruni magnitu-
dine, multo dulciore, supradic-
tis cætera similis.

Fici. Cap. CLXXXIII.

Fici maturæ recentes stoma-
chum lædunt, aluū soluunt: sed
facile cōtracta ab eis fluxio fi-
stitur. sudorē euocant papulaf-
que, sitim sedant, calorē restin-
guunt. Siccis natura excalfa-
ciendi, vires alunt, sed sitim ma-
gis stimulant, alio vtilis, rheu-
matismis ventris & stomachi
contraria: gutturi autem, arte-
riæ, renibus, vesicæ, & iis quos
i iij longa

DIOSCORIDIS

lōga valetudo decolorauit, an-
helatoribus, hydropicis, comi-
tialibus aptissimæ: feruēfactæ
cū hyssopo & potæ, thoracem
purgât: tussi veteri, diuturnisq;
pulmonū vitis conueniunt, al-
iūm molliunt tussæ cū nitro &
cnico, dein manducatæ. Deco-
ctum arteriæ & tonsillarū in-
flāmatiōnib⁹ gargarizatu pro-
dest. Cum hordeacea farina ca-
taplasmatis miscētur, & in mu-
liebres fetus cum foenogræco
& ptisana. Ceterum cum ruta
coctæ torminibus infundūtur.
Coctæ illitæque duritias discu-
tiunt, parotidas & furunculos
emolliunt, panos ad matura-
tionem perducūt, maximè ni-
tro, iri aut calce addita. Crudæ
si cū antedictis tundantur, ea-
dem efficiunt: cum malicorio,
pterygia purgant: cum atra-
mento sutorio, deploratis fe-
rè tibiæ fluxionibus, & ca-
coëthicis vlceribus medentur:
quin & cum vino decoctæ ad-
dito absinthio & hordeacea fa-
rina, vtilissimè hydropicis illi-
nuntur. Crematæ cum cera-
to sanant perniones, prurigi-
nes, sonitusque si crudæ teran-
tur, & sinapi liquorēq; aliquo
execptæ auribus instillentur.
Tā syluestris, quàm satiuæ fici
lacteus

καὶ ἀσθματικοῖς καὶ ἐπιληπτικοῖς
καὶ ὑδρωπικοῖς· ἀνακαθάρει δὲ
καὶ τὰ ἐν θώρακι ἀποζεδέντα· ἀρ-
μόζει δὲ καὶ παλαιοῖς βήξει, καὶ
τοῖς πλεονέκτοις πνεύμονα χρόνιοις πά-
θεσι, κοιλίαν τε μαλάσσει κο-
πέντα μετὰ νήστου καὶ κρόκου ἐ-
διόμνυα. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῶν,
ταῖς πλεονέκτοις ἀρθρίαις καὶ παείδμα-
σιν φλεγμοναῖς, ἀρμόζει εἰς ἀναγρ-
γασίαν, καὶ εἰς τὰς ὠμυλῶ-
σεις δὲ μίγνυται, καὶ εἰς γυναι-
κείας πνεύας μετὰ τίλειος ἢ πι-
σάνης. συνήρηται δὲ ἀφέψη-
μῶν, σπύγγων ὅσιν ἐγκλυσμα κα-
ταπλαττόμενα δὲ ἐφ' ὅτ' αἰετῶν
διαφορεῖ σκληρίας, παρωτίδας. 19
δοδιλίνας μαλάσσει, φύγηδρα πε-
παίνει, καὶ μᾶλλον συνήρηται ἢ
νήστου ἢ ἀσβέσω. καὶ ὅμοι' ἡ κο-
πέντα συνὸς εἴρηται, τὰ αὐ-
τὰ δρᾷ· συνὸς σιδήρου δὲ ροιᾶς, πλε-
ρύμα ἀνακαθάρει· μετὰ χαλ- 20
κάνθου δὲ τὰ ἐν κνήμας ρευμα-
τιχὰ, δυσπαλῆ καὶ κακοήθη ἰᾶται.
ἐψηθέντα δὲ ἐν οἴνῳ καὶ μεθύται
ἀψινθίου καὶ κριθίνου καὶ ἀλεύρου, ὑ-
δρωπικοῖς ὠφελεῖ καταπλασθέν-
τα· κικανυμῶν δὲ μεθύται κη- 25
ρωτῇ, χυμέτρῳ ἰᾶται, αἰετῶν ὅ-
μοι' αὐτῶν ὑγρῶ ἀνακαθάρει·
τα καὶ ἐντεθέντα ἐν ὀσίν, ἢ χυ-
μῶ καὶ κλισμοῖς δευραπύει. Ὁ δὲ ὁ-
πὸς τῆς ἀγρίας καὶ τῆς ἡμέρας αὐτῆς,
πηκτι-

πικτικός ὅτι γαλακτος ὡς αὖ ἢ
 πτύα, λύνει ὃ καὶ τὸ πεπιγρὸς ὡς
 αὖ τὸ ὄξος· ἐλκτικός τε σωμάτων
 καὶ ἀνασωματικός, κοιλίας τε λυ-
 πικός, καὶ ὑστέρας ἀναχαλαστι-
 5 κός, μετὰ ἀμυγδαλοῦ λείου πι-
 νόμμος, καὶ ἐμμελίων ἀγῶρὸς
 παρσεθεὶς σὺν ὠοῦ λεκύθῳ, ἢ
 κηρῷ τυρρηνικῷ· ποδαγρικοῖς τε
 κατωπαλάσμασι χηήσιμος με-
 10 τὰ τηλίου ἀλεύρου καὶ ὄξους·
 σπλήχει δὲ λέπρας καὶ λειχή-
 νας, ἐφήλεις, ἀλφούς, ψώρας, ἀ-
 χῶρας σὺν ἀλφίτῳ· καὶ σκορ-
 ποπλήκτοις, καὶ τῆς πληγῆς ἐπι-
 σαζόμμος, καὶ ἰοδόλοις, καὶ κυνοδι-
 κτικῇ βοηθεῖ· καὶ ὀδονταλγίας ὠ-
 15 φηγεῖ ἐείω ἀναλφθεὶς, καὶ εἰς τὸ
 βρώμα ἐνπιθέμμος. καὶ μυρμη-
 χίαν αἶρει, σέαπι παρπλαθῆσης
 τῆς ἐν κύκλῳ σαρκός.

Περὶ Ἀγρίας συκῆς. Κεφ. ρπέ.

Τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ὁ χυλὸς ποιεῖ
 20 τῶν ἀπὸ τῆς ἀγρίας συκῆς ἀπα-
 λῶν κλάδων, ἡνίκα αὖ ἔγγυοι ὦσι,
 μήπω τῆ ὀφθαλμοῦ βεβλασνηκό-
 τος, κοπήόμμοι ὃ ἐκθλίβον, καὶ ὁ
 χυλὸς ξηρανόμενος ἐν σιῇ ἀπο-
 τήδετα· λαμβάνεται δὲ καὶ εἰς ἔ-
 25 κωπικὰς δυνάμεις ὁ, τε ὁπὸς καὶ ὁ
 χυλός. αἱ δὲ κράδαι βοείους κρέα-
 σι καθε-φάρμακα, ἐνέψντα ταῦτα
 ποιεῖσι· καὶ τὸ γάλα ὃ λυπηκώτερον
 ἐν τῇ ἐψύσει κινέμενον, αὐτὸ ἀπα-
 θῆς ἐν ταῖς παρσπευάζουσι.

Περὶ Ολιῶν

lacteus succus coaguli modo
 lac contrahit, cōcretumq; dis-
 soluit, vt acetū: exulcerat cor-
 pora, meatus aperit, soluit al-
 uum, vuluā recludit cum detri-
 ta nuce græca potus, menstrua
 ciet cum luteo· oui appositus,
 aut Tyrrhenica cera: podagri-
 corū cataplasmatibus cum farina
 foenigræci & aceto utilis: le-
 pras, lichenas, vitiligines, vitia
 cutis in facie, psoras, vlcera in
 capite manantia, cum polenta
 expurgat. instillatus plage, per-
 cussis à scorpione, venenatorū
 ictibus & rabiosi canis morsi-
 bus auxiliatur: prodest dētium
 dolori lana exceptus, & cauis
 eorū additus: verrucarū infor-
 micationes tollit cū adipe, cir-
 cumlita in ambitu carne.

Ficus syluestris, Ca. CLXXXV.

Hoc idem præstat succus ē
 teneris ramis syluestris fici, qui
 lacte prægnantes, silentē adhuc
 oculo, tusi exprimuntur, & sic-
 catus in ymbra reponitur. Et
 lac & succus imponuntur ex-
 ulceratoriis medicamētis. De-
 eo cti cum bubulis carnibus
 ramuli ficulni, facilem afferunt
 decoctionem. Lac efficiunt
 quod magis soluat, si inter co-
 quendum ficulneo furculo spa-
 thæ loco moueatur.

i iiii Grosi

DIOSCORIDIS

Grosfi. Cap. CLXXXVI.

Grosfi, quæ erinei nonnullis vocantur, coctæ illitæ strumas nodosq; omneis emolliūt: crudæ formicas, verrucas. & thymos, nitro farināq; additis, tollunt. Folia eadem possunt, illita cum sale & aceto vlcera in capite manantia, epinyctidas, & furfures sanāt: iis ficosæ exuberationes, & genarum scabritiæ perfricantur. Nigræ ficus foliis cauliculisque candidæ vitilignes perunguntur, faciunt ad canum morsus, & vlcera quæ ceria, id est fauos, vocant. Grosfi cum sylvestris papaueris foliis ossa extrahunt, furunculos cum cera discutunt, cōtra muris aranei morsus, & scolopendræ venena, cum eruo & vino illitæ, auxiliantur.

Lixiuum ficus.

Cap. CLXXXVII.

Fit ex cinere fic^o tā sylvestris q̄ satiuæ lixiuū, crematis ramorū cauliculis: quod subinde macerari op^o est & inueterascere, siquidē inter caustica intelligit. Gāgrenis pdest: nāq; expurgat & cōsumit, quæ excrescūt: eōq; sic vtendū est: Spongia assidue hoc lixiuo imbuta superponitur. Interdum dyesentericis,

&

Περὶ Ὀλῳιδων. Κεφ. ρπζ.

Οἱ δὲ Ὀλῳιδοι, ὑπὸ δὲ πηλῶν εἰρευνοὶ χαλκήμμοι, ἐφθοὶ χαλκῶν ἀέντες, πάντων συστροφὴν καὶ χολέρας ἐμμελῶσουσιν, ὁμοὶ δὲ μυρμηκίας καὶ θύμοις, σὺν νίτρω κατὰ πλάσδέντες καὶ ἀλεύρω ἀέρισ. καὶ τὰ φύλλα δὲ τὰ αὐτὰ συνανται, σὺν ὄξϊ δὲ καὶ ἡσὶ κατὰ πλάσδέντες, ἀχῶρας, πύτυρα καὶ ἐπινυκτίδας ἰῶν. παρατείβεται δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ συκώδη καὶ τρεχέα τῶν βλεφαρῶν. καὶ λευκαὶ κατὰ πλάσδον τοῖς τῶν μελαίνης συκῆς φύλλοις ἢ τοῖς κλάδοις, ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ κυνόδηκτα σὺν μέλιτι, καὶ πρὸς τὰ κνέια. ἀνὰ ροισὶ δὲ οἱ Ὀλῳιδοι καὶ ὁσῶ, σὺν μύκανος ἀγρίας φύλλοις, δοθιλεύας τε σὺν κηρῶ διδύουσι. σὺν ὀρέβῳ δὲ καὶ οἶνω κατὰ πλάσδέντες, πρὸς μυγαλῆς δῆγματα καὶ σκολοπένδρας ἀρμόζουσι.

20

Περὶ Κορίας τῆς συκῆς.

Κεφ. ρπζ.

Γίνεται δὲ καὶ κορία ἀγρίας συκῆς καὶ ἡμέρας καέντων τῶν κλάδων ἐν τῇ τέφρᾳ. πολὺ βροχόν δὲ αὐτῷ δεῖ ποιεῖ καὶ παλαιῶν ἀρμόζῃ δὲ καὶ πρὸς τὰ κνυστικά, καὶ γαγγραινέμματα ἀνακαθαίρει καὶ ἀναλίσκει τὰ περὶ αὐτῆς. αὐτῇ δὲ σπόγγον βρέχοντα σπινθῶς καὶ ἐπιπλέντας. ἐφ' ὧν δὲ καὶ ἐκλύζοντας ὥς ἐπὶ δυσεντερικῶν καὶ πα-

καὶ παλαιῶν ῥευμάτων, καὶ κόλ-
 πων ὑπονόμων καὶ μεγάλων κα-
 θάρσει γὰρ καὶ κολλᾷ καὶ σαρ-
 κοῖ, καὶ συμφύει εὐκότως τοῖς
 ἑνὰ μοις, καὶ ποτίζεται δὲ πρὸς
 5 αἵματος ἐκδρόμῳσιν καὶ πλῶ-
 ματα, ῥήγματα, σπάσματα,
 συν ὕδατος κυάδω προσφά-
 τως διυλισμένη· καὶ ἐλαίου μι-
 γρὸς ὀλίγου, κοιλιακοῖς τε καὶ
 δυσεντερικοῖς, καὶ ἑαυτῷ
 10 κυάδου πλεῖστος βοηθεῖ διδυμέ-
 νῃ καὶ τοῖς νευρικοῖς δὲ καὶ σπά-
 σμασι, σύχρυσμα ἀρμόδιον συν
 ἐλαίῳ, ἰδρῶτας κινῶσα, καὶ πρὸς
 γύφου πέσιν καὶ φαλαγγίων δῆ-
 γματα πίνεται· παρέχουσι δὲ τὰ
 15 αὐτὰ καὶ αἱ λοιπαὶ κοιλίαι, μά-
 λιστα δὲ ἡ δευτέρα· συμπικρὰ δὲ εἰ-
 σι πᾶσαι.

Πρὶ Περσέας. Κεφ. ρπῆ.

Περσέα δένδρον ὅστις ἐν αἰ-
 γύπῳ, καρπὸν φέρον ἐδώδιμον,
 20 εὐτόμαχον· ἐφ' οὗ καὶ τὰ λεγό-
 μενα κρανοκόλαπτα φαλάγγια
 εὐείσκειται, μάλιστα δὲ ἐν θη-
 βαΐδι, Διώαμιν δὲ ἔχει τὰ φύλ-
 λα λεῖα ἐπιπλαπτόμενα ξηρὰ,
 αἱμορραγίαν ἰσάν. τὸτο δὲ ἰσό-
 25 ριστὸν πίνεις ἐν ποσίδι, ἀναρεπι-
 κρὸν εἶναι, μετατεθὲν δὲ εἰς αἰ-
 γύπτον, ἀλλοιωθῆναι καὶ ἐδώδι-
 μον γινώσκειται.

Πρὶ Ἰβείδος. Κεφ. ρπθ'.

*Ἰβρίς ἢ τοι καρδαμαντικὴ ἔχει
 τὰ

& in fluxiones vetustas, & sin-
 cuniculatim exedētes, magnos-
 que, instillari cōueniet. Etenim
 purgat, cōglutinat, carne replet
 & oras cōmittit, nō secus atq;
 emplastra q̄ cruētis vulneribus
 iniiciunt, enema vocāt. Bibitur
 ad discutiendū sanguinē cōcre-
 tū, & cōtra præcipitationes, ru-
 pta, cōuulsa, cum cyatho aque
 recenter colatum: addito olei
 exiguo, coeliacis dysentericis p
 se cyathus dat^o prodest: neruo-
 rū vitiis, cōuulsionibus com-
 modē illinitur ex oleo, vtpote
 quod sudores moueat: aduer-
 sus gypsi potum, & phalágiorū
 morsus bibiūt. Hæc eadē pstant
 reliqua lixiuia, præsertim quer-
 num: omnia tamē adstringunt.

Persea. Cap. CLXXXVIII.

PERSEA arbor est, in Ægy-
 pto, fructum ferens cibo ido-
 neum, stomacho vtilē: in quo
 phalangia cranocolapta nomi-
 ne inueniuntur, præsertim in
 Thebaide. Arida folia in fari-
 nam redacta, illitu sanguinis
 eruptiones sistunt. Arborem
 hanc prodiderūt aliqui in Per-
 side exitiosam esse, translatam-
 que in Ægyptum, mutata na-
 tura in cibos receptam.

Iberis. Cap. CLXXXIX.

Iberis siue cardamantica,
 folia

folia habet nasturtij, vere vi-
rentiora: caulem cubitalem,
aut minore: in incultis nasci-
tur, ætate lacteum floré pro-
mit, quo tempore efficacior
est. Radices duas nasturtio si-
miles habet, calfaciētes & ad-
urentes: ipsæ enim ischiadi-
cis cum falsa axungia empla-
stri modò vtilēs, quaternis
horis alligatæ, vt dein
in balneas descēda-
tur, & postea o-
leo cum lana
locus per-
ungatur.

τὰ φύλλα παρόμοια καρδά-
μων, ἐν ἑαρι ἐν θαλάσσερα, μύ-
κος δὲ ὅσον πηχναῖον ἢ ἑλαπὼν
φύεται δὲ ἐν ἀγροῦσι τοῖς
ποις, δέρις δὲ γαλακτικὸν ἄν-
δος περιβάλλει, καὶ τότε ὅτι δρασ-
τικώτερον. ἔχει δὲ δύο ρίζας πα-
ρόμοιαι καρδάμων. Στερματικὴς
καὶ κωστικὴς αὐταὶ γὰρ ἀγροῦται αἱ
ρίζαι πρὸς ἰσχυαδικούς, συνὲς
τοῖς υἱοῦ τεταρχειμῆου, ὡς
ἐμπλασθῶδες γλυκὺς κατὰ πλά-
σμα μέχρις ὡρῶν τετάρτων, ἔ-
πειτα ἐν βαλανείῳ ἐμβιβάζε-
ται, καὶ ἐλαίῳ μετ' ἐλείου τοῖς
τόποις ἐπιχρίσθαι.

PRIMI LIBRI
FINIS.

Pedaniij

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙ-
ΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ.

ΠΕΔΑ-

DIOSCORIDIS

Echínus terrestris.

Cap. II.

Terrestris erinacei corium combustum alopecijis cum pice liquida aptissimè illinitur, assiccatum corp⁹, & cum aceto mulso potum; renum vitiis auxilio est: item aquæ quæ cutem subiit, conuulsionibus, elephantix, & male habitis, quos cachectos vocant: viscerû fluxiones exiccat. Eiusdem iecur fictili solibus ex cocto arefactum, ad eosdem vsus utilissimè reconditur.

Hippocampus.

Cap. III.

Hippocampus marinum animal est exiguum, cuius cremati cinis exceptus cum liquida pice, aut axungia seu amaracino vnguento illitus, alopecias replet.

Purpura. Cap. IIII.

Purpura vsta exiccat, dentes abstergit, excrescentias in carne cohibet, vlcera purgat, & ad cicatricem perducit.

Buccina. Cap. V.

Eadem præstant concreta buccina, sed vehementius vrunt: si quis salis plena fictili crudo adurat, dentifricio conueniunt: ambustis utiliter.

Περὶ τῆ χειρταίου ἐχίνου.

Κεφ. 6.

Καὶ τῷ χειρταίου δὲ ἐχίνου τὰ δέρμα καὶν, πρὸς ἀλωπεκίας ματὰ πίσης ὑγρᾶς κατὰ χριόμενον ἀμύζει· ἢ δὲ σὰρξ σκελετευθεῖσα καὶ πινομένη καὶ ὀξύμελιτος, βοηθεῖ νεφριτικοῖς, καὶ πῶς ὑπὸ σάρκα ὑδρωψί, καὶ σπασμώδεσιν ἐλεφαντῶσι, καὶ χέκτοις· ξηραίνει δὲ καὶ πᾶσι πρὸς τὰ σπλάγχνα ρευματισμοῖς, καὶ τὸ ἥπαρ δὲ αὐτῆς ξηρανθὲν ἐπ' ὀσράκι ἡλιοκαοῦς, καὶ ἀποταθὲν, πρὸς τὰ αὐτὰ ὁμοίως ἀμύζει διδόμενον.

Περὶ Ἰπποκάμπου.

Κεφ. 7.

Ἰππόκαμπος, θαλάσσιον ὄντι ζῶον μικρὸν, οὗ καὶντος ἀναληφθεῖσα ἢ τέφρα πίση ὑγρᾶ ἢ ὀξυγρίῳ ἢ ἀμαρακίῳ μύρω καὶ κατὰ χριθεῖσα, ἀλωπεκίας διασώζει.

Πρὶ Πορφύρας. Κεφ. 8.

Πορφύρα καθεῖσα διώσκει καὶ ξηραίνει πικρῶ, σπληνικῶ ὀδόντων, ὑπὸ σαρκαμᾶτων δὲ κατασπληνικῶ, ἀνακαταρπικῶν ἐλκῶν, ἀπουλωπικῶ.

Πρὶ Κηρύκων. Κεφ. 9.

Τὰ αὐτὰ ὅτι πινοῦσι καὶ οἱ κήρυκες καὶντ'· εἰσὶ δὲ μᾶλλον χυσι κοῖται δὲ πρὸς αἰλῶν αὐτῶν πληρώσας ἐν ὥμῃ χύβρα καὶ σι, ἀμύζει πρὸς σμικρῶν ὀδόντων, καὶ κατὰ χρι-

ταχυμάτα ὑπεραδέκτες, ἔαν
 δὲ δὴ ἀποσπαρακοῦνται τὸ φάρ-
 μακόν· μετὰ δὲ τὴν ἀπούλω-
 σιν τὸ κατὰ φύσιν αὐτῶν
 ἀποπίνειν γίνεται δὲ ἀσθε-
 νος ἐξ αὐτῶν ὡς ὑποδείξομεν ἐν
 τῷ περὶ ἀσθενείας λόγῳ.

Περὶ Ἰονίων. Κεφ. 5.

Ἰόνια δὲ καλεῖται τὰ ἐπὶ
 τῶν κηρύκων καὶ πορφύρων μύ-
 σα, περὶ οἷς ἡ ἐλὶξ ὅτι τὸ ὄφρα
 10 κου· καίεται δὲ ὁμοίως δυνά-
 μιν ἔχοντα καυσικωτέραν τῶν
 κηρύκων καὶ τῆς πορφυρέας, διὰ
 τὸ πύζειν αὐτῶν τὴν φύσιν· αἱ
 δὲ σάρκες αὐτῶν κηρύκων, εὐστο-
 μοι καὶ εὐστόμαχοι· κοιλίαν δὲ
 15 οὐ μαλακοῦσι.

Περὶ Μύακων. Κεφ. 6.

Μύακες διαφέρουσιν οἱ πον-
 τικοί· καίεντες δὲ τὸ αὐτὸ δρῶσι
 τοῖς κηρύξιν· ἀδιαιτέραν δὲ πλυ-
 νόντες ὡς μύληδες, χρησιμεύου-
 20 σιν εἰς τὰ ὀφθαλμικά, σὺν μέλι-
 τι ὑπερῶν τῶν παχύτητος· βλεφά-
 ρων ἢ σπλήνοντες λευκώματα, ἢ
 τὰ ἄλλα ὁπποιοῦντα τῇ κό-
 ραις· ἢ δὲ σαρξὲς ἀντὶ τῶν κυνοδύ-
 κτοις ἐπιτίθεται ὠφελίμως.

25 Περὶ Τελλινῶν. Κεφ. 7.

Τελλίναι ὀνειαράι· θυκοίλια· μά-
 λιστα δὲ ἐξ αὐτῶν ζωμός· ταιγι-
 ραὶ δὲ καίεται ἢ βιβείσθαι λείπει ἢ
 μετὰ κεδρίας ὅπως ζομεῖται, ταῖς
 ἐκπιδείσας τῇ βλεφάρων βίχας

liter illinuntur: quibus solui me-
 dicamentum nō oportet: nam
 postea quā vulnus cicatricē
 duxerit, ipsum in testæ modum
 induratū, spōte sua decidet. Fit
 etiam calx ē buccinis, vt in ei
 mentione demonstrabimus.

Cionia. Cap. VI.

Cionia vocatur purpurarum
 buccinorūq; mediæ partes, cir-
 ca quas testæ volumē clavicu-
 latim intorquetur. Cremata si-
 mili modo, maiorem purpuris
 buccinisq; facultatē vrēdi cō-
 sequunt, quoniā apprimēdi na-
 turā obtinēt. Buccinorum car-
 nes ori gratae sūt, & stomacho
 vtilēs: sed aluum nō molliūt.

Mituli. Cap. VII.

Mituli laudatissimi in Pōto.
 Cremati eundē buccinis effe-
 ctum præbent. Priuatim plūbi
 more eloti, oculorū medica-
 mentis cum melle vtilēs habē-
 tur: genarū crassitudines absu-
 munt, albugines purgāt, & ce-
 tera quæ oculis caliginē offu-
 ndūt: carnes eorum ad canis
 morsus vtilissimē imponūtur.

Tellinæ. Cap. VIII.

Recētes tellinæ aluo vtilēs,
 sed maximē ius earū, salitæ v-
 rūtur, tritaq; in cinerē, & cum
 cedria instillatæ, auulsos pilos
 renasci

DIOSCORIDIS

renasci non patiuntur.

Chama. Cap. IX.

Chamarum conchularum-
que in exigua aqua decocta-
rum insaluum ciet: id cum vi-
no assumitur.

Vnguis odoratus. Cap. X.

Vnguis siue onyx cōchylj te-
gmentū est, ei simile quo pur-
pura integitur: quod in Indiæ
nardiferis lacub⁹ inuenit. suaue
ideo spirās odorē, & conchylia
inibi nardi pabulo vescantur.

Colligitur posteaq̃ stagnantes
aque æstiuis squallorib⁹ inarue-
rūt. Laudatissimus qui à rubro
mari defertur, cādicās, pinguis.
Babylonicus nigrescit, atq; mi-
nor conspicitur. Ambo odoris
gratia suffiunt, sed aliquatenus
castoreum olent. Iidem suffitu
excitant foeminas vulue stran-
gulatu oppressas, comitialesq;:
poti vëtre molliunt. Crema-
tum cōchylum eadem efficit,
quæ purpura & buccinum.

Cochleæ. Cap. XI.

Terrestres cochleæ stoma-
cho vtilis sunt, & non facile
corrumpuntur. Optimæ Sar-
donicæ, Aphricanæ, Astypa-
leicæ, & quæ in Sicilia, ac Chio
gignuntur, & quæ in Liguriæ
alpibus, pomatiæ, id est oper-
culares cognominatæ. Marina
stomacho

οὐκ ἔωσιν αὐτῆς φθῆναι.

Πρὶ Χημῶν. Κεφ. θʹ.

Καὶ ὁ ἐκ τῶν χημῶν ὃ καὶ τῶν
ἄλλων κογχυλείων ζωμὸς, κοιλί-
αν κηεῖ ἐφόδους μὲν ὀλίγη ὕδα-
τος· μετ' αἶνε δὲ λαμβάνεται.

Πρὶ Ονυχος. Κεφ. ιʹ.

Ονυξ ἔστι πῶμα κογχυλίου, ὁ-
μοιον τῷ τῆς πορφύρας· ἐν εἰσκό-
μῳ ἐν τῇ Ἰνδῇ, ἐν ταῖς γαρδο-
φόροις λίμναις. διὸ καὶ ἀρωματί-
ζει νεμομένων τῶν κογχυλίων ὅτι
γάρδον· συλλέγεται δὲ, ἐστει-
δαν ὑπὸ τῶν χημῶν ἀναξήραν-
θῶσιν αἱ λίμναι· διαφέρεται δὲ ὁ ἀ-
πὸ τῆς ἐρυθρᾶς κομζούδους, ὁ
πλευκος ὢν καὶ λιπαρὸς· μέλας
δὲ ὁ βαβυλώνιος καὶ μικρότερος.
ἁμφοτέρω δὲ ἐν ὁδοῖς, θυμώ-
μῳ, καστορέζοντες ποσὶς τῇ ὁ-
σμῇ ἐγείρονται καὶ ἐτοι ὑποδυ-
μαίνοντες τὰς ὑπερῶς πύλας
καὶ ἐπιληπτικούς· ποδέντες
δὲ κοιλίαν μαλάσσειν αὐτὸ δὲ
τὸ κογχύλιον κηεν, ποιεῖ ὅσα καὶ ἡ
πορφύρα καὶ ὁ κήρυξ.

Περὶ Κογχυλίου χερσαίου.

Κεφ. ιαʹ.

Κοχλίας χερσαῖος ἐκδύμα-
χος, δύσφθαρτος· αἰεὶς δὲ ὁ, καὶ
τε ἐν σαρδῶνι, καὶ λιβύῃ, καὶ ἄστυ-
παλίᾳ, καὶ σικελίᾳ καὶ χίῳ ἡμ-
νώδους, καὶ ὁ ἐν ταῖς κατὰ λι-
γυρίαν ἁλπεσι πωματίας κα-
λούμενος· καὶ ὁ θαλάσσιος

δὲ εὐσμάχος καὶ εὐέκκριτος· ὃ δὲ
 ποτάμιος βρομώδης, καὶ ὁ ταῖς ἀ-
 χαΐταις καὶ τοῖς θαμνίσκοις* πρὸς
 κεκολλημένος ἄγριος, ἐν τινεσὶ σέ-
 σιλον καλοῦσι, τὰ ρακπῆκος ὄντι
 5 κοιλίας καὶ σωμαχοῦ ἐμετοποιός.
 Διῶνται δὲ πάντων τὰ ὄσρα καὶ
 κεχωμμένα θερμαίνειν καὶ χα-
 εῖν· σμῆχειν λέπρας, ἀλφούς, ὀ-
 δόντας· οὐλὰς δὲ ταῖς ἐν ὀφθαλ-
 μοῖς καὶ λευκώματα καὶ ἐφάλας, καὶ
 10 ἀμβλυωπίας, μετὰ τῆς σαρκὸς
 ὅλοι κατέντες καὶ λειανθέντες καὶ
 ἐγχεῖσθαι· οὐλοὶ δὲ μετὰ τῆς ἀποκα-
 θαρίσιν. ὥμοι δὲ σὺν τοῖς
 καλύφοις καταπλαδέντες, ἐξ-
 κμάζουσι τὰ ὑδρωπικὰ οἰδήμα-
 15 τα· καὶ οὐκ ἀφίστανται· τριπλὴν πάν-
 τιν ἀνικμαδιῶσι τὸ ὑγρόν· καὶ πο-
 δαγρικὰς δὲ φλεγμονὰς πρὸς ὑ-
 ποχόντι· καὶ σκόλοπας ἐλκοῖσιν ὁμοί-
 ως καταπλαδέντες καὶ ἐμμη-
 να ἄρουσι· λεῖοι πρὸς ἐξέμενοι.
 20 αἱ δὲ σὰρκες αὐτῶν λεῖαι σὺν
 σμύρῃ καὶ λιβανῶντι καταπλα-
 δεῖται, τραύματα καὶ μάστιγα τὰ
 κατὰ τὰ νεύρα κολλῶσι, καὶ ταῖς
 ἐν μυκτῆσιν αἰμορραγίας σὺν
 ὄξει· λειανθέντες ἐπὶ χοῖσι ζῶσι·
 25 δὲ ἡ σὰρξ* καταποδεῖται τὸ λυ-
 βικοῦ μάστιγα, ἀλγυδόντας σωμα-
 χου παύει· μετὰ δὲ τὸ ὄσρα καὶ ὀ-
 λος τριβείας καὶ μετ' οἶνον καὶ σμύρ-
 νης ποδεῖς· ὀλίγας, καλικοὺς δε-
 ραπύει καὶ κύστεως ἀλγῆματα,
 ἀνακολλᾷ

stomacho idonea, & facile al-
 uo excernitur: fluuiatilis ui-
 rus olet. Quæ verò vepribus
 frutetisque glutinata coheret,
 quam vocant nonnulli fesi-
 lon, ventrem & stomachum
 turbat, vomitiones excitat.
 Crematæ omnium teste excal-
 faciendi & vrendi naturâ for-
 tiuntur: purgant lepras, vitili-
 gines, dentèsque: emendant
 oculorum cicatrices, & vitia
 cutis in facie, albugines, ac vi-
 fus hebetudines, si cum carne
 sua vitæ tritaque ex melle illi-
 nantur. Crudæ cum tegumen-
 tis impositæ, aquæ inter cu-
 tem tumores exugunt: sed nō
 ante soluantur, quàm omnis
 hauriatur humor. podagricas
 inflammationes leniunt, im-
 pactos corpori aculeos illitæ
 euocant, menses trita & ad-
 motæ ciunt. Carnes earum cū
 thure & myrrha illitæ, cū vul-
 nera alia, tum maximè quæ
 nerui acceperunt, congluti-
 nant: trita in aceto, sanguinem
 naribus erumpentem infre-
 nāt: viuæ corpus, & præsertim
 Africanæ cum aceto deuora-
 tū, stomachi dolores mitigat:
 trita cum testa, vino & myr-
 rha, si exiguum inde bibatur,
 coli vesicæque cruciatus sanat.

Terrestres

Terrestris pilos incommodos
replicat, si quis abraſo acu
lentore eius, pilum
attingat.

Cancrī, Cap. XII.

Cancrorum fluuiatiliū ex-
uſorū cinis qui duo cochlea-
ria expleat, adiecto dimidio ra-
dicis gētianæ modo, triduo po-
tus cū vino, magnopere pro-
dest canis rabioſi morſibus: ri-
mas pedum ſedisq; perniūcu-
los, & carcinomata, cum deco-
cto melle lenit: triti crudi, po-
tiq; ex aſinino lacte, auxilian-
tur contra ſerpentium phalā-
giorumq; morſus, atq; ſcorpio-
num ictuſ: decocti autē & cū
iure eſtati, iis proſunt, qui ta-
be conficiuntur, aut leporē ma-
rinum hauſerunt: necant ſcor-
piones triti, & cum ocimo ad-
moti. Poſſunt eadē marini, ve-
rū inefficacius omnia pſtāt.

Terreſtris ſcorpio.

Cap. XIII.

Terreſtris ſcorpio tritus &
impoſitus, ſuæ plagæ reme-
dium eſt: quin eſtur aſſatus, ad
eadem.

Marinus ſcorpio.

Cap. XIII.

Marini ſcorpionis ſel con-
uenit ad ſuffuſiones oculorū,
albugines, & hebetudines.

Draco.

ἀνακολλᾷ δὲ τείχεα ὁ χερσαῖος,
εἰάν τις βελόνῳ καὶ τῆς σαρκὸς
αὐτῆ φέρον τῷ περὶ τὰ μύδια γλοι-
ώδει περὶ σάπηται τῆς τείχεος.

Πρὶ Καρκίνων, Κεφ. ιβ΄.

Καρκίνων ποταμίων καέντων, ὃ
ἢ τέφρα κοχλυαείων δυοῖν πλῆ-
θος σὺν θυπαῆς ῥίζης κοχλυα-
είῳ ὕει, καὶ οἶνῳ ποτεῖσα ἐπὶ ἡμέ-
ρας γ΄ βοηθεῖ λυσιπύκνις ἐνερ-
γῶς· σὺν δὲ μέλιτι ἐφθῶ, ῥαγα-
δας τὰς ἐν ποσὶ καὶ τὰς ἐν δακτύ-
λῳ καὶ χιμῆδας, καὶ καρκινώμα-
τα παρηγορεῖ· λείοι δὲ ὥμοι σὺν
γάλακτι ονείῳ πεζέντες, βοηθοῦ-
σι δὴ μασσῇ ἐρπετῶν, φалаγγίων,
σκορπίων παληαῖς· ἐφθῶ δὲ σὺν
ζωμῶ· ἐδιδόμφοι, φθιστικούς ὡφε-
λοῦσι, καὶ τὸς λαγῶν θαλάσ-
σιον πεπωκότας· τελεζέντες δὲ
μετ' ὠκίμου καὶ περὶ ζέντες,
σκορπίοις κτείνουσι. Δυνάμει δὲ
τὰ αὐτὰ καὶ οἱ θαλάσσιοι, πάλιν
ἡπτον τέτων ἐνεργεῖσι.

Πρὶ Σκορπίου χερσαίου.

Κεφ. ιγ΄.

Σκορπίος χερσαῖος ὥμος, λεί-
ος ἐπιτετεῖς, βοηθῆμα τῆς ἰδίας
παληῆς γίνεται· εὐεῖσεται ὃ καὶ
ὅππῃ τεῖς πρὸς τὸ αὐτό.

Πρὶ Σκορπίου θαλασίου.

Κεφ. ιδ΄.

Τὸ ὃ θαλασίῳ σκορπίῳ ἢ χλοῖ
ἀμύδι πρὸς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς
ὑποχύσεις καὶ λευκώματα καὶ ἀμ-
βλυωπίας.

Πρὶ

Πρὶ Δράκοντος θα-
λασσίη. Κεφ. ιε.

Δράκων θαλάσσιος ἀναπνυχθεὶς
καὶ ὀπτεθεὶς, ἰαμά ᾧσι πρὸς τὸ
ἐκ τῆς ἀκαθάρτης αὐτοῦ πληγῇ.

5 Πρὶ Σκολοπένδρας. Κεφ. ις.

Σκολόπενδρα θαλασσία ἐ-
φθίσα ἐν ἐλαίῳ καὶ κατὰ χεῖρας
ἐφθίσα, ψιλοὶ τείχεας· λαμβάνει δὲ
καὶ κηλὸν ἐργάζεται.

Πρὶ Νάρκης. Κεφ. ιζ.

10 Νάρκη θαλασσία ὀπτεθεὶσα ἐπὶ
χεονίων ἀλγυμμάτων τῷ περὶ κεφα-
λήν, πρὸς τὸ σφοδρὸν τὸ ἀλγύ-
ματος· καὶ ἔδραν τὴν ἐκβεπομένην ἢ
πρὸς πηλὸν, σέλην πρὸς ἐφθίσα.

Πρὶ Σαρκὸς ἐχίδνης. Κεφ. ιη.

15 Ἐχίδνης σαρξ ἐφθίσα καὶ ἐ-
πιπομπή, ὅξυδορεῖς ποιεῖ τὰς ὀ-
φείας, καὶ πρὸς τὰ νευρικὰ ἀρμό-
ζει, καὶ τὰς ἀνδρομέδας χρεῖσθαι
ἵσται· δεῖ τὴν ἐκδεῖραντας αὐτῶν,
ἀποκόπτειν κεφαλῶν καὶ τὴν ἑρῶν,
20 οἷα τὸ ἐν αὐτοῖς ἄσπερον· μυθώ-
δης γὰρ ἢ πρὸς τὸ μέτρον ἀποκο-
πῇ τῶν ἄκρων· τὸ δὲ λοιπὸν πλύν-
αντας καὶ τεμαχίσαντας, ἐφθί-
ναι ἐλαίῳ καὶ οἶνῳ καὶ ἁλῶν ὀλίγων
καὶ ἀνήθου· φασὶ δὲ τὸν πρὸς σφε-
25 ρομέδας φθεῖρας χυλῶν· ὅπερ ᾧσι
ψευδὸς· πρὸς σφροῖσι δὲ ἐννοεῖ καὶ
μακρογέρους γίνεσθαι τὸν ἐπίον-
τας αὐτάς· κατὰ σκευάζονται δὲ
καὶ ἄλλες ἐξ αὐτῶν πρὸς τὰ αὐ-
τά, πλὴν οὐχ ὁμοίως ἐν ῥυθμῷ.

Draco marinus.

Cap. XV.

Draco marinus dissectus &
apertus impositusq; ictus spi-
næ suæ qua ferit, medela est.

Scolopendra. Cap. XVI.

SCOLOPENDRA in
oleo decocta si illinatur, auel-
lit capillos: sed contactu pru-
ritus facit.

Torpedo piscis. Cap. XVII.

Marina torpedo diuturnis ca-
pitis doloribus admota, crucia-
tus vehementiam mulcet: ea-
dem apposita eversam sedem
prociduamque coercet.

Viperæ. Cap. XVIII.

Viperinæ carnes si coctæ e-
dantur, claritatē oculis afferūt,
neruorū vitis auxiliant, incre-
scētes strumas reprimūt: detra-
cta autē cute, caput caudaq;
quoniā carne vacat, amputari
debēt. quippe cōmētitivū est qđ
præcipit, certā vtrinq; mensurā
præcidi oportere. Reliquū verò
corpus exēptis interaneis elo-
tū dissectūq; discoquit cum o-
leo, vino, salis exiguo, & ane-
tho. Aiūt iis q; viperas esēt, pe-
diculos procreari: quod planē
à veritate abhorret. Adiciunt
aliqui longā senectutē agere, q;
eo cibo vescūt. Sal ex eis ad eā
de cōficiť, sed inefficacior est.

Viperæ

DIOSCORIDIS

Viua aut vipera in fictile nouū dimittitur, adiiciūtur salis caricarūq; tritarū, singulatim quīq; sextarij, mellis cyathi sex, mox fictulis operculū luto oblinīt, & fornacib⁹ inassat, donec sal in carbones redigat: qui postea trit⁹ in pulueris faciē, recondit. Plerūq; vt ori gravior fiat, immiscetur, nardi spica, aut foliū, aut malabathri momentum.

Senecta anguiū. Ca. XIX.

Senectus anguium in vino decocta dolori aurium, infusu: & dentium collutione, auxilio est. Addunt eam in medicamenta oculorum, sed precipuē viperinam.

Lepus marinus.

Cap. XX.

Lepus marinus loligini parua similis est, qui per sese trit⁹, aut cum vrta marina illit⁹ capillos euellit.

Lepus terrestris. Cap. XXI.

Terrestris leporis inassatum cerebrū mādatur, iuuandis tremoribus qui valetudine cōtrahti sunt: affricū aut cibo facile infantibus dētitionem præstat: exustū caput & cū adipe vrsino aut aceto illitū, alopeciarū inanitatib⁹ medetur. Leporinū coagulū post triduum à cōcubitu potū, cōceptum adimere, partūsq;

καθιέν) δὲ ἐχιδνα ζῶσα εἰς κρη-
νὴν χύσαν, καὶ μετ' αὐτῆς ἀλῶν
ἰσάδων τετειμμένων ἀνὰ ἕξασ
ἀ. μτ' μέλιτος κυάδων ε'. πειχέ-
εται πλὴν τὸ πῶμα τῆς χύσεως,
καὶ ὁπῶτα ἐν καμίνῳ, ἄχρῃς οὐ
ἀνδρακωδῶσιν οἱ ἄλλοι μετὰ δὲ
τῷτο ληοτελεῖντες. ἀπὸ τῆς
ταυτοῦ ἐπίσης μὲν μύρου πρὸς ἐν-
σομαχίαν αὐτοῖς νοσθεσάχρῃς ἢ
φύλλῃς, ἢ μαλαβάδρε βραχέος.

Πρὶ Οφεως γήρως. Κεφ. εθ'. 10

Τῆρας ὀφεως ἐψηθὲν ἐν οἴνῳ,
βοήθημά ἐστιν ὠταλγίας ἐγχεό-
μῃον, καὶ ὁδονταλγίας διακλυ-
ζόμενον. μίσχρῃσι δὲ αὐτὸ καὶ εἰς
ὀφθαλμικὰς θυνάμεις μάλιστα
δὲ τὸ τῆς ἔχρας.

15

Πρὶ Λαγῶς θαλατῆς.

Κεφ. κ'.

Λαγῶς θαλάσσιος εἰσὶν ἡ μι-
κρὰ τευθίδι· δυνά) δὲ λείος κα-
ταπλάσει κατ' αὐτὸν καὶ μτ'
ἀκαλύφῃς τείχας ψιλοῦ.

20

Πρὶ Λαγῶς χερσαίας. Κεφ. κβ'.

Τῆ δὲ χερσαίας λαγῶς ὁ ἐγκέ-
φαλος, ὁπῶς βίβρωσιόμῃος ὠ-
φελεῖ τρέμοις τοῦ καὶ πάδος γι-
νομόμενος· καὶ ὁδονπάσει ἐπὶ
παίδων παρατειόμενος καὶ ἐπιό-
μῃος· ἢ δὲ κεφαλὴ αὐτῆ καὶ ἴσα
καὶ καταχρῖσθαι μετὰ σέας
ἀρκείας ἢ ὄξους ἀλωπεκίας θερα-
πείας· ἢ δὲ πιτύα ποτῆσαι καὶ ἡμέ-
ρας τρεῖς, μετὰ τῷ ἀφιδεῖν,
ἀτόκῃς

25

ἀτόμιος εἶναι ἰσορεῖ· ἔπεχει δὲ
 καὶ ἐν μήτραις ῥεύσιν, καὶ κοιλίας,
 ὠφελεῖ δὲ καὶ ὀπληπτικὸς, καὶ πρὸς
 τὰ θανάσιμα μετ' ὄξυς πνομέ-
 νη, μάστιγα δὲ πρὸς γάλακτος
 ὁρμώσιν καὶ ἐχιδνῶν δίσματα.
 τὸ δὲ αἷμα αὐτῆς δερμὸν κατὰ
 χροῖον, ἐφάλλει καὶ ἀλφὺς καὶ
 φακὺς δὲ εὐπεύς,

Πρὶ Τρυγόνος θαλασσίας.

Κεφ. κβ'.

10 Τρυγόνος θαλασσίας τὸ κέν-
 τρον, ὃ δὴ ἀπὸ τῆς οὐρᾶς αὐτῆς
 πέφυκεν ἀνεστραμμένον ταῖς φο-
 λίσιν, ὁδόν τε πνοῦντα παύει·
 δρῦπται γὰρ καὶ ἀποβάλλει.

Πρὶ Σηπίας. Κεφ. κγ'.

15 Σηπίας ἐψηθείσης τὸ μέλαν
 βιβρωσκόριον δύσπεπτον, κοι-
 λίας μαλακτικόν, τὸ δὲ ἀπὸ αὐ-
 τῆς ὄρακον ὀμματιδὲν εἰς κολ-
 λυρία ἀρμόζει πρὸς παρὰ τειφιν
 τραχέων βλεφάρων· καὶ ἐν δὲ ἐν
 τῷ ἰδίῳ ὄρακι, ὅχις οὗ τὸ
 20 πλάκωδες αὐτῆς ἀποσῆ, σμύχει
 λεῖον ἀλφὺς, πίτυρα, ὁδόντας,
 ἐφάλλει· μύζην τε καὶ εἰς τὰ
 ὀφθαλμικά πλῦθέν ποιεῖ δὲ καὶ
 πρὸς λευκώματα κτυπῶν ἐμ-
 φυσώμενον· καὶ πτερυγία τὰ ἐν
 25 ὀφθαλμοῖς τήκει, συν' ἀλσὶ λεῖον
 πρὸς τὰ γόμφον.

Πρὶ Τείγλης. Κεφ. κδ'.

Τείγλη συνεχρῶς ἐδιομένη ἐμειλω-
 τίας δοκεῖ καὶ ἀσκειαστικὴ ὑπάρ-
 χειν

partusq; spem interciperē p-
 ditur: vuluæ & alui fluorem
 sistit, comitiales iuuat, contra
 venena ex aceto bibitur, præ-
 fertim aduersus cōcretum lac,
 & viperarum morsus. Sanguis
 eius si callidus illinat, vitia cu-
 tis in facie, vitiliginem, lentigi-
 nēsque sanat.

Pastinacæ.

Cap. XXII.

Marinæ pastinacæ radius, qui
 ei⁹ cauda enat⁹ aduersis squā-
 mis reflectitur, dentium dolo-
 rem mitigat: nam eos frāgit, &
 euocat.

Sepiæ. Cap. XXIII.

Sepiæ coctæ dum estur a-
 tramentum agrè concoqui-
 tur, aluium mollit, collyriis ἐ-
 testa factis conuenienter ge-
 narum scabritiæ perfricantur:
 vltum in sua testa donec id qđ
 crustosum est abicedat, postea
 20 tritū, expurgat vitilignes, fur-
 fures, dentes, & vitia cutis in fa-
 cie: elotum in medicamenta
 oculorum addi solet: cōtra al-
 bugines, oculis iumentorū effi-
 caciter inspirat: pterygiā ocu-
 lorū absūmit, cum sale tritum
 & iniectum.

Mullus piscis. Cap. XXIII.

Mullorum assiduō cibo, a-
 ciem oculorū hebetari cōstat.

k ij Is

DIOSCORIDIS

Is marini draconis, aranei, ac scorpionis morfibus medetur, si crudus atque dissectus admoueat.

Hippopotamus.

Cap. XXV.

Hippopotami testes exiccantur ac triti contra serpentium morbus bibuntur.

Fiber. Cap. XXVI.

FIBER ancipitis vitæ animal, plerunque cum piscibus & cancris ex aqua victum capefit. Huius testes serpentium venenis aduersantur: iter nutamenta mouent, & in vniuersum varios obtinent vsus: siquidem menses ac partus ciunt, duabus drachmis cum pulegio poti: partus secundaque efficiunt: contra inflationes, tormina, singultus, venena, ixiámque ex aceto bibuntur: lethargicos, & vtcunque veterno obdormiscentes excitant infusi: cum aceto autem & rosaceo, olfactu & odoris suffitu, idem faciunt: poti & illiti profunt tremulis, conuulsionibus, & omnibus nervorum vitiis. In summa, calfactoriam vim habent. Eligi debent testes, qui ex vno ortu con-

χεν ὁμῶς δὲ ἀναλαβεῖσαι καὶ ἐπιτεθεῖσαι. θαλασσίῳ δράκοντος καὶ σκορπίου καὶ ἀράχνης δῶγματα ἴσται.

Πρὶ ὀρχεως ἱπποποτάμου. Κεφ. κέ.

Ὀρχης ἱπποποτάμου ξηρανθεὶς καὶ λειανθεὶς, πίνεται μετ' οἶνου πρὸς ἐρπετῶν δῶγματα.

Πρὶ τῶν τῶ καστορεως ὀρχεων. Κεφ. κς.

Καστορεως ὀρχης ζῶον ὅστιν αἰ-
φίδιον, τὸ πλείστον ἐν ὕδασι, σὺν
ἰχθύσι, καὶ καρκίνοις τρεφόμε-
νον. ποιεῖ μὲν καὶ πρὸς ἐρπετά.
ἔστι δὲ καὶ πηαρμικός, καὶ κατόλου
πικίλῳ ἔχει τὴν χεῖρ σὺν ποδὶ
τῷ μετὰ γλήχωνος < πλῆθος 19
δυοῖν, ἐμμελῶς κινεῖ καὶ ἐμμελῶς,
καὶ δεύτερα ἐκβάλλει. πίνεται τῷ
σὺν ὄξει καὶ πρὸς ἐμπνευματώ-
σεις, σφόδρα, λυγμούς, θανάσιμα
φάρμακα, ἰξίαν ἀνακαλεῖται δὲ
καὶ τοὺς λιθαργμούς, καὶ τοὺς 20
ὅπως δὴ ποτε κατὰ φερονμούς,
ἐμβρεχόμενος. σὺν ὄξει καὶ ρο-
δίνῳ καὶ ὀσπρανόμοις, καὶ ὕπο-
δυμώμοις δὲ τὰ αὐτὰ ποιεῖ.
ἀρμόζει δὲ καὶ τρώμοις καὶ σπα-
σμοῖς, καὶ παντὶ τῷ νευρώσει 25
πινόμενος τε καὶ συγχρισμέ-
νος. καὶ κατόλου δερμαντικῶν
ἔχει τὴν δυνάμιν. ἐκλέγου δὲ
αἱ τοὺς σινεζευγμούς ὀρχεις
ἐκ μᾶς ἀρχῆς (ἀδύνατον γὰρ
δύο

δύο φύσας ἐξευγυλίας ἐν ἐνὶ
 ὑμῶνι εὐρεῖν) καὶ τὸ ἐν τὸς ἐ-
 χον κηρείδες βαρύσμιον, βρο-
 μῶδες, δριμύ, δηκτικόν, εὐτει-
 πλον, διαφραστόμυον τε σωε-
 5 χῶς φυσικοῖς ὑμέσι. δολοῦσι δέ
 πινες αὐτὸ, ἀμμονιακὸν ἢ κόμμι
 συμπεφυρμένον αἵματι καὶ χα-
 σμαίῳ, ἐγχεόντες εἰς φύσαν καὶ
 ξηραίνοντες. μέλιτι δὲ ἰσορεῖ-
 ται ὅτι διωκόμυον τὸ ζῶον ἀπο-
 10 παῖ τὸς διδύμοις καὶ ῥίππει·
 ἀδύωτον γὰρ ὅστιν ἀφαιδα αὐ-
 τῶν πρεσύπων ὄντων ὥσπερ υἱός.
 δεῖ δὲ διελόντας τὸ δέγμα κομί-
 σαδὲς συν τῷ πελίσκῳ ὑμῶν
 τὸ ὑγρὸν, ὃν μελιτῶδες, καὶ οὐτω
 15 ξηραίνοντας ποτίζειν.

Πρὶ Γαλῆς κατοικίδης.

Κεφ. κζ΄.

Γαλὴ κατοικίδος πεφλεχθεῖ-
 σα, καὶ δίχα τ' ἐν τὸς σκελετευθεῖ-
 σα δι' ἀλὸς καὶ ξηρανθεῖσα ἐν σκιᾷ
 20 παντὸς ἐρπετὸς ἐνεργέστερόν ἐστι
 βοήθημα ποδείσα, μὲν οἶνον >
 β. πλῆθος, καὶ τοξικὴ ἀντιφάρ-
 μακον ὁμοίως ληθεῖσα. ἢ ὅ κοι-
 λία αὐτῆς κοίῳ πλεθεῖσα καὶ σκε-
 λετευθεῖσα, θηριοδύνκτοις καὶ ἐπι-
 25 ληπτικοῖς βοηθεῖ πνομήν. ὅλη δὲ
 καθεῖσα ἐν χύτρᾳ, ποδαρχικὴς, ὠ-
 φελεῖ, τῆς τέφρας καταχέουμένης
 μετ' ὄξους. τὸ δὲ αἷμα αὐτῆς κα-
 ταχέουμένην, χοιρέσι βοηθεῖ ὠ-
 φελεῖ δὲ καὶ ἐπιληπτικούς.

vt gemini folliculi in vna mem-
 brana cōiuncti reperiantur) li-
 quore int^o veluti ceroso, odo-
 re graui & virus redolētē, gustu
 acri, mordētē, ac friabili, natu-
 ralibus, tunicis circūdato. Quē
 fraude aliqui corrūpūt, cōiciē-
 tes in follem gūmi, aut ammo-
 niacū cū sanguine & castorio
 subactū, & ita exiccātes. Vanū
 est quod traditur testes ab ipsis
 euelli, & à sese abiici, quū ve-
 natu vrgentur: siquidem tangi
 nequeunt, ita, vt in sue, substri-
 cti. Operæ autem pretium est,
 diuisa pelle melleum liquorem
 cum euestiēte tunica assume-
 re, & ficcatum potui dare.

Mustela vulgaris.

Cap. XXVII.

Mustela quę in domibus no-
 stris oberrat, ambusta exente-
 ratur, & inueterata sale, in vm-
 bra ficcatur. Ea binis drachmis
 cū vīno pota, aduersus omnia
 serpentium venena presentaneo
 est remedio: toxico, simili sum-
 pta modo, resistit. Eius vētricu-
 lus coriandro farctus inuete-
 ratusq; , percussis à serpēte, &
 comitialibus potu auxiliatur.
 Cremata in fictili podagricis
 cōfert, cinere ex aceto illito. Sā
 guine perūtæ strumæ, iuuan-
 tur: comitialibus etiā prodest.

Πρὶ

K iij Ranæ,

DIOSCORIDIS

Ranæ. Cap. XXVIII.

Contra omnium serpētium venena pro antidoto sunt ranæ, si ex sale & oleo decoctæ edantur, iusq; earū itidem forbeatur: cōtra inueteratos tendinū rigores pollent. Illit^o eorum cinis, profluētis sanguinis impetus sistit: explēdis alopeciarum inanitatibus ex liquida pice illinitur. Viridium ranarū cruor auulsos genis pilos renasci phibet, in vestigia euulsorū instillat^o: decoctæ in aceto & aqua detiū dolores collutione leniūt. Silurus. Cap. XXIX.

Silurus recēs in cibo nutrit, & facile præbet aluū: sale verò conditus, minimū suppeditat alimentū. Arteriā expurgat, & vocē expedit. Illita saliti caro, aculeos et infixa corpori spicula extrahit. Muria ei^o icipiētib^o dysenteriiis pdest, si in desidetiū for^o adiciatur, fluxiones siquidem ad summa cutis elicit: ischiadicis infusa medetur.

Smarides. Cap. XXX.

Smaridis piscis caput exustū, excrecentes vlcera oras puluillōsq; reprimit: nomas cohibet, thymos clauōsq; absomit. Caro non secus atq; balsamētum prodest a scorpione percussis, aut a cane demorsis.

Manæ.

Πρὶ Βαβύλων. Κεφ. κη.

Βάβαχοι ἀντιφάρμακόν εἰσιν ἐρπετῶν πάντων, ζωμευθέντες* ἐπ' αἰσὶ καὶ ἐλαίῳ, τὸ ζῶμα λαμβανούμεν ὁμοίως· καὶ πρὸς χειροῖς τῶν τινόντων ἀποσάσεις· καμέντες δὲ καὶ ὅππα δέντες, αἰμορραγίαν σέλκουσι· καὶ ἀλωπεκίας θεραπεύουσι σὺν πύσιν ὑγρῶ κατὰ χεῖρας· τοῦ δὲ γλωττῶν βαβύλον τὸ αἷμα ὅππα ζέοντων, κολλύει τὰς ἐκπληθείσας ἀπὸ τῶν βλεφάρων· τοῦ τείχεος φύεται· ὠφελῶσι καὶ ὁδονταλγίαι συνελθόντες· ὕδατι καὶ ὄζει καὶ διακλυζόμενοι.

Περὶ Αἰλῶνος. Κεφ. κθ.

Αἰλῶνος νεαρός βίβρωσκόμενος, περὶ φημιός· ἔστι καὶ ἐλκοῖς· τὰς· 19· χειρὸς δὲ ἄβροφος· ἀρτηρίας δὲ καὶ δαίρη καὶ σὺν χεῖρας παρὰ σκευάσει· κατὰ πλάθεισα δὲ ἡ σὰρξ τῶν ταειχρῶν, σιόλοπας ἀνάγει, καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς δὲ ἄλλη ἀρμόζει ἐν ἀρχῇ συντετακτοῖς εἰς ἐκείνην· 20· διπλοῦσα, κατὰ τὸν ρευματισμὸν εἰς τὴν ἐπιφανίαν, καὶ ἐγκλυζόμενη δὲ ἰσχυρὰ τοῦς θεραπεύει.

Πρὶ Σμαρίδος. Κεφ. λ.

Σμαρίδος ταειχρῶς ἡ κεφαλὴ καίεται, ἔλκει σέλην· 25· σαρκοῦντα, καὶ νομὰς ἴσῃσι, καὶ ἡλοῖς, καὶ θύμοις ἀναλίσκει· σιόλοπας τὴν καὶ κυνοπλήκτοις ἡ σὰρξ ἀρμόζει κατὰ πᾶς ταειχρῶς.

Πρὶ

Πρὶ Μανίδος. Κεφ. λα΄.

Καὶ τὸ μανίδος ὃ κεφαλὴ καὶ
 σκελῆς, τὰς ἐν δακτύλῳ τετυλω
 μέλεις ῥαγάδας κατὰ πλάθειν
 ἀφίστησι· τὸ δὲ γάρον αὐτὸ τὰς ἐν σό
 7 ματι σπιπιδόνας διακλυζόμενον
 παύει. Πρὶ κωβίων. Κεφ. λβ΄.
 Κωβίων πρὸς σφαίρον ἐὰν ἐμβαλὼν
 εἰς υἱάν κοιλίαν κατὰ ῥάφης,
 καθεψήσῃς τὴν μὲν ὑδατος ξέστων
 10 ἰβ΄· ἄλγχι δυοῖν ξέστων, καὶ διηθύνῃς
 καὶ ἐξαθρίδας πετίσῃς, κοιλίαν
 ἀταράχως καὶ τὴν ὑπάρξῃς. κατὰ
 πλάθειν ὃ καὶ τὸς ὑπὸ κυνῶν
 διηθύνῃς ἢ ἐρπετῶν ὠφελεῖ.

Πρὶ ὤμοταριχου. Κεφ. λγ΄.

Ὁ δὲ ὤμοταριχος λεγόμε
 15 νος, σάρξ ἐστὶ δύνην τεταρχειμύε
 νος· βοηθεῖ δὲ λαμβανόμενος τοῖς
 ὑπὸ ἐρίδνης, τῆς καλεμένης πρη
 σῆρος, διηθεῖσι· δεῖ δὲ ὡς ὀπωλεί
 20 σον προσφύροντας οἶνον ἀνακτά
 ζειν πίνειν πολὺ καὶ ἐμῆν· εἰς τε
 τὰς δριμυφάγας μάλιστα ἀρμό
 ζει, κατὰ πλάθειν δὲ καὶ ἐπὶ
 κυνοδόντων ὠφελίμως.

Πρὶ Γάρρου. Κεφ. λδ΄.

Γάρρον δὲ πᾶν τὸ ἐκ τρι
 γυρῶν ἰχθύων καὶ κρέων κατὰ
 25 πλάθειν, νομαὶς ἐφίστα καὶ
 κυνοδόντους ἰάται· εἴοιτε δὲ
 καὶ ἐπὶ δυσεντερικοῖς καὶ ἰσχιαδι
 κοῖς· ἐφ΄ ὧν μὲν ἵνα τὰ εἰλκωμέ
 να ἐπικρύψῃ, ἐφ΄ ὧν δὲ ἵνα τὰ
 ἀνέγκωτα ἐρεθίσῃ.

Μανᾶ. Cap. XXXI.

Manarum ex capitibus ci
 nis si illinatur, callosas sedis ri
 mas abolet. Eius etiam garum
 oris putrilagines collutiōe fe
 dat.

Gobius. Cap. XXXII.

Gobius recens in suillū vē
 trē coniectus, si cōsuta rima in
 duodecim aquæ sextariis, do
 nec duo supersint, decoquat,
 excolatus & sub diuo refrige
 rat⁹ potui deē, alius sine mole
 stia deiicit. Illit⁹ cōtra serpen
 tiū, canūq; morsus auxilio est.

Thunnus. Cap. XXXIII.

Conditanēi thunni caro, quā
 omotarichon vocant, sumpta
 iis auxiliatur, quos vipera no
 mine prester momorderit: sed
 oportet vinū quamplurimum
 subinde cogantur haurire, ita
 vt vomitione reddatur. Con
 tra acrimonias esitatorum ma
 ximè valet, canum morsibus
 vtilissimè illinitur.

Garum. Cap. XXXIII.

Garū oē, qđ ex piscibus carni
 busq; sale maceratis liquamen
 est, si ex eo fort⁹ fiat, depascētia
 vlcera sistit: morsis à cane me
 deē, dysētericis atq; ischiadicis
 infunditur: nōnullis, vt exulce
 rata adurat: alijs autē ad laces
 sēda, q̄ vlcera non senserunt.

Πρὶ

k iij lū

Ius piscium.

Cap. XXXV.

Recentiū piscium ius, modò per se, modò ex vino potum, aluū subducit. Priuatim adhūc vsum cōficitur è phycidibus & scorpionib⁹, & iulide: è percis, & recētibus aliis saxatilib⁹, nec virus resipientibus, simpliciter cum aqua, oleo, & anetho.

Cimices lectularij. Ca. XXXVI.

Cimices qui in cubilibus enascuntur, cauis fabarum inclusi, si ante febrium significationes septeni deuorētur, quartanis auxilio sunt: & citra fabas sumpti, percussis ab aspide ppsunt: vuluarum exanimationes olfactu reuocant: poti cum vino aut aceto adhærentes sanguifugas abigunt: triti & vrinariæ fistulæ impositi, vrinæ angustias leuant.

Millepeda. Cap. XXXVII.

Millepedæ, quæ sub aquario vase stabulantur, animalia sunt multis pedibus nitétia, quæ cōtacta manu contrahunt in orbem: hæ ex vino potæ difficulti vrinæ, & regio morbo auxiliantur. Millepedas illini anginis cum melle vtilissimū. Tritæ, & in cortice mali punici calfactæ, doloribus auriū, addito rosaceo, cōuenienter instillatur.

Blatta

Πρὶ ζωμοῦ τῶν νεαρῶν ἰχθύων. Κεφ. λβ.

Ζωμός ὃ ἐκ τῶν νεαρῶν ἰχθύων κοιλίας ὑπαγωγός, ποτὲ μὲν καὶ ἑαυτὴ πινόμενος, ποτὲ δὲ μετ' οἷν νε. ἰδίως δὲ σκευάζει) πρὸς ταῦτα ὁ ἀπὸ τῶν φωκίων καὶ σκορπίων καὶ ἰαλίδων καὶ περκίδων καὶ τῶν δελφῶν περσείων ἀπαλῶν καὶ ἀερώμων λετῶς μὲν ὕδατος καὶ ἐλαίου καὶ ἀνήδε. Πρὶ κόρεων. Κεφ. λγ.

Κόρεις οἱ ἀπὸ κλήνης ἐνπιθέμενοι βρώμασι μετὰ κυάμων τὸν ἀριθμὸν ζ'. καὶ καταπινόμενοι πρὸς τῆς ὀπισθημασίας, ὠφελοῦσι τοὺς τεταρτάζοντας, καὶ ἀσπιδόδηκτοις δὲ δίχα τῶν κυάμων καταποθέντες ὕσεικῶς δὲ πνιγόμενός ἀνακαλουῦνται ὁσφρανόμενοι σὺν οἶνῳ δὲ ἢ ὅξει ποθέντες βδέλλας ἐξάγρῳσι δυσχεύουσιν τὰ πύοισιν ἐνπιθέμενοι τῷ ἐρπικῷ πόρῳ λεῖν.

Πρὶ κουβαρίδων. Κεφ. λδ. 20

Οἱ οἱ ὑπὸ τὰς ὑδατίας, ζῶά εἰσι πολύποδα, σφαιρομήμοι κατὰ τὰς ἐπαφὰς τῶν χειρῶν· οὗτοι ποθέντες σὺν οἶνῳ βοηθοῦσι δυσουρίᾳ τε καὶ ἰκτέρω· διαχειρόντες δὲ μετὰ μάλιστος σωμαγχικούς ὠφελοῦσι, καὶ πρὸς ὠταλγίαν δὲ λεῖται σὺν ῥοδίῳ θερμανθέντες ἐν καλύφῳ ῥοας καὶ ἐνσαγῆτες, ἀρμόζουσιν.

Πρὶ

Περὶ Σίλφης. Κεφ. λή.

Σίλφης ἢ ἐν τοῖς ἀρτοκοπέοις
εὐεισκομένης, τὰ ἐν τὸς τειρόμε-
να σὺν ἐλαίῳ ἢ ἐψόμῳ καὶ ἐν-
σαζόμενα ὡταλίας παύει.

9 Περὶ πνεύμονος θαλασ-
σίου. Κεφ. λθ'.

Πνεύμων θαλάσσιος πρὸς φα-
τος λεανθεὶς ποδαγριῶντας καὶ χι-
μαίλιωντας, ὡφρὺν καταπλασά-
μενος.

10 Περὶ χοιρίου πνεύμονος. Κεφ. μ'.

Ο δὲ χοίριος καὶ ἀγνῆος καὶ ἀφ-
κῆος πνεύμων, τὰ ἐκ τῶν ὑποδν-
μάτων παρατείματα ἐπιπίδε-
μενοι, ἀφλέγματα τηρεῦσθαι.

Περὶ Πνεύμονος ἀλώπε-

15 κος. Κεφ. μά.

Καὶ ὁ τῆς ἀλώπεκος πνεύμων
ξηρανθεὶς καὶ ποθείς, ἀσθματικὸς
ὀνίνησι, καὶ τὸ σῆμα ὃ αὐτὰ κένει καὶ
ἐγχυθέν, ὡτὸς πόνον παύει.

Περὶ Ἡπατος ὀνείας. Κεφ. μβ'.

20 Ἡπαρ ὀνείον ἐδιόμενον ὀπίθον,
ἐπιληπτικοὺς ὡφρὺν, νήσεις δὲ
λαμβάνειν.

Περὶ Αἰδίου ἄρρενος ἐ-

λάφου. Κεφ. μγ'.

Αἰδοῖον ἄρρενος ὕδατος σὺν οἷ-
25 νι ποθέν λεῖον τοῖς ὑπὸ ἐχιδνῶν
δηχθεῖσι βοηθεῖ.

Περὶ Ονύχων ὄνων. Κεφ. μδ'.

Ονυχες ὄνων καέντες καὶ ποθέν-
τες ἐπὶ ἡμέρας ἱκανὰς πλῆθος κο-
χλιαρίων θυαίνεσθαι, ἵσχυαῖται ἐπι-
ληπτι-

Blatta pistrinaria.

Cap. XXXVIII.

Blattæ eius quæ in pistrinis
inuenitur, interanea trita aut
cum oleo decocta, aurium do-
lores instillatu mitigant.

Pulmo marin⁹. Cap. XXXIX.

Podagras pernionésq; emen-
dat pulmo marinus recens, tri-
tus & illitus.

Pulmo suillus.

Cap. XL.

Suillus & agninus vrsinúsq;
pulmo impositu attritus à cal-
ceamentis contractos, ab in-
flammatione tuetur.

Pulmo vulpinus.

Cap. XLI.

Vulpinus verò si arefactus bi-
batur, suspiriosos adiuuat. A-
deps quoque liquefactus, infu-
susque, auris dolorem finit.

Hepar asini. Cap. XLII.

Asini iecur inassatú esu comi-
tialibus prodest, veruntamé ie-
iunis edendum præcipitur.

Genitale cerui.

Cap. XLIII.

Genitale cerui tritum & vi-
no potum, à vipera demorsis
auxiliatur.

Vngula asini. Cap. XLIII.

Vngularum asini cinis per
dies multos binis cochleari-
bus potus proditur comitiales
adiu-

DIOSCORIDIS

adiuuare, eadem oleo subactæ strumas discutiunt: & illi-
tæ pernionibus medentur.

Lichenes equorum.

Cap. XLV.

Lichenes sunt in equorum
genibus, & super ungulas in
flexu harum partium indurati
calli: qui triti & in aceto poti,
comitialibus mederi traduntur.

Unguli caprinarum.

Cap. XLVI.

Caprinarum cinere perun-
ctæ ex aceto alopecię fanan-
tur.

Iecur caprinum.

Cap. XLVII.

Capræ verò inaffati decidua
fanie, inungi lusciosos prodest:
& dum coquitur, apertos o-
culos halitu eius vaporari: pro-
dest in cibo tostum ad eadem.
Tradunt hircini iocineris cibo
comitiales deprehendi.

Iecur aprinum.

Cap. XLVIII.

Aprinum recens si arefactū
teratur, ex vino potum contra
serpentium volucrumque mor-
sus auxilio est.

Iecur canis rabidi.

Cap. XLIX.

Iecur canis, qui rabie exagita-
tur, tostū & in cibo ab emor-
sis

ληπτικοὺς ὠφελεῖν, ἐλάω δὲ θυρα-
δέντες χοιράδας διαφορεῦσιν ἐ-
πιπλαθέντες δὲ, χιμέτλας δε-
ραπύουσι.

Περὶ λειχμών ἵππων.

Κεφ. μβ.

Λειχμῶνες ἵππων, εἰσὶ τὶ πύλοι
κατ' ἐπιγραφῇ ἐντετυλωμένοι
παρὰ τοῖς γόνασι καὶ περὶ ταῖς ὀ-
πλαῖς πεδύντες λεῖοι μετ' ὄξους,
ἐπιληψίας ἰσορροῦν) θεραπεύειν.

Περὶ Αἰγῶν ὄνου χῶν.

Κεφ. μς.

Οἱ δὲ τῶν αἰγῶν ὄνυχες καέν-
τες, ἀλωπεκίας κατὰ χεῖρ ὀφθαλμοὺς
συνὸ ὅξει δεραπύουσι.

Περὶ Ἡπατος αἰγός. Κεφ. μς'.

Τὸ δὲ ἥπατος τὸ αἰγός ὀπλῶμα-
νον, ὁ ἀπὸ ῥέων ἰχθὺς ἐλκεῖ ὀφθαλμοὺς,
νυκτὶ λῶψιν ἀρμόζει καὶ τὸ ἀλμύ-
δα δὲ πῖς ἐφορμῶν αὐτῶ δέχεται
ἀνέωρσι τοῖς ὀφθαλμοῖς ὠφελεῖ-
ται. ἀρμόζει δὲ καὶ ἐδιδόμῃ ὀπλὸν
πρὸς τὰ αὐτά. Φασὶ δὲ καὶ ἐπιλη-
πτικοὺς ὑγίαινειν. Φαζόντας μάλ-
ιστα τὸ πρᾶγιον ἥπαρ.

Περὶ Ἡπατος κάπρου.

Κεφ. μδ.

Τὸ δὲ κάπρε ἥπαρ νεαρὸν καὶ ξη-
ρὸν λεῖον σὺν οἶνω πινόμῃ, ἐρπε-
τῶν καὶ κτηνῶν δόγματα ὠφελεῖ.

Περὶ κυνὸς λυσῶντος.

Κεφ. με.

Κυνὸς λυσῶντος ἥπαρ βιβρω-
σκόμῃ ὀπλὸν ὑπὸ τῶν δηχθέν-
των

πῶν ὡς αὐτοῦ, ἀπειπώτοις ὑ-
δροφωβίας τηρεῖν πειτεύει. ἤδυν-
ται δὲ εἰς περφυλακίῳ καὶ τῷ
κυνόδοντι τῷ δακόντος ἐπιδοῦν-
τες εἰς κυσίδα καὶ φειάπροντες
ἢ πῶ βραχίονι.

Περὶ Ἡπατος αἰθύας.

Κεφ. ν'.

Αἰθύας ἢ παρ' σκῆψιν δὲν καὶ πο-
δὲν ὡς ὑδρομέλιος κοχλιαεῖον
δυσὶν πλήθος, ἐκ δ' αἵματι δυνάται.

10. Περὶ κατῆματων.

Κεφ. νά.

Τὰ δὲ ἀπὸ τῶν κατῆματων
παλαιὰ δέρματα, κεκαυμένα καὶ
λεῖα καταπλασθέντα, πνεύμα-
τα καὶ παρὰβίμματα καὶ τὰ ἐξ ὑπο-
15 δερμάτων δερμάματα, θεραπεύει.

Περὶ Αλεκτοείδων. Κεφ. νβ'.

Αλεκτοείδες ἀναρχαδεῖται καὶ
ἐπιτεδεῖται ἐν δερμοῖς, τοῖς ἐρπε-
τῶν δῖγμασι βοηθοῦσι· δεῖ δὲ
συνεχῶς ἀκράσειν.

20

Περὶ Ἐγκεφάλου ἀλεκτο-

είδος. Κεφ. νγ'.

Ὁ δὲ ἐγκεφαλὸς αὐτῶν ἐν πό-
ματι θηροδύκτοις συν' οἴνῳ δι-
δοται, καὶ τὰς ἐκ μύνητος αἰ-
25 σμαρρῆρας ἐπέχει. * τοῦ δὲ ἄρρε-
νος τὸ κατὰ τὰ ἐν πὺρ ὑποκεί-
μενον τῇ κοιλίᾳ κεραιτοειδές· ἀ-
ποδεσθέντα δὲ ἐν ταῖς ἐψή-
σεσι ξηρανθέν, ἀρμόζει σωμαχι-
κοῖς, λεῖον μετ' οἴνῳ πινόμενον.

* ὁ δὲ

fis sumptū, ne tententur metu
aquæ tueri creditur. Utitur au-
tem ad arcendos aquæ pau-
res dente eo, qui caninus dici-
tur: hūc à cane, qui momordit
exemptum, & folliculo inditū,
ἢ amuleto brachio adnectūt.

Iecur mergi. Cap. L.

Inueteratū autem sale mergi
iecur, ex hydromelite binis li-
gulis potum secundas pellit.

Coria veteramentaria,

Cap. LI.

Veteris corij cremati illitus
cinis ambusta igni, intertrigi-
nes, nec non calceamentorum
attritus sanat.

Gallinæ. Cap. LII.

Difficili gallinæ, & adhuc ca-
lentes appositæ, serpentiū mor-
fibus auxiliatur: sed identidem
alias sufficere oportet.

Gallarum cerebrum.

Cap. LIII.

Earū cerebellum in vino bi-
bendū datur contra serpentiū
morfus, sanguinem à cerebri
membra profluentē sistit. Quæ
īteriore vētriculi galli sinu resi-
det mēbrana, secti in laminas
cornus specie similis (ea verò
inter coquēdū abiici solet) sic-
cat, tritaq; in vino cōueniētissi-
mè stomachicis datur in potu.

Ius

Ius è vetere gallinaceo aluum
deicit. Abiectis itaque inte-
raneis falem coniici oportet,
& confuto ventre decoqui in
viginti sextariis aquæ, donec
ad treis heminas redigantur:
totum id refrigeratum sub di-
uo, datur. Aliqui incoquunt
olus marinum, mercurialem,
cnicum, aut filiculam. Cru-
dos humores crassosque, a-
tram bilem, & strigmenta eli-
cit: prodest longis febribus,
fufpiriis, articulariis mor-
bis & inflationi-
bus stoma-
chi.

Oui natura. Cap. LIIII.

Ouum molliculum plus alit
sorbili, & durum plus molli.
Luteum oui, contra oculorum
dolores vtile est: inaffatum fe-
dis inflammationibus prodest:
cum croco, & rofaceo: & con
dylomatis, cum meliloto: cum
vua autem fruticis eius, quem
rhoa dicunt, aut galla in patinis
frigitur, vt cibo aluos fiftat: per
se etiam offerri solet.

Candidum oui.

Cap. LV.

Candidum oui crudum re-
frigerat, spiramenta cutis oc-
cludit, inflammationes oculò-
rum infusum lenit, ambusta, si
sta-

* ὁ δὲ ζωμὸς τῷ νόστικος μάλιστα
δίδωσι ἐπικράσεως χάριν φαυλο-
τήτων καὶ ἐπὶ τῷ σόματι πυρρῆς-
γων λιτῶς σκευαζέται. Ὁ δὲ τῷ πα-
λαιῶν ἀγκυρόνων, δίδωται πρὸς
κράσιν κοιλίας. ἐξελόντας ὅ τὰ
ἐντός, δεῖ ἀντεμεθεῖν ἅλας, καὶ
κατὰ ῥάψαντας ἐψῆν μετὰ ὕδα-
τος ξυσῶν κ'. κατὰ γόντας εἰς κο-
τύλας γ'. δίδωσι ὅ τὰ ἐξαιθρια-
θέν. ἐνιοὶ δὲ συνέψουσιν κράμβην
θαλασσίαν, ἢ λιγδῶσιν, ἢ κνίκον. 10
ἢ πολυπέδιον. ἄγει δὲ πάχος ὠ-
μόν, γλοιῶδες, μέλαν. ἀρμόζει
δὲ πυρετοῖς χρονίοις, ἀσθμασιν,
ἀρθρικοῖς, ἐμπνεύματου μύοις
στομάχοις.

Περὶ ὠοῦ. Κεφ. νδ'. 19

Ὁλον τὸ ἀπαλὸν τροφικώτερον
τοῦ ῥοφητοῦ, καὶ τοῦ ἀπαλοῦ τὸ
σκληρόν. ἡ λέκυθος αὐτοῦ χρησί-
μη, πρὸς ὀφθαλμῶν πτερυγ-
γίας· ὁ πηδεῖται συνὶ κρόκῳ καὶ ῥο-
δίῳ· πρὸς τε τὰς πτεὶ δακτύ- 20
λιον φλεγμονὰς καὶ κονδυλώματα,
συνὶ μελιώτῳ· καὶ ῥόδῳ δὲ ἡ κη-
κίδος τηλαμειόσα, καὶ βρωδεί-
σα ἴσησι κοιλίαν, καὶ κατὰ ἐαυ-
τὴν δὲ πτερογενεχθεῖσα.

Περὶ λευκοῦ τῷ ὠοῦ. 21

Κεφ. νε.

* Τὸ δὲ λευκὸν αὐτῷ ὠμόν ὅν
ψύχει, ἐμπλάττει, παρηγορεῖ ἐγ-
χρηματιζέν ἐπ' ὀφθαλμῶν φλεγ-
μαγόντων, κατακαμάματα τε
κα-

ἐν ἑᾷ φλυκταίνουσαι παραχρῆ-
μα ἐπιχρίδεν· πρὸς ὧσα τε ἀνε-
πύκνωτα τηρεῖ, ἀνακόλλημα δὲ
ᾧ ῥευματιζομένων συν λιβανω-
τῶ κτ' τοῦ μετώπου* πιδέμενον·
5 φλεγμαῖας τε ὀφθαλμῶν πρὸς ὕψος
εἰς ἀναληφθὲν μιγνύσας ὡπλῶ
ῥοδίνου καὶ οἴνου καὶ μέλιτος· ὁ μὲν
δὲ ῥοφηθὲν, αἰμορροΐδος δάγμασι
βοηθεῖ. ἀκροχλιαρὸν δὲ πρὸς κύ-
στεως δαγμοῖς καὶ ὕδατι νεφρῶν,
10 καὶ τραχυμοῖς τραχείας ἀπτη-
εῖας, καὶ αἵματος ἀναγωγὰς καὶ
κατάρρους καὶ θώρακος ρευμα-
τισμοῖς ἀμύζει.

Περὶ Τέπληγων. Κεφ. νς'.

Τέπληγες ὅππῃ ἐπιόμνῃσι, τοῖς
15 περὶ τὴν κύστιν ἀλγήμασι βο-
θοῦσιν.

Περὶ Ακρίδων. Κεφ. νζ'.

Ακρίδες ὑποδυμνόμεναι, δυ-
σσεύειας μάλιστα τὰς ἐπὶ γυναι-
κῶν ὠφελοῦσι.* ἡ δὲ λεγομένη
20 ἀκρίς* ἀσφρακος ἢ ὄνος, ἀπ' ἑρὸς
ᾧ καὶ μεγαλόκωλος, πρὸς πα-
τος· ἔκταν δέ τισι δὲ σφόδρα σκορ-
ποδύνκτοις ὠφελεῖ πνομὴν
σὺν αἶνι. καὶ ὧν δὲ αὐτῇ
κατακόρως αἱ κα-
25 τὰ λέπην λί-
βες.

Περὶ Φίνιδος. Κεφ. νη'.

Φίνις τὸ ὄρεον ὃ ῥωμαῖσι κα-
λοῦσιν* ὁσφραζον, τοῦτου ἡ κοι-
νία καὶ ὁλίγον ποπιζομένη, λίθους
ἐξου-

statim eo perungantur, pustu-
las non sentiunt: faciem à solis
adustione tuetur, fronti im-
positum cum thure fluxiones ar-
cet, auertitq; inflammationes
oculorum lana exceptum, ad-
dito rosaceo, melle & vino, mi-
tigat: vtiliter cōtra hemorrhoi-
dis serpentis morsus crudum
forbetur: summe tepidum pro-
dest vesicæ rosionibus, renum
exulcerationibus, gutturis sca-
britæ, reiectionibus sangui-
nis, destillationibus, & thoracis
rheumatismis.

Cicadæ. Cap. LVI.

Cicadæ, quæ inassatæ man-
duntur, vesicæ doloribus pro-
sunt.

Locustæ. Cap. LVII.

Locustæ odoris suffitu urinæ
difficultates adiuuant, præfer-
tim quæ foeminas malè habet:
earum carnes nullo sunt in vfu.
Est & quoddam genus locustæ,
quæ asiracos aut onos dicit, si-
ne pennis, prelógis cruribus. Exi-
cata autè si ex vino bibatur, cō-
tra scorpionis morsus magno-
pere pderit. Hac abūdè vescū-
tur Aphri, qui Leptin incolunt.

Osfifragus. Cap. LVIII.

VENTER eius avis, quam
Latini osfifragum appellant,
particulatim potus, calculos
cum

DIOSCORIDIS

cum lotio pellere proditur.

Galerita. Cap. LIX.

Galerita auicula est parua, apicem in vertice, pauonis modo, gestans: quæ assa, & in cibo sumpta, coeliacos adiuuat.

Hirundines. Cap. LX.

Difsectis crescente luna pul-
lis hirundinis, qui primo partu
exclusi sunt, in ventre eorum
lapillos offendes: è quibus du-
os, vnum colore varium, al-
terum purum eximes: ij prius-
quam terrâ attigerint in iuue-
cæ corio, aut ceruina pelle bra-
chio aut collo adalligati, co-
mitialibus proderunt, & sæpe
prorsus eos recreabunt. Hiru-
dines, vti ficedule, in cibo, aciei-
visus medicamentum præbent.

Tam pullorum, quàm matrum
in fictili olla crematarum ci-
nis cum melle oblitus, oculis
claritatem adfert, anginæ eo
commodè perunguntur: vix
& tonsillarum inflammatio-
nibus hoc cinere succurritur.
Et ipsæ & pulli exiccati, si dra-
chmæ pondere ex aqua biban-
tur, hos iuuât, qui anginæ mor-
bo conflictantur.

Ebur. Cap. LXI.

Eboris scobe illito parony-
chia fanantur. Vim adstringen-
di ebur obtinet.

Suillus

ἐξουρεῖται ποιεῖν ἰσορεῖται.

Πεὶ Κορυδαλλοῦ. Κεφ. νθ.

Κορυδαλλὸς ὀρνίθιον ὅστι μί-
κρον, ἔχον καὶ τὴν κορυφὴν ὑπερὸν
ὡς τὸ ταῦνος. οὗτος βρωθεὶς ὀ-
πλὸς, κοιλιακοῦς ὠφελεῖ.

Πεὶ Χελιδόνος. Κεφ. ξ.

Χελιδόνος νεοσσὸς τοῦ ἐκ τῆς
πρότης νεοσσοπέρας, αὐξομένης
τῆς πτερυγίας ἀνατεμένων, εὐρή-
σεις ἐν τῇ γαστρὶ λίθους, ἐξ ὧν δύο
λαβὼν, ἓνα πικροῖον καὶ τὸν ἑτε-
ρον καθαρὲν, μετὰ τοῦ ὀπιπλά-
σαι τὴν γῆν ἐνδύσας εἰς δέσμα δα-
μάλεως ἢ ἐλάφου, καὶ περὶ αὐτῆς
βραχίονι ἢ τραχήλῳ, ἐπιληπι-
κοῦς ὠφελήσεις. πολλὰς δὲ καὶ
παιτελῶς ἀποκτασθήσεις. βί-
βρωσκόμην δὲ ὡς τὸ αἰ σκα-
λίδες, ὅξυωπίας εἰς φάρμακον.
καὶ ἡ ἀπὸ αὐτῶν δὲ τέφρα καὶ
ἡ τῶν μητέρων θεισῶν ἐν χύ-
τρᾳ μετὰ μέλιτος χριθεῖσα, ὀ-
ξυδερκίαν ποιεῖ. ἀμύζει δὲ καὶ
συναγχεκοῖς διαχρησμένη, καὶ
μετὰ σαφύλης καὶ παριδμύων
φλεμονας, σκελετενδεῖσαι δὲ αὐ-
ταὶ καὶ οἱ νεοσοὶ, συναγχεκοῦς
ὠφελοῦσι πινόμεναι μετ' ὕδα-
τος πολλῆδος < α.

Πεὶ Ελέφαντος. Κεφ. ξα.

Ελέφαντος ὀδόντος ῥήνισμα,
παρωνυχίας καταπλαθεὲν δε-
ραπύει. Διψάμην δὲ ἔχει συ-
πλικήν.

Πεὶ Ἀσπιδος

Περὶ Ασράγαλι υἱός. Κεφ. ξβ΄.

Ασράγαλος υἱός καὶ εἰς μέχρῃς
αὐτὸν μέλανος γίνονται λευκοί, καὶ
λείος ποιεῖς, ἐμπνευματώσας καὶ
λου καὶ σφόδρως χρονοῖς ἰάται.

5 Περὶ Ελάφου κέρατος.

Κεφ. ξγ΄.

Ελάφου κέρατος καὶ σκευάσθαι καὶ
πεπλυμένον, ἀρμόζει πινόμενον
πληθὺς θυοῖν κοχλιαίων· αἱμο-
πλοῖκοις, δυσεντερικοῖς, κοιλια-
κοῖς, ἰκτερικοῖς, κύστεως ἀγγί-
μασι μετὰ τραγανθίδος, ροϊκάς
δὲ γυναιξὶ καὶ ὑγροῦ τῆς πρὸς τὸ
πάθος ἀρμόζοντος. καίεται δὲ ἐν
καμίνῳ καταβληθεὶν καὶ κοπὴν εἰς
ὁμίῳ χύσαντες πεπτασμένην
15 πηλῶν, ἅχρῃς αὐτὸν λευκὸν γίνονται.
πρωτεύει δὲ ὡς καδμεία· τὸ δὲ
τοιοῦτον ἀρμόζει πρὸς τὰ ἐν ὁ-
φθαλμοῖς ἔχοντα καὶ ῥεύματα· καὶ
ὁδόντας παρατεταμένον σμήχει·
ὁμῶν δὲ θυμασθέν, ἐρπετὰ διώ-
20 κει· ἀποζεδέν δὲ μετ' ὅξους καὶ
διακλυζόμενον, παρηγορεῖ ῥοι-
φιάσεις.

Περὶ Καμπῶν. ξδ΄.

Κάμπαι αἱ ἐπὶ τῶν λαχάνων
γινώσκονται, περιχρῖσθαι αὐτὰς
25 ἕλαιον ἀδύνητοις ἀπὸ τῶν ἰοσό-
λων φυλάττειν λέγονται.

Περὶ Κανθαρίδων.

Κεφ. ξε΄.

Κανθαρίδες εἰς ἀπόθεσιν ἑ-
θετοὶ αἱ ἀπὸ τῆς σίτης, αἱ βλαστάνει
ἐκὼς

Suillus talus. Cap. LXII.

Suis talus comburitur, dum
ἐ nigro albescat: qui tritus &
potus inflationibus coli, lon-
gisque torminibus medetur.

Cervinum cornu.

Cap. LXIII.

Cervi in cornu cinis elotus,
binis ligulis epotus, prodest
dysentericis, excreantibus san-
guinem, coeliacis, regio mor-
bo, & vesicæ doloribus cum
tragacantha: foeminis fluxio-
ne vulvæ laborantibus, cum li-
quore huic rei accommodato.
Cervi cornu contusum, crudo
fictili, luto circulito, & in fur-
num indito, vritur donec albe-
scat: id cadmiæ modo elotum,
vulceribus oculorū, & defluxio-
nibus salutare est: infrictū den-
tes expurgat. Crudi cornu suffi-
ti nidore serpentes fugantur: fer-
uefactum in aceto, si eo gingi-
væ colluantur, maxillarum à
dentitione dolorem adimit.

Eruca. Cap. LXIIII.

Erucis, quæ in oleribus gi-
gnuntur, cum oleo peruncti, à
venenatis bestiis feriri negan-
tur.

Cantharides.

Cap. LXV.

E frumētis cōgeste cātharides
ad recōdédū idoneæ sunt, quæ
fictili

DIOSCORIDIS

fiatili vase nō picato conduntur, & raro linteo obligato ore, & deorsum cōuerso suspen-
dūtur super aceti feruētis, q̄ accerrimi halitū, donec estu exanimētur: postea lino transfixæ reponuntur. Potentissimæ omnes variæ, luteis lineis, quas in pēnis trāsuerfas habēt, promissōq; corpore crassæ ac blattarum modo perpingues: sed inertes ac imbecillæ, quæ vnus sunt coloris.

Buprestes, & pinorum
erucæ. Ca. LXVI.

Simili modo reconduntur buprestes, genera quædā cantharidum, & pinorum erucæ: quæ supra cribrum suspensum feruenti cinere paulisper intostæ, reponuntur. Vis omnium communis erodere, vlcerare, calorem elicere, quæ de causa admiscantur medicamentis quæ lepras, ferāsque lichenas & carcinomata sanant. Menses ciunt pēsis emollientibus additæ, Aliqui cantharidas antidotis impostas, aquæ subter cutem auxiliari prodiderunt: argumento, quod vrinam moueant. Alij pennas pedesque contra potarum veneficia, remedio esse tradiderunt.

Sala-

ἀκόριτον ἀγγεῖον, καὶ τὸ εἶδος πε-
ειδύσας ὁδογῶν ἀραιῶν, καὶ θαλάσσης
καὶ κατὰ σφελον ἀτμῶν ζέοντος ὁ-
ξοῦς δριμυτάπυ, καὶ ἕως αὐτῶν πι-
νῶσι κράτει· εἴτα διατείρας λί-
νω ἀποτίθειτο. ἐκτεργέσθαι δὲ
εἰσὶν αἱ πεκίλαι, καὶ μυκίνας ἐ-
πιχαρσίους ζῶνας ἔχουσαι ἐν τοῖς
πτεροῖς, ἐπιμύκειν τὸ σῶ-
μα, ἀδραῖ, ἐμπύμελοι,
ὡς αἱ σίλφαι· ἀνοι-
δὲ εἰσὶν αἱ μο-
νόχρωμοι.

Πεὶ Βουφρήσου.

Κεφ. ξς'.

Ὡσαύτως δὲ ἀποτίθεται καὶ
αἱ βουφρήσεις, εἶδος οὗται κα-
θαείδων, καὶ αἱ πιτυοκάμποι· 15
καὶ αὗται δὲ ἐπὶ κοσκήνου ἐπι-
ωρεσμένην, θερμοσποδῖα φηγνύ-
μεναι, ἐπὶ βραχὺ ἀποτίθεν-
ται. διώμας δὲ αὐτῶν κοινή,
σιπηλική, ἐλκωπική, θερμαντι-
κὴ· ὅθεν μύζνται φαρμάκοις 20
τοῖς πρὸς καρκινώδη καὶ λέπρας
καὶ λειχήνας ἀγέοις τετραπύ-
οισιν. ἄριστοι δὲ καὶ ἐμμύνα
πτερωτοὶ μαλακτικοὶ μυκίσαι.
ἐνίοι δὲ ἰσόρησαν τὰς καυδα-
εἶδας καὶ ὑδρωπικοῖς βοηθεῖν, 25
μυζνόμεναι ἀντιδότοις ὡς οὐρη-
σιν κινούσας. οἱ δὲ, τὰ πτερά
αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας τοῖς πι-
οῦσιν αὐτὰς ἀντιφάρμακον ἀνέ-
χρασαν.

Πεὶ σα-

Πεὶ Σαλαμάνδρας. Κεφ. ξζ'.

Σαλαμάνδρα εἶδος ἔστι σαύρας· ἔστι δὲ νοχελὲς, ποικίλον, μάτην πεισυνδὲν μὴ καίεσθαι. Δυνάμει δὲ ἔχει σπηλικῶ, ἐλκωτικῶ, θερμαντικῶ. μύζονται δὲ σπηλαῖς καὶ λεωκαῖς ὡς ἢ κρηναῖς, καὶ ἀποτρίβεται ὁ μύζος. ψιλοῖ δὲ καὶ τείχους τακῆσαι μετ' ὕδατος. συλλάσσεται δὲ καὶ ἐν μέλει ἐξεντεριθεῖσα, 10 τῶν ποδῶν καὶ τῆς κεφαλῆς ἀφαιρεθέντων εἰς τὴν αὐτὴν χεῖρσιν.

Πρὶ Ἀράχνης. Κεφ. ξη'.

Αράχνη τὸ ζῷον, ὃ ὀλκὸν ἐνίοις ἢ λύκειον καλοῦσι, συμμομαχθεῖσα σπηλικῶ, καὶ ἐμπλαθεῖσα εἰς 15 * ὀδόντιον, περισεδεῖται μετὰ πῶτον ἢ χροτάφοις, περὶ ταῖς περὶ ὀδοῖς ὑγάζει. τὸ δὲ ὕψος αὐτῆς ἐπιπλήρονον αἷμα ἴσῃσι, καὶ ἀφλέγματα τηρεῖ τὰ ἐπιπλάμα τῶν ἐλκῶν. ἔστι δὲ καὶ ἑτέρον εἶδος 20 ἀράχνης, κατασκευάζον τὸν ὑμῶνα λευκόν, λεπτόν, καὶ πικρόν· ὃ ἰσoreῖται ἐνδεόμῃον εἰς κυτίδα, καὶ περικατόμῃον βραχίονι, τεταρτάκως περιόδοις διασπένειν. σινεψιδὲν δὲ 25 δίνω ὠταλγίας βοηθεῖ ἐν χερόμῃον.

Πεὶ Σαύρας. Κεφ. ξθ'.

Σαύρας ἢ κεφαλὴ λεῖα ἐπιτεδεῖσα, σκόλοπας ἐξάγει καὶ πάντα τὰ ἐμπνευστά. αἶρει

Salamandra. Cap. LXVII.

Salamandra lacertæ genus est, iners, varium: quod frustra creditum est, ignibus non vri. Vim habet erodentem, calfactoriâ, exulcerantem. Additur, vt cantharis, in medicamenta, quorū vis est exesse, & lepras aboleri: similique modo reconditur. liquefacta in oleo pilos euellit. Exenterata, detractis pedibus & capite in melle seruatur ad eundem vsum.

Araneus. Cap. LXVIII.

Araneus quem holcum, alij lycon, id est lupū vocant, subactus cū splenio, & linteo illitus, prolatusque vtrisque temporibus aut fronti, tertianos circuitus persanat. Tela eius imposita sanguinem sistit, vulnera quæ summam cutem occuparunt, ab inflammationis iniuria vindicat. Est & alterum aranei genus, qui candidam, tenuem, defamq; telam orditur, quem in aluta ligatū, & lacerato appensum, quartanis circuitibus mederi narrat. Decoctus ex rosaceo, & infusus, aurium doloribus auxiliatur.

Lacerta. Cap. LXIX.

Lacertæ caput intritum, & appositum, aculeos, & omnia corpori infixæ extrahit:

1 varos,

DIOSCORIDIS

varos, formicâtes verrucas, & pensiles, quas acrochordonas vocât, tollit. Iecur exesis dentibus cōiectū dolores finit. Si diuulsa admoueatur, iētis à scorpione leuamentum præstat.

Seps. Cap. LXX.

Seps, quam aliqui lacertam chalcidicam vocarunt, in vino pota morsus suos sanat.

Scincus. Cap. LXXI.

Scincus aut Ægypti, aut Indix, aut rubri maris alumnus, quamuis inueniatur in Lydia Mauritaniæ. Est autem terrestris crocodilus, sui generis, sale inueteratus cum nasturtio. Aiunt carnes, quæ renes amplectantur, id sibi virium vendicasse, vt si drachmæ pondere bibantur, venerem accendant. Verum decocto lentis cum melle aut semine lactucæ cum aqua poto, veneris cupiditates inhibentur. Additur in antidota.

Terreni vermes.

Cap. LXXII.

Terreni vermes impositi, præcisos neruos glutinant, tertianas discutiant: decocti cū anserino adipe, & infusi, affectis auribus medētur: cum oleo autē decocti, si in contrariā aurē instillentur, dentium doloribus præ-

αἷρει δὲ καὶ μυρμηκίας, καὶ ἀκροχορδόνας, καὶ ἥλους.* τὸ δὲ ἥπαρ αὐτῆς ἐντέθεν τοῖς τῶν ὀδόντων βρώμασιν, ἀπενίαν περὶ. ὅλη δὲ ἀνασφαιεῖται, καὶ ἐπιτεθείσα σκορπιόπληκτοις κουφίζει.

Περὶ Σηπός. Κεφ. δ.

Σηψ, ὡς ἐννοιοι πάντων ἐκάλειζ χαλκιδικὴν, ἐν οἴνῳ ποθείσα, τὸν ὥσ' αὐτῆς διηχθέντας ἰάται.

Πρὶ Σκίγκου. Κεφ. οά.

Σκίγκος ὁ μὲν τίς ὅστιν αἰγύ- 10
ππος, ὁ δὲ ἰνδικός, ἄλλος ἐν τῇ ἐρυθρᾷ θηνηρόμομος. ἕτερος δὲ ἐν τῇ λυδία τῆς μαυροσιτάδος εὐείσκειται. ἔστι δὲ κροκόδειλος χερσαῖος, ἰδιοθῆνης, τειχεύο-
μος ἐν καρδίᾳ μω. φασὶ δὲ δύνα- 15
μιν ἔχειν πιδέν τὸ πᾶν τὸν νεφρὺς αὐτοῦ μέρες, ὅσον < πλῆ-
θος μετ' οἴνου, ὁρμητικῶς πρὸς τὰ ἀφροδίσια. ἀποπαύει δὲ τὴν ἐπίτασιν τῆς προθυμίας, φακὲ ἀφελήματα μὲν μέλιτος πνομήνῃ ἢ 20
δρίδακος σπέρματι μὲν ὕδατος. μίγνυται δὲ καὶ ἀντιδότοις.

Περὶ τῶν τῆς γῆς ἐντέ-

ρων. Κεφ. οβ.

Γῆς ἐντέρας λεῖα ἐπιτεθέντα, νεύρων ἀποκοπὰς κολλᾷ, λύει δὲ 25
καὶ τειταῖοις. ἐπιτεθέντα δὲ συνήλωσιν σέασι, διαδέσας ὧτων ἐχρηματιζόμενα θεραπεύει. συνεπι-
θέντα δὲ ἐλαίῳ καὶ ἐγχεόμενα εἰς τὸ ἀντικείμενον ὡς ὀδονταλγίας βοηθεῖ.

ῥοιθεῖ· ἀγρί δὲ καὶ οὐρα λεία π-
νόμῳ αὐτῷ γλυκεῖ.

Περὶ Μυογάλλης. Κεφ. ογ'.

Μυογάλη ἀναχραθεῖσα καὶ ἐπι-
τεθεῖσα, ἄκος ἐστὶ τοῦ ἰδίου δν-
5 γματος.

Περὶ Μυῶν. Κεφ. οδ'.

Μύας τὸς κατὰ τοὺς ἀνα-
γρῆντας, σκορποπλήκτοις ὀφε-
λίμως ἐπιτίθεσθαι ὁμολογεῖται·
βρωθέντας δὲ ὅποιος ὑπὸ παίδων
10 ἀναξήραίνεν τὸ ἐν ταῖς σέρμασιν
αὐτῶν σίελον.

Περὶ Γάλακτος. Κεφ. οε'.

Γάλα κοινῶς μὲν παῖν, οὐχ ὁ-
μιον, τρέφειμον, μαλακτικὸν κοι-
λίας, φυσσητικὸν σωμαχοῦ καὶ
15 ἐντέρων· ὑδαρέσερον μὲν τοῦ
ἐλαϊνίου τοῦ θεινίου, καὶ τὸ ἀ-
πὸ χλωρῆς νομῆς μᾶλλον ἐστὶ
μαλακτικὸν κοιλίας· ἐστὶ δὲ καὶ
ἀλὸν γάλα, τὸ λευκὸν καὶ ὀμαλὸν
τῇ παχύτητι, καὶ συσφιρόμερον
20 ἐπειδὴν ἐπιταγῇ ὄνυχ· τὸ δὲ
αἰγίον ἢ πρὸν κοιλίας ἀπλεται διὰ
τὸ παρ' αἶγας τὸ πλεον συφύσει
νομῇ χρῆσθαι· δρυὶ καὶ χίνῳ, καὶ
θαλίᾳ, καὶ τερμίνθῳ· ὅθεν καὶ
ἐυσόμαχον τυγχάνει· τὸ δὲ πρῶ-
35 ἐστέον ἐστὶ παχύ τε καὶ γλυ-
κὺ καὶ πᾶν λιπαρὸν, οὐχ οὕτω δὲ
ἐυσόμαχον· τὸ μὲν τοῦ βόειον καὶ
ὄνειον καὶ ἰσπεῖον, ἐυκοιλιώτε-
ρα καὶ ταρκαπικά· παῖν δὲ γάλα
κοιλίας καὶ σωμαχοῦ ἀναβεβηκὸν,
ὅπου

præstant auxilium: triti in potu
ex passio vrinam ciunt.

Mus araneus. Cap. LXXIII.

Mus araneus dissectus, &
impositus, sui morsus venefi-
cia luit.

Mures. Cap. LXXIII.

Mures, qui in domibus ob-
errant, concisos scorpionum
plagis vtilissimè imponi in cō-
fesso est: si inassatos infantes
ederint, oris salivam exiccati
promittunt.

Lac. Cap. LXXV.

Lac generatim omne boni
succi est: corpus alit, alium e-
mollit, stomachum & intesti-
na inflatione vexat: vernum ta-
men dilutius æstivo habetur,
& è viridi pabulo alium ma-
gis emollit. Probatum autè can-
didū, equali crassitudine, quod
vngui instillatum cogitur. Al-
uum minus tentat caprinum:
quoniā pecus hoc adstringen-
tibus pabulis, robore, lentisco,
& oleaginis frondibus, & te-
rebintho magna ex parte ve-
scitur: inde stomacho accom-
modatissimū reddi solet. Quil-
lum aut dulce, crassum, & præ-
pingue, non usque adeò vtile
stomacho. Bubulum tamen, a-
fininum, & equinū, ventri ma-
gis idonea: sed ipsum turbant.

l ij Qui-

DIOSCORIDIS

Quibus in locis pecora, scam-
moniam, veratrū, clematidem,
aut mercurialem pascūtur, lac
omne ventrem, & stomachum
subuertit. quale in Iustinis mō-
tibus esse, à nobis proditū est.
Siquidem capræ, quibus can-
didū veratrū pabulo fuerit, pri-
mo foliorū partu euomunt: &
eorū lac haustū nausēā creat,
& stomachū in vomitiones ef-
fundit. Ventrē adstringit lac o-
mne decoctū, præcipuēq; can-
dentibus calculis marinis exu-
stū: & in summa, omnibus au-
xiliatur internis exulcerationi-
bus, præsertim faucium, pulmo-
nis, interaneorū, vesicæ, & re-
num: foris verò contra pruritū
cutis, eruptiones papularū, &
viriatos corporis succos, recēs
cum melle crudo, addito sale,
datur exigua aqua dilutū. Mi-
nus inflat quodcūq; semel fer-
uefactū. Decoctū cum calculis
marinis ad dimidias, vlcerofas
ventris fluxiones adiuuat.

Serum lactis. Cap. LXXVI.

Lac quodcunq; serum con-
tinet implicitū, quod vbi discef-
sit à lacte, multò potentissimū
ad purgatiōes redditur. Datur
quibus sine acrimonia volum⁹
deiectionem moliri, vt melan-
cholicis, comitialib⁹, lepris, ele-
phantiis

ὅπου ὅτι νομὴν σκαμμωνία, ἢ ἐλ-
λέβορος, ἢ λινώζωσις, ἢ κλημα-
τίς. ὡς καὶ ἐν τοῖς ἰουστίνοις ὁ-
ρεσιν ὑφ' ἡμῶν ἰσόρηται. αἱ γὰρ
αἷγες νεμόμεθα τοῦ λευκοῦ ἐλ-
λεβόρου τὰ φύλλα, κατὰ τὴν
πρὸς τὴν ἐκβλάσησιν αὐτῶν. αὐ-
ταῖς ἐμοῦσι· καὶ τὸ γάλα ἀνα-
τριπτικὸν στομάχου καὶ ναυτίας*
γίνεται. ἐν δὲ πᾶν γάλα
σεχωτικὸν γίνεται κοιλίας καὶ
μάλιστα τὸ διαπύρεσις κόχλα-
ξιν ἐξικμαδὲν, κοινῶς δὲ καὶ
ταῖς ἐντὸς ἐλκώσεσι βρογχί, μύ-
λαις δὲ βρογχίου, πνεύμονος, ἐν-
τέρων, νεφρῶν, κίστεως, καὶ πρὸς
τοὺς τῆς ἐπιφανείας κηκομύς,
ἐξανθήματα, καὶ χακοχυμίας, ἵς
δίδεται νεαρὴν μετὰ μέντος
ὁμοῦ καὶ ὕδατος σιωναναρε-
δέντος ὀλίγου, μυζουμένη καὶ
ἀλῶν. ἀφυσότερον δὲ γίνεται
ἀποζεδὲν ἅπαξ. τὰ δὲ τῆς
κοιλίας μεθ' ἐλκώσεως ρέματα, 20
ἄρχει ἡμίσσεως τοῖς κόχλαξιν ἐ-
ν δὲ ὠφελεῖ.

Περὶ Ὀρροῦ γάλακτος.

Κεφ. ος'.

Ἐχει δὲ πᾶν γάλα παραπε-
πλεγμένον τὸν ὀρρόν, ὅς ἐστι
πρὸς χάδαρσιν ἐντονώτερος
γίνεται. δίδωμεν ἐφ' ὧν δὲ χα-
ρειμύτης ἐκκρίσιν βουλόμε-
θα ποιῆσαι, ὡς ἐπὶ μελαγχολι-
κῶν, ἐπιληπτικῶν, λέπρας, ὅτι φαν-
τά

πάσας, καὶ ἐξανθημάτων τῶν
πρὸ ὅλων τὸ σῶμα.

Περὶ Σχιστοῦ γάλακτος.

Κεφ. οζ'.

Σχίζεται δὲ παῖ γάλα ζεννύ-
5 μνον ἐν καινῇ χύτρᾳ κεραμία καὶ
κινέμνον κλάδῳ συκίνῳ νεοτμή-
τῳ, καὶ μετὰ τὸ ζῆσαι δις ἢ τρίς
ἐπιρραίνεται ὀξύμελιτος κύαδος,
πρὸς ἐκάστην κοτύλιν τοῦ γά-
λακτος· οὕτω γὰρ διορίζεται ὁ
10 ὁρρὸς τοῦ πυρώδους. Δεήσει δὲ
πρὸς τὸ μὴ ἔσθ' ἕλῳ τὸ γάλα,
ἐν τῇ ἐψήσει ἀπογγῶ ἐκ ψυχροῦ
συνεχῶς ἀποψᾶν τὸ χεῖλος τῆς
χύτρας, καὶ ξέσῃ ἀργυροῦ πλή-
ρη ὕδατος ψυχρῆ καθίεναι. ποτί-
15 ζεται δὲ ὁ ὁρρὸς ἐκ διασήματος
καὶ κοτύλιν ἄχρι πέντε κοτυλῶν,
ἐν δὲ τοῖς μεταξὺ διασήμασι πε-
ριπατήσωσιν οἱ πίνοντες. ποιῇ
δὲ τὸ πρὸς φατον γάλα καὶ πρὸς
τοὺς ἀπὸ τῶν θαλασίων φαρ-
20 μάκων θηγμοὺς καὶ πυρώσεις, ὡς
καυθαρίδος ἢ πειτυοκάμπης, ἢ
σαλαμαίνιδας, ἢ βουπρήσεως ἢ
ὑοσιάμου, ἢ δορυκνίης, ἢ ἀκονίτου,
ἢ ἐφημέρου· πρὸς δὲ τὰ τοιαῦτα μάλι-
στα τὸ βόειον συμφέρεῖ ἰδίως ἀρμό-
25 ζον. Διακλύζεται δὲ καὶ πρὸς ἐλ-
κώσεις σομάτων καὶ παριδμίων
εἰς ἀναγρηγείσματα· ἰδίως δὲ τὸ
ὄνηιον διακλυζόμενον, οὐλα καὶ
ὀδόντας κρατύνει τάς δὲ τῆς κοι-
νίας μὴ ἐλκώσεως ρευματισμοὺς

καὶ

phantiis, & erumpentibus toto
corpore papulis.

Schistum lactis.

Ca. LXXVII.

Ex omni lacte fit, quod schi-
stū, id est scissile, appellant. Lac
aut fictili nouo feruet, ramoque
ficulneo recēti mouetur, inspar-
fis, postquā bis aut ter efferbue-
rit, totidē aceti mulsi cyathis,
quot sunt heminæ lactis: ita e-
nim ferescēs liquidū ab eo di-
uiditur, quod in caseū concre-
uit. Sed cū feruet, ne superfun-
datur, cōueniet spongia ex fri-
gida continuò fictilis labrum
detergere, sextariūq; argenteū
frigidæ aquæ plenū demittere.
Bibitur heminis per interualla
singulis, vsque ad quinas, ita vt
intercedentibus spatiis, potan-
tes ambulent. Lac autē recens
efficax est contra rosiones v-
stionēsque, ab exitialibus me-
dicamentis factas, vti à can-
tharidibus, aut salamandra,
bupreste, aut pinorum eruca,
hyoscyamo, dorycnio, aconi-
to, aut ephemero: præsertim
bubulum ad id eximiè cōfert.
Gargarizatur autem exulce-
ratis faucibus, tonsillisque. Asi-
ninū peculiariter collutos den-
tes gingiuasque stabilit. Flu-
xiones alui, si vlcera sentiātur,

liij

te-

DIOSCORIDIS

tenefmosq; ouillum, bubulum
aut caprinū cū marinis lapillis
decoctū, sistit: per se autē & cū
hordeacea ptisana aut halica-
ceo cremore infusum magno-
pere intestinorū rosiones miti-
gat: exulceratꝑ vuluæ immittit.

Lac muliebre.

Cap. LXXVIII.

Humanum lac dulcissimum
est, & maximè alit: mammis
autem exuctum, prodest ta-
bi, & stomachi rosionibus: cō-
tra haustum leporem mari-
num præsidio est: oculis cruo-
re ex ictu suffusis, cum thu-
ris polline instillatur: podagri-
cis vtile est, cum meconio, &
cerato illitum. Lac omne re-
spuendum splenicis, hepaticis,
comitialibus, vertiginosis, &
neruorum vitio laborantibus,
febriculosis, & capite dolenti-
bus: nisi si quis interdum pur-
gationis gratia, vt ostendimus,
schistum præbeat. Primiparæ
canis lacte perunctos narrant
glabrescere: potum contra ve-
nena antidoti vicem obtinet,
abortus mortuos expellit.

Caseus recens:

Cap. LXXIX.

Caseus recens sine sale sum-
ptus alit, stomacho utilis est,
&

καὶ τενεσμοὺς περιβάτειον ἢ βό-
ειον ἢ αἰγείον ἴσησιν ἐμύθεν διὰ
κοχλάκων· ἐγκαλύζεται δὲ καὶ κατ'
ἑαυτὸ καὶ μετὰ πτισάνης ἢ χόνδρου
χυλοῦ, ἰσχυρῶς παρ' ὤνων τῶν
ἐντέρων δύνειν· ἐγκαλύζεται δὲ καὶ
μήτρα εἰληκομένη.

Περὶ Γυναικείου γάλα-

κτε. Κεφ. οή.

Τὸ δὲ τῆς γυναικὸς γάλα γλυ-
κύτερόν ἐστι καὶ τροφιμώτατον·
ὠφελεῖ δὲ θυλαζόμενον, σωμα-
τοχου δύνειν καὶ φθίσιν· ἀμύζει
δὲ καὶ πρὸς λαγῶν θάλασσου
πόσιν· μὴ δὲ λιθαινοτῶ, λείω,
ἐνσάζεται τοῖς ἐκ πληγῆς αἵμα-
χθεῖσιν ὀφθαλμοῖς· καὶ ποδα-
γρικούς ὠφελῇ, συνὲ μνηκωνείῳ ἰς
καὶ κηρωτῇ καταχειρόμενον. ὁδε-
τον δὲ παῖ γάλα σπληνικοῖς, ἡ-
πατικοῖς, σιλοπωματικοῖς, ἐπι-
ληπτικοῖς, τοῖς τὸ νευρῶδες πά-
σχουσιν, πυξέουσιν, κεφαλαιού-
σιν· εἰ μὴ πιτε κατὰ σφαιρῶς ἐνε-
καὶ τις προσφέρει τὸ χυτὸν ὡς ὑ-
ποδέδεικται. ἰσχυροῦσι δὲ πινεσ τὸ
τῆς περὶ τοτόκου κύνης γάλα ψι-
λοῦν τείχας καταχειρὶν, καὶ
θυλασίμων φαρμάκων ἀντιφάρ-
μακον πιθέν καὶ τεθνηκότων ἐμ-
βρύων ἐκβάλλειν.

Περὶ Τυροῦ νεαροῦ.

Κεφ. οθ.

Τυρὸς νεαρὸς διχα αἰσίων ἐ-
πιόμενος τροφίμος, εὐστόμαχος,
ἐναιμά-

ἐνανάδοτος • σαρκῶν ποιητικός,
κοιλίας μετεῖως μαλακτικός •
διαφέρειν αὐτοῦ αὐτὸς παρὰ τὴν
τοῦ γάλακτος φύσιν, ἀφ' οὗ σκευ-
άζεται. ἐμφεῖς δὲ καὶ ἐμβλη-
15 τῆς, εἴτα ὀπληθεῖς, σαλπικός γί-
νεται κοιλίας • ὠφελεῖ δὲ καὶ τα-
πλαστόμυθος ὀφθαλμῶν φλεγμο-
νας καὶ ὑπώπια. ὁ δὲ νεφελῆς, ἐντρο-
φώτερος ἐσθιόμενος • καὶ πρὸς κα-
δαίρεσιν* σαρκὸς ἐπιτήδειος, κα-
10 κοσόμαχος, λυπῶν κοιλίαν καὶ
ἐντερά. ὁ δὲ παλαιότερος, κοι-
λίας σαλπικός. καὶ ὁ ἐξ αὐτῆς ὀρρὸς,
κυνῶν τροφιμώτατος.

Περὶ Ἰωπάκης.

Κεφ. π'.

15 Η δὲ* καλουμένη Ἰωπάκη, τυ-
ρὸς ὅσιν Ἰωππος, βρομώδης, καὶ πο-
λύτροπος, ἀναλογῶν τῷ βοεῖω. ἔ-
μνοι δὲ Ἰωπάκην ἐκδήσαν τὴν
Ἰωπεῖον πίτυρα.

Περὶ Βούτυρου καὶ τῆς ἐξ αὐτοῦ

20 λιγνύος. Κεφ. πά.

Βούτυρον σκευάζεται καλὸν ἐκ
τῆς λιπαρώτατου γάλακτος, τοιοῦ-
τον δὲ ὅτι τὸ παρβατέιον γίνεται
δὲ καὶ ἐκ τῆς αἰγίης ἐν ἀγρίοις κινυ-
μύρου τῆς γάλακτος, καὶ χειρομύρου
25 τῆς λίποις. ἔχει δὲ διωάμεως μα-
λακτικῆς, ἡμιάδους ὅθεν κοιλίας
τὴν ἐκλύει πλεον ποδῶν καὶ πρὸς
τὰ θανάσιμα μὴ παρῆντος ἡμιάς
χρησιμεύει. μυχθὲν ὅ μὲντι καὶ πα-
ρατεφθῆν, ὁδονπάσεις ὠφελεῖ,
καὶ τῶν

& facile in mēbra delegatur:
corpus auget, aluum modicè
emollit: alius tamen alio præ-
stātior, pro natura lactis à quo
conficitur. Decoctus autem, &
expressus, deinde inassat^o, aluū
sistit: illitus, oculorū inflamma-
tionibus, & fugillatis prodest.
Qui verò recens salitus est, mi-
nus alimenti præbet: corpus ap-
tè minuit, stomacho aduersa-
tur, negotiū ventri interaneisq;
exhibet: vetustiore sistitur al-
uus. Sero quod à caseo mana-
uit, quàm optimè canes alūtur.

Caseus equinus. Ca. LXXX.

Quod hippacen vocant, ca-
seus est equinus: ea virus redo-
let, magnopere alit, bubulog;
proportionē respondet. Nec
desunt, qui hippacen, equinum
coagulum appellarint.

Butyrum, & eius fuligo.

Cap. LXXXI.

È lacte pinguisissimo proba-
tum fit butyrum, quale o-
uillum est: fit & ex caprino,
agitato in vasis lacte, donec
pingue separetur. Butyrum
natura oleosum est & emol-
liens: vnde largius epotum,
ventrem resoluit: prodest, v-
bi oleum non adfuerit, con-
tra venena. Cum melle si in-
fricetur, dentitiones adiuuat:

gingiuarū pruritus, & oris vl-
cera infantibus emendat. Illitū
foris capaciora alimentorū fa-
cit corpora, & ab albidis pu-
stulis per summa scatētibus as-
ferit. Cōtra inflammationes &
duritias vuluæ, quod nec virus
resipit, nec vetustatē sentit, bu-
tyrū efficax est: dysentericis, &
coli exulcerationib⁹ infundit:
in medicamēta addi solet, quæ
pus mouet: vtile præsertim cum
nerui, aut cerebri mēbrane, ve-
ficæ ceruix, vulnera acceperit.
Id autē purgat, replet, carnem
creat, ab aspidē percussis vtilif-
simē imponitur. Recens obso-
niis additū olei vicem pēsat, &
adipis vice fūgitur in bellariis.
Colligendæ ex eo fuliginis ra-
tio hæc est: Butyrū in lucernā
nouam ingestū accenditur, fi-
ctiliq; operculato quod super-
nē in siphunculi speciem desi-
nat, & infima parte cuniculos
clibani modo habeat, crema-
tur & subinde aliud in absum-
pti locum sufficitur, dum coa-
ceruetur fuliginis modus, quē
facere institueris: penna post
deraditur ad vsus. Eius effectus
est in medicamētis oculorum,
exiccare & adstringere: flu-
xiones cohibet, & vlcera cele-
riter ad cicatricem perducit.

Medi-

καὶ τὸν τῶν οὐλῶν ὀδαξυσμοὺς ἐ-
πὶ παίδων καὶ ἄφθας. ἔξωθεν δὲ
καταπλαστέον, εὐπρόφον καὶ
ἀψυδρακίωτον τηρεῖ τὸ σῶμα.
ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς φλεγμονὰς
καὶ σκληρίας ὑστέρας τὸ μὴ δυ- 5
σῶδες μὴ δὲ παλαιόν· πρὸς τε
δυσεντερίαν καὶ πρὸς κώλου ἑλ-
κωσιν ἐγκλυζέον· πνοποιοῖς
τε μύχεται χησίοις· καὶ μά-
λιστι ἐπὶ τῶν κατὰ τὰ νεύρα καὶ
μυῖνας καὶ κύστιν καὶ τράχη- 10
λοι τραυμάτων. τὸ δ' αὐτὸ πλη-
ροῖ καὶ καθαίρει καὶ σφυκοῖ, καὶ
τοὺς ὑπὸ ἀσπίδος διχθέντας
ἐπιπλέοντες ὠφελεῖ. μύχεται
δὲ καὶ πρὸς σφύμασιν αὐτὴ ἐ-
λάου τὸ νεαρόν, καὶ ἐν τοῖς πέμ- 15
μασιν αὐτὴ σέατος. Συμάχ-
ται δὲ καὶ λιγρὸς ἐκ τοῦ βου-
τύρου τὴν τριπλὴν πύτον· εἰς λύ-
χρον χαρὸν ἐγχέας τὸ βούτυρον
ἄψον, καὶ πωμάτας ἀγγεῖω κε-
ραμεῖω σκληνοειδεῖ σενῶ κατὰ 20
τὰ ἄνωθεν, τρήματα δὲ ἐκ τῶν
ὑπὸ πόδας ἔχοντι ὥσπερ οἱ κλί-
βανοι, ἕα καίεσθαι· ὅταν δὲ ἀνα-
λωθῇ τὸ πρῶτον βούτυρον, διὰ
ἐπὶ χει, καὶ πείνῃ τὸ αὐτὸ ἕως αὐ-
τόσον πληθῆς βούλει ἀπαλώσεως· 25
εἴτα ἀπόσυρον πλεῶν καὶ χεῖν.
Δυσάμιν δὲ ἔχει εἰς τὰ ὀφθαλ-
μικὰ ξηραίνειν καὶ ἀποσύβην, ἐ-
πίσσοι δὲ τὰ ρεύματα, καὶ τὰ
ἔκ τῃ ἀπουλοῖ ταχέως.

Περὶ Ερίων

Πρὶ Ερίων. Κεφ. πβ'. Medicina lanarū. Ca.LXXXII.

Εἴα οἶσυν πρὸς αἰετα τὰ
ἀπαλὰ, καὶ τὰ ἀπὸ τῆ τρα-
χίλου καὶ τῶν μυρῶν. ἀρμόζοντα
ἐν ἀρχῇ, πρὸς τραύματα, δα-
5 σματα, ἀποσύσματα, περνώμα-
τα, ὁσῶν κατάρματα, βρεχόμε-
να ὅξει καὶ ἐλαίῳ ἢ οἶνῳ. δε-
κτικὰ γὰρ ὅτι τῶν ἐμβρεγμάτων
καὶ μαλακτικὰ διὰ τὴν οἶσυν
πυν· ποιεῖ καὶ πρὸς κεφαλαλγίαν
10 καὶ σιμάχου πόνους καὶ παντὸς
ἄλλου τόπου, συν ὅξει καὶ ῥοδίνῳ
ἐπιπιδέμενον.

Πρὶ Ερίων κεχωμμένων.

Κεφ. πγ'.

Τὰ δὲ κεχωμμένα ἔρια, δύνα-
15 μιν ἔχει ἐχάρακην, καὶ σαρκω-
μάτων σαλίκην, ἀσπικλίκην, ἐλ-
κῶν καὶ ὅτι καὶ παρὰ διαξάνοντες
τα ἐν ὠμῇ χύβρα, ὥσπερ τὰ λοι-
πά. ἡ δ' αὐτὴ βόπον καὶ κροκύδες
καίον ὅτι θαλασσίας πορφύρας. π-
20 νες ὅτι σὺν τῷ ῥύπῳ διαξάνοντες
τὰ ἔρια καὶ μέλιτι δύνανται, καί-
σιν ὡς αὐτῶς. ἀλλοὶ δὲ διαξάνοντες
ὁβελίσκος ἐπὶ πλατυσόμεναι κερα-
μεῦ ἀγγεῖα διεσῶται ἀπ' ἀλλή-
λων, καὶ ἐπιπιδέντες ῥάδικας δα-
25 δίων ἰχθυαί, καὶ ἐπαίῳ δέντες τὰ
ἔρια διεξασμένα καὶ βεβερεμμένα ἐ-
λαίῳ ὥστε ὥς ἡ μὴ ἀποσάξιν, καὶ
πάλιν ῥάδικας καὶ ἔρια ἐνδηλὰ
ἐπιπιδέντες, ἐν τῶν δαδίων κέ-
φως ὑφάπτει, καὶ ἐντα δὲ αἶραι.

καὶ

Succidæ lanæ molles, è collo
feminibúsq; laudatissimæ ha-
bentur. Subueniūt inter initia
vulnerib⁹, percussis, desquam-
matis, liuidis, osib⁹ fractis, ace-
to, oleo aut vino imbutæ: si qui-
dem faciliè succos combibunt
quibus immergūtur, & ob pec-
cudum sordem (sic enim œsy-
pum vocant) emolliūt: capitis,
stomachi aliarūq; partium do-
loribus, cum aceto & rosaceo
efficaciter imponuntur.

Crematarū lanarū cinis.

Cap. LXXXIII.

Crematarum lanarum cinis
crustas obducit, excrescētias in
carne cohibet, & vlcera ad ci-
atricem perducit. Mundæ au-
tem & carptæ, in fictili crudo
ceterorum more vtuntur. Nec
secus fimbriati marinarū pur-
purarum flocculi cremari so-
lent: aliqui cum sordibus lanas
carpunt, & melle irrigant, eo-
demq; modo vrunt. Alij in fi-
ctili oris patuli verucula inter
se distātia componūt, & con-
cerptas carminatasq; lanas o-
leo ita suffusas, vt ne stillare q-
dem possint, affulis tedæ sub-
iectis, & eisdem lanisque per-
mutatim interstratis, leuiter
succendunt, & vltas tollunt:
quod

DIOSCORIDIS

quod si è tēda pix, pinguitudōve vlla profluxit, collecta reconditur. Lauatur ad oculorum medicamenta: cinerem in labellis, aqua addita, manibus confricant, & cōfidere patiunt: idq; sēpius, mutātes aquam donec linguam adstringat, nec mordeat.

OEfypū. Cap. LXXXIII.

OEfypū vocāt Græci, succidarum lanarū pinguedinē. Cuius parandi ratio hæc est. Succidæ molles, radícula nō curatæ, calida aqua lauātur, & quibuscunq; sordibus expressis, & in labellum oris ampli coniectis, aqua infunditur, magnōq; impetu ligula, vti respumet, agitur, aut lignea rude validiusculè conturbatur, quò largius sordida spuma colligi possit, deinde marina respergitur: & confidēte pingui quod supernatabat, collectōque in altero fictili vase, denuo aqua in labellum fusa agitur: spuma iterū mari perfunditur, & demum eximitur. Hoc tantisper fieri solet, dum consumpta pinguitudine nihil prorsus spumæ extet. Collectum œfypum manibus emollitur, & si qua infudit spurcitia, confestim demittit: exclusaq;

ἢ εἴ τι λίπες ἢ πίπτα ἐκ τῆς θαλάσσης ὑπερρέει, συναναμιρουῦται καὶ ἀποτίθενται. πλυνέται δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικά. ἐν κεραμείῳ κρατῆρι ὕδατος ἐπιχειρῶν. καὶ καταρροὺς ἐν τῷ τῶν χειρῶν, καὶ μὲν τὸ ἀποκαταστῆναι ἀποχειρῶν τῶν ὕδατος, καὶ ἄλλως ἐπιχειρῶν καὶ πάλιν ἀναταρασσόμενος καὶ τὸ τοιοῦτον ἄρχεις ἂν περὶ τὸν ὕδατος γλῶττι μὴ δάκνη' ποῦς ὅτι σφῆ.

Ορί Οϊούων. Κεφ. πδ'. 10

Οἶσους δὲ λέγει τὸ ἐκ τῶν οἶσυν πρὸν ἐρίων λίπες. ὁ κατασκευάσας ὕδατος λαβὼν ἕρμα μαλακὰ οἶσυν πρὸ ἐκ πλωτον, ἐστρουθισμένα διεμῶ ὕδατι, ἅμα ἐκθλίβων πᾶσι τῶν ῥυπαρίων, μὲν βαλὼν εἰς κρατῆρα πλατύσεμον καὶ ἐπιχέας ὕδωρ ἀνάχει ἀστυπῆρι τὰ ῥάπων ῥαβδαίως, ἕως ἂν ἀφρίσκη, ἢ ἕλῳ ἀνατάρακτε ἐν τῷ τῶν μέρους ἂν ὁ πλὺς ἀφρὸς καὶ ῥυπαρὸς συληγῇ, εἴτα κατάρραινε θαλάσσης καὶ ὅτι κατατῆ τὸ ἐπινηχόμενον λίπος, ἀναλάμβανε εἰς ἕτερον κεραμικῶν ἀγγεῖον, ἐπιχέας τὸ ὕδωρ εἰς τὴν κρατῆρα, πάλιν τάρασσε καὶ κατάρραινε τῇ θαλάσσῃ τὸ ἀφρὸν, καὶ ἀναλάμβανε καὶ τὸ αὐτὸ ποιεῖ ἄρχεις ἂν μικρὸν ἀφρὸς ἐφίση δαπανηθέντος τοῦ λίπους. τὸν μὲν τοὶ ἀνηρημένον οἶσυν τῇ χειρὶ μαλάξας, παραχρῆμα ἀναγῶ εἴ τινα ἔχει ἀκαθαρσίαν, τραγγίζων

σραγίλων τὸ περὶ τον ὕδωρ καὶ ἀ-
 λο ἐπιχέων, καὶ κινῶν τῇ χειρὶ, ἄ-
 ρχεις ἂν περὶ το γόμφους τῇ γλώτ-
 τη καὶ δάκνῃ ποσὶς ὅ σφηνίπα-
 ρος καὶ καὶ παρὸς καὶ λευκὸς φανῇ.
 5 ἔτω δὲ ἀποτίθεισο εἰς ἀγρεῖον
 κρυσταλλῶν ἐν ἡλίῳ ὅ θερμῶ γινέ-
 στω πάντῃ αἰνῶσι ὅ διηθῶνται τὸ
 λίπος πλυέσθιν ἐν ὕδατι* ψυ-
 χῶ τῇ χροὶν ἀνατείνοντες, ὥς ὅ
 κηρωτῇ αἱ γυναικες γίνεσθαι ὅ τοι
 10 ὅτος λευκότερος. οἱ ὅ πλυῶντες
 τὰ ἔρια καὶ ἐνδελίψασθαι τῇ ῥύπον,
 ἔλυσαι μὲν ὕδατος ἐν λέβητι πυρί-
 κέῳ, καὶ τὸ ἐφιστάμενον λίπος ἀ-
 φαιρῶντες, πλυέσθιν ὕδατι ὡς περὶ
 εἴρη. καὶ διυλίθῃτες εἰς λοπάδιον
 15 κρυσταλλῶν ἔχον ὕδωρ θερμὸν,
 λινῶ τε ῥάκη περὶ μάλιστα π-
 θέασθιν ἐν ἡλίῳ, μέχρις ἂν αὐτὰς
 κως παχὺς καὶ λευκὸς ᾖ. ἐνιοὶ
 δὲ διὰ δύο ἡμερῶν ἀποχέοντες
 τὸ περὶ τον ὕδωρ, ἄλλο ἐπιχέου-
 20 σιν. ἐστὶ δὲ βελτίων ὁ ἀσπιδίτος καὶ
 λεῖος, ὅζων ἐρίων οὐ σπινθῶν, ἀνα-
 τεύοντες τῇ μὲν ὕδατος ψυχρῇ
 ἐν μύακι καὶ λευκανόμενος, καὶ ἔ-
 δὲν ἔχων ἐν ἑαυτῷ σκληρὸν ἢ
 σπινθηρὸς ὡς περὶ ὁ δολερός ὁ μύος
 25 κηρωτῇ ἢ σέσπ. Διῶαμιν ὅ ἔχον
 θερμαστικὴν, πληρωτικὴν ἐλκῶν,
 μαλακτικὴν. μάλιστα τῶν περὶ
 δακτύλιον καὶ ὑσέραν συν μελι-
 λώτῳ καὶ βυτύρῳ καὶ ἔμβρυα καὶ ἔμ-
 βρυα ἐν εἴῳ περὶ το γόμφους αἰσ-
 περὶ

exclusaque sensim omni aqua,
 recentique affusa, manibus mi-
 sceatur, donec admotum lin-
 guæ œsypum adstringat leui-
 ter, nec mordeat, atq; pingue
 candidumque spectetur: tum
 in fictili vase conditur. Verum
 omnia feruido sole fiant. Nō-
 nulli excolatum pingue frigi-
 da aqua eluunt, & manib⁹, nō
 secus atque ceratum mulieres,
 confricant: ita enim candidius
 redditur. Alij elotis lanis & for-
 dibus quibuscūq; exemptis, ac
 lēto igni in æneo vase ex aqua
 decoctis, pīguc quod superna-
 tat collectum, aqua, vt dixim⁹,
 lauant: colatumq; in fictilē pa-
 tellam, quæ calidam aquā con-
 tineat, linteo operiunt, atq; so-
 li mandant, donec candidum
 fiat, & satis crassum. Alij bidui
 spatio aquā effundūt, nouām-
 que adiiciunt. Melius est læue,
 radícula non curatū, quod suc-
 cidarum virus oleat, & si manu
 in conca fricetur cum aqua fri-
 gida, albescat, nihil in se du-
 ri aut concreti habens: veluti
 quod ceraso aut adipe adulter-
 ratur. OEsypum excalfacit, ex-
 plet vlcera, & emollit: præser-
 tim fedis ac vuluæ, cū melyo-
 to & butyro: in vellere appo-
 situm, mēses & partus euocat,
 vlcera

DIOSCORIDIS.

ulcera non auriū modò sanat, sed et genitaliū cū āserino adipe: cōtra erosos angulos oculorū, scabiososq; genas q̄ occa-luerunt, & ciliorū defluuia, efficax est. In testa noua torret, donec redactū in cinerē pinguitudinem amittat. Ex eo etiā fuligo colligitur, vti demonstrauimus: quæ in oculorū medicamenta cōmodè addi solet.

Coagulum. Cap. LXXXV.

Leporis coagulū tribus obolis ex vino, venenatorū moribus, coeliacis, dysētericis, & foeminis fluxione vuluæ laborātib; ac reiectionib; à pectore, auxiliatur. Sanguinē in grumos concretum discutit. Post menstruas purgationes appositum vuluæ cū butyro, præstat mulieribus vt concipiant: potū verò partus enecat, & à puerperio pariendi spem adimit. Equi coagulum, quam hippacen aliqui vocāt, priuatim coeliacis dysentericisque conuenit. Hoedi, agni, hinnuli, capreæ laticornis, & dorci, apri, cerui, vituli, bubalique coagula similes naturas fortiūtur: cōtra aconiti potum vino, & concretum lac in aceto cōuenienter assumentur. Hinnuli priuatim tri- duo à purgationibus admotū, partus

πρὸς τὰ ἐν ὧσιν καὶ ἐν αἰ-
δοῖσι συνὲς χιμείῳ σέας. ποιεῖ δὲ
καὶ εἰς περὶ βρωμύρους κα-
πνοῦς, καὶ φαρμάκους καὶ βλέφα-
ρα τετυλωμένα καὶ τειχορροῦ-
τα. χρίεται δὲ ἐπ' ὀφθαλμοῦ κα-
νοῦ, μέχρις ἂν τεφρωθῇ ἀπο-
βάλλει τὸ λίπος. συνάγεται δὲ
καὶ λιγυρὸς ἐξ αὐτῆς ὡς ὑπεδεί-
ξαμεν ἀρμόζουσα πρὸς τὰ ἐφ-
θαλμικά.

Πρὶ πτύας λαγῶν. Κερπέ. 10

Πιτύα λαγῶν ἀρμόζει συνὲς
οἶνω ὅλην τειχορροῖαν πρὸς θηριο-
δύκτους καὶ κοιλιακούς καὶ δυσεν-
τερικούς, καὶ πρὸς ροιῖδας γυναι-
κας, πρὸς τὴν αἵματος δρόμω-
σιν καὶ ἀναγωγὰς τὰς ἐκ σώματος 15
κορ. πρὸς τὴν ἀρμόζουσαν τε μὲν καὶ παρ-
σιν τῇ μήτρᾳ μὲν βουτύρου σύλ-
λην ποιεῖ ποδῆσαι δὲ φθείρει
ἐμβρυα, μὲν δὲ τὴν ἀφειδρον ἀ-
τίκτος ὄσιν. ἡ δὲ τῆς ἰσχυρῆς
ἐνὶ ὧσιν ἰσχυρὰ καλουμένη, ἰδίως 20
ἀρμόζει ἐπὶ κοιλιακῶν καὶ δυσεν-
τερικῶν. ἐρίφου δὲ καὶ ἀγροῦ καὶ γε-
βῆ καὶ δρυγίδος καὶ πλατυκέ-
ρωτος καὶ δόρυς καὶ ἐλάφου καὶ
μόσχου καὶ βουβάλου, ὁμοίαν ἔ-
χουσι δύναμιν ἀρμόζουσαι πρὸς 25
ἀκονίτου πόσιν συνὲς οἶνω λαμβά-
νόμεναι, καὶ πρὸς γάλακτος δρόμω-
σιν μετ' ὄξους. ἡ δὲ τῆς γε-
βῆ ἰδίως μετὰ τὰς καθάρσεις
πρὸς τὴν ποδῆσαι ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας,
ἐπὶ τὸν

ατόκιόν ὄσιν. ἢ δὲ τῆς φώκης ἑοικε καὶ τὴν δυνάμιν καστορέω· δοκεῖ δὲ ἀρμόζειν μάλιστα ἐπιληπτικοῖς καὶ ὑστερικαῖς πνεύσι πνομῶν. δοκιμάζεται δὲ εἴ ἐστι φώκης, ἥ τρεῖς ἄνθρωποι λαβὼν πτύαν ζώοντος, μάλιστα ἥ ἀρνός, καὶ ἐπιχέας ὕδατος, ἑάσον βραχὺν χρόνον, καὶ μὲν ταῦτα ἐπὶ χεῖρ τοῦ ἀπόλερου καὶ τῆς πτύας τῆς φώκης· ἢ γὰρ ἀληθινὴ ἐξυδατῶται ταχέως· ἢ δὲ μὴ τοιαύτη, διαρρέει ὁμοίαν λαμβάνεται δὲ ἐκ τῆς φώκης πτύα μὴ πω διωαμῶν συννηχῶσαι τῇ σκύμνῳ. κοινῶς δὲ πᾶσαι πτύαι πᾶσαι μὲν τὰ διαλελυμένα· λύει δὲ τὰ συνεστώτα.

15 Πρὶ Στέατος. Κεφ. πς.
Στέαρ πρὸς μὲν τὰ πρὸς μὴ τρεῖς ἀρμόζει τὸ νεαρόν, χρίνειον ἢ ὀρεγνίδειον· καὶ δὴ καὶ ἀλῶν τεταρχειμῶν, πολέμιον δὲ ὑστέρῳ τὸ ἡλισμένον καὶ τὸ τῷ χρόνῳ με-
20 ταβεσθῆναι εἰς δριμύτητα, πρὸς φάτον δὲ λαβόντι τοῦτων καὶ ἐξυμῆρισας, ἔμβαλε εἰς λοπάδα χαλκίαν κατὰ μέαν, δις τοσούτον χωρῶσαν ἢ ὅσαν ὄσιν τὸ μέλλον δεραπνεύειν, εἴτα δεῖς εἰς
25 ὀξύτατον ἡλίον τὸ ἀγγεῖον κεκαλυμμένον ἐπιμελῶς, τὸ ἀποθηκόμῳ ἀπὸ δεῖς εἰς ἕτερον ἀγγεῖον ὀρεγκινον, ἕως ἂν πᾶν διαπαύσῃ, τὸ το δὲ εἰς κατὰ ψυχρὸν ἀποτίθειτο τόπον καὶ χρόνον

πνέει

partus spem intercipit. Vituli marini, castorei vires repræsentat: comitialibus, strangu-latis vuluis, potu conferre existimatur. Sed si sit vituli marini, hoc experimentum est: aqua inspergitur, qua paulisper cum alterius animæ is, tum præcipuè agni coagulum, maderit: nam si erit syncerum, statim liquefcit in aquam: sin minus, consimile permanet. Excipitur autem catulis, qui nondum natate possunt. In summa, coagulum omne dissipata cogit, & coacta dissolvit.

Adeps. Cap. LXXXVI.

Adeps anserin⁹ aut gallinaceus recens, & sine sale conditus, ad vuluæ vitia proficit: sale inueteratus, & qui temporis spatio acrimoniam concepit, vuluæ inimicus est. Recens exemptis membranis in fictilem ollam demissus, quæ altero tātopere capacior sit, quantus sit modus adipis, quem curare institueris, obstructo diligēter vase, flagrantissimo soli exponitur: eliquesccens inde humor in fictile alterum excolatur, donec adeps omnis absumatur, mox loco vehementer frigidoreconditur, & ad vsus digerit.

Alij

DIOSCORIDIS

Alij fictile fulciunt super aquā calidam, aut tenuem & elanguidam prunam, quæ solis vicem penset. Est & alia curandi ratio: Exemplis membranarum teritur, coniectusque in ollā eliquatur, adiecto minuti salis momento: mox lineo colo transfusus reponitur. Utiliter in medicamenta additur, quæ lassitudines & fatigationes leuant.

Suillus adeps & vrsinus.

Cap. LXXXVII.

Suillus adeps & vrsinus hoc curantur modo: Recens, præpinguis, renibus potissimū detractus, in largiore aqua cœlesti & quā frigidissima, exēptis tunicis, diligentissimè manibus confricatur, & exprimēdo fermè ficcatur, subindeq; noua aqua abluitur: cæterū fictili capacitatis duplæ inditus, in aquā demergitur, & subditis leuibus prunis spatha mouetur: eliquatusq; , colo transfunditur in aquam: vbi verò refrixit, & guttatim aquam omnē excludit, in prælotum fictile demittitur, & infusa aqua leniter eliquari debet, & manu deprimi, quo facilius fæculentum virus pessum eat: postea in pilā spongia madefactam trāsfunditur.

Vbi

πῆρες δὲ ἀντὶ ἡλίου ὑπὸ ὕδατος θερμῷ ἐπερείδονται τὴν λοιπάδα, ἢ ἐπὶ λεπτῆς καὶ μαλακῆς ἀνδρακίᾳς. ὅστι δὲ καὶ ἄλλος πόπος θερμῆς τοιοῦτος· μετὰ τὸ ἐξυμυκθῆναι τὸ σῆμα λεαίνεται, καὶ εἰς λοιπάδα ἐμβληθὲν τίκεται, ἁλὸς ὀλίγου καὶ λεπτοῦ περὶ σιμωλαδέντους· εἴτα διὰ βράχους λιγὲς δι' ὕλης δέν ἀπείθεται. ἀρμύζει δὲ τὸ πιεῖτον εἰς τὰ ἄκοπα.

10

Πρὶ Στέατος ὑέιν καὶ ἀργέιν. Κεφ. πζ.

*Υγιον δὲ καὶ ἀρτεριον θερμαίνεται οὕτως· λαβὼν τὸ θερμαίνον καὶ κατὰ πίμελον, οἷόν ἐστι τὸ νεφριαῖον, εἰς ὕδωρ θαψίλεις ὁμβρίον ὡς ἐπὶ ψυχρότατον ἐξυμύσισον, καὶ τίθει· ἥ χερσὶν ἐπιμελῶς ἀνατείλων αὐτὸ καὶ οἶνεϊ ἀναψύχων· εἴτα ἐτέρω ὕδατι πολλὰ καὶ ἀποκλύσας, δὸς εἰς χύτραν κεραμέαν τὸ διπλάσιον χωρεῖ· ἐπιχέας τὲ ὕδωρ ὡς ὑπὲρ χεῖν τῆς στάτης, δὸς ἐπὶ κέφης ἀνδρακίᾳς καὶ κίνης σπόδης, ὅταν δὲ τακτὴ διηθῆσας αὐτὸ δι' ἡδμεῦ εἰς ὕδωρ καὶ ἐόσας ψυχρῶν, πάλην ἐσπλῆγισμένον ἐπιμελῶς, ἀπὸ δὸς εἰς τὴν χύτραν περὶ πλωμύλιν, ἐπιχέας τὲ ὕδωρ τῆξον πρὸς ὥς. καὶ καθελὼν, μικρὸν τε ἐόσας τὴν τρύφα ὑποσπύσας, κατὰ χεῖρα εἰς θυῖαν νενοτισμένην ἀπὸ γνάθου ὅταν

15

20

15

ὅταν δὲ παρῇ, ἀνελόμενος καὶ ἔ
 ἐν τῷ πυθνύῳ πρὸς ἀκαθάρσι-
 αν ἀφελὼν. τῆξον ἐν τείτε χω-
 εῖς ὕδατος, καὶ κατεράσας εἰς
 θυίαν, καθαίρας τὸ ἐμβαλεῖ εἰς
 5 κεραμευῖν ἀργεῖον καὶ πωμάσας
 ἀπόθης, εἰς κατάψυχρον τόπον.

Πρὶ Στέατος βραχεὶ καὶ περ-
 βατείῃ καὶ ἐλαφείῃ. Κεφ. πη.

* Τράχειον δὲ καὶ περβάτειον,
 ἔπι δὲ καὶ ἐλάφειον, περσπευτέον
 10 ἔτω λαβὼν οἶον περσπεύεται σέαρ
 οἶον πηροσπύῳ αὐτῶν καὶ πλύνσας,
 ἐξυμνίσας τὸ ὡς περσπεύεται ἔπι
 σῆς ὑέης, δὸς εἰς θυίαν μαλάττειν,
 καὶ τείτε κατ' ὀλίγον ὕδωρ ἐπιχέ-
 ων, ἄρχεις ἀν μὴ ἔαιμάλα φέκ-
 15 κρινῇ, καὶ λίπος ἐπὶ πάλῃ λαμ-
 πρὸν τε γλῆνῃ. λοιπὸν ἐμβαλὼν
 αὐτὸ εἰς κεραμεῖαν χύβαν, καὶ
 περσπεύεται ὕδωρ ὡς τε ὑδρέ-
 χειν, δὲς ἔπι κέφης ἀνδρακίᾳ καὶ
 κίνῃ. ὅταν ὅτε παρῇ ἅπαν, κατερά-
 20 σας αὐτὸ εἰς ὕδωρ ὅτε ψύξας, πλύν-
 νας τὸ πλὺν χύβαν ἐν δευτέρῳ
 τῆκε, καὶ τὰ αὐτὰ τοῖς περσπευμέ-
 νοις ποιεῖ. τὸ δὲ τείτον χωρεῖς ὕ-
 दाτος τήξας, εἰς νεγοπισμένην θυ-
 ίαν ἀπὸ θύσων, καὶ ψυχρὴ ἀποτί-
 25 θεσσ ὡς ἐλέγετο, ἔπι τῆς ὑέης.

Πρὶ Στέατος βοείῃ. Κεφ. πη.

* Καὶ σῆς βοείῃ δὲ στέατος ἐξυ-
 μνίσαι τὸ νεφελῶν καὶ θα-
 λάτῃ πελαγία πλυτέον. εἴτα
 εἰς ὄλμον ἐμβαλτέον καὶ κοπτεόν
 ἐπιμελῶς,

Vbi coire coepit, residens in
 imo sordes eximitur. Tertio
 citra aquam eliquatur, re-
 purgatusque, fictili be-
 ne operculato, per-
 quam frigidis lo-
 cis reponitur.

Hircinū seuū, ouilū, & cer-
 uinū. Cap. LXXXVIII.

Hircinū seuum, ouilū, cerui-
 numq; ita curato: Elotū ex his
 quodcunq; tunicis, (vt in suilli
 mentione dictū est) exēptis pi-
 lā emolliendū tradito, ac ma-
 nibus fricato, affusa paulatim
 aqua, donec ne amplius quidē
 cruentū virus excernatur, aut
 pingue aliquod innatet, sed ni-
 tida spectetur. Deinde in ollā
 fictilē coniicito, & adiecta a-
 qua vt superemineat, leui pru-
 na liquefacito, & moueto, atq;
 in aquā colato: cūq; refrixerit,
 iterū in loto fictili eliquato, &
 quē antē dixim⁹ facito. Tertio
 sine aqua liquefactū, in perfu-
 sam liquore pilam colato, re-
 frigeratūmq; vt in suilli ratio-
 ne diximus, recondito.

Seuū Bubulū. Ca. LXXXIX.

Bubulum autem seuum, re-
 nibus maximē detractum, ex-
 emptis membranis, aqua ma-
 rina ex alto petita eluendum
 est: mox in pila tundendum
 diligēter,

DIOSCORIDIS

diligenter, affusa maris aqua. Cum verò dissolutum fuerit, in fictilem ollam coniiciendum, & marina aqua, quæ nō minus dodrante supereminet, proluendum, decoquendum donec omnis aboleatur odor, additis ad singulas seui Atticas minas, quaternis Tyrhenicæ ceræ drachmis: excolatūque, detractis quæ perfum ierant fordibus, in nouo fictili reponendum: opertūque soli interdiu credendum, vt ad candorem reducatur, & odoris virus euanescat.

Pingua taurorum, pardorum & leonum.

Cap. XC.

Priuatim taurorū pingue sic curari debet: Renib⁹ euulsum pingue profuente annis aqua abluito, detractisque tunicis, fictili nouo, postquam exiguum salem insperferis, liquefacito: dein in nitentem aquam excolato, & vbi cōcrescere cœpit, manibus iterum confricando vehemēter lauato, aqua sæpi⁹ infusa refusaque, donec quam optimè elotum videatur: rursus in olla cum pari modo vini odorati decoquito, & cū iterum efferbuerit, depto ab igni vase, ibidē finito pernoctare: postridie

ἐπιμελῶς, ἐπιρράνομβός τῆς θαλάττης. ὅταν δὲ διαλυθῇ ἀπαι, ἐμβλητέον αὐτὸ εἰς χύτραν κεραμείαν, καὶ θάλασσαν ἐπιχύτεον ὅσον ὑπερέχειν μὴ ἥτιον σπιδαιμῶς, ἐψητέον τὲ ἄχρῃς ἂν ᾗ ἰδίαν ἰσμήν ἀποβάλλῃ. εἴτα πρὸς μίαν μιν ἁπλὴν ᾗ σέατος, κίρῃ τυρρηνικῇ ὀκταὶ τέτταρας ἐμβλητέον καὶ δινηντέον· ἀφαίρετέον δὲ πρὸς προσκαθήμενόν ἐν τῷ πυθμένι ἀκαθάρσιαν, καὶ εἰς λυπάδα χαλκὴν ἀποστρέψας. εἴτα εἰς ἥλιον κατ' ἡμέραν καμνίσας ἀεισχεπασμένον, ὅπως ἀπολευκανθῇ, καὶ δυσοδίαν ἀποβάλλῃ.

Πρὶ Στέατος ταυρείου, παρδαλείου, καὶ λεονταίου.

15

Κεφ. C.

*Τὸ δὲ ταυρεῖον δευτερευόντος οὕτω. λαβὼν καὶ τῆδε τὸ πρὸς φαπὴν καὶ νεφελῶν ἐκπλωον ποταμῷ ρεύματι. ἐξυμνίσας τὲ δὲ εἰς χύτραν κεραμείαν χαλκὴν, ἄλλος ὀλίγον προσεμπάσας, καὶ τῇ κατ' εἴτα εἰς ὕδωρ διανγὲς ἀπιδήσας, ὅταν ἀρχὴν λαμβάνῃ πήξεως, ᾗ χερσὶ πάλιν ἐκτείβων σφοδρῶς πλύνων, τὸ μὲν ἀποχευόμενον ὕδατος, τὸ δὲ ἐπιχειρόμενον, ἄχρῃς ἂν πλυθῇ χαλῶς· καὶ πάλιν εἰς χύτραν ἐμβάλλων ἐλε μετ' οἴνου ἴσου ἐνώδους, ὡς δ' ἂν ζέσῃ δὲ, ἄρας ἀπὸ τῆς πυρὸς ᾗ χύτραν, ἕα σον νυκτερεύσαι τὸ σέας ἐνθάδε· τῇ δ'

τῇ ᾗ ἐχρυσήν ἐάν τι τ' δυσωδίας
 ὑποκίπῃ, ἀνελομένης τὸ περι-
 ρημύρον εἰς ἑτέραν χύβαν καμὴν,
 περιστερίῃ οἶνον ἐνώδῃ καὶ τὰ
 αὐτὰ τοῖς περιρρημύροις ποίῃ, ὥς
 ἂν ἀπαρτ' ἡ δυσωδίαν ἀποβάλῃ.
 τί καται δὲ καὶ χρεῖς ἁλῶν ἐπ'
 ἐνιαυτοῖς διατρέσσιν ἐν αἷσι ἔτοι ἐ-
 ναντιοῦν γίνε' ἡμῶν τοι τὸ ἔτω
 σκευασθῆν ἐκ ἄγαν λευκόν. ὦσαύ-
 πως δὲ καὶ παρδάλλον σκευασέον
 καὶ λεόντφον, * συαγρεῖον τε καὶ χα-
 μῆλινον καὶ ἵππφον καὶ τὰ ὁμοία.

Πῶς τὸ σέαρ ἀρώματι-
 σέον. Κεφ. ζα.

Αρώματισέον δὲ σέαρ μόχειον
 καὶ ταύρειον, ἐπὶ δὲ ἐλάφειον, καὶ
 μινελόν τῶδε τῷ ζώον τὸν τρόπον
 τῶτον ἐξυμυρίσας τὸ μέλλον ἐν-
 ὠδιάζεσθαι καὶ πάλυας ὡς περιεί-
 πομην καὶ ζέας οἶνον ἀδαλάσ-
 σω τε καὶ ἐνώδει, εἴτα ἀνελομέ-
 νος καὶ ἐνυκτερεῦσαι ἀφείς. ἔτε-
 ρον οἶνον ἐν τῷ αὐτῷ γήραιοις ἐπι-
 χέων, τοσοῦτον τῷ πάλυδι ὅσος
 λῦ ὁ ἔμπεροθεν δοδεῖς, καὶ τήξας
 ἀφυλίσας τε ἐπιμελῶς πρὸς κο-
 τύχας ἐνέει τῷ σέατος ἐμβαλεῖ
 γήρην ἀραβικῆς ὀληθῆς ζ'. ἐάν
 δὲ ἐνώδιστερον ποιῆσαι ἐδέλῃς,
 τῷ ἀνδρὶ ὀληθῆς μ'. περισαπό-
 δος δὲ καὶ φοίνικος καὶ κασσίας
 καὶ χαλάμου πὰς ἴσας ὀληθῆς.
 ἀσπαλάδου τε καὶ ξυλοβαλσά-
 μιν ἀνὰ ὀληθῆς μίαν. μύζον δὲ καὶ
 κιννα-

postridie, si grauitur adhuc o-
 leat, noua olla repetitum, vi-
 no odorato perfundatur: ea-
 dem quæ prius fiant, dum o-
 mne virus euanescat. Colli-
 quatur & sine sale, præsertim
 affectionū eorum causa, qui-
 bus sal aduerfari solet, sed
 ita paratum non magno-
 pere albescit. Eodē mo-
 do pardorū ac leo-
 nū pinguia cura-
 ri oportet.

Quo pingue odoramētis
 imbuendū sit. Ca. XCI.

Taurinum autem & vituli-
 num pingue, necnon ceruinū,
 atq; etiā huius animalis medul-
 la, odoremētis imbuuntur, hac
 ratione: Pingue quod odoratū
 reddi debet, demptis, quæ dixi-
 mus modo, mēbranis, elotū &
 vino quàm odoratissimo, nullā
 maris aqua diluto, feruefactū,
 pernoctare sinis: alterū id gen⁹
 vinū eadē mēfura infundit, col-
 liquatur, & exquisitè collat, nō
 uēq; eius heminis iūci. Arabici
 septem drachmæ adiiciuntur:
 Quod si ipsum odoris fragrā-
 tioris fieri voles, quadragintā
 floris eiusdem drachmæ, cū pa-
 ribus palmæ, calami, & casia
 modis adduntur: & xylobalsa-
 mi, aspalathi singulæ drachmæ
 m cinnā

DIOSCORIDIS

cinnamomi, cardamomi, & nardi, singulæ vnciæ: omnia exactius tunduntur, & affuso vino odorato, in vase operto: quod supra carbones firmiter collocatum sit ter effervescunt, & semoto ab igni vase inibi pernoctant: postridie vinū effunditur, aliudq; generis eiusdem adiicitur. Ter simili modo bene conferuescat. Deinde matutinis exépto adipe vinū effundat: & abluto vase, si quid imo subsidēs hæsit, detergat. Postremo eliquatū pingue & excolatū, ad vñs recõditur. Hoc autē modo odoriamentis imbuit, qđ antea curatū est. Verū antè dicta prius inspissari solét, quò facilius sibi odoramētorū vires adsciscāt. Itaq; assumēs qđcūq; horū voles, cū vino ferúefacito ipositis vnā myrti ramulis, serpillio, cypero, itē aspalatho plenius tuso. Aliqui tamē ad hunc vsū, vno dūtata horū cõtēti sunt. Cū autē ter effervuit, exemptū leniter, & hinteo colatum, aromatis, vti expositū est, imbuitur. Adipibus spissamēta sic fiūt (quēcunq; acceperis, oportet vt recēs tūdat) Syner^o & sanguinis. expers adeps, reliquas habēs notas quas sepe retulim^o, in ollā nouā demittitur, infuso

κινναμώμου & καρδαμώμου & νάρδου ἀνὰ οὐγγίαν μίαν· παύ-
τα δὲ ἔσω ὀλοχερέσει. καμώμ-
ιδία, εἴτα ὀπίχει οἶνον ἐυώδη,
& ὑπέρειδε ἐπ' ἀνδράκων πε-
πωματισμένον τὸ ἀγρίον, & σύ-
ζισον τοὺς ἄρας τὴν ἀπὸ τοῦ πυ-
ρὸς ἔασον ἐννυκτιρεῦσαι αὐτό·
τῇ δὲ ἐχρυσήν ἀπὶ χειρὸν τὸν οἶνον
καὶ ἄλλον ὀπίσθι· τὸ αὐτὸ ἥνους,
σύζευξον ὁμοίως ἕως τοὺς, καὶ ἄ-
φες. περὶ δὲ ἀνελόμενος τὸ σῆμα, 10
ἀπὸ χειρὸν τὸν οἶνον ἐκπαλύνων τὸ
τὸ ἀγρίον & καθάρας τὸ πρὸς
τῷ πυθμῇ καὶ τήξας, διυλί-
σας τὸ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ & χρυσῆν
ρωματίζειται δὲ καὶ τὸ τετερε-
πυθμῶν τὸν αὐτὸν βότον. περ- 15
σύφεται ὃ τὰ περὶ χρυσῆν σῆμα-
τα πρὸς τὸ ῥαδίως διέξωδον τῶν
τῶν ἀρωμάτων διώκων οὕτω
λαβὼν αὐτῶν ὅτι ἂν βέλαιο, ζέ-
σον ἅμα οἶνον, συγκαθεῖς μυρσί-
νης κλάδον, ἐρπυλλόν τε καὶ κύ- 20
πειρον, ἐπὶ δὲ ἀποκλάδον ὀλοχε-
ρέσειρον κοπέντα. τινὲς δὲ ἐνὶ τέ-
των ἀρκοῦνται τῇ χρύσει· ὅταν
ὃ εἰς βίτον ἀναζέση, ἀνελόμενος
πρὸς καὶ δι' ὀδόνης ὑλίσσας, ἀ-
ρωματίζει ὡς διήλωται. ἐπὶ δὲ 25
καὶ οὕτω πρὸς συφεται τὰ σῆματα· κό-
ψας ὃ, πὶ ἂν αὐτῶν ἐδέλης, πρὸς
φατον δὲ καὶ ἀμυγὰς αἵματος,
τὰ τε ἄλλα ἔχον ἅ πολλαίς εἴ-
ρη, ἐμβαλεῖ εἰς λοπάδα χαλκῆν.
ὀπίσθας

ἐπιχέας τὲ οἶνον λευκὸν ἐν ὧδῃ
 παλαιόν, ὥς ἰσθῆναι δακτύλους
 ὀκτώ, σύζεσον ἐλαφρῶ χρώμα-
 τος πυεὶ ἕως πλὴν σύμφυτον ὀ-
 σμῶν ἀποβάλλῃ καὶ μάλλον οἶ-
 νῷ. εἴτα καθελὼν τὸ ἀγνέιον
 καὶ ψύξας, ἀνελοῦ σέατος μῖαν
 β'. καὶ βαλὼν εἰς λοπάδα περ-
 σεπιδούς τε τῆ αὐτῆς οἴνου κοτύ-
 λας δ'. καὶ λωπύρου καρπῶν, οὗ
 τοῖς ξύλοις οἱ αὐλοποιοὶ χρών),
 10 κακομμένου, μῖαν δ'. ἔψῃ πυεὶ
 κοῦφῳ διωκεῖς κινῶν. ὅταν δὲ
 πλὴν σέα τῶδῃ ἀποφορᾶν ἀπο-
 βάλλῃ πᾶσαν, διυλίσας αὐτὸ ψύ-
 χε, καὶ λαβὼν ἀσπαλάθου κακομ-
 μένου μῖαν μίαν, ἀμαρακίνου δὲ
 15 ἄνδοις μῖαν τέτταρας, οἶνω φύ-
 ρεσον παλαιῶν, καὶ ἔασον μίαν νύ-
 κτα πίνειν. τῇ δὲ ἐχρυσῇ εἰς χύ-
 βαν κερμαίαν βιχουαίαν και-
 νῶν κέβες αὐτὰ καὶ τὸ σέαρ, περ-
 σατόδος ὃ καὶ χρὸς ἡμισυ οἶνε, καὶ
 20 σύζεσον ἅπαντα ὁμοῦ*. ὅταν δὲ
 πάντων τ' συμμάτων πλὴν διῶα
 μιν καὶ πλὴν ὀσμῶν ἀποβάλλῃ τὸ
 σέαρ, καθελὼν αὐτὸ καὶ διυλίσας,
 τῆξον καὶ ἀπόδου, ἐὰν δὲ ἐν ὧδῇ
 25 σέαρ ποιῆσαι θέλῃς, μίσγε σπύρε-
 νης τῆς λιπαρωτάτης ὀλκῆς ἢ οἶ-
 νῳ διαιμῶδες πολυετέ. τὸ δὲ ὀρ-
 νίδειον καὶ χίνειον σέαρ ἕως ἂν
 ἐν ὧδῇ λαβὼν οἶς πινος αὐ-
 τῶν τετραπυμῶς κοτύλας δ'.
 καθεὶς εἰς ὀσρακίνῳ χύτρῳ,
 30

infuso vino albo, vetere, odo-
 rato, quod semipedis altitudi-
 nem superet: lento igni ferue-
 scat, dum vernaculus odor ab-
 oleatur, planeq; vinū redoleat.
 At vbi deposito vase. refrixit,
 duæ adipis minæ in ollam mit-
 tuntur, & duo vini eiusdem se-
 xtarij, & feminis loti, ei⁹ inquā
 cuius è ligno ludicræ tibiæ fa-
 ctitant, tusi minæ quatuor ad-
 iiciunt: lento igni subinde mi-
 scendo decoquuntur: cūq; odo-
 ris virus euanuerit, excolatusq;
 adeps refrixerit, vna contusi a-
 spalathi mina, cum amaricini
 floris minis quatuor, & vetere
 vino subigitur. Nocte vna hæc
 odoré rapiunt, combibunt.
 Postridie in fictilem ollam tri-
 congialem ea omnia cum adipe
 iniecta, additis sextariis tri-
 bus vini, vna feruescunt, quo-
 usque & vim & odorem spissa
 mentorum adeps ipse contra-
 xerit: qui eliquescent colatur,
 & reponitur. Quodd si maiore
 odoris fragrantiam efflagites,
 drachmas octo quàm pinguis-
 simæ myrrhæ vino maceratae,
 quod multos in annos asserua-
 tum est, misceto. Gallinace⁹ anse-
 rinusq; sic odoribus imbui so-
 lèt. Cuiusvis eorū pcurati sex-
 tarij duo fictili olla excipiunt:
 in ij erysi-

DIOSCORIDIS

erysiceptri, xylobalsami, pal-
mæ elatæ, & calami planè cō-
tusi, singulorum fescuncia ad-
miscetur: vini Lesbij veteris
cyathus vnus adiicitur: ea ter
effervescunt prunis, mox vase
sublato ab igne, die noctū-
que refrigerantur: postridie li-
quata per linteum crassum,
mundum in vas excolantur.
Vbi verò adeps coierit, con-
cha excipitur, fictilique nouo
densius operto perfrigidis lo-
cis reponitur. Hyberno tem-
pore id instituire oportet: æ-
state siquidem pingua non co-
guntur. Nec desunt qui Tyr-
renicæ ceræ momentum ad-
iiciant, quo facilius in vnum
corpus omnia coalescant. Ea-
dem ratione suillus adeps &
vrsinus cæterique id genus, o-
doramentis imbuuntur.

Quomodo adeps fampsu-
chi odore imbuitur.

Cap. XCII.

Verum fampsuchi odorem
adeps ipse repræsentabit hoc
modo: Curati quā optimè adi-
pis, p̄sertim taurini, mina vna,
tépestiuiq; fampsuchi exquisitè
cōfracti fescquimina miscetur,
& insperfo largiore vino dige-
runt ī offas, q̄ in vase cooperto
nocte q̄escūt: matutinis ī fictili
olla.

περόσμιζον ἐρυσισκήπηρε καὶ ξυλο-
βαλσάμῃ, ἐπὶ δὲ φοίνικος ἐλάτης
καὶ καλάμου ὀλοχερῶς κεκομμέ-
νου ἀνὰ < ιβ'. ὅπδ' ἔς τε οἶνον
λεσβίου παλαιοῦ κύαθον ἄ. τῆς
ἐπ' ἀνδρακιδῆς καὶ σύζουσιν τρεῖς
εἴτα ἀνελόμβρος ἀπὸ τῆς πυρρῆς
τὸ ἀγγεῖον, καὶ ἑάσας ψυχρῶσαι τὸ
ἐν αὐτῷ ἡμέραν μίαν καὶ νύκτα·
τῇ ἐχολοβή τῇζον αὐτὰ, καὶ διὰ
ράχοις λινοῦ καὶ καβαροῦ χύλισσον
εἰς καβαρὲν ἀγγεῖον. ὅταν δὲ πα-
ρῇ ἀνελόμβρος κόγχα τὸ περε-
ρημόρον εἰς καραμεοῦν ἀγγεῖον
βάλε καυτὸν, καὶ πωμάσας σεγα-
ρῶς, ἀπόθου ἐν καλαψύχῳ τό-
πῳ. χειμῶνος δ' ταῦτα δρασεόν·
ἐν γὰρ θέρει οὐ πίνγνται. τινὲς δὲ
πρὸς τὴν σύστασιν αὐτῶν καὶ τὴν
πῆξιν, βραχὺ κινεῖ τυρρῶνικῶς μί-
στοισι. τῷ δὲ αὐτῷ τρόπῳ ἀρω-
ματισέον καὶ τὸ ὕειον, ἀρκείον τε
καὶ τὰ ὁμοία.

Πῶς Σαμψυχίζεται τὸ 20
τέαρ. Κεφ. εβ'.

*Σαμψυχίζει δ' ὁ τέαρ ὅταν λα-
βὼν τὸ καλῶς τετερεσπευμόρον
ὅσον μινᾶν μίαν, ἔσω δὲ μᾶλλον
ταύρειον, καὶ σαμψύχου ὠείμου
τεθλασμένον ἐπιμελῶς μινᾶν. μί-
αν ἡμισυ, μίζον καὶ μαρίδας ἀνά-
πλωσον, ὅπρ' ῥαίνων δαψιλέσπερον
οἶνον, εἴτα ἀποθέρμερος αὐτὰς εἰς
ἀγγεῖον καὶ σκεπάσας, ἑάσας νυκτε-
ρεῦσαι. περὶ δὲ εἰς καραμέαν
χύσαι

χρῖαν ἐμβαλὼν, καὶ ὕδωρ ἐπιχέ-
 ας, ἔψε κέφως. ὅταν δ' ἴδῃαν ὁ-
 σμὴν ἀποβάλῃ τὸ σῆαρ, διυλίσας
 αὐτὸ καὶ ἑαπας μείναι ὅλιγν πλὴν
 νύκτα πεπωμασμένον καλῶς, τῇ
 5 ἐπίσῃ ἀνελόμενος ἢ τροχίσκον,
 καὶ περισπολύξας ἢ ἐν τῷ πυθ-
 μένῃ ῥυπαρίαν, μίξον πάλιν συμ-
 ψύχας κεκομμένον, ὡς εἴρη' ὁμῶν
 μὲν μίαν ἡμῶν, καὶ ὡσαύτως ἀ-
 νάπλωσε μαρίδας. ποιῶν καὶ τὰ
 10 ὁμῶν ἀπερρίπτεται, ἐπὶ πᾶσι δὲ
 ἐψύχας καὶ διυλίσας, ἀφελόντες
 εἴ τις ἐν τῷ πυθμένῃ ῥυπαρία
 ὑπόχρη. ἀπὸθεν ἐν κατὰ ψύχρῳ
 τόπῳ. Πρὶς τέλειος χινεῖς

καὶ ὀρνίθειον. Κεφ. 57.

15 *Εἰ δ' ἀδεράπτειν τὸ σῆαρ ἢ χί-
 νειον ἢ ὀρνίθειον ἢ μόρχειον θέλη
 τις ἀσπλην διατηρεῖν, ἕτω ποι-
 ῆτέον αὐτὸ λαβὼν πρὸς ὄφρατον ὁ
 ποῖον ἂν βέλαιο, ἐκπλωγὸν ἐπιμε-
 λῶς, καὶ διαλύξας ἐπὶ κοσκίνου
 20 ἐν σιῶ μὲν τὸ ξηρανθῆναι, ἐμ-
 βαλεῖς ἐν ὀδόνῳ καθαράν, καὶ ἢ
 χερσὶν ἐκπίεσον* βιαίως, εἴτα λί-
 νῳ διείρας κρέμασον ἐν τόπῳ
 σιῶ μετὰ δὲ ἡμέρας ἑπολλὰς
 κενῶ ἀποθήσας χάρτι, ἀποτίθῃ
 25 σὺν κατὰ ψύχρῳ τόπῳ ἀσπλη
 διαμύρῃ καὶ ἐν μέλι' ἀποτίθῃ ἐν ἡμέρῃ.

Στεάτων δυνάμεις.

Κεφ. 58.

* Δυνάμιν δ' ἔχει τὰ στέατα πάν-
 τα θρυσαντικὴν, μολυβδανικὴν, ἀραι-
 ωτικὴν.

olla leuiusculo igni, affusa a-
 qua, leuiter coquuntur: dūm-
 que suum adeps edorem exu-
 erit, defæcatus ac bene oper-
 tus, nocte tota permanet: po-
 stero die deterfa sorde quæ
 pessum ierat sampsuchi, vt di-
 ctum est, contusi iterum ses-
 quimina priori pastillo. adici-
 tur, eodēque modo in offas
 cogitur: alijs quæ diximus per-
 actis, decoquitur & colatur:
 & si qua fundo hæsit spurci-
 tia, deraditur, & frigidō loco
 reconditur.

Adeps anserinus & gal-
 linaceus. Cap. XCIII.

Si quis tamen incuratum a-
 dipem anserinum, gallinacē, aut
 vitulinum à putredine tue-
 ri velit, ita faciundum est:
 Quemuis adipem diligēter e-
 lotum & ficcatum in vmbra
 super cribrum, per lintea mun-
 da manibus vehementer ex-
 primat, linōque confutū vm-
 broso in loco suspēdat, & post
 multos dies noua charta inuo-
 lutum frigidō loco recondat.
 Pinguia autē indito melle vin-
 dicantur ad putredinis vitio.

Adipum vis.

Cap. XCIII.

VIS OMNIVM est ex-
 calfacere, mollire, rareface-
 re.

DIOSCORIDIS

re. Taurinus adeps, bubulus, & vitulinus aliquantum adstringunt: earūdem virium compos leoninus: nam resistere eū aiūt iis qui insidias moliuntur. Ceruino, elephātinóq; perunctos, serpentes fugiunt. Adstringētiōr est caprinus: qua ex causa decoct^o cum polenta, rhoē, & caseo, dysentericis datur, & cū ptisanæ succo infūditur. Ius decocti phthificis in sorbitionib^o pdest. Datur quoq; vtiliter iis qui cantharidū venena hauserūt hircinus, vt qui validissimē discutiāt: podagricis auxiliā, cū fimo capræ & croco impositus: huic pportione respōdet ouillus. Suillus verò cōtra vuluæ & sedis vitia idone^o est: am bustis igni medetur. E sue vetustissimus quisque sale conditus excalfacit, & emollit: elotus vino pleuriticis prodest. Cinere aut calce exceptus, inflātionibus, fistulis, ac tumoribus succurrit. Asininum tradunt cicatrices corpori concolores reddere. Anserinus galinaceusque conueniunt muliebribus malis, et ad labiorum rimas, ad mangonizandam faciem, & contra aurium dolores. Vrsinum cōstat raptos vitio alopecie capillos restituere pernionibus

ωπικήν. τὸ μὲν τοι ταύρην εὐφραίνει, καὶ τὸ βόρον, καὶ τὸ μόχθιον, καὶ τὸ λέοντρινόν δὲ ἀναλογεῖ τοῖς φασὶ δὲ αὐτὸ καὶ ἀντιφάρμακόν τοῖς ἐπιελευσίον ἐῖναι. τὸ δὲ ἐλεφάντην καὶ ἐλάφιν, ἐρπετὰ δίδωκεν καταχρῆσθαι. τὸ δὲ αἰγρινόν συπτικώτερον ὄσιν δυσεντερικοῖς δίδωται σὺν λήϊτῳ καὶ ῥοῖ καὶ πυρρῷ χαρτεφόρῳ, ἐγκλύζει τὰ τε μὲν πρῶτα καὶ χυλῶ. εὐδετεῖ δὲ καὶ οἰστικοῖς ἐν ῥοφῇ. 10 μαστὶν δ' ἐξ αὐτῶν ζῶμος, καὶ τοῖς χαρταρείας πεπωκόσιν ὠφελίμως δίδεται. τὸ δὲ τεράγιον διαλυτικώτατον ὃν βοῦν τε ποταμικοῖς, οὐραδὲν σὺν αἰγῶς στυράδοις καὶ κρόκῳ καὶ ἐπιπιδέ- 15 μῳ καὶ τὸ περὶ αἰνῶν ἢ ἀναλογεῖ τούτῳ. ὕειον δὲ ἀναλογεῖ τοῖς περὶ ὕστερον, καὶ ἔδραν ὃ καὶ πνευχμῶν ἀρμόζει. τὸ δὲ τειχεῖν ὕειον ὡς ἐπὶ παι- 20 λαιότυπον, θερμαίνει καὶ μάλαται, οἶνω δὲ πλυθὲν ἀρμόζει πλευεπικοῖς, σὺν τίφρῳ ἢ ἀσθέσει ἀναληφθὲν, καὶ πρὸς οἰδήματα καὶ φλεγμονὰς καὶ σύειγας. τὸ δὲ ὄνειον φασὶν ἐλὰς ὁμόχρῳ ποιῆν. χήνιον δὲ καὶ 25 ὀρνίθειον πρὸς τὰ γυναικεία, καὶ ἐπὶ ῥήξεις χειλῶν καὶ * πρὸς ὥπων ἐπιπύλαιαν, καὶ ὠταλγίας ἀρμόζει. τὸ δὲ ἄρκειον δόκει τειχοφύειν εἶναι ἀλωπεκίων, 30

καὶ χυμὸν τῶν ἀρμόζων. τὸ δὲ ἄ-
 ῤῥωπος σῆμα πρὸς ὠταλγίας.
 τὸ δὲ τῶν ποταμίων ἰχθύων ὀξύ-
 δερκες ἐγχεσίμωρον, ἀποτακὲν
 ἐν ὕλῳ, καὶ μέλιτι μίχθῃ. τὸ δὲ
 5 τῆς ἐχίδνης πρὸς ἀμβλυωπίας,
 ἔπι δὲ ὑποχύσει ἐν ῥῆϊ, μίχθῃ
 κεδρία καὶ μέλιτι ἀπὸ κῆρυ, καὶ ἐ-
 λαίῳ παλαιῷ ἴσον· ἐκπιλείσας
 δὲ τὰς ἐν μαχαλῇ τείχας, πρὸς
 τὰς ῥίζας κατὰ χροιδὲν καθ' ἑαυ-
 10 τὸ πρῶτον, ἐξιτίλοις ποιεῖ.

Πρὶ Μυελῶν. Κεφ. σέ.

Μυελῶν δὲ κράτιστος ὅστις ἐλά-
 φος, εἴτα μόχθιος, καὶ μὲν τὸν
 ταύρος, εἴτα αἰγίος καὶ πρῶτος
 15 ἐγγίζοντος τῷ φθινοπώρῳ. ἐν γὰρ
 τοῖς ἀγροῖς καμροῖς, αἰμαλωπὶς
 καὶ οἰονεὶ σαρξὲς εὐδρυπῆτος ἐν τοῖς
 ὕδασι εὐρίσκεται· ἐστὶ δὲ δύσγνωστος
 ἐὰν μή τις, αὐτὴ * ἐξοσεῖσας εἶδη,
 καὶ ἀπόδη· ἀπαντες δὲ εἰσὶ μα-
 20 λακίκοι, ἀραιωτικοί, θεραπευτι-
 κοί, πληρωτικοί ἐλακῶν, ὁ δὲ ἐλά-
 φος πειχιδεὶς καὶ θηρία διώ-
 κει. θεραπεύεται ὁ πρῶτος μα-
 λαχθεὶς ὡς σῆμα παραχρόμωρον
 ὑδατὶ ἐκλεβομύων τ' ὕδατων, εἴτα
 25 δι' ὀδόντος ὑλιδεὶς καὶ ὡσαύτως
 πλωιδεὶς, ἄχρως ἂν τὸ ὕδωρ κα-
 θαρὸν γλῆνι· ἐπεὶ ἐν διπλώμα-
 τιστακίς, ἐπαναφθέρσης πλεονῶν τ'
 ἐπινυχομύων ῥυπαρίας, καὶ διυλι-
 δεὶς εἰς θυϊάμ μετὰ τὸ παλῶαι
 ἀπο-

pernionib⁹ subuenire. Vulpin⁹
 medet auriū dolorib⁹. Fluuiati-
 liū pisciū pinguia punctis ocu-
 lis claritatē afferūt, si in sole li-
 quescāt, & melli admisceātur.
 Viperæ adeps cōtra oculorum
 heberudines suffusionesq; effi-
 cax est. addita cedria, melle At-
 tico, & pari oleo vetere: pilos
 alis euulsos perūctis radicibus
 recēs & per se illitus obliterat,
 atque renasci non patitur.

Medulla. Cap. xcv.

Laudatissima est ceruina,
 mox vitulina, post hanc tauri-
 na, dein caprina, & ouilla. Col-
 liguntur æstatis exitu, cū ap-
 petit autumnus: quippe cum
 aliis anni temporibus concre-
 mentum sanguinis, & veluti
 caro friabilis, in ossibus inue-
 niatur, nec facile cognosci po-
 test, ni quis eam ossibus extra-
 hat & recōdat. Omnes medul-
 læ molliunt, calfaciunt, rarefa-
 ciunt: vlcera explent, ceruina
 perunctos venenata fugiunt.
 Curantur recentes, adipis mo-
 do, aque resperfu subacte, sele-
 ctisq; ossibus tātisper elota, &
 in lintheū expressa, donec aqua
 sincera emanet: & deterfa for-
 de pēna, siqua innatet, liquate
 in duplicato vase in pilā expri-
 munt: & vbi coire omni fæce,
 m iij. quæ

DIOSCORIDIS

quæ ad ima fidit, derafa, ficti-
li nouo reponuntur. Quod si
libet incuratas reponere, fa-
cito omnia quæ de anserum
& gallinarum adipe demon-
strauimus.

Fel. Cap. XCVI.

Fel omne curatur hoc mo-
do: Recens præligato ore fol-
liculi lino tandiu demissum in
feruentē aquam, dum quis spa-
tium trium stadiorum percur-
saret, mox exemptum siccatur
vmbroso loco, asperginem nō
redolente. Sed quod ad ocu-
lorum medicamenta adiici so-
let, ligatum lino in vitreū vas,
quod mel habeat, immittitur:
circumuoluto ad os vasis lini
principio, & operto vase re-
cōditur. Est enim vis omnium
acris & excalfaciens: intensis
tamen & remissis viribus dif-
ferūt: siquidem præstantius in
effectu esse videtur fel mari-
ni scorpionis, & piscis qui cal-
lionymus appellatur, marinæ
testudinis, hyænæq; item perdi-
cis, aquilæ, gallinæ candidæ, &
syluestris capræ: quod priuatim
prodest cōtra suffusiones inci-
piētes, & oculorum caligines,
argemas, & genarū scabritias.
Ouille, suillo, hircino, atq; vr-
fino, taurinū multo efficacius.

Felle

ἀποτίθεται ἐν ὀσρακίνῳ ἀγρίῳ
καὶ νῶ, ἀπεξυσιμένῃς ἐπιμελῶς ὃ
ὑποσάδουσιν. εἰ δ' ἀθεράπτου
ἀποτίθεσθαι βέλει, ποιεῖ πάντα
ὡς ἐπὶ τῷ ὀρνιθείῃ καὶ χηνίῃ σέ-
ατος ὑπεδείξαμεν.

Πρὶ Χολῆς πάσης. Κεφ. 95.

Χολὴ πάντα ἀποτίθεται τοῦ-
τω τῷ τρόπῳ· λαβὼν τὸ πρῶτον
φαπν καὶ ἀποθήσας τὸ σῶμα
αὐτὸ λίαν, κέθισον εἰς ὕδωρ ζέον,
διαλιπὼν, χέοντον τοσοῦτον, ὅσον
αἷτις τειῶν σαδίων δέσμων· ἀ-
νύσει, εἴτα ἐξελὼν, ξήρανε ἐν
τόπῳ σκιρῶ καὶ ἀνοίστῳ. ταῖς
δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ λίαν, ἀπο-
θήσας, βάλε εἰς βυκίον ὑελοῦ
ἔχον μέλι· καὶ πλὴν ἀρχῇ τοῦ
λίγου φειδύσας τῷ σώματι τοῦ
βυκίου πωμάσας ἀπόδου. εἰσὶ δὲ
πάνται αἱ χολαὶ δριμεῖται, θερμαι-
νται τὸ μᾶλλον· καὶ ἥτιον κα-
τὰ διωάμην ἀλλήλων διαφέρου-
σαι· δοκοῦσι δὲ ὀπτεῖσθαι ἢ, 20
τε τῷ θαλασπίου σκορπίου καὶ
ἰχθύος τῷ λεγομένου χαλλιονύμφε,
χελόνῃς τε θαλασσίας καὶ ὑαίνης.
ἐπὶ δὲ πέρδικος καὶ αἰτῆς, καὶ ἀλε-
κτορίδος λευκῆς, καὶ αἰγὸς ἀγρίας·
ἰδίως ἀρμόζουσι πρὸς ἀρχομέ- 25
νας ὑποχύσεις καὶ ἀχλὺς, ἀρ-
μαμά τε καὶ τραχέα βλέφαρα.
τῆς δὲ τῷ περβάτε καὶ τῷ τρα-
γου καὶ τῷ σὺς, ἐπὶ δὲ ἄρκτε ἐμ-
πρακτικωτάτη ὅσῃ ἢ ταυρείᾳ.

πάντα

παῖσαι δὲ περὶ θυμίαν πρὸς δια-
 χύρῃσιν ἐργάζονται, καὶ μάλ-
 λον παιδίων, εἴ τις χρόνιδα βά-
 λλας περὶθεῖν τῷ δακτύλῳ. ἡ
 δὲ ταυρεία ἰδίως ἐπὶ ζωναν-
 γῆ καὶ διακρίεται ζυὸν μέλιτι· ἀ-
 πιθεραπεύει τὸ ἐν δακτύ-
 λῳ μέγχις οὐλῆς. πυρρоруῶντά
 τε ὧτα, καὶ τὰς ἐπ' αὐτῶν ῥίξεις
 συνὶ γάλακτι αἰγείῳ ἢ γυναικείῳ
 ἐνσαζομένη· πρὸς δὲ σπειγμοὺς
 10 συνὶ περὶ σου χυλῷ· εἰς τε τὰς
 βραυματικὰς ἐμπλάστοις μυγμυ-
 ρήν, καὶ θηριακὰς περὶ χέισους.
 καὶ πρὸς φαρμακικὰ, ἔλκη καὶ
 ὀδυνὰς αἰδοίου, καὶ ὀρχοῦ συνὶ
 μέλιτι· πρὸς δὲ κέπρας καὶ πῶ-
 15 τυρα, ζυὸν νίτρω ἢ γῆν κημωλία
 σμῆγμα κράτιστον. καὶ ἡ περὶ βα-
 τεία δὲ πρὸς αὐτὰ καὶ ἡ ἀρκεία,
 ἐνδείξερα δὲ τυγχάνουσιν. ἐκλει-
 χρομένη δὲ ἡ ἀρκεία ἐπιληπτικοῖς
 ὀφελεί· ἡ δὲ πῆς χελώνης πρὸς
 20 συνάγχας καὶ τὰς ἐπὶ τῶν παύ-
 δων νομὰς ἐν σώματι. καὶ ἐπι-
 λεπτικοῖς ἐντεθεῖσα πᾶσι ῥισίν·
 αἰγρὸς δὲ ἀγρίας ἰδίως νυκτάλω-
 πας θεραπεύει ἐν γαστρίᾳ. καὶ
 ἡ τῷ τσάρον δὲ τὸ αὐτὸ τοιῆς θυ-
 25 μιά τε αἶρει, καὶ τὰς ἐπὶ τῶν ἐ-
 λεφαντιῶντων ὑδροχὰς κατὰ
 χρομένην, κατὰ σέλην. ἡ δὲ υἷα
 πρὸς τὰ ἐν ὧσιν ἔλκη καὶ πρὸς
 τὰ λοιπὰ πάντα ὀφελίμως πα-
 ραλαμβάνεται.

Felle omni perfacilem, præser-
 tim infantibus, deiectionem
 quis molietur, si intinctum eo
 tomentum aut fimbriam sedi
 subiiciat. Priuatim taurino an-
 ginæ cum melle perunguntur:
 sedis vlcera fanat, & ad cica-
 tricem vsq; perducit. Idem au-
 ribus fractis, & purulētis cum
 muliebri lacte aut caprino in-
 stillatum, medetur: & sibilo ea-
 rundem ex porri succo. Admi-
 fceri insuevit vulnerariis em-
 plastris & circūlinationib⁹, quæ
 cōtra venenata parantur. Pha-
 gedænicis vlceribus, colis &
 scroti doloribus, ex melle pro-
 dest: lepras, furfures cum nitro
 & terra cimolia quàm optimè
 purgat. Ouillum & vrsinum
 contra eadem pollent, verum
 inefficacius hæc præstant. Vrsi-
 num eclegmate comitiales ad-
 inuat. Fel testudinum anginis,
 & in ore infantium nomis, pro-
 dest: naribus inditum comitia-
 les erigit. Syluestriū caprarum
 felle peculiariter perūcti lufci-
 osi sanatur. Hircinum idē obit
 munus, thymia abolet, & luxu-
 riantes elephantorum extu-
 berationes illitu reprimat. Suil-
 lum autem contra aurium vl-
 cera, reliquaq; omnia, magno
 vsu assumitur.

DIOSCORIDIS

Sanguis. Cap. XCVII.

Sāguis anferis, anatis & hoēdi
vtilissimē in antidota miscēt.
Palūbi aut, turturis & colūbæ,
nec nō perdicis, oculis cruore
suffulis, & recētibus corū vul-
neribus, lusciosisq; illinūtur. Pe-
culiariter colūbæ sanguis, cruo-
rē mēbranis cerebri erūpentē
inhibet. Hirci, capræ, cerui &
leporis sanguinis inassatus sar-
tagine, dysenterias & coeliaco-
rū profluuvia sistit: in vino potus
cōtra toxica efficax est. Lepo-
rin⁹ sanguis ita vt tepet illitus,
vitia cutis in facie, lentiginesq;
emaculat. Caninus cōmodē ab
his bibitur quos efferata in ra-
biē bestia momorderit: contra
epotū toxicū auxilio est. Testu-
dinis terrestris sanguinē epotū
tradūt pdesse comitialib⁹. Ma-
rine autē testudinis cū vino &
leporis coagulo cuminóq; cō-
tra serpentiiū morsus, & hausta
rubetæ venena cōueniēter bi-
bit. Taurin⁹ cū polēta illit⁹, du-
ritias discutit, emollitq;. Sāguis
equarū quæ admissurā experte
sunt, in medicamēta addit quæ
erodūt, septica vocāt. Sāguine
chamæleōis genarū palpebras
euelli creditū est. Hoc enim vi-
ridiū ranarū sanguine præsta-
tur. Mēstru⁹ sanguis foeminarū,
cir-

Περὶ Αἱμάτων. Κεφ. 57.

Αἷμα χυτὸς καὶ εἰς τοὺς καὶ
νόσους, ἀντιδότοις χρῆσθαι μί-
γνεται. φάσις δὲ καὶ πυρρός
καὶ πνευματὶς καὶ περὶ τοῦ, εἰς
περὶ τοῦ αἵματος ὁφθαλμῶν τρώσεις
καὶ ὑποδρόμας αἵματος ἢ νυ-
κτάλωσας ἐγχεῖται. ἰδίως δὲ
τὸ τῆς πνευματὶς, αἱμορραγίας
τὰς ἐκ μιλίγγων ἐπέχει. τὸ δὲ
τοῦ πύρου καὶ αἰγὸς καὶ ἐλά-
φου καὶ λαγωῦ, ὅπῃ ἀπὸ τῆ- 10
ραίου λαμβανόμενον, δυσεντε-
ρίας καὶ κοιλιακὰς ῥύσεις ἐφίση-
σι· μετ' οἶνου δὲ πρὸς το-
ξικὰ πιεῖ. τὸ δὲ τῶν λαγῶν
δερμὸν κατὰ χιόμον, ἐφίλιδας
καὶ φακὰς διεσπύει. ἢ τὸ ἀ- 15
πὸ τῶν κινῶν δὲ πρὸς τὸν, λυσο-
δύνκτις ἢ τοξικὸν πεπωκόσιν ἀρ-
μύζει. τὸ δὲ τῆς χειρταίας χελώ-
νης πρὸς τὸν, ἐμπληθικοῖς ἰσορεῖται
ἀρμύζειν. θαλασσίας δὲ χελώ-
νης σὺν οἶνῳ καὶ πικρὰ λαγωῦ 20
καὶ κυμίνῳ πινόμενον, ἀρμύζει
πρὸς θνητοδύγματα καὶ φρύ-
γου πόσιν. τῷ εἰς δὲ αἷμα δια-
φορεῖ καὶ μαλακάζει σκληρίας κα-
ταπλαστέον μετὰ ἀλφίτων.
τὸ δὲ τῶν ὀχευτῶν ἰσχυρῶν σι- 25
πῶν μίγνεται. τὸ δὲ τῷ χα-
μαιλέοντος, τείχας ψιλοῦν ἐ-
πὶ τῶν βλεφάρων πεπίπτειται
καὶ τὸ τῶν χλωρῶν βατεράων
ὁμοίως. γυναικὸς δὲ τὸ ἐπιμύνην
πεπλάει-

περιλαβειφόρμῳ καὶ ὑπερβαίνον-
 μῳ, ἀσυλλήπτους δοκεῖ ποιεῖν
 γυναικας· ποδαγρικούς δὲ ὀδυνας
 καὶ ἐρυσσιπέλατα καφίζει κατὰ χρι-
 σμῶν.

5 Πρὶ Αποπάτε. Κεφ. 57.

Αποπάτος βοὸς νομάδος πρόσ-
 φατος ἐπιτεθείς, φλεγμονὰς τὰς
 ἐν βραυμάτων περὶ ὤφ· ἐνφλεῖται
 ὃ φύλλοις καὶ θερμαίνει· ὅτι θερ-
 μοσποδία καὶ ἔτις ἐπιτίθεται. καὶ
 10 ἰσχυρὰς δὲ πυεῖα περὶ ὤφ· ἢ
 τοιαύτη ἐπιθεῖται· σὺν ὅξει ὃ κατὰ
 πλαθεῖται, σκληρίας καὶ χοιράδας
 διαλύει καὶ φύγεθλα· ἰδίως ὃ ἄρρε-
 νος βοὸς βόλβιτον ὑσέραν περὶ
 15 πτωκῆν ὑποδυμῶν μῶν, ἀποκα-
 λίσσει· διώκει ὃ καὶ κώωπας θυ-
 μαθέν· αἰγῶν ὃ ἀσύραθοι μάλισα
 ὀρεῖων πινόμεναι σὺν οἴνῳ, ἵκτε-
 ρον ἀποκαθαίρουσι· σὺν ἀρώμα-
 τι δὲ ποδεῖται ἐμμίνα κινῶσι,
 καὶ ἐμβρυα ἐκβάλλουσι· ξηραὶ
 20 δὲ λείαι σὺν λιβανωτῷ περὶ
 δεῖται ἐν εἰῶ, γυναικείον ροῦν
 ἐπέχρυσι, καὶ τὰς ἄλλας αἰμορ-
 ράγας σὺν ὅξει σέλλουσι· καί-
 σαι δὲ ἀλωπεκίας περὶ πύουσι,
 μετ' ὅξους ἢ ὀξυμέλιτος κατὰ
 25 χριόμεναι· σὺν ὀξυγρίῳ δὲ κα-
 ταπλασόμεναι, ποδαγρικούς ὡ-
 φελῶσιν· ἐψηθεῖται δὲ μετ' ὀ-
 ξους ἢ οἶνον, ἐπιτίθεται περὶ ἐρ-
 σιπέτων δῆγματα καὶ ἐρπητας, καὶ
 ἐρυσσιπέλατα, καὶ παρωτίδας·

circumlitu conceptū inhibere
 existimatur, aut si omnino mu-
 lier mēstrua supergrediatur: le-
 uat podagrę dolores & ignem
 sacrum illitus.

Fimum. Cap. XC VIII.

Armentariae bouis fimum si
 recēs admoueatur, vulnerum
 inflammationes mitigat: foliis
 autē inuoluitur, & calfactū ci-
 nere feruēti superponitur. Co-
 xendicis cruciatus fotu com-
 pescit: illitū ex aceto duritias,
 panos, & strumas discutit. Pri-
 uatim suffitu fimi, quod à ma-
 sculo boue redditum est, pro-
 cidentes vuluæ reprimūtur: ac-
 censi nidore culices abigūtur.
 Fimum caprarum, praesertim in
 montibus degentium, potum
 in vino, regium morbum emē-
 dat: mēses cit cum odora-
 mentis haustum, & partus euocat:
 tritum in farinam, & imposi-
 tum lanis cum thure, foemina-
 rum profluvia sistit, ceterosque
 sanguinis impetus ex aceto co-
 hibet: medetur alopeciiis exu-
 stū, & cum aceto aut oxyme-
 lite illitum: cum axungia verò
 impositum, his qui podagra tē-
 tātur, auxilio est. Caprillum in
 aceto decoctū imponitur ser-
 pētiū morsib⁹, vlcerib⁹ quę ser-
 punt, igni sacro, & parotidibus

Vtilem

DIOSCORIDIS

Vtilem ischiadici vſtionē hunc in modum accipiunt: In eo interſtitio vbi pollex brachiali committitur, caua veluti lacuna ſubſidet, in qua lana oleo imbuta ſubſternitur, deinde ſigillatim feruentes ſtercoris caprini pilulæ imponūtur, dū vapor per brachium ad coxā ſentiatur peruenire, & coxendicis dolorē mitigare: aduſtio id genus Arabica appellatur. Ouillum ex aceto illitum ſanat epinyctidas, clauos, péſiles verrucas, thymos & ambuſta igni, roſaceo cerato exceptū. Fimū ſuis ſylueſtris aridum, in aqua aut vino potū, reiectiones ſanguinis ſiſtit: vetuſtū lateris dolorē mulcet, ad rupta & cōuulſa ex aceto bibitur: laxatis cū cerato roſaceo medetur. Tā afinorū quàm equorū fimū ſiue crudū ſiue crematū, addito aceto, ſanguinis eruptiones cohibet. Armétarij, qui herba paſcitur, ſiccū fimū liquatū in vino, mox potum, cōtra ſcorpionū iſtus magnopere auxiliat. Colūbinū vehemētius & excalfacit & vrit, cū hordeacea farina mixtū ſtrumās ex aceto diſcutit: carbunculos emarginat, tritum cum melle, lini ſemine & oleo: ambuſtis igni medetur.

Galli-

καὶ ἐπὶ ἰſchiaδικῶν δὲ ἢ δι' αὐ-
τῶν χαῦσις ὠφελίμως παρελαμ-
βάεται τοῦτον τὸν τρόπον· ἐπὶ
τὸ μεταξύ μέρος τοῦ ἀντὶ χειρὸς,
συνεγρίζον δὲ τῷ καρπῷ κοί-
λον, περὶ ποδὲς ἕριον ἐλαίῳ
βεβεργυμένον, ἐπιτίθει κατὰ μίαν
ἀντὶ χειρὸς πνεύων, ἄχρῃς αὖ ἢ
αἰδήσις διὰ τοῦ βραχίονος ἐπὶ
τὸ ἰσχίον ἔλθῃ καὶ πᾶσι. χαλεῖ-
ται δὲ ἢ τοιαύτῃ χαῦσις ἀραβι-
κή. ἢ περὶ ἀτῶν δὲ ἀφοδὸς συν- 10
ῥξει χαταπλασθεῖσα, ἐπινυκτί-
δας, ἥλους, θυμῶν ἀκροκορδ-
νας ἔαται· πνεύματα δὲ κηρω-
τῇ ῥοδίῃ λευθεῖσα, ὕδρ' ἀ-
γρίου ξηρὰ μὲν ὕδατος ἢ οἶνου
πεθεῖσα, αἵματος ἀναγωγῇ ἰ- 15
σχει καὶ χεῖρ' ἄλγῃμα πλευρᾶς
περιένει, ῥήγματα δὲ καὶ σπᾶσ-
ματα μετ' ὅξους πινομένη· σπᾶσ-
ματα δὲ δευραπνεύει ἀναληθεῖ-
σαι κηρωτῇ ῥοδίῃ. ὄνων δὲ καὶ ἢ
τῶν ἰσθμῶν, αἰμορραγίας ἴσσησι, 20
ὡμῶς τε καὶ κεφαλῇ ὅξει μυθεῖ-
σαι. ἢ ὅτ' ἐξ ἀγέλης ὄντος πομφά-
ρου, ξηρὰ χυλιδεῖσαι ἐν οἶνῳ καὶ
πεθεῖσαι σκορπιόπληκτοις σφό-
δρα βοηθεῖ. περιερεῖς δὲ, δευ-
μαντικωτέρας καὶ χυλικωτέρας 25
χερσὶ μὲν ὡμὴν μὲν μυθεῖται
συν ὅξει δὲ χοιράδας διαφορεῖ·
ἀνδραγᾶς τε περιέρρηται συν μέ-
λιτι καὶ λινοσπέρμῳ καὶ ὕδατι λεαν-
θεῖσαι, πνεύματα τε δευραπνεύει.
καὶ ἢ

καὶ ἡ τῶν ἀλεκτορείδων δὲ ταῦτα
 ποιεῖ, ἐνδέεσθαι μὲν τοῖς πάλιν
 ἰδίως πρὸς μύκητας θανάσιμοις
 καὶ κόλῳ ἀλγύματα ἀρμόζει με-
 ὅξοις ἢ οἴνου πνομύην. πελαργού
 5 δὲ συνὺδατι πεδείσα ὀπληπι-
 κοῖς ἀρμόζειν πτεύεται. γυπὸς
 ὑποδυμαδεῖσα, ἔμβρυα ἐκπι-
 νάσκειν παραδέδοται. μυῶν, λεῖα
 συνὺδεῖ ἀλωπεκίας καταχρῶ-
 μύην δερραπύει· σὺν λιβανώτῳ ὅ
 10 καὶ οἰνομέλιτι πνομύην λίθους ἐκ-
 κρῖνει· πρὸς δὲ μύρια δὲ παιδοῖς
 τὰ μύοχρδα κοιλίαν πρὸς ἐκκρι-
 σιν ἐρεδίζει. κυνὸς δὲ ἢ ἐν τοῖς κυ-
 νογαύμασι ληφθεῖσα, ξηρὰ πνο-
 μύην μεθ' ὕδατος ἢ οἴνου, κοιλίαν
 15 ἐφίστησιν. ἢ δὲ τ' ἀνθρώπων πρὸς
 φάτος καταπλαθεῖσα, ἀφλέγ-
 μαντα μετὰ τῷ παρακολλῶν φυ-
 λάττει τὰ τραύματα· ξηρὰ δὲ
 μετὰ μέλιτος διαχρησμένη ὀπ-
 σιμαγληκῶν, βοηθεῖν παραδέδο-
 20 ται. ἢ δὲ τοῦ χερσαίου κροκοδεί-
 λου, ἀρμόζει ὀπὶ τῶν γυναικῶν,
 πρὸς εὐχρίαν καὶ σίλωσιν* τ'
 πρὸς ὁσίων. χαλκῆ δὲ ὅσῃν ἢ
 λεπιοτάτη καὶ ἐνδρυβής, κού-
 φη τὲ ὥσπερ ἄμυλον, ταχέως τὲ
 25 χυκομύην ὑπὸ ὕδατος διατερεῖ-
 σά τε ὑποξίς· καὶ ζυμίζουσα πλὴν
 ὁσμίν'. δολίζουσι δὲ αὐτῶν, χεί-
 ρας δρύζῃ τρέφοντες, καὶ πλὴν ἀφο-
 δον ὁμοίαν οὔσαν πωλουῦντες. οἱ
 ὅ, ἄμυλον ἢ κιμωλίαν φερόντες,
 καὶ

Gallinaceum verò omnia ea-
 dem, sed inefficacius præstat:
 priuatim tamen contra vene-
 na fungorum, & coli cruciatus
 ex aceto aut vino bibitur. Ci-
 conix fimū, si ex aqua hauria-
 tur, comitialibus prodesse cre-
 dunt. Vulturini fimi nidore par-
 tus excuti produntur. Murinū
 detritū cum aceto, & illitū, a-
 lopeciis medetur: cū thure &
 mulso calculos expellit: subdi-
 tæ infantibus muscerdæ, alui
 deiectionē promouent. Cani-
 num quod flagrantissimo canis
 sydere fuerit exceptum, cū vi-
 no aut aqua potū, fistit aluum.
 Humanum stercus illitum, vul-
 nera ab inflammatione vindi-
 cat, & obiter intumescere non
 patitur: sed ea statim glutinat:
 sicco ex melle anginx perungi
 comodissimè traduntur. Terre-
 stris crocodili fimū, crocodileā
 vocant, quæ mulieribus colorē
 nutrit in facie, nitoréq; seruat.
 Optima est candidissima & fria-
 bilis, amyli modo, minimè pon-
 derosa, in humore statim eli-
 quesces: quæ cū teritur, fermētē
 acorē quadātenus refert. Adul-
 terat eam sturnorū fimo quos
 captos oryza pascunt, ipsūm-
 que nō dissimile vendunt. Alij
 amyllum aut cimoliam miscēt,
 & ad-

DIOSCORIDIS

& adscito anchusæ colore per
rarū cribrum paulatim expri-
mūt, vt se cōtrahat in vermicu-
lorū speciē: qui siccati pro cro-
codilea vaneunt. Inter omnes
conuenire inuenio, humanū
stercus caninūmq; gutturi im-
positum, anginis auxiliari.

Vrina. Cap. XCIX.

Humanam vrinā suā cuiq;
bibere, contra viperæ morsus,
ac venena, incipiētemq; aquā
inter cutē proderit: scorpionis,
viperæ marinorū, draconisque
morsus ea cōuenientissimē fo-
uentur. Canina ad perfunden-
dos canis morsus idonea est:
pruritus & lepras nitro addito
expurgat, sed vetus vlcera capi-
tis manātia, furfures, pforas, &
feruidas eruptiones, multò ma-
gis abstergit: nomas, & præci-
puè genitaliū, cohibet: auribus
infusa manās pus supprimit: de
coctāq; in calyce mali punici,
earū vermiculos abigit. Pueri
impubis resorpta vrina, ortho-
pnoicis auxiliatur: decocta in
æreo vase cū melle emēdat ci-
catrices, argema, caliginēsq; ex
ea & cupro idoneū auri ferru-
men cōficiunt. Quod in vrina
subsedit, illitu ignem sacrū miti-
gat: feruefactū cū cyprino, in-
ditūq; , vuluæ dolores mulcet:

strant-

ἡ χροίζοντες* ἀλχουρή δι' ἀραι-
κοσκίνου, εἰς ὀλίγον ἀπηδύσει· ἡ ξη-
ρανάντες ὡς σκωλήκια πωλοῦσθαι
αὐτὴ ταύτης.*

Πρὶς Οὐρῶν.

Κεφ. ςθ'.

Οὐρὸν αὐτῶν τοῦτο τὸ ἴδιον πο-
τεῖν, πρὸς ἐχίδνης δῆγματα ἀρ-
μόζει, ἡ πρὸς θανάσιμα καὶ ἀρ-
χωδύτης ὑδρωπάς, ἡ πρὸς δὴξιν
τῶν θαλασσίων ἐχιδνῶν, ἡ σκορ- 10
πίου θαλασσίου καὶ δράκοντος
ἐπαγγελούμενος. τὸ δὲ κυνῶν ἐπαί-
τλημα, κυνοδύνεσι· καὶ πρὸς
λίπρας καὶ κηλίδας σημήματα
συνίπτει, τὸ παλαιὸν σημηπι-
κάτεστι ἀχάρων, πιτίρων, ψω- 15
ρῶν, ἐκζέσματων· νομάς τε ἐ-
πέχει, ἡ τὰς ἐν αἰδοῖσι ἐγκλυ-
ζόμενον· ἡ ὅσα πυρεφόρῳτα σε-
χρῶν ἐκβάλλει· δὲ ἡ τοὺς ἐν αὐ-
τοῖς σκωλήκας ἐφόμενον ἐν σι-
δίσις ῥέας. τὸ δὲ τοῦ ἀφθόρου 20
παιδὸς κατάρροφούμενον, ὁρδο-
ποσίαις ἀρμόζει· ἐψηθὲν δὲ
ἐν χαλκῷ συνμίλει, οὐλὰς ἡ
ἀφῆμα καὶ ἀχλὺς ἀποσμήχει·
κατασκευάζεται δὲ δι' αὐτοῦ ἡ
τοῦ κυνῶν χαλκοῦ ἀρμόζουσα 25
ἐπὶ τοῦ χυσίου κόλλα. ἡ δὲ ὑ-
ποσάθμῃ τῷ ὕδατος κατὰ χεῖρας
ἐρυσιπέλατα παύει· ἀναζέσσει
δὲ συνὶ κυνῶν καὶ πρὸς σεί-
σαι, ὁ δὲ ὕδατος ὑστέρας παρηγορεῖ·
ὑστερα-

ὑστερικῶς πινομένης κουφίζει, βλεφαρά τε ἀποσμήχει καὶ οὐ-
 λὰς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς ἀποκαθαί-
 ρει. τὸ δὲ ταύρεον σὺν σμύρνῃ λεαν-
 θέν κὺ ἐσταγνῷ, ὠταλγίας παρήγο-
 ρεῖ. κὺ τὸ συάγειον δὲ τῆς αὐτῆς ἑ-
 5 χεῖ) συνάμεως ἰδιαίτερον δὲ τὸν
 ἐν κύσει λίθοις δρῦπται κὺ ἐκκρί-
 νει πινόμυρον. αἰγρὸς δὲ ὑδρωπαῖ τ'
 ὑπὸ σάκκῃ πινόμυρον μὲν γάρδου
 σάκκος καθ' ἑκάστην ἡμέραν συν
 10 ὑδαπὶ κυάδων πλῆθος β'. ἄγειν
 οὐρά κτ' κοιλίαν, ἰᾶσθαι δὲ κὺ ὠταλ-
 γίας ἐσταζόμενον. ὄνε δὲ παρὰ δέ-
 δοται νεφριτικοῖς ὑγιάζειν.

Πεεὶ Λυγγούεια. Κεφ. ρ'.

* Τὸ δὲ τῆς λυγρὸς, ὃ δὴ
 15 λυγγούειον καλεῖται, ἀμα τῷ
 ἐξουρηθῆναι λιδοῦνθαι πεπίστυ-
 ται. διὸ καὶ ματαίαν ἔχει τινὲ
 ἰσορείαν. ἔστι γὰρ τὸ χαλούμενον
 ὑπὸ εἰσῶν ἡλεκτρὸν πετριζομέ-
 20 νον. ὅπου ποδὲν συν ὑδαπὶ, σ-
 μάχω καὶ ρευματιζομένη κοι-
 νή ἀρμόζει.

Πεεὶ μέλιτος.

Κεφ. ρά.

Μέλι παρθεύει τὸ ἄττικόν,
 καὶ τούτου τὸ ὑμήπιον καλούμε-
 25 νον, εἴτα τὸ ἀπὸ τῶν κυκλάδων
 γήσων, κὺ τὸ ἀπὸ τῆ σικελίας σίμ-
 βλιον καλούμενον. ἔστι δὲ δοκι-
 μώτερον τὸ γλυκύτερον καὶ δρι-
 μύ, ἐνωδέστερον, ὑπόξανδρον, οὐχ
 ὑγρὸν, ὀλκιμον δὲ καὶ εὐτόνον,
 κὺ ἐν

strangulatus leuat, genas deter-
 get, oculorum cicatrices expur-
 gat. Taurina, si cum myrrha
 instilletur, aurium dolores le-
 nit. Aprina viribus eisdem præ-
 dita est: priuatim comminuit
 vesicæ calculos, & potu ex-
 pellit. Caprina ad aquam quæ
 cutem subijt, cum nardi spi-
 ca quotidie binis cyathis cum
 aqua bibitur, vrinamque per
 aluum extrahit, aurium dolo-
 ribus instillata medetur. Asi-
 nina traditur renum vitiis me-
 deri.

Vrina lyncis. Cap. C.

Lyncis vrinā, q̄ lyncuriū ap-
 pellāt, simulac excernit, glaciā-
 ri coirève in calculi duritiā, vul-
 go creditū est: quare quod de
 ea p̄ditū est, vanū esse cōvinci-
 tur. Est enim quod à nonnullis
 vocat succinū pterygophorό,
 ideo dictū q̄ pennas ad se alli-
 ciat. Id potū ex aqua, stomacho
 aluόq; fluxiόε laborāti cōueit.

Mel. Cap. CI.

Principem locū obtinet mel,
 quod Atticę regionis est, præci-
 puè ex Hymetto, mox Cycladi-
 b⁹ insulis, & è Sicilia, cognomi-
 ne hybleū. Magis probatur dul-
 cius & acre, odoratiū, subfla-
 uum, nec humectum, graue, &
 minimè fluxū, qđ ob se quacē
 len-

DIOSCORIDIS

lentitiam non facilè abrumpi-
tur, tractúmque; refilit in digitos.
Mel abstergédi vim habet: ora
venarum aperit, humores euo-
cat, qua ratione in sordida vl-
cera sinusque, commodissimè
infunditur. Decoctum atque; im-
positum, abscedentem carnem glu-
tinat, medetur impetigini co-
ctum cum liquido alumine &
illitum, item auriū sonitui & do-
lori, cum fossili sale trito, tepi-
dum instillatur: lendes & foeda
capitis animalia illitum necat,
nudam gládem recutitis ope-
rit, præsertim quæ circuncisio-
ne aperta nõ est, simile præpu-
tium à balineo triginta diebus
emolliatur: oculorū caliginem
discutit, faucibus, tonsillis, ang-
inæ collutum gargarizatúmve
medetur: vrinā ciet, auxiliatur
tussi, & à serpēte percussis, cõ-
tra haustum meconium, cum rosa-
ceo calidum assumitur: aduer-
sus venena fungorū, & rabiosi
canis morsus linctum aut potum
proficit: crudum tamen alium in-
flat, tussim lacepsit, & ea de re
despumati vsus aptior est. Pri-
matum tenet in mellis genere
vernū, deinde æstiuū, hybernū
verò, vtpote quod crassius cõ-
stet, deterrimum reputatur ce-
raginis halitum expirat.

Mel

καὶ ἐν τῷ ἐλκυθίσῳ ἀνατρέχον
ὡς ἐπὶ τὸν δάκτυλον. Δυνάμει
δὲ ἔχει σμηκτικὴν, ἀνασωπι-
κὴν, ὑγρὴν περικλητικὴν, ὅθεν ἀρ-
μόζει ἐλκεσι ῥυπαροῖς καὶ κόλποις
ἐγκλυζόμενον. ἔμφεν δὲ καὶ ὀπι-
τινὴν, παρακολλᾷ τὰ ἀφεσώτα
σώματα, λειχμῶας τε θεραπεύει
ἐφόρμον μὲν σπληνέας ὑγρὰς καὶ
καταχρῖόμενον ἥχους τὲ τὸς ἐν
ὧσὶ καὶ ἀλγύματι συνᾷ ἀλὸν ὀρυ-
κτοῖς λείους ἐπαζόμενον χλια- 10
ρὴν καὶ φετῆρας καὶ κόνιδας φθει-
ρει καταχρῖόμενον, λειποδέρμοις
τὲ τὸς μὴ ἐκ φαιτομῆς, ἀποκα-
θίστησι μαλακωμένους τῆς πό-
δης τῷ μίλιτι, μάλιστα ἀπὸ βα-
λανίου ἐφ' ἡμέρας λ'. ἀποκα- 15
θαίρει δὲ καὶ τὰ ὀπισθοτοῦντα
ταῖς κόραις, καὶ τὰ πρὸ βρογχὸν
καὶ πρὸ ὀφθαλμοῦ καὶ συνάγχας δια-
χρῖόμενον καὶ ἀνακαθαρίζόμενον
θεραπεύει· κινεῖ δὲ καὶ οὖρα, καὶ
βηξίν ἀρμόζει, καὶ τοῖς ὑπὸ ἐρ- 20
πετῶν διηχθεῖσι· καὶ πρὸς μήλω-
νος πόσιν μετὰ ῥοδίνου θερμὸν
λαμβάνόμενον· καὶ πρὸς μύκη-
τας καὶ λυσοδὴκίους ἐκλειχόμενον
ἢ πινόμενον· ἐστὶ μὲν τοι τὸ ὥμον·
φυασώδες κοιλίας, καὶ βηχὸς ἐ- 25
ρεθιστικόν, ὅθεν ἐξηφεισμένῳ δεῖ
χρησθαι· θεραπεύει δὲ τὸ ἔαι-
νόν, εἴτα τὸ θερμόν· τὸ δὲ χαιμε-
ρινὸν παχύτερον ὃν χεῖρον, καὶ ἐξ-
ανδίστοις ποιοῦν.

Περὶ Μελί=

Περὶ Μέλιντος ἐν σαρδωνία.

Κεφ. ρβ'.

* Τὸ δὲ ἐν σαρδωνία ἡμυνώμενον
μέλι, πικρὸν διὰ τὴν τοῦ ἀμν-
δίου νομὴν· ἀρμόζει δὲ πρὸς ἐ-
ξ φήλιδας καὶ ἀπλόους τὰς ἐν πρὸ-
σώπῳ κατὰ χεῖρὶ δέν.

Περὶ Μέλιντος ποντικῷ.

Κεφ. ργ'.

† Γεννᾶται δὲ καὶ ἐν ἡρακλείᾳ
τῇ ποντικῇ κατὰ πῖνας καμερὺς
10 διὰ πηγῶν ἀνδρῶν ἰδιότητα μέλι·
ὃ τὰς φαρύντας ἐξίσησι μετὰ ἐ-
φιδρώσεως· βοηδουῶνται δὲ πῖ-
νανον ἐδίοντες καὶ τὰ ἐλκὺς, καὶ
οἰνόμελι πίνοντες, ἵσάκεις αὖ ἐ-
μέσωσι τὰ αὐτὰ πρὸς σφροδύμοι.
15 ἔστι δὲ δριμύ, καὶ παρμόις κα-
τὰ τὴν ὁσφρησιν κινουῖν· διεφ-
πεύον ἐφελιν, κατὰ χεῖρὶ δέν μετὰ
κόσου, μετὰ δὲ ἁλὸς, πεκνύμα-
τα αἶρεν.

Περὶ Σακχαροῦ μέλι-

20 τος. Κεφ. ρδ'.

* Καλεῖται δὲ π καὶ σάκχαρον
εἶδος ὃν μέλιτος ἐν Ἰνδία πεπ-
τῶτος καὶ τῇ ἐν δαμόνι ἀραβία,
εὐρισκόμενον ἐπὶ τῶν χαλάμων,
ὅμοιον τῇ συστάσει δῆσι, καὶ θραύ-
25 μόνον ὑπὸ τοῖς ὁδοῦσι κατὰ τὰ
οἱ δῆες, ἔστι δὲ εὐκοίλιον, εὐσώμα-
χον διὰ τὴν ὕδατι καὶ ποτὲν· ὠφε-
λουῖν κύντιν κακακωμῶν καὶ νε-
φρῶς· κατὰ δὲ καὶ τὰ τὰς κόρας
ἐπισκοτούμενα ἐπὶ χεῖρὶ δέν.

Περὶ Κηρύ-

Mel Sardoum.

Cap. CII.

Quod in Sardinia gignitur
mel, amarum est: quoniam a-
pes inibi absinthio vescantur:
quo vitia cutis in facie & ma-
culæ aptissimè perunguntur.

Mel Ponticum.

Cap. CIII.

Heraclia in ponto quibus-
dam anni temporibus, propria
quorundam florum dote, mel
conflatur: quod qui edere, mē-
te ab alienantur, ac sudore dif-
fluunt. Remedio sunt, esitata ru-
ta, & falsamēta, aut epotū mul-
sum, resumpta, quoties vomiti-
one reiiciuntur. acre autē est,
& olfactu sternutamenta mo-
uiet. Quod cum costo illitum,
foeminarum cutem emendat,
& cum sale sugillationes rapit.

Mel Saccharum.

Cap. CIIII.

Est & aliud concreti mellis
genus, quod saccharon nomi-
natur. In India verò, & felici
Arabia in arundinibus inueni-
tur: salis modo coactum est, de
tibus, ut sal, fragile, alio ido-
neū, & stomacho vtile, si aqua
dilutum bibatur: vexata vesice
renibusque auxiliatur, illitū eā
discutit, quæ tenebras oculorū
pupillis offundunt.

¶ Cera;

DIOSCORIDIS

Cera. Cap. CV.

Cera optima est subfulua, suppinguis, pura, odorata, & halitū quadamtenus melleū referēs, natione Pontica, aut Cretica. Secundum locum obtinet candidās, & suapte natura pinguis. Cádida fit hoc modo: Ex ea radūt album syncerúmque, atq; transfundunt in vas, quod satis habeat marinæ ex alto petita, inspersoque nitri momēto, decoquunt: cūmque iterum tertióve inferbuit, separatum vas refrigerant, ac ceræ pastillum eximunt, deterfa sorde, si qua fortè adhæsit: tum denuo indita noua maris aqua feruet, vti retulimus: & vase dempto ex igne, fundum ollulæ nouæ aqua frigida madefactū, in ceram summam suspensa manu intingunt, quo celerius cócre-scat, & quā minima portio extrahatur. Suscepto primo ceræ orbiculo, iterum vasis imum aqua refrigeratum, tantisper in ceram immitti debet, dum tota excipiat. Orbiculi lino cófuti, interuacante spatio, suspenduntur, & interdiu, continuò sub sole noctu sub luna asperguntur, vsque dum perfectè albescant. Verum si eximius ille candor desideretur eadem

Περὶ Κηρέω. Κεφ. ρε.

Κηρὸς ἀρίστος ὅστις ὁ ὑποκίρρος καὶ ὑπολίπαρος, ἐνώδης τὸ καὶ ποσὴν μελιτώδη ἀπιφορεῖν ἔχει, ἐπι δὲ καθαρεὶς καὶ ῥυτί πεντικὸς ἢ κρητικὸς. ὁ δὲ ἐκλευκος, τῇ φύσει δὲ λιπαρὸς, δευτερεύει. λευκαντέον δὲ κηρὲν ὅτω κατακλίπας αὐτῷ τὸ λευκὸν καὶ καθαρὸν, ἐμβόηεις χύβαν καλὴν, καὶ ὀπιχέας θαλάσσης πλαγίας τὸ αὐταρκές, ἐπε βεβ-
χὴν ἵττον περιεμπάσας· ὁ τε δὲ 10
ἀναζέσει δις ἢ τρίς, καθελὼν τὴν χύβαν καὶ ἐάσας ψυχθῆναι, αὐτοῦ τὸν προχέσκον, καὶ ἀποξύσας εἰς πρὸς αὐτὴν ὑπάρχει ῥυπαρίαν, ἐπε 20
ἐκ δευτέρου αἰὶο θαλάσσιον ὕδωρ ὀπιδέας, ἀναζέσαι τοις δὲ πάλιν τὸ 15
κηρὸς ὡς δεδύλω, ἀνελοῦ τὸ ἀγχεῖον ἀπὸ τῆ πυρὸς, καὶ λαβὼν καμτὴν χυτείδιν τὸν πυθμῆρα, περινοποσμένον ὕδατι ψυχρῷ. καθεὶς πρῶτος εἰς τὴν κηρὸν, ἀκροθιγῶς ἐμβάπτων, πρὸς τὸ ὑάχρὸν τι αὐτῷ 20
ἀφύκεσθαι, καὶ καθεὶς αὐτὴν πύγνυθαι. ἀνθόμηνος δὲ τὸ περιτὸν κυκλίσκον ἀφαιροῦ καὶ ἐκ δευτέρου καθεὶς τὸν πυθμῆρα ψύχων ὕδατι. καὶ τὸ αὐτὸ ποιεῖν, ἕως αὐτὰ πάντα ἀνθόβης. λοιπὸν λίνῳ διαφάσας τὰ κυκλίσκια διεσῶτα ἀπὸ δηήλων κρέμασιν. ἡμέραν μὲν εἰς ἡλίον συνεχῶς ἐπινοτίζων αὐτὰ νυκτὸς δὲ ὑπὸ τῇ σελήνῃ τίθει, ἕως αὐτὰ λευκὰ ῥυτίθαι· εἰ δὲ ἄρα τις θελῇ λευκὸν ποιῆσαι, τὰ 25

τὰ μὲν λοιπὰ ὡσαύτως ἐνδραχέτω,
 ἔπειτα δὲ πλεονάσῃς. πινὲς ὅτι ἀπὸ
 πελαγίας θαλάσσης, ἐν ἧ μὲν θρι-
 μυτάτη ἐφοῖσι τὸν περὶ ἐρητύλον
 τρόπον ἅπαξ ἢ δὶς· εἴτα ἀναίρεον
 5 ταὶ λαγνίω λεπτῶν, καὶ περὶ ἐρεῖ,
 λαβὼν ἐν ἑαυτῷ ἔχοντι· εἴτα κυ-
 κλίσεια ἐπὶ πόας πυκνῆς ἐπιθέν-
 τες ἡλιάζουσιν, ἕως αὖ λευκώτα-
 τος ᾗσινται. παρανοοῖσι δὲ ἕαρος
 ἐπὶ τοῦτο ἔρχεσθαι, ὅτε καὶ ὁ ἥλιος
 10 τῇ σφοδρότητι ἀνέεται, καὶ νότι-
 α παρέρχει, πρὸς τὸ μὴ τήκε-
 σθαι. Διῶαμιν δὲ ἔχει πᾶς κη-
 ρὸς θερμαντικὴν, μαλακτικὴν,
 πικρῶν τε μετεώως· μύρρον
 δὲ καὶ ἐν ῥοφήμασιν ἐπὶ τῷ δυσεν-
 15 τερικῶν, καὶ ἀπινόμενος ὅτι μεγέθη
 κεγχειαῖα δέκα, οὐκ ἔα τυροῦ δὲ
 ἐπὶ τῶν πιδύμουσιν τὸ γάλα.

Περὶ Πρόπολεως. Κεφ. ρς'.

Πρόπολιν παρακλητικὴν καὶ ξαν-
 θὴν καὶ ἐνώδη καὶ συρακίζουσαν.
 20 μαλακικὴν τε ἐν τῷ ὑποξήρῳ, καὶ
 μασίχης τρόπον ἐφελκομένη. ἔ-
 σσι δὲ θερμαντικὴ ἄγαν καὶ ἐπι-
 σπαστικὴ, καὶ σκολόπων ἐλκυσ-
 κή. ἀρήγει δὲ καὶ βήξι παλαιᾶς
 ὑποθυμωμένη, αἶρει δὲ καὶ λει-
 25 χύδας ἐπιπιδυμένη· εὐείσκειται
 δὲ πρὸς τοῖς σώμασι τῶν σμυνίων
 φύσει κηρειδύς.

Περὶ Πυρῶν.

Κεφ. ρζ'.

Πυροὶ πρὸς ὑγείας χρῆσιν ἀριστοί,
 οἱ

eadem factitari, & identidem
 recoqui operæpretiū est. Nec
 defunt, qui pro marina, in mu-
 ria, quàm acerrima semel aut
 iterum excoquant: dein lagun-
 cula tenui, rotunda, ansam ha-
 bente, extrahunt: postea or-
 biculos, substrato affatim ce-
 spite herbofo, insolant, donec
 candorem summum contra-
 xerit. Præcipiunt hoc obeun-
 dum minus vere, cum sol re-
 remissa vehementia humorem
 pariat, vt non faciliè liquetur.
 Cera omnis mollit, calfacit, mo-
 dicè explet corpora: datur in
 forbitione dysentericis, ac mi-
 lij magnitudine decem grana
 ceræ hausta, lac in nutricibus
 non patiuntur coagulari.

Propolis. Cap. CVI.

Propolis eligi debet flava, o-
 dorata, styracé referens, in ve-
 hemēti ariditate mollis, & ma-
 stiches more ductilis. Magno-
 pere calfacit, & euocat: acu-
 leos, & omnia infixa corpo-
 ri extrahit, in vetere tussi suf-
 fita proficit, impetigines ad-
 mota tollit: ea in alueario-
 rum foribus, cerosæ naturæ in-
 uenitur.

Triticum. Cap. CVII.

Optima è tritici generibus
 ad secundæ valetudinis vsus ha-
 bentur

DIOSCORIDIS

bentur, quæ recentia, & iâ perfectè adulta, colorem luteû referunt: dein sequuntur trimestria, quæ nonnullis fitania nominantur. Itaque cruda in cibis teretes tineas gignunt, canum morsibus profunt, man-
sa & imposita: confectus eorum similagine panis, plus alit, quàm cibarius: è trimestrium farina panis leuiorem cibum præbet, & qui facile in mēbra demandetur. Farina eorû cum hyoscyami succo illinitur aduersus neruorû fluxiones, quas Græci rheumatismos vocât. Itē contra interaneorum inflationes, lentigines ex aceto mulso tollit. Furfures autē in acri aceto decocti, turgentes mammas sedant: viperarum ictibus auxiliantur, & torminosi profunt. Farinaceû fermentû calfacienti, extrahēdiq; vim habet: priuatim callos pedû, clauosq; extenuat, & cætera tubercula furunculósq; ex sale cōcoquit, & aperit. Sitaniorû farina, contra venenatos ictus cû aceto aut vino, cōmodissimè illinitur: eadē si decocta in glutini modû delingatur, cruētis excreationibus pderit: cōtra tussim, & exasperatas arterias, cum mētha & butyro decocta, efficax est.

Tritici

οἱ πρὸς φατοὶ καὶ τελείως ἡδυσκό-
τες, τῇ χροῖα μιν λίζουσιν· εἴτα μὲν
τούτους οἱ βιμηνιαῖοι, λεγόμενοι ὅτι
ὑπὸ πινῶν σιτάνιοι· ὧμοι ἐν βρω-
θέντες, ἐλμινδας σπογγύλας γλυ-
κῶσι, μαροσηθέντες δὲ καὶ κατὰ πλά-
σας, ὡφειῶσι κυνοδάκτοισι· ὃ δὲ
ἐν τῇ σεμιδάλεως αὐτῶν γνόμε-
τος ἀρτος, ἐν τρεσφώτερος ὅστι τοῦ
συγκομιστοῦ· ὃ δὲ ἐν τῶν σιτα-
νίων ἀλεύρων, κουφότερος καὶ εὐα-
νάδοτος. τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἀλευρον
συνὸ ὑοσπύμου χυλῶ, κατὰ-
πλάσσεται πρὸς νέρων ρευματι-
σμοῖς καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις
ἐντέρων, ζυῶ ὅξυ μέλιτι δὲ φαρ-
μακοῖς αἶρει. τὸ δὲ πίτυρον συνὸ ὅξυ
δριμύει λέπρεας ἀφίστησι κατὰ-
πλάσσει μύρον θερμόν, καὶ πάσης
φλεγμονῆς ἐν ἀρχῇ κατὰ πλάσμα
σύμφερον, μετὰ δὲ πηγαίου ἀφει-
ψήματος ἐπιθεῖν, μαροῖς σπαρ-
γῶντας πυνέει, καὶ ἐκ κοδύκτοις ἀρ-
μόζει, καὶ σποφινδοῖς· ἢ δὲ ἐν τῶν
ἀλφειῶν ζύμην θερμαστικὴν ἔσσαι καὶ
ἐπιπασστικὴν ἰδίως τὰ ἐν πέλμασι
λεπθύνει, καὶ τὰ δῆα φύματα, καὶ
δοσθηγας σὺν δῆσιν ἐκπέσσει καὶ ἀ-
νασσομοῖ. τὸ δὲ σιτανίων πυρῶν ἀ-
λευρον, ἰοβόλοισι ἀρμόζει καὶ ἀπλά-
τόμωμον ἐν ὅξυ· ἢ οἶνω ἐπιθεῖν δὲ
ρόπον κόλλης καὶ ἐκ λυγρόμωμον, αἰ-
μοποιοῖκας ὡφειῖ καὶ πρὸς βήχας
καὶ ἀρτηρίας τραχυσμέας, συνὸ ἡ-
δυόσμων καὶ βουτύρων ἐπιθεῖν ποιεῖ.
καὶ ἡ ἐξ

καὶ ἡ ἐξ αὐτῶν τῶν πυρῶν γύρις
 ἐψηθεῖσα συνὲ μελικράτῳ, ἢ ὑ-
 δρηαίῳ, πᾶσαν διαφορεῖ φλεγμο-
 νίῳ. καὶ ὁ ἀρτός συνὲ μελικράτῳ
 ἐφ' ὅς καὶ ὠμὸς καταπλασσομέ-
 5 νος, πᾶσαν φλεγμονὴν παρσμου-
 δεῖται μαλακτικώτατος ἢ πᾶρ-
 χων, καὶ παρυποψύχων· μηγείς
 πόαις ἢ χυλοῖς ποῖν. ὁ δ' ἀλγαιὸς
 καὶ ἐνερὸς καθ' ἑαυτὸν μηγείς πι-
 σὶν, ἰσησι κοιλίαν ρέουσιν. ἄλλμη
 10 δὲ βραχεὶς ὁ περὶ σφατος καὶ κα-
 ταπλαθεῖς, παλαιοὺς λειχμῶας
 ἰᾷται. * κόλλα δὲ ἡ γινομμένη ἐκ
 τῆς σιμιδάλεως καὶ γύρεος περὶ
 τῶν βιβλίων κόλλησιν, ἀρμό-
 ζει ἐπὶ αἰμοπτοικῶν ὑγροτέρῃ καὶ
 15 χλιαρῇ καταρροφυμνῇ, κο-
 χλιαρείου πλῆθος.

Πρὶ Κειδῆς. Κεφ. ρή.

Κειδῆ δὲ ἀρίστη ἡ λευκὴ καὶ κα-
 παρὰ ἀποφωτέρῃ δὲ πυροῦ. τῷ
 μύτοι γινομμένη ἐξ αὐτῆς ἀλφί-
 20 του ἡ πῖσάνη τροφιμωτέρῃ, διὰ
 τὴν ἐν τῇ ἐψήσει χύλωσιν. ποι-
 οῦσα δὲ περὶ τὰς δειμύτητας
 καὶ τὰς περὶ ἀρτηρίαν τραχύτη-
 τας καὶ ὑγρώσεις περὶ αἶμα καὶ ἡ
 πνεῖνη πῖσάνη ἀρμόζει τροφι-
 25 μωτέρῃ καὶ οὐρητικωτέρῃ οὐ-
 σα κατασπᾶ, ὅτι καὶ γὰρ αὖτε ἐψη-
 θεῖσα μαρμαρίου σπέρματι, καὶ
 ῥοφυμνῇ. ἐστὶ δὲ οὐρητικὴ σμη-
 κτικὴ, φυσώδης, κακοσμία-
 χος, συμπεπτικὴ οἰδημάτων.

διὰ

Tritici pollen si ex aqua mul-
 sa, aut hydrelæ decoquatur,
 omnem discutit inflammatio-
 nem. Panis & crudus, & co-
 ctus cum aqua mulsa inflam-
 mationes omneis illitu mul-
 cet: cum emolliat, & quadam-
 tenus refrigeret: sed herbis suc-
 cise huic rei accommodatis
 admisceatur. Vetus panis ari-
 dus, adiectis conuenientibus,
 citam aluum cohibet. Recens
 muria macerat, illitu vetustas
 impetigines sanat. Glutinum
 ex similagine, & polline, quo
 chartæ glutinantur, sanguinem
 excreatibus prodest, si liquidus
 ac tepidum cochlearis mensu-
 ra detur forbendum.

Hordeum. Cap. CVIII.

Hordeū optimū est candidū
 purūmq; id minus q̃ triticum
 alit. Ptisana tamē ob cremorē
 in decoctione redditū, plus ali-
 mēti præbet, q̃ polēta ex hor-
 deo facta, Contra acrimonias
 atq; gutturis scrabritias, exulce-
 rationesq; pollet: quibus etiam
 triticea ptisana præsidio est: sed
 plus alit, magisq; vrinā mouet.
 Lac abundē suppeditat, si cū foe-
 niculi semine decocta forbea-
 tur. Hordeū absterget, vrinam
 ciet, inflationē parit, stomacho
 aduersatur, tumores cōcoquit.

n iij Farina

DIOSCORIDIS

Farina hordeacea decoquitur in mulsa aqua cum fico, vt inflammationes collectionesque discutiat: duritias cum refina, & fimo columbarum concoquit: cum meliloto autem, & papaueris calyce dolores finit, qui latus excruciant: aduersus intestinorum inflationes cum lini femine, foenogracæ, & ruta illini iuuat: strumas cū pice liquida, cera, oleo, & impubis pueri vrina, ad concoctionem perducit: & cum myrto, aut vino, aut malicorio, aut syluestribus pyris, aut rubo, alui profluuia sistit: podagricis inflammationibus, cum cotoneis aut aceto prodest: decocta in acri aceto, modo quo hordeaceum cataplasma, & calida imposita, lepris medetur. Cremor verò farinæ ex aqua, atq; cū pice, & oleo decoctus, puri mouédo est: cū aceto subactus itidem, & cum pice, contra articulorū fluxiones prodest. Farina ex his aluum cohibet, inflammationesq; mitigat.

Zythum. Cap. CIX.

Ex hordeo pot⁹ fit, cui Zytho nomé est. Is urinā cit, renes & neruos tentat, mēbranis, præsertim cerebrū vestiētibus, officit: inflationē parit, vitiosum

suc-

διαφορεῖ δὲ τὸ ἄλευρον αὐτῆς μετὰ σύκων καὶ μελικράτου ἐψηθὲν οἰδύματα καὶ φλεγμαῖς συμπίπτει δὲ καὶ τὰς σκληρίας μετὰ πίστεως καὶ ῥητίνης καὶ πεσεῖδος κόπρου· συνὲ μελιώτῳ δὲ καὶ κωδίαις ἀνωδυμῖαν παύει τοῖς πλεurst. ἀλγούσι· χαταπλάσσεται δὲ καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις ἐντέρων μετὰ λιγυπότρου καὶ τίλειος καὶ πιγάνου· μετὰ δὲ πίστεως ὑγρᾶς καὶ κη-
10
ρεῦ καὶ ὄρου παιδὸς ἀφόρου καὶ ἐλαίου, χρισάδας ἐκπέπτει. Συνὲ μυστήρι δὲ ἢ οἶνω ἢ ἀγρᾶσιν ἢ βάτῳ ἢ σιδίῳ, κυλίας ρεύματα ἴσησι· συνὲ κωδωνίῳ δὲ ἢ ὄξει, ποδαγρικὰς φλεγμαῖς ὠ-
15
φείει· ἐψηθὲν δὲ μετὰ ὄξυις δριμύτως ὄν τρόπον ὥμῃ λύσις, καὶ θερμὸν ἐπιπιδέμενον, λέπρας ὑγιάζει. χαλωθὲν δὲ τὸ ἄλευρον συνὲ ὕδατι καὶ ἐψηθὲν συνὲ πίστι καὶ ἐλαίῳ, πυσσιόν ὄσθ· συνὲ ὄξει
20
ῥ χαλωθὲν καὶ ἐψηθὲν μετὰ πίστεως, πρὸς τὰ πῶν ἀνδρῶν ρεύματα ἀμύζει· τὸ δὲ ἐξ αὐτῶν ἄλευρον κυλίας σπληνικόν, καὶ φλεγμαῶν πνευματικόν.

Περί Σύκου. Κεφ. ρθ'. 25

Σύκος σκευάζεται ἐκ τῆς κρημῆς· ἐστὶ δὲ διουρετικὸς, καὶ νεφρῶν καὶ νεύρων ἀπικὸς, καὶ μάλιστὰ μνήγων κακωτικὸς· πνευματικὸς τε καὶ χυμωτικὸς κακω-
χυμῶν,

χυμῶν, καὶ ὕφαντι ἀσεως ποιη-
τός. ὑρῆς δὲ καὶ ὁ ὕφας γίνεται
βερεχόμυθος αὐτῷ.

Πεὶ Κούρμυθος. Κεφ. ρί.

Καὶ τὸ καλούμυθον δὲ κοῦρμι,
σικυαζόμυθον δὲ ἐκ τῆς κριθῆς, ὃ
καὶ αὐτὸ οἶνου πόματι πολλάκις
χρῶνται, κεφαλαίος ὅστις καὶ κα-
κόχυμον, καὶ τὸ νεύρου βλαπτικόν.
σικυαζέει δὲ καὶ ἐκ πυρῶν ποιεῖ-
ται πόματα, ὡς ἐν τῇ περὶ ἐσπε-
ραν ἰβηεία καὶ βρετανία.

Πεὶ Ζεΐας. Κεφ. ριά.

Ζεῖα διτλή. ἡ μὲν γὰρ ἀ-
πλή, ἡ δὲ δίκοκκος καλεῖται,
ἐν δυοσὶν ἐλύτρεαι ἐχρυσά σικυ-
αζευμύθον τὸ σπέρμα. ἐστὶ δὲ
προφιμωτέρα μὲν κριθῆς, οὕσο-
μος· ἀπροφωτέρα δὲ πυρῶν ἀρ-
τοποιουμένη.

Πεὶ Κεῖμνον.

Κεφ. ριβ.

Κεῖμνον ἀδρότερόν ὅστις τῇ κα-
τεργασίᾳ τὸ ἀλεύρου γινόμενον ἐκ
τῆς ζείας καὶ πυρεῦ, ἐξ οὗ ὁ πολλὸς
γίνεται. ἐστὶ δὲ ἱκανῶς προφιμον καὶ
ἐν κατεργασίᾳ, σαλπικώτερον δὲ
κοιλίας τὸ ἀπὸ τῆς ζείας μάλι-
σα προσφωχθείσης.

Πεὶ Οἰύρας. Κεφ. ργ.

Καὶ ἡ οἰύρα δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ
γῆους ὅστις τῆς ζείας, ἀπροφωτέρα
δὲ κατὰ πᾶσιν ἐκείνης ἀρτοποιεῖ-
ται καὶ αὐτῇ. καὶ κρέμνον ἐξ αὐ-
τῆς ὁ παύτως γίνεται.

Πεὶ Αἰθῆ-

succū creat, elephátia singnit:
perfusū Zytho ebur, obsequio-
sū & operi tractabile redditur.

Curmi. Cap. C X.

Fit & ex hordeo potus, quē
curmi nomināt, eóq; sæpe po-
tu, pro vino vtútur: verum do-
lorem capitis mouet, malum
succū gignit, neruis nocet. Cō-
similia etiā potus genera ex tri-
tico fieri solent, in Iberia, quæ
occidentē spectat, & Británia.

Zea, seu semen. Cap. CXI.

Zea duorum generum est:
vna simplex, altera in geminis
putaminibus grana binā iūcta
gerit, ob id dicoccos appellat.
Plus quàm hordeū alit, ori gra-
ta: digeritur in panificia, minus
quàm triticum alens.

Crafsior farina.

Cap. CXII.

Crimnon crafsior est ex Zea
triticóque farina, ex qua pul-
tem faciunt. Abundē alit, faci-
lē conficitur, alium vehemen-
tius adstringit, si Zea, ex qua fit,
prius torreatur.

Siligo. Cap. CXIII.

Eidem generi sigillo adscri-
bitur, sed minus aliquanto nu-
trit: in panes, vt Zea, cogitur. Fit
quoq; è filigine crafsior farina,
quam Græci crimnon vocitāt.

n iiii Athera

Athera. Cap. CXIII.

Athera ex Zea fit tenuissimè molita: est autè sorbitio, quasi liquida pulricula, infantibus conueniens, & cataplasmatiss efficac.

Tragos. Cap. CXV.

Tragos quandam halicæ frugis figuram gerit: multò minus, quàm Zea nutrit, quòd multum aceris habeat: quare ægrius conficitur, aluúmq; magis emollit.

Auena. Cap. CXVI.

Auena genicula quædam habet, folio & stipula triticú imitatur, & in cacuminibus dependentes paruulas veluti locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur, vtile ad cataplasmata, vti hordeum. Pulte huius aluus sistitur, prodest tussientibus in sorbitione succus.

Oryza. Cap. CXVII.

Oryza frugum generis est, in palustribus riguísq; nascens. Mediocriter alit, sed aluum supprimit.

Halica. Cap. CXVIII.

Halica fit ex Zea, quâ dicoccon appellauimus: plus alit, q̃ oryza: aluú magis cohibet, stomacho longè vtilior. decocta in aceto illitáque lepras tollit, ynguuium

Περὶ Ἀθήρας. Κεφ. ριθ'.

Ἀθήρα δὲ ἐκ τῆς ἀληλεσμένης εἰς λεπτὸν ζεῖας σκευάζεται ὅ ῥόφημα ὡς τὸ πλεῖστον ὑγρὸν, παιδίοις ἀρμόδιον· ποιεῖ δὲ καὶ εἰς τὰ καταπλάσματα.

Περὶ Τράγου. Κεφ. ριε'.

Τράγος τὸ γῆμα μὲν παρὰ πλεονείως τῷ χόνδρῳ ἔοικεν· ἀφωότερος δὲ παρὰ πλεὺ ζεῖας, διὰ τὸ πλεὺ ἔχειν τὸ ἀχυρῶδες. διὸ καὶ δυσκατέρηστος ὅτι, καὶ κοιλίας ἰομαλακτικὸς.

Περὶ Βρώμου. Κεφ. ρις'.

Βρόμος κάλαμός ἐστι, πυρεῖς ὅμοιος καὶ τοῖς φύλλοις, γήρασιν δὲ διηληκμίνος. καρπὸν δὲ ἔχει ἐπ' ἀκρῶ ὡς τὸ ἀκεί· ἵς δια δίκωλα, ἐν οἷς τὸ σπέρμα χρησίμων εἰς καταπλάσματα ὡς ἡ χρυσὴ. καὶ πέλτες δὲ ἐξ αὐτοῦ γίνονται σιληπκὸς κοιλίας. ὁ δὲ ἐξ αὐτοῦ χυλὸς ῥοφούμενος βήσπεισιν ἀρμόζει.

Περὶ Ορύζης. Κεφ. ριζ'.

Ορύζα τῶν σιτηρῶν ὅστιν εἶδος, φουομένη ἐν ἐλώδεσι τύπτει καὶ ὑγροῖς. τριόφιμος δὲ μετεώρος καὶ κοιλίας σιληπκή.

Περὶ Χόνδρου. Κεφ. ριη'.

Ὁ ὅ χόνδρος γινέται μὲν ἐκ τῆς λευκῆς δικοκκου ζεῖας· τριόφιμότερος δὲ ὀρύζης σεγνωπικώτερος κοιλίας. ἐντομαχώτερος δὲ μάλλον· αἶρει δὲ καὶ λέπρας συν ὅστις ἐπιμα

ἰψήδεῖς καὶ καταχρίδεῖς, καὶ λε-
 πρὺς ὄνυχας ἀφίσησι, καὶ ἀγυλώ-
 πα ἀφ' ἧς ὁ ἄνθρωπος θέρειται. ἔκλυ-
 σμά τε τὸ ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν τοῖς
 μὲν ἀλγύμασι δυσεντέροις συ-
 5 δετον. Πρὶ Κέγχρου. Κεφ. ρθ'.

Κέγχρος ἀποφωτίζει τῶν λοι-
 πῶν σιτηρῶν, ἀποποιεῖται δὲ ἡ
 ὥς τῶν πολλῶν σκευαθῆσα κοιλί-
 αν ἴσησιν, ἔρα δὲ κινεῖ. φωχθεῖ-
 σα δὲ καὶ βληθεῖσα εἰς τὰ κύνες πυ-
 10 εἰωμῶν, ἐρώπων καὶ τῶν ἀγῶν ἀγ-
 γημάτων ὅτι βοήθημα.

Περὶ Ελύμης. Κεφ. ρκ'.

Ελύμος, οἱ δὲ μελίνῳ, τῶν σι-
 τηρῶν ὅτι σπέρματων, κέγχρω
 ὁμοία· ὡς πύως σιτοποιουμένη
 15 καὶ πρὸς τὸ αὐτὸ ἀρμόζουσα, ἀ-
 ποφωτίζει μὲν τοῖς κέγχρω καὶ
 ἡπλον συπλήν.

Πρὶ Σήσαμης. Κεφ. ρκβ'.

Σήσαμον κακοσμίαχον, καὶ δυσ-
 ωδίας σώματος ποιητικόν, ὁπό-
 20 ται βίβρωσκόδιον ἐμμελὲς μετα-
 ξὺ τῶν ὀδόντων καταπλαθὲν δὲ
 διαφορεῖται ἐν νεύροις παχύτη-
 τας, καὶ τὰ ἐν ὧσι θλάσματα, καὶ
 φλεγμοναῖς καὶ πυρίκλωτα, καὶ κώ-
 λων ἀλγύματα, καὶ καρδίου δ' ἡ-
 25 σμα θέρειται· σὺν ῥοδίῳ δὲ κα-
 θαρτὴς ἀλγύματα ἐξ ἐγκώσεως
 γινώμενα παραμυθεῖ· ἡ δὲ πᾶσα
 καθελεῖται ἐν οἶνῳ τὰ αὐτὰ
 ποιεῖ μάλιστα δὲ φλεγμοναῖς ὀφ-
 θαλμῶν καὶ περὶ δυνάμεις ἀρμόζει
 γίνε)

unguim scabritias extricat, in-
 cipientibus ægilopiis mede-
 tur. Decoctum dysentericis,
 quos excruciat dolor, infusum,
 idoneum est.

Milium. Cap. CXIX.

Milium in panes coactum,
 minus cæteris frugibus alit, si-
 flit pulte sua aluum, urinam
 cit. Torretur milium, feruens-
 que in sacco ponitur, ut tor-
 minibus, reliquisq; doloribus,
 si foueatur, auxilio sit.

Panicum. Cap. CXX.

PANICVM frumenta-
 cæis feminibus annumeratur,
 milio simile, eodémque mo-
 do in panes subigitur: eosdem
 habet usus, minus tamen & nu-
 trit, & stringit.

Cesama. Cap. CXXI.

SESAMA stomacho in-
 utilis cibus, halitus, grauitatem
 facit, quoties inter manden-
 dum commissuris dentium in-
 hæsit: neruorum crassitiem il-
 litu discutit, medetur auribus
 fractis, ambustis, inflamma-
 tionibus, coli doloribus, & ce-
 rastæ moribus: capitis dolo-
 res, qui æstuatione concitan-
 tur, ex rosacea lenit: eadem
 efficit harba decocta in vino,
 præsertim inflammationib; o-
 culorum doloribusq; prodest.

Ex ea

DIOSCORIDIS

Ex ea fit oleum quo Ægyptij
vtuntur.

Lolium. Cap. CXXII.

Lolium quod inter segetes
nascitur, molitú, illitu nomas,
putrescentia vlcera, gangræ-
násque emarginat: sanat cum
raphanis, sale & aceto feros
lichenas: & ex aceto, & sulphu-
re viuo, lepras: strumas quoq;
discutit, cum fimo columbi-
no, et lini semine decoctum in
vino: rumpit, quæ agrius ad co-
ctionem perducuntur. Deco-
ctum ex aqua mulsa, vtilissimè
ischiadice illinitur: si cum po-
lenta, thure, myrrha, aut croco
suffiatur, cõceptione adiuuat.

Amylum. Cap. CXXIII.

Amylum ex eo appellatum
est, quòd sine mola fiat. Opti-
mú ex trimestri, natione Cre-
ticum aut Ægyptium. Ratio
faciundi amyli hæc est: Pur-
gatum trimestre triticum ma-
descit quinquies die, & si fie-
ri potest, nocte: cum emolli-
tum fuerit, effunditur sensim,
sine agitatione, aqua, quò mi-
nus cremor vtilis vnà exclu-
datur. vbi molissimum esse vi-
detur mutata aqua pedib⁹ cal-
cari oportet: rursus infusa, te-
ri: tum demum enatantes ibi
furfures incerniculo eximèdi,
reliquúm q;

γίνεται δὲ καὶ ἔλαιον ἐξ αὐτῆς ἥ
οἱ αἰγύπτιοι χρῶνται.

Περὶ Αἵρας. Κεφ. ρκβʹ.

Αἷρα, οἱ δὲ δύστροπος, αἷρα ἢ γινώ-
σκῃ ἐν τοῖς πυροῖς ἀλεθεύουσα.
δυνάμειν ἔχει πειρακτικὴν νο-
μῶν καὶ σπηπιδόνων καὶ γαγγραινῶν·
μὲν ῥαφάνων καὶ ἀλῶν καταπλασ-
σάμεν καὶ λήχνιας ἀγρίους καὶ λεί-
πας συνὲ δεινὸν ἀπὸ πυρὸς καὶ ὅξους
θεραπεύει· συνὲ κόπρωϊ ἢ πείσει-
ρας καὶ λεγομένην ἐν φορμῇ ἐν οἷς ἰο-
νὸν χοιρῶδες διαλύει· καὶ τὰ δύσπε-
πτα ἐρύκει. ἰσχυρὰ δὲ καὶ τὴν με-
ληράτω ἐκθεύουσα καὶ καταπλάσ-
σάμεν ὠφελεῖ· συνὲ ἀλφίτῳ ἢ ἢ
σμύρῃ ἢ κρόκῳ ἢ λιβανωτῷ ὕδα-
τος μετὰ σμύρῃν ἢ συλάνῃ·
σι. Περὶ Ἀμύλου. Κεφ. ρκγʹ.

Ἀμύλον ἀνόμεσαι, διὰ τὸ
χωρεῖν μύλου κατασκευάζεσθαι.
αἱ εἰσὶν δὲ ὅτε τὸ σκευάζομενον
ἐκ πυρὸς σπταίου, κρητικὸν δὲ ἢ
αἰγύπτιον. σκευάζεται δὲ ἐκ πυ-
ρὸς σπταίου καὶ πυρὸς, βρεχο-
μένη πεντάκις ἢ ἡμέρας, εἰ δυ-
νατὸν δὲ καὶ τῆς νυκτὸς· ὅταν δὲ
μαλακὸς γένηται, δεινὸς πείσει·
ὕδαρ ἐκ χεῖν χωρεῖς τὸ κίεϊν, ἵνα
μὴ συνεκκλύζηται τὸ νόστιμον. ἐ-
πει δὲ σπυρσθῇ μαλακώτερος
γινώμενος, ἀποχέας τὸ ὕδαρ τεί-
βειν τοῖς ποσίν, εἴτα ὕδαρ ἐπιχέ-
οντας τείβειν· εἴτα ἀναρεῖσθαι
τὸ ὑψιστάμενον πύτυρον ἢ σμύρῃ
καὶ

καὶ τὸ λοιπὸν διηθήσαντας ἐμβα-
 λειν εἰς ὑλισθήρα, διυλίσαντας τε
 εὐθεὶς φύγειν ἐπὶ κεραμίδων
 χαλῶν ἐν ἡλίῳ ὀξυτάτῳ· ἐνικμον
 γὰρ καὶ ἐπ' ὀλίγον μένη ὀξίζι· ποι
 5 εἰ δὲ πρὸς ὀφθαλμῶν ῥεύματα
 καὶ κοιλότητος καὶ φλυκταίνας· σέλ-
 λι δὲ καὶ αἵματος ἀναγωγὰς πρὸ
 μύθρον, καὶ τὰς περὶ ἀρτηρίαν τραυ-
 νή· μύνηται δὲ καὶ γάλακτι καὶ
 πρὸς σφίμασι. σκευάζεται δὲ καὶ
 10 ἐκ ζείας βραχέως καὶ πλυθεί-
 σης πρὸς μῖαν ἢ δευτέραν ἡμέ-
 ραν, καὶ σμύττος τρέπεν ἀποθλι-
 βείσης διὰ τῶν χειρῶν καὶ ξηραν-
 θείσης ἐν ὀξυτάτῳ ἡλίῳ ὥς περ-
 εῖρηται· τὸ δὲ τοῦτον ἄδετον μὴ
 15 πρὸς ἰατρικὴν χρῆσιν, πρὸς δὲ τὰ
 λοιπὰ εὐδετον.

Πρὶ τήλεως ἀλεύρου. Κεφ. ρηδ'
 Τήλις, καὶ τὸ ἐκ τ' τήλεως ἀλευ-
 ρον μαλακτικὴν καὶ διαχυτικὴν
 ἔχει δύναμιν· κατὰ πλάσιν μύθρον
 20 δὲ λεῖον σμῶν μελικράτῳ ἐφθῶ,
 ποιεῖ πρὸς φλεγμονὰς τὰς ἐντὸς,
 καὶ ἐκ τὸς σμῶν νίβῳ ὃ καὶ ὄξος κείον
 καὶ ἀπαλαδὲν, σπληνῶα μφοῖ. τὸ δὲ
 ἀφέψιμα αὐτ' ἐκβάθισμα εἰς τὰ
 γυναικεῖα· ὅσα καὶ φλεγμονὰς ἢ
 25 μύθρον σμῶν αἶ. σμῆχι δὲ καὶ πεί-
 ρας καὶ πίτυρα, καὶ ἀχώρας τὸ ἀ-
 πόθλημα αὐτ' ἐν ὕδατι ἐψιδεί-
 σης· σμῶν σέαπι δὲ χηνείῳ πρὸς ὀ-
 θεί· αὐτὸ πρὸς μάλασσον καὶ ἀνευ-
 ρμῶν τὸν περὶ τ' ὑστέραν τόπους.

χλωρά

reliquumq; quallo sportisque
 siccatum tegulis novis confe-
 stim torreatur flagrantissimo
 in sole : nanque si paulisper
 vdim maneat, acorem concipi-
 pit. Contra fluxiones oculo-
 rum, pustulas, cauæque vlce-
 ra efficax est : sanguinis reie-
 ctiones potu cohibet, exasper-
 ratas fauces lenit, lacti atque
 obsoniis admiscetur. Fit etiam
 amyllum ex Zea, quæ macera-
 tur, ac eluitur vno aut altero
 die, & subactæ farinæ modo
 manibus subigitur : pressâque
 feruentissimo in sole, vt antè
 retulimus, exiccatur : nullius in
 medicina vsus, ad alia tamen
 conueniens.

Foenū græcū. Cap. CXXIII.

Foenigræci farina vim habet
 emolliendi discutiendiq; in a-
 qua multa decocta aduersus
 tam internas, q̃ externas inflā-
 mationes, efficaciter illinitur :
 lienem cū aceto, & nitro trita
 extenuat. Succus decocti eius
 foeminarum malis subuenit : &
 siue tumor, siue præclusio sit
 vulux fouet, & insidet. Fenigre-
 ci in aqua decocti cremor ex-
 press, capillos, furfures, & ma-
 nantia capitis vlcera purgat : lo-
 cos dilatat, et emollit, si cū anse-
 rino adipe pessi vice subiiciat,

Viride

DIOSCORIDIS

Viride cum aceto vtilissimum imbecillib⁹ locis, & vlcera sentientibus. Decoctum eius prodest aduersus tenesmos, foetidamque dysentericorū proluuiem: Oleū quod ex eo exprimit, & myrtho, capillos & genitalium cicatrices absterget.

Linum. Cap. CXXV.

Linum vulgò notum est, cuius semē easdem quas fœnugræcum vires habet. Discutit & emollit omnem intus foris-que inflammationē, cum melle, oleo, exiguaque aqua decoctum, aut melle cocto exceptum: vitia cutis in facie variosque crudum tollit, illitum cum nitro & ficulneo cinere, parotidas duritiāsque discutit: vlcera quæ serpunt, fauósque, cum vino decoctum expurgat: vngues scabros eximit, cū pari modo nasturtij & mellis: vitia pectoris extrahit si ex melle in eclegmatis vicem substituitur: tussim lenit, venerem stimulat, si farina piperis, & melle exceptum, pro placenta largius adsumatur. Hui⁹ decoctum interaneorum vulu-que erosionibus immittitur, alui excrementa euocat, ad vulu- inflammationes in defessio- nibus perquam vtile.

χλωρὰ δὲ μετ' ὄξους ἀπονοῦσα
τόποις καὶ εἰληκωμένοις ἀρμόζει.
τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆς πρὸς τρι-
νισμους καὶ δυσώδη ὑποχωρή-
ματα δυσεντερικά. τὸ δὲ ἀπὸ
αὐτῆς ἔλαιον μὲν μυρσίνης σμή-
λαι τεύχας, οὐλὰς τε τὰς ἐν αἰ-
δοίοις.

Πρὶ Λίνου. Κεφ. κξέ.

Λίνον γινώσκοντες, δυνάμειν δὲ
ἔχει τὸ σπέρμα τὴν αὐτὴν τῇ
τίλει. διαφθερῶν καὶ μαλακῶν 10
πάντων φλεγμονῶν ἐντός τε καὶ
ἐκτός, συνὲ μέλιτι καὶ ἑλαίῳ ἢ
ὕδατι ὀλίγη ἐψηθὲν, ἢ ἐφθῶ
μέλιτι ἀταλακθὲν· αἶρει δὲ καὶ
ἐφάλεις ὤμων καὶ ἰόντοισι συνὲ
νίτρω χαταπλαθεὶν καὶ σύκοις· 15
συνὲ κορίανθι δὲ, παρηντίδας καὶ
σκληρίας διαφθερεῖ· ἐρπητάς τε
συνὲ οἴτῳ ἐψηθὲν καὶ κηρία ἐκ-
καθαίρει· ὄνυχάς τε λεωθεύς ἀ-
φίσησι συνὲ καρδάμω ἴσῳ ἢ μέ-
λιτι· ἀτάγει δὲ καὶ τὰ ἐν θώρα- 20
κος συνὲ μέλιτι αὐτὴ ἐκκληκτῆ
λεωθὲν· καὶ βῆχας παρηγορεῖ,
παερμαῖ δὲ ἢ πρὸς ἀφροδίσια
μυθὸν μέλιτι ἢ πιπύρει αὐτὴ κο-
πῆς πελὺ λαμβανόμενον· καὶ τὸ
ἀφέψημα δὲ αὐτῆς ἐτίεται πρὸς 25
ἐντέρων καὶ ὑστέρας διγμους,
ἢ ἐν κομιδῇ πεπτομάτων καὶ
φλεγμονὰς τὰς ἐν μήτῃ εἰς ἐξ-
κώδησιμα, ὥσπερ τὸ τῆς πηλεως
ἐυχρηστῆ.

Cicer

Πρὶ

Πρὶ Ερεβίνθου. Κεφ. ρκς'.

Ερεβίνθος ὁ ἡμερος, εὐκοίλι-
ος οὐρητικός, πνευμάτων ἡγνη-
τικός, εὐχροίας πεπρωτικός,
καταμυωίων ἀγώγος καὶ ἐμ-
5 βρύων, καὶ γάλακτος ἡγνητικός,
καταπλάσσειται δὲ μάστιγα συν
ὁρόβοις ἐφ' ὅς, πρὸς ὀρχέων φλε-
γμονὰς καὶ μυρμηκίας, πρὸς
τε ψώρας καὶ ἀχώρας καὶ λει-
χῶας καὶ τὰ καρκινώδη ἑλκη καὶ
10 κακοήθῃ συν κριθῇ καὶ μέλιτι.

Καλεῖται δὲ τὸ ἕτερον αὐτῶν
εἶδος, κρίος. ἀμφότεροι δὲ εἰσι
διουρητικοί, διδομένου πρὸς ἱ-
κτερον καὶ ὑδρωπα τῇ ἀφελί-
ματος αὐτῶν συν λιβανωτίδι.
15 βλάπτοισι δὲ καὶ κύστιν εἰκασ-
μήν καὶ νεφροὺς. πρὸς δὲ μυρ-
μηκίας καὶ ἀκροχορδόνας νεομη-
νίας οὐσης, ἐνιοὶ ἐκείνης ἐξοχῆς ἐ-
ρεβίνθου ψάλλοντες ἄλλω καὶ ἄλ-
λω, εἰς τε ὀδόντιω ἀποδύσαντες
20 αὐτὸν, ρίπτειν εἰς τοῦ πύσω κε-
λεύουσι, ὡς ἀποπτηλουσῶν τῶν
ἀκροχορδόνων. Γίνεται δὲ καὶ
ἀγχιος, ἐρεβίνθος ὁμοιος τοῖς φύλ-
λοις τῷ ἡμέρῳ, ὁσμὴ δριμύς, τῷ
καρπῷ διαφέρων ποτῶν πρὸς ὁ-
25 σα καὶ ὁ ἡμερος.

Πρὶ Κυάμου ἑλληνικῶς. Κεφ. ρκζ'.

Κυάμος ἑλληνικὸς πνευματώ-
δης, φουστώδης, δύσπεπτος, δυσό-
νητος, βιχὴ δὲ σύμφορος καὶ σαρ-
κῶν ἡγνητικός, * μέσος διεγμοῦ

καὶ

Cicer. Cap. CXXVI.

CICER fatium aluo ido-
neum est, vrinam ciet, infla-
tionem parit, colorem com-
mendat, menses ac partus ex-
pellit, lac auget, cum eruo de-
coctum illinitur ad inflamma-
tiones testium, verrucosas in-
formicationes, ad scabiem vl-
cera capitis manantia, impeti-
ginésque: contra carcinoma-
ta, & vlcera, quæ cachoëthe vo-
cantur, cum melle & hordeo
prodest. Alterum genus arie-
tinum nominatur: vtrunque
cit vrinas, dato cum rore mari-
no, hydropicis aut regio mor-
bo laborantibus, eorum de-
cocto. Lædunt ea exulcera-
tam vesicam, & renes. In ver-
rucarum formicantium pen-
siliūmque genere, prima luna
singulis granis singulas tangūt,
eæque grana linteolo deligata
abūci post se præcipiunt, ita
decidere eas arbitrātur. Syl-
uestre cicer, foliis fatiuo simi-
le est, odore acri, sed semine
discrepat: idem quod fatium
præstat.

Faba. Cap. CXXVII.

Faba inflationem excitat, æ-
grè concoquitur, tumultuosa
somnia facit, tussi confert, car-
nem gignit, media calidi, fri-
gidiq;

DIOSCORIDIS

gidiq; natura. Decocta in posca, & cum suo cortice esitata, dysenterias, & coeliacorū profluua sistit: contra vomitiones conuenienter manditur. Inflatione leuior contrahitur. si aqua prior inter coquendū abiiciatur. Viridis plus negotij stomacho exhibet, maioremq; flatū parit. Lomētum eius, & per se, & cum polēta illitum, inflammationes quas vulnus excitauit, mitigat: cicatrices cōcolores facit, turgentes grumoso late mammas, etiam si inflamatione tentētur, adiuuat: lac restinguit, furūculos, sugillata, parotidasq; cū foenigræci farina & melle discutit: cum rosa autem, thure, & oui candido, prœcidētes oculos, tumores, vuāscque, reprimat: subactū vino, suffusiones & ict⁹ oculorum recreat. Manducata sine cortice faba, ad auertendas fluxiones, fronti illinitur: decocta in vino testium collectiones sanat: quo tardius pubes erūpat, pueris imo ventri illinitur, vitiliginem purgat. Fabarum cortice illiti capilli, qui post euulsionem renascūtur, gracilesunt, & minus alimenti capeffunt, cū polenta, scisso alumine, & vetere oleo impositi cortices, strumas

καὶ ψυχρῶ. ἐψηθεὶς δὲ συν ὄξυ·
κράτῳ καὶ συν τῷ λέπει ἐπιθόμε-
νος, δυσεντερίας καὶ κοιλιακῆς ῥύ-
σεως ἐπέχει· καὶ πρὸς ἐμέτους δὲ
εὐθελὲς βρωθεὶς. γίνε⁹ δὲ ἀφυσ-
σώτερος ὅτε πρὸς τὴν ὕδατος κατ' ἡ-
τ' ἐψησιν ἀποχρησθῆναι. ὁ δ' ἡλω-
ρὲς καὶ χακοσμομαχόττερος καὶ φυσ-
σωδέστερος. τὸ δὲ διέφρεν τ' κνέ-
μου καταπλασθὲν κατ' αὐτό τε
καὶ συν διήφιστῳ, τὰς ἐκ πληγῆς
φλέμμονας πρὸς αὐτῇ καὶ οὐλᾷ ὁ-
μοχρῶς πιεῖ, καὶ μαστὸς χονδρι-
ῶντας καὶ φλεγμαίνοντας ὠφελεῖ·
γάλα τε σβέννισι. συν μέλιτι δὲ
καὶ τιλίῳ ἀλῦρῳ δοθῆναι καὶ πα-
ρωτίδας καὶ ὑπόπια διαφορεῖ. συν
ρόδῳ τε καὶ λιβάνῳ καὶ τῷ τῷ ὠοῦ
λευκῷ, ὀφθαλμῶν περιπόσεις καὶ
σαφυλώματα καὶ οἰδήματα τέλ-
λει· φουραθὲν δὲ συν οἴῳ, συγ-
χύσεις καὶ πληγὰς ὀφθαλμῶν
καθίστησιν· εἰς τε ἀνακέννημα βρύ-
ματος χρεὶς τῷ λέπει μασ-
σθεὶς, ἐπιτίθεται κατὰ τὸ με-
τόπει, καὶ διδύμων φλεγμο-
νὰς ἐψηθεὶς ἐν οἴῳ θεραπεύει·
καὶ τοῖς ἐκ νεφροῦ δὲ τῶν παι-
δων καταπλασθῆναι, ἀνέχουσιν
ἐπιπολὺν θέρει· σμικρὴ δὲ καὶ δι-
φές. τὸ δὲ λέπει καταπλασθῆναι
μετὰ δὲ ἀλφίτου καὶ χρῆσις καὶ
ἐλαίῳ καταπλασθῆναι παλαιῷ,
χοιρῶδαις

χοιράδας διαφορεῖ καὶ ἕρια βά-
πται τὸ ἀφέλῃμα αὐτῶν. ὅπ-
τίδεται δὲ καὶ πρὸς ταῖς ἀπὸ
τῶν βδελλῶν αἰμορραγίας λε-
λεπσμένους εἰς δύο διαιρεθεῖς
καὶ δ' ὁ πρὸς ἀπέφυκεν, ἐπὶ χει-
ρὸς τυπούμενος κατὰ τὸ ἡμι-
τόμιον.

Πρὶ Κυάμης αἰγυπλίας.

Κεφ. ρκή.

Ο δὲ αἰγυπλίος Κυάμιος ὄν' ἔγιοι
10 πονηκὸν καλοῦσι, πλείους μὲ γί-
νεται ἐν αἰγύπτῳ, καὶ ἐν Ἀσίᾳ δὲ
καὶ ἐν κελικίᾳ ἐν ταῖς λίμναις εὖ-
εἰσκεται. ἔχει δ' φύλλον μέγα ὡς
πέτασον, καυλὸν δὲ πηχυαῖον,
καὶ δάκτυλον τὸ πᾶχος· αἰθῶς
15 δὲ ῥοδόχρουν, διπλασίον μήκω-
νος· ὅσῳ ἀπανθήσαν φέρει φυσίλα
παρὰ πλῆσι δυλακίσκοις, ἐν οἷς
κῡαμος μικρὸς ὥσπερ αἰῶν τὸ πῶ-
μα ὡς πομφόλυξ. καλεῖται δ' ἡ κι-
βώριον ἢ κιβώριον, διὰ τὸ ἔχει φυ-
20 τέαν τῇ κῡάμῃ γίνεσθαι αὐτὴ ἐν-
πιδεμόρου ἐν ἱκμοβάλλῳ. ὅπου τὸ
εἰς τὸ ὕδωρ ἀφιεμόρε. ῥίζα δὲ ὕ-
πτει παχύτερα καλὰ μὲ βιβρω-
σκομὴν ἐφάπτεται καὶ ὁ μὲν κολλο-
κασία καλουμένη. ὁ δὲ κῡαμος
25 βιβρώσκεται μόνῃ καὶ χλωρῷ. ἐν
ῥανθεῖς δὲ γίνεται μέλας, καὶ
μείζων τῷ ἑλληνικοῦ· ἔχων δὲ
ναμιν συπικνὴν καὶ εὐσώμαχον
ἀρμόζει δὲ δυσεντερικοῖς, καὶ
κοιλιακοῖς τὸ ἐξ αὐτῶν ἄλγεον

ἐπιπαρό.

strumas discutiūt: decocto ea-
rum lanæ inficiuntur. Faba dé-
pto cortice in illas partes diui-
sa, in quas suapte natura scindi-
tur, imponi solet sanguinis de-
fluxionibus ab hirundine con-
citatis: namque eas suppressit,
si semisecta apprimatur.

Faba Ægyptia.

Cap. CXXVIII.

Ægyptia faba, quā aliqui Pó-
ticam vocant, in Ægypto ple-
rūque prouenit: in Asiā etiam
Ciliciāq; lacubus, inuenit. Fo-
lia habet ampla, etiam si ad ar-
borum frondes comparentur,
caulem cubitalem, digiti crassi-
tudine: florē roseum dupla pa-
paueris amplitudine: & ubi flo-
re exuitur, fert folliculos vespa-
rum fauis similes, in quibus fa-
ba supra operculum, bullantis
ampullæ modo, pminet. Cibo-
rion aut Cibotion ideo nomi-
nant, id est arculā, quoniā sera-
tur ipsa, humenti glebæ mada-
ta, & ita in aquā demissa. Radi-
ce firmat harundine crassiore,
quæ cruda coctāve estur: ei co-
locasiæ nomen est. Faba virens
māditur, & exiccata nigrescit,
vulgarē magnitudine superat.
Adstringendi facultatem obti-
net, & stomacho vtilem: dy-
sentericis, coeliacisq; prodest,
insparso,

DIOSCORIDIS

insparso, polentæ vice, lomento : datur quoq; in pulste. Cortices in vino mulso decocti, si terni inde cyathi bibātur, magis proficient. Facit ad aurium dolorem, quod in earum medio viride spectatur, gustu amarum, si tritum & cum rosaceo coctum instilletur.

Lens. Cap. CXXIX.

Lens frequenti cibo aciem oculorum obtundit, ægrè concoquitur, stomachum malè habet, cumq; & intestina inflat : sed aluum cum cortice cocta sistit. Præstat in cibo, quæ facilimè coquitur, nihil atri in maceratione reddens. Vim habet adstringendi : qua ex causa aluum cohibet, si detracto antea cortice discoquatur accuratè, primaque aqua inter coquendum effundatur (quippe primum id decoctum ventrè resoluit) Somnia tumultuosa excitat, capiti, neruis, ac pulmone inutilis : melius suo fungetur munere contra alui fluxiones, addito cum aceto intybo, aut portulaca, aut beta nigra, aut baccis myrti, aut putamine punici, aut aridis rosis, aut mespilis, forbisve, pyris Thebanis, aut malis cotoneis, aut cichorio, aut plátagine, aut gallis ítegris :
quæ

ἐπιπαροξύμῳ ἀντὶ ἀλφίτου, καὶ πολτοποιήμῳ δὲ δίδεται. τὰ δὲ λίπη μάλλον ποιεῖ ἐφόμενα ἐν οἶνο μέλιτι, καὶ ποτιζόμενα πλῆθος κυάθων τεσσάρων, καὶ πρὸς ὠταλγίαν δὲ ποιεῖ τὸ ἐν μέσῳ ὁ χλωρὸν ἀντὶ, πικρὸν δὲ καὶ πικρὸν γαῖον συνῶρον συνελόμενοι τε καὶ ἐν σαζόμενοι.

Πρὶ Φακοῦ. Κεφ. ρκθ'.

* φακὸς βιβρωσκόμος συνελχὼς, ἀμβλυωπὴς, δύσπεπτος, καὶ 10 κοσμάχος, πνευματικός, τομάχου καὶ ἐντέρων, κοιλίας δὲ σαλτικός συν τῷ λέπτι ἐσθόμῳ. διαφέρει δὲ αὐτὸς ὁ ἐλαγὶς καὶ μηδὲν ἀνέκῃς ἐν τῇ διαβροχῇ μέλαν. Διῶσται δὲ ἐν 15 χειρὶ συπικνύῳ. ὁ δὲ κοιλίαν ἰσῆσι, περὶ πλεπιδὲς καὶ ἐπιδὲς ἐπιμαλῶς, τὸ πρὸς τὴν ἐν τῷ ἀφίψαι ὕδατος ἀποχρόμῳ, λυτικὸν γὰρ κοιλίας τὸ πρὸς τὸν ἀφίψαι αὐτῷ, ἐστὶ δὲ 20 δυσόνηρος, ἄσπετος πρὸς τὰ νευρώδη καὶ πνεύμονα καὶ κεφαλῇ. βέλτιον δὲ τὸ ἴδιον ἔρπον ἀποτελεῖ πρὸς τὰ ρεύματα τῆς κοιλίας, μεγέσθῃ αὐτῷ μετ' ὄξους, σίριως ἢ ἀνδράχνης, ἢ σέυτλου 25 μέλανος, ἢ μύρτων, ἢ σιδῶν, ἢ ῥόδων ξηρῶν, ἢ μεσπίλων, ἢ ὕων, ἢ ἀπίων θηβαϊκῶν, ἢ κυδωνίων μέλων, ἢ κυχωρίου, ἢ ἀρνογλώσσου, ἢ κυκίδων ὀλοκλήρων, αἱ πινεῖς

αἱ τινες μετὰ τὴν ἐψησιν ῥίπον-
 ται, ἢ ρόδους τῶ ἐπὶ τὰ ὄψα. Δεῖ δὲ
 τὸ ὄξος ἐπιμελῶς συγκαθεψέιν
 αὐτῷ· εἰ δὲ μὴ, ταρῆται τὴν
 κοιλίαν, καὶ ἀνατρεσπῶ δὲ 50-
 5 μάχου περὶ ἐπιδέντες τειάκον
 τα φακοὶ καὶ κατὰ ποδέντες ὠ-
 φελουσι· παρηγορεῖ δὲ καὶ ποδά-
 γρας σὺν ἀλφίτῳ ἐφθός κατε-
 ψιδεῖς καὶ κατὰ πλάδεῖς· μετὰ
 δὲ μέλιτος κόλποις κολλᾷ, ἐξ ἧς
 10 ρος περὶ ῥήπει καὶ ἔλκη ἀνα-
 καθαίρει· σὺν ὄξει δὲ ἐψιδεῖς
 σκληρώματα καὶ χοιράδας δια-
 φορεῖ· σὺν μελιλωτῳ δὲ ἢ κυ-
 δωνίῳ, ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καὶ
 δακτυλὶς θερεπύδης, ῥοδίνου με-
 15 γνυμῶν· ἐπὶ δὲ τῶν μειζόνων
 ἐν δακτύλῳ φλεγμονῶν καὶ κόλ-
 πων μεγάλων, σὺν σιδίοις ἢ ῥό-
 δοῖς ξηροῖς ἀφεφόρμος μγνυ-
 μῶν καὶ μέλιτος· περὶ νομάς
 δὲ γαργαρινκῆς ὁμοίως, ἢ καὶ
 20 θαλάσσης μγνυμῶν· περὶ δὲ
 φλυκταίνας καὶ ἐρπίτας καὶ ἐ-
 ρυσσιπέλατα καὶ χμέτλα ὡς
 περὶ εἰρηται· περὶ δὲ χονδριῶν-
 τας μάστιγας καὶ σπαργανώσεις ἐ-
 φόρμος ἐν θαλάττῃ ἀρμόζει κα-
 25 τὰ πλάδεῖς.

Πρὶ Φασιόλης. Κεφ. ρλ'.

Φασιόλος φυσιώδης, πνευμάτων
 κινήτικος, δύσπεπτος· ἐψιδεῖς δὲ
 χλωρὸς καὶ ἐφόρμος· κοιλίας καὶ
 λακκίκοις· περὶ δὲ ἐμῆς αὐθιῆς.

Πρὶ

quæ post decoctionem abiici-
 untur, vel vuarum rhois quæ
 obsoniis insparguntur: verum
 acetum cum eo diligenter per-
 coqui debet, aliàs aluum con-
 turbat. Contra subuersionem
 stomachi, triginta grana len-
 tis delibrata deuorari prode-
 rit: decocta cum polenta, &
 illita, podagras lenit: sinus cum
 melle glutinat, crustas rumpit,
 vlcera purgat, decocta in ace-
 to duritias & strumas discutit,
 cū cotoneo aut melilolo me-
 detur inflammationibus ocu-
 lorum, sedisque, addito rosa-
 ceo: sed in amplo sinu aut in-
 flammationibus sedis, quæ ma-
 ius remedium exigunt, cum pu-
 tamine punici, ac siccis rosis,
 adiecto melle, decoquitur: no-
 mis quæ in gangrænam euase-
 runt, adiuncta maris aqua, pu-
 stulis, & his quæ serpunt, igni
 sacro, peritionibusq; vt antea
 dictum est: contra mammas in
 quibus lac in grumos coit, &
 præ nimia sui copia profundi-
 tur, cocta in aqua maris, & il-
 lita auxiliatur.

Phasioli. Cap. CXXX.

Phasioli inflant, spiritus ci-
 ent, ægrè coquuntur. Virides ci-
 bo aluum emolliunt, ad vomiti-
 ones idonei.

Eruium

DIOSCORIDIS

Eruum. Cap. CXXXI.

Eruum parvus frutex omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valuulis habes, è quibus farina fit, nomine eruina, ad medendi vsus conueniens. Eruum capiti onerosum est, aluum esu turbat, sanguiné per vrinam extrahit, elixo boves saginantur. Parandæ farinæ ratio hæc est. Vberiora grana cādidáque deliguntur, permiscendóque aqua respergūt, donec sufficienter combibāt: postea torrétur, vsque dum hians cortex disrumpatur: moli-táque, farinario cribro incernuntur, postremò farina recóditur. Hæc aluo utilis est. Vrinam ciet, meliorem colorem efficit, sanguinem per vesicam aut aluum cum torminibus elicit, si largius in cibo aut potu assumatur: vlcera cum melle purgat, lentigines & vitia cutis in facie, & maculas totúmque corpus emédāt: nomas, gágras, duritiásque, serpere nó patiī māmārú duritias emollit, atra vlcera quæ theriomata vocāt, fauósque emarginat, carbúculos rūpit: cū vino subacta illitu morsib⁹ viperarú, canū, hominūq; medet: vrinæ difficultates, tenesmósque, ex aceto mitigat.

Eruum

Πρὶ Ορέγκ. Κεφ. ρλά.

Ορεβος γνῶνιμος θαμνίσκος, σενόφυλλος, λεπτὸς, ἔχων σπερμάτια ἐν λοβοῖς, ἐξ ὧν γίνεται τὸ χαλούμβιον ὀρέβινοι ἄλνεον, ὃ πρὸς τὴν ἰατρικὴν χρῆσιν ἀρμόζει. ἔστι δὲ καρπώδης, κοιλίας τε τραχικὸς ἐν βρωδείῃ, αἷμα τὲ δὲ οὖρον ἄγει. ἔσως δὲ λιπαίνει ἐφ' ὅς παραπνέμενος. σιευάζεται δὲ τὸ ἐξ αὐτοῦ ὀρέβιον οὖρον. ἐκλέξαι τὸν ἐν σφόδρῳ, καὶ λευκοὺς ῥᾶναι ὕδατι ἀναφυεῶν, ἰάσας τὲ ἐφ' ἰσχυρὸν συμπεῖν, φρίγι ἄχρῃς ἀν περιρράγῃ ὁ φλοιός. εἴτα ἀλίους καὶ διασείσας κοσκίνῳ, λεπτῷ ἀπόδεσ. ἔστι δὲ ἰς ἐν κοιλίῳ, οὖρητικόν, ἐν χροίας πικτικόν· πλωγαδὲν δὲ ἐν βρωτῷ ἢ ἐν ποτῷ, μετὰ σφόδρῳ αἷμα ἄγει διὰ κοιλίας καὶ κύστεως· χαθαίρει δὲ ἔλκεα σὺν μέλιτι, καὶ φακοὺς καὶ ἐφίληας καὶ σπύλους, καὶ τὸ λοιπὸν σῶμα· νομάς τε ἴσησι καὶ σκληρώματι, καὶ γαγγράναις· καὶ σκληρείας μαλάσσει τὰς ἐν μαστοῖς, καὶ θειώδι καὶ ἀνδρακας καὶ κνεία φειρρήτι· φουραδεῖς δὲ σὺν οἴνῳ κνωόδηκα καὶ ἀνδρωπόδηκα καὶ ἐρχόδηκα θειραπύει καρταπλαστόμενος· σὺν ὄξει δὲ δυσουείας, καὶ σφόδρους καὶ τεινεσμούς παύει. ἀρ-

μόζ

μᾶλλον δὲ καὶ τοῖς ἀποροῦσι, κα-
ρύου μέγιστος φρενὶ τὸν ληθῆν σὺν
μέλιτι. τὸ δὲ ἀφέψημα αὐτῆ κα-
ταπλούμνον, χυμέλα καὶ κη-
σμοὺς τοῦ ἐν σώματι διεξ-
5 πύει.

Πρὶ Θέρμ. Κεφ. ρλβ'.

Θέρμος ἡμερος γνάμμος, οὗ
τὸ ἄλευρον σὺν μέλιτι ἐκλει-
χόμενον, ἐλμυδας ἐκτενιάσει,
καὶ αὐτοὶ δὲ ἀποβεχέντες, καὶ
10 ἔμπυροι ἐδιόμυροι, τὰ αὐτὰ
δρῶσι. καὶ τὸ ἀφέψημα αὐτῶν
τὰ αὐτὰ ποιεῖ μετὰ πηγαίου καὶ
πεπέρεως ποδῆν· ὅθεν καὶ σπλη-
νικούς ὠφελεῖ. ἐπαύτημά τε
γαγγράνης ὅτι χηρίσιμον, καὶ θη-
15 ειομάτων, ψώρας ἀρχομένης,
ἀλφῶν, σπύλων ἐξανθημάτων
τε καὶ ἀχάρων. τὸ δ' αὐτὸ
καὶ καταμυλίων, καὶ ἐμβρύων
ἐπισπαστικόν, μετὰ σμύρνης καὶ
μέλιτος ἐν περὶδέτῳ. καὶ αὐ-
20 ρει δὲ τὸ ἄλευρον χρώτα καὶ πε-
λιώματα, καὶ φλεγμονὰς περὶ-
νει σὺν ἀγρίῳ καὶ ὕδατι· σὺν
ὅξει δὲ ἰσχάδας παρηγορεῖ καὶ φύ-
ματα, χοιράδας δὲ μεταβάλλει
ἐν ὅξει ἐψηθεὶς καὶ καταπλα-
θεὶς, καὶ ἀνδρακας περιρρήσκει.
25 μὲν ὕδατος δὲ ὀμβρεῖς ἐψηθέν-
τες οἱ δέρμιοι ἄχρι χυλώσεως,
σμήχουσι πρὸς σπον· καὶ δὲ χα-
μαλέοντος ῥίζης τοῦ μέλανος ἐψη-
θέντες, περὶβάτων ψώρας ἰῶν,

Eruum tabidis, qui alimentum
non sentiunt, tostu, & ad vncis
magnitudinē melle exceptum,
sumptumq; conuenit. Eius cre-
mor perniones, & pruritus in
toto corpore, sanat fouendo.

Lupini. Cap. CXXXII.

Satiuus lupinus notus est, cu-
ius farina cum melle delinctu,
aut potu vētris animalia expel-
lit. Ipsi quoq; macerati, & cum
sua amaritudine esiti, eadē effi-
ciūt. Decoctū eorū idem mu-
nus prestat, cum ruta & pipere
potum: quare lienosis prodest.
Eodē vlcera tetra, quæ therio-
mata vocant, gangrænas, inci-
pientē scabiem, eruptiones pu-
stularū, vlcera in capite manā-
tia, vitilignes, maculāsque fo-
uere vtilissimū. Menses & par-
tus extrahit, cum myrrha &
melle subditum in vellere. Eo-
rum farina cutem liuorēsque
corrigit, inflammationes cum
polenta & aqua mitigat, tuber-
cula & coxendicum cruciatus
ex aceto lenit, strumas in ace-
to cocta illitāque dissipat, car-
bunculos rumpit. Decocti coe-
lesti aqua, donec in cremorem
lentescant, faciem abstergunt:
medentur pecorū scabiei, cum
radice nigri chamaeleontis, ita
vt tepente decocto abluantur.

DIOSCORIDIS

Cit vrinam radix cum aqua
cocta. Lupini triti, vbi mace-
ratu dulcescere coeperint, cum
aceto poti, fastidium de-
trahunt, & cibi auidi-
tatem faciunt.

Lupinus sylvestris.

Cap. CXXXIII.

Gignuntur & sylvestres lu-
pini, sativis similes, sed omni-
no minores, qui eadem quæ
sativi possunt.

Rapum. Cap. CXXXIII.

Decocta rapæ radix alit, in-
flationem parit, humentem ac
fluxam carnem creat, venerem
stimulat: decocto podagræ,
pernionesque fouentur, con-
tritòque rapo atque imposi-
to iuvantur: si excavata radi-
dici rosaceum ceratum adiga-
gatur, & feruenti cinere elique-
scat, exulceratis pernionibus
proficiet. Cymæ eius decoctæ
manduntur, & vrinam ciunt.
Semen antidotis & theriacis,
præsertim quæ sensum dolo-
ris auferunt, anodyna vocant,
idoneum est: potum contra ve-
nena salutare est, venerem cõ-
citat. Rapum muria cõditum,
minus alimēti sufficit: sed mul-
to magis appetentiam recreat.

Sylvestre rapū. Ca. CXXXV.

Sylvestre rapum in aruis na-
scitur,

* ἐκλελεμμένων τῷ ἀφελήματι
χλιαρῶ. ἡ δὲ ῥίζα ἐψηθεῖσα σὺν
ὕδατι καὶ πεθείσα, ἔρησιν κινεῖ. οἱ
δὲ ἀπογλυκαίνοντες λεῖοι σὺν
ὕξει πεθέντες σομάχου ὀσίων
παραύρσι, καὶ ἀνορεξίας ἰσθύνονται. 5

Πρὶ ὁσμῆς ἀγρίου.

Κεφ. ρλγ'.

Γίνεται δὲ καὶ ἄγριος,
ἐμφερὲς τῷ ἡμέρῳ, κατὰ πάντα
δὲ μικρότερος, ποιῶν ὅσα καὶ ὁ
ἡμερος.

10

Πρὶ Γογγύλης. Κεφ. ρλδ'.

Γογγύλης ἡ ῥίζα ἐφθὴ τρυφί-
μος, πνευματώπην, σαρκὸς πλα-
δαρᾶς ἡμνητικῆς, ἀφροδισίων πα-
ρερμητικῆς. τὸ δὲ ἀφελήμα αὐ-
τῆς, πεδάχρας καὶ χιμέτλαν ἐ- 15
στὶ κατατίλημα, καὶ αὐτὴ δὲ λεῖα
καταπλασσομένη ὠφελεῖ· εἰ δὲ
πρὸς ἐγγλύψας τὴν ῥίζαν, κηρω-
τὴν ροδίνην ἐπὶ αὐτῇ ἐπὶ δερ-
μοσποδᾷ τήξει, ποιεῖ πρὸς τὰ
εἰληκμῆρα χιμέτλα. ὁ δὲ ἐξ αὐτοῦ 20
τῆς ἀσπύρατος βιβρωσκεται ἐφ-
θός, ἔστι δὲ διουρητικός. τὸ δὲ
σπέρμα εἰς ἀντιδότους καὶ θηρια-
κὰς ἀνωδυνόους εὐδαιμον βοηθεῖ
δὲ καὶ τοῖς θανασίμοις πεθόν, πα- 25
ρερμᾶ καὶ πρὸς ἀφροδίσια. ἀλ-
μυθεῖσα δὲ ἀποφωτέρα γίνε-
ται βιβρωσκομένη· τὰς μὲν τοι
ὀρέξεις ἀναλαμβάνει.

Πρὶ Γογγύλης ἀγρίας. Κεφ. ρλέ.

Ἡ μὲν τοι ἀγρία ρογγύλη φύεται ἐν
ἀγρίαις,

ἀρέραις, δάμνος πηχυαῖος τὸ ὕψος, πολὺκλαδός, ἐξ ἄκρου λείος, φύλλα ἐχρούσα λεία, δακτύλου τὸ πᾶχος, ἢ καὶ μείζονα· καρπὸν δὲ ἐν λοβοῖς καλυκώδεσιν·
 5 ἀγοιχθέντων δὲ τῶν περικαρπίων, ἔσωθεν ἄλλος κεφαλοειδὴς ἔστι * λοβός, ἐν ᾧ σπερμάτια μέλανα, θραυσθέντα δὲ λευκά ἐνδοθεν. μίγνυται δὲ σμήγμασι περὶ σῶπου καὶ τῷ ἄλλῳ χρω-
 10 τός· ὅσα δὲ ἀλεύρων γίνεται θερμίνων, ἢ πυρένων ἢ αἰείνων ἢ ὀρεθίων.

Πρὶ Βενιάδος. Κεφ. ρλς'.

Βενιάς, καὶ ταύτης ἡ ῥίζα ἐφθῆ φουσώδης ἐστίν, ἥ πῖον δὲ τρεῖσι
 15 μος· ποιεῖ γὰρ τὸ σπέρμα αὐτῆς ἀνεργῆ τὰ θανάσιμα περὶ πνόμῃον, μίγνυσι δὲ καὶ ἀντιδότοις, ἀλμυρύνεται καὶ ταύτης ἡ ῥίζα.

Πρὶ Ραφανίδος. Κεφ. ρλς'.

* Ραφανίς, καὶ αὕτη πνευματῶν
 20 ἡμνητικὴ καὶ θερμαντικὴ, εὐσμομος· καὶ εὐσμάχος, ἐρευνκτικὴ δὲ ὅτι καὶ ἐρητικὴ, εὐκοίλιος εἰς τὴν αὐτὴν ἐπιλαμβάνει μᾶλλον συνερροῦσαν τῇ ἀναδόσει. περὶ πνόμῃον ἢ μετεωρίζῃ πῶν τοσούτων·
 25 ἀρμόζει δὲ καὶ τοῖς ἐμείν μέλλουσιν περὶ πνόμῃον. ἀκριβοῖ δὲ καὶ τὰς αἰδιόσεις· ἐφθῆ δὲ ποιεῖ λαμβανόμενῃ βήσοισι χρονίως, καὶ τοῖς πᾶχος ἡμνησιν ἐν τῷ ρα. καὶ δὲ φλοῖος αὐτῆς μετ' ὀξύμελιτος λαμβανόμε-

scitur, fruticosum in cubiti altitudinē assurgēs, ramosū, læue in cacumine folia fert læuia, digitali latitudine, aut maiora & fructum in filiquis calyculatis: cūmq; eorū inuolucra aperiūtur, alia intus filiqua spectatur, quæ quandā capitis speciē præbet, in qua semina paruula cōcipiūtur, foris nigra intus alba. Additur in medicamēta quib⁹ ad detergendā cutē in facie, totoq; corpore, vtimur: præsertim quæ ex lupini aut arui, tritici aut lolij farina, fieri solent.

Napus. Cap. CXXXVI.

Cocta napi radix inflat, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat, antidotis admiscetur, conditur sale radix.

Radix Cap. CXXXVII.

Radix (q̄ græcis raphan⁹ dicit⁹) excalfacit, flatus gignit, ori suavis est: sed stomacho aduersa, ruēt⁹ ciet, urinā pellit, alio aptior: summo tamē cibo sumi debet, quo magis ei⁹ distributionē adiuuet, quā aut p̄sumit, cibū suspendit: quare vomituris comodissimē datur ante cibū. Sésuum aciē excitat: decocta cōtra veterē tussim, & pituitæ crassitiē in pectore, effica est. Cortex ex aceto mulso
 o iij celerius

DIOSCORIDIS

celerius vomitiones mouet: hydropicis commodissime illinitur, lienosis utilis, sugillata cum melle rapit, & nomas amolitur: cōtra viperarum ictus auxiliatur, alopecias ad pilum reducit, lentigines cum loliacea farina emendat, his qui fungis stragulantur, tam cibo quàm potu salutaris est. Semen vomitiones facit, vrinam mouet, menses cit, lienem extenuat, cum aceto illitum gangrænas validissime emarginat, : coctum cum aceto mulso anginis perquàm vtiliter gargarizatur, contra cerastis morfus, potū ex vino auxilio est.

Rhaphanus syluestris.

Cap. CXXXVIII.

Syluestri raphani, quā Romani armoraciā vocāt, folia fatiuo similia, sed magis lapsanā imitatur: radix gracilis, tenera, subacris. Tam foliū q̄ radix in olera recipitur: sed hæc excalfacit, vrinā concitat, estuosa est.

Sifer. Cap. CXXXIX.

Sifer vulgò cognitum, cuius radix decocta ori grata est, & stomacho, utilis, vrinam ciet, & appetentiam inuitat.

Lapathū siue rumex. Ca. CXL.

Ex generib⁹ rumicis, oxylapathum

λαμβάνομενος, ἐμετικώτερος ἀρμόζων ὑδρωπικοῖς, καταπλάσσει δὲ ἐνδετεῖ καὶ σπληνικοῖς σὺν μέλιτι δὲ νομας ἐφίστησι καὶ ὑσώπια αἶρει. βροχεῖ καὶ ἐχθρόκτοις, καὶ ἀλωπεκίας δασυνεῖ· φασ καὺς ἀποσμήχει σὺν αἰρίνῳ ἀλεύρῳ, βροχεῖ καὶ τοῖς ὑπὸ μυκήτων πιγμύδοις βεβρωσιόμενος ἢ πινόμενος καὶ ἐμμέλω ἀγει. τὸ δὲ σπέρμα αὐτῆς ἐμετικόν, οὐρητικόν, σπληνὸς καὶ δαιρετικόν ἰοπινόμενον μετ' ὄξους· σιναγχοῖς τε βροχεῖ ἀφελήδεν σὺν ὄξυμέλιτι διεμῶν εἰς ἀνακαρῆεισμα, καὶ πρὸς κεράσι δῆγμα σὺν οἴνῳ πινόμενος βροχεῖ, * ὀππλάσεν δὲ μετ' ὄξους καὶ γαγ- 15 χασίας ἐν τῷ σπέρματι φεραθήσεται.

Πρὶ Ραφανίδος ἀγρίας.

Κεφ. ρλ'.

Ραφανὶς ἀγρία φύλλα ἔχει ὅμοια τῇ ἡμέρῳ, πρὸς τὰ τῆς λαμβάνουσας μάλλον· ῥίζα δὲ ἐ- 20 χνή, μαλακή, ὑπόδριμς, λαχανεύεται δὲ τὰ φύλλα καὶ ἡ ῥίζα * ἐφθά· ἐστὶ δὲ δερματικὴ, οὐρητικὴ, χαυματώδης.

Πρὶ Σισαρέ. Κεφ. ρλθ'.

Σισαρεν γινώμενον, οὗ ἡ ῥίζα 25 ζα ἐφθῇ κύστος, κύστοςμαχος, οὐρητικὴ, ὀρεξέως πωρεκτική.

Πρὶ Λαπάθου. Κεφ. ρμ'.

Λάπαδον, τὸ μὲν αὐτῇ ὄξυλά- 30 παδον

παθον λέγεται. φυτόν μιν ἐν ἑλε-
σι, σκληρὸν κατὰ ἄκρα, ὑπόξυ. τὸ
δὲ πικρὸν τὸν οὐχ ὁμοιον τῷ
πρώτῳ. τείτον δ' ὅστιν ἄχειον,
μικρὸν, παρ' ἑμὸν ἀγρογλώσσῳ,
5 μαλακόν, ταπεινόν. ἐστὶ δὲ καὶ
τέταρτον εἶδος αὐτοῦ, ὃ ἐνίοι ὀξα-
λίδα ἢ ἀναξυρίδα ἢ λάπαθον κα-
λοῦσιν, ἔφυλλα ὁμοια τῷ ἀγρίῳ
καὶ μικρῷ λάπαθῳ, χαυλὸς ἔμ-
βας, κατὰ τὸ ὑπόξυ, ἐρυθρὸς, δρι-
μύς, ἐπὶ τῷ χαυλῷ, καὶ ἐπὶ τῶν
10 φραφιδάδων. πάντων δὲ τὸ λά-
χανον μαλακᾷ κοιλίαν ἐλπίδεν.
ὥμὸν δὲ κατὰ πλατύρριον, με-
λικερίδας* σὺν ῥοδίῳ ἢ κρόκῳ
διαφορεῖ. τὸ δ' ὡς ἔμα τῷ ἀγρίῳ
15 καὶ τῷ ὀξυλάπαθῳ καὶ τῆς ὀξαλί-
δος, πίνεται ὡφελίμως μὴ ὕδα-
τος ἢ αἶνου, πρὸς δυσεντερίας καὶ
κοιλιακὰς διαρροίας, καὶ ἄστυ
σομάχου, καὶ πρὸς σκορπίου πλη-
γῇ. καὶ εἰ πρὸς τοῖς δὲ πρὸς οὐδὲν
20 πείσει. πικρὸν αἰ δὲ ῥίζαι αὐ-
τῶν ἐφθαλμῶν σὺν ὀξεί καὶ ὥμῳ κα-
ταπλαθεῖσαι, θάραπυνοισι λέ-
πτας, λειχῶνας, ὄνυχας λε-
πτας δὲ τὸ πρὸς ἀνὰ ῥίβειν τὸ
πρὸς ἐν ἡλίῳ νίτρω καὶ ὀξεί. πρὸς τὴν
25 δὲ καὶ κνημοῦς τὸ ἀφ' ἡμῶν αὐ-
τῶν πρὸς ἀνὰ ῥίβειν. παρ' ἑμὸν
ῥυτί τὸ ὡτάριον καὶ ὀδονταλ-
γίαν ἐλπίδεν. ἐν οἴῳ καὶ δια-
κλυζομένῳ, διαφορῶσι καὶ χοι-
ρέας καὶ παρ' ἑμὸν ἐφθαλ-
μοῖς

pathum vocant, quod in acutū
tendit, dura habēs extrema, in
palustribus nascēs. Alius est fa-
tius, illi dissimilis. Tertiū gen^o
sylvestre, parvū, plantagini p-
ximū, humile & molle. Quar-
tum est quod alij oxalida, alij
anaxyrīda, aut lapathon vocāt.
Folia ei^o sylvestri ac exiguo ru-
mici similia, caule nō magno,
femine subacuto, rubēte, acri,
in caude & agnatis appēdici-
bus, emicante. Omnium deco-
cto olere alius emollii. Crudi-
illitu, melicerides, rosaceo aut
croco adiecto, discutunt. Syl-
vestris & oxylapathi, & eius
quam oxalida nomināt, semen
ex aqua aut vino vtiliter bibi-
tur, contra dysenterias, & coe-
liacorum affectus, stomachi fa-
stidia, scorpionum ictus. Quod
si quis in potu præsumat, nihil
molesti ex ictu patietur. Radi-
ces ex aceto coctæ aut illitæ
crudæ, lepras, impetigines, &
scabrosos vngues perfanāt: sed
antea locus aceto & nitro in
sole perfricandus est. Pruritus
corporis, decoctum earum se-
dat, si foueatur, aut in foliis
balarum confricetur. Coctæ
in vino & instillatæ, auriū den-
tiūq; dolorem mulcent, stru-
mas parotidasque discutunt,
o iij lienē

lienem cum aceto extenuant. Aliqui amoliendis strumis radicum gestamine vtuntur, eas collo appendentes. Tritæ & admotæ fœminarum profluvia sistunt, cum vino autem potæ regio morbo medentur, calculos vesicæ comminuunt, menses ciēt, scorpionum ictibus auxiliatur.

Hippolapathon. Ca. CXLI.

Hippolapathon olus est magnū, in paludibus nascens: eadem habet vires, quas supradicta rumicis genera.

Lampfana. Cap. CXLII.

Lampfana syluestre olus est: plus alit q̄ rumex, & stomacho vtilius. Cuius folia caulésq; coquantur in cibo.

Blitum. Cap. CXLIII.

Blitum estur oleris modo, alio vtile est: nullius in medicina vsus.

Malua. Cap. CXLIII.

MALVA fatiua esui longè aptior syluestri: stomacho aduersatur, aluum iuuat, sed multò magis caules: interaneis & vesicæ vtilis. Cruda folia cum salis exiguo māducata, ægilopas ex melle fannant: verum cum cicatricem trahere coeperint, ea demum citra

συνὸ οἶνω καταπλαθεῖσαι, πλῆ-
να δὲ συνὸ ὄξει. καὶ ἐν δέσματι δέ-
πνιες χεῖνται ταῖς ῥίζαις πρὸς
χοιράδας, πειράζοντες τῷ τρα-
χήλω. ἰσάσι καὶ ροῦν ζωακτεῖον
πρὸς δεῖσαι λείαι, ἀφειψιδεῖσαι δὲ
συνὸ οἶνω καὶ πνιόμεναι, ἰκτερι-
κοὺς ἀποθεραπύουσι, καὶ λίθους
τοὺς ἐν κύσει θρύψκον, ἐμμηνά-
τε ἄριστοι, καὶ σκορπιόπληκτοις
βοηθεύουσιν.

Πρὶ Ἰππελάπαθου. Κεφ. ριμά. ια

Ἰππελάπαθου λάχανόν ἐστι
μέγα ἐν ἕλει τῷ ἡρώδῳ. Δύ-
ναται δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τοῖς
πρὸς ἐνέμενους.

Πρὶ Λαμψάνης. Κεφ. ριμά. ιβ

Λαμψάνη λάχανόν ἐστιν ἄρι-
στον. πρὸς μάλιστα καὶ ἐν στομαχῷ
πρὸς τῷ λατάθου, καὶ τὰ φύλλα
καὶ ὁ χαυλὸς ἐδίεται ἐφάδα.

* Πρὶ Βλήπης. Κεφ. ριμά. ιγ

Βλήπη λαχανεύεται καὶ τὸ πο-
τὸν δὲ ἐν κοίλῳ, οὐδὲ μὲν ἔχον 29
φαρμακῶδη διώκει.

Πρὶ Μαλάχης. Κεφ. ριμά. ιδ

Μαλάχη ἐδωδιμώτερα μάλ-
λον ἢ κηπευτὴ τῷ χειρταίῳ κακο-
στόμαχος ὅτι καὶ ἐν κοίλῳ, καὶ μὴ
λον οἱ χαυλοὶ ἐντέροις δὲ καὶ κύ- 25
σι φέλιμοι. Διωκόμεν ὅτι ἔχει τὰ
φύλλα ὡμὰ καταπλαθέντα καὶ
μετὰ ὀλίγων ἄλτων μασηθέντα
ἀγνῶπα ἀνασπυάζειν συνὸ μέ-
λιτι πρὸς μὲν τοῖς τῇ ἀπουλώσει

δύναται

δίχα τ' ἄλλων χρῆσθον αὐτῇ. ποιῇ
 καὶ πρὸς μελισσῶν καὶ σφηκῶν πλη-
 γὰς καὶ ἀπλαιοσυμῶν καὶ ὧν περὶ
 σιταὶ δὲ πρὸς αὐτῷ. ὁ μὲν λείαν
 σὺν ἡαίῳ, ἀπληκίος διαμυρῶ. μῦ-
 5 δὲ ἔρου καταπλαθεῖσα, ἰχθῦρας
 καὶ πίπυρα ἰᾶται. ἐφθὰ δ' ὅτι λεία τὰ
 φύλλα καὶ σὺν ἡαίῳ ἐπιπιδέματα,
 πνέμεντα καὶ ἐρσιπέλατα ὠφε-
 λεῖ. τὸ δὲ ἄφελμα αὐτῆς μαλα-
 κτικὸν ἐγκάδισμα ὑστέρας, εἰς τε
 10 ἐνέματα πρὸς δηγμοὺς ἐντέρων
 καὶ μήτρας καὶ δακτυλίσκῳ μόδιον.
 ὁ δὲ ζωμὸς σὺν τῷ ῥίζαις βοηδεῖ
 ἐφόδρος πᾶσι τοῖς θανάσιμοις,
 ξεραὺν δ' αὖτε συνεχῶς πίνοντας. ὡ-
 φγεῖ δὲ καὶ φλογητοὺς καὶ γά-
 15 λα κατασπᾶ. ὁ δὲ καρπὸς μυρ-
 τὸς αὐτῶν λωτοῦ ἀγρίου σπέρμα-
 τος, πινόδρος μετὰ οἶνε, τὰ περὶ
 κύστιν δὴ γήματα πρὸς αὐτῇ.

Περὶ Ἀτράφαξ. Κεφ. ρμῆ.

20 Ἀτράφαξ οἱ δὲ, χρυσολάχα-
 γον, λάχανον θρόειμον. διττὸν, τὸ
 μὲν ἄγιον, τὸ δὲ κηπευτόν. λα-
 χανεύεται δὲ ἐφθόν. ἔστι δὲ κοι-
 λίας μαλακτικόν, καταπλασ-
 μόνον δὲ ὁ μόνον τε καὶ ἐφθόν, φύ-
 ρεθλα διαφορεῖ. ὁ δὲ καρπὸς αὐ-
 25 τῶ πινόδρος μετὰ μελικράτου,
 ἰκτερον πρὸς αὐτῇ.

Περὶ Κράμης.

Κεφ. ρμς'.

Κράμη ἢ ἡμερὸς ἐνκοίλιος,
 ἀκρέζεδος ἐδιορμῆ, κατε-
 30 δεῖται

citra falem vtendum est. Con-
 tra aculeatos apium vesparum
 que ictus, illita efficax est: ea-
 dem cruda cum oleo trita per-
 uncti, non feriuntur. Ulcera
 manantia in capite, furfurisque
 cum vrina sanat. Sacris igni-
 bus & ambustis decocta fo-
 lia, tritaque, vtilissimè ex oleo
 imponuntur. Eius decoctum
 vulvas infusione mollit: pro-
 dest erosionibus vesicæ, & in-
 testinorum, vulvæ, sedisque, cly-
 stere infusum. Ius decoctæ cū
 radice sua, contra omnia ve-
 nena auxiliatur, si continuò à
 bibentibus reuomatur. Cōtra
 phalangiorum morsus reme-
 dio est, lac euocat. Semen in vi-
 no potū addito loti syluestris
 femine, vesicæ cruciatus lenit:

Atriplex. Cap. CXLV.

Atriplicè aliqui chrysolacha-
 non vocāt, cognitum olus est.
 Duo eius genera, sylvestre &
 fatium. Coctum estur, vt o-
 lus. Alium mollit, panos discu-
 tit, siue crudum, siue coctum
 illinatur. Semē cum aqua mul-
 sa potum, regium morbum
 sanat.

Brassica. Cap. CXLVI.

Brassica fatiua aluo est ido-
 nea, si modo leuiter feruefa-
 cta edatur (nam percocta al-
 35 uum

DIOSCORIDIS

uum sistit, sed multò magis bis cocta, aut quæ in lixiuio coquitur) stomachum autem malè habet. acrior est æstiuæ. In Ægypto propter amaritudinem non estur. Cæcutiëtibus, & tremulis esse prodest: summo cibo sumpta crapulam discutit, & vini noxam restinguit. Melior stomacho cyma, sed acrior, & ad ciendum vrinam validior. Ea condita stomacho inimica est, aluum conturbat. Crudus succus cum nitro & irideuoratus aluum emollit: cum vino quoque epotus viperarum moribus auxiliatur: cum fœnigræci farina podagris & articulorum vitiis illinitur: prodest & sordidis vlceribus & vetustis illitus: caput purgat naribus infusus: menses extrahit cum loliacea farina inditus. Folia per sese illita, aut cum polenta trita, conferunt inflammationibus, tumoribusque: epinyëtidas, ignem sacrum, leprásque sanant: carbunculos ex sale rumpunt: fluentes capillos retinent: cocta, addito melle, aduersus depascentia vlcera, gangrænásque valent: lienosisque ex aceto cruda profunt. Mása, deuorato succo, retusam vocem instaurant.

Deco-

δείσα δὲ κοιλίαν ἴσησι, καὶ μέλλον ἢ δίστιφος καὶ ἐν κοιλίᾳ ἐλθὼν δείσα, κακοσόμαχος ὅ καὶ δριμυτέρα ἢ διεσνή. ἡ δὲ ἐν αἰγυπλίῳ διὰ πικρίαν ἀβρωτος. ἀμβλυωπὲς ὅ βροχθεὶ καὶ βρομάσειν ἐδιόμα-
5 νη, καὶ τὰς ἐκ κραυπάλης καὶ οἴνου κακίας σθένισιν ἐπλαμβανομένη. τὸ δὲ ἐξ αὐτῆς κύημα ἐντομαχόπρω μὲν, δριμύτερον δὲ καὶ ἐρηπικώτερον. ταραχθέν ὅ κακοσόμαχος, καὶ κοιλίας ταρακτικόν. ὁ δὲ ἰα-
χρὺς αὐτῆς ὥμους μὲν ἱρίδος καὶ νίτρου καὶ ταπινόδρους, κοιλίαν μολάττι· μέν οἴνου δὲ ποθείς ἐχοδή-
κτως βανθεῖ. (ὡν τῆλινω δὲ δῆεν-
ρω καὶ ἐξ ἡ, πεδαγχοῖς καὶ ἀφθρη-
πικοῖς ἢ καὶ ἰσὶ ῥυπαροῖς ἐπιπλα-
15 τίμορος καὶ παλαιῖς ἀφύκει· ἐγ-
χερόμορος τε καὶ ἑαυτῇ ἴσιν, κα-
θαλὼν καὶ αἰεὶ μὲν δὲ αἰεὶν ἀ-
λεύρη φερεσθεῖς, καὶ ταμνία ὅ-
ρη. τὰ ὅ φύλλα καὶ ἀπλασμένα
καὶ ἑαυτὰ ἢ μὲν ἀλφίπων λεία, 20
πιεῖ φερεσθεῖς πᾶσαν φλεγμονὴν καὶ
οἰδήματα, καὶ ἐρσιπέλατα δὲ καὶ
ἐπινυκτίδας καὶ λέπρας ἰάται·
μὲν ἄλλων δὲ ἀνδρακας φειρήτ-
ται· ἴσιν δὲ καὶ ῥυσιν τῶν ἐν κα-
φῇ βιχῶν ἐφόμορος ὅ καὶ μυζή-
25 νόμος μέλιτι, πρὸς νομὸς γαστρει-
νῶν ποῖσι. ὥμω δὲ ἐδιόμορος μέν
ὅζης σπληνικοῖς ὥφθει. διαμασ-
σάμορος δὲ, φωνῆς ἀποκοπὴν κα-
δίσησι τοῦ χυλοῦ καὶ ταπινόδρους.
τὸ δὲ

τὸ δ' ἀφέλημα δ' αὐτὸ, κοιλίαν καὶ
 ἔμμηνα κινεῖ πνιγμένον. τὸ δ' αὐθις
 ἀτόκιον μὲν δ' ἀποκύνει πρὸς
 δὴν ἐν πρὸς. τὸ δ' σπέρμα μάλι-
 στα δ' ἐν αἰγύπῳ γνομένης πνι-
 γόμενον, ὅμινθας ἐκπινάσκει μίσην
 δ' καὶ εἰς ἀντιδότας κοιλιὰς. πρό-
 σωπόν δ' ἀποκαθαίρει καὶ φακὸς. οἱ
 δὲ καυλοὶ χλωροὶ καίντες σὺν τῇ
 ῥίζῃ καὶ ἀνθηφύοντες σέας χοι-
 ρεῖω πηλαῖω, πλευρὰς χελόνια δὲ
 10 γήματα ἐπιτεθύντες παύουσιν.

Περὶ Κράμβης ἀγρίας.

Κεφ. ρμζ'.

Κράμβη ἀγρία φύει ὡς ἐπι-
 τοπλείσον ἐν παρὰ θαλάσσις καὶ
 κρημνώδει τόποις, ἰοικύει τῇ ἡμέ-
 15 ρῃ, λευκότερα δὲ ὅτι καὶ δασυτέ-
 ρα καὶ πικρά. τὸ δὲ κύημα αὐτῆς
 ἐν κοιλίᾳ ἐληθὲν ἐκ ἄσμομον. Δύ-
 ναμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα κατα-
 πλασθέντα, κολλητικὴν τραυμά-
 των, καὶ διαφορητικὴν οἰδημάτων
 20 τῇ καὶ φλεμονῶν.

Περὶ Κράμβης θαλασσίας.

Κεφ. ρμη'.

Ἡ δ' θαλασσία λεγομένη κράμ-
 βη, ἐξήλλαξεν τῷ παντὶ τῇ ἡμέρᾳ,
 ἔχουσα φύλλα ἐμμήκη τῇ στρογγύ-
 25 λῇ ἀριστολογία ὁμοία ἐκπέφυκε δ'
 ἑκάστον αὐτῇ ἀπὸ κλονίων ὑδρῶ-
 δρων ἐξ ἐνὸς μόχου ὡς αὐτὸς κινεῖται
 ἔχει δ' καὶ ὅσον λευκὸν, καὶ πολὺν ἔστι
 δ' τῇ γένει ὑφ' ἡμῶν, καὶ ποτὶς
 ἔμικρος, καὶ παρὰ τὴν σύστασιν.

ὅλη

Decoctum eius potu, aluum &
 menses ciet. Flos post conce-
 ptionem in pello subditus, par-
 tum abortu vitiat. Semen eius,
 præsertim quæ in Ægypto na-
 scitur, potum tineas repellit: in
 antidota theriaca additur, fa-
 ciei cutem lentiginesq; expur-
 gat. Virentes cauliculi cū radi-
 ce cremati, & adipe porci ve-
 tusto excepti, diuturnos late-
 rum dolores mitigant.

Brassica sylvestris.

Cap. CXLVII.

Syuestris brassica, mariti-
 mis præruptisque locis, ma-
 gna ex parte gignitur: fatiua
 similis, sed candidior, hirsu-
 tiórque, amara. Cuius cyma in
 lixiuia cocta, ori non insuavis.
 Folia illitu vulnera congluti-
 nant, & inflammationes tumo-
 resque discutunt.

Brassica marina.

Cap. CXLVIII.

Marina brassica à fatiua
 prorsus abhorret, quod folia
 ferat rotundæ aristolochiæ, præ-
 longa, tenuia: singula à ramu-
 lis rubentibus exeunt, singu-
 lari, vt hedera, pediculo: al-
 bo succo prædita est, sed pau-
 co, falso gustu, & aliquan-
 tum amaro, pingui concretu.

Herba

DIOSCORIDIS

Herba in totum stomacho inimica, acris: vehementissimè aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniã cū pingui carne.

Beta. Cap. CXLIX.

Beta duorum generū est, è quibus nigra coquitur cū lentacula, vt ventrè sistat: quod magis radice eius prestatur. Cādi- da aluo utilis est. Vtraq; tamen propter nitrosum humorē: quē habet in se, noxij succi est. Vnde succus earū cū melle nari- bus indit⁹, caput purgat, auriū doloribus auxiliatur. Decoctū radice & foliorū, furfures len- dēsq; deterget, perniones fotu mitigat. Crudis foliis vitilignes, nitro antea perfrietas: alopeciarū inanitates, scapello prius exasperatas: atq; depascētia vl- cera, illini prodest. Eruptioni- bus papularū, igni sacro, am- bustisque, cocta medetur.

Portulaca. Cap. CL.

Portulacæ vis adstringit: ca- pitis doloribus, inflammatio- nibus oculorū, cæterisq; cū po- lenta imponitur: ardoribus sto- machi, sacro igni, vesicæ dolo- ribus, auxilio est: commandu- cata, dentiū stupores sedat: sto- machi & intestinorum æstua- tionem, fluxionesque mulcet:

renes

ὅλη δὲ ἡ πῖα, κακὸς ὁ μαχός, δει-
μῖα, κοιλίας λυτικώτατῃ ἐφθῆ
βρωθεῖσα. συνέφοισι δὲ αὐτῇ ἔ-
νιοι διὰ τὴν δριμύτητα τὰ λιπα-
ρὰ τῶν κριῶν.

Πεὶ Τεύτλου. Κεφ. ρμβ'. 5

Τεύτλον διαπνέον ὄντι, ὡν τὸ μῆ-
λόν σαλπικώτερον κοιλίας σὺν
θακῇ ἐφθῆν· καὶ μάλλον ἡ ρίζα.
τὸ δὲ λευκὸν ἐν κοιλίῳ. ἀμφοτέ-
ρα δὲ κακόνυμα διὰ τὸ ἐν αὐ-
τοῖς πρῶτες. ἔστι δ' ὁ χυλὸς αὐτῶν 10
καταβρεχέει κεφαλὴν ἐπὶ ἐγγερόμε-
νος μὲν μέντες, καὶ ὠταλγίας ὠ-
ρεῖται. τὸ δὲ τῶν ριζῶν καὶ τῶν
φύλλων ἀφίψιμα, πύρον καὶ κο-
τίδων σμηκτικόν, καὶ χιμύτης
περὶ τὴν κεφαλὴν κατατλούμενον. ὡ- 15
μοῖς δ' τοῖς φύλλοις καταπλάσ-
σῃ δὲ ἀλφειὸς περὶ τὴν πρῶτην
ταῖς καὶ ἀλωπεκίας κατακρηδεύ-
σας, καὶ τὰ νεύματα ἔλκει. ἐφθῆ
δ' ἐξ αὐτῶν καὶ πνεύματα καὶ
ἱεροπύλατα ἰᾶται. 20

Πεὶ Ἀνδράχης.

Κεφ. ρν'.

Ἀνδράχης δυνάμειν ἔχει συ-
πτικὴν· καταπλασθεμένη δὲ μὲν
διήφρων κατὰ τὴν ἀλγίαν καὶ ὁ-
φθαλμῶν φλεγμοναῖς καὶ ταῖς δι- 25
λαις. καὶ στερμαχίου πυρῶσσι καὶ ἐ-
ρισσιπέλοις, καὶ κίστεως ἀλγίαν
συνδραμεῖ· βρωθεῖσα δὲ αἱμα-
δίαν καὶ στερμαχίου καὶ ἐντέρων
πύρωσιν καὶ ρευματισμὸν περὶ τὴν
νεφρὸς τε

φερούς τε δακρυόμοις καὶ κύσιν
 ἐνδιατίθῃσι· καὶ τὰς πρὸς συμ-
 οισίας ὁρμὰς ἐκλύει· παρὰ πλη-
 σίως δὲ καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐνερ-
 γεῖ πινόμενος καὶ ἐν πυρετοῖς ποι-
 5 ὤν· καὶ πρὸς ἐλμινδας σρογγύ-
 λας, αἱματός τε πύσιν καὶ δυσεν-
 τερίας, καὶ πρὸς αἱμορροΐδας καὶ
 αἱμορραγίας, πολυέφθους γινόμε-
 νη. καὶ πρὸς σπινὸς δόγματα, καὶ
 εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ δὲ χηνοίμους
 10 μύγνυται, ἐγκλυσμαὶ τε ὅτι ἐντέ-
 ρων ρευματιζομένων. ἢ * δαξομέ-
 νης μήτρας· καὶ πρὸς τὰς ἐξ ἐγ-
 χαύσεως κεφαλαγίας συν ῥοδί-
 νῳ ἢ ἐλαίῳ ἐμβρεγμα. πρὸς τε
 τὰ ἐν κεφαλῇ ἐξανθήματα, συν
 15 οἶνῳ σμῆγμα· πρὸς τραύματα ὅ
 σφακαλίζοντα, συν δὲ φήτῳ κα-
 ταπλασσομένη.

* Περὶ Ἀνδράχνης ἀγρίας.

Κεφ. ρνά.

Ἀνδράχνη ἀγρία ἔχει αὐτὴ
 20 πλατύτερα φύλλα πρὸς τὰ ἑ
 ἀνδράχνης καὶ δασέα· φύε' ἐν πε-
 ρώδεσι τόποις. ἔστιν ὅτε καὶ ἐν κή-
 ποις, φύλλα ἔχει ὁμοία ῥαΐα, μι-
 κρότερα δὲ πολλῶ, πλείονα δὲ καὶ
 ἀπαλὰ, καυλὸς ἐρυθρὰ, ἀπὸ μι-
 25 ας ῥίζης πολλὰ ἐπὶ γῇ κεκλιμέ-
 να· μακρότερη δὲ σῆχυμα καὶ γλί-
 σσα καὶ ὑπόδημα. Δυσίαιμον δὲ
 ἔχει θέρμαντικὴν, δριμύειαν, ὕνω-
 πικὴν, χοιράδων διαφροσητικὴν σὺν
 ἀξουγγίῳ καταπλασσομένη.

Περὶ

renes & vesicam adiuuat, etiā
 si erosionē sentiant: veneris im-
 petus exoluit: succus epotus si-
 mili effectu prodest, in febrīb⁹
 valēs. Contra teretes vētris ti-
 neas, cruentē excreationē, dy-
 senteria, hemorrhidas, & pro-
 fluvia sanguinis, percocta effi-
 cax est. Item contra seps mor-
 fus. Ocularibus medicamentis
 vtilissimē commiscetur, intera-
 neis fluxione laborātibus, at-
 que vulvarum erosionibus, in-
 funditur: contra dolores, quos
 ætus excitauit, caput ex rosa-
 ceo & oleo fouetur: eruption-
 es papularum in capite, cum
 vino emendat: vulneribus quæ
 ad syderationē spectant ex po-
 lenta illinitur.

Andrachne syluestris.

Cap. C L I.

Andrachne Syluestris paruis
 est foliis & latiorib⁹ q̃ portula-
 ce hirsutis. Nascitur i petrosis,
 est qñ & in hortis, folia oleæ,
 sed minora multo. Verū plu-
 ra, tenuioraq; cauliculis rubri-
 cātibus ab radice vna frequēti
 b⁹, inclinātib⁹ in terrā. Hi māsī
 in succū facile soluūt tenacē li-
 quore cū quodā salis gustu. Fa-
 cultas eius calfacere acré vim
 obtinēs, & exulcerās strumis il-
 linitur cū axungia vt discutiat.

Aspa-

Asparagi. Cap. CLII.

Corruda siue syluestris asparagus vulgaris est notitiæ. Huius cauliculi in cibo cocti ventrē emolliunt, urinā cient. Radicis decoctū contra vrinę difficultatē, regium morbum, renū vitia, & coxendicū cruciatus, in potu proficit: cū vino autē, phalagiorum morfibz auxiliatur. Si decocti succus super dente cōtineatur, eius dolori medetur. Semen potū ad eadē valet. Canes, vt aiunt, si decoctū bibāt, emoriuntur. Asparagū etiā nasci prodiderūt, arietiscornibus contusis, atque defossis: quod, quātum equidē sentio, planē à veritate abhorret. Altilis autē asparag⁹ multis ramis fruticat, foliis foeniculi, lōgis, numerosis: radice rotūda, grandi, spongiā habente. Huius teneri cauliculi triti in vino albo, renum dolores sedant. Assus autē coctusve, vrinę stillicidiū, difficultatēq;, ac dysenterias, mitigat. Radix cum vino aut aceto cocta, luxatos art⁹ mulcet. Decocta cū ficis aut ciceribus sumpta, regiū morbum sanat: coxendicis cruciatus strāguriāmque leuat. Alligata radix, aut haustū eius decoctū, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

Plan-

Περὶ ἀσπαράγου. Κεφ. ρηβ.
 Ἀσπάραγος πετραῖος ἢ μυά-
 καιδα γινώριμος, οὗ τὸ χαυλὸν ἐ-
 ψιδέν, καὶ βρωθέν, κοιλίαν μεγάλησ-
 σει καὶ οὐρα κινεῖ. τῶν δὲ ῥιζῶν τὸ
 ἀφέψημα πινόμενον βοηθεῖ δυ- 5
 σουρεσθι, ἰκτερικῶς, νεφρικῶς,
 ἰσχιαδικῶς. φалаγγιοδίκτοις δὲ
 μετ' οἴνου ἀφεφόμενον. καὶ ὁδον-
 ταλγούσι δὲ κρατουμένη τὸ ἀφε-
 ψήματος ἐπὶ τῷ πνιούπῳ ὁδον-
 τι. πικρὴ δὲ πρὸς τὰ αὐτὰ καὶ 10
 τὸ σπέρμα πινόμενον. φασὶ δὲ καὶ
 τοὺς κύτας πόστας τὸ ἀφέψη-
 μα αὐτῶν ἀποθήσκειν. ἐνιοὶ δὲ
 ἰσχυρῶς ἐπὶ ἐὰν τις κυοῦ κέρα-
 τα συγκόψας κατερύξῃ, θύεται
 ἀσπάραγος. ἐμοὶ δὲ ἀπίστατον. 15
 Ο μῶτις ἀσπάραγος οὗτος,
 δάμιος ὅστις πολυκλαδός, φύλ-
 λα ἔχει πολλὰ, μακρὰ, ὁμοία
 μαραῖνῳ. ῥίζα στρογγύλη μεγά-
 λη, ἔχουσα κότυλλον. οὗ πινος τὸ
 χαυλὸν λειούμενον μετὰ οἴνου 20
 λευκοῦ, παύει φρενίτιδας. ἐφθός
 δὲ ἢ ὅπως λαμβανόμενος, παύει
 σπαραγουείας καὶ δυσουείας, καὶ
 δυσεντερίας. ἢ δὲ ῥίζα αὐτῆς ἐψη-
 δεῖσαι ἐν ὀξείῃ ἢ οἴνῳ, παύει σρέμ-
 ματα. ἐφθὴ δὲ μετὰ σύκων καὶ 25
 ἐρεβίνδων λαμβανομένη, ἰᾶται ἰ-
 κτερον. καὶ παύει ἰσχάδα καὶ
 σπαραγουείαν. πτελομένη δὲ καὶ
 τὸ ἀπόζεμα αὐτῆς πινόμενοι, πικρὴ
 ἀτόκιον καὶ ἄζονον.

Περὶ Ἀργ-

Περὶ Ἀργυρώου. Κεφ. εγγ'.

Ἀργυρώου διπλόν ἔστι· τὸ μὲν
μικρόν· τὸ δὲ μείζον· ἔχει δὲ τὸ μὲν
μικρόν φύλλα στενότερα καὶ μι-
κρότερα, καὶ μαλακώτερα καὶ
λειότερα καὶ λεπτότερα· καυλίω
δὲ γωνιοειδῆ κεκλιμένα ὡς ἐπὶ
πύλιν, ἀνθὶ ὀχρά· τὸ δὲ σπέρ-
μα ἐπ' ἀκρῶν τῶν καυλῶν. Τὸ δὲ
μείζον ἐυρύτερον, πλατύφυλλον,
λαχανώδες· καυλὸς δὲ ἐπὶ τούτῳ
γωνιώδης, ὑψὺ ὕδρος, ὕψος πένχε-
ως, ἐκ μέσου μέχρι κορυφῆς σπέρ-
ματι ὡς ἐκ χόρδης λεπτῷ. ῥίζαι
δὲ ὑπὸ πτερίν ἀπαλαὶ, διασείαι, λευ-
καὶ, πάχος δακτύλου. ἤνθεται
δὲ ὡς τοῖς τέλμασι καὶ φρεσμοῖς
καὶ ἐνὶ κμοῖς τόποις· ἐυχερότερον
δὲ τὸ μείζον. Δυνάμει δὲ ἔχει
τὰ φύλλα ξηραντικὴν, συπτικὴν·
ἔθεν καὶ καταπλασθέντα ὡς
πάντα τὰ κακοήθη καὶ ὑφαντιῶν-
τα ρευματικὰ καὶ ἀκράδερτα ἔχον
ἀρμόζει· ἔχει δὲ καὶ αἰμορροῖαν, νό-
μας, ἀνδραγας, ἔρπητας, ἐπινυκ-
τίδας· ἀπουλοῖ καὶ ἔλκεα χρόνια καὶ
ἀνώματα, καὶ τὰ χειρῶν ἰά-
ται, καὶ κόλποις παρακολλᾶ· καὶ τὰ
κυνόδηκτα καὶ πυρίκωντα φλε-
γμονὰς, παρωτίδας, φύγεθλα,
χοιρέδας δὲ καὶ αἰγίλωπα συν-
άλσιν ἐπιπλασθέντα ὠφελεῖ. ἔ-
θεν δὲ τὸ λάχανον μετ' ἄλτων
καὶ ὄξους λαμβανόμενον, δυσεν-
τερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς ἀρμόζει.

Δίδο-

Plantago. Cap. CLIII.

Duo plantaginis genera: mi-
nor folia habet angustiora, mi-
nora, molliora, laxiora, & te-
nuiora: cauliculo anguloso in
terram inclinato: floribus pal-
lidis: semine summis caulibus
emicante. Altera maior, latior,
virentiorque, latis constans fo-
liis, oleracei generis: cuius cau-
lis cubiti altitudinem petit, an-
gulofus, subruber, à medio ad
verticem tenui semine circun-
datus: radicibus nititur tene-
ris, hirsutis, candidis, digitum
crassitudine æquantibus. Na-
scitur in lacunosis, sepibus, &
locis humidis. Multò utilior ma-
gna est. Vim habent folia exic-
catoriâ, constringentem: quare
omnib' malignis vlceribus, &
fluxioni opportunis atque ele-
phanticis, sordidissq; illita pro-
funt: profluuia sanguinis, vlcera
quæ serpunt, epinyctidas, car-
bunculos, nomasque cohibet:
vetera vlcera & inæqualia ci-
catrice obducunt, chironia fa-
nant, sinus conglutinant: mor-
sibus canis, ambustis igni, inflâ-
mationibus, panis, parotidibus,
strumis, ægilopiis, illita cum sa-
le profunt. Coctum cum ace-
to & sale olus, dysentericis, cœ-
liacisq; sumptum subuenit.

Datur

DIOSCORIDIS

Datur & in locum betæ cum lenticula coctum. Et ad aquam inter cutē cui leucophlegmatix nomen est, datur & herba decocta post aridas epulas, sic ut media antecedit: comitialibus & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris vlcera, purgat: cum cimolia aut cerusa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest, lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. Additur quoque in oculorum collyria. Gingivis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu confert: clystere dysentericis infunditur, contra tabem datur in potu, aduersus strangulationes vuluæ in vellere subiicitur, etiam si vulua fluxione laboret. Semen ex vino potum, alui fluxiones & sanguinis excreta- tiones sistit. Decocta radix & manducatu, & collutione, den- tium dolores sedat: eadē cum foliis, vlceribus renum & ve- sicæ in passo datur. Ferunt treis radices cum tribus vini cya- this, & pari aquæ modo, tertia- nis auxiliari: & quatuor, quar- tanis. Sunt qui radicis gesta- mine, discutiendis strumis v- tantur.

Lauer seu

δίδοται δὲ καὶ μετὰ φακῆς ἀν-
τὶ στυτλῶν συνεφόρμῳ, καὶ
πρὸς λευκοφλεγματίαν μετὰ τὸ
ξηροφαγῆσαι, μέπη δίδοται ἢ
πῶς ἐφθῆ· ποιεῖ δὲ καὶ ἐμπληπ-
κοῖς, καὶ ἀσθματικοῖς διδομένη. 4
ὁ δὲ χυλὸς τῶν φύλλων, τὰ ἐν
στόματι ἔλκη ἀνακαθαίρει συνε-
χῶς διακλυζόμενος· (ὡν δὲ κι-
μωνία ἢ ψιμμυδίω, ἔσται τὰ ἐ-
ρυσσάλατα· σύειγας τε ἐγκλυ-
ζόμενος ὠφελεῖ, καὶ πρὸς ὠταλ- 10
γίας καὶ ἐφθαλμίας ἐσταζόμε-
τος ἐχυλός· καὶ κοιλυεῖσις μυσ-
ζόμενος, καὶ πρὸς οὖλα αἵμασπό-
μενα, καὶ πρὸς αἷμα ἀνάγον-
τας πτόμενος· καὶ πρὸς δυσεν-
τερικὸν ἐγκλυζόμενος, πίνεται 15
δὲ καὶ πρὸς φθίσιν καὶ πρὸς
ὕστερας πτίγας πρὸς δίδεται ἐν
εἰώ, καὶ ὑστερὰ ρευματιζομένη.
καὶ ὁ καρπὸς δὲ πτόμενος μετ'
οἴνου, τοὺς τῆς κοιλίας ρευμα-
τισμοὺς καὶ πύσεις αἵματος ἐ- 20
πίχει· ἢ δὲ ῥίζα ἀφελήθεισα καὶ
διακλυζομένη καὶ διαμασσωμέ-
νη, ἐδονταλγίας πάσκει· πρὸς δὲ
τὰ ἐν κύστι ἔλκη καὶ νεφροῖς δι-
δοται ἢ ῥίζα καὶ τὰ φύλλα μετ' γλυ-
κίος. φασὶ δὲ ῥίζας τρεῖς ποτεῖ- 25
σας μετ' οἴνου κυάδων τειῶν καὶ ὕ-
δατος ἴσου, τεταύω βοηθεῖν· τε-
ταρταύω δὲ τέσσαρας ῥίζας· ἐνίοι
δὲ καὶ ἐν δέσματι χερῶν τῇ ῥίζῃ
πρὸς χοιρέδας καὶ διαφοροῦσιν.

Περὶ Σίνου.

Περὶ Σίου. Κεφ. ρηδ'.

Lauer seu fium.

Cap. CLIII.

Sion in aquis inuenitur, frutice pingui, recta, foliis latis, olusatro similibus, sed minoribus, & odoratis. Quæ cruda cotinæque esu, calculos rumpunt, atque excernunt: vrinas cient, menses & partus extrahunt, dysentericis in cibo auxiliatur. De fimo Crateuas tradit, herbam esse fruticis specie, pauca folia ferentem, rotunda, maiora quam menthæ, nigra, & ad erucam accedentia.

Sifymbrium. Cap. CLV.

Sifymbrium (alij serpillum syluestre vocant) in solo inculto nascitur, menthæ hortensis similitudine, odoratius, latiore folio. Inferitur coronis. Calfaciendi vim habet: contra stillicidia vrinæ, calculoque, semen ex vino bibitur, tormina & singultus sedat. Folia in capitis dolore, fronti aut temporibus illinuntur: item contra vesparum apiumque ictus. Vomitiones potu cohibet.

Alterum Sifymbrium.

Cap. CLVI.

Alterum sifymbrij genus, quod aliq. cardaminā, alij fion appellant. Ea herba riguis gaudet, & eisdem in locis, quibus fion pro-

p uenit:

Σίον τὸ ἐν ὕδασι εὐεσκέται

ἐν τοῖς ὕδασι θαμνίον ὀρθόν, λι-

παρὲν, φύλλα ἔχον πλατέα ἰπ-

ποσελίνῳ ἰοικότα, μικρότερά δὲ

καὶ ἀρώματίζοντα. ὅπως ἐδιόμε-

να ἔφθάνει, καὶ ὡμὰ λίθους θρύ-

πτει καὶ ἐκκρίνει· οὗρα τε κινεῖ,

καὶ ἐμβρυα καὶ ἐμμήνια ἄγει, δυ-

σεντερικοῖς τε χηρίσμα βρωθέν-

τα. Κρετέως δὲ ἰσορεῖ περὶ αὐ-

τοῦ οὕτω· πόα θαμνοειδὴς ὀλί-

γη ἔχουσα φύλλα περὶ φερῇ μεί-

ζονα ἡδυόσμου, μέλανα, πάρεγ-

γύζοντα ἐν ζώμῳ.

Περὶ Σισυμβείας. Κεφ. ρνέ.

Σισύμβειον (οἱ δὲ ἔρπυλλον

ἢ ἄγειον καλεῖσιν) ἐν χέρσις φύει,

ἔοικε δὲ ἡδυόσμῳ κηπαίῳ, πλατυ-

φυλλότερον δὲ καὶ ἐνυδρέστερον, σε-

φανωματικόν. Δυνάμει δὲ ἔχει

θρῆναι πικρὴν ἀφ' ἧς ὅτι πρὸς τρα-

χουείας καὶ λιθιάσεις τὸ σπέρμα

συνὸ οἶνον πινόμενον· καὶ σφόδρα καὶ

λυγμοῖς παύει. τὰ δὲ φύλλα ὀπι-

πλάσσει· πρὸς κεφαλῆαλγίαν καὶ

τῇ κροτάφῳ καὶ τῇ μετώπῃ· πρὸς

τε σφηκῶν πληγὰς καὶ μελιτῶν.

Ἰσησι δὲ καὶ ἐμέτοις ποδέν.

Περὶ Ἐτέρου σισυμβείου.

Κεφ. ρνς.

Σισύμβειον ἕτερον, οἱ δὲ, καρ-

θαμνίῳ, οἱ δὲ, καὶ τοῦτο σίον

καλεῖσιν. ἔνυδρός ἐστι πόα, κα-

τὰ τὰ αὐτὰ τῷ σίῳ ἡνωμένη.

καρ-

DIOSCORIDIS

uenit: quæ ided nonnullis cardamina nominatur, quod gustu cardamum, id est nasturtiū, repræsentet. Folia primum rotunda prodeunt, adulta erucæ modo finduntur. Id exalfacit, vrinas mouet, crudū estur, purgat lentigines, cutisq; vitia in facie, noctibus impositū, matutinisq; detractum.

Crithmum. Cap. CLVII.

Crithmum, seu potius, vt alii, crithamon, fruticosa & vndique foliosa herbula est, cubiti altitudinem ferè petēs. Nāscitur in maritimis, & petrosis: foliis pinguibus, numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, latioribus, & longioribus, falso gustu, flores candidi sunt, & semen, ceu rorimarini, odoratum, molle, rotundum, quod ficcatum rumpitur: habet intus tritici modo nucleum: radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & folia incocta vino, potu vrinæ difficultati & regio morbo auxiliantur: menses cient, estur crudum coctūve in olere, feruatur etiam in muria.

Coronopus. Cap. CLVIII.

Coronopus oblonga herbula est, per

καρδαμίνω δι' ἐνιοι λέγουσι, διὰ τὸ εἰσκέσαι καρδάμω τὴν γεῦσιν. φύλλα ἔχει τὸ μὲν πρῶτον περιφερῆ, ἀνδρομήμα δὲ χρίζεται ὡς τὸ τοῦ ἐνζώμου. ἐστὶ δὲ δερματικόν, οὐρητικόν, βιβρώσκειται δὲ καὶ ὁ μὲν, ἀποκαθαίρει δὲ καὶ φακοὺς, καὶ ἐφελκυσσάτα πλάγντα δι' ὅλης τῆς νυκτός, ἔωθεν δὲ ἀποκλυδέν.

Περὶ Κεῖθμου. Κεφ. ρνζ.

Κεῖθμον οἱ δὲ, κρίταμον, δαμῶδες ὅτι βοτάνιον, ἀμφιλαφές, πρὸ πᾶν τὸ ὑψός. φύλλον μόνον ἐκ πρῶθεν καὶ παραθαλασσίαις τόποις, φύλλοις πλείον ἢ παροις καὶ ὑπολεύκοις, τοῖς τῆς ἀνδράχνης παρεικόσι, πλατυτέροις μὲν τοῖς καὶ ἐπιμηκετέροις, ἀλμυρίζουσι δὲ πρὸς τὴν γεῦσιν, ἀνθηλευχὰ, τὸν δὲ καρπὸν ὡς πρὸς ἡβανωτίδος μαλακὸν, ἐν ὧδῃ, σφυγμολόν, ὅς ἐξῆρανθεὶς διίσταται· καὶ ἐν δὲ ὡς πυρρὸν ἔχει τὸ σπέρμα· ῥίζας δὲ δακτύλους τὸ πάχος, τρεῖς ἢ τέσσαρες, ἐν ὧδῃ, ἡδέας. δύναται δὲ ὁ καρπὸς καὶ ῥίζα καὶ τὰ φύλλα ἐναφελκυσσάτα οἴνω καὶ πινόμῳ, βοηθεῖν δυσουρεσίᾳ καὶ ἰκτερίκοις· κινεῖ καὶ ἡ καταμύνησια, λαχανεύεται ἐφθόν τε καὶ ὁ μὲν ἐδιδόμῳ, καὶ ταειχέεται ἐν δῆμῳ.

Περὶ Κορωνόποδος. Κεφ. ρνθ.

Κορωνόπος πρόμηκες βοτάνιον κατὰ τὸν

καὶ τὸ ἐδάφους ἐσπώμενον, κατεγ-
μαπιόμενον τὰ φύλλα ἀλαχάνευ-
ται ὃ καὶ τὸ τοῦ ἐφ' ὅν ῥίζαν λεπτὴν
ἔχον, συμπικνὴν, ἐσπομένην πρὸς
κοιλιακοὺς ποιούσαν, γίνεταί δὲ ἐν
5 χέρσις τόποις, καὶ ἐν δώμασι καὶ
ἐν ταῖς ὁδοῖς.

Περὶ Σόκχου. Κεφ. ςθ'.

Σόκχου δύο εἶδη· τὸ μὲν, γὰρ
ᾧ ἐστὶ ἀγριοδέσσειν καὶ ἀκανθωδέ-
σειν· τὸ δὲ, τρυφερώτερον καὶ
10 ἐδώδιμον, χαυλὸς δὲ ῥωνιοειδὴς
ἐνίοτε καὶ ὑποῦδρος· φύλλα ἔχει
ἐν διασημάτων ἐχρήσιμα πλὴν
περιφέρειαν. Διῶαμις δὲ αὐτῶν
ᾧ συκπικνὴ, μετρίως ὑποσύ-
φουσα· ὅθεν σωμαχὰ καυσουμέ-
15 νη, καὶ φλεγμοναῖς, καταπλασσο-
μενοι ἀρμόζουσιν. ὁ δὲ χαλὸς κα-
ταρροφούμενος, διγυμὸν σωμα-
χοῦ καταπερύνει, καὶ γάλα κα-
ταπλάσσει, πρὸς τοὺς δὲ ἐν εἰώ,*
δακτύλων καὶ μήτρας φλεγμο-
20 ναῖς βοηθεῖ. ἢ δὲ πᾶσα καὶ ἡ ῥίζα
καταπλασθεῖσα σκορποπλήκτοις
ἀρήγει. Ὁ δὲ ἕτερος σόκχος ὁ
καὶ τρυφερός, δεινδρώδης ᾧ, καὶ
πλάτυφυλλος· τὰ δὲ φύλλα διεί-
λε τὸν χαυλὸν· καὶ οὗτος δὲ τὰ
αὐτὰ ποιεῖ.

25 Περὶ Σέρειος. Κεφ. ρθ'.

Σέρειος διωστήων ἢ μὲν ἀγρία, π-
κρίς ἢ καὶ χαλῶριον καλουμένη· ἢ
δὲ τις ἐστὶ καὶ πλατυφυλλότερα,
καὶ εὐσπομαχότερα τῆς κηπευτῆς.

καὶ ταύτης

est, per terram repens, fisis
folliis: coquitur in olerē: ra-
dicem habet tenuem; adstrin-
gentem; quæ in cibo coelia-
cis facit. Prouenit in aggeri-
bus, & locis incultis, & fe-
cus vias.

Sonchus. Cap. CLIX.

Sonchi duo genera: sylue-
strior quidā est, & magis spinis
horret: alter teneritate quadā
mollescit, cibis expetitus, angu-
loso caule, inani, interdū rubē-
te: foliis in ambitu per interual-
la dissectis. Vtriusq; vis refrige-
rat, modicè adstringit: vnde æ-
stuantī stomacho & inflāma-
tionibus illiti profunt. Succus
eorū stomachi rosiones forbi-
tione mitigat, lac elicit, in vel-
lere appositus sedis ac vuluæ
collectionibus opitulatur. Tā
herbā q̃ radix illita vibratis à
scorpione ictibus subuenit. Al-
ter sonchus tenerior, arboris
instar, latis cōstans foliis: caulē
in ramos exeuntē folia distin-
guunt: sed ad eadem pollet.

Seris siue intybus.

Cap. CLX.

Seris duūm generum est: al-
tera sylvestris, quæ picris & ci-
chorion vocatur: altera satīua,
latioribus foliis constat, sto-
macho quàm hortensis vtilior:

p ij Quæ

DIOSCORIDIS

Quæ iterum in duas species digeritur: vna folio latiore prodit, lactucarum simillima: altera angustiore est folio, & gustu amara. Vtraque refrigerat, & adstringit, stomacho vtilissima: aluû sistit cocta, si cum aceto adsumatur. Syluestres stomacho meliores: quandoquidem æstuantem ipsum, & quæ imbecillitas vexet, cibo leniût. Cardiacis per se, aut cum polenta, vtiliter illinuntur: podagris, & oculorû inflammationibus auxilio sunt. Herba cum radice illita, percussis à scorpione subuenit, igni sacro cû polenta medetur. Succus cum cerusa, & aceto, valet ad illitus eorum, quæ refrigerationem desiderant.

Chondrilla. Cap. CLXI.

Chondrilla, quâ aliqui cichorion, alij serin appellant, caulê, flores, & folia habet cichorio familia: qua ex causa nonnulli syluestris intubi speciê esse putant, verum tenuior tota est: in cuius ramulis, gûmi mastiches simillimû tuberculo fabæ inueniri solet: quod cû myrrha tritû & linteo appositû, instar oliuæ, foeminarum menses trahit. Tusa cum radicibus herba, adiecto melle, diuiditur in partillos,

καὶ ταύτης δὲ διττὸν εἶδος· ἡ μὲν γὰρ τις ὅτι θριδακωδὲς ἐστὶ καὶ πλατύφυλλος· ἡ δὲ, στενόφυλλος καὶ ἔμπικρος. * πᾶσαι δὲ συππικαὶ, ψυκτικαὶ καὶ ἐνσώμαχοι· ἰσαῖσι δὲ καὶ κοιλίαν ἐφθαλμῶν μετ' ὄξους λαμβανόμεναι. καὶ μάλιστα αἱ ἀγρίαι ἐνσώμαχότεραι· βρωθεῖσαι γὰρ ἀπενουῶντα σώμαχον παρηγοροῦσι καὶ κυσσύμενον. κατὰ πλάσσειναι δὲ σὺν ἀλφίτῳ καὶ κατ' ἐαυταῖς καρδιακοῖς εἰσι χρεῖσι μοι· ποδάγρας καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμοναῖς βοηθοῦσιν. ἡ δὲ πᾶσα καὶ ἡ ῥίζα κατὰ πλάσσειναι, σκορπιόπληκτοῖς ἀρήγει· καὶ ἐρισπέλατα σὺν ἀλφίτῳ ἰᾶται. σὺν ψιμίδι δὲ καὶ ὅξει ἐστὶ ὁ χυλὸς αὐτῶν ἐπὶ χρεῖσι τῶν ψύξεως δεομένων.

Περὶ Κονδρίλλης. Κεφ. ρξά.

Κονδρίλλα, ἡ δὲ, καὶ τὸ κικχόειον καλεῖσιν ἡ σέριδα, τὰ μὲν φύλλα καὶ τὸν κλωνὸν, καὶ τὰ ἀνθὲς καὶ χυλὸν ὁμοία· ὅθεν καὶ εἶδος αὐτὸ πᾶσι εἶπον στείριδος ἀγρίας λεπτότερον δὲ τὸ ὅλον· ὅθεν δὲ τοῖς κλωναρίοις αὐτοῖς εὐρίσκεται κόμμι ὁμοίον μασίχῃ, μέγεθος κυμαῖα· ἃ πᾶσι περὶ στέρας μετὰ σμύρνης λεία, ἐν ὁδονίῳ, μέγεθος ἡγίας, ἐμμιλω ἀγρίῃ ἢ πᾶσι σὺν τῇ ῥίζῃ κοπεῖται, εἰς τροχίσκοις ἀναπλάσσεται μίγνυμνόν τε μέλι,

5 πος, οἱ πηγες διεθέοντες καὶ νίβω μι-
 γρῦτες, ἀφοῦ ἀποσηύχουσιν. ἀ-
 νακολλᾷ δὲ καὶ τείχας τὸ κόμμι·
 καὶ ἡ ρίζα ὅτι πρόσφατος ποιεῖ εἰς τὰ
 αὐτὰ, βαπτομένης εἰς αὐτὴν βελβ-
 ρνης, καὶ περσαρομένης ταῖς θρίξιν.
 ἀρμόζει δὲ καὶ πρὸς ἔχεις σὺν οἴ-
 νῳ πινομένη. καὶ κοιλίαν ἱσπην ὁ
 χυλὸς αὐτῆς ἐπιθεῖς σὺν οἴνῳ καὶ
 ποδεῖς, καὶ κατ' αὐτόν. ἔστι δὲ καὶ
 ἕτερον εἶδος κονδρίλλης, φύλλον
 10 δὲ ἔχει περβεβρωμένον, πρῶμι-
 κας, ἐπὶ γῆς ἐρωμένη. χαυλὸν δὲ
 ὁποῦ μεσόν· ρίζαν δὲ λεπτήν, ἑ-
 πακμον, κόφιν, σρογγύλιν,
 ὑπόξανθον, ὁποῦ μεσὴν. Διῶα-
 μιν δὲ ἔχει ὁ χαυλὸς καὶ τὰ φύλ-
 15 λα, πεπτηκύν. ὁ δὲ ὁπὸς τειχῶν
 τῶν ἐν βλεφάρεσι ἀνακολληπι-
 κός. φύεται δὲ ἐν γαστέρι καὶ ἐρ-
 γασίμοις χυδαίοις.

Περὶ Κολοκύνθας. Κεφ. ρξβ'.

Κολόκυνθα ἐκώδιμος· ὠμὴ κα-
 20 ταπλαθεῖσα λεῖα, οἰδήματα καὶ
 ἀποσήμεα πραινέ. τὸ δὲ ἐξέσμα
 αὐτῆ παιδίῳ σπρίων, ὡφελίμως
 κατ' ἑβρέγματος καταπλάσσει·
 καὶ πρὸς ὀφθαλμοῦ φλεγμοναῖς καὶ
 ποδαγρικαῖς ὁμοίως. ὁ δὲ χυλὸς ἑ-
 25 ξυσμάτων θλιβέντων, πρὸς ὠταλ-
 γίας κατ' αὐτόν καὶ μετὰ ῥοδί-
 νου ἐγχυματιζόμενος ὡφελεῖ· καὶ
 πρὸς χαυσσομένην ἐμφάνειαν
 ἐγχεῖν ὡφελεῖ· ὅλης δὲ αὐ-
 τῆς ἀποζωοδείσης καὶ ἐκθλιβείσης
 ὁ χυλὸς

stillos, qui nitro admisti vitili-
 gines emaculant. Gummi in-
 ordinatos pilos replicat: quod
 item tenera radix efficit, si in-
 tineta succo acus, pilis admo-
 ueatur. Contra viperas in vi-
 no pota proficit. Succus de-
 coctæ, in vino, aut per sese
 potus, aluum fistit. Aliud ha-
 betur chondrillæ genus, fo-
 lium ferens oblongum, cir-
 cumrosum, humi sparsum, cau-
 lem succo madentem lacteo:
 radice tenui, rotunda, leui, ve-
 geta, flavescente, succosa. Cu-
 ius & caulis, & folia conco-
 quendi vim habent. Succus in-
 commodos palpebrarum pi-
 los reflectit. Nascitur in lætis
 & cultis.

Cucurbita. Cap. CLXII.

Cucurbita esui apta: cruda,
 trita illitu tumores, & absces-
 sus mitigat. Ramenta eius in-
 fantibus contra capitis ardo-
 rem, quam syriasin vocant, in-
 fincipite illinuntur: oculorum
 inflammationes podagrâsque
 refrigerant. Succus è ramen-
 tis tufis per se, aut cum rosa-
 ceo infusus, aurium doloribus
 auxiliatur: adustiones cutis in
 ardenti febre illitu adiuuat:
 totius feruefactæ, & expressæ
 p iij succus,

DIOSCORIDIS

succus, cum melle exiguo, & nitro potus, aluum leniter resoluit. Vinum in cucurbitam recentem excauatam infusum, si mistum sub diuo teneatur, potu aluum leuigabit.

Cucumer satiuus.

Cap. CLXIII.

Satiuus cucumis aluo, & stomacho per q̄ vtilishabetur, refrigerat, corruptione nō sentit, vesicæ prodest, olfactu reuocat, quos animus liquerit. Semine modicè vrinā mouet: cum lacte aut passo, vesicæ exulcerationibus subuenit. Illita cum vino folia, morsus canū sanāt: & epinyctidas, cum melle.

Pepones. Cap. CLXIII.

Peponis caro in cibis, vrinā cit: inflammationes oculorum illita sedat. Ramēta eius cōtra aduersionem infantium, quam syriasin vocant, sincipiti impo-
nuntur: fronti admota, oculorum fluxiones auertūt. Succus cum semine, adiecta farina, siccatus in sole cogitur in smegmata, quæ faciem repurgāt, & nitorem afferunt. Radix sicca, & ex hydromelyte pota, drachmæ pondere, vomitione mouet. Si quisquam moderatè secundum coenam vomere cupiat, geminis obolis sit cōtētus.

Sanat

ὁ χυλὸς πινόμῃος μετὰ μέλιτος
βραχέος καὶ νίβρε, κοιλίαν λύει κί-
φως. καὶ εἰ τις κοιλάνας αὐτῷ ὠ-
μιλῷ, εἰχέας τὲ οἶνον καὶ ἐξαδριά-
σας, κερσίπας τὲ πῆν γῆς, μα-
λάττει κοιλίαν κούφως.

Πεὲς Ἡμέρου σίκκος.

Κεφ. ρξγ.

Σίκκος ἡμέρος εὐκοίλιος, εὐσ-
μαχος, ψυκτικός, οὐ φθειρόμε-
νος, κύσει ἀρμόδιος, ἀνακτητικός
λειποθυμῶν ὁσφραινόμῃος. καὶ
τὸ σπέρμα αὐτῆς μεβίως ἐρηκτικόν
ἀρμόζον συν γάλακτι ἢ γλυκεῖ
πρὸς τὰς ἐν κύσει ἡχώσεις. τὰ
δὲ φύλλα αὐτῆς συν οἶνῳ κατὰ
πλαδέντα, κυνόδνητα ἰαῖται συν
μέλιτι δὲ ἐπινηκτίδας.

Πεὲς πέπονος. Κεφ. ρξδ.

Ἡ δὲ τοῦ πέπονος σὰρξ καὶ
αὐτὴ οὐρητικὴ ἐδιομῆν κατὰ
πλαδέντα ὃ ὀφθαλμοῦ φλεγμο-
νας πρᾶσσει. τὸ δὲ βρέγμα αὐτῆς
σειᾶσι παισίν καὶ τῷ βρέγμα-
τος ἐπιτίθεται, καὶ ρευματιζο-
μένοις ὀφθαλμοῖς αὐτὴ ἀνακολ-
λήματος κατὰ τοῦ μετώπου. ὁ
δὲ χυλὸς συν τῷ σπέρματι μι-
γρὲς ἀλεύρω καὶ ξηραίνδεις ἐν ἡ-
λίῳ, σμῆγμα γίνεται ρυπτικόν καὶ
λαμπαρυτικόν πρὸς ὅπου. ἡ δὲ
ρίζα ξηρὰ ποδῆσαι συν ὕδρομέ-
λιτι < ὀλκῇ, ἐμέτοις κινεῖ. εἰ δὲ
τις πρᾶξας ἀπὸ δείπνου ἐμέσαι
δειλήσειεν, ἀρκέσαισιν ὀβολοὶ β'.

ὑγιάζει

ὑμίζει δὲ καὶ κρεῖα καταπλα-
θεῖτα μετὰ τῆς μέλιτος.

Περὶ Δρίδακος ἡμέρου.

Κεφ. ρξέ.

Θεῖδαξ ἡμερος ἐυσόμαχος,
ὑποψύχουσα, ὑπνωτικὴ, κοιλί-
ας μαλακτικὴ, γάλακτος κατα-
σπαστικὴ. ἐψιδεῖσα δὲ γίνεται
προφιμωτέρα. ἄπλυτος δὲ ἐ-
διομύνη, σομαχικοῖς ἀρμόζει.
τὸ δὲ σπέρμα αὐτῆς πηρόμε-
νον, τοῖς συνεχρῶς οὐκ ἐφύτοι-
σεν. καὶ συνοισίαν ἀποσφί-
νει. αὐτοὶ δὲ συνεχρῶς ἐδιό-
μνυται. ἀμβλυωτίας εἰσὶ ποικι-
λικαί· ταιριχέονται δὲ ἐν ἄλ-
μῃ, ἐκκαυλίσασθαι δὲ, ἐχρῶσι
τι παρεμφέρον τῇ τοῦ χυλοῦ
καὶ ὁποῦ διατάμει τῆς ἀγείας
Δρίδακος.

Περὶ Ἀγείας Δρίδακος.

Κεφ. ρξς.

Ἡ δὲ ἀγεία Δρίδαξ ὅμοια τῇ
ἡμέρῳ, χαλωδιστέρα δὲ καὶ τοῖς
φύλλοις λευκότερα, καὶ ἰσχυρό-
τερα καὶ τραχυτέρα ὑποψύχουσα.
πικρὰ ὅτι πρὸς τῇ γεύσει, ὡμοίω-
ται δὲ κατὰ τὴν δύα-
μιν μήκωνι· ὅθεν καὶ τὸ ὅπν αὐτῆς
ἐννοιο μύσχοισι τῷ μήκωνι. κα-
θαίρει δὲ μετὰ τὸ ἐξυκράτου ποθεῖς
ὁ ὅπν δυνάμει ὁλοῶν ὁλοῦν, ὑδατῶ-
δη κατὰ κοιλίαν, ἀποκαθαίρει ὅτι
καὶ ἀργεμα καὶ ἀχλὺς ποιεῖ καὶ
πρὸς ἐπιχρῶσις ἐγχεῖσθαι σὺν
γλυκύμει.

Sanat quoque illita cum melle
ulcera concreta in modum fa-
ui, quæ ceria vocant.

Lactucæ. Cap. CLXV.

Lactucæ fatiux, quibus natu-
ra refrigatrix inest, stomacho
gratæ habentur: somnū conci-
liat, aluū emolliunt, lac euocat:
verum decoctæ magis alūt, sto-
machicis illotas esse prodest. E-
potū semen, asiduas libidinum
imaginationes in somno, cō-
pescit, & veneri refragatur. Ip-
sæ verò frequentiores in cibo,
claritati oculorū officiant: in-
flamationibus, & ignib⁹ sacris
opitulatur, muria condiuntur.
Cū in caulē exierunt, vim quā-
dā nanciscūtur, succo aut lacti
syluestris lactucæ similem.

Lactuca sylvestris.

Cap. CLXVI.

Sylvestris lactuca fatiux fi-
milis est, sed longior caulis,
& candidiora folia, gracilio-
ra, & asperiora: amaro gustu
est, & viribus aliquantum pa-
paueri similis: vnde lacteum e-
ius succū aliqui meconio per-
miscuerūt. Aquam per aluum
elicit, potus in aceto mulso suc-
cus ad duos obolos: argema ca-
lignemq; repurgat, cōtra adu-
siones efficaciter illinitur, cū
p. iiii lacte

lacte mulierū. In summa, somnum allicit: doloris leuamentū præstat, menses trahit, contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur. Semen, nō aliter, quā satiuæ, libidinū imaginationes in somno amolitur, ac venerē arcet. Succus ad eadē valet, sed viribus infirmior. Reponitur in fictili nouo lac eius antea, vt in aliis liquaminibus moris est, insolatum.

Gingidium. Cap. CLXVII.

Gingidiū, aliqui lepidion, in Syria, & Cilicia plerūque nascitur: herbula syluestri pastinacæ similis, tenuior, & amarior: radice parua cādicāte subamara. Olus hoc crudum, coctum, cōditūmve estur magna stomachi vtilitate: vrinam cit. Decoctum ex vino potum vesicæ prodest.

Scandix. Cap. CLXVIII.

Scandix, syluestre olus est, amarum, subacre: quod crudū coctūmve manditur, stomacho & ventri vtile. Decoctum in potu, vesicæ, renibus, & iocineri confert.

Caucalis. Cap. CLXIX.

Caucalis, quam alij syluestre daucum vocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: foliis apio similibus, foeni-

γυναικείω γάλακτι. ἔστι δὲ καὶ τοῦ
λου ὑπνωτικὴ καὶ ἀνώδυμος, ἀ-
γχι δὲ ἐμμήνια, ποτίζεται δὲ καὶ
πρὸς σκορποπλήκτοις καὶ φάλαγγι-
δοθήκτοις. τὸ δὲ σπέρμα ὡς πρὸς
τὸ τῆς ἡμέρας ποδὲν, ὀνειραγμοῖς
καὶ σπασμοῖς ἀποσπέρφει. διυά-
ται δὲ καὶ ὁ χυλὸς πρὸς τὰ αὐτὰ,
ἀδενέστερος μὲν τοι. ἀποτίθεται
δὲ ὁ ὅπτες ἐν κεραμίσις ἀγγείοις
περικυλίσσας ὡς πρὸς καὶ τὰ λοι-
πὰ χυλίσματα. 10

Περὶ Γγγιδίου. Κεφ. ρξζ'.

Γγγίδιον, οἱ δὲ λεπίδιον, φύε-
ται πλεῖστον ἐν κιλικίᾳ τε καὶ συ-
ρίᾳ βιταῖον σαφιλίνῳ μὲν ἑοικὸς
ἀγρίῳ, λεπτότερον δὲ καὶ πυκνό-
τερον ῥίζιον ὑπόλευκον, πικρίζον. 15
λαχανεύει) δὲ ὁ μὸν τε καὶ ἐφθόν,
καὶ ταπεινὸν ἐδίδεται. ἔστι δὲ ἐν-
σώμαχον οὐρητικόν. καὶ τὸ ἀφέψη-
μα αὐτοῦ πινόμενον μετὰ οἶνου
κύνει χηρίσιμον.

Πρὶ Σκανδυκος. Κεφ. ρξή. 20

Σκανδύξ, καὶ τὸ το ἔχριον λάχα-
νον, ὑπόδριμν, καὶ ἐμπικρον, ἐδωδι-
μον ἐφθόν καὶ ὁ μὸν ἐδιόμβρον, ἐν-
κοίλιον καὶ ἐνσώμαχον. τὸ δὲ ἀφέ-
ψημα αὐτοῦ κύνει χηρίσιμον καὶ
νεφροῖς πινόμενον καὶ ἥπατι. 25

Περὶ Καυκαλίδος. Κεφ. ρξθ'.

Καυκαλὶς, ἔνιοι δὲ δαῦκον ἄ-
χριον καλοῦσι, καυλίον ὅστις σπ-
σαιμαῖον ἢ καὶ μετίζον, ὑπόδα-
σιν. φύλλα ἔχον μαρμαρίσκου ὁμοία
πτερυ-

πολυμήνη, δασέα· καὶ ἐπὶ ἄκρου σιμάδιον λευκόν, ἐυώδες. λαχανύεται δὲ καὶ τὸ τοῦ μόντε καὶ ἐφ' ὅσον ἐπιτόμιμον· ἔστι δὲ διουρητικόν.

5 Πρὶ Εὐζώμης. Κεφ. ρο'.
Εὐζώμον, τὸ τοῦ μόντε κλέϊον

βρωτὸν συνοσίαν παρορμητὴν καὶ τὸ σπέρμα ὃ αὐτὸ τὸ αὐτὸ ποιεῖ· ἐρηπικὸν ὑπάρχον καὶ πεπτικὸν καὶ ἐνκοιλίον. χροῖν δὲ τῷ σπέρματι

10 π' αὐτὸ καὶ εἰς τὰς ἀπ' ὑψέως ἀποπίδεν δὲ αὐτὸ πρὸς τὸ πλείονα διαμύρησιν χροῖον, ὅξει φουρῶντες καὶ γάλακτι, καὶ ἀναπλάσσονται τροχίσκου. Γίνε δὲ καὶ ἄθριον εὐζώμον, μάλα ἐν τῇ κτ'
15 τ' ἐσπέραν ἐκινῶν τῷ σπέρματι καὶ ἀντὶ σιγήσεως οἱ τῇδε ἀνδρῶνται χροῖν. ἔστι δὲ διουρητικώτερον καὶ δριμύτερον πολλῶν τῶν ἡμέρων.

Πρὶ Ωκίμης. Κεφ. ροα'.

Ωκίμον, γνώριμον βιβρωσκόμη

20 γον πολὺ, ἀμβλυωπὲς ὄσιν, ὅστι δὲ κοιλίας μαλακτικόν, πνευμάτων κινητικόν, ἐρηπικόν, γάλακτος πρὸς κληπτικόν· συσμετάβλητον, κατὰ πλάσιν, καὶ ῥοδίνω καὶ ὀξεί, φλεγμοναῖς βοηθεῖ, καὶ δράκοντος δαλασίου καὶ σκορπίου πικρῆ καὶ αὐτὸ δὲ σὺν οἶνῳ χίῳ, πρὸς ὀφθαλμῶν ὀδυμῶς, ὃ δὲ χυλὸς αὐτὸς ἀποκαθαίρει ἀχλὺς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς, καὶ τὰ ρεύματα ξηραίνει.

foeniculi modo per extrema multifidis, hispidisq; candida in cacumine umbella, suauiter olente. Crudum coctumve oleum modo estur, urinā mouet.

Eruca. Cap. CLXX.

Cruda eruca venerem largiore cibo concitat. Semē eodem effectu prodest: urinam cit, concoctioni prodest, alio perquam commodata. Semine ad cōdimēta vtūtur: quod, vti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum syluestris eruca, maxime in Iberia, quæ occidentem spectat: cuius semine pro sinapi incolæ vtuntur. Urinam vehementius pellit, multò satius acrior.

Ocimum. Cap. CLXXI.

Ocimum vulgò cognitum.

Id copiosiore cibo oculorum acie hebetat, aluum mollit, spiritum mouet, urinam pellit, lac euocat: ægrè tamen cōficitur. Illitum cum polline polentæ, aceto & rosaceo, pulmonum inflammationibus auxilio est: draconis marini, & scorpio- nis ictibus per se prodest: & cum vino Chio oculorum doloribus. Succus visus caliginem abstergit, destillationes exiccat.

Semen

DIOSCORIDIS

Semen potum conuenit atram-
bilé gignentibus, difficili vrinę,
inflatísq; naribus haustú, subin-
de mouet sternutaméta: quod
idem herba efficit, sed oculos
premi necessum est, cū sternu-
tamentú vrget. Sunt qui in ci-
bis abdicandú censeant: quan-
doquidem manducatum, & in
sole positum, vermiculos cre-
at. Aphri autem adiiciunt, si fe-
riantur à scorpione, qui oci-
mum ederint, nullo conflictari
dolore.

Orobanche. Cap. CLXXII.

Orobáche cauliculus est, ses-
quipedalis, & interdú maior,
subruber, hirsutus, tener, sine
folio, pinguis: flore subalbido,
aut in luteum vergente: radice
digiti crassitudine, & cum ari-
ditate flaccescit caulis, fistulo-
sa. Hanc inter quædam legu-
mina nasci constat, & ea stran-
gulare: vnde orobanche sibi
cognométum vsurpauit. Estur,
vt olus, cruda, & in patinis, a-
sparagi modo, decocta. Legu-
mentis addita, coctionem ac-
celerare creditur.

Barbula hirci. Ca. CLXXIII.

Barbula hirci, q̄ ab aliis co-
me vocatur, breui est caule: fo-
liis croci: radice longa, dulci,
supina: magno super caulem
calyce,

τὸ δὲ πέρμα πινόμενον, ἀρμό-
ξῃ τοῖς* μέλαιναν χολῇ θηνῶ-
σι καὶ δυσουροῦσι καὶ πνευματικῇ μέ-
νοισι ποιεῖ δὲ καὶ πῖα μούσας πλεό-
νας ἐπιπώμῃον δι' ὀσφρησιώσας
καὶ ἡ πῖα δὲ τὸ αὐτὸ ποιεῖ, συμ-
πέζειν δὲ τῶν ὀφθαλμῶν δει-
κνόντες τῷ πῖα μού. φυλάσσον-
ται δὲ πῖα αὐτὸ καὶ οὐκ ἐπιόισι,
διὰ τὸ μασηθῆναι καὶ τεθῆναι ἐν ἡ-
λίῳ, σκληρὰ θηνῶν λίβες δὲ
περσειλήφασιν ἐπὶ οἱ φαρύγγες 10
αὐτὸ καὶ πληγῆτες ὑπὸ σκορπίου,
ἀπνοι διαμύουσιν.

Πρὶ Οροβάκης. Κεφ. ροβ.

Οροβάκη χαυλῖον ὅστιν ὑ-
πέρυδρον ὡς διαπιδάμαϊον, ἐ-
νίοτε δὲ καὶ μεῖζον, φύλλοις ὑπο- 15
λίπαρον, ἔνδυσσιν, τρυφῆρον ἀνθε-
σιν ὑπολευκοῖς ἢ μελίζοισι κα-
ρχημύον. ῥίζα δὲ ὑπερὶ δακτύ-
λου τὸ πάχος κατὰ τετραμύον
πρὸς πλὴν τῷ χαυλῷ ἐκτετατόν.
δοκεῖ δὲ φυόμενον ἐν ὀσφείοις 20
πρὸς πῖα γινῆναι αὐτὰ. ὅθεν καὶ πλὴν
περσωνυμίαν ἔρηκε. λαχανεύει
δὲ καὶ ὁ μόνος καὶ ἐφθόνος, ἐκ λοπά-
δος ὡς ἀπαργαῖος ἐπιόμενον καὶ
ὀσφείοις συνελθὲν, τὰ χον αὐ-
τὰ δοκεῖ ἐλθεῖν. 25

Πρὶ Τραυπώωνος. Κεφ. ρον.

Τραυπώωνος ἢ τεβρώωνος,
οἱ δὲ κόμην χαλῶσι, χαυλὸς βρα-
χὺς φύλλα κρόκος ὁμοιοῦ ῥίζα μα-
κρά, γλυκεῖα, * ἐπὶ δὲ τῷ χαυλῷ
καλῶσι

καλυξ μέγας· ἢ ἐξ ἄκρης καρπὸς
μέγας, ἀφ' ἧς καὶ τὸ ὄνομα ἔχον. ἔστι
δὲ ἡ πρὸς ἐδάδιμος.

Πρὶς Ορνιθογάλας. Κεφ. ροδ'.

Ορνιθογάλον καυλίον ἔστι τρυ-
5 φερὲν λεπτὸν, ὑπόλευκον ὡς δι-
σπιδάμιαϊον, ἄνω παραφυάδας
ἔχον, τρεῖς ἢ τέσσαρες ἀπαλάς·
ἀφ' ὧν αὖθις ἐξώθεν μὲν βοτα-
νώδη, διανοιχθέντα δὲ γαλακτί-
ζοντα· καὶ μετὰ αὐτῶν κεφα-
10 λιον ὡς καλχευ ἐν τετμημένον
μετὰ αὐτοῦ σιωπῆτόμῳ ὡς με-
λάνθιον· ῥίζα δὲ βολβώδης· ἐ-
δοιμὴν ὥμῃ τε καὶ ἐφθῆ.

Πρὶς Ὑδνυς. Κεφ. ροε'.

Ὑδνὸν ῥίζα ἔστι περὶ φέρης, ἄ-
15 φυλλος, ἀκαυλος, ὑπόξανθος· ἑα-
ρες ὀρυθιμὴν, ἐδάδιμος δὲ ὅστιν
ὥμῃ τε καὶ ἐφθῆ ἐδοιμὴν.

Περὶ Σμίλακος.

Κεφ. ρος'.

Σμίλαξ κηπήια, ἥς ὁ καρ-
20 πὸς λόβια· ὅπως ἐνίων δὲ ἀσπεί-
ρατος καλεῖται· φύλλα ἔχει κισ-
σῶ ὅμοια, μαλακώτερον μὲν
τοῖς καυλοῦς δὲ λεπτοῦς καὶ ἑλι-
κας πεπλεγμένους τοῖς πε-
ρακειμένοις δαμνίοις· ἀνέανο-
25 μὲν τὸ ἐφ' ἱκανόν, ὡς τε καὶ
σκίωποιεῖσθαι· καρπὸν δὲ φέρει
ὅμοιον τήλει· μακρότερον δὲ καὶ
ἐπισπῆμότερον ἐν οἷς σπέρματα
ὅμοια νεφερίσ, οὐκ ἰσχύροα·
ἐν μέγους δὲ ὑποπυρίζοντα,
λαχανεύει

calyce, è cuius summo semen
nigrum depēdet, vnde nomen
inditū est. Herba esui apta est.

Ornithogalū. Ca. CLXXIII.

Ornithogalū cauliculus est
tener candicans, tenuis, sesqui-
pedalis, tribus aut quatuor in
cacumine mollibus agnatis: à
quibus flores pdeūt, foris her-
bacei, & cum hiātes se pādūt,
laetei visuntur, inter quos dif-
fectum, cachryos modo, capi-
tulum emicat. Coquitur cū pa-
ne, vt melanthiū. Radix bulbo-
sa, cruda & cocta manditur.

Tubera. Cap. CLXXV.

Tubera rotūda radices sunt,
sine caule, sine foliis flauescen-
tes: vere fodiūtur, cruda & co-
cta eduntur.

Smilax hortenfis.

Cap. CLXXVI.

Hortenfis smilax, frutex, cu-
ius semen à nōnnullis lobia vo-
catur: folia habet hedere, mol-
liora tamē: tenues caules, & ca-
preolos vicinis fruticibus cir-
cumuolutos: qui tantum ado-
lescunt, vt topiarias scenas re-
præsentare videant: siliquas foe-
nigræci pfert longiores & to-
rosiores, in quibus semina re-
num similia, sed inæquali colo-
re recluduntur: quæ quadā ex
parte fuluescūt. Siliquas cocta,
cum

DIOSCORIDIS

cta, cum semine in oleribus, asparagi modo estur. Vrinam ciet, & tumultuosa somnia facit.

Medica. Cap. CLXXVII.

Medica cum recenter prodiit, foliis & caule trifolio pretenfi similis est: procedēs verò folia contrahit, caules edēs trifolij, & siliquas corniculorum modo intortas, in quibus semen lentis magnitudine depēdet. Id siccatum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. Viride, quibus refrigeratione op⁹ est, illitu suffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt.

Aphaca. Cap. CLXXVIII.

Aphaca in aruis nascitur, altior lente, tenuibus foliis: siliquas lenticulam maiores fert, in quibus terna quaternave femina nigra, lente minora, continetur: quæ adstringendi vim habent: quare torrefacta, stomachi aluique fluxiones sistunt, si frefalentis more decoquantur.

Porrum capitatum.

Cap. CLXXIX.

Capitatu porru inflatione facit, noxiu succu creat, tumultuosum somnu parit, vrinam ciet, aluo accommodat, extenuat, oculorum

λαχανεύει δὲ εἰς βρώσιν ὁ καρπὸς ἐφόμβιος σὺν τῷ σπέρματι ὡς ἀσπέρου. οὐρητικὸς ὢν καὶ δυσόνειρος.

Πρὶ Μηδικῆς. Κεφ. ροζ'.

*Μηδικὴ ἔοικε μὲν ἄρτι φουμάκῳ τριφύλλῳ τῇ ἐν χορτοκοπίοις. περὶ αὐτοῦ δὲ γενοφύλλοις γίνεταί, χαλωλὸς ἀνείστα τριφύλλῳ ὁμοίους, ἐφ' οἷς τὸ σπέρμα περὶ σπέρματος φακοῦ τὸ μέγεθος, ἐπισημασμένον ὡς κεράτιον. ὅπως ἐξηρανθὲν, μύλνῃται ἡ δύσματος χάριν τοῖς ἀρτυτοῖς αἰσθ. χαλωλὸν δὲ κατὰ πλάτῃν ὠφελεῖ τὰ ψύχειας διόμβρια. ὅλη δὲ τῇ πύα χεῖνται οἱ κτύμοι βοφοὶ ἀντὶ ἀρρώσεως.

Πρὶ Αφάκης. Κεφ. ροθ'.

Αφάκη θαμνίον ὅστις φυτόμβριον ἐν ἀεράρις, φακοῦ ὑψηλότερον, λεπτοφύλλον. τὰ δὲ ἐπ' αὐτῇ φύμβρια μέζονα * θυλάκια τῶ φακοῦ περικλυτὰ τῶν σπερματίων τετάρων μεγάλων καὶ μικροτέρων φακοῦ. Διύαμιν δὲ ἔχει τὰ σπερμάτια συνηκνῶν. ὅθεν ἴσησι καὶ ῥεύμα κοιλίας καὶ σωμαίου φρυγμόμβρια καὶ ἐρεϊκόμβρια καὶ ἐφόμβρια ὡς περὶ φακός.

Πρὶ Πράσου Κεφαλῶτε.

Κεφ. ροθ'.

Πράσον κεφαλῶτὸν φουμάδες, χακόχυμον, δυσόνειρον, οὐρητικόν, ἐνκοιλίον, λεπτιωτικόν, ἀμυγδαλίαν

βρωτιάς ποικίλων, κατὰ μινίων
 ἀρωγόν, βλαπτικόν, κύστεως εἴλκω
 μύνης καὶ νεφρῶν· συνελθὼν δὲ
 πτωσάνη καὶ βρωδὲν ἀνάγῃ τὰ ἐν
 θώρακος· ἢ ὅ καὶ αὐτὶ ἐλθὼν
 5 σα ἐν θαλάσῃ καὶ ὄξῃ, εἰς ἐλκᾶ δι-
 σμα χρῆσι μεύει πρὸς μύσιν καὶ
 σκληρίαν ὑστέρας. ἀπογλυκαίνε)
 ὅ καὶ ἀφυσότρον γίνε)
 10 δισιν ἐλθὼν, καὶ ἀποβραχύν ἐν
 ὕδατι ψυχρῷ. ὅ καὶ καρπὸς δριμύ-
 τερος ἔχων τι καὶ εὐφραίνει· ὅθεν αἰ-
 μαὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς ἴσησι συν' ὄξῃ, καὶ
 μάλα τὸ ἐν μυκτῆρων φρόμα-
 γον, μάνης ἢ λιθανῶν μύχτος.
 ἀφροδίσι δὲ παρμαῖ καὶ πρὸς
 15 τὰ ἐν θώρακι παύτα συν' μέλιτι
 ἀντὶ ἐλκῆ καὶ ποικί καὶ πρὸς φθί-
 σεις βρωδὲν καὶ αἰσὶν δὲ καὶ τὸ ἀπὸ
 ρίαν ἐπὶ τὸ μύρον ὅ πωρεῖ καὶ ἀμαυ-
 ρωτικὸν ὁφθαλμοῦ γίνε)
 20 κακοσώμα-
 χον δὲ ἐστίν. ἀρήϊα καὶ θηριοδύκτοις
 συν' μέλιτι πτόμας ὁ χυλὸς καὶ
 αὐτὸ δὲ κατὰ πλάστος μύρον ὡφε-
 λεῖ. βοηθεῖ καὶ ὡταλίαις ὁ χυλὸς
 καὶ ἡ χοίρη, συν' ὄξῃ καὶ λιθανῶν καὶ
 γάλακτι ἢ ῥοδίνῳ ἐπασαίει. αἰ-
 25 ρει δὲ καὶ ἰόνδοις τὰ φύλλα με-
 τὰ ῥοῦ τὸ ἐπὶ τὰ ὄψα κατὰ πλά-
 στος δέντρα καὶ ἐπιφυκτίδας ἰᾶται, ἐ-
 γχείρας τὲ περιρρίπτει συν' αἰσὶν
 ἐπιπλαστόμας, τὲ μύρτοι πέρ-
 ματος < β'. μτ' μύρτων ἴσων πο-
 δεῖσαι, τὰς χροῖοις ἀναγνώσας τὸ
 αἶματος ἐπὶ χροῖον.

oculorum aciem hebetat, me-
 fes pellit, sed ledit exulceratam
 vesicam, renésque: cum ptisa-
 na verò coctum, esu pectoris
 vitia extrahit. Coma eius in a-
 qua maris, & aceto cocta, in
 defectionibus, ad præclusiones
 vulvæ, & duritias, utilis habet.
 Porrum bis aqua mutata co-
 ctum, tum frigida maceratum,
 dulcescit, & multò min⁹ inflat.
 Semen acrius est, & quandam
 adstrictoriâ vim habet: quare
 succus cum aceto, addito thu-
 re aut manna, sanguinis proflu-
 uia sistit, maximè si narib⁹ erū-
 pat. Venerem stimulat: contra
 omnia thoracis vitia tabémq;
 p' delinctu efficax est: arteriâ
 esu purgat, sed si assiduè estur,
 visus obscuritatē inducit: sto-
 macho aduersatur. Succus ex
 melle potus, aut illit⁹, cōtra be-
 stiarū morsus auxilio est: ipsum
 quoque cum aceto aut thuris
 polline, lacte aut rosaceo, uti-
 liter aurium doloribus, & so-
 nitui instillatur. Varos tollunt
 folia illita cum vua rhois, qua
 ad obsonia vtuntur: epinycti-
 di medentur, crustas ex sale
 illita rumpunt, veteres sangui-
 nis reiectiones cohibent, si bi-
 nis drachmis, & æquali bacca-
 rum myrti pondere bibantur.

DIOSCORIDIS

Ampeloprasum .

Cap. CLXXX.

Ampeloprasū stomachio magis aduersat, & plus porro ex-
calfacit: vrinam & menses ve-
hementius ciet. Id contra fer-
pentium morsus esse cōuenit.

Cepa. Cap. CLXXXI.

Cepa longa acrior est, quàm
rotunda, item flaua quàm can-
dida, & sicca quàm viridis, &
cruda quàm cocta, aut sale cō-
dita. Omnes tamen mordent,
flatus gignunt, appetentiā inui-
tant, sitim mouēt, & extenuāt:
fastidiū pariunt, & expurgant:
aluo vtilis sunt. Ex detractis
purgamētis in oleum cōiecta,
hæmorrhoidas, reliquosq; ex-
cretionum exitus referāt, sub-
dita pro balanis. Succus cum
melle illitus, oculorum hebetu-
dinibus, argemis, nubeculis, &
incipientibus suffusionibus au-
xiliatur: angine eodē perungū-
tur: suppressos menses pellit, ca-
put purgat naribus infusus: ca-
nis moribus cū aceto, ruta, &
melle illinitur: cū aceto autem
perunctas in sole, vitilignes fa-
nat: & cū pari spodio, scabras
lippitudines sedat: varos cū sa-
le reprimit: contra calceamen-
torum attritus, cum gallinaceo
adipe vtilis est: citē aluo pdest:

in

Πρὶ Ἀμπελοπρασού,

Κεφ. ρπ'.

Ἀμπελόπρασον, κακοσμομαχόν
τερον τ' ὑπερθεῖν, διεμνηστικώτε-
ρον δὲ καὶ ἐρεπτικώτερον· κατα-
μύωσιν ἀγωνόν. Φησι οὐδὲν τοῖς
βιβρώσκοις ἀντιόχον.

ῥὶ Κεράμυον. Κεφ. ρπα'.

Κεράμυον δριμύτερον τὸ μα-
κρόν τῷ στρογγύλῳ, καὶ τὸ ξανθὸν
τῷ λευκῷ, καὶ τὸ ξηρὸν τῷ χλωρῷ,
καὶ τὸ ὠμὸν τῷ ὀπίῳ καὶ ταχυερῷ. 10
ἔστι δὲ ἅπαντα δηκτικὰ καὶ πνευ-
ματωπικὰ. ὀρέξεως ἐκκλητικὰ, καὶ
πλωτικὰ, διψώδη, ἀσπώδη, ἀπο-
καταρπικὰ, ἐνκοιλία ἀναστομω-
τικὰ ἐκκρίσεων τῶν τε δάκνων καὶ
αἰμορροΐδων, ἀντὶ βαλάνου δὲ 15
προσίδεται λεπιδέντα καὶ εἰς ἐ-
λαιὸν ἐμβληθέντα. ὁ δὲ χυλὸς ἐξ-
χειρὶς μὲν σὺν μέλιτι βοιδεῖ ἀμ-
βλυωπεύσιν, ἀντὶ γαστρίδος,
καὶ ἀντὶ χολέρας ὑποχειρῶς, καὶ σὺν-
αγχοῖς διαχειρῶς· κινεῖ τε 20
καταμύωσιν καὶ ἄγει, ἐγχυτὸς τε
καταρπικὸς διὰ ῥινὸς κεφαλῆς·
κυνοδόντοισι δὲ κατὰ πλάσμι-
α μετ' ἄλως καὶ πηγαίου καὶ μέ-
λιτος· σὺν ὅξει δὲ ἐν ἡλίῳ κα-
ταχειρῶς ἀλφουρὸς ἵσται· μετ' 25
ἵσου δὲ ἀποδίου ἡμεροφθαλμίας
παύει, καὶ ἰόντοισι σὺν ἄλῳ
τέλει· σὺν ὀρνιδεῖω δὲ σέας
πρὸς ἐκτενέμματα ὑποδημάτων
χρήσιμος· καὶ πρὸς ῥεύσιν κοιλίας
καὶ

5 ἢ δυσκολίαν καὶ συνεισμὸν, καὶ
 πυορροῦν τὰ ὦτα * καὶ πρὸς τὰς
 ἀπολήψεις τῶν ὑδάτων τῶν ἐν
 τοῖς ὠτὶν ἀρμόζει καὶ πρὸς ἀλω-
 πεκίας παρατείδόμενον, τάχον
 10 γὰρ ἀλκυονίδου προσκαλεῖται τεί-
 χας. ἔστι δὲ τὸ κράμμυν κεφα-
 λαλγές πλείον βρωθὲν, ἐφθδὲν δὲ
 οὐρητικώτερον γίνεται. πλείον δὲ
 ἐπιτόμενον ἐν γόσοις λιθάρχοις
 ποιεῖ. τὸ τοίνυν ἐφθδὲν καὶ κα-
 15 ταπλαδὲν συνὲ σαφίδι ἢ σύκῳ,
 φύματα πέψῃ καὶ διαρρήσσει.

Πρὶ Σκορόδου. Κεφ. ραβ'.

Σκορόδον τὸ μέν, ἔστιν ἡμερον
 καὶ κηπευτὸν, καὶ τὸτο ἐν αἰγύπτῳ
 μονοκέφαλόν ὄσιν, * καλοῦσι δὲ
 15 τὰς ἐν αὐτῷ ῥάχας ἀλιδας. * ἔστι
 δὲ καὶ ἀπὸ ἄλλου ὀφιοσκορόδου κα-
 λοῦμενον. Διῶαμιν δὲ ἔχει δρι-
 μεῖαν, θερμαντικὴν, ἐκκριτικὴν
 φυσώδη, καὶ κοιτίας ταρκατικὴν,
 20 ξηραντικὴν σομάχου, δΐψης πει-
 πτικὴν, ἐμπνευματώσεως ἀναι-
 σθητικὴν, καὶ ἐπιφανείας ὀμμάτων
 ἀμβλυωτικὴν, βιβρωσκόμενον, * καὶ
 πρὸς τοὺς ξηνισμοὺς τῶν ὑδά-
 των ἀρμόζει, ἀρτηρίας λαμπαρῶ-
 ν, καὶ βήχας χρονίας παρηγορεῖ,
 25 ὡμὸν τε καὶ ἐφθδὲν ἐπιτόμενον.
 Φθεῖρας δὲ καὶ κόνιδας φθεῖρει
 συνὲ ἀφελήματι οὐρανῶ πνόμε-
 νον καὶ δὲ καὶ μέλιτι φρεσθὲν,
 ὑπόπια καὶ δλωπεκίας ἰάται κα-
 ταχρίόμενον ἐπὶ τῷ δλωπεκίῳ

in auribus fonitū, ac grauitatē
 emendat: ad purulētas aureis,
 & eliciendā earūdem aquam,
 valet: alopeciae earū succo p-
 fricantur, qui celerius, quā al-
 cionium pilos euocat: largiore
 cibo cepa capitis dolores ciet,
 cocta q; vehemētius vrinā pel-
 lit: eos lethargicos efficit, q; va-
 letudinib⁹ aduersis, vt etiā co-
 cta, plus æquo vescant: elixa, &
 cū pafsisvuis, et fico illita, tuber-
 cula cōcoquit, & celerrimē rū-
 pit. Alliū. Cap. CLXXXII.

Allium quoddā satium atq;
 hortēse habetur, quod in Aegy-
 pto, singulari, vt porrum, capi-
 te cōstat, cui⁹ nucleos aglitas,
 Græci nominant. Aliud est syl-
 uestre, quod Ophioscorodon,
 id est anguinū, vocant. Vis allij
 acris est: excalfacit, mordet, ex-
 ceruit, aluū turbat, inflationes
 facit, stomachum exiccat, sitim
 gignit, flatum permouet, sum-
 mam corporis cutem exulce-
 rat, aciem oculorū esu hebe-
 tat, cōuenit & cōtra aquarum
 mutationes, vocem clarificat,
 veterē tussim crudum coctū-
 ve lenit: potū autem cū origa-
 ni decocto, pediculos, & lēdes
 enecat: cremati cinis illit⁹ fugil-
 lationib⁹ cū melle, & alopecis
 cū nardino vnguine, medetur:
 eruptiones

DIOSCORIDIS

eruptiones papularum cum oleo & sale sanat: vitiligines, lichenas, lentigines, vlcera capitis manatia, lepras, & furfures, cum melle eximit: cum thure, & teda decoctum, dētium dolorem leuat, si in ore conuinca-
tur: contra venenatos muris aranei morfus, cú ficulneis frōdibus, & cumino illinitur. Feruefactæ comæ ius, foëminarū defefsionibus additū, mēses & secundos partus extrahit. Alliū eiusdē gratia suffitur. Factū ex eo, & nigra oliua intritū, quod myttoton vocant, esu cit vrinam, ora venarum patefacit, hydropicis vtile.

Scorodoprasum.

Cap. CLXXXIII

Scorodoprasum magnitudine porrum equat, qualitatum porri, & allij particeps: vnde p-
miscuas sibi vires ex vtroq; vēdicauit, effectus allij, & porri præbens: inefficacius tamē. Coctum, porri modo, dulcescit, & in olerum vicem transit.

Sinapi. Cap. CLXXXIIII.

Sinapi hortēse, aliqui napi vocāt. Eligi debet adultū, valde rufum, nō magnopere ficcū, sed qđ fractū internē virefcat, & veluti quodā succo madeat, cęsiū colore: siquē recēs id genus tēpestiuū

συν ναρδίνω μύρω καὶ ἄλλοις καὶ ἐλαίῳ, ἐξανθήματα θέρει· ἀφίσησι δὲ καὶ ἀλφoύς καὶ λειχῖνας καὶ φακοὺς· ἀχῶρές τε καὶ πίτυρα καὶ λέπρας συν μέλιτι· μετὰ δαδίου δὲ καὶ λιθανώτῃ ἐψηθῆν, ὁδονταλγίαν διακράτῃ· μύρον ἐν τῷ σώματι κουφίζει· μυρῶνός τε ὅστις κατὰ πλάσμα συν συκῆς φύλλοις καὶ κυμίνῳ· τῆς δὲ κόμης τὸ ἀπόζημα ἐξ ἰσθμίου ἐμμιλῶν καὶ δευτέρων ἀγωγόν· πρὸς τὸ αὐτὸ δὲ καὶ ὑπερδυμιᾶται. τὸ δὲ ἐξ αὐτῆς καὶ τῆς μελαίνης ἐλαίας γινόμενον πείμα, καλὸν μύρον δὲ μύρτον, οὐρηστικὸν καὶ ἀναστομῶν· χρῆσιμον δὲ καὶ ὑδρωπικοῖς ὅστιν.

Πρὶ Σκορδοπρασσοῦ.

Κεφ. ργʹ.

Σκορδοπρασσον φύει ὡς πρᾶσον μέγα, μετέχον τῆς τῆς σκόρδου καὶ τῆς πρᾶσου ποιότητος· ὅθεν καὶ πλὴν διῶαμιν μικτὴν ἔχει ποιῶν ὅσα καὶ τὸ σκόρδον καὶ τὸ πρᾶσον· ἀνιμνύως μὲν τοι. λαχαρεύεται ὅ εἰς βρώσιν ὡς τὸ πρᾶσον ἐφόμῳ καὶ ἀπογλυκανόμενον.

Πρὶ Σινίπεως. Κεφ. ρπδʹ.

Σίνιπι ἢ νάπυ, ἐκλέγουσιν τὸ μὴ κατὰ ξηρὸν καὶ κατὰ πυρρὸν, ἀδρὲν, ἀλλ' ὁ δὴ θλαδρὲν ἐνδρὲν χλωρὸν καὶ οἶονεῖ ἔγχυλον. γλαυκόν· πρὸς σφαπὴν γὰρ καὶ ἀκμαῖον

ἀκμαῖον τὸ πρῶτον. δυνάται
 δὲ θερμαίνεν, λεπτιώεν, ἐπι-
 σσᾶσαι, ἀποφλεγματίζειν δια-
 μασσηδέν. μυχὸς δὲ ὁ χυλὸς ἀν-
 τὸ ὑδρομέλιτι, πρὸς ἀντιάδας
 5 καὶ τὰς χροῖοις τραχύτητας τῆς
 ἀρτηρίας καὶ πυλώδεις, ἀναγερ-
 γαιζόμενος ἀρμόζει. πρὸς α-
 λθεν ὅ τοις μυκτῆσι λείον, πηαρ-
 μούς κυεῖ. ἐπιληπτικοῖς τε βο-
 ηθεῖ καὶ ὑστερικῶς πικρὰ μύδας δι-
 10 γείρει. καὶ ἐπὶ ληθαργικῶν κα-
 ταπλάττεται ξυρηδείσης τῆς κε-
 φαλῆς. μυγρὸν δὲ σύκοις καὶ ἐπιτε-
 δέν ἄχρι φοινίξεως, ἀρμόζει πρὸς
 ἰσχιάδας καὶ σπληνῶας, καὶ καδόλου
 εἰς πᾶν χροῖον ἀλγισμα, ὅπου
 15 μετάρηεν τί ἐν τῷ βάθους εἰς
 τὴν ἐπιφάνειαν βουλόμεθα τῷ
 τῆς ἐτεροπαδείας λόγῳ. θερα-
 πεύει καὶ ἀλωπεκίας καταπλά-
 σθην, πρὸς ὥσπον δὲ καδαῖρη, καὶ
 ὑπόπια αἶρει σὺν μέλιτι ἢ σέα-
 20 π ἢ κηρωτῇ. σὺν ὀξὺ δὲ πρὸς
 λέπρεας καὶ λεγύνας ἀγρίους πε-
 ριχέσται. πίνεται δὲ καὶ πρὸς
 πελιδόους ξηρόν. ὡς ἀλφίτα ἐπι-
 παρόμυρον τῷ ποτῷ, ἐπιπασσι-
 κῶς τε ἐμπλάστοις καὶ, ἰσχυ-
 25 καὶς μύζνται χροῖοις. δυσπ-
 κοίαις τε καὶ ἡχοῖς λείον ἐπιπιδέ-
 μυρον τῇ ἀκοῇ, μετὰ σύκῃ ὠφε-
 λεῖ. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῇ σὺν μέλιτι
 ἀρμόζει, πρὸς τὸ ἀμβλυωπίας καὶ
 τραχέα βλέφαρα ἐγχεόμενος.
 χυλίζεῖ

tempestivum habetur. Ad cal-
 faciendū, extenuandū, extrahē-
 dum, efficax est. Ad eliciendam
 capitis pituitam manditur: cō-
 tra præduros tonsillarū tumo-
 res, ac veterem callosamq; ar-
 teriæ scabritiē, succus ex aqua,
 & melle, conveniēter gargari-
 zatur: sternutamenta ciet, tritū
 & naribus admotū: comitiali-
 bus quoque auxiliatur. Foemi-
 nas vuluæ strangulatu oppres-
 sas excitat: lethargicis, derafo
 capite, illinitur cum ficis admi-
 stum, donec rubescat locus, &
 ad coxendicum cruciatus im-
 positum, ad lienes, & omne ge-
 nus dolores confert, cum per-
 mutandæ valetudinis causa, ex
 alto vitia extrahenda sunt. A-
 lopecijs illitū medetur, faciem
 purgat, sugillata cum melle, a-
 dipe aut cerato rapit. Ferē im-
 petigines & lepræ, eo cum acē-
 to perunguntur: contra feбри-
 um circuitus aridum bibitur,
 aut potui polentæ modo, in-
 spargitur: extrahētibus empla-
 stris, scabiemq; extenuanti-
 bus, vtiliter admisceri solet: tri-
 tum, gravitati aurium & soni-
 tui, cum fico impositum pro-
 dest. Succus ad hebetudines
 oculorum & genarum scabri-
 tias magna vtilitate illinitur.

DIOSCORIDIS

Expressius recenti semine succus, in sole ficcatur.

Nasturtiū. Cap. CLXXXV.

Nasturtium optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre: excalfacit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tincas excutit, lienem imminuit, partus exanimat, menses cit, venerem stimulat, sinapis & erucæ simile intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Illitum cum melle, lienem extenuat, fauos expurgat, pulmonum vitia extrahit, forbitionibus incoctum. Serpenticum venenis potum resistit, atque eas suffitu fugat: capillorū defluuia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta commodè ex aceto illinitur, tumores collectionesq; discutit, emittit furunculos, illitum cum muria. Herbx ad omnia eadem effectus, licet minor.

Thlaspi. Cap. CLXXXVI.

Thlaspi, herbula angustis foliis, digitali longitudine, in terram versis, suppinguibus, in cacumine diuisis: binum dodrantum cauliculo, tenui, non sine adnascentibus ramis: fructu circa ipsum totum, ab extremo

χυλίζει) δὲ ἐπὶ χλωρὸν τὸ σπέρμα, καὶ τὸ ἀποθλίβει ξηραίνει) ἐν ἡλίῳ. Πρὶ καρδάμικ. Κεφ. ραβ.

Καρδάμον κάλλιπον μὲν εἶναι δοκεῖ τὸ ἐν τῇ βαβυλωνίᾳ καρδάμον. πάντες δὲ τὸ σπέρμα θερμαίνον. δριμύ, κακοςόμαχον, κοιλία ταράσσον, καὶ ἐλμυνδας ἐπιγάσσον, σπληνῶα μειοῦν, ἐμβρυαφθεῖρον, ἐμβρυακινούν, συνουσία παρρημῶν, εἰσὶν δὲ συνήπει καὶ ἐνζώμω. ἀποσμήχει λέπρας, ἰαλὴ χυλῶας. συνὲ μέλει δὲ σπληνῶα ταπεινῶι καταπλαστέμενον, καὶ κνεία ἀποκαθαίρει, * καὶ τὰ ἐκ θώρακος ἀνάγει ἐγκατεφόμενον. ῥοφήμασιν. ἐρπετῶν τε ὅτιν ἀντιφάρμακον πνύμενον, θυμιαίνον δὲ ἐρπετὰ διώκει. τείχας τε ῥεύσας ἐπέχει· καὶ ἀνδραγας περὶ ῥήτιει πυοποιεῖ. συνὲ ὅξος δὲ καὶ ἀλφίτοις καταπλαδέν, ἰσχυρὰ δικοῖς ὠφελεῖ καὶ οἰδήματα καὶ φλεγμονὰς διαφορεῖ, δοθιλήνως τε ἐκ πυοῖ συνὲ ἄλλη καταπλαδέν. καὶ ἡ πῶα δὲ τὰ αὐτὰ ποιεῖ, ἔλασσον μὲν τοι διώαται.

Πρὶ Θλάσσεως. Κεφ. ραβ.

Θλάσσι βοτανίον ὅτι σενὸν τοῖς φύλλοις ὡς δακτύλου μῆκος πεπωκὸς ἐπὶ τῆς γῆς, ἀκροκαθέσιν ὑπολιπάρεις, χαμλὸν δὲ λεπτὸν ἀνίσχισι διασπιδαιμῶν. ἀποφυάδας ὀλίγας ἔχοντα, καὶ ὅτε ὅλον αὐτὸν καρπὸς ὑπόπλατυς

ὑποπλατὺς ἐξ ἄκρῃ· ἐν δὲ σπρ-
 μάπον ἐμφερὲς καρδιάμω, δισκο-
 ειδὲς, οἷονεὶ ἐν τεθλασμένον (ἐξ
 οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἐσηκεν) αὐτὸς
 δὲ ὑπολευκόν. ἐπὶ ὁδοῖς καὶ ἐπὶ
 5 τοιχῶν καὶ ἐπὶ θριγκῶν φυόμενον·
 σπέρμα δειμν, σερμαντικόν· χρ-
 λῶ ἄνω τῇ καὶ κατω καθεῖσθαι,
 ποδὲν πληθὺς ὀξύβαφον· ἐγκλύ-
 ζεται δὲ καὶ πρὸς ἰσχιαδικοῖς· ἀγ-
 δὲ καὶ αἷμα ποδὲν, καὶ τὰς ἐν τοῖς
 10 ἀποσάσεις ῥήγνισι· κινεῖ δὲ καὶ
 καταμυῖα, καὶ ἐμβρυα φθείρει.
 Ἰσορεῖ δὲ κρατεύας καὶ ἑτέρον
 θλάσσι, ὁ πινεσ ὁρσικόν σίνηπι κα-
 λουσι, πλατύφυλλον καὶ μεγαλόρ-
 ριζον· καὶ τὸτο δὲ μίγνυται τοῖς
 15 πρὸς ἰστιάδα διακλυσμοῖς.

Πρὶ Δράβης. Κεφ. ρθζ'.

Δράβη ἡ πόα πῆχως ἐχρυστα
 ὑψος, ῥάβδος λεπτὰς, παρ' ἐκά-
 τερα δὲ τὰ φύλλα ὡς ὁρ λεπ-
 δία, ἀπαλῶτερα δὲ καὶ λευκότε-
 20 ρα· ἐπ' ἄκρῃ δὲ σπιάδιον καθεῖ-
 σθαι ἀκτίς· ἐχρον αὐτὴν λεπτὰ, ταύ-
 της ἡ πόα συνέψεται τῇ πρισάνῃ
 μάλιστα ἐν καππαδοκίᾳ· ὅς καρ-
 πὸς αὐτῆς ξηρὸς ἀντὶ πεπέρεως
 μίγνυται τοῖς πρὸς σπῆμασιν.

Πρὶ Ερυσίμου. Κεφ. ρπθ'.

25 ΕΡΥΣΙΜΟΝ φύεται
 πρὸς τὰς πόλεις, καὶ οἰκόπεδα,
 καὶ κήπους, φύλλα δὲ ὁμοία
 ἐνζώμῳ ἀγρίῳ ἔχει· καυλὶα ἰ-
 σία τῶδιν, αὐτὴν μολίζοντα· ἐπ'
 ἄκρῃ

extremo in latius se panden-
 te: semine nasturtij incluso lé-
 ticular vasis effigie, nisi quod
 infringitur (vnde nomen ac-
 cepit) flos albicat. Nascitur in
 semitis, & sepibus, fossisque:
 Semen asperi gustus, excalfa-
 ciens: bilem vtrinque extra-
 hit, potum acetabuli mensura:
 pdest ischiadicis infusum: san-
 guinem potu educit, internas
 suppurationes rumpit: menses
 ciet, sed partus enecat: Alte-
 rum thlaspi tradit Crateuas,
 quod aliqui Persicó sinapi vo-
 cant, latis foliis, radicibus ma-
 gnis: vtile ischiadicorum in-
 fusioni.

Draba. Cap. CLXXXVII.

Draba herba ad cubiti alti-
 tudinem affurgit, tenues spar-
 gens ramos, & ex vtroque la-
 tere folia, ceu lepidij, sed mol-
 liora, & candidiora: in cacumi-
 ne verò sambuci umbellá ge-
 rit, cádidos flores habenté. Her-
 ba hæc cū ptisana coquitur, in
 Cappadocia maximè. Semen
 aridú p pipere obsoniis admi-
 sceť. Irío Ca. CLXXXVIII.

Erysimon, Latini irioné vo-
 cāt, iuxta vrbes, rudera hortó-
 que nascit, foliis erucæ sylue-
 stris: cauliculis in lori modú lé-
 tis et obsequiosis: florib⁹ luteis,
 q ij filiquis

filiquis in cæcumine gracilib⁹,
vt fœnogræco, corniculatis:
femine nasturtij,exiguo vren-
tis gustus.Contra thoracis flu-
xiones efficax est, & si puru-
lenta extulsiuntur: regio mor-
bo, & coxendicibus prodest:
contra venena in delinctu cū
melle datur: illinitur ex aqua
aut melle vtiliter cæcis carci-
nomatis, parotidibus, duritiis
mammarum, & testium inflā-
mationibus. In totum exte-
nuat, & calfacit. Mitius mul-
tò ad clysteres fiet,si aqua ma-
descat atque torreatur, vel lin-
teo illigatū, pinlita farina ob-
litum perassetur.

Piper. Cap. CLXXXIX.

Piper in India nasci, breui
arbore traditur: quæ inter ini-
tia, prælongum fructum, velu-
ti filiquam promit, quod lon-
gū piper est: habet int⁹ aliquid
tenui milio simile, quod tan-
dem in perfectū piper euadit.
Id autem suis téporibus dehi-
scens,pandensq; sese racemos
emittit,grana ferétes qualia vi-
demus.Ea acerba cádídum pi-
per faciūt,aptū ocularibus re-
mediis,antidotis,& medicami-
nibus,quæ cōtra venenata pa-
rantur: theriaca vocant. Lon-
gum veròv chemétius mordet,
&

ἀκρων δὲ λοβοὶ κεραιόειδεις, ἰ-
χνοὶ ὡς τήλιδος· ἐν οἷς σπερμά-
τια μικρὰ καρδάμω παραπλή-
σια, πυρῶδη κατὰ τὴν γεύσιν.
πιουῶντα πρὸς θώρακος ρευμά-
τισμόν, ἐμπύους, βῆχας· ἱκτε-
ρον, ἰσχιάδας, ἐκλειχρόμυρον συν-
μέλιτι. πίνε· καὶ πρὸς τὰ δακτύ-
σμα φάρμακα, κατὰ πάλαιον με-
νον ᾧ μετ' ὕδατος ἢ μέλιτος, ὀφει-
λεῖ καρκινώματα κρυπτὰ, σκλη-
ρείας, παρωτίδας, διδύμων καὶ ἰο-
μαστῶν φλεγμονάς. λεπτὰ δὲ καὶ
καθόλου θερμαίνει· ὀπτεῖ δὲ
δὲ γίνεται εἰς τὰ ἐγκλύσματα,
ἀποβραχύν ὕδατι καὶ φωχθέν, ἢ
ἐὶ δεξὴν εἰς ὀδόνιον καὶ ὀπτηθὲν
στάτος πειπλαδέντος. 15

Πρὶ Πεπέρεως. Κεφ. ρπθ'.

Πέπει δένδρον ἰσορεῖται φυ-
όμυρον ἐν ἰνδία, βραχὺ, καρπὸν
δὲ ἀνίσσι, καταρχὰς μὲν πρὸς
μύκη κατὰ περ λοβούς, ὅθ' ὅστι
μακρὸν πέπει· ἔχον τὸ ἐντὸς 20
* κέχλω παραπλήσιον, τὸ μέ-
λον ἔσεσθαι τέλειον πέπει. ὁ-
περ κατὰ τοὺς οἰκείους καιροὺς
ἀναπλούμυρον· βότρυς ἀνίσσι,
κόκκους φέροντας οἷοις ἴσμεν·
τοὺς δὲ, καὶ ὀμφακώδεις, οἱ π- 25
τες εἰσὶ τὸ λευκὸν πέπει, ἐν-
δετοῦν μάλιστα εἰς τὰ ὀφθαλ-
μικὰ καὶ ἀντιδότους καὶ θηρι-
ακὰς διωάμεις· * ἔστι δὲ τὸ μὲν
μακρὸν ὀπιτεταμύρον τῇ δύνει,
καὶ

καὶ ὑπόπικρον, διὰ τὸ ἄωρον,
καὶ ἐπιτήδειον εἰς τὰς ἀντιδω-
τους καὶ θηριακάς διωάμεις.
τὸ δὲ μέλαν ἥδιον καὶ δριμύ-
τερον τῷ λευκοῦ, καὶ ὑσομώ-
στερον, καὶ μάλλον διὰ τὸ εἶ-
ναι ὀρεῖμον ἀρωματίζον, ἐν-
χρηστότερον. τε εἰς τὰς ἀρτύ-
σεις. τὸ δὲ λευκὸν καὶ ὀμφα-
κίζον, ἀδυνέστερον τῶν περρι-
ρημύων. ἐκλέγρου δὲ τὸ βαρύ-
10 ταντον καὶ πλήρες, μέλαν, μὴ
σφόδρα ῥυστὴν, πρὸς φατον. δὲ
καὶ μὴ πυρῶδες. ἐνείσκειται
δὲ π ἐν τῷ μέλανι ἄτροφον, κε-
νὸν καὶ κοῦφον, ὃ καλεῖται βράσμα.
Διωάμιν δὲ ἔχει κοινῶς διερχαν
15 πικρὴν, οὐρητικὴν, πεπικνὴν, ἐπι-
σπαστικὴν, διαφορητικὴν, σπικτικ-
κνὴν, τῶν ταῖς κόραις ἐπισκοποῦ-
των. ἀρμόζει καὶ ῥίγας πελοδικαῖς
πυρόμενον τε καὶ συγχυρόμενον.
καὶ θηριοδύκτοις ἀρήγει, ἄγει καὶ
20 ἐμβρυα. δοκεῖ δὲ καὶ ἀτόκιον
εἶναι μετὰ συνουσίαν περριδέ-
μενον. βηξί τε καὶ πᾶσι τοῖς
πρὸς τῶν κατὰ τὴν ἀρμόζει,
ἐντε ἐκλεικτοῖς καὶ ποτήμασι
λαμβάνομενον. καὶ συνάγχαις
25 ἀρμόζει διαχυρόμενον συν μέ-
λι. καὶ σφόδρος λύει πυρόμε-
νον μετὰ δάφνης φύλλων ἀπα-
λῶν. ἀποφλεγματίζει δὲ συν
σαφίδι διαμασσηθέν. ἀγώδιον
τε ὅτι καὶ ὑγρὸν καὶ ὀρεῖον κινεῖ.

πέλει

& quoniam prius q̄ emature-
scat decerptū est, subamarum
relinquitur, antidotis & theria-
cis medicaminib⁹ expetitū. Ni-
grum verò, vtpote quod tēpe-
stiva maturitate collectum sit,
odoratum esse cōstat, candido
suavius, acrius, & ori gratius
necnon ad condimēta vtilius.
Sed candidū, & adhuc in acer-
bū vergēs antē dictis infirmius
est. Eligi oportet grauissimum,
plenū, nigrū, sinē multis rugis,
recēs ac minimē fursurosum.
Inueniuntur etiam nūm in ge-
nere nigri semina nutrimento
defecta, cassa, inania, minimi-
que pōderis quod vocāt bra-
sma. Vis omniū excalfacit, vri-
nā ciet, cōcoquit, extrahit, dif-
cutit, absterget caliginē q̄ ocu-
lis obuerfat. Piper, febriū hor-
rorib⁹ circuitu repetētibus, si-
ue potu, siue illitu, subuenit: ser-
pentiū morsibus auxiliat, part⁹
extrahit, cōceptū adimere cre-
dit, statim à cōcubitu supposi-
tū: tussi, oibusq; pectoris vitiis,
siue eclegmate, siue potu, suc-
currit: angine eo & melle cōue-
niēter pungunt: potū cū recēti
b⁹ lauri foliis, tormina discutit:
cū vua passa māducatū, pituitā
à capite elicit: valetudinē tuef,
dolores finit, appetētiā mouet:

q̄ iij. cōco-

concoctionē adiuuat, ad intin-
ctus esculentorum additū: stru-
mas cū pice discutit: vitilignes
ex nitro emaculat. Fictili no-
uo, vt lenticula, motū torretur.
Nō est huius arboris radix gin-
giber, vt aliqui existimauēre, si-
cuti paulò post ostēdem⁹. Nā-
que piperis radix costa similis
est, ora gustantiū accendit, sa-
liuam ciet. Hęc lienē reprimat,
cū aceto illita, aut pota: caput
etiam purgat, manducata cum
femine pedicularis herbæ, quā
staphidem agriam vocant.

Gingiberis. Cap. CXC.

Gingiberis sui generis plāta
est, ī Troglodytica Arabia ma-
gna ex parte nascēs: qua virēte,
ad multa, perinde atq; nos ru-
ta, vtūtur, & primis potibus &
eduliis admiscēt. Huius radi-
ces, cyperi modo, parux sunt,
candicātes & odoratæ, atq; pi-
per sapore imitantur. Eligi de-
bēt quę teredines nō nouerūt.
A multis tamen ob id cōdiunī,
q̃ celeriter cariē sentiāt, ac fi-
ctilibus in Italiam asportātur.
Gingiberis cibo cōueniēs est,
& cū cōdimēto assumit. Excal-
factoriā vim & excoquentem
habet: aluū leniter emollit, sto-
macho utilis est, efficax aduers⁹
ea q̃ oculis caliginē offundūt.

In

πέλει τε συνέρχεται μινύμνον ἐν
βάμμασιν. ἀναλφθὲν δὲ πρὸς
χρυσάδας διαφορεῖ. σιμῆχει δὲ
ἀλφούς συνὲ νίτρω· φώγνυται δὲ
ἐπ' ὀσφάκκι καὶ ἐπ' ἀνδράκων,
κινούμνον ὡς φακίη. ἢ ὅ ρίζα αὐ-
τῶ, οὐκ ἔστι ζγγίβρις καὶ δάφνη·
νιοὶ ὑπέλαβον, ὡς αὐτῆς δηλώ-
σονται. ἔοικε μὲν τοι κόσμῳ ἢ τῷ
πεπέρεως ρίζῳ, θερμαίνουσα τὴν
γύσιν καὶ ἵζη ἀποσκαλομένη.
ταπεινοὶ δὲ σπληνῶ συνὲ ὄξει καὶ
ταπασκομένη καὶ πινομένη· ἀπο-
φλεγματίζει δὲ μετὰ σαφίδος ἀ-
ρχίας μαροσηθεῖσα.

Πρὶ Σιγγιβέρεως. Κεφ. ρς'.

Σιγγίβρις ἴδιον ὅστις αὐτὸν,
κινούμνον ἐν τῇ τετραγλοδυτι-
κῇ ἀραβίᾳ πλείστον· οὐ χρῶν-
ται τῇ γλῶσσει εἰς πολλὰ καὶ δά-
φνη· ἡμεῖς τῷ πινακίῳ ἔχοντες εἰς
θεραπευτικούς καὶ ἐλπίματα μι-
νύμνους. ἔχει δὲ ρίζα μικρά
ὡς τὸ κινάρεον, ὑπέλαβον καὶ
ἀνέχοντα τῇ γύσει, καὶ ἐνὶ
δελφίνου δὲ τὰ ἀτερπιδόνισα.
ὑπὸ ἐλίων μὲν τοι ταριχεύεται
διὰ τὸ εὐσηπτόν, καὶ διακο-
μίζεται κεραμείοις εἰς ἰταλίαν.
ἐν χρυσῶν εἰς βρώσιν, λαμβά-
νεται δὲ μετὰ ταριχείου. Διῶα-
μιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, πεπτι-
κὴν, μαλακτικὴν κοιλίας ἐπιει-
κῶς, ἐν σόμαχον· ποιεῖ καὶ πρὸς
τὰ ἐπισκοτουῦντα ταῖς κόραις.
μινύμνῳ

μύγνυται ἢ ἀντιδότοις, ἢ κα-
δόλου παρέοιχέ πως τῇ τε πε-
πέρεως δυνάμει.

Πρὶ Τδροπεπέρεως. Κεφ. ρεα.

Τδροπέπει φέται μὲν μάλι-
5 σα παρὰ τασίμοις ὕδασι, ἢ ἐπι-
εκέσι ρείθροις· χαυλὸν δὲ ἀνήκοι
ζονα τώδῃ, σφεδὸν, περὶ δὲ μαχά-
λαι ἢ φύλλα ἐοικότα ἡδυσμῶ,
μεΐζονα δὲ ἢ τρυφερότερα καὶ
λευκότερα, δριμύα ἐν τῇ γένει
10 ὥσπερ τὸ πέπει, οὐ μὲν ἀρωμα-
τίζοντα· καρπὸν δὲ ἔχει ἐπὶ κλω-
ναρίων μικρῶν ἐκφυρόμενον παρὰ
τὰ φύλλα, σιωεχὴ ἢ βωβυώδῃ,
δριμυὴ ἢ αὐτόν. Δυνάμει δὲ
χει τὰ φύλλα σὺν τῷ καρπῷ κα-
15 ταπλαστόμενα, οἰδήματα ἢ χρο-
νίαι σκληρίαι διαφορεῖ· ὥσπερ
ἡ ἀποκαταίρειν, ξηρανθέντα δὲ ἢ
κοπέντα, μύγνυται ἀντι-πεπέρεως
αἰσὶ ἢ περὶ σπύγμαισι, ρίζαν δὲ
ἔχει μικρὰν ἄχρηστον.

20 Πρὶ Πταρμικῆς. Κεφ. ρεβ.

Πταρμικὴ δαμνίον ὅτι κλω-
νας ἔχον μικροὺς πολλὰς, περὶ φε-
ρεῖς, ὁμοίους ἀβροτόνῳ· περὶ οὖν
φύλλα ἐπιμήκη, ἐοικότα τοῖς τῆ
ἐλαίας, πολλὰ, ὥσπερ ἄκρω δὲ ὥσ-
25 περ ἀνθεμίδος κεφάλιον μικρὸν.
Πειφερεῖς, δριμυὴ καὶ ὁσμυῶ, ἐ-
ρεθιστικὸν πταρμικῶν ὅθεν ἢ ὀνόμα-
ται. Δυνάμει δὲ καταπλαστόμε-
να τὰ φύλλα μὲν τῶν ἀνθῶν ὥσπερ
πταρμικῶν, τὰ δὲ ἀνθῶν, πταρμικῶν,
ἐν ἀρχῇ τῇ

In antidota addi solet. In sum-
ma piperis viribus respondet
Hydropiper.

Cap. CXCI.

Hydropiper apud aquas
nascitur, quæ stagnant, aut pi-
gro lapsu repunt: caulem ædit
geniculatum prædurum, mul-
tis alis concavum: folia men-
thæ, maiora, molliora, candi-
dioraque, gustu piperis, acri,
citra tamen ullam odoris gra-
tiam: fructum acrem, in fur-
culis parvis, prope folia race-
matim cohærentē. Folia cum
semine illita tumores veteres-
que duritias discutunt, fugil-
lata delent: quæ postquam in-
aruerunt, tusa pro pipere
in obsoniis admiscen-
tur. Radix parva,
nullius in medi-
cina momenti.

Ptarmica. Cap. CXCH.

Ptarmica exiguus frutex est,
furculos habes paruos, multos,
& rotundos, abrotono nō dis-
similes: & circa eos folia oleæ,
longa, multa, & in cacumi-
ne capitulum, vti anthemidis,
paruum, rotundum, quod suo
acri odore sternutamentū ex-
citāt, unde nomen accepit. Fo-
lia cū floribus illita, fugillatio-
nes rapiūt. Flores sternutamēta
q. iiii effica.

efficacissimè mouët . Nascitur
in montibus & petrosifis.

Radicula seu lanaria her-
ba. Cap. CXCIII.

Struthium herba vulgò no-
ta, qua purgadis lanis vtuntur,
qui eas eluunt. Huius radix est
acris:vrinam ciet: prodest tuf-
fi, iocinerosis, orthopnoæ ex
melle sumpta, cochlearis men-
sura, aluum soluit. Eadem cum
panace & capparis radice cal-
culos frangit, & cum vrina ex-
turbat, duritiâ lienis absumit:
menses imposita trahit, par-
tus efficaciter enecat . Cum
polenta autem & aceto illita,
lepras tollit:tubercula discutit,
cum farina hordeacea & vi-
no decocta . Miscetur & ma-
lagmatis, & ocularibus colly-
riis, claritatis causa . Sternu-
tamenta mouet, per os pur-
gat, trita cum melle, & nari-
bus infusa.

Cyclamin⁹. Cap. CXCIII.

Cyclamin⁹ folia habet hede-
ræ, purpurea, varia, in quib⁹ su-
prà ifraq; albicât maculæ:caule
nudo, quaternos digitos equâ-
tes florib⁹ in eo purpureis, ro-
farû effigie:radice nigra, & ali-
quantum lata, vt rapum videri
possit. Quæ cum hydromelite
pota pituitâ aquamq; detrahit:
menses

ἐναργέστατα κινεῖ· φύεται δὲ ἐν
ὄρεσιν καὶ περὶ ὁδοὺς τοῖσις.

Πρὶ Σβεθίου. Κεφ. ρςγ'.

Στρούδιον γινώσκον ὅτι, ὅ-
οι εἰσπαύται χέωνται πρὸς κα-
θαρσιν τῶν ἐρίων . οὐ ἡ ρίζα
δερμῖα καὶ οὐρητικὴ βοηθεῖ δὲ
ἡ παρὰ τοῖς βηθῖν, ὁρθοπνοίας σὺν
μέλιτι, κοχλιαίου πλῆθος λα-
βανομένη . κοιλίαν τὴν ὑάγει.
συνὸν δὲ παῖα καὶ χαπάρεως
ρίζῃ ληφθέν, λίθοις δρῦπται, καὶ
ἐξουρεῖν ποιεῖ . καὶ σπλῆνᾳ ἐ-
σκιρρωμένον τήκει· πρὸς δὲ
ἐμβρυα ἄγει, καὶ ἐμβρυα φθε-
ρεῖ ἐναργῶς . συνὸν ἀλφίτω δὲ καὶ
ὄξει κατὰ πλάτῃν, λείπεται αἰ-
ρεῖ . διαφορεῖ καὶ τὰ φύματα
συνὸν ἀλεύρω κριθῇ καὶ οἴῳ ἐ-
ψηθέν . μύρτυται δὲ καὶ κολλυ-
είοις ὅξυδερέσι καὶ μαλάγμα-
σι· κινεῖ δὲ καὶ πταρμούς . καὶ εἰς
ταὺς ῥῖνας δὲ ἐργασίον λείπει
ματὰ μέλιτος, καθαίρει διὰ σῶ-
ματος.

Πρὶ Κυκλαμίνης. Κεφ. ρςδ'.

Κυκλάμιος φύλλα ἔχει ὁμοί-
ασι τῶν πορφυρῶν ποικίλα, κατὰ
πλάτῃν δὲ καὶ αὐτὸν κυκλίσιν ὑπο-
λευκοῖς· χαμλὸν δὲ τετραδάκτυ-
λον, γυμνὸν ἐφ' οὗ αὐτὸν ῥοδίδει
πορφυρίζοντα . ρίζαν μέλαναν
ἰσχυρὰν διὰ παραπλησίαν, ὑπὸ πλά-
τῃ· ἢ πρὸς ποδῆσιν μετ' ὑδρομέλι-
τος, ἄγει φλέγμα καὶ ὑδρὸς κατὰ
καὶ

καὶ ἐμμηνα δὲ κινεῖ πνομήν καὶ
 προσθεμένη φασὶ ὅτι αὐτὴ ὑπερβῆ
 τὴν ῥίζαν ἐνύμων γυνή, ἐξαμβλώ-
 τειν αὐτήν. ἔστι δὲ καὶ ὁξύτονον πε-
 ριαπνομήν· πίνεσθαι δὲ πρὸς τὰ θα-
 νάσιμα μετ' οἶνου, καὶ μάλα πρὸς
 λαγῶν θαλάσσιον· καὶ ἐρπετῶν ἐ-
 σθαι αὐτὰρ μακρὸν κατὰ πλαιοσο-
 μένη· μεθύσκει τὸ οἶνον μὲν εἶσα·
 κατὰ δὲ σθαι δὲ καὶ ἵκτερον βίῳ δὲ α-
 χμῶν πληθὺς ποδεῖσα, καὶ γλυ-
 10 κέος ἢ μικράτου ὑδατοῦ. κατὰ
 κλίην δὲ δεῖ ἐν οἴκῳ θέρμα τὴν πί-
 γοντα, καὶ πλείοσθαι ἱματίοις πε-
 ρεμένην ὅπως ἰδρώσῃ· ὅτι ἀποκρί-
 ομενος ἰδρώς, χολώδης εὐρίσκεται
 τῇ χροῖα. ἐν χυματίζεταί τ' ὁ χυ-
 15 λὸς αὐτῇ μετ' ἐλκίτος εἰς τὰς ῥίνας
 πρὸς καθαρότην καφάτης· καὶ τῷ θα-
 λυλίῳ ἐν ἐρίῳ προσθεῖναι πρὸς κο-
 μιδὴν περὶ τῶν μακρῶν· κατὰ χρι-
 σθέντος δὲ αὐτῇ ἐπ' ὀμφῇ καὶ ὑ-
 πογαστρίῳ, καὶ ἰσχυρῶς κοιλίαν μετὰ σ-
 20 σθαι, καὶ ἐκβῶσμις ἐξέρχεται· καὶ πρὸς
 τὰς ὑποκαχυμώσας καὶ ἀμβλυοπῆν-
 τας ὀφθαλμοὺς ἐλκιδόμος ὁ χυλὸς
 σὺν μέλιτι ἀρμόζει. μίγνυναι δὲ εἰς
 τὰ φθόρια· ἔδραν δὲ* προσπερῆσαι
 σὺν ὀξεί κατὰ χροῖον· ὅτι χυλὸς
 25 κατὰ σθαι. χυλίζεσθαι δὲ ἢ ῥίζα κοπι-
 ομένη καὶ ἐκθλιβομένη, ἐφόμος τῇ
 χυλῷ ἄρχει μετὰ τῶν συστάσεως.
 ῥύπθαι δὲ καὶ χροῖα τὴν ῥίζαν καὶ ἐξαν-
 θήματα σέλη καὶ βρώματα μετ'
 ὀξέος κατὰ ἐαυτήν· καὶ μετ' ἐλκίτος
 ἰατρικῶς κατὰ

menfes potu appositivè ciet.
 Tradunt si prægnans radicem
 transgrediatur, abortum fieri.
 Partum appensa accelerat: con-
 tra venena, præsertim leporis
 marini, ex vino bibitur: illita
 contra serpentium ictus, reme-
 dio est: immista vino inebriat:
 regium morbum discutit, tri-
 bus drachmis pota, cum pas-
 so aut diluto mulso. Sed opor-
 tet eum qui ebibit, multis ve-
 stibus contectum, loco calido,
 & à perfrictionibus tuto, re-
 cumbere, quòd facilius exudet:
 eiectioni autem sudores fellei co-
 lore inveniuntur. Succus eius ad
 purgandum caput, naribus in-
 funditur: ad deicienda quoque
 alui excrementa, in vellere se-
 di subiicitur: illito umbilico &
 imo ventre coxarum tenuis, al-
 uum emollit, & abortum efficit:
 suffusionibus, & retusæ ocu-
 lorum aciei, oblitus cum melle
 succus prodest. Medicamen-
 tis abortum inferentibus ad-
 miscetur. Succus cum aceto il-
 litus, prociduam sedem resti-
 tuit. Exprimitur tusa radice suc-
 cus, & ad mellis crassitudinem
 decoquitur. Radix cutem pur-
 gat, eruptiones papularum re-
 primit, vulneribus ex aceto
 per se aut cum melle medetur,
 lienem

lienem absumit: vitia cutis in facie, & alopecias emendat: eius decocto luxata, podagras, & capitis vlcuscula, pernionesque foueri congruum est: ipsaque in oleo vetere feruefacta, illito oleo, vlcera ad cicatricem perducit. Cauata radix oleo expletur, & cinere feruenti imponitur, adiecto interdum Tyrrhenicæ ceræ momento, vt strigmenti crassitudinem vnguentum cōtrahat, cū primis vtile pernionibus. Radix, scillæ modo, concisa reponitur. Narrant ad amatoria asfumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in vmbrosis, maximè sub arboribus.

Altera cyclaminus.

Cap. CXC V.

EST & altera cyclaminus, quam cissanthemon aut cissophyllon vocant: foliis hederæ, sed minoribus: geniculatis caulibus, crassisque, circa vicinas arbores, capreolorum modo, se voluentibus: flore candido, odorato: acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum acris: radice superuacua: nascitur in asperis. Huius acini, dradchmæ vnus pōdere poti,

cum

ἰᾶν). καταπλασσομένη ὃ καὶ πολλή·
να τίθει· ἀποκαθαίρει δὲ καὶ ἔφη·
λιν καὶ δὴ ὠπεκίας· ἐνδεῖται δὲ καὶ
πρὸς σπέρματι καὶ ποδάγραν, καὶ
τὰ ἐν κεφαλῇ ὑγυῖα καὶ χιμ-
ετλα τὸ ἀφ' ἡμῶν αὐτῆς κατα-
τλούμενον· αὐτὴ τ' εἰς ἐλαίᾳ πε-
λαοῦ ἀναζευδεῖται, ἀπουλοῖ κα-
ταχρυσίου τ' ἐλαίου, ἐγκοιλαν-
δεῖται δὲ πληροῦται τῷ ἐλαίῳ, καὶ
τίθεται ἐπὶ θερμωσποδίας, προσ-
εμβάη) ὃ ἐνίοτε καὶ κερὲ τυρρῆ-
νικῇ ὀλίγον, ὥς γλοιῶδες γινέσθαι
κατὰ χρυσία αἶσιν χμελίῳσιν.
ἀποτίθεται δὲ ἡ ῥίζα τμηθεῖσα
ὡς περ σκίλλα. ἰσορεῖ) δὲ καὶ πρὸς
εἰλβα αὐτὴν λαμβάνει καὶ κοπι-
σαν ἀναπλαθεῖσά τ' εἰς προχί-
λους. φύεται ὃ ἐν συσκότις τόποις.
μάλιστα δὲ ἐπὶ τὰ δένδρα.

Πεὶ ἑτέρας κυκλάμινος.

Κιβ. ρσέ.

Κυκλάμινος ἑτέρα, ὣς ἐνίοι
κισάνθεμον ἢ κισόφυλλον κα-
λοῦσι· φύλλα ἔχει κιστῶ ἐνικότα,
ἐλάσσην δὲ· χαυλοὺς παχεῖς γο-
νατώδεις, σπειροειδομένους τοῖς
παρσχημένους δένδρεσιν ἐλικοφ-
δῶς· αὐτὴ λευκὰ, ἐνώδη. κατ-
πὸς δὲ ὡς ῥάγες σαφυλῆς, ὅμοι-
ος κιστῶ, μαλακός, δριμύς ἐ-
τῇ γύσει ἡρέμα, καὶ γλίγρος·
ῥίζα ἄχρηστος· φύεται δὲ ἐν τρα-
χεῖσι χωρίοις. ταύτης ὁ καρπὸς
ὅσον < μία τὸ πλῆθος πινόμενος
μετ'

μετ' οἴνου λευκοῦ κυάθων β' ἐπὶ
ἡμέρας μ', πλῆνα τήκει δι' ἔρων
καὶ κοιλίας διαπανόμενον. πίνεται
δὲ καὶ πρὸς ὀρθοπνοίαν. καὶ τὰς ἐν
τοκετῶν καὶ τὰς ποδῶν.

Πεὶ Δρακοντίου.

Κεφ. ρςς'.

Δρακόντιον ἔχει φύλλα κισ-
σοειδῆ, μεγάλα, σπῆλαις ἔχοντα
λευκοῖς· καυλὸν δὲ ὀρθόν, δίπ-
λυν, ποικίλον, ὀφιοειδῆ διαπόρ-
10 φουρον τοῖς σπῆλαις, βακτηρίας τὸ
πάχος· καρπὸς δὲ ἐπ' ἄκρου βο-
τρυώδης, χρώματι τὸ μὲν πρῶ-
τον* χλωδῆς, πεπαισθεῖς ὅ κρο-
κίζων, ἐπιδάκνων τὴν γεῦσιν ῥί-
ζα ποσῶς στρογγύλη, βόλβοειδῆς,
15 ὁμοία ἄρ' φλοῖον ἔχουσα λεπτόν.
φύεται ἐν συκίοις περὶ φραγμοῖς
καὶ αἰμαστάς. Δυνάμιν δὲ ἔχει
ὁ καρπὸς χυλιδεῖς καὶ ἐγκυμα-
πιδεῖς μετ' ἐλαίου εἰς τὸ οἶον, ὠ-
ταλγίαν παύειν· εἰς δὲ τὰς ῥίνας
20 πρὸς τὸ μένος ἐν εἰώ πολὺ πικρὸν
δαπανᾶν· κατὰ χυλιδῆς δὲ σέλ-
λειν καὶ καρκινώματα. ποδέντες
δὲ ὅσον λ'. κόκκοι μετὰ ὀξυκρά-
του ἑξαμυλώποιοι· καὶ τὴν ὁσ-
μὴν δὲ φασὶ μετὰ τὸν μαρμα-
25 μὸν τῆς ἀνθήσεως, ἣ ἄρ' τι σινει-
λημμένον ἐμπερύων φαρμακὸν εἶ-
ναι. ἢ ὅ ῥίζα θρμακτικὴ ἔσται, βοη-
θεῖ ὀρθοπνοίας· ῥήγματα, σπῆλαι-
μασι, βίξι, κατὰ ῥῶ· καὶ τὰ ἐν
ὁστέωνι ὑπερὰ ἐναγὰ γωγα ποιεῖ,
ἐφθῆ

cum vini albi cyathis duobus,
quadraginta diebus, lienē per
vrinam & aluum absumūt. Ad
orthopnoeā bibitur. reliquias
à partu purgat.

Dracunculus.

Cap. CXCVI.

Dracunculus folio constat
hederaceo, magno, cādidis no-
tis insigni: caule recto, bicu-
bitali, versicolore, maculis re-
perso purpureis, ita vt anguē
planē referat, baculi crassitu-
dine: fructus summo caule ra-
cematim cohæret, colore pri-
mum herbaceo, & cum ema-
turuir, croceo, gustu feruens,
mordaxque: radice aliquantu-
lum rotunda, bulbosa, aro non
abfimili, tenui obducta cor-
tice. Nascitur in sepibus vm-
brosis. Seminis succus cum o-
leo instillatus, aurium dolorem
mitigat: naribus etiam ex la-
na impositus, polypum absumit:
carcinomata illitu sistit:
triginta eius grana, si in posca
bibantur, abortus inferunt: o-
dorem aiunt posteaquam flac-
cidi flores emarcuerūt, conce-
ptus adhuc teneros enecare.
Radix excalfacit: orthopnoeis,
ruptis, vulsis, tussi, destillatio-
nibus, auxiliatur: humores pe-
ctoris excreatu faciles reddit,
siue

DIOSCORIDIS

siue cocta tostaque cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur: vrinam pellit, venerem excitat, cum vino potato phagedenas vlcerum, & quæ cacoëthe vocantur, trita cum melle & bryonia alba, expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas & eiiciendos partus fieri solent. qui radice suas manus perfricuerunt, à viperis feriri negantur: illita ex aceto, vitiliginis emaculat. Folia recentibus vulneribus, linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decocta in vino pernionibus apposuisse prodest: caseus foliis inuolutus, à putredine defenditur. Succus radicis ad nubes, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctave, ad sanorum vsus, pro olere recipitur: in Gymnesiis insulis, quæ Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiujs placentarum loco offerunt. Radix mensibus effoditur, tostaque frustatim conciditur, & lino traiecta, sicatur in vmbra, & ita reconditur.

Arum.

ἐφθί τε καὶ ὀπλή μετὰ μέλιτος καὶ κατ' ἐαυτῷ βιβρωσκομένη. ξηρὰ δὲ λεία συνὲ μέλιτι ἐκλείχεται. ἔστι δὲ οὐρητικὴ, ὁρμᾶς τε πρὸς σπασμὸν ἐγείρει πνομένη μετ' οἴνου· καὶ ἔλκεα κακοήθη καὶ φαγεδαίονα μετὰ βρυωνίας λευκῆς συνὲ μέλιτι λεανθεῖσα ἀνακαθαίρει καὶ ἀπυλοῖ. καὶ κολλύρια ἐξ αὐτῆς ἀναπλάθεται πρὸς σύειγας, καὶ ἐμβρύων κομιδίῳ. φασι δὲ ὅτι καὶ εἰ διατεῖται τις τὰς χεῖρας τῇ ῥίζῃ, ἀπὸ ἐχιδνῆς ἄδνηκτος μύει· ἀποκαθαίρει δὲ καὶ ἄλφειν συνὲ ὄξει καταχειδεῖται. τὰ δὲ φύλλα λεία ἐπὶ τῶν τοις ὤτων ἀντὶ μόνων ἐπιπιδέματα ἀμύζει· καὶ πρὸς χυμῖλα ἐψηθέντα ἐν οἴνῳ καὶ ἐπιτεθέντα· τυρὸς τε ἐπειλούμενος τοῖς φύλλοις, ἄσκητος διαμύει. ὃ δ' ἔχει τοῦς ῥίζης ἀμύζει πρὸς νεφελίαν, καὶ λευκώματα καὶ ἀχλὺς. λαχαρεύεται δὲ ἡ ῥίζα καὶ πρὸς πλὴν ἐν ὑγείᾳ χρῆσθαι, ἐφθί τε καὶ ὠμὴ ἐδοιμμένη· οἱ δὲ ἐν ταῖς γυνήσι νήσοις, καλκιδεύας δ' καλλασθῆναι, ἐφθί τ' ῥίζαν μυζήντες μέλιτι πολλῷ ἐν τοῖς σπασμοῖς, ἀντὶ πλικοῦτων παρὰ πιδέσθαι. ἀποτίθειναι δὲ δεῖ τὴν ῥίζαν ἐν πυραμνῶν ὀρύξαντας καὶ πλωγάντας καὶ κατατεμόντας. ἐκείραντας τε λίνῳ καὶ ξηρὰντας ἐν σκιά.

Περὶ Ἀεὺ.

Περί Αερί. Κεφ. ρςζ'.

Αερί τὸ καλούμηνον παρὰ σύ-
 ροις λέφα, φύλλα ἀνίστην ὅμοια
 τοῖς τῷ δρακοντί, μακρότερα ὃ
 καὶ ἀπολότερα· χαλὸν ἀπιδάμι-
 5 αῖον, ὑποπέρφουρον, ὑπόροισιν. ἐφ'
 οὗ ὁ καρπὸς κροκίζων· ῥίζα λευκὴ
 πρὸς τὴν τῷ δρακοντίου, ἥ τις καὶ
 ἐδίδεται ἐν φόρμῃ ἥ πον οὔσα δρι-
 μεῖα. ταιριχέεται δὲ τὰ φύλλα
 εἰς βρώσιν, καὶ κατ' ἐαυτὰ ξηραν-
 10 θέντα ἐν φόρμῃ ἐδίδεται. Δυνά-
 μιν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα καὶ τὸ σπέρμα
 καὶ τὰ φύλλα τὴν αὐτὴν τῷ δρα-
 κοντί. ποιεῖ ὃ ἡ ῥίζα καταπλασ-
 σαμένη* συνὸν βολεῖται ἐπὶ ποδα-
 γμῶν. ἀποτίθεται δὲ ὡς ἡ τοῦ
 15 δρακοντίου καὶ κατὰ δόλου βεῖ διὰ τὸ
 μὴ λῖαν δριμύ ἐδώδιμος.

Περί Αεισαρίου. Κεφ. ρςη'.

Αείσαρον ὅστις μικρὸν βοτά-
 νιον, ῥίζαν ἔχον ὡς ἐλαίας, ἔστι
 δὲ δειμντέρα τοῦ ἄρου· ὅθεν
 20 νομάς ἴσησι καταπλασσομένη.
 κολλύειά τε πρὸς σύειγας ἐν-
 ερῇ ἐξ αὐτῆς γίνεται. φθείρει
 δὲ καὶ αἰδοῖον παντὸς ζώου* ἐν-
 τεδεῖσα.

Περί Ασφιδέλου. Κεφ. ρςθ'.

25 Ασφιδέλος φυτὸν τοῖς πλείστοις
 γνώριμον, φύλλα ἔχον πρὸς σπῆ-
 μέλῳ ὅμοια· χαλὸν δὲ λεῖον,
 ἔχοντα ἐπ' ἄκρῃ αἰδος καλόμε-
 νον αἰσθεῖκον· ῥίζαι δὲ ὑπείσιν
 ἐπιμήκεις, στρογγύλαι, βαλανοῖς
 ὅμοιαι,

Arum. Cap. CXCVII.

Aron, apud Syros lupha vo-
 citatum, folia emittit dracun-
 culi, sed longiora, & pauciori-
 bus distincta maculis: caulem
 suppurpureum, dodrantalem,
 pistilli specie, à quo croceum
 semen exit: radice dracunculi
 alba, quæ decocta estur, vtpo-
 te cum minus acris sit. Folia ad
 esum conduntur, & arida per
 se, decocta manduntur. Radix,
 semen & folia, dracunculi vi-
 res habent. Priuatim radix ex
 fimo bubulo podagris illini-
 tur, & dracunculi more repo-
 nitur. In totum, ob mitiorem
 eius acrimoniam, in cibum ex-
 petitur.

Arifarum. Cap. CXCVIII.

Arifarum exigua herbula est,
 cuius radix oleæ magnitudinē
 implet, longè maioris quàm a-
 ron acrimonix: vnde illitu no-
 mas sistit. Fiunt collyria ex ea,
 ad fistulas efficacia. Illitu radi-
 cis, genitale animalis cuiuscū-
 que in perniciem agitur.

Hastula regia. Cap. CXCIX.

Hastula regia vulgaris noti-
 tiæ est, foliis maioris porri: cau-
 le leui, ferente in cacumine
 florem, quem anthericon ap-
 pellat: radices subiacent ob-
 longæ, rotundæ, glandibus si-
 miles,

DIOSCORIDIS

miles, gustu acres, quæ exal-
faciunt: vrinæ & menses epo-
tæ ciunt: lateris doloribus, ru-
ptis, conuulsis & tussibus, dra-
chmæ pondere potæ ex vino,
medentur. Ea verò vomitio-
nes adiuuat, ludicri tali ma-
gnitudine commanducata: à
serpente demorsis datur aptif-
simè, verum trium drachma-
rum pondere, foliisque flori-
bus & radice ex vino, morsus
illinire oportet. Item vlcera
sordida & depascentia, mam-
marum quoque & testium in-
flammationes, tubercula, fu-
runculósque, decoctis in fæce
vini bulbis, recentibus inflam-
mationibus ex poléta auxilia-
tur. Radicis succus adiecto ve-
tere vino dulci, myrrha & cro-
co decoquitur, fitque perquam
vtile oculis medicamentum: ad
purulentas aureis per se, & cū
thure, melle, vino & myrrha
tritum, prodest: in contrariam
aurem infusus, dentium dolo-
rem mitigat. Cinis è radice il-
litus, alopecias ad pilum re-
ducit. Oleum in excauatis ra-
dicibus igni decoctum, illitu
exulceratis pernionibus & am-
bustis igni, conducit: & furd-
tati, instillatum in aurem, auxi-
liatur. Candidam vitiliginem,
linleo

ὁμοιοι, δριμεῖαι καὶ ἡ γένεσις, καὶ ἡ
δύναμις θέρμαντικαί, κινῶσι δὲ καὶ
ἐρησι, καὶ ἐμηνά ποθεῖσαι ἰσχυρὰ καὶ
πλευρὰς δὴ γήματα καὶ βήχας, καὶ
σπασμάτα, καὶ ῥήματα < ἀπλῆ
δος τῆς ρίζης ἐν οἶνῳ πινουμένης. 9
ποιεῖ δὲ καὶ εὐμετέρας ὅσον ἀσπρά-
γλας βρωδεῖς καὶ ἐρεπετοδύκτοις
δίδεται ὠφελίμως ὅσον < γ'. τὸ
πλῆθος, κατὰ πλάτην δὲ δεῖ τὰ
δύγματα τοῖς τε φύλλοις καὶ τῇ
ρίζῃ καὶ τοῖς ἄνθεσι σὺν οἶνῳ καὶ τὰ 10
ῥυπαρὰ καὶ νεμόμενα ἔλκη καὶ μα-
στῶν καὶ διδύμων φλεγμοναῖς καὶ φύ-
ματα καὶ δοδιήνας, συγκαθεύομε-
νης πρὸς οἶνον τῇ ρίζῃ, πρὸς δὲ
ταῖς πρὸσφάτοις φλεγμοναῖς καὶ
ἀγφίτε. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ρίζης πρὸς 15
λαβῶν οἶνον παλαιῶ γλυκεῖος, καὶ
σμίρνης καὶ κρόκου, συνέψιδέντων
ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ἔρχετον γίνεσθαι ἐφθὰ
μοῖς φάρμακον καὶ πρὸς ὧτα πυ-
ορροῦντα καθ' ἑαυτὸν, καὶ σὺν λιβα-
νωτῷ καὶ μέλιτι καὶ οἶνῳ καὶ σμύρνῃ 20
χλιαυθεῖς ἀμύζῃ. ὁδονταλγίαις
τε καθ' ἑαυτὴν ἔσχυθεῖς ὁ χυλὸς τῶ
ἀντικαμάρῳ ὧτῳ, πρὸς αὐτῷ. καεῖ-
σα δὲ ἡ ρίζα τῇ τέφρᾳ ἐπιπασ-
σομένης, δὴ ὠπεκίας δασύνης. ἐψι-
δένει δ' ἡ αἰὼν ἐν * κεκοιλωμέναις 25
τῇ ρίζᾳ ἐπὶ πυρὸς, εἰλικαμέναις
χμέτλας καὶ πυρεῖκαυτα ἐπαλφ-
φόμενον ὠφελεῖ καὶ * ὧτα λγία-
σαι βοηθεῖ ἐγχεόμενον εἰς τὸ οὖς.
ἀλφόντε λευκὸν πρὸς ἀνατεφέντα 30
ἐν

ἐν ὀδονίῳ ἐν ἡλίῳ, καταχρησθεῖ-
σαι ἢ ῥίζα σμήχει. ὁ δὲ καρπὸς καὶ
τὰ αἰθῆ κατ' ἐξοχῶν, σκολοπέν-
δρων καὶ σκορπίων ἀντιφάρμακόν
ᾧ ἐστιν ἐν οἴνῳ πεζύντα· κατάρρητ-
ται δὲ καὶ τὴν κοιλίαν.

Περὶ Βόλβου ἐδωδιμου.

Κεφ. δ'.

Βόλβος ἐδωδιμος γινώριμος πα-
σιν ὃν ἐδιόμην· ἐν σόμαχος, ἐν κοί-
λιος, πυρρὸς, καὶ ἀπὸ λιβύης κο-
μιζόμενος· ὁ δὲ πικρὸς, καὶ σκι-
λῶδης, ἐν σόμαχῳ τερεός, πεπι-
κός. πάντες δὲ δειμῆς καὶ δερ-
μαστικοί· καὶ πρὸς συνοισίαν πα-
ρρημῶντες, τραχυῶντες, γλῶσ-
σαν καὶ παρείδημα, πολύτροφοι,
15 σαρκῶν χυνηπτικοί, ἐμπνευμα-
τουῦντες· ποιοῦσι δὲ κατὰ πλάσ-
μοι τοὺς ἐρέμματα, θλάσματα,
σκόλοπας καὶ πρὸς τὰς τ' ἀρ-
θρων ὀδύνας· γαγγράνας τε καὶ
ποδάχρας συν μέλιτι καὶ καθ' ἑαυ-
20 τοὺς καὶ τὰ ἐπὶ τῶν ὑδρωπικῶν
οἰδήματα καὶ κηρόδηκτα, ὁμοί-
ως συν μέλιτι καὶ περὶ λείῳ
κατὰ πλάσθεντες ἐπέχρυσιν ὑδρῶ-
τας· καὶ σωμαχῶν ὀδύνας παύ-
σι· καὶ πύρεθρον καὶ ἄλγος ἀπο-
25 σμήχουσι (ὡς ὁ πῶν νίτρω. καὶ θα-
ρσει δὲ καὶ ὑπόπια καὶ ἰόνδοις,
καθ' ἑαυτὸς ἢ συν ὠοῦ λεκύνῃ,
καὶ φακοῖς (ὡς μέλιτι ἢ ὄξει.
πρὸς δὲ ὧτων θλάσματα (ὡς
ἀφίτω καὶ πρὸς θλάσεις ὀνύχων·
ἀφαι-

linleo antea perfrictam in so-
le, illita radix emendat. Semen
floresque in vino poti, scolo-
pendræ & scorpionum vene-
nis, mirum in modum resistūt:
aluum purgant.

Bulbus esculentus.

Cap. C C.

Esculentus bulbus vulgo co-
gnitus, à nobis estur: stomacho
& aluo utilis rufus, & qui ex A-
phrica defertur. Amarum verò
& scillin^o, stomacho aptior est,
& concoctione adiuuat. Bulbi
omnes acrimoniā habent, ex-
calfaciūt: venerē stimulant, lin-
guā tonsillasq; exasperant, mul-
tum alimenti præbent, carnes
creant, inflationē parium tluxa-
tis, fractis, articulorum dolori-
bus efficaciter illinuntur: spicu-
la extrahunt: gangrēnas & po-
dagras ex melle aut per sese,
hydropicorū tumores, & can-
cū morfus cū melle & piperis
polline illiti cohibent: sudores
compescunt: stomachi dolores
mitigāt: furfures & vlcera quæ
in capite manant, cū tosto ni-
tro abstergunt, sugillata varic-
que per se aut ex oui luteo, &
lentigines cū melle vel aceto,
emendant: fractis auriculis vn-
guibúsq; ex poléta medētur: ii-
dē calidis cinerib^o torrefactis,
tollunt

DIOSCORIDIS

collunt ficus: item cum cinere è mænarum capitibus, impositi: cremati verò & cum alcyonio misti, vitia cutis in facie, atrásque cicatrices, in sole illiti, emaculant. Faciunt ad rupta, si cum aceto cocti edantur. Sed copiosiorè eorum cibo abstinédu[m], quoniam nervos tentant.

Bulbus vomitorius.

Cap. CCI.

Bulbus quem vomitorium vocant, folia habet lentiora multo & longiora quàm bulbus esculentus: radicem simile[m], cortice nigro. Ea radix mansa, aut decoctum eius potum, vesicæ malis medetur: vomitiones mouet.

Scilla. Cap. CCII.

Scilla vim acrem atq; feruētē habet: assatā ad multa vtiliorē esse cōstat. Polline ad crustā subactō, aut luto oblita, in clibanū coniicitur, aut carbonibus obruitur, donec obducens crusta sufficiēter intosta fuerit: qua exēpta, si non emollescat, altero polline simili, aut luto circumlinitur, & eadē quē prius hūt: nā quē ita nō assatur, interaneis maximè noxia est. Torret itē in olla, indito operculo, quæ in furnū demittatur.

Sumi

ἀφαερῶσι ὃ καὶ συγχεῖ ὀπληθεύοντες ἐν θερμοσποδίᾳ, καὶ μετὰ μανίδων κεφαλῶν κεχωρμύων ἐπιπλεονέχοντες· καίνοντες δὲ καὶ μυγχεύοντες ἀκμονίῳ, ἐφηναν καὶ οὐλὰς μελαίναντας ἀποκαθαίρουσιν ἐν ἡλίῳ χαταχρίσθμενοι. (ὣν ὅξιν δὲ ἐφδοῖ βιβρωσκόμενοι ποιοῦσι πρὸς ῥήγματα φυλάσσεσθαι δὲ αὐτῶν τὸ πλεόντος ἐν τῇ βρώσει δεῖ διὰ τὸ ἀπλεῖσθαι τῆ νευρώδους.

Περὶ Βολβοῦ. Κεφ. σά. 10

Βολβὸς ὁ χαλούμβρος ἐμετικὸς, ἔχει τὰ φύλλα ἱμαντωδέεστερα, καὶ πολλῶ μακρότερα τῶ ἐδωδίου· ῥίζαν ἰσοκῆσαν βολβῷ, πρὸς ὃν φλοιὸς μέλας. αὐτῇ ἐπιτομήν καθ' αὐτὴν καὶ τὸ ἀφέλημα αὐτῆς πινόμενον. τὰ πρὸς κύστιν ἰάται καὶ ἐμετον κινεῖ.

Περὶ Σκύλλας. Κεφ. σβ.

Σκύλλα δύναμιν ἔχει δριμύτην καὶ πυρωτικήν· πολύχρηστος δὲ γίνεται ὀπληθεύουσα· σὰν γὰρ δὲ ἡ πολλῶν πλεονέχουσα, καὶ διδύται εἰς κλίβανον, ἢ ἀν' ἄρᾳ ἐγκρύπτει· μέγας δ' ὀπληθεύει ἰσχυρῶς τὸ πλεονέχμενον· σὰς δ' ἀπαιρεθέντος, εἰ μὴ τακτῆς γέροντος, ἕτερον σὰς ἢ πολλὸν ἀπαιπλάσαντες, τὰ αὐτὰ ποτὶ σωματι· ἢ γὰρ μὴ οὕτως ὀπληθεύουσα, βλαβερά τινα δόσιν, πρὸς τὰ ἐντόδια μάλιστα πρὸς σφραγισμένην πᾶται ὃ καὶ ἐν χύρᾳ πεπωμασμένη καὶ καθιεμένη εἰς κλίβανον.

καὶ με-

λαμβάνει) ἡ αὐτῆς τὸ μεσάτα-
τον τ' ἐξώθεν περιαιρουμένων, καὶ
ἐφε) δὲ ἐν τμηθεῖσαι ἀποχομέ-
νου τῷ περὶ τοῦ ὕδατος, ἐτέρῃ τὲ
ἐπ' χομίου ἀρχῇ αὐτὴ μὴ παρὸν
ἢ δριμύτην) τὸ ὕδωρ, καὶ ξηραί-
νεται δὲ ἐν σκιά, * τμηθεῖσαι, καὶ
διαμεθεῖσαι λιγαρίῳ, ὥς μὴ ἀπ' ἐ-
ξ ἀμύλων τῶν τόμοις. τῇ μὲν ἐν
τμητῇ, εἰς ἑλαῶν καὶ οἶνον καὶ ὄξος
σιελιπτικὸν χρώμεθα. πρὸς ἡ ῥα-
10 χάδας τὰς ἐν ποσὶ, τὸ ἐν δον τῆς
ὥμης συν ὕδατι ζεθεῖν, ἢ συν τῇ
ρίτῃνη τηχθεῖν, ἐπιτίθεται ἐξ ἰο-
κτοῖς δὲ κατὰ πλάσμα ἐψηθεῖσαι
σὺν ὄξει. τ' ἡ ὀπλῆς περὶ ἐν μέρῳ
τ' σκίλλης, σιωκελεύαντες δὴ ὦν
15 ὀπλῶν μέρη ὁκτὼ, δίδωμεν κο-
χλιάριον ἐν ἡ δύο νήσεσι πρὸς μά-
λαξιν κοιλίας· εἰς ποτήματά τ' καὶ
ἀρωμάτικὰς δυνάμεις, καὶ ἐφ' ὧν
ἐρησιν κινῆσαι δέλτομον, καὶ ἐπὶ ὕ-
δρωπικῶν καὶ σωματικῶν, οἷς ἐπὶ
20 πολάζει τὰ σπῖα, καὶ ἐπὶ ἐκτέρευ-
στροφουμένων, βησιόντων χρονίως,
ἀσθματικῶν, ἀναφορικῶν, αὐτάρ-
κης ἡ ὅλην βιοβόλῃ σὺν μέλιτι ἐκ-
λειχθεῖσαι. καὶ συγκατέφετα δὲ
τῷ μέλιτι, καὶ βιβρώσκειται πρὸς
25 τὰ αὐτὰ μάλιστα, πέφει συνδροῦ-
σαι. ἄρει δ' ὅλοι ὦδες καὶ κοιλίαν.
ἐφ' ἣ δὲ περὶ τὰ αὐτὰ ποιεῖ ὁ-
μοίως λαμβανομένη· φυλάττε-
ται δὲ καὶ αὐτῆς πῶς δόσιν δεῖ
ἐφ' ὧν ἐκκωσὶς τις ὅτι ἐν αὐτῷ.
καὶ περὶ

Sumi etiā solet quod maxime
est mediū, direptis viuentis
tunicis, quod frustatim conse-
ctū coquitur, mutata sæpius a-
qua, donec ipsa nec amaritudi-
nē nec acrimoniā habeat: tra-
iectaq; lino frusta siccantur in
vmbra, ita vt ne vlla quidē par-
te se cōtingāt: his scillæ segmi-
nibus ad oleum, vinum, aut a-
cetum scillinum vtimur. Ad ri-
mas pedū, interna pars crudæ
scillæ in oleo feruefacta, aut cū
refina liquefacta, imponitur:
decocta in aceto demorsis a
vipera, cataplasma est. Ad sin-
gulas affæ parteis adiectis o-
ctonis tosti salis; cochlear vnū
aut alterū damus ieiunis, ad e-
molliendā aluum: in potu autē
& odoratis medicaminibus, &
quibus vrinam ciere volumus;
hydropicisque & stomachicis;
quibus innatat cib⁹, regio mor-
bo, torminibus, in tussi vetere,
fusprioris, & ore reiicientibus
tres obolos, i delinctu ex mel-
le sumpsisse satis est. Coquitur
cū melle, & estur eorundē grā-
tia, maxime vt cōcoctionē ad-
iuuet. Strigmenta per aluū ex-
trahit. Cocta & simili sumpta
modo, eosdem præbet effe-
ctus: sed cauedus scillæ vsus, his
qui intestinum sentiunt vlcus.
f Ad pen-

DIOSCORIDIS

Ad penfiles verrucas & per-
niones, tosta efficaciter illini-
tur. Tritum semen, & in carica
aut melle deuoratum, aluum
emollit. Scilla tota in limine ia-
nuæ suspēsa, mali medicamen-
ti noxam arcet.

De Pancratio.

Cap. CCIII.

Pancratiū, quod aliqui scil-
lam appellāt, radice est magni
bulbi, subrufo colore aut sup-
purpureo, gustu amaro ac fer-
uēte: foliis lilij, sed longioribus.
Scillæ vires & præparationem
habet, eodémque pondere in
morbis efficaciter assumitur:
cui tamen mitior quàm scillæ
facultas inest. Radicis succus
cum erui farina digeritur in
pastillos, qui hydropicis sple-
nicisq; cum hydromelite, com-
modissimè dantur.

Capparis. Cap. CCIII.

Capparis aculeat⁹ frutex est,
qui in terra stratus, magis in or-
bé euagatur: spinas, vt rub⁹, ha-
bet, in hami modū adūcas: fo-
lia mali cotoneæ, rotunda: fru-
ctū oleæ similé, qui cū dehiscēs
pāditur, floré candidū promit:
quo excusso, nō nihil glādis ob-
lōge figura inuenitur, qđ aper-
tū grana acinis punicorū simi-
lia, ostendit, parua, rubicunda:
radi-

καὶ πρὸς ἀκροχορδῶνας ποιεῖ καὶ
χμέτλα ἐγχεῖσθαι ὀπλή. τὸ δὲ
σπέρμα αὐτῆς λείον ἀναληφθὲν
ἐν ἰσχάδι ἢ μέλιτι καὶ βρωθὲν, μα-
λάντει κοιλίαν. ἔστι δὲ καὶ ὀλέξι-
φάρμακον ὅλη πρὸς τῶν θυρῶν,
κρέμα μύρη.

Πεὶ Παγκρατίου. Κεφ. σγ'.

Παγκράτιον, οἱ δὲ καὶ τὸ σκίλ-
λαν ὀνομάζουσι, ῥίζα ὅτι βολεῖ
μεγάλῳ ὁμοίᾳ ὑπόπυρος ἢ ὑπο-
πέρφυρος, πικρὰ καὶ πυρῶδης τὴν ἰα-
γῆσιν· φύλλα κρίνου ὁμοία, μα-
κρότερα δέ. ἔχει δὲ δυνάμιν τὴν
αὐτὴν τῇ σκίλλῃ, καὶ σκευασίαν,
καὶ δόσιν ποιεῖσιν ὅτι τῶν αὐτῶν
παθῶν· ὅπτε καὶ ἑτέροις, μύρη τοι τῆς
σκίλλης ἢ ταύτης δυνάμεις. ὁ δὲν ἰσ-
καὶ χυλίζομεν ἢ ῥίζα ταύτης, μι-
γρὺ μύρη τε ὁρῶμεν ἀγέρας καὶ ἀ-
ναπλαστομύρη εἰς ἀφ' ἵπποισι, δέ-
δοται (ὡς) ὑδρομέλιτι σπληνι-
κοῖς καὶ ὑδρωπικοῖς ὡφθίμως.

Πεὶ Καπάρους.

Κεφ. σδ'.

Κάππαρις δάμνος ὅτι ἀκαν-
θώδης, ὅτι γῆς γυροειδὲς ἐρω-
μύος· ἀκανθὰς ἀγκιστροειδεῖς ἔ-
χων ὡς βάτος· φύλλα σπυγγύκα,
μυλῆα κυδωνία ὁμοία· καρπὸν δὲ
οἶον ἐλαίας ὅς ἀνοιχθεὶς λευκὸν
περίεται αἴθος· οὗ πεσόντος, εὐ-
εἰσκατὰ πῶς βάκανος ὅπτε μύ-
κης, ὅπτε ἀνοιχθὲν ἔχει κόκκους
ὡς ὅσον ῥοῖα, μικροὺς ὀρυζοῖς·
ρίζας

ρίζας ξυλώδεις καὶ μεγάλας πλεί-
 στας. φύει⁹ του πύπαι ἐν τραχέσι καὶ
 λεπτογείοις τόποις, καὶ νήσοις καὶ οἰ-
 κοπέδοις. ταειχέυεται δὲ ὁ κων-
 λὸς αὐτῆς καὶ ὁ καρπὸς εἰς βρώσιν.
 5 ταράττει δὲ κοιλιάν, κακοσόμα-
 χὸς τε ὅτι καὶ δι' αὐτῆς βρωθεῖσα
 ὅ ἐφθῆ, εὐσωμαχότερα τ' ὤμῃς.
 ὁ μὲ οὖν καρπὸς αὐτῆς σπληνῶα
 τήκει, ὁ δὲ κλη δύοιν < μετ' οἶνε πί-
 νόμενος ἐπὶ ἡμέρας μ', ἄγει δὲ
 10 οὖρον καὶ διαχώρημα αἵματός-
 δεσ· ἰσχυρὰ δὲ καὶ παραλύσει βον-
 θεῖ πινόμενος ὁ καρπὸς, καὶ πρὸς
 ῥήγματα καὶ σπασίματα ἐμμυῶα
 τε ἄγει καὶ ἀποφλεγματίζει. καὶ ὁ-
 δόντων πόνον παύει ὁ καρπὸς σὺν
 15 ὅξει ἐφόμνος καὶ διακλυζόμενος.
 τ' ὅ ῥίζης ὁ φλοιὸς ξηρὸς, πρὸς τε
 τὰ προσηκνύον ἀρμόζει, καὶ ἀνὰ κα-
 ταίρει πᾶν χρόνιον καὶ ρυτίαν καὶ
 τετυλαμένην ἕλκος. καὶ ταπλάσσει-
 ται δὲ καὶ ἐπὶ τῶν σπληνικῶν (ὡς
 20 ὡμῇ λύσει· δακνομένην τε τῷ πῶ-
 νῳ ἐν πὶ ὁδόντι βονθεῖ· ἀγροῖς τ' λευ-
 κὸς ἀποσπῆχει σὺν ὅξει λεῖα. τὰ ὅ
 φύλλα καὶ ἡ ῥίζα λεανθέντα, σκλη-
 είας καὶ χοιράδας διαφορεῖ. σκώ-
 ληκός τ' τὸς ἐν ὧσιν ὁ χυλὸς ἐλχυ-
 μαπθεῖς κλείνει. Ἡ μὲν τοι λυβητικὴ
 25 χάππαρις, ἡ γυνωμένη δὲ καὶ τὸς
 μαργαρίτας λεβομένης, ἐμπνευμα-
 τοῦ ἰσχυρῶς. ἐμετικὴ δὲ πυγχανέη
 ἢ ἐν ἀπουλίᾳ, ἢ δὲ ἐν τ' ἐρυθραῖ
 θαλάσσης καὶ λιβύνης, δριμυτάτη.
 φλυκταί-

ra dices lignosas spargit, gran-
 des numerosasque. Tenui ple-
 runque solo, asperisq; locis, in
 insulis & iuxta rudera nasci-
 tur. Caulis & fructus, cibi gra-
 tia condiuntur: aluum turbat,
 stomacho aduersatur, sitim gi-
 gnit: cocta tamen stomacho
 quàm cruda vtilior est. Fructus
 drachmis duabus in vino po-
 tus, quadraginta diebus, liené
 absorbit, & urinā cruentumq;
 excrementum emittit: bibitur
 vtilissimè in coxarū doloribus,
 & neruorum resolutione, item
 ruptis & cōuulsis: menses ciet,
 caput purgat. Dentium doloré
 sedat semen ex aceto decoctū,
 colluto inde ore. Aridus radi-
 cis cortex ad eadé proficit: vl-
 cera omnia vetera, & sordida,
 & quæ occaluerunt, expurgat:
 lienosis cum farina hordei illi-
 nitur: dente demorsa, dolori
 eius auxiliatur: cum aceto tri-
 ta, vitilignes albas absterget.
 Radix foliaque intrita, stru-
 mas ac duritias discutunt. Au-
 rium vermiculos infusus suc-
 cus enecat. Aphrica, & præ-
 fertim Marmarica capparitis, ve-
 heementer inflat. Apula vomit-
 us facit. & quæ à Libyco,
 & quæ Rubro mari defertur,
 mirum in modum acris est:
 r ij liqui-

DIOSCORIDIS

liquidem in ore pustulas exci-
tat, gingivasque offe tenus ex-
est: quare in cibis non ab re
damnatur.

Lepidium. Cap. CCV.

Lepidium aliqui gingidium
vocant, herbula vulgo nota:
muria cum lacte feruatur. Vis
foliorum acris & exulcerans:
quapropter ischiadicis trita,
præsentissimum est auxilium,
si cum helenij radice, quarta
parte horæ, illinatur: lienos-
is simili modo prodest. lepras
eximit. Radix appensa collo,
dolore dentium liberare exi-
stimatur.

Ranunculum. Cap. CCVI.

Complura ranunculi gene-
ra. vis tamen omnibus vna, a-
cris, & vehementer exulceras.
Nam vnū coriandri foliis con-
stat, latioribus, subalbidis, pin-
guibus: flore luteo, interdum
purpureo: caule gracili, cubi-
tum alto: radice alba, exigua,
amarâque, multis capillamen-
tis, hellebori modo, fibrata:
nascitur in limitibus humidis.
Alterum lanuginosius, longio-
ri caule, pluribus foliorum
incisuris, plerunque in Sar-
dinia proueniens, quam acer-
rimum, quod syluestre apium
appellant. Tertium minimum,
odore

φλυκταίνουσα τὸ σῶμα, καὶ κα-
τεδίονσα τὰ οὖλα ἄχει γυναι-
κείως· ὅθεν πρὸς βρωσίν ὅστιν αὐ-
τὴ ἐπιθήδειος.

Περὶ Λεπιδίου. Κεφ. σέ.

Λεπίδιον, ὃ ἐνίοι γγγίδιον κα-
λοῦσι, γνῶνιμον βοταΐιον· ται-
χευόμενον εἰς δὴμαίαις μὲν γάλα-
κτος. Διώαμις δὲ ὅτι τῶν φύλ-
λων δριμύεια, ὕψωτική· ὅθεν ἰσχυ-
ρὸν ὅστιν ἐπίπλασμα, ἀμυνπι-
κώτατον· λεῖον σὺν ἐλενίου ῥίζῃ
ἐπιπιθέμενον πρὸς τέταρτον ὡ-
ρας, καὶ ἐπὶ σπληνικῶν ὁμοίως· ἀφί-
σησι τὸ καὶ λέπρεας. ἢ τὸ ῥίζα δοκεῖ
ὁδόντων δὴ γήματα παραιτεῖσθαι,
ἀφαιπομένη τῷ τραχήλῳ.

Περὶ Βαβαρίου. Κεφ. σς. 15

Βατράχιον, οἱ δὲ σέλιγον ἄγριον
καλοῦσι· τοῦτου πλείονα μὲν ὅστιν
εἶδη. Διώαμις δὲ μία δριμύεια,
καὶ ἄγαν ὕψωτική· ἔχει δὲ τὸ μὲν αὐ-
τῶν, φύλλα ὁμοία κοίρῳ, πλατύ-
τερα δὲ καὶ ὑπόλευκα καὶ λιπαρά·
ἀνδρὸς μίλινον, ἐνίοτε περφυρῶν·
καυλὸν δὲ ἐκ παχύν, ὕψος δὲ ὅσον
πήχεως· ῥίζαν μικράν, λευκὴν, πί-
κραν, ἔχουσαν ἀποφύσεις ὡς ἐλ-
λεβορέ· φύεται δὲ παρὰ ῥείθροις.
Ἔστι δὲ καὶ ἕτερον εἶδος χροαδέσε-
ρον, καὶ μακροκαυλότερον, ἐν Ἰομάς
ἔχον πλείους τῶν φύλλων, πλείους
ἐν σαρδωνίᾳ γυνώμενον, δριμύ-
τατον, ὃ δὴ καὶ σέλιγον ἄγριον κα-
λοῦσι. καὶ τείτον σφόδρα μικρὸν
καὶ

ἢ δυσσομιον, τὸ αὐτὸς χρυσῷ δ-
 μοιον. καὶ τέταρτον εἰκὸς τούτου,
 αὐθὸς γαλακτίζον. Διώαμιν δὲ
 ἔχει τὰ φύλλα ἢ οἱ κρύλοι, ἀπα-
 λοὶ καταπλασσομένοι, ὥς κωπικὴν
 5 ἢ ἐξαρωπικὴν μᾶλλον· πόνε· ὅθεν ὄνυ-
 χας λεωρεῖς ἢ ψώρας ἀφίσησι,
 ἢ σήγματα ἐξ αἰφῆ, ἢ μυρμηκίας
 καὶ ἀκροχορδονας καὶ ἀλωπεκίας
 πρὸς ὅλην καταπλαδέντα. Ἐ-
 ψάμνα δὲ κατὰ τλημα χιμε-
 10 τλιόντων ὅτι χλιαρὸν. ἢ δὲ ῥίζα
 πταρμὸν κινεῖ ξηρὰ λεῖα πρὸς πε-
 ρομὴν τοῖς μυκτῆσι· ἢ ὁδόνταλ-
 γίας κοφίσι πρὸς σαπιόμην, δρύ-
 πται μὲν τοὶ αὐτοῖς.

Περὶ Ἀνεμώνης. Κεφ. σζ'.
 15 Ἀνεμώνη, διόση, ἢ μὲν, ἀγρία,
 ἢ δὲ ἡμερὸς· καὶ τῆς ἡμέρου· ἢ
 μὲν τις φοινικὰ φέρει τὰ αὐτὴν· ἢ
 δὲ, ὑπόλευκα ἢ γαλακτίζοντα,
 ἢ πορφυρεῖα. φύλλα δὲ κορειοειδῆ,
 λεπτοχρόδια πρὸς τῇ γῇ· χα-
 20 λία*· ἡρώδη λεπτὰ, ὑπὸ ὧν τὰ
 αὐτὴν ὡς πρὸς μήκωνος, καὶ μέγα
 κεφάλια μέλανα, ἢ κυανίζον-
 τα· ῥίζα κατὰ μέγεθος ἐλαίας
 ἢ μείζων, οἷονεὶ γόνασι διεκμη-
 μύνη. ἢ δὲ ἀγρία κατὰ πάντα
 25 μείζων τῆς ἡμέρου, ἢ τοῖς φύλ-
 λοις πλατυτέρα καὶ σκληροτέ-
 ρα· τὴν τε κεφαλὴν ἐπιμνησέ-
 ραν ἔχει· αὐτὸς φοινικοῦν, ῥίζα
 λεπτὰ καὶ πλείω. ἢ δὲ τις ἔχει
 φύλλα μέλανα δριμυτέρα οὖσα.

Διώα-

odore graui, flore aureo. Quar-
 tū huic simile, flore lacteo. Fo-
 lia, flores & cauliculi recentes,
 illitu exulcerant, & crustas nō
 sine dolore gignunt: quare vn-
 gues scabros extricant, scabiē
 eximunt, stigmata delent: for-
 micantes verrucas, & pensiles,
 alopeciāsq; paulisper illita, tol-
 lunt. Tepente decocto pernio-
 nes fouentur. Sicca radix, tri-
 tāque, sternutamenta ciet, na-
 ribus admota: dentium dolo-
 rem appensa leuat, ipsos ta-
 men frangit.

Anemone. Cap. CCVII.

Duo anemones genera, vnū
 syluestre, alterum in cultis na-
 scens. Cuius multæ species: vna
 phœniceū floré profert: altera
 candicantē, aut lacteū, aut pur-
 pureū. harū folia coriádro simi-
 lia cæterū scissā tenuius in ter-
 rā, inclinātur: caules lanugino-
 si, tenues, in quib⁹ flores aut pa-
 paueris, & in medio capitula
 nigra, aut coerulea: radix oleæ
 magnitudine, aut ampli⁹ paulo
 grādescit, ac veluti geniculis q-
 busdā cingitur. Syluestri ampli-
 tudo prorsus maior, latioraq;
 folia, & duriora: oblongius ca-
 put: flore puniceo, tenuibus, &
 multis radicū capillamētis. A-
 crior est, quæ nigra habet folia.

r iij. Vis

DIOSCORIDIS

Vis vtriusque acris : ea de causa succus naribus infusus, purgat caput. Commanducata radix pituitam trahit : decocta in passo & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorundem & hebetudines emendat, sordida vlcera abstergit. Folia, & caules, si cum pituita decocti edantur, copiam lactis præbent : mēstrua ciunt, velle re apposita. Illita quoque lepras eximunt. Sunt qui errore ducti, argemonem nominari eupatorium putent : quoniam à sylvestri anemone, argemonem & papauer, quod rhœada appellant (de quo inter papaueris genera referemus) propter colorum cognationem in floribus, distinguere non possunt. Verum papauer & argemone colore minus saturato spectantur, & vtrâque tardius floret. Quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acré, reddit : rhœas verò candidiorem & acrem. Insuper anemone & rhœadi capitula sylvestris papaueris similia insunt, sed in anemone supernè crassiusculū, in rhœade subagustū. Anemonēs genera nec succū remittūt,

nec

Διὼ αμιν ὃ ἔχουσι δριμύτην ἀμφοτέρωθεν ὅθεν ὁ χυλὸς τῆς ρίζης ἀπὸ τῆς ῥινὸς ἐγχευθεὶς, πρὸς κεφαλῆς κλάδαρσιν ἀρμόζει. μασηθεῖσα δὲ ἡ ρίζα, φλέγμα ἄγει ἐκ τῆς σπλῆνός, ἐν γλυκεῖ καὶ καταπλασσομένη, ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς ἰάται· καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς καὶ ἀμβλυωπίας ἀποσμήχει, ἀνακαθαίρει δὲ καὶ τὰ ῥυτίδια τῶν ἐλκῶν· τὰ δὲ φύλλα καὶ οἱ χυλοὶ συνεψηθέντες πρισάτην καὶ ἐδιότυμα, γάλα καταπατῶν πρὸς ὁδῶν δὲ ἐμύλια ἄγει καταπλασθέντα ὃ λέγεται ἀφίστησι. Ενιοὶ δὲ μὴ διωάμενοι διοείζουσιν ἀπὸ τῆς ἀγρίας ἀνεμώνης, τὴν λεγομένην * ἀργεμώνην καὶ τὴν ροιάδα μήκωνα (ὅτι ὡς ἐν ταῖς μήκωσι ἰσορήσμεν,) διὰ τὸ τῶν ὁμόχρου ποικιλοῦ ὑπαρχόν, πλανῶνται τὴν ἀργεμώνην ὑπατέρειον ὀνομάζοντες. πολλὰ δὲ ἀργεμώνης ἥπιον βαδὺ τὸ ποικιλοῦ ὅτι καὶ τῆς ροιάδος, ὁ ψαιτέρων * δὲ αὕτη καὶ ἡ ἀργεμώνη ἀνθούσι. καὶ ἡ μὲν ἀργεμώνη ὅπῃ ἀνήσυχον κροκίζοντα καὶ δριμύτην πρὸς τὴν γαστρίαν ἰαχρῶς· ἡ δὲ ροιὰς λευκότερον καὶ δριμύτην. ἀμφοτέρωθεν δὲ μεταξὺ καφάλια μήκωνι ἀγρία παραπλήσια ἔχουσι, πλὴν τὸ μὲν * τῆς ἀνεμώνης ἀνῶθεν ὑπόπαχυ, τὸ δὲ τῆς ροιάδος ὑπόσεινον, αἱ δὲ ἀνεμώναι ὅτε ὅπῃ ἀνιῶσιν, οὕτε

ἔτε κωδίαν ἔχουσιν, ἀλλ' οἰοῦνται
ἀσπαράγου ἄκρον. ἐν ἀρούραις τε
τὸ πλεῖον ἐκείναι φύονται.

Περὶ Ἀργεμώνης. Κεφ. σή.

Ἀργεμώνη* ὅλον μὲν ἔστι ὁμοιον
ἀγρία μήκωνι· τὸ δὲ φύλλον ἀνε-
μώνη ἔχει ὁμοιον· ἀνθος ἐχρησμένον·
καυλὸν φοινικοῦ, κεφαλὴν δ' ἑοι-
κίαν μήκωνι· ροιὰ δὲ, ἐπιμυκετέ-
ραν δὲ καὶ πλατείαν καὶ τὸ ἄνω-
θεν μένῃ· ῥίζαν στρογγύλην· ὅπῃ δ'
ἀγρίοι κροκίζοντα, δριμυῶς κα-
θαίρει δὲ ἀργεμα καὶ νεφέλια. καὶ
φλεγμονὰς παρηγορεῖ τὰ φύλλα
καταπλασθόμενα.

Περὶ Ἀναγαλλίδος. Κεφ. σθ'.

Τῆς ἀναγαλλίδος διττὸν εἶδος

ἓστι, διαφέρειν αὐταί. ἡ μὲν γὰρ
κυανέον ἔχουσα τὸ ἄνθος, δῦλεια
λέγεται· ἡ δὲ τὸ φοινικοῦ, ἄρ-
ρην. δαυμία δὲ ἔστι κεχυμένα ἐπὶ
τῆς, φύλλα ἔχοντα ἐπὶ τετραγώ-
νων καυλίων μικρὰ, ὑποστρογ-
γυλὰ περὶ τὰ τῆς ἐλξίνης· καρ-
πὸν περιφέρει· εἰσὶ δὲ ἀμφοτέ-
ραι περὶ ὧν πεκαί· ἀφλέγμαντοι,
σπολόπων ἐπισπαστικαὶ, γομῶν ἐ-
φεκτικαί. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῶν ἀνα-
γαραειζόμενος, ἀποφλεγματί-
ζει κεφαλῶν· καὶ ῥιπὸν ἐγγεό-
μνος, ὁδόντων πόνον παύει, ἐὰν
εἰς τὸν ἀντικείμενον μύξωτῃ ῥα-
τῶ ἀλγούῃ τι ἐμβληθῇ· καθαί-
ρει καὶ ἀργεμα μετὰ μέλιτος ἀτ-
τικοῦ. καὶ ἀμβλυωπίας βοηθεῖ.

ὠφε.

nec calyces habent, sed quasi
asparagi cacumen. In aruis illa
sæpius enascuntur.

Argemone. Cap. CCVIII.

Argemone in totū sylvestri
papaueri similis est: folia habet
anemones, diuisa: florem pu-
niceum: caput in cauliculo pa-
paueris rhœadis, oblongius, &
summis partibus latum: radi-
cem rotundam: succum croci
colore, acrem, dimittit. Arge-
ma & nubeculas expurgat. Fo-
lia illitu inflammationes com-
pescunt.

Anagallis. Cap. CCIX.

Duo anagallidis genera, quæ
tantū flore distāt. Nā quæ coe-
ruleo flore est, foemina dici-
tur: mas, quæ phoeniceo. Fruti-
ces sunt parui, in terra iacētes,
foliis in quadrangulo caulicu-
lo pusillis, subrotundis, ad hel-
xinæ folia accedentibus: semi-
ne rotundo. Vtraque mitigan-
di vim habet: inflammationem
arcet, adactos corpori aculeos
extrahit, nomas cohibet. Suc-
cus caput gargarizatu purgat:
& naribus infusus, dolorem
dentium lenit, si in aduersam
narem iniiciatur: argema cum
melle Attico emendat: retu-
fæ, oculorum aciei auxiliatur.

x iij cōtra

contra viperarum morsus, iocineris & renum vitia, si ex vino bibatur, prodest. Tradunt eam quæ coeruleum ædit florem, prociduum sedem reprimere: quæ verò phœniceum, illitu euocare.

Hedera. Cap. C C X.

Hedera differétias multas in specie fortitur, summas autem genere treis. Nam quædã candida est, altera nigra, tertia helix. Candida, fructum fert candidum: nigra, nigrum, aut croci æmulum, quam vulgus Dionysiam vocat: helix fructum non gignit, sed albas habet viticulas, & folia parua, angulosa, & concinniora. Hedera omnis acris est, & adstringens: neruos tentat. Flos trium digitorum carptu, facit ad dysentericos, in vino bis die potus: ambustis cum cerato tritus illinitur. Recentia folia ex aceto cocta, aut cruda cum pane detrita, lienes sanant. Foliorum & corymborum succus, cum irino vnguento, melle aut nitro, naribus infunditur, & contra veteres capitis dolores caput eo cum aceto, & rosaceo perfundi utile est: purulentis auribus, aut dolétibus, cum oleo medetur.

Nigræ

ὠφελεῖ καὶ ἐχιδνήκοις μετ' οἶνου πινόμενος, καὶ νεφρητικούς, καὶ ἡπατικούς. φασὶ δὲ ἔνιοι τὴν μὲν ἔχουσαν τὸ κυανέον αἵδος, περπλώσεις δακτυλίου ἐλλειν. τὴν δὲ τὸ φοινικικῶν ἐρεδίζειν καὶ ταπλαθεῖσαν.

Περὶ κισσοῦ. Κεφ. σί.

Κισσὸς πολλὰς ἔχει διαφορὰς. τὰς κατ' εἶδος, τὰς δὲ γνηκωτάτας τρεῖς. * λέγεται γὰρ ὁ μὲν πῖς λευκός, ὁ δὲ μέγας ὁ δὲ ἥγξ. ὁ μὲν ἐν λευκός, φέρει τὸν καρπὸν λευκόν. ὁ δὲ μέγας, μέλανα ἢ κροκίζοντα, ὃν δὴ καὶ ἰδιῶται διονύσιον καλοῦσιν. ὁ δὲ ἥγξ ἀκαρπὸς ἔστι, καὶ λευκὸς ἔχει τὰ κλήματα, καὶ τὰ φύλλα λεπτὰ καὶ γωνιώδη καὶ ἐρυδρά. 10 πᾶς δὲ κισσός, δριμύτης, συπληκός. τῷ νευρώσει ἀπληκός. ποιεῖ δὲ αὐτὴ τὰ μὲν αἵδη τεισὶ τοῖς δακτύλοις ληφθέντα καὶ ποθέντα ἐν οἴνῳ, πρὸς δυσεντερικοῖς, δις δὲ τῆς ἡμέρας δεῖ πίνειν καὶ πρὸς πυλίνωντα δὲ ἀρμόζει σὺν κηρωτῇ λεανθέντα. τὰ δὲ ἀπαλὰ τῷ φύλλων σὺν ὀξει ἐφόμῳ, ἢ ὠμὰ ἀπὸ συνλειανόμενα, ἀπλῆνα ἰσθύνονται. 20 ῥινέχουτος δὲ ὁ κυλὸς τῷ φύλλων καὶ τῶν κορύμβων σὺν ἰείνῳ, καὶ μέλιτι, ἢ γάλακτι, καὶ πρὸς τὰ χροῖα τῆς κεφαλῆς ἀλγήματα ἀρμόζει, καὶ ἐπιβρέχεται σὺν ὀξει καὶ ῥοδίνῳ. ὠταλγίας δὲ καὶ πυορροῶντα ὦτα σὺν ἐλαίῳ ἰᾶται.

τὸ δ'

τῷ δὲ μέλανος κισσῷ ὁ χυλὸς καὶ οἱ κόρυμβοι ποδέντες, ἀτονίαν ποιοῦσι, καὶ τὰ ἐράσσοις τῷ διάνοι-
αν πλεοναδέντες. λεία δὲ σφα-
εῖα πέντε τῷ κορύμβων θερμαν-
5 δέντα σὺν ῥοδίῳ ἐν σιδίῳ καὶ ἐν
σαχθέντα εἰς τὸ ἀντικείμενον ἕς
ἐπὶ ὁδοῖ ἀλγίας, τὸ ἄλγημα τραυ-
νῇ. μελάνοις δὲ καὶ ταῖς τείχας οἱ
κόρυμβοι. κατὰ πλάσσειται δὲ τὰ
φύλλα πρὸς πᾶν ἔλκος ἐλκιδέν-
10 τα σὺν οἶνῳ καὶ κατὰ πλάσσειται
να, κατὰ καύματα κακοήθη, καὶ
ἐφ' ἡλίδας δεσφαιεύει ὡς περ εἰρη-
ταῖ ἐφ' ἀκινούσι τῷ κατὰ μὲν
ἵππο ποδέντες οἱ κόρυμβοι λείοι
καὶ ποδέντες δὲ μετὰ τινὶ κάρφαρ
15 σιν < πλῆθος, ἀτόκιον ὄσι. καὶ ὁ
μύθος δὲ τῷ φύλλων μέλιτι δευ-
δεῖς καὶ περσεδεῖς τῇ μήτρας ἐμ-
μέλω αἶμα καὶ ἐμβρυα. ὁ δὲ χυ-
λὸς ἐν σαζόμορος ταῖς ἐν τοῖς ῥα-
θωσι δυσωδίας καὶ σιπεδόνας ἐκ-
20 καθαίρει. τὸ δὲ δάκρυον αὐτῆς ψι-
λοῖ τείχας καὶ κτείνει φθεῖρας
ἐπαλειφόμενον. ὁ δὲ τῶν ῥιζῶν
χυλὸς σὺν ὀξεί ποδεῖς, φθαλαγγί-
δῆτοις βονδεῖ.

Πρὶ Χελιδονίου τῷ με-

25 γάλκ. Κεφ. σιδ.

Χελιδόνιον μέγα καυλὸν ἀ-
νίστι πηχυαῖον, ἢ καὶ μείζονα,
ἰσχυρὸν, ἔχοντα παραφυάδας φύλ-
λων μεσείας. φύλλα ὁμοία βα-
τραχίω, τρυφερώτερη καὶ τοῖς
ταῖς

Nigræ hederæ succus, aut e-
poti corymbi, corpus infir-
mant, mentémque turbant lar-
gius sumpti. Acini quinque tri-
ti, calfactique in punici mali
cortice cum rosaceo, si instil-
lentur à contraria aure, dolo-
rem dentium mitigant. Deni-
grant capillum, illiti corymbi.
Folia in vino decocta, illinun-
tur omnium vlcerum generi,
etiam si cacoëthe sint: vitia cu-
tis in facie, & ambusta sanant,
vti anteà diximus, decocta. Mo-
uent menses triti & subditi co-
rymbi: iidem poti, post purga-
tiones foeminarum, drachmæ
pondere, concipiendi spem a-
dimunt. Pediculus foliorum
melle irrigatus, ac vuluæ indi-
tus, menstrua & partus extra-
hit. Instillatus succus putrida
tadia narium, graueolentiám-
que emendat, & sanitati resti-
tuit. Lachryma hederæ psilo-
thrum est: illitu pediculos e-
necat. Succus radicum in ace-
to potus, contra phalangia pro-
dest.

Chelidonium.

Cap. CCXI.

Chelidonium maius, caule
est gracili, cubitali aut altio-
re, agnatis foliosis: foliis ra-
nunculi, mollioribus tamen,
82

DIOSCORIDIS

& colore cæsis: flore violæ al-
bæ, secundum singula folia
prodeunte: in eo succus cro-
ci, mordax, acris, & aliquan-
tulum subamarus, grauitè o-
lens: radix supernè singularis,
infernè in multa crocea capil-
lamenta fibratur: siliqua, ceu
corniculati papaueris, tenuis,
in metæ figuram longa, in qua
semen papauere maius reclu-
ditur. Succus in æreo vase, cū
melle prunis decoctus, oculis
claritatem adfert. Foliis, cau-
le, radice, succus exprimitur
ineunte ætate, & siccatus in
vmbra digeritur in pastillos.
Radix cum aniso & vino albo
pota, medetur regio morbo,
& vlceribus quæ serpunt: im-
posita cum vino, aut mandu-
cata dentium dolorem sedat.
Hoc nomen sibi videtur ven-
dicasse, quòd aduentu hirun-
dinum exoriatur, & discessu
emarcescat. Sunt qui narrant,
hirundines matres excæcatis
pullis, admota herba visum re-
stituere.

Chelidonium minus.

Cap. CCXII.

Chelidonium minus, quod
triticum syluestre aliqui nun-
cuparūt, herbula pediculis ab
radice pēdens, sine caule: foliis
hederæ,

τὰ τῆ χελιδονίου καὶ ὑπόγλυ-
κα πλὴν χροῶν, καὶ παρ' ἑκάστον
φύλλον αὐτοῦ ὥσπερ τὸ λευκόιον.
χυλὸς δὲ χροκόνης, δριμύς δι-
κπικὸς, ποσῶς ὑπόπικρος καὶ δυσ-
ώδης· ῥίζα αἰώδην μὲν ὅτι μία,
καὶ πῶδεν δὲ πλείονες· καρπὸς δὲ
ὥσπερ τῆς κερστίπιδος μήκωνος,
λεπτός· μακρὸς ὡς κῶνος, ἐν ᾧ
σπέρματ' ἰα μείζονα μήκωνος. ταύ-
της ὁ χυλὸς μίγεις μέλιτι καὶ ἐ-
ψηθεὶς ἐν χαλκῷ ἐπ' ἀνδρά- 10
και ἀρμόζει πρὸς ὀξύδρεκιαν.
χυλίζεται δὲ τὰ φύλλα καὶ ἡ ῥί-
ζα καὶ ὁ καρπὸς, ἀρχιμύρου θέρ-
εως, καὶ ξηραίνεται ἐν σιῇ καὶ
ἀναπλάσσεται. ἡ δὲ ῥίζα πνο-
μὴν συν' ἀνίστη καὶ οἴνω λευκῇ, 15
ἰκτερικὸς θέρει πύει καὶ ἔρπι-
ται· καὶ κατὰ πλάσσει μὴν συν'
οἴνω ὀδονταλγίας τὲ πύει δια-
μασσωμένη. δοκεῖ δὲ ὡγομάσσει
χελιδόνιον, ἐπεὶ δὴ ἅμα ταῖς χε-
λιδόσι φαινομένης ἀναφέεται, 20
ληγούσας δὲ συμπαρεγκμάζει.
πνὲς δὲ ἰσόρησται ὡς ἐὰν τις τυ-
φλωθῇ, τῶν δὲ χελιδόνος νεοσσῶν,
αἱ μητέρες προσπύρευσται πλὴν
πόαν· ἰῶνται δὲ πύρωσιν αὐτῆς.

Πρὶ Χελιδονίῃ τῆ μικρῆς.

Κεφ. σιβ'.

Χελιδόνιον τὸ μικρόν, οἱ δὲ
πυρὲν ἄγριον ἐκάλεσαν, βό-
ταϊον ὅτι ἐν μόσχων ἀπρη-
πισμένον, ἀχμυλον, φύλλοις κισ-
σοῦ δέσσι,

σοῖς δέ σι, περὶ φέρεται εἰς τοὺς δὲ μάλ-
 λον καὶ μικροτέρας, καὶ τρυφε-
 ραῖς καὶ ὑπολιπάραις περὶ ἐχό-
 μωρον· ῥίζας δὲ ἔχει ἐν τῷ αὐ-
 τῷ μικρὰς πολλὰς, ὥσπερ πυ-
 ρεῖσσι παρὲν μύσας. τρεῖς δὲ εἰσιν ἡ
 τέσσαρες αὐτῶν μακρὰ πεφυ-
 κῆται. φύεται δὲ παρ' ὑδάσι, καὶ
 τέλει μασιν. ἔχει δὲ τὴν δύνα-
 μιν δριμύτην, παρὰ πλεονάζον ἀ-
 νεμώνη ἐλκουσαν τὴν ἐπιφά-
 10 νειαν· φέρεται δὲ καὶ ὄνυχας λε-
 πτεροῦς ἀφίστησιν. αἱ δὲ ῥίζαι χυ-
 λω δεῖται χρησίμοι εἰς ῥινοεχ-
 σίαν μετὰ μέλιτος πρὸς κήδαρ-
 σιν κεφαλῆς.

Πρὶ Ὀδόννης. Κεφ. σγ'.
 15 Ὀδόννα οἱ μὲν φασὶ τὸ μεγάλ-
 λε χελιδονίης χυλὸν εἶναι· οἱ δὲ,
 γλαυκίου. οἱ δὲ τῆς κερατίνιδος
 μήκωνος* τῶν ἀνδρῶν χυλόν.* ἔ-
 νιοι δὲ μύγμα ἀναγαλλίδος τῆς
 κυανέας καὶ ὑοσκιάμου καὶ μήκω-
 20 νος χυλόν. οἱ δὲ βοτάνης τρωγλο-
 δυτικῆς πνός, ἡ πρὸς Ὀδόννα κα-
 λεῖται, εἶναι χυλόν· ἡνυῶνται δὲ
 αὐτῇ καὶ ἐν τῇ κατ' αἴγυπτον.
 ἀραβία· ἔχει δὲ τὰ φύλλα ἐν ζώ-
 μω ἐμφερεῖ, πολὺ τρητὰ ὥσπερ σι-
 25 τόκοπα, φαφαρά, ὀλιγόφυλλα,
 ἄνθος δὲ φέρει κρόκινον, πλατύ-
 φυλλον· ὅθεν ἔδοξαν ἀνεμώνης
 αὐτὸ πνός εἶδος εἶναι. χυλίζεται
 δὲ καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ, ὅπου
 δεῖ ἀποκαθαίρειν δάκρυον, καὶ
 πάντα

hederæ, multò rotundioribus,
 & minorib⁹ teneris, & suppin-
 guibus: radices habet ex eodē
 callo cōplures, pusillas, in gra-
 norū tritici modū aceruatī cō-
 gestas: quarū tres aut quatuor
 in longitudinē exeūt. Iuxta a-
 quas & lacus nascitur. Vis ei a-
 cris, & anemones modo, sum-
 mā cutem exulcerat: p̄foras &
 scabros vngues eximit. Succus
 radicib⁹ expressus ad purgan-
 dū caput, narib⁹ ifunditur. De-
 coctū eius cum melle gargari-
 zatum, magnificē id præstat, &
 omnia pectoris vitia extrahit.

Othonna. Cap. CCXIII.

Othónā aliq̄ maioris chelido-
 niæ succū esse aiūt, quidā glau-
 cij, Alij succū florib⁹ cornicula-
 ti papaueris expressū. Alij per-
 mistos coeruleæ anagallidis, hy-
 oscyami, & papaueris succos,
 esse cōtēdūt. Alij troglodyticæ
 cuiusdā herbæ succū, q̄ othonna
 vocat: nasciq; eā in eo Arabiæ
 tractu, qui ad Ægyptū spectat.
 Othonna foliis erucæ, p̄foratis
 cribri modo, & veluti à tineæ
 derosis, squalore obfitis, pau-
 cis: flore croci, latifolio: quare
 qdā anemones speciē esse pu-
 tauerūt. Extractis succ⁹ oculo-
 rū medicamētis adiicit: vbi ex-
 purgare est op⁹: mordet enī &
 absterget:

absterget omnē caliginē, quae oculis offunditur. Tradunt humorē quēdā ex herba emanare q. elotus, semotis calculis, in pastillos ad eadē digerit. Aliq. tamē affirmāt, lapidē esse Aegyptiū, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, aereo colore, gustu cum fervore quodā & adstrictione mordaci.

Auricula muris. Ca. CCXIII.

Muris auricula, quam myosotida vocant, herba est caulibus pluribus ab vna radice, aliquatenus ab imo rubētibus, & concavis foliis angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per intervalla assidue geminatis, atque in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flosculo, vt anagallidis, coeruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita ægilopia sanat. Sunt qui alsinen, muris auriculam vocitāt.

Glastum. Cap. CCXV.

Satiū glastū, quo infectores Ianarū vtuntur, foliū habet plātagini simile, verū pinguius nigriusq; cui⁹ caulis duū cubitorū altitudinē excedit. Illita folia tumores omneis discutiunt, cruenta

παίτα τὰ ἐπισκοῖντα τῇ κόραις ἀποσμήχεται. φασὶ δέ τινα καὶ ὑχασίαν ἀπορρεῖν τῆς βεταίνης, ἣν πλωῖαντες καὶ χαίρειντες τῇ λίθῳ, ἀναπλάσσει βόχισκους πρὸς τὰ αὐτά. ἐγὼ δὲ φασὶν αὐτὴ λίθον εἶναι αἰγύπτιον ἐν τῇ θεβαΐδι γηνώμενον, καλὸν καὶ μικρὸν τῷ μεγέθει, δάκρυον τῇ γούσῃ καὶ πυρώσει καὶ σφύσει.

Πρὶ Μυδὸς ὠτων. Κεφ. σιδί.

Μυδὸς ὦτα* οἱ δὲ μυδὸς ὠτίδα 10
καλεῖσιν, ἀνίσκει καυλὸς ἀπὸ μιᾶς ῥίζης παλαιοῦς, ὑψίστους τὰ κατὰ πᾶν καὶ κοίλους φύλλα τῇ ἐπιμήκει καὶ στενὰ, ῥάχιν ἐπηστημένην ἔχοντα μελανίζοντα, ἀνὰ δύο πεφυκότα ἐκ διασηματίων. εἰς ὅξυ 15
ἀπολήγοντα. ἐμφύεται τε λεπτὰ καυλία ἐκ τῆς μαχαλῶν ἐφ' ὧν ἀνθήματα κυανίζοντα μικρὰ ὡς τὰ τῆς ἀνακαλίδος ῥίζα τῇ δακτύλῳ τὸ πάχος, ἔχουσα πολλὰς ἀπεβλαστήσας. κατὰ πᾶν δὲ ὅστιν ὁμοία ἢ πᾶσα 20
τῷ σιολοπινδρίῳ. λεοτέρη τῇ καὶ ἐλάσσων ταύτης ἢ ῥίζα καὶ ἀπὸ λαοῖς αἰγυλώπια ἰσθ. τινὲς τῇ καὶ τῇ ἐλέγινον μυδὸς ὠτίδα καλοῦσιν.

Πρὶ Ἰσάπιδος ἡμέρη. Κεφ. σιδί.

Ἰσάπιδος* ἡμέρη, ἣ οἱ βαφεῖς 25
καλεῖσιν φύλλον ἔχει ἀνθογλώσσῃ ἐμφρὲς λιπαρώτερον τῇ καὶ μεγαλύτερον, καυλὸν τῇ ὑψίστῃ. δύναται τὰ φύλλα καταπλασθῆναι πᾶσι οἰδημασιν διαφορεῖν, καὶ

καὶ φύματα καὶ ἔναιμα τραύμα-
τα κολλᾶν. αἰμορροῖας τὲ σέλ-
λειν, καὶ φagedaνικά, καὶ ἐρπι-
τας ἐρυσιπέλατά τε καὶ σιπεδύ-
νας δερεαπύειν.

5 Πρὶ Ἰσάπιδος ἀγρίας. Κεφ. σις'.

Ἰσάπιδος ἀγρία, παραπλήσια ἵστα
τῇ πρὸς αὐτὴ φύλλα ἔχει μείζο-
να πρὸς τὰ τ' Ἰρίδακος, χαμηλοὺς
Ἵ λεπιοτέρους πολυαχιδεῖς ὑδρο-
ῖδας, ἔχοντας ἐξ ἄκρης ὡς σφῆνδα

10 καὶ γλωσσίδων πολλά ἀποκρε-
μάσματα, ἐν οἷς τὸ σπέρμα, ἀνδρὸς
μύλινον λεπτόν. διῶα δ' ἡ τὰ αὐ-
τὰ ἴη πρὸς αὐτὴ, ὠφελῶσα καὶ σωτη-
ρικής πινόμενη καὶ καθάπλωστος μέ-
νη. * Πρὶ Τηλεφίου. Κεφ. σις'.

15 Τηλεφίου, σῆτο καὶ τοῖς φύλλοις
καὶ τῷ χαμῶϊ ὅμοιον ἀνδράχην.
μαχάλας ἔχον δύο παρ' ἑκάστην
γόνυ τ' φύλων ἐμφυομενίας. ἀφ'
ῶν κλωνία ε' ἢ ζ'. ἀπὸ τῆς ῥίζης
πλήρη φύλων κυανοειδῶν*, πα-

20 χέων τὲ καὶ γλίχρων καὶ σαρκωδῶν,
ἀνθ' ἧς μύλινος ἢ λευκός φύεται δὲ
ἐν ἀμπελῶσι καὶ τόποις ἐργασί-
μοις ἔαρος. δερεαπύει δὲ κατα-
πλωσόμενα τὰ φύλλα ὅπῃ ὥρας
ἐξ λευκῆς. δεῖ δὲ μὲν ταῦτα ὡ-

25 μὴ λύσει χερσὶν αἰετὶ δὲ καὶ ἀλ-
φούς ἐπιχειρῶντα σὺν ὅξϊ ἐν ἡ-
λίῳ, δεῖ μὲρ τοι μὲν τὸ ἀποξηρα-
νθῆναι αὐτὰ ἀποψῆν.

cruenta vulnera glutinant, san-
guinis profluuia sistunt, ignem
sacrum, phagedaenas, putre-
scentia ulcera, & quæ serpunt,
sanant.

Glastū syluestre. Ca. CCXVI.

Syluestre glastū satiuo simile
est: folia fert maiora, lactuca-
ceis proxima: caules pretenues
multifidos, quadatenus ruben-
tes: in quorū cacumine follicu-
li multi dependēt, quandā lin-
guarum effigiem referentes, in
quibus semē flore tenui, luteo.
Eadē q̄ & suprā dicta præstat:
potu & illitu lienosis auxiliaē.

Telephiū. Cap. CCXVII.

Telephiū herba portulacæ
similis est, & caule, & foliis: a-
las binas in singulis foliorū ge-
niculis, annectit, ramuli à radi-
ce seni septénive prodeunt, fo-
liis referti cœruleis, crassis, lē-
tis, ac carnosus, flore luteo, aut
cādido. Nascitur inter vites, &
locis cultis verē. Folia senis ho-
ris illita albam vitiliginē sanāt:
sed postea hordeacea farina

illini debet, perunctā ex
aceto etiam in sole vi-
tiliginē tollunt, sed
vbi inaruerūt,
abstegūtur,

Τέλος τοῦ βιβλίου δευτέρου.

Π Ε Δ Α -

Finis libri secundi.

Π Ε Δ Α -

PEDANII Π Ε Δ Α

DIOSCORIDIS
Anazarbei de medicinali ma-
teria Liber tertius.

Io. Ruellio Sueſſionēſi interprete.

ΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙ-
ΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕ-
ΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΟ-
ΓΟΣ ΤΡΙΤΟΣ.



V P Erioribus
charissimè A-
ree commen-
tariis, tradidi-
mus de aro-

matibus, vnguentis, oleis, arbo-
ribus, earū fructibus & lachry-
mis, itē de animalibus, cerea-
libus, oleraceis, & herbis acri-
monia præditis. In hoc autem
tertio radices, succos, semina,
herbas, & quæ vernacula, &
inter se cognata cēsentur,
quæque pluribus scatent
remediis, p̄sequemur.

Agaricum. Cap. I.

Agaricum radix fertur laſer-
pitij ſimilis, ſed facie ſūma ſolu-
tior, & rariore fungoſoq; to-
ta contextu. Duo eius genera:
foemina, quæ præfertur, rectis
intus veniarum diſcurſibus cō-
ſtat. mas rotundus eſt, & vndi-
que compactior. Vtrique guſt⁹
initio dulcis, mox ex diſtribu-
tione in amaritudinem tranſit:
gignitur



Ν μ τῆς παρ
τέττε βιβλίοις
φίλτατε Αρειε
παρεδὼκα μὲν
πρὸς ἀρωμά-

των καὶ μύρων, καὶ ἐλαίων, καὶ δέν-
δρων, καὶ τῶν ἀπ' αὐτῶν καρπῶν
τε καὶ δακρύων, ἐπὶ τῇ ζώων καὶ
σπτηρῶν καὶ λαχάων, καὶ τῶν
δριμύτητα κεκτημένων ῥοταιῶν. ἰς
ὧν δὲ τούτῳ τεύτῳ ὑπαρχόντι,
πρὸς ῥιζῶν καὶ χυλισμάτων καὶ
βοταιῶν καὶ σπερμάτων, συμ-
φύλων τε καὶ φαρμακῶδων ἐπε-
λευσόμεθα.

Πρὶς Ἀγρικῶ. Κεφ. α'.

Ἀγρικὸν ῥίζα φέρεται σπλήνι ἐμ-
φρῆς, οὐ πυκνὴ πλὴν ἐμφαίνεαι
ὥσπερ τὸ σίλφιον, ἀραιὰ δὲ ὅστιν
ὀλη. ἔστι δὲ τὸ μὲν, αὐτὸ ἄρρεν τὸ
δὲ, θῆλυ. τὸν διαφέρει τὸ θῆλυ ἐ-
χον κτηδόνας ἐνδείας ἐντός. τὸ
δὲ ἄρρεν περὶ φέρεται ὅστι καὶ παντα-
χόθεν συμφυέει. γένος δ' ἀμφοτέρω
ρα ὁμοία καὶ ἀρχαῖς μὲν γλυκάζον-
τα, ἔτιτα ἐξ ἀναδούσεως ἐμπικρα-
ντα.

ἡγνῶται δὲ ἐν τῇ ἀγρίᾳ τῇ σαρ
 ματιῇ. λέγουσι δὲ οἱ μὲν, φυτόν
 εἶναι πνὲς δὲ ἐν τοῖς στελέ-
 χου τοῦ δένδρου καὶ σῆψιν γίνε-
 σθαι ὡς ὅτε οἱ μύκητες, ἡγνῶται
 5 δὲ καὶ ἐν τῇ καὶ τὴν ἀσίαν γαλα-
 τία καὶ κυλικία ἐπὶ τῶν κέδρων,
 ἐν δρυπιδίον μὲν τοι καὶ ἀδενέες.
 Τὴν μὲν τοι διωαμίν' ὅτι συπι-
 κόν, διερχομένην ποιοῦν πρὸς τῇ
 σφόδρῳ καὶ ὁ μὲν τῆς, ῥήματα
 10 τε καὶ πώματα. ὁ δὲ ὅλων δὲ δυοῖν
 πλῆθος διδόμενον μετ' οἶνο μέ-
 λινος ἀπυρέτοις· πυρέσοισι δὲ
 ἐν μελικράτῳ. καὶ ἡπατικοῖς δὲ
 καὶ ἀσματοῖς, καὶ ἰκτερίῳ καὶ
 δυσεντερικοῖς, καὶ νεφριτικοῖς καὶ
 15 δυσουρῶσι καὶ ὑστερίῳ πνίξι καὶ
 κακοχρίαις < α. διδόμενον φθι-
 στικοῖς δὲ μετὰ γλυκῆος· σπλη-
 νικοῖς δὲ μετ' ὄξυμέλιτος, καὶ σπ-
 μαχοῖς ὡς ἐστὶ διαμασώμενον
 καὶ κατὰ πινόμενον, μηδενὸς ὑ-
 20 γροῦ ἐπὶ ῥόφου μέρους. ὁμοίως δὲ
 καὶ ὄξυρεγμῶσι, ἰσθίσι δὲ καὶ αἰ-
 ματος ἀναγωγὰς, ὀκλή πειωθό-
 λου μὲν ὑδατος λαμβανόμενον.
 πειεῖ καὶ πρὸς ἰσθίων καὶ ἀφ' ὧν
 ἀγρήματα, καὶ ἐπληψίας μετ'
 25 ὄξυμέλιτος λαμβανόμενον τὸ ἱ-
 σθὼν πλῆθος· ἀγεί δὲ καὶ ἑμμελία,
 καὶ ταῖς ἐμπνευματομύαις ὑ-
 στέρα γυναιξὶ ὡφελίμως τὸ ἴσον
 δίδεται· λύει δὲ καὶ ῥίγος πρὸ
 τῆς ἐπισπασίας διδόμενον·

κα-

gignitur in Sarmatiæ regione,
 quæ Agaria dicitur. Sunt qui ra-
 dicem esse plantæ affirmēt: alij
 vt fungos nasci in arborū cau-
 dicibus, quadā putredine. Gi-
 gnitur in Galatia Asiæ, & Cili-
 cia, in cedris, sed friabile, & in-
 firmum. Adstringēdi calfaciē-
 diq; naturam habet: efficax est
 contra tormina, cruditates, &
 rupta: prodest itidē contusis, &
 ab alto deuolutis. Datur duo-
 bus obolis in vino mulso, fe-
 brim non sentiētibus: febricu-
 losis verò, ī aqua mulsa. Arqua-
 tis quoq; suspiriosis, iocineris,
 renumq; vitio laborātibus, dy-
 sentericis. Itē si vrina ægrè red-
 datur, si vuluæ strangulatus vr-
 geat, si pallor membra decolo-
 ret, drachma vna dari solet: si
 tabes infestat, ex passo: si lien
 negotiū exhibet, ex aceto mul-
 so: si dissolutio stomachi est, ita
 vt cibi tenax nō sit, mādatur, &
 sine vlla humoris sorbitiōe de-
 uoratur. Simili modo acida ru-
 ctātibus ppinat. Sāguinis reie-
 ctiones sistit, tribus obolis ex
 aqua sūptū. Facit ad coxedicū,
 & articulorū dolores, & comi-
 tiales morbos, si cū aceto mul-
 so pari pōdere assumant: mēses
 ciet: foeminis, quas īflatio vuluæ
 vexat vtiliter æquali modo da-
 tur.

DIOSCORIDIS

tur. Horrores soluit datum ante febrium accessiones: aluum purgat drachma vna aut altera, si cum aqua mulsa bibatur: venenorum antidotum est denarij instar, cum diluta potione sumptum: si serpētes ictum vibrarunt, morsumque subfixerūt, tribus obolis ex vino potū, mirē auxiliatur. In summa, internis omnib⁹ vitiis cōuenit, pro viribus, & ætate datū, nūc ex aqua, nūc ex vino, iis ex aceto mulso, alijs ex aqua mulsa.

Rhaponticum. Cap. II.

Rha, alicui rheū, Latini rhaponticum vocant, prouenit in iis, quæ supra Bosphorum sunt regionibus, ex quibus affertur. Radix nigra, centaurio magno similis, sed minor & rufior, fungosa, aliquantū læuis, sine odore. Optimū habetur, quod terebines nō sensit, si gustatu cum remissa adstrictione lentescat, māducatūmque colorē reddat pallidum, aut ad crocū inclinātem. Id epotū facit ad inflationes, stomachi imbecillitatē, & omne gen⁹ dolores, ad cōulsa, lienosos, hepaticos, tormina ad vnum, vesicæ & pectoris vitia, aduersus intēta p̄cordia, & vuluæ mala, coxēdicum dolores, sanguinis excreationes, fuspiria,

καθαίρει δὲ καὶ κοιλίαν < α, ἢ β. μετὰ μελικράτου πινόμυρον. ἔστι δὲ καὶ θαλασίμων ἀντίδοτον μετὰ κράματος < μῦας ὀλκὴ λαμβανόμενον. καὶ πρὸς ἐρπετῶν δὲ πληγὰς καὶ δῆγματα, ὀλκὴ τειωβόλου μετ' οἶνου πινόμυρον βοηθεῖ. καὶ χαλδίου πρὸς τὰ ἐντὸς πάντα πάθῃ ἀρμόζει, πρὸς δυνάμιν καὶ ἡλικίαν διδόμενον, οἷς μὲν ὕδατος, οἷς δὲ μετ' οἶνου, ἰοοῖς δὲ μετ' ὀξύμυλτος ἢ μελικράτου.

*Πρὶ Ρᾶ. Κεφ. β.

Ρᾶ, οἱ δὲ ῥῆον καλοῦσι, ἡμῶνται ἐν τοῖς ὑπὲρ βόσπορον τοῖς, ὅθεν καὶ κομίζεται. ῥίζα ἰσμέλαινα, κανταυρίω τῷ μεγάλῳ ἔοικη, μικροτέρα μὲν τοῖς καὶ ἐν ῥωδῶσι ἔσται ἄσπερος, χαλκῆς ὑπόκουρος. ἔστι δὲ αὐτῆς κρᾶπτον τὸ ἀτερεθόνισον, ἔγγληχρόν τε κατὰ τὴν γῆσιν μετὰ ἀναιμότητος σύψως, διαμασσηθέν τε ἐνωχρόν καὶ κροκίζον ποσὺς τῷ χρώματι. Ποιεῖ δὲ πινόμυρον πρὸς ἐμπνευματώσεις σωμαχοῦ, ἀτονίαν, δῆγμα πατοῖον, πᾶσματα, σπληνικούς, ἢ πατικούς, νεφριτικούς, σφοδρύνους, καὶ τὰ πρὸς κύστιν καὶ δούρα καὶ ὑποχονδρίων ἐν τάσεις, καὶ τὰ πρὸς ὑστέρα πάθῃ, ἰσχυράς, αἵματος πύσεις, ἡδύματα,

ἀσθματά, λυγμούς, δυσεντερίαις,
κοιλιακὰς διασέσεις, καὶ πτερόδους,
καὶ θηριῶν δῆγματα. δώσῃς ὅ-
μοίως τῷ ἀγαιικῷ πρὸς ἕκαστον
πάθος, τῇ αὐτῇ ὁλκῇ, καὶ ὑγροῖς
καὶ χρώματος· μετ' οἶνο μέλιτος μὲν
ἀπυρέτοις· πυρέτοισι δὲ μὲν με-
λικράτε· φθιστικοῖς μὲν γλυκέας,
σπληνικοῖς μετ' ὀξύμελιτος· σο-
μαχικοῖς ὡς ἐστὶ διαμασσωμέ-
νον καὶ καταπνέον· κινδυνὸς ὑ-
γροῦ ἐπὶ ῥοφουμένου· αἰρεῖ δὲ, καὶ
πελώματα καὶ λειχῶας μετ' ὀ-
ξοῖς καταχρῖσθαι· καὶ φλεγμονὰς
πάσας διαχεῖ χροῖας σινὺ ὑδα-
τι καταπλασθέντων· ἢ δὲ ἀνω-
τάτω αὐτῇ δυνάμει, συμπιπνέμε-
15 τὰ ποσὶς θερμασίας.

Πρὶ Γεντιανῆς. Κεφ. γ'.

Γεντιανὴ δοκεῖ μὲν ὑπὸ πρῶ-
του εὐρεῖσθαι Γέντιδος τῆ ἱλλυ-
ριῶν βασιλέως, ἀφ' ἧ καὶ τὴν ἑπω-
νυμίαν ἐσηκέν· ἢς τὰ φύλλα τὰ
20 μὲν πρὸς τῇ ρίζῃ καρυῖα ἢ ἀρνό-
γλώσσω ὁμοία ὑπερυδρα, τὰ δὲ
ἐν μέσῳ τῷ καυλῷ, καὶ μάλιστα
τὰ κατὰ ἄκρον ἐρησμένα, μικρῶς
καυλὸς δὲ κενὸς, λεῖος τὸ πάχος
δακτύλου, τὸ δὲ ὕψος δίπτηχυς, γό-
25 νασι διτληκμῆνος, ἐκ διασημά-
των μειζόνων πτελικείμενος τὰ
φύλλα καρπὸν ὃ ἔχων ἐν κάλυξι
πλευρῶν, κοῦφον, ἀχρῶδην, πρὸς
τὸν τῷ σπονδύλῳ· ρίζαν μακράν,
ὁμοίαν ἀριστολόχῃ τῇ μακρῇ,

suspiria, singuli, dysenterias, &
coeliacorū affectus, contra fe-
brium circuitus, & venenatorū
morsus. Datus in singulis vale-
tudinibus eodē, quo agaricum
pondere, & cum eisdem liquo-
ribus; si febris careant, in mulso;
sin aliter, ex aqua mulsa; si tabe
experiuntur, ex passō; si lienis
exercet, in aceto mulso. si disso-
lutio est stomachi, id est cū ci-
bi tenax non est, manditur, &
fine sorbitione vlla denoratur;
liuentia lichenásq; tollit, cū a-
ceto illitū, inflammationes om-
neis veteres ex aqua oblitum
dissipat. summa eius vis adstrin-
gens, cum aliquanto calore.

Gentiana. Cap. III.

Gentianæ inuētio prima as-
signatur Gétio Illyriorum re-
gi, à quo cognomentū habuit:
Folijs partim proximè radicē,
iugladi plantaginive similibus;
subrubris, partim à medio cau-
le, & præsertim iuxta cacu-
men, paulum dissectis: caule
cauo, & læui, digiti crassitudi-
ne, geniculato, & ex interual-
lis maioribus foliato; binūm
sæpe cubitorum: semine in ca-
lycibus lato sine pondere, glu-
moso, satis ad sphondyli se-
men accedente, radice lon-
gæ aristolochiæ, crassa, amara:

Nascitur

DIOSCORIDIS

Nascitur in sublimibus montium iugis, vmbrosis locis, aquisque. Vis radicis excalfactoria, & adstringens: contra morfus serpentium, duabus drachmis cum pipere, ruta, & vino pota, auxiliatur. Extracti succi drachma, laterum doloribus, & ex sublimi deturbatis, ruptis, & conuulsis, prodest: hepaticis & stomachis, pota cum aqua subuenit. Radix collyrii modo subdita, partus ejicit: imposita, vt lycium, vulneraria est, & vlcera cuniculatum depascentium medela. Succus præcipuè eodem effectu prodest: oculis inflammatione laborantibus illinitur: pro meconio collyris acribus immiscetur. Radix vitiliginè absterget. Succus extrahendi ratio hæc est: Côtusa radix quinque diebus aqua maceratur: postea in eadem tantisper decoquitur, dum extent radices: & vbi refrixit aqua, linteo excolatur: mox discoquitur, dum mellis crassitudo fiat, ficti lique reconditur.

Aristolochia rotunda.

Cap. II II.

Aristolochia nomen ex eo sibi adoptauit, quod existimetur, optimè puerpis opitulari.

Tria

πα χείαν, πικράν. ἔχοντα δὲ ἐν ὑψηλοτάταις ἀκρωρείαις, καὶ συσίοις τοῖσι καὶ ἐν δρυὶ. Διῶαμιν δὲ ἔχει ἢ ῥίζα διερχομένη, συπλεκτὴ βοηθεῖ δὲ διεισδύκτοις ποτιζομένη < β'. τὸ πλῆθος, μετὰ πεπέρως καὶ πηγαίου, καὶ οἴνου. τὰ δὲ χυλίσματα ὅσων < α'. καὶ πρὸς ὀδύνας πλευρῶν, καὶ πτώματα, ῥήματα τε καὶ * σπύσματα. ἐνδετεῖ, καὶ ἡπατικοῖς, καὶ σωματικοῖς πινόμενῃ μετ' ὕδατος. ἐνθάλλει ὅτι ἐμβρυα ἢ ῥίζα ὡς κολλύειον πρὸς σπινθύν. ἐστὶ δὲ καὶ τραυματικὴ ἐπιπινόμενῃ ὡς τὸ λύκιον, ὑπονόμων τὲ ἐλκῶν ἴαμα* καὶ μάλα τὸ χύλισμα, καὶ ὀφθαλμῶν ἐπιχρίσμα φλεγμαινόντων. μύζονται δὲ καὶ εἰς τὰ δριμύα τῶν κολλυείων τὸ χύλισμα ἀντὶ μηχανίου. ὅστις ὅτι καὶ ἀλφῶν σμηκτικὴ ἢ ῥίζα. χυλίζει ὅτι θλαθεῖται καὶ βραχεῖται ἐν ὕδατι ἐπὶ ἡμέρας 6. εἴτα ἐψηθεῖται ἐν τῷ ὕδατι, ἀχρὶς ἂν ὑπὸ χροσιν αἱ ῥίζαι, καὶ μετὰ τὸ ψυχθῆναι τὸ ὕδωρ διηθεῖται δι' ὀδονίου καὶ ἔψεται ἄχρὶς ἂν γίνηται μελιτώδες τῇ συστάσει. καὶ ἀποτίθεται ἐν ὄσπρῳ κίνῳ ἀγρίῳ.

Περὶ Αἰσολοχίας σπογγύλης. Κεφ. δ'.

Αἰσολοχία ὀνόμασαι μὲν ἀπὸ τοῦ δοκεῖν αἰετα βοηθεῖν τῇ λοχείᾳ.

ἐστὶ

ἔστι δὲ ἡ μὲν στρογγύλη, θήλειαν
καλουμένη, φύλλα δὲ ἔχει κισ-
σοειδῆ, ἐν ᾧ δὲ μετὰ δριμύτητος,
ὑποστρογγύλα ἀπαλὰ, παρὰ πολ-
λοῖς βλαστοῖς ἐν μιᾷ ῥίζῃ, τὰ δὲ
ἑλκίματά ἐπιμήκη. ἀνδρὶ λευκὰ,
οἰογὲι πλίπκας, τὸ δὲ ἐν αὐτοῖς
ἐρυθρὸν, δυσώδες.

Πρὶ Αριστολοχίας μα-
κράς. Κεφ. 4.

Ἡ δὲ μακρὰ ἀριστολοχία ἀρ-
10 ῥῶν καλεῖται καὶ δακτυλίτις, φύλ-
λα ἔχουσα ἐπιμήκεστερα. τὸ στρογ-
γύλης κλωνία λεπτὰ ὡς ἀσιδά-
μῆς τὸ μέγεθος, ἀνδρὸς πορφυρῆν,
δυσώδες, ὃ πρὸ ἐξανδείσαν ἀπὼ
παρὰ πλῆθος γίνεται. ῥίζα δὲ τῆς
15 μὲν στρογγύλης πεφρησ γέγγυλι-
δι ὁμοία. ἡ δὲ τὴ μακρᾶς δακτύ-
λου ἔχει τὸ πάχος ἀσιδάμια ἢ
καὶ μεΐζων. ἀμφοτέραι δὲ τὰ πολ-
λὰ πυξοειδεῖς ἐνδεδεν. πικραὶ τὴ
τῶν γούση καὶ βρώμαδεῖς.

20 Πρὶ Αριστολοχίας κλημά-
τιδος. Κεφ. 5.

Ἔστι δὲ τις καὶ τρίτη μακρὰ, ἡ
τις καὶ κλημάτις καλεῖται, κλω-
νία ἔχουσα λεπτὰ, φύλλοις ὑπο-
στρογγύλοις ἀλζῶν μικροῦ εἰκόσι,
25 περὶ πλεοναῖον, εἰκόσια περὶ ἄνω ῥί-
ζας μακροτέρας, λεπτὰς, φλοιὸν ἑ-
χούσας παχυν καὶ ἀρωματίζοντα,
ιδίως χρησιμεύουσας μύρεσι εἰς
ταῖς τῶν μύρων εὐχάρις ποιεῖ τὸ πρὸς
τὰ δὴ αὐτὰ φάρμακα ἢ στρογγύλη

Tria eius genera tradunt. Ro-
tunda, quæ foemina vocat, foliis he-
deraceis præfati odore cum acri-
monia, mollibus, subrotundis,
multis ab una radice germini-
bus, plôgisq; palmitib; florib;
câdidis, pilei similitudine, in quibus
quod rubrum est, grauter olet.

Aristolochia longa.

Cap. V.

Longa, mascula appellatur,
nonnullis dactylitis, longiore
quàm rotunda folio: tenuibus
ramulis, dodrâtalib; flore pur-
pureo, grauter olète, qui mar-
cescens in pyri similitudinem
turbatur. Radix rotundæ, in
orbē conglobata, rapi modo:
Longæ verò radix digiti crassi-
tudinem, & dodrâtis lôgitudi-
nem implet, nonnunquâ paulo
maiorē. Ambæ colore intus bu-
xæo, gustu amaro, & graui.

Aristolochia clematidis.

Cap. VI.

Est etiamnum tertia longa,
quæ clematidis vocatur, ramu-
los habens tenues, refertos fo-
liis subrotundis, minori sem-
per viuo similibus: flores ru-
tæ: radices longiores, tenues,
crasso cortice odoratoque ve-
stitas, priuatim vnguentorum
spissamentis conuenientes. Ro-
tunda cæteris venenis resistit.

f ij Lōga

DIOSCORIDIS

Longa verò aduersus angues,
& venena, drachmæ ponde-
re ex vino bibitur, & illini-
tur: pota cum pipere, & myr-
tha, menses, partus, & omnia
vuluarum onera eiicit: eadem
efficit subdita in pello. Rotun-
da ad eadem pollet: insuper
singultibus, suspiriis, horri-
bus, lien, conuulsis, laterum
doloribus, pota cum aqua, sin-
gulariter auxiliatur. Aculeos,
& spicula extrahit, oſiū squa-
mas illitu adimit, vlcera putri-
da exest, & fordida expur-
gat: caua cum iri, & melle
explet, gingiuas, & de-
tes extergit. Clemati-
tis ad eadem pol-
lere credit, viri-
bus tamē in-
ferior est.

Dulcis radix. Cap. VII.

Dulcis radix pluririma gi-
gnitur in Cappadocia, & Pon-
to: fruticosa est, ramis binūm
cubitorum altitudine assurgē-
tibus: foliis lentisci densis, pin-
guibus, tactūq; gummosis: flo-
re hyacinthi, fructu pilularum
platani magnitudinis, asperio-
re, qui siliquas lentium mo-
do habet, rufas & paruas: ra-
dicibus longis, vt gentianæ,
coloris

πρὸς δὲ τὰ ἐξ επιτὰ καὶ διατάξιμα
ἢ μακρά. < α. ὅλην πινομέ-
νη μετ' οἴνου καὶ καταπλασθῆναι
καὶ τὰ ἐν μήτρᾳ συνιστάμενα παρὰ
τὰ λόγια καὶ ἐμμελῆ καὶ ἐμβρυα
ἐκβάλλει. ποδεῖται μετὰ πεπτε-
ρας καὶ σμύρνης, καὶ ἐν πεσσοῖ δὲ
πρὸς δεῖται τὰ αὐτὰ δρᾶ. ἢ δὲ
σπογγύλη ποιεῖ μὲν πρὸς αὐτὰ καὶ ἡ
πρὸς εἰρημὴν ἐκ πεσσοῦ δὲ βου-
δεῖ ἄσθμα πλὴν γμῶ, ῥίγει, σπλη-
νι, ῥήγμασι, σπασμοῖσι, ἀλγύμα-
σι πλευρᾶς ποδεῖται μὲν ὕδατος.
ἀνάγει δὲ, καὶ σκόλοπας, ἀκίδας,
λεπίδας ὅσων καταπλασθῆναι
ἀφίσησι καὶ σπινθῆρας πειχά-
ρασει καὶ τὰ ῥυπαρὰ πειχάσαι-
ρει ἔλκη καὶ τὰ κοῖλα πληροῖ σὺν ἱ-
ταῖσι καὶ μέλιτι, σπλήνι δὲ καὶ οὐ-
λα καὶ ὀδόντας. δοκεῖ δὲ καὶ ἡ κλη-
μνίτις πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖν ἔ-
λα ὕψι μὲν τοι τῇ δυνάμει
τῶν γερνημῶν.

Πρὶ Γλυκυρρίζης. Κεφ. ζ. 20

Γλυκυρρίζα ἑνὶ τῷ πλεί-
στῳ ἐν καταπαδοκίᾳ, καὶ πόντῳ
ἔστι δὲ θαμνίσκος, ῥάβδους ἔχων
διπλῆς, πρὸς οὓς τὰ φύλλα πυ-
κνὰ εὐκότα ὁρῶν, λιπαρὰ καὶ
κολλώδη ἀφαιμῶν. τὸ δὲ αἶδος 25
ὑακίνθου ὁμοιον· καρπὸς δὲ πλα-
τάνου σφαιρεῖον μέγιστος τε ἀχύ-
ρεος, λοβοὺς ἔχων ὡς φακοῦ,
πυρρὸς, μικρὸς. ῥίζαι μακρᾶι,
πυξοειδεῖς ὡς γυπανῆς. ὑπό-
σφυνοι,

ὑποερυφνοί, γλυκῆαι· χυλίζόμε-
 ναι ὡς τὸ λύνιον. ποιεῖ δὲ τὸ
 χύλισμα πρὸς τραχύτητος ἀρτη-
 ρίας· δεῖ ὅ ὑποπίνοντας ἢ γλῶτ-
 τη ὑποχυλίζεν· ἀρμόζει δὲ καὶ
 5 πρὸς καῦσον στομάχου, καὶ πρὸς
 τὰ ἐν θώρακι καὶ ἡπατι· ἰσχυραί-
 σεις τὲ κύσεως καὶ νεφρίτιδας π-
 νόθυμοι μετὰ γλυκέως· ἀδιψόν
 τέ ἐστιν ἀποχυλίζομενον, καὶ βαν-
 μαπκὸν περὶ χυλίζομενον, καὶ στομα-
 10 χικὸν διαμαστώμενον, καὶ τὸ ἀφί-
 ψημα δὲ τῶν ῥιζῶν πρὸς σφάτως
 πρὸς τὰ αὐτὰ ἀρμόζει· ἢ ὅ ῥιζα
 ξηρὰ λειοτελεῖται, πλεονέκτοις
 κατὰ πλάσος ἐστιν ἐπιτήδειος.

Πρὶ Κενταυρεῖς τὸ μέγα.

15 λα. Κεφ. η'.

Κενταύρειον τὸ μέγα, οἱ ὅ ἡνὰ
 κλῶ καλοῦσι, φύλλα ἔχει καρύα
 βασιλικῇ ὁμοία, περιμήκη, χρώ-
 ματι χλωρὰ ὡς κράμβης, τὸ δὲ
 περιφερὲς αὐτῷ ἐντέτμη· ὡς τὸ
 20 ὀρίων καυλὸν ὅ ἔχει ὡς λαπάθου
 δίπληχον, ἢ καὶ τριπληχον, παρ-
 φυάδας ὑπὸ τῷ ῥίζῃς ἔχοντα πολ-
 λὰς, ἐφ' ὧν κεφαλὰὶ ὁμοίαι μύκω-
 νι, ὑπομήκης ἐν τῷ περιφερὲι αἰ-
 25 κος κυανίζον· καρπὸς ὁ ὁμοιος γινί-
 κω, ἐξέκείμενος ὡς τὸ ἐν ἐριώδεσι
 τοῖς αἰθέσι· ῥίζα παχεῖα, σερρή,
 βαρεῖα, πρὶ πύχης ὕδατος, μετὰ χυλῶ-
 δριμεῖα μετὰ ποτὶς σύψευος καὶ ἰσ-
 κύτητος, ὑπόλευκος*. ποιεῖ ὅ λιπα-
 ρὰν γῆν, ἐπιήλιον, καὶ δρυμὲς καὶ γελῶ

λαφῶ.

coloris buxæ, subacerbis &
 dulcibus: quæ densantur in suc-
 cum, lycij exemplo. Is in ar-
 teriæ scabritia efficax habe-
 tur: verum oportet vt linguæ
 subditus eliquescat: æstuant
 stomacho, thoraci, ac iocine-
 ri conuenit: sanat vesicæ sca-
 biem, & renum dolores, cum
 passio potus: idem eliquatus
 sitim sedat, vulnerib⁹ illitus ac-
 commodatur, commāducatus
 ori prodest: recētis radicis de-
 coctum ad eadem conuenit.
 Eiusdem farina pterygiis com-
 modissimè inspargitur.

Centaurium magnum.

Cap. VIII.

Centaurium magnum fo-
 lia habet iuglandis, oblonga,
 viridi brassicarum colore, ser-
 rata in ambitu: caulem, ceu
 rumicis, binum aut ternum cu-
 bitorum, multis ab radice ad-
 natis, in quibus capita, ceu pa-
 pauerū, in rotunditate oblon-
 ga: flos cœruleus: semen cni-
 co simile, ceu laneis floccis qui
 busdam inuolutū: radix crassa,
 grauis, solida, tripedalis, succo
 prægnans, cum adstrictione a-
 liqua & dulcedine acris, & ru-
 bescens. Amat solū pingue &
 apricū, ac syluas & colles. Co-

f iij pio.

piofissima est in Lycia & Pelloponneso, in Arcadia, Helide & Messenia, pluribusq; locis circa Pholoën, Lyciâ & Smyrnam. Radix cōuenit ruptis, cōuulsis, pleuriticis, spirâdi difficultati, veteri tussi: sanguiné expuentibus, drachmis duab' trita datur, si febris sit, in aqua: cæteris, in vino. Item ad tormina, & vuluæ dolores. Ramēta eius in collyrij formam vuluæ subdita, mēses atque partus extrahūt. succus eadem præstat: vulneribus prodest: nam recēs tusa, aut arida antè madefacta, ea glutinat & coniungit. Carnes coalescūt, si tusa simul decoquatur. In Lycia succū expriunt, quo pro Lycio vtuntur. Cognominata est & panacea, quoniâ medet oīm morbis, vbi aliqua inflāmatio timet, omninoq; multis modis opifera est. Illisa vulnerū labra cōsolidat, fustillū yrinæ calculósq; sanat iniectiōe. legenda præcipitur cū in eo sol est, vt emergat hora pura: dum lucē syderis erūpētis vniuersa complentur.

Centaureum minus.

Cap. I X.

Centauriū, limrefion aliqui vocauere, qm rigua amet loca. Herba origani aut hyperici similis

λοφα·πλεονάζει δὲ ἐν λυκίᾳ καὶ πελοποννήσῳ, ἐν ἡλίδι καὶ ἀρκαδίᾳ καὶ μεσσηνίᾳ καὶ περὶ* φολλοῦ καὶ λυκίαν καὶ σμύρνην. Ἀρμόζει δὲ ἡ ῥίζα, ῥήγμασι, ἀσπασμασι, πλευρητικοῖς, δυσπνοίᾳ, βηχὶ παλαιῷ· αἱμορροϊκοῖς ἀπυρέτοις μετ' οἶνι· πυρέσσουσι δὲ μὲν ὕδατος < β'. πλῆθος τῆς ῥίζης λείας διδομένης· πρὸς σφόδρους ὁμοίως καὶ ὑστέρας ἀλγήματα. ἄγει δὲ καὶ ἐμμήνια καὶ ἐμβρυα εἰς γῆμα τοκολευεῖς ἐκσθῆτα καὶ πρῶσθῆτα τῇ ὑστέρᾳ· ὅ, τι χυλὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ· ἐστὶ δὲ καὶ βαυμαπικὴ· ὕδα μὲν κοπῆσαι ξηρὰ δὲ πρῶθ' ἄγει καὶ οὕτω κοπῆσαι. συνάγει γὰρ καὶ κολλᾷ καὶ τὰ ἐφόρμηκα δὲ κρέα συνάγει· ἐάν τις αὐτῷ κόψας συνελήσῃ· οἱ δὲ ἐν λυκίᾳ αὐτῷ χυλίζοντες, χρωῖνται αὐτῇ ἀπὸ λυκίου. ἐκλήθη δὲ πανάκεια, ἐπεὶ δὲ πάντα τὰ φλεγμαίνοντα πάσῃ παύει,* καὶ κρούσματα πληγῶν, σπαραγμοῦ τὲ παύει ἐν ἐνέμασι καὶ λιθίωντας. συνάγεται δὲ τοῦτο ἡλίου μέλλοντος ἀνατέλλειν, ὥρα ἀγνὴ ὅτε πληροῦνται ἅπαντα.

Πρὶ Κενταυρείου τῆ μικρῆς. Κεφ. θ'.

Κενταύριον τὸ μικρὸν, ὃ πινες λιμναῖον καλεῖσιν, ἐπεὶ δὲ ἐν ἡμέραις φιλεῖ τὸ πᾶν. πῶς ὑποκινᾷ ἢ δειγνύει

γαῖω παραπλήσιός ἐστι, χαυλὸν
 ἔχουσα ὑπὲρ σπιθαμὴν γεγωνίω
 μύλων· αὐτὴ ἐν τῷ φοινικῷ ὑπο-
 πύρεφρα πρὸς τὰ τῆς λυχνί-
 δος· φύλλα μικρά· * ὑπὲρ μύκη
 5 ὡς ὑπὲρ πηγάν· καρπὸς ὁμοῖος πύ-
 ρρ· ῥίζα μικρά ἄχρηστος λεία·
 Αὕτη κοπιμομένη χλωρὰ καὶ κα-
 ταπλαστομένη, τραυμάτων ἐστὶ
 κολλητικὴ, ἀνακαταρπικὴ ἐλ-
 κῶν παλαιῶν καὶ ἀπουλωτικὴ
 10 ἀφελήθεισα δὲ καὶ καταπνο-
 μήν, ἄγει κατὰ κοιλίαν χολώδην
 καὶ παχέα· ἐγκλυσμὰ τε τὸ ἀ-
 φελήμα αὐτῆς ἐπὶ τῶν ἰσχιαδι-
 κῶν ἀρμόδιον· ἄρον αἷμα καὶ
 κομφίζον· ὁ δὲ χυλὸς πρὸς τε τὰ
 15 ὀφθαλμικὰ ἄχρηστος· ἀποκα-
 ταίρων τὰ ἐμποκοτουῦντα ταῖς
 κόραις συνὲ μέλιτι· καὶ ἐν πρὸ-
 δέ τῳ ἐμμύων ἀρωγὸς καὶ ἐμ-
 βρύων· ποδεῖς δὲ ἀρμόζει τοῖς
 ποδὶ τὰ νεύρα πάθεισιν ἰδίως· Χυ-
 20 λίζεται δὲ ἡ πόα συλλεγομένη
 ἐγκύμων ὅσα σπέρματος, καὶ ἀπο-
 βρεχόμενη ἡμέρας ἑ· εἴτα ἐψέῃ
 ἄχρης ἂν ὑπὲρ ἔχει τὸ ὕδωρ· ἐπει-
 τα τέτε ψυχθέντος, ὑλίζεται δι-
 ὀδονίς· δλιβεῖσθαι τὴ πόας καὶ πά-
 25 λιν ἐψέται μέχρι μελιτόδου συ-
 σάσεως· ἐνιοὶ δὲ χλωρὰν ἐγκύ-
 μονα αὐτὴ κόψαστες, ἐκδλίβουσι
 τὸν χυλὸν καὶ βελόντες εἰς κερσ-
 μερῶν ἀγγεῖον ἀκόγιτον, ἐν ἡλίῳ
 * συστέφοισι κινουῶντες αἰεὶ ξύλω·
 καὶ

similis, caule anguloso, palmū
 excedente : flore lychnidis, è
 puniceo in purpuream vergē-
 tæ : foliis rute, prælogis & par-
 uis : fructu tritico simili : radi-
 ce pusilla, leui & superuacua,
 quæ gustanti amaritudinē ad-
 fert. Herba recens tusa, suo il-
 litu vulnera conglutinat : vete-
 ra vlcera purgat, & cicatrice
 obducit : bilem crassosque hu-
 mores per aluum exigit, si de-
 cocta deuoretur. Ius decocti
 ischiadicis conueniētissimè in-
 funditur : trahit enim sangui-
 nem, & dolorem leuat. Succus
 oculorum medicamentis per-
 quàm utilis : siquidem cū mel-
 le caliginem oculorum expur-
 gat : in vellere appositus, men-
 ses & partus extrahit : epotus
 peculiariter neruorum vitiis
 succurrit. Succī extrahendi ra-
 tio : Legitur herba semine præ-
 gnans, & diebus quinque ma-
 defacta decoquitur, donec su-
 peremineat aqua : mox ubi re-
 frixit, linteolo exprimitur, &
 eiecta herba, iterum decoqui-
 tur, vsque dum mellis crassitu-
 dinem habeat. Nonnulli eā re-
 centem grauidāq; cōtundunt,
 atq; succum fictili non picato
 exprimūt, & in sole, lignea ru-
 de assiduè mouētes, inspissant.
 f iij Quod

Quòd si quid cōcretū faucib⁹
vafis adhærefcat, deradūt, reli-
quoq; humori pmiscēt. Noctu
diligēter operiūt: nāq; ros no-
cturn⁹, liquores coalescere nō
finit. Quæ aut ficcis radicibus
aut herbis liquamēta exprimū-
tur, decocta (vt in gétianæ mē-
tione retulim⁹,) pparant: sed q̄
ex corticib⁹ humidis, aut cōtu-
fis herbis factitātur, in sole, vt
antè dictū est: cogunt. Sic è tha-
psia, sic è mādragora, reliquiq;
similibus succus: sic ex acerbis
vuis melligo elicitur. Lyciū ta-
men, & absinthiū, hypocistis &
confimilia, decocta, eo quo di-
ximus modo, coguntur.

Chamæleon albus.

Cap. X.

Chamæleon albus, ixia ideo
aliquibus vocatur, quòd qui-
busdam in locis viscum circa
radicem eius inueniatur, quo
pro mastiche vtuntur mulie-
res: folia habet silybo aut car-
duo similia, asperiora, acutio-
ra, nigróque chamæleone vali-
diora: caulé non promit, verū
ex medio spinas, echini mari-
ni, aut cinaræ modo, erigit: flo-
res purpureos, veluti papporū
lanugines emittit: semen cnici
simile: radicē í letis collib⁹ craf-
sam, in mótofis verò graciliorē.

in

καὶ τὸ πεπτηγμένον αἰεὶ ἔχον-
τες καὶ τῷ ὕδατι μίσχοντες. σκεπά-
ζοντες τε νυκτὸς ἐπιμελῶς· ἡ γὰρ
δρόσος καλυπτικὴ τῆς τῶν ὕδατων
χυλῶν συστάσεως καὶ δέσσειναι. ὅσα
μὲν οὖν ἐν ξηρῶν τῶν ριζῶν ἢ
τῶν βοτανῶν ἐγχυλίζεσθαι, ἐφό-
δον σκευάζεται, ὡς ἡ ἡσπια-
νὴ· ὅσα δὲ ἐμφλοίων ὕδατων ἢ ρι-
ζῶν ἢ βοτανῶν ἐνδιηρομένων ἐν
ἡλίῳ, συσφύονται ὡς περ εἰρη-
ται. οὕτω καὶ ἡ θάψια καὶ μαν- 10
δραγόρα καὶ ὁμφάξ· καὶ τὰ ὁ-
μοία τούτοις χυλίζεται. λυκίον
μὲν τοι καὶ ἀψίνθιον καὶ ὑπο-
κίστις καὶ τὰ ὁμοία τούτοις ἐφό-
δον, συσφύονται ὅν τρόπον
περ εἰρηται. 15

Πρὶ χαμαιλέοντος λευ-
κοῦ. Κεφ. ι.

Χαμαιλέον λευκός, ἰξία τῆ-
τον ἐνάλεσαν, διὰ τὸ ἐν ποσσὶ
ποῖς ἔχον εὐερίσκεσθαι πρὸς τὰς
ρίζας αὐτῆς, ὥ καὶ ἀντὶ μασίχης 20
χρῶνται αἱ γυναῖκες· ἔχει φύλ-
λα ὁμοία σιλύβῳ ἢ σκολύμῳ, θά-
χύτερα δὲ καὶ ὀξύτερα καὶ ἰσχυρό-
τερα τὰ μέλανος· χαμλὸν δὲ οὐ
ἔχει, ἀλλ' ἀφίστην ἐν τῇ μέσῃ
ἀκανθῇ, ὁμοίαν ἐχίνῳ θαλασσίῳ 25
ἢ κινάρῳ· ἀνθὶ δὲ πορφύρεός ἐστι
ὡς τείχας ἐν παππικιδίας· καρ-
πὸν δὲ κνίκῳ παρὰ πλόστον· ῥίζαν
ἐν μὲν τοῖς ὑγροῖς γεωλόφοις πα-
χεύειν, ἐν δὲ τοῖς ὀρεγοῖς ἰσχυροτέρην
λευκωτά

λευκὴν διὰ βάθους, ὑπερωμα-
 πίζουσαν, βαρύνουσαν, γλυκεῖαν.
 ἢ τις ποθεῖται * ὀξύβαφου πλῆ-
 θους, ἀγχι ἑλμυδα πλατεῖαν.
 λαμβάνεται δὲ συν ὀίνῳ αὐση-
 ρῶ μετὰ δειγμάτου ἀποζέματος,
 καὶ ὑδροπικοῖς δὲ ἐπιτηδεύουσιν δι-
 δοται ὅλην συν ὀίνῳ * ἰσχυράν γὰρ
 αὐτῷ· καὶ πρὸς δυσουρίαν τὸ
 ἀφέλμα αὐτῆς πίνεται. ἔστι δὲ
 καὶ θηριακὴ συν ὀίνῳ ποθεῖται· ἀ-
 ποκτείνει καὶ κύνας καὶ ἴα· καὶ μύας
 συν ὀφίτῳ πεφυραμένη, καὶ ὑ-
 δρῳαίῳ διεδεῖται.

Περὶ Χαμαιλέοντος μέ-
 λανος. Κεφ. ια.

Χαμαιλέον μέλας, καὶ αὐτὸς
 τοῖς φύλλοις σκολύμφου ὅμοιος. ἑ-
 λάνθη αὐτῷ καὶ λεπτότερος καὶ
 διέρυθρος ἔχει ταῦτα· χαμλὸν δὲ
 αὐτοῖσι δακτύλου τὸ πᾶχος, σπι-
 θαμοῦλον, ὑψύθρον· ἔχον σιγί-
 διον καὶ ἀνθή ἀκανθώδη λεπτά,
 ὑακινθίζοντα ποικίλα· ῥίζα δὲ πα-
 ρεῖα, μέλαινα, πυκνὴ, ἐν ὅτῳ δὲ καὶ
 βεβρωμένη, χροθεῖται δὲ ὑπόξαν-
 θος, διαμασιθεῖται δακτυλῷ. φύ-
 ται δὲ ἐν πεδίοις ξηροῖς καὶ βουνώ-
 δεσι τοῖσι καὶ παραθαλασσίοις.
 Διῶνται δὲ ἢ ῥίζα λεῖα μικρότερος
 αὐτῇ χαλκάνθη ὀλίγη καὶ κεδρίνη
 ῥαίου καὶ ὀξυγρίου ἴσους ἐξάχων·
 σιγήχει δὲ καὶ λειχύδας δεῖον καὶ
 ἄσπερον περυσλαβῶσα, καὶ σιμι-
 γμηθεῖσα ὄξει καὶ καταχροθεῖται.

δια-

in profundo albam : aliquate-
 nus aromaticam, graui odore,
 dulcé. Quæ pota acetabuli me-
 fura, latas interaneorū tineas
 pellit. Bibitur autē in vino au-
 stero, cū origani feruefacti suc-
 co. Hydropicis cōmodissimè
 drachma in vino datur, etenim
 eos extenuat: cōtra difficultatē
 vrinę decoctū ppinat. Hausta
 in vino, serpentīū venenis resi-
 stit: occidit canes & fues: mures
 item necat, subacta cū polēta
 aut aqua, & oleo madefacta.

Chamæleon niger.

Cap. XI.

Chamæleon niger, foliis sco-
 lymo similis esset, nisi minora,
 tenuioraque, ac rubro distin-
 cta viderentur: caulem emit-
 tit dodrantalem, crassitudine
 digitali, subrubrum: & in um-
 bella flores spinosos, tenues,
 hyacinthi æmulos, versicolor-
 es: radice crassa, nigra, densa,
 interdū exesa, quæ dissecta fla-
 uescit, & commāducata mor-
 det. Prouenit in campestribus,
 siccis, & cliuosis tractibus, &
 maritimis. Radix trita, addito
 atramēti futuri exiguo, cedri-
 no oleo, & axūgia, scabiē abi-
 git: eadē, cū sibi sulphur & bi-
 tumē asciuit, & cocta in aceto
 illinitur, impetigines absterget.

Deco-

Decoctum collutione dētium
dolorem mitigat: cum pari pi-
pere & cera oblita radix, do-
lenti denti auxiliatur. Radice
concisa, & in aceto decocta,
dētes fouentur: eos quoq; fran-
git, si scriptorio stylo feruens
admoueat: vitia cutis in facie
vitilignesque cum sulphure e-
mendat: erodentibus medica-
mentis admiscetur: phagedæ-
nas, tetráq; vlcera illitu sanat.
Quare chamæleo vocetur, à
varietate foliorum euenit: mu-
tant enim cum terra colorem:
hic viridia, illic albicantia, ali-
bi coerulea, nonnusquam ru-
bra inueniuntur.

Crocodilium. Cap. XII.

Crocodilion chamæleontis
nigri figuram habet. Nascitur
in syluosis, radice longa, læui,
aliquantum lata, odore, vt na-
sturtij, acuto. Feruēcta in aqua
& pota radix, sanguinem co-
piofum per nareis pellit. Datur
lienosis, eos euidenter adiu-
uans. Semen ei rotundum in-
est, duplex vti scutú, quod sua-
pte vi vrinam ciet.

Dipsacum, siue labrum

Veneris. Cap. XIII.

Dipsacum aculeatarum ge-
neris est: caulem habet altum,
spinis,

διακλυζόμενον δὲ τὸ ἀφ' ἡμῶν
αὐτ' ὁδονταλγίας παύει· μετ' ἴσθι.
ἢ πεπέρεως ἢ κηρὺ πειπταστο-
μένη τοῖς ἀγνῶσιν ὁδοῦσι βοηθεῖ.
ἢ πυριῶν) ἢ δὲ αὐτ' αἱ ὁδόνες,
καθε-ἡμετέρης σὺν ὅξϊ ἢ καταν-
τληθείσης πρὸς αὐτὴν τὴν διὰ
γραφεῖς θρῦλὸν τῶν ἀγνῶσιν ὁδόντι,
δρῦπται αὐτὸν ἔφηνεν δὲ ἀπεκα-
θαίρει ἢ ἀγνοῖς μὲν δέει· μίγνυ) ἢ
ταῖς δυνάμεσι τ' σιτηαῖς. ἢ τὰ
φαρμακὲν ἡδ' ἔλκεα ἢ τὰ τεθνηω- 10
μένα καταπλαθεῖσα, ἀνασκευά-
ζουσα διεραπύει. ὠνόμασαι δὲ
χαμαιλέον, διὰ τὸ ποικίλον τῶν
φύλων· οὐ εἰσεται γὰρ ἢ λίαν
χλωρὰ τὰ τοιαῦτα, ἢ ὑπόλευκα,
ἢ κυανοειδῆ, ἢ ἐρυθρὰ, παρὰ τὰς 15
τῶν τόπων διαφορὰς.

Περὶ Κροκοδείλις. Κεφ. ιβ'.

Κροκοδείλιον ὁμοίον ὅτι τῶ
μέλανι χαμαιλέοντι. φύεται δὲ ἐν
τόποις θερμώδεσι, ρίζαν ἔχον μα-
κραν, ὕψους, * ὑπόπλατυ, ὅς- 20
μιν δειμνίσαν, ὁμοίως καρδάμων.
Ἰσχύει ἢ ἡ ρίζα ζεθεῖσα ἐν ὕδατι
ἢ πνομένη, αἶμα πολὺ αἶμα διὰ
ῥωτῶνων. δίδοται δὲ καὶ σπη-
νικοῖς ἐναργῶς ὠφελούσα. καὶ τὸ
σπέρμα αὐτῆς, διουρητικῆς, ὑ- 25
πέρχει δυνάμεως. πρὸς φέρει ὅν
ἢ διπλοῦν ὡς ἀσπίς.

Περὶ Δίψακος. Κεφ. γγ'.

Δίψακος τῶν ἀκανθωδῶν ὅτι
ἢ αὐτῇ κλων δὲ ἔχει ὑψηλόν.
ἀκαν-

ἀκανθώδη, καὶ φύλλα περιειληφό-
 τα τὸν χαυλὸν, ἐμφερῆ δριδάκι,
 δύο καὶ ἑκαστον γόνυ, περιμήκη,
 ἀκανθώδη καὶ αὐτά. ὥσπερ πινὰς
 πομφόλυγας ἐπὶ μέσῃ τῆς ῥάχε-
 5 ως, ἔσωθεν τε καὶ ἔξωθεν ἔχοντα
 ἀκανθώδεις, * κοιλίαν δὲ πε-
 εἰ τὰ δύο μέρη τῶν φύλλων ὥς
 τε ὕδατα ἀπὸ τῶν δρόσων καὶ
 τῶν ὀμβρῶν* συλλέγουσιν· ὅθεν καὶ τὸ
 ὄνομα εἰληκται. ἐπ' ἄκρου δὲ τῆς
 10 χαυλοῦ καθεκασμένη ἀπόφυσις, κε-
 φαλή μία ἐοικυῖα ἐρίνῳ, ὑπομή-
 κης ἀκανθώδεις· ξηρανθεῖσα δὲ
 λευκὴ φαίνεται. ἔχει δὲ καὶ σκα-
 λήκια κατὰ μέσσην τὴν ἐντεριώ-
 νην διαρραδίαν ἢ κεφαλὴν. Ἡ ῥίζα
 15 ὅ τ' αὐτῆς (ὡς οἶνον ἀφελθεῖσα,
 καὶ κοπείσα, * κηρωτῆς λαβῶσα πά-
 χος, τὰς ἐν* δακτυλίων ῥαγάδας
 καὶ σύειγας ἐν περὶ τὴν δεξα-
 μένῃ ἀποπύειται· δὲ δὲ τὸ φάρ-
 μακον εἰς χαλκὴν πυξίδα· φασὶ
 20 δὲ καὶ μυρμηκίων αὐτὸ καὶ ἀκρο-
 χορδῶν ἱάμα εἶναι. οἱ δὲ τῆς κε-
 φαλῆς σκώληκες εἰς κυτίδα ἐν-
 δεόμβροι καὶ πελαπιδόμβροι τρα-
 χήλῳ ἢ βραχίονι, ἵστροῦται τε-
 ταρτακοὺς δεξαμένῃ.

25 Πρὶ Ἀκάνθας λευκῆς. Κεφ. ιδ'.

Ἀκανθα λευκὴ φύεται ἐν ὄρεσι
 καὶ ὑψώδει τόποις· φύλλα ἔχουσα
 χαμαιλέοντι λευκὰ ἐμφερῆ, σε-
 νώτερα δὲ καὶ λευκότερα, ὑποδαί-
 30 σσα, ἀκανθώδη· χαυλὸν ὑπὸ δύο
 πύχεις,

spinis horridum, foliis lactucæ,
 spinosis, binis genicula singu-
 la complectentibus, prælon-
 gis, ceu quasdam bullas intus
 & extra aculeatas, in dorfi me-
 dio habentibus, concauo ala-
 rum sinu, in quo imber aut
 ros asseruetur: vnde dipsaci,
 quasi sitientis, nomen traxit.
 In cacumine caulis, singula fur-
 culis capitula insunt, oblon-
 ga, echinata spinis: quæ are-
 facta, candida spectantur, dis-
 sectaque medulla tenuis, ver-
 miculos ostendunt. Sanat ri-
 mas sedis, fistulasque, si tusa
 & decocta in vino radix, vs-
 que dū sit crassitudo ceræ, im-
 mittatur. Medicamentum ærea
 pyxide recondendum. Aiunt
 fornicationibus, verrucisque
 pensilibus remedio esse. Ver-
 miculi capitulorum in follicu-
 lo alligati, collo aut bra-
 chio appesi, produn-
 tur quartanis febri-
 bus reme-
 dio esse.

Spina alba. Cap. XIII.

Spina alba nascitur in mon-
 tibus & syluosis: folia fert albi
 chamæleonis angustiora, & cā-
 didiora, aliquantum hispida,
 & aculeata: caulem supra bina
 cubita

cubita altum, pollicari aut ampliore crassitudine: albicantē, intus cauum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen ceu cnicum, sed rotundius. Huius radix pota, coeliacis, stomachicis, & iis qui cruenta extulsiunt, efficax est: urinam cit, tumoribus illinitur. Decocto eius dentes in dolore collui prodest. Epotum semen cōuulsis infantibus, & a serpente demorsis auxiliatur: gestatum pro amuleto, serpentes abigere traditur.

Spina Arabica.

Cap. XV.

Arabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat: ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis reiectiones, mensium abundantiam, cæterásque fluxiones radix etiamnum valet. Prouenit in asperis.

Carduus. Cap. XVI.

Carduus, Græci scolymon vocant, folia chamæleonis habet, aut albæ spinæ, nigriora, & crassiora: caulem longum ædit, foliosum, capite spinoso: radice nigra, & crassa, quæ illita, graueolentiam alarum totiusque corporis emendat.

item

πύχεις, δακτύλου τῆ μεγάλῃ ἢ καὶ μείζονος πάχος, ὑπολευκὸν, κενὸν ἐνδοθεν, ἐπ' ἄκρου δὲ αὐτῆς κεφαλὴ πῶς ἐστιν ἀκανθώδης, ἐχίνω θαλασσίῳ ἐμφερὲς, πολλὰν ἐλάσσαν καὶ ὑπομήκης· αὐτῇ πορφύρεα, ἐν οἷς τὸ σπέρμα ὡς κνίκος, στρογγυλότερον δέ. Ταύτης ἡ ῥίζα πνομήν, ποιεῖ πῶς αἵμοπλοικοῦς, σμαγχοῦς, κοιλιακοῦς· οὐδ' αὖτε κενεῖ, κατὰ πλάσεται ἔς πρὸς οἰδήματα. καὶ τὸ ἀφέλημα δὲ αὐτῆς πρὸς ὀδονταλγίαν ποιεῖ διακλυζόμενον. τὸ δὲ σπέρμα πινόμενον, παιδίοις σωματικῶς βοηθεῖ, καὶ ἐρπετοδύκτοις. φασὶ δὲ ὅτι πείρατον ἐξ αὐτῆς θηρία δάσκει.

Περὶ Ἀκανθῆς ἀραβικῆς

κῆς. Κεφ. ιε.

Ἀκανθα ἀραβικὴ ἰοικύει πύχους εἶναι δοκεῖ τῇ λευκῇ ἀκανθῇ σφύρα. καὶ πῶς ῥοῦν γυναικῶν καὶ πρὸς ἀναγκαζὺν αἵματος καὶ πρὸς τοὺς δῆλοις ῥευματισμοῖς ἡ ῥίζα, παρὰ πλοσῶς ἐνδετεῖ.

Περὶ Σκολύμου. Κεφ. ις.

Σκόλυμος φύλλα ἔχει χαμαλέοντος καὶ τῇ λευκῇ ἀκανθῇ κεκομμένης, μελαίντερά τ' αὖτε παχύτερα καυλὸν ἀγίστον μακρόν. πείρατων φύλλων, ἐφ' ἧς κεκομμένη ἀκανθώδης ῥίζα ἣ ὑπερὶ μέλαινα παχέια, ἥς δύναμις ποιεῖ πρὸς τοὺς ἐχοντάς τας μαγύλας, καὶ τὸ λοιπὸν σῆμα δυσώδες κατὰ πλοσώμεν.

καὶ αὖ

καὶ ἀφελθεῖσα ἐν οἴνῳ καὶ πι-
νομένη. ἄγει δὲ οὖρα πολλὰ
καὶ δυσώδη. ἢ δὲ πόα ἀρτιφυῆς
οὖσα, λαχαρεύεται ἐφθὴ ὡς πορ
ἀπάρεαρος.

Περὶ Ποτηρίου.

Κεφ. ιζ'.

Ποτήριον, ἴωνες δὲ νευρά-
δα καλοῦσι, δάμνος ὅτι μέγας,
κλώνας ἔχον μακροὺς, μαλακοὺς,
ἱμαντώδεις, λεπτοὺς, ἐμφερεῖς
10 τραχαλίδη, φύα * μικρά, πε-
φερῇ, ὅλος δὲ ὁ δάμνος περι-
κεῖται * λεπτὸν χροῖν ἐλειώδη, καὶ
ἔστιν ἀκανθώδης, ἀγνή μικρά,
λευκὰ, καρπὸν δὲ * καὶ δριμυῶ,
ἄχρητον. φύεται ἐν ἐλώδεσι καὶ
15 μελώδοις χερείοις. ρίζαι δὲ ὑ-
πτεισι πύχων δύο ἢ τριῶν, ἰορραῖ,
νευρώδης * αἱ πνιες πρὸς τῇ γῇ ἀ-
πομυθεῖσαι, ἀνιάσι δάκρυον κόμ-
μει ὁμοιον. κοπεῖσαι δὲ καὶ ἐ-
πιπλαθεῖσαι νεύρων διακοπὰς
20 καὶ τραύματα κολλῶσι. καὶ τὸ
ἀφελήμα δὲ αὐτῆς πινόμενον,
ταῖς περι νῦρα διαδέσσειν ἀρ-
μόζει.

Περὶ Ακανθίου. Κεφ. ιθ'.

Ακανθίον ἐμφερῇ τὰ φύλλα ἔ-
25 χει τῇ λευκῇ ἀκανθῇ, ἐπ' ἄκρῳ
δὲ ἀκανθώδεις ἐξοχὰς, * οὗ συλ-
λεγομένου καὶ ὑφ' ἐν πινομένου,
βαμβάκοις * γίνεται. ταύτης
ἢ ρίζα καὶ τὰ φύλλα, ὅπου το-
νικοῖς βοηθεῖ πινόμενα.

Περὶ

item si decocta, in vino biba-
tur. Copiosam autem vrinam
foetidamque expellit. Herba
cum recens tenerescit, in ole-
ra, asparagi modo, transit.

Poterium. Cap. XVII.

Poterium, Iones neurada vo-
cant, largè fruticat, cortice ob-
ductum tenui, spinis horridū,
lanugine spissa, ramulis longis,
mollibus, lentis, tenuibus, tra-
gacanthæ proximis: foliis par-
uis, rotundis: flore exiguo,
candidi coloris: semine nul-
lius usus, sed gustu acuto & o-
dorato. Nascitur in aquosis,
& collibus. Radices demittit
binum ternumve cubitorum,
neruofas, & firmas: quæ pro-
ximè terram recisæ, dant suc-
cum gummi similem. Tufæ,
præcisus nervis & vulneribus
glutinandis illinuntur. Deco-
ctum quoque eius nervorum
affectibus prodest.

Acanthium. Cap. XVIII.

Acanthium albæ spinæ si-
mile, foliis aculeatis per ex-
tremities, & lanugine ara-
neosa obductis) ex qua col-
lecta & neta, vestes bombi-
cinis similes texunt, folia vel
radices ad remedia opistho-
toni bibuntur.

Acan-

DIOSCORIDIS

Acanthus. Cap. XIX.

Acanthus, Romani pæderotam vocant, nascitur in hortis, petrosif, & riguis: folia habet multo lactucaceis latiora, & longiora, erucæ diuifura, nigricantia, pingua, læuia: caulem binūm cubitorum, digitali crassitudine, læuē, prope verticē ex interuallis circumdatum foliolis, ceu nucamenta quædam oblonga referentibus, spinosis, è quibus flos prodit albus: semen oblongum, luteum: caput thyrſi specie. Radicibus nititur longis, mucosis, rubris, & glutinosis: quæ vſtis igni & luxatis artubus illitæ subueniūt: potæ vrinam ciunt, sed aluum cohibent. Ruptis, conuulſis, tabem ſentientibus, mirè profunt.

Acanthus sylueſtris.

Cap. XX.

Nascitur & ſylueſtris acanthus, ſcolymo ſimilis, aculeat⁹, breuior quàm fatiuus, & is qui in hortis puenit: cuius radix ad eadē ad quę ſuperior efficax.

Anonis. Cap. XXI.

Anonis, quam aliqui anonida appellant, ramos habet fruticosos, dodrantes, aut paulò maiores, frequētibus geniculis cinctos, cauſis alarū multis capiti-

Περὶ Ἀκανθίδος. Κεφ. ιθ.

Ἀκανθα, ἢ ἐρπῆκανθα. * φύνται ἐν παρὰδείσοις, καὶ ἐν πετρῶ-
δεσι, καὶ παρὺρροις χερσίοις. ἔχει δὲ
πλατύτερα φύλλα πολλῶ καὶ μα-
κρότερα θρίδακος, ἐγκυρὰ ὡς τὰ
δὲ ἐν ζώμου ὑπομέλανα, λιπαρὰ,
λεία· κωνικὸν λείον, δίπικρον, πά-
χος δακτύλου, ἐν διασημάτων
πρὸς τῇ κορυφῇ περικυκλωμένον
φυλλαίοις ποτίν, οἷον ἐκ τῶν αἰ-
νῶν ὑπομήκεσιν, ἀκανθώδεσιν, ἐξ ὧν
τὸ αἶδος πρὸς ἵεται λευκόν. σπέρ-
μα ὑπομήκες, μήκρον. θυρσοει-
δὴς δὲ ἡ κεφαλὴ. ρίζαι δὲ ὑπὲρ
γλήκρας, μυζώδεις, ἐμπυρεσιμα-
χαί. αἱ τινες πνευμαῖς καὶ
σπέρμασιν ἀρμόζουσι κατὰ παλ-
σόμηναι. πινόμηναι δὲ οὐρα, ἄ-
γριοι, καὶ κοιλίαν ἱσθῶσι. * φθισι-
κοῖς τε καὶ ῥήγμασι καὶ σπασμα-
σιν ἐνδεητούσιν.

Περὶ Ἀγρίας Ἀκανθίδος.

Κεφ. κ.

* Γίνεται δὲ καὶ ἀγρία ἀκανθα,
ὁμοία σκολύμῃ, ἀκανθώδης, βρα-
χυτέρα τῆς ἐν παρὰδείσῃ καὶ ἡ-
μέτερον δυνάται δὲ καὶ ἡ ταύτης
ρίζα ὅσα καὶ ἡ πρὸς αὐτῆς.

Περὶ Ἀωνίδος.

Κεφ. κβ.

Ἀωνίς, οἱ δὲ, ὠνωνίδα καλοῦ-
σι, κλώνες σπιδάμιασι καὶ μεί-
ζονες, θαμνοειδεῖς, πολυρόντοι,
μαχέας ἔχοντες πολλὰς, κεφα-

λια περιφερῇ, φυλλάδια μικρά,
 λεπτά, ὡς ὁ φρακοῦ, πρὸς τὰ
 τοῦ πηγαίου ἢ λωτοῦ τοῦ ἐν χρε-
 τοκοπέοις, ὑποδάσσα, ἐν ὧν
 οὐκ ἀνδρὲς ὄζοντα. ἀλμεινέται δὲ
 5 πρὸ τοῦ ἀκαιοδοφυῆσαι· καὶ ἐ-
 σπινῇ δίδει. ἔχουσι δὲ οἱ κλάδοι ἀ-
 καίδας ὀξείας, σκολοποιεῖς, τε-
 ρεῖς· *ρίζαν δὲ λευκὴν, θερμαν-
 τικὴν, *λεπτοπικλὴν ἥς ὁ φλοιὸς
 πνιγμός· σὺν οἴνῳ, οὖρα ἄγει
 10 καὶ λίθοις δρῦνται, ἐσχάρας πε-
 ειρῇται. ἀφελθεῖσα δὲ ἐν ὀ-
 ξυκράτῳ καὶ διακλυζομένη, πό-
 νον ὀδόντων παραύνει.*

Περὶ Λευκακάνθης.

Κεφ. κβ.

25 *Λευκάκανθα, ταύτης ἡ ρίζα
 ὁμοία κυπέρῳ, σικκῶν, ἰορρῶν, ἢ
 πρὸς μασηθεῖσα, ὀδονταλγίας πα-
 ραμυθεῖται. τὸ ὃ ἀπόζημα αὐτῆς
 (σὺν οἴνῳ κυάδων τεινῶν ποτὲν,
 20 βοηθεῖ πνευματικοῖς χρονοῖς, καὶ
 ἰσχυρικοῖς, ῥήγμασι, σπασμοῖς,
 καὶ τὸ χυλῶδες δὲ τῆς ρίζης, τὰ
 αὐτὰ ποιεῖ πνιγμῶν.

Περὶ Τραγακάνθης. Κεφ. κγ.

Τραγακάνθα· ρίζα ὅτι πλα-
 25 τεῖα καὶ ξυλῶδης, φαινομένη δὲ καὶ
 ὑπὸ γῆς, ἀφ' ἧς κλάδοι ταπεινοί,
 ἰσχυροί, χροῖοι ὃ ἐπὶ πολὺ, καὶ ἐπ'
 αὐτῶν φυλλάδια πολλὰ μεταξὺ
 λεπτά ἀκαίδας ἔχοντα ἐγκρυ-
 πτομένης τοῖς φύλλοις, *λευκὰς,
 ἰορ-

pitibus rotundis, foliis lenticu-
 læ, tenuibus, pufillis, ad rutæ aut
 pratensis loti folia accedētibus,
 subhirsutis, odoratis, nō iniu-
 cundè olentibus. Muria cōdi-
 tur, antequā spinosa fiat, cibis
 gratissima. Rami acutioribus
 spinis, & veluti spiculis firmio-
 ribus horrēt: radicē mittit can-
 didam, quæ excalfacit, & exte-
 nuat: huius cortex ex vino po-
 tus, vrinā ciet: calculos cōmi-
 nuit, margines vlcera erodit.
 Radix cū decoquitur in posca,
 dolorem dentium collutione
 mitigat. Decoctum eius potu
 hæmorrhoidas sanare creditur.

Leucacantha. Cap. XXII.

Leucacantha prædita est ra-
 dice cyperi, valida & amara
 quæ mādūcata dolorem den-
 tium sedat: veteri laterū dolo-
 ri, atq; ischiadicis prodest, de-
 cocto cyathis tribus ex vino
 potu. Eadē ruptis & conuulsis
 medetur. Radicis epotus suc-
 cus eisdē præbet effectus.

Tragacantha. Cap. XXIII.

Tragacanthæ radix lata &
 lignosa, summo cespice niti-
 tur, vnde furculos humiles,
 robustos, latissimè fundit, in
 quibus minuta folia, multa,
 nonnunquam tenuia exorun-
 tur, quæ sub se spinas albas,
 rectas,

rectas & firmas occulunt. Est etiamnum tragacantha, lachryma: quæ, vulnerata radice manans, concrevit. Præstat pellucens, gracilis, lævis, syncera & subdulcis. Cutis spiracula, vt gummi, obstruit. Huius increbuit vsus ad oculorum medicamenta, ad tussim, exasperatas fauces, retusas voces, catarrasque destillationes, cum melle in delinctu: subdita quoque lingue liquefcit, & in passo ma defacta, drachmæ pondere bibitur, contra renum dolorem, & vesicæ rosiones, mixto cornu cerui vsto & eloto, aut scissif aluminis momento.

Eryngium. Cap. XXIII.

Eryngium aculeatarum generis est. Cuius folia in principio, sale condita, in cibos recipiuntur. lata autem sunt, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica. Sed vbi adoleuerunt circa cōplures cauliū eminentias in spinas aculeantur. in quorū summitatibus globosa capitula, durarū acutissimarūque spinarū ambitu stellatim circumuallantur, quorū colos aliās viridis, aliās albus: interdū cœrule⁹ inuenitur. Radix oblonga, lata, foris nigra, internè cādida, pollicis crassitudine, odorata.

Nasci-

ἰσχυράς, ὀρθάς. ἔστι δὲ ἡ τραγάκανθα, δάκρυον τῆ ῥίζης ἀπολήμψεως ἐπισπαστικόν, ἧς διαφέρει ἡ διαυγὴς καὶ λεῖα καὶ ἰσχυρὰ καὶ ὑπόγλυκος. Διῶμιν δὲ ἔχει ὁμοίαν κόμμει παρρημπλαστικῷ. χρῆσις δὲ αὐτῆς τὰ ὀφθαλμικά, καὶ πρὸς βήχας, καὶ πρὸς τὰς περὶ ἀρτηρίαν βραχυτητας, καὶ φωνῆς ἀποκοπὰς, καὶ ἐπισταγμοὺς ἐν ἐκλεικτῷ σὺν μέλιτι ἀποχυλίζεται ἢ ὑποτεθείσθαι ἰοτῇ γλώσση, καὶ πίνεται ἢ ἀποθραχεῖται ἐν γλυκείᾳ ἢ ἀ. πηλῆδος, πρὸς νεφρῶν ὀδυώλω καὶ κύστεως δῆξιν, μυχῶτος αὐτῇ κέρατος ἕαφείη κέντυμνον καὶ πεπλυμνον, ἢ συπληείας χρῆσις ὀλίγη. 15

Περὶ Ἡρυγγίου. Κεφ. κδ.

Ἡρύγγιον τῶν ἀκανθωδῶν ἐστίν, ἧς ἐν ἀρχῇ τὰ φύλλα λαχαρεύει, εἰς δὲ μαίης σιωπιδέμναι. ἔστι δὲ πλατεῖα, βραχέα τοῖς πείρξ, ἀρωματίζοντα τῇ γεύσει, ἀνθάνουνα δὲ ἀκανθωῦνται καὶ παλείνας ἐξοχὰς καυλῶν, ἐφ' ὧν καὶ τὰ ἀκρα κεφάλαιά ἐστι σφαιροειδῆ, ἀκαίδας ἀεικείμενα ὡς περὶ ἀσπὴρ ὀξύτητας κύκλω, σκληρά, ὧν τὸ χρώμα χλωρὸν ἢ λευκόν, ἐνίοτε δὲ καὶ κυανοῦν εὐείσκεται. ῥίζα δὲ ἐπιμήκης, πλατεῖα, μέλαινα καὶ πῶ ἐπιφανείαν, ἐνδοθεν λευκὴ, δακτύλου μεγάλου τὸ πάχος, καὶ αὐτὴ ἐνώδης καὶ ἀρωματίζεται. 20

φύεται

φύεται δὲ ἐν πεδίοις καὶ τραχέσι
τόποις. Διῶαμν ὃ ἔχει θρυμαν-
πικὴν* πινομένη ἀγει καὶ οὐρα καὶ
ἐμμιννα, σφόδρα τε καὶ ἐμπνευμα-
τώσεις λύει ὑπατικαῖς δὲ καὶ θη-
ζιοδύκτοις, καὶ θαλάσσιμον εἰλη-
φόσιν, ἀμύζει (ὡς οἶνω). πίνεται
δὲ πρὸς τὰ πλείστα (ὡς σαφυλί-
νου σπέρματι, < α. τὸ πηλιδος. ἰ-
σορεῖται δὲ ὅτι θαλασσιμὴν καὶ
καταπλασσομένην, φύματα δια-
φορεῖ. ῥίζα δὲ αὐτῆς πινομένη καὶ
ὕδρομέλιτος, ὅτι πύκνους ἰσχύει
καὶ ἐπιληπτικοῖς.

Πιεὶ Ἀλόης.

Κεφ. κβ.

Ἀλὸν φύλλον ἔχει σκύλη πα-
ραπλήσιον, παχὺ λεπτόν, ὑπό-
15 πλατυ, περὶ φέρει, εἰς τοῦ πύσω*
κλώμενον, παρ' ἑκάτερα δὲ τὰ μέ-
ρη ἔχει τὰ φύλλα ἐν πλαγίῳ ἀ-
κανθώδη, ἀραιῶς ἐξέχοντα, κολο-
ῖα, καυλὸν δὲ ἀνίστην ἀνδρείκῳ
ὁμοιον· αὐτὸς δὲ λευκὸν καὶ κερπὸν
20 ἀσφοδέλω ἐοικότα, βαρύνσμος δὲ
ὅλη, καὶ ἀπογευσμένη πικροτάτη·
ἔστι δὲ μιονόριζος ὡς περ πάσα-
λον ἔχουσα πῶς ῥίζαν. θυνά-
ται δὲ ἐν τῇ Ἰνδία πλείστη λε-
πιδος, ἐξ ἧς καὶ τὸ ὀπισμα κομί-
25 ζεται. φύεται δὲ καὶ ἐν ἀραβίᾳ καὶ
Ἀσίᾳ, καὶ ἐν ποταμοῖς θαλάσ-
σις τοῖς τόποις καὶ νήσοις, ὡς ἐν αὐ-
θρῶ οὐκ εὐχρηστος εἰς ὀπισμόν,
πρὸς ὃ κόλλησιν βρωμάτων ἐπι-
τίθειος, λεία καταπλασσομένη.

διήγον

Nascitur in asperis & campe-
stribus. Vim habet calfacto-
riam: pota menses & urinas
pellit, tormina inflationesque
discutit: contra iocinerum vi-
tia, serpentium morsus, & hausta
venena, cum vino prodest. Bibi-
tur aduersus plurima cum semi-
nis pastinacæ drachmā vna: ap-
penfa illitave, tubercula discu-
tere proditur. Pota cum hy-
dromelite radix, opisthotoni-
cis & comitialibus medetur.

Aloë.

Cap. XXV.

Aloës folium scillæ similitu-
dinem habet, crassum, pingue,
modicè latum, rotundum, retrorsum
pandum: folia vtrinq; ex obliquo
longioribus interuallis strian-
tur, & in spinulas definunt re-
tusas truncasq;. Caulis emitti-
tur non dissimilis antherico: flos
albus: fructus hastulæ regię co-
gnatus: graui tota est odore, &
gustu amarissima: radice vna,
ceu palo, in terrā depacta. Plu-
rima præpinguisq; in India gi-
gnitur, ex qua coact^o succ^o ad-
fertur. Nascit^r etiā in Asia & A-
rabia, in locisq; bsdā maritimis:
& in insulis (vt in Andro) non
valde succo extrahendo ido-
nea, sed ad glutinanda vulnera
sanē, q̄ vilis, si detrita illinatur.

t

Duo

DIOSCORIDIS

Duo suo succi genera: quoddā arenosum, quod sedimentū purissimæ esse videtur. Alterū ad iocineris imaginē vergit. Eligibet, syncera, quæ nihil doli sensit, nitida, calculorū expers, rufi coloris, friabilis, ac iocineris modo coacta, facile liquefcens, eximiæ amaritudinis: improbaturnigra & fractu cōtutumax. Gummi eam adulterāt: quod deprehenditur gustu, amaritudine, & valido odore: eoque argumento, quod digitis friata non ad minima vsq; frusta resoluitur. Nec defunt qui acaciā immisceant. Natura eius est spissare, exiccare, somnū allicere, & corpora densare, alium resolvere. Stomachū repurgat binūm cochleariū mēfura, in aqua frigida aut egelida pota: sanguinis reiectiones sistit: regiū morbū purgat, tribus obolis ex aqua, aut drachmē pōdere in potu: deuorata cum resina, aut cū aqua, vel melle cocto sumpta, aluū soluit: purgationis perfectæ causa, tribus drachmis sumit: aliis purgatoriis medicaminibus admista præstat vt minus stomachū infestent: sicca glutinādis vulneribus inspargitur, vlcera ad cicatricē perducit, cohibetque: eadem

διπλὸν δὲ ἔστι τὸ εἶδος τοῦ χυλίου
ματος • τὸ μὲν τοι ψαμμῶδες,
ὃ φησὶ ὑποσάθμην τῆς χαδαρωτά-
της ὅμοιον εἶναι • τὸ δὲ, ἥπα-
τον • ἐκλέγου δὲ τὴν χαδαρὴν
καὶ* ἄδελον καὶ ἄλιδον, σίλβου-
σαν, ὑποξάνδρον, εὐδρυπλον, ἥπα-
τίουσαν, ῥαδίως ὑγρανομήλιν,
ἐπιτεταμένην τῇ πικρίᾳ • τὴν
μὲν τοι μέλαιναν καὶ δυσάτακτον
ἀπεκλέγου • δολίχοισι δὲ αὐτὴν
κόμει • ὃ φησὶ ἐλέγχεται γέυσαι
καὶ πικρία καὶ ὁσμῆς ἐπιτάσει •
καὶ τῷ μὴ διαλύεσθαι μέχρις
ἐλαχίστου ψήγματος θλιβομένη
ὑπὸ τῶν δακτύλων • ἐνιοὶ δὲ καὶ
ἀκακίαν μίσχουσι. Διῶσιν ὅ-
τι ἔχει συπτικὴν, ὑπνωτικὴν, ξηραν-
τικὴν, πυκνωτικὴν τῶν σωμάτων,
κοιλίας τε λυτικὴν, καὶ σωμαχο-
ἀποκαταρκτικὴν, κοχλιαρίων ἕ-
ως πλῆθος, μεθ' ὕδατος ψυχροῦ, ἢ
γαλακτώδους πινομένη • αἵμα-
τίς τε ἀναγωγὰς ἐπέχει • καὶ ἰ-
κτερεν ἀποκαθαίρει, μεθ' ὕδα-
τος τριωβόλου, ἢ < α. ὁλοῦς ἐν
ποτῷ, καὶ μετὰ ῥητίνης δὲ χα-
ταπνομένη ἢ ὕδατος ἢ μέλιτος ἐ-
φδοῦ ἀναλκιδεῖται κοιλίαν λύει •
δραχμῶν δὲ τριῶν πλῆθος τε-
λείως καθαίρει • μυχὸ δὲ τοῖς
ἄλλοις καταρπηκοῖς, ὥσπερ αὐ-
τὰ χακοςόμαχα ποιεῖ, ξηρὸν δὲ
ἐπιπλατύνει, τραύματα κολλᾷ,
καὶ ἐπουλοῖ ἔλκη καὶ κατασέληφ-
αἰδοῖα

αἰδοῖα δὲ εἰληκόμενα ἰδῶς δε-
ραπύει, καὶ ἐπαγῶμα παύδων
ῥηχθέντα παρσκολᾷ· δεραπύει
δὲ καὶ κωνδυλώματα καὶ ῥαγά-
δας κερταύρη σὺν γλυκεῖ οἶνω·
5 αἰμορροίας τὲ ἴσῃσι τὰς ἐξ αἰ-
μορροϊδῶν, καὶ πτερύγια ἀπτο-
λοῖ, αἶρει τὰ περὶ τὰ μάτια καὶ ὑ-
πώπια σὺν μέλιτι· ὠφθαλ-
μίας τὲ καὶ ἀκνιδῶν κησμοὶ
παρηγορεῖ καὶ κεφθαλγίαν με-
10 ὄξους καὶ ῥοδίνου, μετ' ὧπι καὶ
κροτόφῳ ἐπιχρίοι μύρον· ἐπέχει
καὶ ρεύσας τείχας· σὺν οἶνω καὶ
πρὸς παείδμια δὲ καὶ οὐλά, καὶ
παύτα τὰ ἐν τῷ στόματι ἀρμύζει
σὺν μέλιτι καὶ οἶνω· φώγνυται δ'
15 καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικά ἐπὶ καθά-
ρσιν καὶ διαπύρου ὀσράκου, μετα-
βλήσας μύρρον, μέχρ' ἂν ὀ-
μαλῶς πυρωθῇ· πλωύεται δὲ
χλωροκόρου τὸ ψαμμόδου ὡς
ἀχρῆσου, * λαμβανόμενον δὲ τὸ
20 ἀπαρῶτάτου, καὶ λείου.

Περί Αψινθίου. Κεφ. κς'.
Αψινθιον, βαθύπικρον, γῆριμος
ἢ πῖα. ἔστι δὲ αὐτῆς βελύγιον τὸ ἐν
πόντῳ καὶ κατὰ δακίαν, ἐν ὅρῳ τῷ
καλυμένῳ ταύρῳ γινώσκον. Δύ-
ταμν δὲ ἔχει θέρμα πικρὸν, συπι-
25 κτὴν, καὶ ἀποκαθάρτικὴν τὴν ἐν ἡρῶ-
των σωματικῇ καὶ κοιλίᾳ χολωδῶν.
ἔστι δὲ καὶ ἐρηπικὸν καὶ ἀκράταλον,
πρεσπιτόμυρον, καὶ πρὸς ἐμπνεύ-
μα τῶσσι δὲ ἀρμύζει, καὶ κοιλίας
καὶ σπ-

eadem peculiariter exulcera-
tis genitalibus medetur, & dis-
rupta puerorum præputia iun-
git: condylomata, rimasque se-
dis ex passio sanat: hæmorrhoi-
dum abundantiam & sangui-
nis eruptiones sistit, pterygia
ad cicatricem ducit, liuores &
insignita ex melle tollit: pri-
uatim scabras lippitudines, pru-
riginésq; angulorum, permul-
cet: dolorem capitis sedat, tem-
poribus & fronti illita, ex ace-
to & rosaceo: capillum fluen-
tem continet, cum vino: tonsil-
lis, gingivis, & omnibus oris vl-
ceribus, cū melle & vino pro-
ficat: oculorum medicamentis
torretur, in munda & cādenti
testa, pennâque subinde versa-
tur, vt possit æqualiter torreri.
Lauatur, vt quod sit arenosissi-
mū, tanquā inutile subsidat, &
leue ac pinguisimū assumatur.

Abinthium. Cap. XXVI.

Abinthium, aliqui bathy-
picron, herba vulgò cognita.
Præstantius in Ponto & Cap-
padocia, in monte Tauro na-
scitur. Vim habet calfaciendi &
adstringendi: bilem expurgat,
quæ & stomacho & ventri in-
hæsit: vrinam cit, & crapu-
lam præsumptum arcet. Ad in-
flationes ventris, & stomia-

chi dolores prodest, cum se-
feli & nardo gallico potum: fa-
stidia discutit, & arquatos fa-
nat madefacti dilutum, aut de-
cocti ius, quotidie tribus cya-
this haustum: menses cit po-
tum, aut cum melle apposi-
tum. Contra fungorum stran-
gulationes conuenienter ex a-
ceto bibitur. Aduersatur ixiæ
venenis cum vino, item cicu-
tæ, & muris aranei morfibus,
& draconi marino. Anginæ
eo cum melle & nitro perun-
guntur, & epinyctides ex a-
qua. Ad fugillata & oculo-
rum caligines ex melle illi-
nitur: item auribus, si manat
fanes. Dentium auriūque
dolores decoctum vaporis suf-
fitu compefcit. Decoctum in
passo dolentibus oculis obli-
nitur: item præcordiis & io-
cineris, tritum cum cerato cy-
prino stomacho quoque lon-
ga valetudine laboranti, cum
rosaceo: cum ficis auté, aceto
& loliacea farina, aquæ inter-
cuté lienosisq; subuenit. Vinū
ex eo fit, quod absinthem vo-
cât, præsertim in Propontide &
Thracia, quoad ante dicta vtū-
tur, cū febris carent: alioquin in
æstate ppinât, & acceptâ huic
vino incolumitatem referunt.

Inspar-

χὺ σωμαχοῦ ἀγλήματα, πινόμνον
μὲν σετέλεως ἢ νάρδου καλτικῆς.
καὶ ἀγορεξίας καὶ ἰκτερικοῖς θέρει
πέφυκ, τὸ ἀπόβρεγμα αὐτῆς ἢ τὸ ἀ-
φέψημα, καὶ ἐκείνην ἡμέραν λαμ-
βανόμενον εἰς πληθὺς κυάθων βι-
βὼν ἀγλή καὶ ἐμμηνα, πινόμνον τε
καὶ προσθήμενον μὲν μέλιτος. πρὸς
τὸν ἀπὸ μυκήτων πνιγμὸς, ἀφ-
μόζει σὺν ὄξει πινόμνον, (ὡς οἶ-
νω καὶ πρὸς ἰξίαν καὶ κόνειον καὶ κυ-
γαλῆς δάγματα, καὶ δράκοντα θαλα-
λάστοιον. σωμαλχοῖς καὶ διάρχειο-
μα (ὡς μέλιτι καὶ νίτρω καὶ πρὸς
ἐπινυκτίδας σὺν ὕδατι. πρὸς δὲ ὑ-
πώπια (ὡς μέλιτι, καὶ πρὸς ἀμ-
βλυωπίας, καὶ πρὸς ἰχωρῶντα ὥτα
ὁμοίως. καὶ ὁ ὑπάλμιος δι' αὐτῆς
καὶ ἀφεψηματος πρὸς ἀταλγίαν καὶ
ὀδονταλγίαν. ἀφεψόμενον τε σὺν
γλυκεῖ, κατὰ πλάσμα ὀφθαλμῶν
περιοδονῶντων ὅτι καὶ ἀπλάσσει)
δὲ καὶ πρὸς ὑποχόνδρια, καὶ ἥπαρ
καὶ σωμαχοῦ ἐπὶ ἀγλή καὶ χροῖως
πάσχοντα, συνεκλεανόμενον κηρω-
τῇ κυπρίνη πρὸς δὲ σωμαχοῦ ῥοδί-
νη ἀφ' ἧς καὶ ὑδρωπικοῖς, καὶ σπλη-
νικοῖς. μετὰ τῶν αὐτῶν σύκων, καὶ νί-
τρω, καὶ αἰρίνῃ ἀγέυρε. Σκευάζει δὲ
ἐξ αὐτῆς καὶ οἶνος ὁ λεγόμενος ἀψιν-
θίτης, μάλιστα πρὸς τὴν πρὸς πον-
τίδα καὶ θράκην, ὅς πρὸς τὰ πρὸς
ρημάρα χροῖται ἐν ἀπυρεξίᾳ καὶ
ἀγλή καὶ, πρὸς πίνεσιν ἐξ αὐτῆς θέρει
ὕγείας ποιητικὸν εἶναι νομίζοντες.

δοκέει

δοκεῖ ἡ καὶ ἀειπλοπόρομον εἰς
 τὰς κισσῶν ἄβρωτα τηρεῖν τὰ ἰ-
 μάπα. ἀειφορόμῳν τε μὲν ἑλαίῳ,
 κώνωπας καλύειν ἀπὸ τοῦ τοῦ
 σώματος· τὸ δὲ μέλαν ὃ γράφο-
 5 μὲν τῷ ἀποτρέγματι αὐτῆς * ἡρα-
 φῆν, ἄβρωτα μισὶ τηρεῖ τὰ χράμ-
 ματα. ἔοικε δὲ καὶ τὸ τῆς χυλίσ-
 ματος εἶναι ποιεῖν τὰ αὐτά. πλὴν
 εἰς τὰς πόσεις οὐ δοκιμάζομεν
 αὐτὸ, χακοσόμαχον καὶ κεφα-
 10 λαλγές ὄν. τὸ δὲ χύλισμα ἀ-
 μόγη ἐψηθεῖση καὶ μυνημὴν
 δολοῦσιν πίνες.

Περὶ Ἀψινθίου θαλασσίῳ.

Κεφ. κζ'.

Ἀψινθιον θαλασσιον πίνες δὲ
 15 καὶ στείφιον καλοῦσι, ὅθεν πλεί-
 σον ἐν τῷ περὶ χρωπαδοκίαν
 ταύρῳ ὄρει γινώσκται, καὶ ἐν τα-
 φοισίρει τῆς αἰγύπτου· ὃ ἀπὸ
 θαλλῶ οἱ ἰσακοί χεῖνται, ἔστι δὲ
 ἡ πόα λεπτόκαρπος, ἐοικυῖα ἄβρο-
 20 τῶν μικρῶ, ἀειπλοπόρομον σπερμα-
 τῶν, ὑποπικρὸς, χακοσόμαχος,
 βαρύσμος, εὐφρούσα μετὰ πο-
 τῆς δερμασίης· ἡ τις ἐψηθεῖσα
 καὶ ἐαυτῷ, ἢ μετὰ ὀρύζης καὶ
 ληθεῖσα μετὰ μέλιτος, ἀσκα-
 25 εἶδας καὶ ἑλμυνδας στρογγύλας
 κτείνει, ὑπόρουσα κοιλίαν κού-
 φως· δυνάται δὲ καὶ συν* ἐψη-
 ματι, ἢ φαλῇ καὶ ἐψηθεῖσα τὰ
 αὐτὰ ποιεῖν. λιπαίνεται δὲ μάλι-
 κα τὰ πρῶτα γεμύματα.

Περὶ Ἀψιν-

Insparsum arcis-absinthii, ve-
 stes ab erodentium iniuria vin-
 dicat: culices ex oleo perun-
 ctum abigit, & à corpore ar-
 cet: atramentum librarium di-
 luto eius temperatum, literas
 à murium erosione tuetur. Exi-
 stimatur liquamētum eisdem
 præstare effectus. Attamen po-
 tionibus improbatur, quoniā
 stomachum malè habet, &
 capitis ciet dolorem. Sunt qui
 decocta amurca, liquamen-
 tum adulterant.

Marinum absinthium.

Cap. XXVII.

Absinthium marinum, quod
 aliqui seriphum vocant, co-
 piofissimum in Tauro monte
 iuxta Cappadociam & in Ta-
 phorisi Egypti gignitur: quo
 Isiaci pro oliuæ ramo vtuntur.
 Herba est tenuis, abrotoni par-
 ui similitudine, referta minu-
 tulis feminibus, sub amara, sto-
 macho inimica. Ea grauter o-
 let, & cum quadam calfactio-
 ne adstringit: per sese aut cum
 oryza cocta, interaneorum a-
 nimalia, teretēsque tineas, ad-
 iecto melle, enecat, aluum le-
 uigat: cum edulio auté vel len-
 ticula decocta, eadem præstare
 potest. Pecora maximè pin-
 guescunt hoc pabulo.

t iij Absin-

Absinthium Santonicū.

Cap. XXVIII.

Tertiū genus absinthio as-
gnatur, quo Gallia alpibus fi-
nitima scatet: id patrio nomi-
ne Santonicum vocant, regio-
nis in qua nascitur cognomē-
to, absinthio non dissimile, ve-
rū subamarum est, nō adeo
feminis foecundum. Eadē quæ
seriphium potest.

Abrotonum. Cap. XXIX.

Abrotonum duorum est ge-
nerum. Foemina quadam ar-
boris specie fruticans, candi-
cat, circum ramulos foliis, se-
riphi modo, minutim incis-
floribus referta est, comanti-
bus in summo, fulgore auri, co-
rymbis: quod per æstatē pro-
diit, suauiter olet, cum graui-
tate quadam & amaro gustu:
id genus ficulum esse constat.
Alterum mas vocatur, sarmen-
tosum, gracilibus ramulis vti
absinthium. Plurimum in Cap-
padocia gignitur, & Gala-
tia Asiatica, atque in Syriæ
Herapoli. Crudum semen tri-
tum & feruefactum ex aqua,
in potu auxiliatur orthopnoi-
cis, cōuulsis, ruptis, coxendici-
bus, vrinæ angustis, mensibus
suppressis, aut remorantibus.

In vino

Περὶ Ἀψινθίου παντο-

νίου. Κεφ. κη.

Ἐστὶ δὲ καὶ τείτον ἔϊδος Ἀψιν-
θίου, ἡνωμένον ἐν τῇ κατὰ τὰ
ἄλπεις γαλατία· πλείστον ὁ ὀπι-
χωρείως παντύνιον καλούσιν ἑπώ-
νυμω τῇ ἡνωσῇ αὐτὸ σαρδο-
νίδι χάρις. ἔοικὸς Ἀψινθίῳ, οὐ-
μὲν οὐτῶ γε ἔχοντες, ὑπόπι-
κρον δὲ, καὶ διυάμενον τὰ ἀν-
τὰ τῷ σπειρίῳ.

Περὶ Ἀβροτόνου. Κεφ. κθ.

Ἀβρότονον, ἔστι δὲ αὐτὸ τὸ μὲν
ἔϊλον δάμος δεινδρείδης, ὑπό-
λευκος φύλλοις λεπτορδέσιν ὡς
τῶν σεσιφίς, πάλ τὰ κλωνία πλήρες
αὐθις, * ἐπ' ἄκρῃ ἔχον κορυμβώ-
δες χρυσοειδῆς θρέας ἡνωμένον τῷ
ἑνώδες μὲν ποσὺ βάθος, πικρὸν
τῇ γύσει, δοκεῖ δὲ τὸ σκελετω-
πὸν εἶναι τὸτο. τὸ δὲ ἕτερον ἄρρη-
καλεῖται, κληματῶδες λεπτόκαρ-
πον ὡς Ἀψινθίου. πλείστον δὲ ἐν
καππαδοκίᾳ ἡνωτὶ καὶ γαλατία
τῇ καὶ πλεὺς Ἀσίαν, καὶ ἐν ἑρεσσόλῃ
τῇ καὶ πλεὺς Σουρίαν. Τούτων ὁ καρ-
πὸς ἀποζεννύμενος καὶ ὁμοβίβης
μὲν ὕδατος πινόμενος, βοηθεῖ ὀρ-
δοποιῶν, ῥήγμασι, σπασμασιν, ἰ-
σχάσι, δυσουρίαις, ἐμμελῶν ἐπι-
χάσει. καὶ θυλασίμων φαρμάκων
ὄσιν ἀντίδοτος. ποδὲν συν-
γνώσχησιμά τε ῥιζομύτων μετ'
ἐλαίου ὄσι. διώκει δὲ καὶ ἔρπετα
σιβαδενόμενον καὶ θυμώμενον.

καὶ πρὸς

καὶ πινόμενον· εἰ σὺ οἶνω ὀθε-
 λεί τὸς δηχθέντας, ἰδίως δὲ ἀρ-
 μόζει ἐπὶ φελαγίων καὶ σκορ-
 πίων· βροῦνται δὲ καὶ ὀφθαλμοὶ
 φλεγμοναῖς σὺν ἐφθῶ κυδωνίῳ
 ἢ μετὰ ἄρτου χαταπλασθέν. Δια-
 φορεῖ καὶ φύματα μετὰ ὀ-
 μῆς λύσεως λεῖον ἐπι-
 δέν. μίγνυται δὲ καὶ
 εἰς τὴν τῆ ἰείνη
 ἰλίκου σκευα-
 σίαν.

Περὶ Τασάπου. Κεφ. λ'.

Τασάπος πόα γνῶνιμος, διωτὴ,
 ἢ μὲρ γὰρ τίς ὅστιν ὀρενῆ, ἢ δὲ κυ-
 πτυτή. ἀείνη δὲ ὅστις ἢ ἐν κιλικίᾳ
 γλυωνομένη. Δύναμιν δὲ ἔχει λε-
 15 πυντικὴν, θρυμωτικὴν ἀφελήναι
 σα ὅ μὲν σύκων, καὶ ὕδατος, μύϊός
 τε καὶ πηγάνης καὶ πινομένης ἀργὴ πε-
 ριπνευμονικοῖς, ἀσθματικοῖς, βηχέ-
 λησι, κατὰ ῥῶν, ὀρθοπνοίᾳ κλεινῇ
 ὅ καὶ ὕμνηθας. σὺν μύϊτι ὅ ἐκλει-
 20 γνόμεν τὸ αὐτὸ ποιεῖ. ἀργὴ ὅ καὶ πᾶ-
 ρος καὶ κοιλίας τὸ ἀφελήμα αὐτὸ
 σὺν ὀξύμύϊτι πινόμενον· βιβρώσ-
 κε ὅ καὶ μὲν χαλῶν σύκων λεί-
 ων πρὸς ὑπερῶν καὶ κίβας, σφοδρό-
 τερον δὲ καὶ παίρει μύϊτος αὐτῶν
 25 καρδιακάμους, ἢ ἱρίδος ἢ ἐξοίμους πε-
 ριποιεῖ ὅ καὶ ὀρχοίαν. καὶ ἀπλάσ-
 σε ὅ καὶ μὲν σύκων καὶ γίγξος πρὸς σπλῆ-
 να καὶ ὕδρωπα, σὺν οἶνω δὲ πρὸς
 φλεγμονάς. Διαφορεῖ ὅ καὶ ὑπόπια
 σὺν ὕδατι ζεσῶ χαταπλασθεῖσα.
 σκευα-

In vino potū exitialiū veneno-
 rū antidotū est: horroribus ex
 oleo illini: serpētes & substra-
 tu & nidore fugat: cōtra ictus
 eorū cū vino potū prodest, pri-
 uatim efficax cōtra scorpionū
 & phalágiorū venena: oculorū
 inflātionib⁹ cōmodē illini,
 cum cotoneo cocto, aut pane:
 tritū cū farina hordeacea, de-
 coctūq; tubercula discutit: iri-
 ni cōpositionibus admiscetur.

Hysopum. Cap. XXX.

Hysopum, herba nulli non
 cognita, duūm generū est, mō-
 tanum & hortense. Optimum
 est Cilicium. Vim habet exte-
 nuādi & calfaciendi· decoctū
 cum ficis, aqua, melle, & ruta,
 potūmque, peripneumoniciis,
 diurne tussi, spiriosis, destilla-
 tionibus, & orthopnoicis auxi-
 liatur: tineas enecat. Idē facit, si
 cū melle delingatur. Crassum
 humorem per aluum extrahit,
 decoctū ex aceto mulso epo-
 tū: & ad subducendam aluum
 cū ficis viridibus detritis man-
 ditur, vehemētiusq; addita iri,
 cardamomo, aut irione, deii-
 cit: colorē in corpore fouet: lie-
 ni, & aque inter cutem, cū fico
 nitroq; inflātionibus quoq;
 ex vino illinitur: cū feruēte a-
 qua impositū, fugillata discutit:
 e iiii cum

cum decocto ficorum, optimè anginis gargarizatur. Decoctum cum aceto, dentiū do-
lorem in collutione sedat: in-
flationes auricularum vaporis
fuffitu discutit.

Stoechas. Cap. XXXI.

Stoechas, iuxta Galliā in in-
fulis eiusdem nominis è regio-
ne Massiliæ gignitur, vnde co-
gnomentū accepit. Herba te-
nuibus furculis, coma thymi,
lōgiore folio subamara gustu,
& aliquantum acris. Cuius de-
coctum, hyssopi modo, ad pe-
ctoris vitia efficax est. Antido-
tis miscetur. Viscera omnia &
vniuersum animantis habitum
extenuat, ab obstructionibus
& farctu liberat.

Origanum. Cap. XXXII.

Origanum Heracleoticum,
quod & cuniculā vocant, foliū
habet hyssopo non dissimile:
ymbellam autem non in rotæ
speciē orbiculatam, sed veluti
multifidā, semine in summis vir-
gis haudquaquā denso. Excalfa-
cit: vnde decoctum cum vino
potū, demorsis à serpente con-
uenit. Si cicutā aut meconion
hauserunt, ex passo: si gypsum
aut ephemerum, ex aceto mul-
so propinatur. Ruptis, cōuulsis,
hydropicis, cū fico esui datur.

Aridū

συνάγχαις δὲ ἀναγκαζάματα με-
σίων ἀφέψηματος αἰσιν. ὁδον-
των τὲ πόνον παρὰ τὴν σιν ὅξει ἐ-
ψηθεῖσαι καὶ διακλυζομένη κύνει ὅ-
καὶ τὰς παρὰ τὰ ὦτα ἐμπνευματώ-
σαις ὑπατμιθεῖσαι.

Περὶ Σπινθίδος. Κεφ. λβ.

Σπινθίς, γινώσκειται μὲν ἐν ταῖς
καὶ γαλαττίαν νήσοις ἀντικρὺ μασ-
σαλίας, καλυμμένη δὲ σιχάσιν,
ὁδον καὶ τὴν ἐπωγουμένην ἐρηκ-
πία λεπτόχερτος ὅστις, ὁμοίαν ἐ-
χρυσά κόμην δύμη, μακροφυ-
λοτέρα μὲν τοι γὰρ καὶ δριμύεια ἐν
τῇ γένει, καὶ ὑπόπικρος ποσῶς.
ποιεῖ δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς κα-
θὼς ὁ ὕσσωπος παρὰ τὰ ἐν δώρα-
κι. μύρνεται δὲ καὶ ἀντιδοτοῖς ἰσ-
χρησίμως.*

Περὶ Ορείχαλκου.

Κεφ. λγ.

Ορείχαλκος ἡρακλεωπικὴ, οἱ δὲ
κοινῶν καλοῦσι, φύλλον ἐχει ἐμ-
φερές ὑσώπω. σιτιάδιον δὲ οὐ
προχειρὲς, ἀλλ' ὥσπερ διηρημέ-
νον, καὶ ἐπ' ἀκρῶν τῶν ῥάβδων τὸ
σπέρμα οὐ πυκνόν. Ἐστὶ δὲ δερ-
ματικὴ. ὁδον τὸ ἀφέψημα αὐ-
τῆς σιν οἶνω ποθέν, ἀρμόζει δι-
ειροδῆκτοισ. σὺν γλυκεῖ δὲ τοῖς κώ-
νειον ἢ μηκώγειον πεπωκόσι. σιν
ὁξύμελιτι δὲ τοῖς πεπωκόσι γύ-
ψον ἢ ἐφήμερον. παρὰ τὰ σπασ-
ματα, καὶ ῥήγματα καὶ ὑδρω-
πας μετὰ σίκου βιβρωστικομένη.
ἐν ἑσπ.

ξερὰ δὲ ποδῆϊσα ὀξύεάφου πλῆ-
 ρος, σὺν μελικράτῳ μέλανα καὶ
 κοιλίαν ἄγει· ἐμμιμνά τε κηεῖ
 καὶ βήχας διεραπύει σὺν μίλιτι
 ἐκλειχρὸν κηησιμὸν δὲ καὶ ψά-
 ρος καὶ ἰκτεριν τὸ ἀφέψημα αὐ-
 τῆς ἐν λουτρῷ ὠφελεῖ· ὁ δὲ χυλὸς
 αὐτῆς χλωρεῖς οὖσης, καὶ παεί-
 ρμα καὶ κοινίδας καὶ ἀφιδας διε-
 ραπύει, καὶ διὰ ῥινοῦ ἄγει σὺν ἐ-
 λαίῳ ἰεῖν ἐγχεύματα πρὸς ὄφθους·
 10 σὺν γάλακτι δὲ καὶ ὠταλγίας πα-
 ρηγορεῖ· ἐμετικόν τε φάρμακον
 σκευάζει δι' αὐτῆς καὶ κρομμύ-
 ρων, καὶ ῥοοῦ τ' ἐπὶ τὰ ὄψα, πάντων
 ἐν χαλκῷ κηωρίῳ, ἐν τοῖς ὑπο-
 κωια καὶ μαστὶν ἡκιστα δύντων, ἐπὶ
 15 ἡμέρας μί· ὑποσπωννυμένων δὲ ἡ
 πύα, ἐρπετὰ διώκει.

Πρὶ Ονήτιδος. Κεφ. λγ'.

Ἡ δ' ὀνήτις καλεμένη, λευκοτέ-
 ρα τοῖς φύλλοις ὅτι, καὶ μάλλον
 εὐοικῆα ὑπόπυρρον, καὶ τὸ σπέρμα ὡς
 20 ὡρ κορύμβους αἰωρεῖς ἐπιμή-
 νους ἔχει· διὸ αὐτὴ τοι τὰ αὐτὰ
 τῇ ἡρακλεωπικῇ, οὐχ οὕτω μὲν
 τοι δραστικὴ κατέστηκεν.

Πρὶ Ἀγριοειράνης. Κεφ. λδ'.

Ἡ δὲ ἀγριοειράνης ὡς πά-
 25 γνακες ἡ ἐρακλειον, οἱ δὲ κορύλλω
 καλοῦσιν, ὧν ὅτι καὶ Νικανδρὸς ὁ
 κολοφώνιος, ἔχει τὰ μὲν φύλλα
 ὁμοία δειγαίῳ, ῥαβδία δὲ σπι-
 θαμιαῖα λεπτά, ἐφ' ὧν σιμάδια
 ὁμοία ἀνήθω, αὐτὴ δὲ λευκά,
 ρίζα

Aridum acetabuli mensura po-
 tum in aqua mulsā, atros hu-
 mores per aluum extrahit: mē-
 ses ciet, & tussi cum melle lin-
 ctum medetur: ad pruriginem,
 psoras, regiumque morbum, de-
 cocti ius in balneis pdest. Suc-
 cus virentis tonsillas, vuam, &
 oris vlcera sanat, & per nares,
 ex oleo irino infusum, trahit:
 auriū dolores cum lacte mul-
 cet, Cōficitur ex eo, & cepis &
 rhois frutice quo ad obsonia
 vtuntur: vomitorium medica-
 mētum, his omnibus in cupreo
 vase per dies bis videnos inso-
 latis, dum caniculæ sydus fla-
 grat. Herba autē substratu ser-
 pentes fugantur.

Ouitis. Cap. XXXIII.

QVÆ ouitis appellatur,
 candidiore est folio, & hyssopo
 similiar. Semen veluti con-
 iunctos corymbos habet. Vis
 ei origani Heraclei, sed multo
 inefficacior.

Origanum sylvestre.

Cap. XXXIII.

Sylvestre origanum, aliqui
 panaces Heraclion, alij cuni-
 lam vocant, ex quibus est Ni-
 cander Colophonius. Foliis est
 origani, ramis tenuibus, dodrā-
 tem altis, in quibus umbellæ
 anethi infunt, flores candidi:
 radix

radix tenuis, superuacua. Peculiariter percussis à serpente, folia & flores ex vino poti auxiliāt.

Tragoriganum.

Cap. XXXV.

Tragoriganū tenuis frutex, est, syluestri serpillio aut origano similis, folio & ramulis. Qui busdam in locis latius virentiusque inuenitur, & latioribus foliis, satis glutinosum. Alterū exilibus furculis, ac tenuibus foliis, qđ aliqui prasiū vocauerunt. Optimū est Cilicium, & Cretense, & Smyrneum, & in Chio Choos; pueniens. Omnia excalfaciūt, vrinā cient, aluo accommodantur, decocto potio bilem deiiciūt, lienosis ex aceto bibere prodest, cōtra pota ixi venena in vino bibuntur, mentes trahunt: peripneumonicis, tussietibus, ex melle in eclegmate dantur. Grata ac mitis eorū potio est: quare cibum fastidientibus & stomacho acidurctati, imbecilloque traditur. Item si à maritima iactatione nausea, & æstus præcordiorū excitetur: tumores verò cum polenta illita discutiant.

Pulegium. Cap. XXXVI.

Pulegiū herba vulgaris notitiæ. Extenuat, calfacit, decoquit: menstrua, secundas ac partus eūcit:

ρίζα λεπτή ἢ ἀρχητος. ἰδίως ὃ βοτάνῃ περιόδηκτοῖς τὰ φύλλα καὶ τὰ ἀνθή συνὸ οἶνω πινόμενα.

Περὶ Τραγοριγάνου.

Κεφ. λβ.

Τραγορίγιανος θαμνίσκος ἐστίν, δειγνύων ἢ ἐρπύλλω ἀγρίῳ ὁμοῖος, τὰ φύλλα καὶ τὰ κλωνία ἢ μὲν τις εὐείσκειται κατὰ τοποῖς ἐνερπές τε, καὶ πλατύφυλλος, κολλώδης ἰκανῶς. ἢ δὲ τις λεπτοκαρπός καὶ λεπτοφύλλος, ὡς τοῦ καὶ περὶ αὐτοῦ ἐννοεῖται καλοῦσιν. ἀρίστη δὲ ἢ κελίκιος, καὶ ἢ ἐν κῶ καὶ χίῳ καὶ σμύρνῃ καὶ κρήτῃ. θερμαντικὰ δὲ πάντα καὶ οὐρητικὰ καὶ ἐνκοιλία, πνομένου τὸ ἀφελεῖν ματος. ὑποβιάζουσι γὰρ τὰ χολώδη, εὐδιστοὶ καὶ σπληνικοὶ πινόμενα μετ' ὅξους, καὶ τοῖς ἰξίαν πεπωκόσι μετ' οἶνω, καὶ ἐμύλω δὲ ἀροισι βιβέει τε καὶ πεπνευμονίαις, συνὸ μέλιτι ἐν ἐκλήκτῳ δίδωται. ὅθεν δὲ καὶ τὸ πύημα ὀπτεῖται. ὅθεν τοῖς ἀσπλάγξι καὶ κακοσμάχοις καὶ ὀξύρεγμοισι δίδωται καὶ ἐφ' ὧν ἀλισμὸς καὶ ναυτία καὶ δέρεμα ὑποχονδρίων παρακολουθεῖ. Διαφορεῖ δὲ καὶ οἰδήματα καταπλαθεῖν σὰ μετὰ ἀλφίτων.

Περὶ Γλήχωνος. Κεφ. λγ.

Γλήχων πῶς γινώσκω, λεπτοφυὴ καὶ θερμαντικὴ, πεπτικὴ. ποθεῖται ὃ ἐμύλω καὶ δινύρεα καὶ ἐμβρυα ἀγεί-

ἄγει ἀνάγει δὲ καὶ τὰ ἐκ πνεύμο-
 vos μετὰ ἀλόης καὶ μέλιτος πο-
 δεῖσα, καὶ σπασμένοις βοηθεῖ· ναυ-
 τίας τὲ καὶ θηγμὸς σωμαχοῦ με-
 τὰ ὀξύκρατε ποδεῖσα παρμυ-
 5 δεῖται· ἄγει δὲ καὶ κατὰ κοιλίαν μέ-
 λαν· α. βοηθεῖ δὲ καὶ θηροδύκτοις
 πηρομένη μετ' οἴνου· λ. ποδουμουῶ
 τας τ' ἀνακτᾷται σὺν ὀξείῃ τ' ῥι-
 σὶ περσπερμένῃ· κρατῶν δὲ καὶ
 ἔλαξηρα λεία κακαυμένη, ὅπ-
 10 πλαδεῖσα τὸ περσπὸν πασαν φλε-
 γμονίαν σὺν ἀλφίτῳ, κατὰ ἐαυ-
 τῷ δὲ ποδαγχοῖς ἀρμόζει, ἄ-
 ρχι φοινίξεως τῆς ἐμφανείας· σὺν
 κηρωτῇ δὲ ἰόνδοις σθένισιν, ὠ-
 φελεῖ δὲ καὶ σπασμικούς μετ' ἁ-
 15 λος κατὰ πλάσσομένην. τὸ δὲ ἀφέ-
 λημα αὐτῆς κησιμὸν καὶ ὀξύμυρον
 παῖν, καὶ εἰς ἐγκάθισμα, καὶ περὶ
 ἐμπνευματώσεως καὶ σκληρίας καὶ
 ὑποστροφῆς ὑστέρας ἀρμόζει· κα-
 λουσι δὲ πῦες αὐτῷ βλήχωνα,
 20 ἐπεὶ δὴ τὰ γευσάμενα κατὰ τὴν
 ἀρῆσιν τῶν παιρνίων, βληχῆς ὑ-
 ποπίμπλυνται.

Πρὶ Δικτάμνου. Κεφ. λζ.

Δικτάμνος ἢ καλοῦσι π-
 νες γλήχωνα ἄγρια· π. α. ὅτι
 25 κρητικὴ, δριμύεια, λεία, ὁμοία γλή-
 χωνι, μείζω δὲ καὶ γρασθαλώ-
 δι τὰ φύλλα ἔχει, καὶ ἐριώδη
 τινὰ ἐπίφισιν· οὕτε δὲ αἶδος
 οὕτε καρπὸν φέρει· ποιεῖ δὲ παῖ-
 τα ὅσα καὶ ἡ ἡμερὴς γλήχων,
 ἐρρύτερον

eiicit: pulmonis vitia ex mel-
 le & aloë potum extrahit, &
 conuulsis auxiliatur: nauseas
 stomachique intercisiones, ex
 posca permulcet: atram bi-
 lem per alium exigit. Bibitur
 in vino vtilissimè contra ser-
 pentium morsus. Defectos a-
 nimo recreat, cum aceto nari-
 bus obiectum: gingiuas arefa-
 cti cinere corroborat, illitum
 cum polenta inflammationes
 omneis sedat, podagris per se
 subuenit, impositum vsq; dum
 rubescat locus: cum cærato va-
 ros extinguit, lienosis cum fa-
 le vtiliter illinitur: decoctum
 eius ablutas pruriges miti-
 gat, conuersas vuluas corri-
 git, contra inflationes duri-
 riasque vuluæ, in defensione
 couenienter adiicitur. Vocāt
 aliqui blechona, quoniam
 dum floret gustatum à
 pecoribus, bala-
 tum cōcit.

Dictamnú. Cap. XXXVII.

Dictamnnum aliquibus sylue
 stre pulegiū vocatur. Cretensis
 herba est, acris, levis, pulegio
 similis, sed maiorib; foliis, quæ
 tomento quodam spissâque la-
 nugine pubescunt. Floré nullū
 aut semen profert. Præstat o-
 mnia quæ satium pulegium,
 sed

sed efficacius multò: nam non
potum modò, sed appositum
quoque aut suffitum, defun-
ctos partus eiicit. Produnt in
Creta capras sagittis percuf-
fas, huius herbæ pastu, eas ex-
cutere. Purgandi vim habet
succus illitus, aut cum polenta
tritum. Herba impactos pedi-
bus reliquòve corpori acule-
os, illitu refigit. Ad lienis do-
lorem efficax habetur; siqui-
dem ipsum imminuit. Metunt
æstate & autumno. Radix eius
gustu calfacit, partus accele-
rat. Succus cum vino potus,
còtra serpentium morsus præ-
sidio est. Tanta herbæ facul-
tas est, vt olfacta abigat be-
stias, quæ venenato ictu sæui-
ant, appensaque contactu exa-
nimet. Vulneribus ferro illa-
tis, & venenatis morfibus, in-
fusus succus præsentaneo est

remedio, si etiam ab in-
stillatione statim in
potu assumatur.

Pseudodictamnium.

Cap. XXXVIII.

Quod pseudodictamnium
vocant, multis in terris nasci-
tur, antè dicto simile, sed mi-
nus quàm illud acre. Eisdem
effectus præbet, sed ineffica-
cius multò.

Dictamnium

ἐνεργέστερον δὲ πικρὸν ὁ μόνον
γὰρ πινόμενον ἀλλὰ καὶ περιθε-
μένη καὶ ὑποδυμνωμένη, τὰ τετρα-
κότα ἐμβρυα ἐκπνέει. φασὶ δὲ
καὶ τὰς αἰγας ἐν κρήτῃ τοξευθεῖ-
σαι καὶ νεκροθεῖσαι τὴν πᾶν ἐκ-
βάλλειν τὰ τοξεύματα. ἔχει δὲ καὶ
καταρπικὴν δύναμιν ὁ χυλὸς αὐ-
τῆς, καταχειρίσματος ἢ τριβόμενος
μετ' ἀλφίτων, καταπλασσομένη
δὲ ἢ βοτάνῃ τὸν ὑπογάστρῳ τῷ πο-
δῶν ἢ τῷ λοιπῷ σώματι δερε-
πεύει σιόλοπας. ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς
πύον σπληνός, μετὰ γὰρ αὐτῶν.
καρπίζουσι δὲ αὐτῷ ἐν δέρεϊ καὶ
φθινοπώρῳ. ἢ δὲ ρίζα αὐτῆς νεο-
μῶρους δερμαίνει, ἐστὶ δὲ καὶ ὀξύ-
τακτον. βοηθεῖ δὲ καὶ θηριοδύ-
κτοις ὁ χυλὸς αὐτῆς μετ' οἴνου πι-
νόμενος. τοιαύτη δὲ τῆς βοτάνης
ἢ δυνάμεις, ὥς καὶ ὀσφρανομένη
διώκει, καὶ περισπινόμενον ἀναί-
ρειν τὰ ἰοβόλα θηρία. τὸ δὲ αὐ-
τῆς χυλίσμα ἐπιχειρόμενον πληγῇ
σιδήρου ἢ ἰοβόλου δάγματος, καὶ
πρὸς τῷ ἐπιχυθῆναι καὶ λαμβὰ
νόμον πείσσει, ἐνδέως ὑπάρξει.

Πρὶ Ψευδοδικτάμνου.

Κεφ. λθ.

Τὸ δὲ Ψευδοδικτάμνον κα-
λούμενον, φύεται ἐν πολλοῖς τό-
ποις, ἐμφερές δὲ τῷ πρὸ αὐτοῦ,
ἐλαττον δὲ δριμύ. ποιεῖ δὲ τὰ
αὐτὰ τῷ δικτάμνῳ οὐχ ὁμοίως
ἐνεργεῖν.

Πρὶ

Πρὶ τῆ ἀπὸ κρήτης δι-
κτάμνου. Κεφ. λδ.

Dictamnium creticum.

Cap. XXXIX.

Defertur á Creta alterum di-
ctamni genus, foliis sisymbrij,
ramis maiorib⁹: in qbus flores
sylvestris origani, nigri, molles:
odor foliorú inter sisymbrium
& saluiam iucundissimus. Effi-
cax ad eadem, sed minus nares
ferit. Miscet emplastris & me-
dicaminibus quæ aduersus ser-
pentium iniurias configuntur,
theriaca vocant.

Saluia. Cap. XL.

Saluia siue elelisphacon, fru-
tex est ramosus, longus, virgas
habens quadrangulas, & ca-
uas: folia mali cotonei effigie,
sed longiora, asperiora, cras-
siora, & quæ sensim attritarum
quasi vestium scabritiem refe-
rant, hirsuta, subalbida, per-
quàm iucundo odore, sed gra-
ui: semen summis in caulibus
sylvestri hormino simile ge-
rit. In asperis nascitur. Men-
ses cit & vrinas, decoctum folio-
rum ramorumque potus, & partus
extrahit, & pastinacæ
marinæ ictibus auxiliatur. Ca-
pillis denigrat, vulnere san-
guinem cohibet, tetra vlcera
purgat: testium pruritus sedat
rami foliáque, si decocto eo-
rum foueantur.

Métha.

Φέρεται δὲ καὶ ἀπὸ κρήτης ἑ-
τερον εἶδος δικτάμνου, φύλλοις
ἑοικὸς σίσυμβρείου, κλωστὶ δὲ μετ-
5 ζον· ἐφ' ὧν αἰθὺς θειραίνω ἀγρίω
ἑοικὸς, μέλαν, μαλακὸν· ὅσμη δὲ
τῶ φύλλων μετὰ τὸ σίσυμβρείου, καὶ
ἐλελίσφακος, ἡ δὲ σπ. ποιεῖ δὲ περὶ
ὅσα καὶ ἡ περὶ αὐτῆς, ἥσων παληκτι-
κὴ ὑπερχειρὸς. μίγνυται δὲ καὶ
10 ἐμψαλσροῖς καὶ θειραίνεσσι.

Πρὶ Ελελίσφακος. Κεφ. μ.

Ελελίσφακον, οἱ δὲ ἐλαφρόσπον-
οἱ δὲ σφαγνόν, δάμνος ὅστις ἐπιμή-
κης, πολὺ κλονος, ῥαβδὸς τετραγ-
νης καὶ ὑπερλήνης ἔχων, φύλλα
15 δὲ μήλα κυδωνία ἑοικὸς, ἐπιμή-
κестρα μὲν τοῖς καὶ βαχύτερα. * καὶ
πυχύτερα λεληθότως ὥσπερ τὰ
ἀνάβηπτα τῶ ἱμαλίων δασέα, ὑπὸ
λευκῇ, σφοδρῶς ἐυώδη, βρωμώ-
20 δη· καρπὸν δὲ ἐπ' ἀκρῶν τῶν καυ-
λῶν ὥσπερ ὀρμίνε ἀγρίῳ ἔχει. φύε-
ται δὲ ἐν βαχέπ χωρίοις. Διωά-
μιν δὲ ἔχει τὸ ἀφ' ἡμῶν τῶ φύλ-
λων καὶ τῶ κλάδων ἔρα ἀγνὴ πινό-
μῳ, καὶ ἐμμηνα καὶ ἐμβρυα καὶ α
35 παῖν, καὶ βυζόνος παληκτὸς ἀρήν.
μελαίνῃ δὲ καὶ βίχας, καὶ βαυματι-
κὴ, καὶ ἰσχυαίμος, καὶ ἀποκαθαρίσκῃ τῇ
θυριοδῶν ἐστὶν ἐλκῶν. παύει δὲ σὺν
οἴνῳ τὸ ἀφ' ἡμῶν τῶ φύλλων καὶ τῶ
κλάδων αὐτῶν περὶ τοὺς ἰσχυαίμους,
ποῦς περὶ τὰ αἰδοῖα κνησμοῖς.

Πρὶ

Mentha. Cap. XLI.

Mentha, cognita herba est. Calfaciendi, adstringendi, atque exiccandi vim habet. Sistit sanguinem, poto ex aceto succo: tineas in ventre teretes enecat, venerem stimulat, singultus, vomitiones, colerasque sedant terni ramuli cum acidi granati succo poti. Suppurationes discutit, si cū polenta illinatur. Imposita fronti, capitis dolores mulcet: mamas si tendantur, aut lacte turgeant, cōpescit: cum sale canum morfib⁹ illinitur: aurium dolorib⁹ cum aqua mulsa subuenit: vuluæ ante coitum admota, conceptioni resistit: linguæ scabritiæ confrieta læuigat: coire lac, densariq; in caseū nō patitur, si folia potionib⁹ lactis immergātur. In summa, stomacho utilis est, & in condimentis peculiarem gratiam habet.

Menthastrum.

Cap. XLII.

Syluestris métha, Latini méthastrū vocāt, hirsutior est folio, & prorsus maiore, q̄ sisymbrii, odore magis virofo. quare minus ad sanorū vsus expetit.

Calamintha. Cap. XLIII.

EX calaminthæ generibus quædam montibus familiaris, folia

Πρὶ Ἡδύοσμου ἡμέτε. Κεφ. μα. Ἡδύοσμος, οἱ δὲ, μίνθω, γινώσκον βοτάνιον. διώκων ἔχον διεμαντικῶ, συπτικῶ, ξηραντικῶ ὅθεν αἵμα ἴσῃσι πινόμενος ὁ χυλὸς αὐτῆ μετ' ὅξους, καὶ ἐλμίνδας κατείνει σπυγγίλας, ἀφροδίσια τε ἐρεθίζει, καὶ λυγμούς, καὶ ἐμέτους, καὶ χολέραν παύει δὴ ἢ τεῖα κλωναρία συν ῥοδῶς ὁξείας χυλῶ πίνοντα. Διαφορεῖ δὲ καὶ ἀποστήματα μετὰ δὴφίτου κατὰ πλάγιν. 10 καὶ κεφαλalgίας παρηγορεῖ ὀπιτεδὲν τῷ μετώπῳ· μαστῶν τε πείτασιν καὶ ἀσπέρῳσιν παρῶν· σὺ δὴ σὶ δὲ τοῖς κυμοδῆκτοις κατὰ πλάσμα ὠλalgίας ὃ ὁ χυλὸς σὺ μελικράτῳ ἀρήγει· γίνωσκει δὲ πρὸ τῆ πλυσιάζειν πρὸς δέμημον. ἀσυνληψίαν ἐργάζεται· γλῶσσαν τε τραχείαν παρῶν· ὁ μὲν κλαίνει· καὶ γάλα ἀπύρωτον φυλάσσει ἐν ἀποκλυδέντων αὐτῷ τῷ φύλων. καὶ καδὸλκ ἐστὶν 20 ἐν σόμα· χον καὶ ἀρτυματῶδες.

Πρὶ Ἡδύοσμου ἀγρίου.

Κεφ. μβ.

*Τὸ δὲ ἄγιον ἡδύοσμον γίνεταί δισύτερον τοῖς φύλοις, καὶ πάντῃ μείζον σισυμβρίαι, ἐν ὅσῳ δὲ βρωμωδέστερον, καὶ ἥπιον εἰς τὸ ἐν ἐγεία χεῖρον εὐθετον. 15

Πρὶ Καλαμίνθης. Κεφ. μγ.

Καλαμίνθη, ἡ μὲν τις ὀρεινότερα ἐστὶν, ἐχέει δὲ φύλλα ὁμοία ὠκίμῳ· 20 ἐστέλεως.

ὑπόλευκα, κλώνια δὲ καὶ ἄρρηκτα
 γεγωνισμένα, ἄνθος πορφυρεῶν.
 Ἡ δὲ τις γλήχωνι ἔοικε, μείζων
 δὲ ἔσται τινος ἀρείαν αὐτῷ γλή-
 χωνα ἐμάλεσαν, διότι τῇ ὁσμῇ
 παρόικε, ταύτῃ ῥωμαῖοι νεπέ-
 ταν καλοῦσιν. Ἡ δὲ τεῖτι ἔοικεν
 ἡδυόσμῳ ἀγρίῳ. ἐπιμνησέσθαι
 τοῖς φύλλοις, καυλῷ καὶ κλάδῳ
 μείζων τῷ πεφρημένῳ, καὶ ἡπίων
 ἐν ῥήγῃ. Πασῶν δὲ τὰ φύλλα λευ-
 κὰ, πυρωπικὰ ἰχυρῶς καὶ δρι-
 μέα· ῥίζα ἄχρηστος. Φύεται δὲ ἐν
 πεδίοις καὶ ἐν τρυφέσι τύποις καὶ
 καλύχροις. Πανομήνη δὲ καὶ κα-
 ταπλασιμένη, ἀγρίῃ ἐρπετο-
 δήκτοις. ἄγει δὲ καὶ οὖρα τὸ ἀ-
 φέλημα πανομήνου· βοῶν δὲ καὶ
 ῥήγματος, σπασμασιν, ὀρθοπνοί-
 ας, σφόδρας, χολέρας, καὶ ῥήγας
 καὶ πρὸς τὰ θανάσιμα περὶ
 νομήν ποιεῖ συν οἶνον, καὶ ἵκτε-
 ρον ἀποκαθαίρει· ἐλμιάς τε
 κτείνει καὶ ἀσκαρίδας συν ἁλ-
 σὶ καὶ μέλιτι πανομήν· ὠφελὲς τε
 καὶ ὠμὴν τετειμμένην. ὠφελὲς καὶ
 ἐλεφαντιῶντας βροδείσας, ἐπιπ-
 νομήνου ὄρρου γάλακτος. Φθεί-
 ρει δὲ καὶ ἔμβρυα, καὶ ἐμυλῶ-
 ῖται τὰ φύλλα λεῖα ἐν περὶ
 τῷ. Συμμετρῶντα δὲ ἐρπετὰ διώ-
 κει καὶ ὑποσποννύμενα· λευκαίνει
 τὰς μελάνας οὐκας ἐλμιάς
 ἐν οἶνῳ καὶ καταπλαθεῖσα, κα-
 θαίρει καὶ ὑπόπια ἰσχυρὰ καὶ
 ἐπιπύει

folia ocimi habés, incana, sur-
 culos, & caules angulosos, pur-
 pureum florem. Altera pule-
 gio similis est, sed maior: quam
 sylvestre pulegium ideo appel-
 larút, quòd odore ipsum æmu-
 letur: nepetam Latini vocitát.
 Tertia méthastro cognata est,
 foliis oblongioribus, caule &
 ramis maioribus, quàm supe-
 riora, sed viribus inefficacior.
 Omnium folia gustu impense
 feruentia, & acria: radix super-
 uacua. Nascitur in campestri-
 bus, asperis, & aquosis. Potu aut
 illito demorsis à serpente opi-
 tulatur. Decoctum potu men-
 ses, & vrinas expellit: ruptis, cò-
 uulsis, orthopnoeæ, torminibus,
 choleris, horroribusque auxi-
 liatur: regium morbum expur-
 gat: præsumpta in vino vene-
 nis resistit: tineas cæteraque
 interaneorú animalia, cum sa-
 le & melle pota, enecat: nec
 fecus cocta crudave, si teratur.
 Elephanticos esitata adiuuat, si
 postea serú lactis ebibatur. Fo-
 lia detrita si in vellere subiiciá-
 tur, menses extrahunt, & partus
 enecát. Accensa aut substrata,
 serpentes fugant: nigris cicat-
 ricibus candorem reddunt: in
 vino cocta, & illita, & sugillata
 tollunt. Calamintha ischiadicis
 imponitur,

imponitur, vt ex alto humores euocet, summam cutem exurens. Vermes necat, succus auribus instillatus.

Thymum. Cap. XLIII.

Thymum ab omnibus cognoscitur, furculosus frutex, exilibus foliis multis & angustis circumdatus: capitulis in cacumine, flore purpurascente refertis. Gracili solo, & petroso puenit. Vim habet hac, vt cum sale, & aceto potum, pituitam per aluum detrahat. Decocti ius prodest orthopnoicis, & anhelatoribus: tinea ventris exigit: menses, parvus, & secundas pellit: vrinas ciet: cum melle in eclegmate, faciles facit excreationes: recentes tumores discutit, cum aceto illitum: concretum sanguinem dissoluit: verrucas thymi colorem reddentes, pensilesque tollit, ischiadicis cum vino, & polenta impositum subuenit: hebetibus oculis in cibo prodest. Perquam utile pro condimento, duntaxat ad vsus eorum, qui recte valent.

Satureia. Cap. XLV.

SATUREIA triuialis notitiæ est: gignitur in asperis locis, & tenui solo, thymo similis, minor tamen, & tenerior: defert

ἐπιπδέται εἰς μετασύγχριστον, ἐπιχρίουσαι τὴν ἐπιφάνειαν. καὶ σκόληκας τοῦ ἐν ὧσιν κτείνει ὁ χυλὸς ἐσαζόμενος.

Πρὶ Θύμης. Κεφ. μδ.

Θύμος γινώσκεται ὑπὸ πάντων δαμνίσκων φρυγανιδῆς, φυλαερίοις πολλοῖς καὶ γενοῖς περιλημμένον ἔχον ἐπ' ἄκρου κεφαλὰ αὐτοῖς πορφυρίζοντα. μάλιστα ὅ φέρεται ἐν πετρῶδεσι καὶ λεπτογείοις τόποις. Διῶμαιν δ' ἐχει πινόμενον μετὰ αἰλῶν καὶ ὄξους, ἀγὼν φλεγμάτων κατὰ κοιλίαν. τὸ δ' ἀφ' ἡμᾶς αὐτῆς μελέτος ὀρθοπνοϊκοῖς καὶ ἀσθματικοῖς βοηθεῖ. ἔλμυνδας τε ἐξάγει καὶ ἐμύλωσιν, καὶ ἐμβρυά, καὶ δυνάμεις. ἐστὶ δὲ καὶ οὐρητικόν. μὴ δὲ μέλιτι καὶ ἐκλειχθὲν, ἐνανάγων τὰ ἐν θώρακος ποιεῖ. διαφορεῖ δὲ οἰδήματα πρὸς φάτα καὶ ταπλαδὲν μετ' ὄξους αἵματος δρόμους διαλύει, καὶ δύμους καὶ ἀκροχορδῶνας αἰετὶ καὶ ἰχθυατικοῖς μετ' οἴνου καὶ ἀλφίτων ἐπιτεθέν ἀερώζῃ ἀμβλυωπουῶντας ἐπιτόμιον συντροφῇ ὠφελεῖ. εὐχρηστον δὲ καὶ πρὸς τὴν ἐν ὕγεια χρῆσιν ἀντὶ ἀπύματος.

Πρὶ Θύμβρας. Κεφ. με.

Θύμβρα, καὶ αὐτὴ γινώσκεται ἡγνωμένη ἐν λεπτογείοις, καὶ τραχέσι τόποις, ὁμοία δύμῳ, ἐλάσσων μὲν τοι καὶ ἀπαλωτέρα, φέρεται

ἐόντα ἐὰν χυμὸν αἰθρῶν μετὸν, ἐγ-
χλωρεν. διὰ αὐτὰ δὲ τὰ αὐτὰ τῷ
δύμα ὁμοίως λαμβανόμεν. καὶ
πρὸς τὴν ἐν ὑγείᾳ χρῆσιν ἐνδε-
τεῖ, γίνεσθαι δὲ καὶ ἀσπερτὴν δύμβρα,
καὶ πάντα τὰ ἀγρίας ἐλάσσων, ἐν
χρηστέρεσσι δὲ πρὸς βρώσιν διὰ
τὸ μὴ ἐπιτεταῖσθαι τὴν δριμύτητα.

Πρὶ Ερπύλλου. Κεφ. μς'.

- Ερπυλλος ὁ μὲν τίς ἐστὶ κη-
πευτὸς, σαμψυχίζων τῇ ὀσμῇ. καὶ
10 τεφανωματικὸς, ὠνόμασται δὲ ἀ-
πὸ τοῦ ἔρπειν τὴν καὶ ὅ, πᾶν αὐτῷ
μέρος. διὴν τῆς γῆς ῥιζοβολεῖν.
ἔχει δὲ φύλλα καὶ κλωνία δειγ-
νῶ ἐμφερῇ, πλεονεχότερα. ἀ-
πὸ δὲ αἰμασίων καὶ διέμυρος, ἐν-
15 ἀξέστερος γίνεται. Ὁ δὲ τίς ἐστὶν
ἀγρίας, ὅς καὶ ζυγίς καλεῖται. ἐχ-
ἔρπων, ἀλλ' ὁρδὸς κλωνία αἰεὶς
ἀετὶ ἀφρηανώδη, φύλλων πε-
πλεα ὁμοίων πηγύνῃ, ὑπόστενα
-δὲ ἐστὶ καὶ ἐπιμυκότερα, καὶ σκλη-
20 ρότερα. αὐτῇ γενομένη δριμύτης,
ὁσπὴν ἡδεῖα. ῥίζα ἀχρηστος. φύεσθαι
ἐν πέτραις ἐνεργέστερος καὶ δερ-
μαντικώτερος τοῦ κηπευτοῦ ὑ-
πάρχον, καὶ πρὸς τὴν ἰατρει-
κὴν χρῆσιν ἐπιτηδειότερος. ἔμ-
25 μύνα γὰρ ἀγρί καὶ οὐρα, κατεῖ π-
νόμβρος ὠφελεῖ σφόδρα, ῥήγμα-
τα, σπασίματα, ἡπάτος φλεγμο-
νὰς καὶ πρὸς ἐρπετὰ πινόμβρος τὴν
καὶ καταπλασφόμβρος. κεφαλῆς
τὴν ὀδυνῶν παρρημυδεῖ. ἐμφεῖς
ροδίνης

defert spicam florum plenam,
coloris herbacei. Eadē potest
quæ thymum, si modo cōsimili
sumptitetur. Aptus sanis vsus.
Est etiamnum quædam satiuæ,
syluestri prorsus minor, q̄ pro-
pter mitiorem acrimoniā, cō-
modius in cibos recepta est.

Serpillum. Cap. XLVI.

Serpillum duorum generum
est: Hortense odore sampsu-
chum imitatur, atque in coro-
nas addi solet, cui à serpendo
nomē inditum est: quoniam si
qua eius particula terram at-
tingat, inibi radices demittet.
Folia & ramulos origani ha-
bet, sed candidiores: in mace-
riis multò procerius affurgit.
Syluestre, zygis appellatū, non
serpit, sed in altitudinem incre-
scit, ramulos ædēs. tenues, sur-
culosos, foliis refertos longiori-
bus quàm rutæ, & durioribus,
angustis: flores iucundè olent,
gustāti acres: radicis nullus vsus.
Nascit in petris, satiuo effi-
caciùs, atque magis excalfaci-
ens, & ad medēdi vsum apti⁹.
Mēses trahit, vrinam potu ciet
torminibus, ruptis, vulsis, & io-
cineris inflāmatōnibus, auxi-
liatur, & aduersus serpētes po-
tu illitūve: capitis dolores mul-
cet coctum, abiecto rosaceo,

DIOSCORIDIS

& madefactū in aceto: maxime vero phreniticis, & lethargicis conuenit. Cruentos vomitus sedat succus, drachmis quatuor ex aceto potus.

Sampsuchū. Cap. XLVII.

Sampsuchum in Cypro, & Cyziceno laudatissimum: secundum sibi locum vendicauit Ægyptium. Amaracū gens Sicula, & Cyzicena appellat. Herba est ramosa, per terram repens, foliis eius calaminthe, quæ tenui folio constat, hirsutis, & rotundis, suauissimū odorem spirat, ideo coronis inferitur. Vis eius excalfaciens. Succus decocti potus, cōuenit incipientibus hydropicis, & iis quos vrinæ difficultas, aut tormenta excruciant. Illita ex melle arida folia, sugillata tollunt: menses subditi in pefso trahūt: contra scorpionis ictum ex aceto, & sale illinuntur: luxatis tumoribusque, cerato excepta imponuntur: aduersus oculorum inflammationes, tumoresque cum polline polentæ illini prodest. Acopis malignatisque, calfaciendi gratia, commiscetur.

Melilotos, siue fertula Căpana. Cap. XLVIII.

Sertula Căpana laudatissima in

ρόδινε μεγύτος αὐτῶ, σὺν ὄξει καὶ καταβραχεῖς μάλιστα δὲ ἐπὶ λιθασίας καὶ φρενίτιδος ἀρμόζει. παύει δὲ καὶ ἔμετον αἵματος < δὲ πολλὸς μὲν ὄξος ποθεῖς ὁ χυλὸς αὐτῆς

* Πρὶ Σαμψύχου. Κεφ. μζ'. 5

Σάμψυχον κράτιστον τὸ κυζικιών καὶ κύπριον· δευτέρου δὲ τέτε τὸ αἰγύπτιον. καλεῖται δὲ ὑπὸ κυζικίων καὶ τῶν ἐν σικελίᾳ ἀμαράκων. πῶς δὲ ὅτι πολύκλωνος, ἔρπουσα ἐπὶ τῇ γῆς. φύλλα δασέα καὶ περὶ ἑξήχουσα, ὁμοία τῆς λεπτοφύλλου χαλαμίνθης, σφόδρα ἐνὸς καὶ δερμασπικῆ, πλεκομένη καὶ εἰς στεφάνους. Ἀρμόζει δὲ τὸ ἀφέψημα αὐτῆς πινόμενον ἐπὶ ἀρχομένων ὀδόντων καὶ δυσουρεσιῶν καὶ σφοδρῶν, ἔξω δὲ τὰ φύλλα ἐπιπλαθέντα μετὰ μέλιτος, αἶρει ὑπόπια· καὶ ἐμμύα ἀγει ἐν περὶ δέτω· πρὸς δὲ σκορπίου πληγὴν μετὰ αἰλῶν καὶ ὄξους καταπλάσsetαι· πρὸς δὲ σφύγματα μὲν κηρωτῆς ἀναληφθέντα ἐπιτίθεται· καὶ πρὸς οἰδήματα ὁμοίως ἀναληφθέντα κηρωτῇ καὶ πρὸς ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καταπλάσsetαι μὲν παιπάλης δόφιτι. μίσγνεται δὲ καὶ ἀκόποις καὶ μαλάγμασι πρὸς τὸ δερμαίνειν. 20 25

Πρὶ Μελιλότου. Κεφ. μκ.

ΜΕΛΙΛΩΤΟΣ κράτιστος, ὁ ἀπὸ τοῦ

ὁ ἀπικὸς καὶ ὁ ἐν κυζίκῳ, καὶ ὁ ἐν
 χαλκηδόνι ἡγωνώμενος· κροκίζων
 καὶ ἐνώδης. φύεται δὲ καὶ ἐν καμ-
 παρία περὶ γόλαν, κηκίζων. καὶ
 ἀπονος καὶ τὴν ἐνώδιαν. Δυσώ-
 5 μιν δὲ ἔχει συπικνῶ, μαλακτι-
 κὴν, πάσης φλεγμονῆς, μάστιγα ὅ-
 τῃς περὶ ὀφθαλμούς καὶ μύτην
 καὶ δακτύλιον καὶ διδύμοις μετὰ
 γλυκέας ἐψηθεὶς καὶ καταπλά-
 σθείς· ἐνίοτε δὲ καὶ ὡς λέκιδου ὁ-
 10 πῆς παραμυγείσης, ἢ τηλίου δῆ-
 ούρου, ἢ λινοπέρεμου, ἢ γύρεως ἢ
 κωδίων, ἢ σέρεως. Σεραπείναι καὶ
 μελικρίδας περισπάτες καὶ ἐ-
 αὐτὴν ἐν ὕδατι, καὶ ἀχόρεας συν-
 γῇ χυλῇ καὶ οἶνῳ ἢ κηκίδι κατα-
 15 χρίσμενος. ἀλχημὰ τε σωμαχοῦ
 μετ' οἶνον ἐφ' ὅδους καὶ ὥμους συνπι-
 νει τῶν περὶ ἐξηγμένων καὶ ὡταλγί-
 ας παύει συν γλυκεῖ ὥμους χυ-
 λιδέας καὶ ἐν σαλίνῳ καὶ κεφα-
 λαλγίαν περὶ ὅθεν ἐμβρεχόμενος
 20 μετ' ὄξους καὶ ῥοδίον.

Περὶ Μάρου. Κεφ. μδ'.
 Μάρον, ἢ ὑσόβριον, πῶς γινώσκουσιν,
 φρυγανώδης, ὁμοία τῷ ἀνθερί ὀρι-
 γάνῳ, τὰ μὲν ἴσθι φύλλα τέττε λευ-
 κότερα πολλῶ καὶ τὸ ἀνθος ἐνω-
 25 δέστερον. ἔχει ὅ δυνάμειν ὁμοίαν
 σισυμβρίῳ. ὑποξύφον καὶ θρμαίνον
 ἡρέμα· ὅθεν νομάς τε ἰσθὶ καὶ α-
 πλοστέμενον, καὶ εἰς τὰ θρματῶ
 σὺν χρισμάτων (μάγνη). ἡγωνῶ καὶ
 καὶ καὶ μαγνησίαν καὶ βάλανος πλεῖ-
 στον.

Περὶ

in Attica, & Cyzico, & Chal-
 cedone nata: cuius color vici-
 nus est croco, boni odoris. Na-
 scitur & in Cápania circa No-
 lám, colore in luteum langu-
 scente, odore infirmo. Vim ha-
 bet adstrictoriam, inflámatio-
 tionem omné emollit, præfer-
 tim: quæ in oculis, vulua, sede
 aut testibus erumpat, si ex pas-
 so cocta illinatur: interdú auté
 addito oui luteo affato, aut foe-
 nigræci farina, lini semine, aut
 polline, aut capitulis papaue-
 ris, intybóve. Recètes melice-
 ridas per se cū aqua, & vlcera
 manantia in capite, illita cum
 creta Chia, vino aut galla sa-
 nat. Stomachi dolores, & cru-
 da, & cocta cū aliquo ex anté-
 dictis leuat: dolorib' auriū mi-
 tigādis cruda ex passio instillat:
 in aceto aut rosaceo madefa-
 cta, capitis dolorem lenit.

Marum. Cap. XLIX.

Marum herba cognita vul-
 gò, furculosa, flore origani, fo-
 liis multò candidioribus, flore
 odoratiore. Vim habet, fisy-
 mbrio cōsimilē. Substringit eni,
 & modicè calfacit: qua de cau-
 sa illitu serpētia vlcera sistit, &
 in calidas illitiones additur. Iu-
 xta magnesiā, & Tralleis co-
 piofissima gignitur.

v ij

Acinos.

DIOSCORIDIS

Acinos. Cap. L.

Acinos aut aconos à Græcis dicitur, tenui siccoq; ramulo herba, ocimo similis, odorata, sed hirsutior: qua coronæ factitāt, à nonnullis olitoribus colitur. Menses & aliuū pota sistit. Illitapanos ignemq; sacrum sanat.

Baccharis. Cap. LI.

Baccharis herba fructicosa, q in coronas additur: cuius folia aspera sunt, media violæ & verbasci magnitudine: caulis angulosus, cubiti altitudinem petēs, aliquantulū asper, nō sine appedicibus adnatis: flore purpureo, subalicante, odorato: radicib⁹ veratro nigro similibus, quib⁹ odor inest cinnamomoproximus. Asperū squalidūq; foliū amat. Radix ī aqua decocturuptis, vulsis, ex alto p̄cipitatis, spiradi difficultati, salutaris. Itē diurnæ tussi, & urinæ difficulti: mēses pellit: cōtra serpentium morsus utilissimē dat in vino. Recēs radix apposita, partū extrahit: puerperis eius decoctū in defelsionib⁹ pdest: in diaphanata vtiliter inseritur, iucundi odoris gratia. Folia, vtpōte quæ adstringāt, capitis dolorib⁹ illitu profunt: oculorum inflātionibus, mammis tumētibus à partu, agilopiis incipientibus, ignib⁹q;

Πρὶ Ακίνου. Κεφ. γ.

Ακινος, ἢ ἀκονος, πόα ἔστι λεπτόκαυρος, σεφανωματική, παρὰ πλεονήσια ὠκίμως, δασυτέρα δὲ καὶ εὐώδης. παρ' ἐπίοις δ' ἐκ κηπεύεται. ἴσησι δὲ κοιλίαν καὶ ἐμπελωσπνομένη φύγεθλὰ τε καὶ ἐρυσσιπέλατα καὶ ταπλωσπνομένη ἰάται.

Πρὶ Βακχαρείως. Κεφ. νά.

Βακχαρεὶς βοτάνη ἔστι εὐώδης καὶ σεφανωματική· ἥς τὰ φύλλα τραχέα, μέγιστος ἔχοντα μετὰ ζῦν καὶ φλόμου· καυκὸς ὅ γε νιόδῃ, πύχως τὸ ὕψος, ὑπότραχος ἔχων παραφύδα· αὐτῇ δὲ ἐμπόρφυρα, ὑπόλευκα, εὐώδῃ· ῥίζαι δὲ ὅμοιαι ταῖς τοῦ μέλανος ἐλλεβορέου, εὐοικῶσαι τῇ ὁσμῇ· κινὰ τῆ μώμῃ. φιλεῖ δὲ τραχέα χωρία καὶ ἐνικμα. Ταύτης ἡ ῥίζα ἐψηθεῖσα ἐν ὕδατι, βοηθεῖ ἀσπασμασι, ῥιγμῶσι, πτώμασι, δυσπνοιῖαι, βήχεϊ, χροῖα, δυσουείᾳ· ἄγει δὲ καὶ ἐμπελωσπνομένη καὶ διουροδύκτοις χροῖαις σὺν οἶνῳ δίδοται. πρὸς δεύσεισα δὲ μετὰ τὰ ἀπαλῶν ῥιζῶν, ἔλκει ἐμβρυα ταῖς τελεχοῖς εἰς ἐγκάδισμα τὸ ἀφελήμα αὐτῆς ἀρμόζει· καὶ εἰς διασπασματα χρησιμεύει, ἰκανῶς ἔχουσα πλὴν εὐωδίας. τὰ δὲ φύλλα συπληρόντα κατὰ πλωσπνομένη ὠφελεῖ κεφαλαγίας, ὀφθαλμῶν φλέβων, καὶ αἰγίλων ἀρχαίων, καὶ μαστῶν ἐκ τόνων φλεγμαίνοντων.

καὶ ἐρμωπέλατα . ἔστι δὲ καὶ ὑ-
περπυλὸς ἡ ἐσμὴ.

Πρὶ Πηγαία. Κεφ. ιϛ'

Πήγανον ὄρεον καὶ ἄγριον,
τὸ καὶ ἡμέρου κηπευτὸ δειμύτε-
ρον καὶ ἄδετον πρὸς βρώσιν τὸ
δὲ κηπευτὸ ἐδωδιμώτερον τὸ
παρὰ ταῖς συκαῖς φυόμυρον. Αμ-
φότερα δὲ κηυσικά, θερμανπι-
κά, ἐλκωπικά, οὐρηπικά, ἐμμή-
νων ἀγῶγά, ἐδιόμυρα τε, καὶ πι-
νόμυρα, κοιλίαν ἰσῶσι. καὶ τῶν
φθαρπικῶν φαρμάκων ἔστιν ἀν-
τίδοτος, ὅσον ὀξύδαφου τὸ πώε-
ματος ποθέντος ἐν οἴνῳ. καὶ πρὸς
βρωθέντα δὲ τὰ φύλλα κατ' ἐ-
αυτὰ, καὶ μετὰ χαρῶν βασιλι-
κῶν καὶ σύκων ξηρῶν, ἀπορακτα
καθίστησι τὰ δαμάσιμα. καὶ πρὸς
ἐρπετὰ ἀρμύζει ὁμοίως λαμβά-
νόμυρα γονίῳ τε στέννισιν ἐδιό-
μυρον, καὶ πινόμυρον. ἐψηθὲν δὲ
συν' ἀνήθῳ ξηρῷ καὶ ποθέν, σπύ-
ροις παύει. πικρὸν δὲ καὶ πρὸς
πλευρῶν πόνον καὶ θώρακος, δύσ-
πνοιαν, βήχας, πνευμονίαν, δι-
γήματα ἰσχῶν, ἄρθρων, ῥίγη πύ-
ειοδιχὰ πινόμυρον ὡς πρὸς εἶρη.
καὶ πρὸς ἐμπευματώσεις δὲ κώ-
λου καὶ ὑστέρας καὶ ἀπώδυσιμέ-
νου συν' ἐλαίῳ ἐψηθὲν καὶ ἐπιδέν.
πίνχας τὸ ὑστερικὸς λείον μετὰ
μέλιτος κατὰ τὸ αἰδοῖς ἄχει δα-
κτυλίου ἐπιπιδέν. παραιτεῖται.
ἀναζωδέν ᾧ συν' ἐλαίῳ καὶ ποθέν,
ἐλμυσίας

ignibúsque sacris auxiliantur.
Odor somnum gignit.

Ruta. Cap. LII.

Ruta montana sylvestrisque
fatiua, & hortensi acrior est, &
in cibis damnata: fatiua verò
quæ sub ficu arbore enascitur,
magis in cibos admittitur. V-
traqueurit, calfacit, exulcerat:
urinam ciet, mēstrua pellit, al-
uum sistit potu cibove: lætaliū
medicamentorum antidotum
est, si semen ex vino, acerabuli
mensura, ebibatur. Folia per
se præsumpta, aut cū nuce iu-
glande, aridisque ficis, ineffica-
ces venenorum vires reddunt:
contra serpentes simili modo
sumere conuenit: genituram
cibo potuve extinguit: cum a-
netho sicco decocta, tormina
sedat. Facit ad pectoris late-
rūmque dolores, difficulta-
tem spirandi, tusses, pulmonis
inflammationem, coxendicum
articulorūque cruciatus, &
horrores febrium circuitu re-
petentes, pota vt antè dictum
est. Itē ad inflationes coli, vul-
uæ, rectique intestini, cū oleo
decocta, & infusa. Foeminas
vulvæ strangulatu liberat, si à
genitali, sedētenus cum melle
subiiciat. Feruefacta ex oleo,
& pota, ventris tineas excutit:

v iij articu-

DIOSCORIDIS

articulariis doloribus ex melle, aquæ inter cutem cum ficis illinitur. Eisdem in potu auxiliatur, decocta in vino ad dimidias parteis, & oblita. Cruda conditâque cibo, visus aciem excitat: dolores oculorum illita cum polenta lenit, doloribus capitis cum rosaceo, & aceto illita auxiliatur: profluentem naribus sanguinem sistit trita & indita: testium inflammationibus cum laureis foliis imposita, & eruptionibus pabularû cum myrto, & cerato prodest. Cum pipere autem vino, & nitro affricata, albæ vitiligini medetur. Cum eisdem illita for- micationes tollit, & verrucas quæ thymi florem repræsentant: contra impetigines cum alumine, & melle vtilissimè imponitur. Succus in mali punici calyce calfactus, aurium dolori efficaciter infunditur: hebetudinem oculi qui sensere, ruta cum foeniculi succo ac melle peruncti iuuantur: ignem sacrum, vlcera quæ ferpunt, aut in capite manant, cum aceto, rosaceo, & cerula perfanat: mansa, aliorum ceparûq; acrimoniâ domat. Mōtana si copiosius estur, interficit.

Dum

ἐλμυνδας ἐκτινάσκει· κατὰ πλάσσειται δὲ καὶ πρὸς ἀνδρῶν ἀγῆματα συνὺ μέλιτι· συνὺ δὲ σύκα πρὸς ὕδρωπας ὑποσαρκίους. καὶ πινόμενον δὲ βοηθεῖ τέτοις, καὶ κατεψιδέν ἐν οἴνῳ ἄχρις ἡμέρας καὶ σπεισμηρόμενον. ἔστι δὲ καὶ ὄξυνπὲς ἐπιόμενον αἰμὼν καὶ ταιριχυτόν· καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς σπεισμηρίας συνὺ ἀφίτω κατὰ πλάσσειται πρὸς ἀνδρῶν ῥοδίνῳ δὲ καὶ ὄξει κεφαλαλγούσι βοηθεῖ, καὶ αἱμορραγίας τὰς ἐν τῶν μυκτήρων· λείον ἐπιτεθέν ἴσῃσι, τὰς δὲ τῶν διδύμων φλεγμονὰς συνὺ δάφνης φύλλοις κατὰ πλάσσειται ὡφελεί, καὶ τὰ ἐξανθήματα συνὺ μυρσίῃ καὶ κυρῳτῇ. συνὺ οἴνῳ δὲ τὰ καὶ πεπύρει καὶ νήτρῳ σπεισμήμενον, λευκὸν ἀλφὸν ἰάται. καὶ κατὰ πλάσσειται δὲ μετὰ τῶν αὐτῶν, θυμούς καὶ μυρμηκίας αἰρεῖ. ὠφελεί καὶ λειχῶας συνὺ μέλιτι καὶ συπληεῖα ἐπιτεμέ-
νον. ὁ δὲ χυλὸς ποιεῖ πρὸς ὠταλγίας ἐν σιδήρῳ θερμαινόμενος καὶ ἐγχεόμενος· καὶ ἀμβλυωπίας βοηθεῖ μετὰ μαράθρου χυλοῦ καὶ μέλιτος ἐγχεόμενος ἐρεσιπέλατά τ' καὶ ἐρπητας καὶ ἀχάρας συνὺ ὄξει καὶ ψιμμυδίου καὶ ῥοδίνῳ κατὰ χιόμενος ἰάται· τὰς τε ἀπὸ σπορόδων καὶ κρομμύων δριμύτητας, παύει ἐπιμασσηθέν. τὸ δὲ ὀρεῖον πολὺ βρωθέν κτείνει.

ἴαται

ὑπὸ δὲ τῷ αἵματι εἰς τὰς ἀλ-
 μεύσεις συλλερόμενον, φοινίσκει,
 καὶ φυσᾷ τὸν χροῖα σὺν κνησμῷ
 καὶ φλεγμονῇ σφοδρᾷ. δεῖ δὲ τὸ πρῶ-
 ται ψαλμύρους τὸ πρῶτον καὶ
 5 τὰς χεῖρας, οὗτω συλλέγειν. φασὶ
 δὲ τὸν χυλὸν ἐπιρράδεντα* ὀρ-
 νήσιν, ἀφ' ὧν τὸς αἰλάρους.
 τὸ δὲ ἐν μακεδονίᾳ φυρόμενον
 παρὰ τὸν* Ὀλκμον ποταμὸν ἀ-
 ναιρεῖν φασὶ βρωθέν. ὀρενός δὲ ὁ
 10 τόπος ὑπάρχει καὶ ἐχθρῶν πλῆ-
 ρης. τὸ δὲ σπέρμα αὐτῷ πνόμενον,
 πρὸς τὰς ἐπὶ τοῖς ποταμοῖς καὶ ἀντιδω-
 τοῖς μέγιστον χρησιμὸς καὶ φερίστος
 δὲ τὸ σπέρμα αὐτῷ, ὅς τις πίνῃ ἐπὶ
 ἡμέρας ζ'. τῷ ἐννεοῦσι καὶ
 15 παύσεται. ἡ δὲ ῥίζα αὐτῷ λέγεται
 μῶλυ ὀρενόν. τὸ οὗτο ἄγριον πύ-
 ρον ὁμοῖοι τῷ ἡμέρῳ. πνόμενον
 δὲ ὠφελεῖ ἐπληπτικοῖς καὶ ἰσχυ-
 ροῖς. κινεῖ δὲ, καὶ καταμύει,
 τὰ δὲ ἐμβρυα φετέρι. δριμύτην
 20 δὲ ὅτι ἡμέρας, καὶ τῇ ἐνδρεία.
 δυνάτωτερον. καὶ δεῖ δὲ τὸ ἀγρίαν
 ἐδίειν, διότι ἐπιβλαβὴς ὅτι.

Πρὶ Πηγῆς ἀγρία. Κεφ. νγ'.

Καλὸς δὲ πνεύς πύρρον ἀγρί-
 ον, καὶ τὸ ἐν τῇ καππαδοκίᾳ. καὶ
 25 τὸ ἐν τῇ κατὰ τὴν Ἰσταν γαλατῖα
 λερόμενον μῶλυ. ἐστὶ δὲ δάμνος
 ἀπὸ μιᾶς ῥίζης πλείονας ῥάβδους
 ἀναφέρειν ἐχρὺ φύλλα μακρότε-
 ρα. πολλῷ τῷ ἄλλου πηγῆς καὶ
 τραφέντεσσι, βαρύνονται, αἵματος
 λευκόν,

Dum florem promit, & ad mu-
 rias colligitur, cutem inflat, &
 rubore quodam inficit, cū pru-
 ritu ac vehementi inflāmatio-
 ne. Oportet itaque eam vnctis
 antea manib⁹, & facie collige-
 re. Tradūt succum gallinaceis
 pullis insparsum feles arcere.
 Adiciūt eam quæ in Macedo-
 nia circa Haliacmon amnem
 prodeat, comedētes interime-
 re. Montosus autem his locus,
 viperis scatet. Semen eius po-
 tum contra intestina vitia effi-
 cax est: in antidota commo-
 dè additur: contra incontinen-
 tiam vrinæ tostum, semen se-
 ptenis diebus potui datur. Ra-
 dix huius montanum moly vo-
 catur. Syluestris ruta fatiux si-
 milis est. Prodest comitialib⁹,
 & coxendicum doloribus: μέ-
 strua mouet, partus enecat. A-
 crior est viribus, q̃ hortēsis, &
 validior. Syluestris, vtpote no-
 xia, cibis abdicatur.

Syluestris ruta. Cap. LIII.

Vocant etiamnum syluestre
 rutam, quod in Cappadocia,
 & Galatia Asiæ finitima mo-
 ly dicitur. Frutex est, qui ab
 vna radice multos emittit cau-
 liculos: foliis multò, quàm al-
 terius rutæ longioribus, tene-
 riorib⁹que, odore graui, flore
 v iij cādido

candido, capitulis in cacumine paulò maiorib⁹ q̄ satiuæ rutæ, quæ trib⁹ maximè partibus cōstat: in quibus triangulū semē, subrufum, gustu amarum recluditur, cuius est vsus. Semen autumno maturefcit, quod cum melle, vino, croco, & fœniculi succo, ac gallinaceo felle, teritur contra retusam oculorum aciem. Sūt qui eam harmalam vocēt, Syri besafan. Qui Capadociam incolūt, moly, quoniam quandam cum moly feruet similitudinē: radice nigra, flore candido. In collibus, & læto solo prouenit.

Moly. Cap. LIIII.
Moly folia habet graminis latiora, humi sparsa: florem albæ violæ similé, sed minoré, ac magnitudine violæ purpureæ respondentē lactei coloris: caulē candidum, quaternūm cubitorum, in cuius cacumine inest aliqd quod alij speciē referat. Radix parua bulbosa, quæ mirum in modū valet ad aperiēdas vuluas, si trita cū irino vincto, in pefso subiciatur.

Panaces. Cap. LV.
Panaces nōnullis heracleum dicūt: ex quo opopanax colligi solet. Plurimum in Boeotia, & in Phocide Arcadiæ nascitur: ibiq;

λευκόν, ἐπ' ἄκρῃ τῇ κεφάλῃ ὀλίγῳ μείζονα τῇ ἡμέρῃ πηγάιν, ἐκ τειῶν μάλιστα μερῶν συγκείμενα ἐν οἷς σπέρμα τείρωνον, ὑπό κίρρον, πικρὸν μάλιστα πρὸς τὴν γῆν, ἢ καὶ ἡ χεῖρσις. Φθινοπώρου δ' ἐκπεπαιγμένη τὸ σπέρμα ἀρμύζον πρὸς ἀμβλυωπίας, μετὰ μέλιτος λειανόμενον καὶ οἶνου καὶ χολῆς ἀλεκτοείδων, χρόκου τὲ καὶ μαράθρου χυλῶ. χαλοῦσι δὲ πνεύματα ἄρμαλα, σύροι βοκισσά, καὶ παδὸν καὶ δὲ μῶλυ ἐπεὶ καταποσὸν σώζει τὴν πρὸς τὸ μῶλυ ἐμφέριαν τῇ ρίζῃ μέλαν καὶ τῷ ἀνθεὶ λευκὸν ὑπάρχον. φύει δὲ ἐκ μελόφοις καὶ ἐν γείοις χειροῖς.

Πρὶ Μώλεως. Κεφ. νδ'. ις
Μῶλυ τὰ μὲν φύλλα ἔχει ἀγρώσει ὁμοία, πλατύτερά δὲ ἐπὶ γῆν ὄντα ἀνθῇ· λευκοῖσι ὁμοία, γαλακτόχροα, ἥσσονα δὲ πρὸς τὰ τῇ ἰου καυλὸν δὲ λευκόν, πῆχυν τεσσάρων, ἐπ' ἄκρου δὲ ἐπέκειν ὡς σκορδείδες. ἡ ρίζα δὲ μικρὰ βοκισσίδης, αὐτὴ σφόδρα ἀγασθὴ πρὸς ὑστέρας ἀνασωμώσεις τετειμμένη μετὰ ἱρινοῦ μέρου καὶ πρεσβυτέρῃ ἐκπεπαιγμένη. 25

Πρὶ Πανάκος. Κεφ. νε'.
ΠΑΝΑΚΕΣ * ἡ ἐσκληρόν, ἐξ οὗ ὁ ὀποπανάξ συλλέγεται. πλεῖστον θηνᾷται ἐν βοιωτῇ καὶ ἐν* Ἰωφιδι τῆς ἀρχαίας, ὅς

ὡς τε, καὶ ἐπίτηδες κηπεύει· διὰ
 τὸ ἐν τῷ ὅπου περὶ σπονδον. φύλλα δὲ
 ἔχει τραχέα, χαμαιπετῆ, χλω-
 ρὰ σφόδρα πρὸς τὰ τῆς συκῆς,
 ἐν τῷ περὶ φέρει ἐπεχρησμένα πεν-
 5 ταμερῶς· χαυλὸν δὲ ὡς περὶ νάρθη-
 κος ὑψιλότατον, ἔχοντα χυρὸν λευ-
 κὸν καὶ φύλλα πρὸς αὐτὸν* μικρό-
 τερα, σκιάδιον δὲ ἐπὶ ἄκρῳ ὡς ἀ-
 νήδου μακρόν· ἀνθός δὲ μύλινον,
 σπέρμα ἐν ὧδες καὶ πυρωτικὸν ῥί-
 10 ζας πλείονας ἐν μίᾳ ἀρχῇ, λευ-
 κὰς, βαρυόσμις, παχὺν ἐχούσας τὸ
 φλοιὸν, ὑπόπικρον τῇ γεύσει. φύε-
 ται δὲ ἐν κυρήνῃ τῆς λιβύης καὶ ἐν
 μακεδονίᾳ. Ὀπίζεται δὲ ἡ ῥίζα,
 ἐπιτεμνομένη ἀπὸ βλάστων ὄντων
 15 τῶν χαυλῶν. ἀνίστη δὲ λευκὸν ὀ-
 πόν, ὃς ξηρανθεὶς κατὰ πλὴν ἐπι-
 φάνειαν κροκίζει. δέχονται δὲ τὸ
 ῥέον εἰς φύλλα περὶ υποπιδέντες
 εἰς* κεκοιλωμένον ἑδαφος, ἀνα-
 ρύται δὲ ξηρανθέντα. ὀπίζου-
 20 σι δὲ καὶ τὸν χαυλὸν ἐπιτέμνον-
 τες εἰς τὸν πυρραμντὸν, ὁμοί-
 ῳς δεχόμενοι τὸ ἀπορρέον. εἰσὶ
 δὲ τῶν ῥιζῶν βελτίους αἱ τετα-
 ται, καὶ λευκαὶ, καὶ ξηραὶ, ἄβρω-
 τοί τε καὶ πνεώδεις ἐν τῇ γεύ-
 25 σει, καὶ ἀρωματίζουσαι. καρπὸς
 δὲ σφαιρικός ὁ ἐν μέσῳ, τὸ νάρθη-
 κος, ὁ γὰρ ἐν τῶν παραφυάδων ἐ-
 σὶν ἀπεσφώτερος. τὰ δὲ ὅπου δια-
 φέρει ὁ μικρότατος τῇ γεύσει, ἐν-
 δεδεν μὲν λευκός καὶ ὑπόκυρτος,
 ὁ ἑξῶθεν

ibiq; cōpendij, & quæstus, qui
 ex eo liquore factitatur, gratia
 studiose colitur. Foliis est aspe-
 ris, in terra iacētibus, herbacci
 coloris, multū ad ficulnea ac-
 cedētibus, in ambitu quinque-
 partitò diuifis: caule, vt ferulæ,
 altissimo, qui lanugine quadā
 incanescit, foliis etiā minutiori
 bus obsitus, muscariis, ceu ane-
 thi, in cacumine: flore luteo, &
 semine odorato feruentēq; ra-
 dices habet multas ab origine
 vna: cādidas, graueolētes, crassi
 corticis, & subamari gustus. Na-
 scitur in Cyrene Lybiæ, & Ma-
 cedonia. Excipitur succus inci-
 sa radice, recēti caulū pullula-
 tu. Ea cādidiū succū emittit, qui
 ficcatur, in summa cute croceū
 colorē contrahit, Effluentē au-
 tem succū excipiunt, foliis ex-
 cauato solo stratis, quæ ficcata
 tolluntur. Simili modo caule
 melsibus inciso, profluētē suc-
 cū eximūt. Meliores ex radi-
 bus, albæ, rigentes, distētæque:
 siccæ, quæ cariem non sentiāt,
 aromaticæ, feruētes gustu. Fru-
 ctus ex media ferula cibo ido-
 neus est: sed ex agnatis stoloni-
 bus, ab vfu cibario abhorret.
 Maximè in hoc succi genere
 probatur, quàm amarissimus,
 internè albus, aut subfuluus,
 foris

foris ad croci colorem incli-
nans, lævis, pinguis, friabilis,
tener, statim in aqua elique-
scens, graui odore. Niger im-
probatur, ac mollis. Adultera-
tur ammoniaco aut cera: sed
synceri experimentum est, si
digitis in aqua friatus resol-
uatur, & lactescat. Excalfacit,
mollit, extenuat: horroribus
februm circuitibusque, vul-
fis, ruptis, laterum dolori, tor-
minibus, stillicidio vrinæ con-
uenit. Contra vesicæ scabiem
ex aqua mulsa aut vino bibi-
tur: menses trahit, foetum ene-
cat, inflationes quæ vuluâ ma-
lè habent, duritiasque, ex mel-
le dilutus, discutit: ischiadicis
illinitur, acopis & capitis me-
dicaminibus admiscetur, car-
bunculos rumpit, podagri-
cis cum vua, passa illitus sub-
uenit: dolore dentium libe-
rat, cauis inditus: oculorum a-
ciem illitu excitat. Ex eo & pi-
ce optimū fit emplastrum con-
tra bestiarum morsus, quæ in
rabiem efferantur. Radix in ra-
menta conscissa, vuluæ admo-
ta, partus extrahit: ad vetera
vlcera efficax est, nudata ossa
corpore operit, si trita cum
melle illinatur. Semē cum ab-
sinthio sumptum, menses pellit,
cum

ὁ ἔξωθεν ὃ κοκκίζων, λεῖος, λιπα-
ρὸς, εὐδρυπτός, εὐδαίτος, ταχέως
ὃ διέμελνός, βαρύσομος. ὃ ὃ μῆλας
φαῦλος καὶ μελακός. δολοῦται γὰρ
ἀμμωνιακῷ, ἢ κηρῷ. δοκιμάζει
ὃ ὕδατι διατεταθὲς τοῖς δα-
κτύλοις, ὃ γὰρ ἄσβολος ἀνιέει καὶ γα-
λακτοῦται. Διώαμις ὃ αὐτὴ ὅστις
δερμαστικὴ, μαλακτικὴ, λεπυν-
τικὴ ὅθεν ἀρμόζει πρὸς αἰσίδες καὶ
ρίγνι, σπᾶσματα, ῥήγματα, πλε-
ρῶς δὲ ῥήματα, βήχας, σφόδρος, 10
σπαραγγείας. Ἰώρας τὰς ἐν κύσει
σὺν μελικράτῳ, ἢ οἶνω ποτιζόμε-
νος ἔμμελυνά τε ἄγει, καὶ ἔμβρυα
φθείρει, καὶ ἐμπνευματώσεις τὰς
ἐν ὑστέρα, καὶ σκληρίας διαφορεῖ σὺν
μέλιτι ἀνιέδεις ἔστι καὶ σύσχυσις 15
μα ἰσχυρότος, μίγνυται δὲ καὶ ἀκό-
ποις καὶ κεκολληταῖς δυνάμεσι, πε-
ριρρήτις δὲ καὶ ἀνδραγας, ἀρμόζει
καὶ ποδαγρικοῖς καὶ σαφίδος ἡμέ-
ρου καταπλασσομένης· παραγίγν-
ται δὲ καὶ τὰ τῶν ὀδόντων δὲ ῥή- 20
ματα, ἐντιδέμενος τοῖς βρώμα-
σιν ὁ φθαλμῶν τε ὅτι ὀξύδερες
εὐχεῖσιν. μυεῖς ὃ πῖος ἔμπλα-
στρός ἐστι πρὸς τὰς λυσσοδύνκας ἀβ-
ση καὶ ἢ ῥίζα ὃ ξυδαῖσα καὶ πορσε-
δαῖσα μήτρας, ἄγει ἔμβρυα· πλεῖς 25
τε ἔλκεα ποιεῖ παλαιά, καὶ τὰ ἐπι-
λωμένα τὰ ὀστέων σαρκῶς, λεία κα-
ταπλασσομένη καὶ σὺν μέλιτι ἐγ-
χειρομένη. ὃ δὲ καρπὸς αὐτῆς σὺν
ἀψινθίῳ ληφθεὶς ἄγει ἔμμελυνά
συν

συν ἀριστολογία δὲ πρὸς τὰ ἰο-
βάλα ἀρμόζει, καὶ πρὸς τὰς ὑ-
στερήσας πνίγας, συν οἴνω ποπι-
ζόμενος.

Περὶ Πανάκος ἀσκληπιῶ.

Κεφ. 15.

Πανάκες * ἀσκληπιῶ ἀνίη-
σιν ἀπὸ γῆς καυλὸν λεπτὸν, πη-
χυαῖον, γόνασι διειλημμένον, πε-
ρὶ ὃν τὰ φύλλα ὁμοία μαράθρω,
μείζονα δὲ, καὶ δασύτερα, * ἐν ὧ-
10 δι * καὶ ἐπ' ἄκρου σκιάδιον, ἐφ'
οὗ τὰ αὐτὰ χυσοειδῆ, δριμύα,
ἐν ὧ δι * ρίζα δὲ μικρά. Διῶα-
μιν δὲ ἔχει εὐδαιμον τὸ αὐτὸς καὶ
ὁ καρπὸς πρὸς ἔλκεα καὶ φύμα-
τα καὶ φαγέδαναν, λείος συν
15 μέλιτι ἐπιπιδέμενος * καὶ πρὸς
ἐρπετὰ πονόμενος συν οἴνω, καὶ
συναλειφόμενος συν ἐλαίῳ. κα-
λοῦσι δὲ τινες πανάκες καὶ τὴν
ἀγρίαν οὐρίαν, οἱ δὲ, κορί-
λλιν πρὸς ἧς εἴρηται ἐν τοῖς πε-
20 ρὶ δειγμάτων.

Περὶ Πανάκος χειρωνίου.

Κεφ. 16.

Πανάκες χειρωνίου φύεται μά-
λιστα ἐν τῷ πελλείῳ ὄρει· φύλλα
δὲ ἔχει ἀμαράκω ἐμφερῆ * αὐ-
25 δι χυσοειδῆ· ρίζαν λεπτήν, καὶ
οὐ βαθεῖαν, γενομένην δὲ δει-
μύαν. Διῶαμιν δὲ ἔχει ἢ ρίζα
πρὸς ἐρπετὰ πονόμεν. καὶ ἢ κό-
μην δὲ ἐπιπλαττομένην πρὸς τὰ
αὐτὰ ποιεῖ.

Περὶ Λι-

cum aristolochia, prodest ad-
uersus animalia quæ venenum
eiaculantur & contra vuluæ
strangulatus in vino bibitur.

Panaces Asclepij.

Cap. LVI.

Panaces Asclepij caulem à
solo emittit tenuem, cubita-
lem, geniculatum, circa quem
folia fœniculi funduntur, sed
maiora tamé hirsutioraque o-
dorata: in cacumine umbel-
la, vbi flores emicant aurei, o-
dorati & acris gustus: radix
parua est & tenuis. Auxiliarem
vim habent flores & semina,
contra vlcera, phagedanas, &
tubercula, si trita cum melle
imponantur: aduersus serpen-
tes ex vino bibuntur, & cum
oleo illinuntur. Aliqui panaces
syluestre origanum vocât, alij
cunilâ, de qua in origani men-
tione diximus.

Panaces chironium.

Cap. LVII.

Panaces Chironium in Pe-
lio monte maximè prouenit:
foliū eius amarâco simile: flos
aureus: radix parua, quæ non
altè demittitur, gustu acris.

Pota radix serpetiū ve-
neno resistit. Illi-
ta coma eadē
præstat.

Ligu-

Ligusticum. Cap. LVIII.

Ligusticum, quod alij panaceā, alij panaces vocant, plurimū in Liguria nascitur, in mōte Apennino, Alpibus contermino: vnde nomē traxit. Panaces incolæ nō ab re appellant: quoniā & radice & caule, heracleotico panaci simile sit, & viribus eisdem præditū. Gignitur in altissimis asperisq; mōtibus, ac vmbrosis, maximè verò iuxta fluentia. Cauliculū fert anethi, geniculatum, tenuem, & in circuitu folia fertulæ cāpanæ, molliora, odorata, prope verticē graciliora, & longè magis diuisa: in cacumine muscarium, in quo semen dependet nigrū, solidum & oblongū, foeniculo proximū, gustanti acre, & aroma olens: radix candida, heracleotici panacis similis, odorata. Radicis seminisque vis excalfactoria, cōcoquens: prodest ad intestinos dolores, tumores, concoctiones. Item ad inflationes, præsertim quibus stomachus turgeat: & cōtra serpentium ictus: vrinas & menses potu trahit. Eisdem præstat effectus appōsita radix. Semen cum radice oxyporis & medicamentis decoquentibus admiscetur: ori perquā vtile: quare

Περὶ Λιγυστικοῦ. Κεφ. νη.
Λιγυστικὸν φύεται μὲν πλείστον ἐν
λιγυρίᾳ· ὅθεν καὶ τὸ προσωνυμία
ἐλήκεν ἐν τῷ χαλκιδικῷ ἀπενίνῳ,
ὅρεσι δὲ ὅστιν ὁμοροῦν τῇ ἁλπίσι.
πάντακες δὲ αὐτὸ καλεῖσιν οἱ ἑπι-
χόριοι καὶ ἀλόγως· ἐπεὶ ἡ ῥίζα καὶ
ὁ χαλκὸς ἔοικε τῇ τῷ ἱρακλεωπι-
κοῦ πάντακος, καὶ ἡ διῶαμις ὁμοίᾳ
καθέστηκε. φύεται δὲ ἐν τοῖς ὑψηλο-
τάτοις καὶ βραχυτέροις καὶ συσκαί-
ορεσι, μάλιστα δὲ παρὰ τοῖς διώ-
ρυξι, χαλκίον δὲ φέρει λεπτόν, ὁμοίον
ἀνήθῳ, γέγοναί τι μόνον, ὡς δὲ φύ-
λα ἔοικότα τοῖς τῷ μελιώντι, τε-
φρώτερος δὲ καὶ ἐυώδης, ἰσχυρότερη
δὲ τὰ πρὸς ἀκρῶ τῷ χαλκῷ, καὶ
μᾶλλον ἐπιχρηστέα. ἐστὶ ἄκρη δὲ
σκιᾶδιον, ἐφ' ᾧ καὶ τὸ σπέρμα μέ-
λαν, νασόν, ὑπόμικτες πρὸς τὸ τῷ
μαράθῳ, γυταμῶν δὲ δριμύτη καὶ
ἀρώματιζον· ῥίζα λευκή, ὁμοίᾳ τῇ
τῷ ἱρακλεωπικῷ πάντακος ἐυώδης.
Διῶαμις δὲ τῷ σπέρματι καὶ τῇ ῥί-
ζῃ θέρματικὴ, πεπτικὴ ἀρμόζουσα
πρὸς τὰ ἐν τῷ δαγμάτῳ καὶ πέ-
ψει καὶ οἰδήματα, καὶ ἐμπνευμα-
τώσεις καὶ μάλιστα τὰς πρὸς σόμα-
χον, καὶ πρὸς θηρίων πλῆγας· ἀγνή
δὲ καὶ οὔρεα, καὶ ἐμμελὴ παγομύνη. 25
καὶ ἡ ῥίζα δὲ πρὸς διδιδυμῶν τὸ αὐ-
τὸ ποιεῖ. μέγνυται δὲ ἡ ῥίζα καὶ τὸ
σπέρμα χηνοσίμωσι καὶ τοῖς ὀξύπο-
ροις καὶ ταῖς πεπτικαῖς διῶαμε-
σιν· ἰκανῶς δὲ ἐυώμαχόν ὅστιν.
ὅθεν

ἴσθαι καὶ αὐτὸ πεπύρεως αὐτῷ χερῶν
 ται οἱ ἐπιχώριοι, μίσροντες τῆς
 περσοψήμασι. δολῆται δὲ σπέρ-
 ματί πνι παρσμοίῳ ὁ διακρι-
 νεῖς τῇ γούσει· πικρὸν γὰρ ἔστιν.
 5 ἔνιοι δὲ καὶ σπέρμα μαρσίδρου
 ἢ σεπέλεως συμμίσροντες, δολοῦσιν αὐτό.

Πεεὶ Σταφυλίν. Κεφ. νθ'.

Σταφυλίνος ἄγριος φύλλα ἔ-
 χει ὁμοία γηγίδι, πλατύτε-
 10 ρα δὲ καὶ ὑπόπικρα· καυλὸν δὲ
 ὀρθιον, τραχύ, σιμάδιον ἔχον-
 τα ἀνήθη παροπλήστον, ἐφ' οὗ
 ἀνήθη λευκὰ, ἐν μέτρῳ δὲ πορφυ-
 ρεῖδες τι μικρὰ, καὶ οἶονεὶ κρο-
 κίζον· ρίζα δὲ δακτύλου τὸ πά-
 15 χος· σπέρμα μαῖα, ἐυώδης, ἐδω-
 δίμη, ἐφθῆ. Τούτου ὁ καρπὸς πο-
 δεῖς ἢ περσεδεῖς, ἐμβλῶα κινεῖ.
 ἀρμόζει καὶ δυσουρεῦσι καὶ ὑ-
 δρωπικοῖς, καὶ πλευρεπικοῖς ἐν
 πόμασι, καὶ πρὸς θηρίων δὲ δού-
 20 ματα καὶ πέλγας· τὸς δὲ περ-
 λαβόντας φασὶ μὴ ἀδικεῖσθαι ὑ-
 πὸ θηρίων· σώζει δὲ καὶ συλλή-
 νει. ἢ δὲ ρίζα καὶ αὐτὴ οὐρητικὴ
 οὕτα σωσιόσιν τὴν παρσμοίαν καὶ
 25 ἔμβρυα ἐμβάλλει περσεδεμῶν.
 τὰ δὲ φύλλα κτεῖα μετὰ μέλιτος
 ἐπιπιθέμενα, τὰ φαγεδαινικὰ ἔλ-
 κη ἀνακαθαίρει. Ο δὲ κηπευτὸς
 σταφυλίνος ἐδωδεκάμυτος ὢν ἀρ-
 μόζει πρὸς τὰ αὐτὰ ἐυδέεστε-
 ρον ἐρῶν.

Πεεὶ Σεπέ-

quare pro pipere vtuntur eo
 indigenæ, ad obsonia. Adul-
 teratur semine quodam simi-
 li, quod faciliè gustu discerni-
 tur: amarum enim est. Alij se-
 men foeniculi aut feselis ad-
 miscentes, ligusticum dolo vi-
 tiant.

Pastinaca. Cap. LIX.

Pastinaca syluestris folia gin-
 gidij habet, latiora, subamara:
 caulem rectum, scabrum: um-
 bellam similem anethi, in qua
 flores insunt candidi, & in me-
 dio exiguum quiddam cernitur
 colore purpureo, ferè ad cro-
 ceum accedente: radix digiti cras-
 situdine, dodrantalis, odorata,
 quæ cocta mādatur. Semen po-
 tum vel impositum, mēstrua mo-
 uet. Is cōuenit in potione, quos
 vrinæ difficultas torquet, aut
 lateralis dolor excruciat, aut si
 aqua cutem subiit: serpentium
 moribus ictibusque prodest:
 præsumentes id nulla affici in-
 iuria à serpentibus traduntur:
 conceptus adiuvat. Radix vri-
 nam pellit, venerem stimulat,
 partus apposita eiicit. Folia tri-
 ta, & cum melle imposita, pha-
 gedænas vlcerum purgant. Sa-
 tiua ad eadem pollet, ineffica-
 cior tamen, & cibo aptior.

Seseli

DIOSCORIDIS

Seseli Mafsiliense.

Cap. LX.

Seseli Mafsiliense folia foeniculi habet, crassiora: caulem vegetiorem: umbellam anethi, in qua semen oblongum, angulosum, degustanti statim aere: radix longa est, iucundi odoris. Semen & radix excalfaciendi vim habet: potu stranguriæ & orthopnœæ medentur, suffocationibus mulierum comitialibusque profunt, menses & partus trahunt: ad omnia interna mala pollent, tussim veterē sanant. Semen cum vino potū, cōcoquit, & tormina discutit: epialis febribus utile, & cōtra perfriktiones in itincribus, cum pipere & vino bitur: capris, cæterisque pecudibus, datur in potu, quod facilius suos foetus enitantur.

Seseli Æthiopicum.

Cap. LXI.

Æthiopicum seseli, folia habet hederæ, minora, & ad periclimeni modū oblonga: frutext nigricat, palmitibus in bina cubita extensis, ramis sesquipedalibus, capitulo anethi: femine in tritici morem dēso, nigro, amaro, Mafsiliensi odoratiore, & acriore, multum suavi.

Seseli Pelo-

Πρὶ Σεσέλειως μαυσαλευ-
τικοῦ. Κεφ. ξ'.

Στέλει τὸ μαυσαλευτικόν, φύλλα ἔχει ἰοικότες μαράθρω, παχύτερα δὲ καὶ τὸν καυλὸν εὐρύτερον ἔχει· ἔχει δὲ σκιάδιον ἀνήδωδ-
μοιον, ἐφ' οὗ ὁ καρπὸς ἐπιμήκεις γεγωνιωμένος, δριμύως βιβρωσκό-
μῆμος ταχέως· ῥίζα μακρὰ ἐνώ-
δης. Δυνάμει δὲ ἔχει ὁ καρπὸς καὶ ἡ ῥίζα θερμαντικὴν, πινόμενα δὲ σπαραγγοῦσαν ἰάται, καὶ ὀρδό-
πνοιαν ὠφελεῖ· καὶ ὑστερικὰς πνί-
γας καὶ ἐπιληπτικοῖς, ἐμμηλιά τε ἄγει καὶ ἐμβρυα, καὶ πρὸς τὰ ἐν τῷ σώματι πάντα ποιεῖ, καὶ βήχας ἰάται πα-
λαιὰς, πινόμενός τε μὲν οἶνω ὁ καρ-
πὸς, πεπλικός ἐστὶ, καὶ σρόφων λυπ-
κός· ἡ πηλὸς τε χησίμος καὶ πρὸς
τοῦ ἐν ὁδοῖς κρυμμοῦ συνπιπεί-
ει καὶ οἶνω πίνεται. Δίδεται δὲ καὶ
αἰξὶ καὶ τοῖς λοιποῖς κτήνεσι πρὸς
ἐντόκισιν ποτόν.

Περὶ Σεσέλειως αἰδιοπι-
κοῦ. Κεφ. ξα'.

Τὸ δὲ αἰδιοπικόν λεγόμενον
στέλει, φύλλα μὲν ἔχει ὅμοια κισ-
σῶ, ἡ δ' αὖτοια δὲ καὶ ἐπιμήκει πρὸς
τὰ ἑπτακλυμένους, δάμνος δ' ἡ μέ-
λας ἐστὶ, κλήματα ὡς διπλήχη-
χων, ἐφ' ἧς κλάδοι διασπασμαῖσι,
κεφαλῆαι δὲ ὡς ἀνήδου. σπέρμα δ' ἡ
μέλαν πυκνὸν ὡς πυρρὸς, δριμύ-
τερον δὲ καὶ ἐνωδέτερον τῷ μαυ-
σαλευτικοῦ· ἡ δὲ ἰσχυρῶς.

Περὶ

Περὶ Σέσελεως πελοποννη-
σακού. Κεφ. ξβ΄.

Τὸ ὅ ἐν πελοποννήσῳ θυνώμε-
τον, φύλλα ἔχει κονεῖω παραπλή-
σια, πλατύτερα ὅ καὶ παχύτερα,
καυλὸν μείζονα τοῦ μαυσιλευπι-
κοῦ, ναρθηκοειδῆ, ἐπ' ἄκρῳ δὲ
τούτῃ σκιάδιον πλατύ. ἐν ὅ τού-
τῳ καρπὸς πλατύτερος καὶ ἐνώ-
δης * καὶ σαρκώδεστερος. διώαμιν
δὲ τινὲς αὐτῷ ἔχει. φύεται ἐν τό-
ποις τραχεῖσι καὶ ἐφ' ὄρεσι καὶ γεω-
λόφοις. φύεται δὲ καὶ ἐν ἰσθμῷ.*

Περὶ Τορδυλίου. Κεφ. ξγ΄.

Τορδυλίον, ἔνιοι δὲ σέσελι κρη-
τικὸν καλεῖσι. φύεται ἐν τῷ κατὰ κλι-
κίαν * ἀμαθῶ. ἐστὶ ὅ βοτάνιον φρυ-
γανῶδες, ἔχον σπερμάτιον περὶ φε-
ρῆς, διπλῆν, ὁμοίον ἀσπιδίσκοις ὑ-
πόσφιμυ, καὶ ἀρωματίζον πνόμε-
τον πρὸς δυσουρίαν, καὶ ἐμμηνίων
ἀγῶγῳ. ὅ ὅ καὶ χυλὸς τῷ καυλοῦ καὶ
τῷ σπέρματι ἐπὶ χλωροῦ ὄντος,
ὅσον τριώβολον ποδεῖς σὺν γλυ-
κεῖ ἐν ἡμέραις δέκα, νεφριτικὰς ὑ-
γιάζει. ἡ δὲ ῥίζα παρακκική. ἀνά-
γουσα καὶ τὰ ἐν δώρακος ἐκλει-
χονδύη μὲν μέλιτος.*

Περὶ Σίσωνος. Κεφ. ξδ΄.

Σίσων σπερμάτιον ἐστὶ ἐν συρίῳ,
θυνώμετον, παρεικὸς σκίνῳ, ἐπί-
μυκας, μέλαν, πυρωτικόν. πνόμε-
τον πρὸς σπληνῶα καὶ δυσουρίαν,
καὶ ἐμμηνίων ἐποχῇ. χεῖρονται
δὲ αὐτῷ οἱ ἐπιχώριοι ἀρτύματα
μὲν

Seseli Peloponnesse.

Cap. LXII.

Peloponnese folia habet ci-
cutæ, latiora, & crassiora: caulē
supra Massiliensis magnitudi-
nem, ferulaceū, & latam in ca-
cumine umbellam, in qua se-
men latius, odoratum, & car-
nosius pendet. Eisdem viribus
præditum est: nascitur in aspe-
ris, riguis & collibus: inueni-
tur & in insulis.

Creticum Seseli.

Cap. LXIII.

Tordyliū, quod aliqui Cre-
ticum seseli vocant, iuxta Ci-
liciam in Amano monte na-
scitur, herbula furculosa, se-
mine duplici, rotundo, scutu-
lorum effigie, odorato, suba-
cri. Contra vrinæ difficul-
tatem bibitur, potu cit menses.
Succo feminis caulisque viren-
tis, ternis obolis ex passo de-
cem diebus hausto, renes sa-
nātur. Efficax est radix ad cien-
das pectoris excreationes, in
delinctu cum melle.

Sison. Cap. LXIII.

Sison exiguum semen est, in
Syria natū, apio simile, nigrū,
feruēs, oblongum. Contra lie-
nis vitia bibitur, vrinæ difficul-
tatē potu emendat, remoratos
menses citat. Quo in cōdimētis
cū cu-

DIOSCORIDIS

cum cucurbita, & aceto, indigenæ vtiūtur. In cacumine granula multa gerit.

Anisum. Cap. LXV.

Anisum in summa exalfacit, exiccaturis halitum iucundiores facit, doloris leuamentum præstat, vrinam ciet, aquam quæ subit cutem dissipat, potum sitim cohibet, animalium venenis aduersatur: valet ad inflationes, aluum & alba foeminarum profluvia fistit, lac ad mammas elicit, venterem stimulat: dolores capitis leuat, suffitum naribus: cum rosaceo tritum, instillatumque, fractis auribus medetur. Melius semper recens, plentū non suffurosum, odore præstans.

Inter prima laudatū est

Creticum, proximo loco Ægyptium.

Carum. Cap. LXVI.

Carum, semen est vulgaris notitiæ. Exalfacit, vrinam cōcitatur, stomacho vtile, os commendat, concoctionem adiuuat, vtiliter miscetur antidotis & oxyporis: anifi vicem præbet. Radix cocta, pastinacæ modo, manditur.

Anethum.

μετὰ κολοκύνθης ἐφθῆς (ὡς ὅξει λαμβάνοντες. ἔχει δὲ ὡς κοκκία πολλὰ ἐπ' ἄκρων.

Περὶ Ἀνίσου. Κεφ. ξε'.

Ἀνισον* σπερμάτιον ἐστὶν ἐν σπέρματι χλονώμενον, εἰσὶν δὲ σελήνη περὶ ῥιμῆες, μέγα, πυρῶπικόν. πινόμενον δὲ πρὸς σπλήνα, καὶ δυσουρίαν ἢ ἐμμήνων ἐποχὴν. χρών δὲ αὐτῶ οἱ ἐπιχώριοι ἀπὸ τύματι μὲν κολοκύνθης ἐφθῆς σὺν ὅξει λαμβάνοντες. τὸ το δὲ τὸ ἀνίσον, τὸ μὲν κατὰ 10
λα δύναμιν ἔχει θερμαντικὴν. ξηραντικὴν, εὐπνεῖν, ἀνώδυνον, διαφορητικὴν, οὐρητικὴν, διαχυτικὴν, ὑδρωπικοῖς ἀδύφον σπινώμενον· ἀρμόζει δὲ πρὸς τὰ ἰσθμια τῶν ζώων καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεως, καὶ 15
λίαν τὴν ἰσθμια καὶ λευκὸν ροῦν, καὶ γὰρ κατὰ σπῆν, καὶ συνρῖσας παροξμαῖς ὑπιδυμώμενον δὲ τὸ ῥιπὶ κεφθαλγίαν πῦρ καὶ τὰς ῥήξεις δὲ τῶτων, λείον σὺν ῥοδίῳ ἐνταζόμενον ἰατρίῃ. ἔστι δὲ αὐτὸ κρεῖσσον τὸ νέον καὶ ἀδρὸν, καὶ μὴ πιτυρῶδες, εὐτονον τῇ σπῆνι. περὶ τῆς δὲ τῆς κρηπικόν, ἐπειτα δὲ καὶ τὸ αἰγύπτιον. 20

Περὶ Κάρου. Κεφ. ξς'.

Κάρος* σπερμάτιον ὅστις γινώμενον οὐρητικόν, θερμαντικόν, εὐσομαχόν, εὐσομον, πεπτικόν, μισθώμενον ἐν τοῖς ἀντιδότοις καὶ ὁξυπύρεσι χροσίμως· ἀναισθητικὸν ἀνίσου. ἢ δὲ ῥίζα ἐφθῆ ἐδωδιμος ὡς περ σαφυλίνος.

Περὶ Ἀνίθου.

Περὶ Ἀνήθου. Κεφ. ξζ'.

Ἀνήθος ξηρὸς ἔχει κόμην καὶ τὴν καρ-
πὸν τὸ ἀφίψιμα πινόμενον, γάλα
καταπαύει, σπέρμας τὴν ἐμπνεύμα-
τώσεις παύει, κοιλίαν τὴν καὶ τὰς ἐ-
πιπολαιώεις ἐμέτους ἱσησι, οὐρὰ τὴν
κινεῖ, λυγμοὺς παρήγορει, ἀμβλύ-
νει τὴν τὰς ὀφθαλμοῦ, καὶ γονὴν στέννισι
συνεχῶς πινόμενον. χηρὸς μὲν ὅτι τὸ
ἀφίψιμα αὐτὸ καὶ γυναιξὶν ὕπε-
ρεικῶς εἰς ἐγκύδημα. τὸ δὲ σπέρ-
μα καὶν καὶ καταπλασθέν, κόνδυ-
λώματα αἶρει.

Περὶ Κυμίνου ἡμέρα. Κεφ. ξη'.

Κύμινον τὸ ἡμέρον εὐσομον. καὶ
τούτῃ μᾶλλον τὸ αἰθιοπικόν, ὅσον
ἰσχυρᾶτις βασιλικόν ἐκάλεισε.
Τὸ δεύτερον τὸ αἰγύπτιον. εἴτα τὸ λοι-
πὸν. φύει ἐν γαλατῖα καὶ ἐν Ἀσίᾳ
καὶ καλιχία καὶ τερεντία, καὶ ἐν ἀγροῖς
πλείοσι τοῖσι. Εἰς δὲ θερμαντι-
κόν, συπτικόν, ξηραντικόν ἀρμόζον
πρὸς σπέρμας, καὶ ἐμπνεύμα τώσεις.
ἐγκλυζόμενον ἐκδοῖν σὺν ἐλαίῳ
καὶ καταπλασόμενον σὺν ὠμῇ λύ-
σει. διδοῖ δὲ καὶ ἡρεσπονοῖκοις σὺν
ὀξύκρᾳτῳ. θηριόδηκτοῖς δὲ σὺν
οἶνῳ. διδύμων τὴν φλεγμοναῖς ἀ-
ρήγει σαφίδι καὶ αἰείνῳ ἀλεύρῳ, ἢ
καρῳ τῇ ὀπτεθῆν. ἐπέχει δὲ καὶ
ροῦν γυναικῶν καὶ τὰς ἐν μεκτί-
ρων αἱμορραγίας. σὺν ὀξείᾳ λείον
προσνεχθῆν, τρέπει δὲ καὶ χεῶ-
τα ἐπὶ τὸ ὠχρότερον πινόμενον
καὶ συγχυόμενον.

Anethum. Cap. LXXVII.

Aridi anethi comæ feminif-
que decoctum, potu lac euo-
cat, inflationes & tormina se-
dat, alium vomitionesque fi-
stis, vrinas ciet, singultus lenit,
oculorū aciem hebetat & ge-
niturā restinguit assidue potū.
Foeminis vulue malo opportu-
nis, ad defefsiones vtile. cōdy-
lomata illitus eius cinis tollit.

Cuminum fatium.

Cap. LXXVIII.

Cuminū fatiū ori gratū est:
sed multò magis Æthiopicum,
quod Hippocrates regiū appel-
lauit. Secundū locū tenet Egy-
ptium: reliqua sequuntur: Pro-
uenit in Galatia, in Asia, Cili-
cia, & Terentia, & plerisq; aliis
tractibus. Excalfacit, adstrin-
git, exiccat: ad tormina inflatio-
nēsq; conuenit, coctum & cū
oleo inditum, aut cū hordea-
cea farina illitum. Orthopnoi-
cis datur in posca: demorsis a
serpente, in vino. Testium col-
lectionibus auxiliatur, imposi-
tum cū vīa passa, aut lolij fa-
rina caratōve. Mensium abun-
dantiam inhihet. Contritū au-
tē in aceto, & narib⁹ obiectū,
sanguinis profluuiā sistit. Co-
lorem bibentiū aut pertuncto-
rum mutat in pallorem.

Περὶ

* Sylvestre

DIOSCORIDIS

Syluestre cuminum.

Cap. LXIX.

Syluestre cuminum, plurimum efficaciusq; in Lycia & Galatiæ Asia, atq; Carthagine Hispaniæ gignitur: frutice paruo: dodrantali caule, ac tenui, quaternis, aut quinis foliis tenuibus, veluti ferratis, & gingidij diuifura. In cacumine capitula quina, aut fena habet, mollia, rotunda: in quibus est semē acerosum, gustu satiuo acriore. nascitur in collibus. Bibitur semen ex aqua, aduersus tormina inflationesq;: itē contra venenatas bestias, ex vino: singultus ex aceto fedat: stomacho vtile, quē humor vexat. sugillata tollit, si manducatū cū melle & vna passa illinatur: testium inflammationibus, adiectis eisdem illitum medetur. Est & aliud syluestris cumini genus, satiuo non dissimile, quod à singulis floribus promit cornicula in sublimē exerta, in quibus semē est meláthio simile: quod potit̃ omnium serpentiū morfibz p̃sidio est. Calculosis & iis qui vrinæ stillicidio vexantur, aut concretum sanguinem cum lotio reddunt, auxiliatur: sed apij semen feruefactum postea bibendum est.

Ammi

Περὶ Κυμίνου ἁγρίου.

Κεφ. ξθ'.

Κύμινον ἁγρίον, φύεται μὲν πλείστον καὶ ἐνεργέστερον ἐν λυκίᾳ καὶ ἀσίᾳ τῆς γαλατίας, καὶ ἐν καρχιδόνι τῆς ἰσπανίας· ἐστὶ δὲ διαμεινόν· ἔχον καρπὸν σπιδαιμαῖον, λεπτόν, ἐφ' οὗ φυλλόερα δ' ἢ ἐ. λεπτὰ, οἷον ἐπεπρισμένα, τινὲς κατὰ χεῖριν ὡς γγγίδιον. κεφάλια δὲ ἔχει ἐπ' ἄκρου ἐ. ἢ 5'. στρογγύλα, μαλακὰ· ἐν οἷς ὁ ἰοκαρπὸς ἀχυρώδης, γενομένη δὲ δειμύτερος τοῦ ἡμέρου. φύεται δὲ ἐν γεωλόφοις. πίνεται δὲ τὸ σπέρμα πρὸς σφόδρα καὶ ἐμπνευματώσεις συνὺδαπ· συνὺξεί δὲ λυγμούς παύει. πρὸς 15 δὲ τὰ ἰοδόλα καὶ πλάσθον σωμαχρον συνὺοῖν· ἀφίρει δὲ καὶ ὑπόπια μαρονητὴν καὶ καταπλαδοτὴν συνὺμέλιτι καὶ σαφίδι. φλεγμονὰς τε διδύμων ἴσται μετὰ τῶν αὐτῶν καταπλασομένων. Ἔστι καὶ 20 ἕτερον γένος ἁγρίου κυμίνου ἐμφορὸς τῶν ἡμέρων, ἐξ ἑκάστου δι' αἰθροῖς * ἀφίησι κεράτια μετέωρα, ἐν οἷς ὅτι σπέρμα ὁμοιον μελανδίων· τοῦτο πινόμενον, πρὸς ἐρπετοδύκτοις ἀρίστον διέξημα. βοη 25 δεῖ καὶ σπαραγγοειῶσι καὶ λιθιῶσι καὶ αἵματος δρόμοις οὐρεῦσθαι. ἐπιπινέτωσαν δὲ σιλήνου σπέρμα ἀποζωδέν.

Περὶ Αμ-

Περὶ Ἀμμιός. Κεφ. ο'.

Ἀμμι, ἔνι καὶ τὸ το αἰθιοπικόν,
 οἱ δὲ βασιλικὸν κύμινον καλεῖσιν.
 ἔνι δὲ ἑτέρας φύσεως τὸ αἰθιοπι-
 κὸν κύμινον ἔφασαν εἶναι, καὶ ἑτέ-
 ρας τὸ ἄμμι. γνώριμον δὲ τὸ σπέρ-
 ματιόν, μικρότερον πολλῶν τῶ κυ-
 μίνου, καὶ ὀριζάντιον τῇ γένει· ἐκλέ-
 γει δὲ τὸ καθαρόν, καὶ μὴ πυρρῶ-
 δες. Δυσάμιν δὲ ἔχει καὶ τὸ το θρῆ-
 ματικὴν, πυρρῶτικὴν καὶ ξυραντι-
 κὴν· ποιοῦν πρὸς σφόδρας, δυσου-
 είας, καὶ θηριοδύντοις πινόμε-
 νον σὺν οἶνῳ ἄγει δὲ καὶ ἔμμη-
 να. μύνηται καὶ τοῖς διὰ καρδα-
 είδος ἐκδορίαις πρὸς τὸ ἀντιπά-
 ρχειν ταῖς ἐπιγνομήαις δυσου-
 είας. καὶ ὑπὸ πᾶσι καταπλασθέν
 σὺν μέλιτι αἶρει· τρέπει δὲ καὶ
 χροῖαν πινόμενον καὶ συγχρόμε-
 νον ἐπὶ τὸ χλωρότερον, καὶ μετὰ
 σφίδος ἢ ῥιτίνης ὑποδυμνόμενον,
 ὑστέραν ἀποκαθαίρει.

Περὶ κορείου. Κεφ. οα'.

Κορείον ἢ κορείαννον γνώριμον,
 δύσάμιν ἔχον ἡλεκτικόν. ὅθεν
 καταπλασθέν μετὰ ἄρτων
 ἢ ἀλφίτων, ἐρεσιπέλατα καὶ ἐρ-
 πτας ἰᾶται· σὺν μέλιτι δὲ
 καὶ σαφίδι ἐπιτυκτίδας, καὶ δι-
 δύμων φλεγμονὰς καὶ αἰσθρά-
 κας θεραπεύει· μετὰ ἐρεγμοῦ
 δὲ χοιράδας καὶ φύματα διαλύει.
 τὸ δὲ σπέρμα ὀλίγον μὲν ποδὲν
 μετὰ γλυκείας ἑλμινθας ἐκβάλλει,

Ammi. Cap. LXX.

Ammi Æthiopicum cumi-
 num appellant. plerique hoc
 natura diuersum esse ab illo
 existimant. Vulgo notum est:
 semen exile, multò minus cu-
 minò, origanum resipiens. E-
 ligendum est purum, minimè
 furfur osum. Vis ei excalecto-
 ria, feruens, & exiccans: facit
 ad tormina, vrinæ difficulta-
 tem, serpentium ictus, cum vi-
 no potum: menstrua ciet. Mi-
 scetur derodentibus canthari-
 dum medicamentis, quæ ec-
 doria vocant: vt inde exortis
 vrinæ difficultatibus resistat.
 Sugillata cum melle tollit, co-
 lorem potù aut illitu mutat in
 pallorem. Suffitum cum vicia
 passa aut resina, vuluas pur-
 gat.

Coriandrum. Cap. LXXI.

Corindrū aut corianū vulga-
 ris est notitia, vim refrigerato-
 riā habēs. Quare illitū cū pane
 aut poléta, ignibus sacris: & vl-
 ceribus quæ serpunt, medetur:
 epinyctidas cū melle vel vicia
 passa, testiū inflānationes, car-
 bunculosq; sanat: cū faba fre-
 sa, strumas & tuberculas discu-
 tit: tineas interaneorum expel-
 lit semen cum passo potum,

DIOSCORIDIS

& genituram adauget. largius autem sumptum, mentem non sine periculo mouet: quare continuo, & copiosiore vsu abstinendum. Succus cum cerussa, spumave argenti, necnon aceto & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

Hieracium maguum.

Cap. LXXII.

Hieracium magnum, caulem emittit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia ex interuallis rariusculè diuisa, similia soncho per ambitum: luteos flores in oblongis capitulis. Vim refrigerandi habet, & modicè substringendi: vnde illitum stomacho æstuant, inflammationibúsq; prodest. Succus erosionem stomachi forbitione mitigat. Herba cum radice illita, uibratis à scorpione ictibus auxiliatur.

Hieracium paruum.

Cap. LXXIII

Hieracium paruum, folia eodem modo obtinet ex interuallis diuisa per ambitum: cauliculos teneros, virentes, in quibus lutei flores, orbem circinantes, emicant. Vim suã ad eadem ad quæ superior impendit.

Apium.

ἡ σπέρματος ἐστὶ γυνητικόν. πλείον δὲ λιθοδὲν κινεῖ τὴν διάνοian ἐπικινδύνως· ὅθεν δεῖ φυλάττειν τὴν πλείονα ἢ συνελθὼν χεῖρσιν αὐτῆς· ὁ δὲ χυλὸς συνψιμνίδιω ἢ λιθαργύρω ἢ ὀξείᾳ ἢ ῥοδίνῳ καταχρυσόμενος, ἀφαιεῖ τὰς κτὶ τὴν ἐπιφάνειαν φλεγμοναῖς τὰς πυρῶδεις.

Περὶ Ἱερακίης τῆς μεγάλης.

Κεφ. σβʹ.

Ἱεράκιον τὸ μέγα, καυλὸν ἀνίστηται τραχὺν, ἐρυθρόν, ἀκανθώδη, ὑπόκεινον φύλλα ἔχει ἐν διασημάτων ἐπεχισμένα ἀραιῶς, σπικχὰ ἐμφερῆ τὴν περιφέρειαν· αἰθὴ μύλινα ἐν κεφαλίοις ὑπομήκεισι. Διώαμιν ἔχει ψυχτικὴν, καὶ μετρίως ὑποσύφουσαι· ὅθεν σωματὶ χαμσομυρῶ καὶ φλεγμοναῖς καταπλασσομένην ἀρμύζει· ὁ δὲ χυλὸς καταρροφούμενος, διηγιόν* παρῶναι. ἢ δὲ πόα συντῆρις ἢ καταπλασθεῖσα, σκορπιόπληκτοῖς ἀρήγει.

Περὶ Ἱερακίου τῆς μικροῦς. Κεφ. σγʹ.

Ἱεράκιον τὸ μικρόν, φύλλα ἔχει καὶ αὐτὸ ἐν διασημάτων ἐπεχισμένα τὴν περιφέρειαν· χαυλὶα δὲ ἀνίστηται περφερά καὶ χλωρά, ἐν οἷς αἰθὴ μύλινα, κύκλον περιεχόμενα. Διώαμιν δὲ ἔχει καὶ αὐτὸ τὴν αὐτὴν τὴν περιεχόμενα.

Περὶ Σελίνου.

Περὶ Σελίνου. Κεφ. οδ'.

- Σέλινον κηπύον, ἀρμύζει ἢ
πῶς πρὸς ἃ καὶ τὸ κόριον· καὶ
πρὸς ὀφθαλμῶν φλεγμοναίς με-
τὰ ἄψυ, ἢ πωπάλης ἀλφί-
5 του καταπλασθόμενον, καὶ καυ-
σον σομάχου παρηγορεῖ· μα-
σοῖς τε χονδριῶντας ἀνήσι· κη-
ρεῖ τε οὖρα ἐφθόν τε καὶ ὠμὸν
ἐπιτόμιον. καὶ τὸ ἀφελήμα ἀν-
τοῦ τε καὶ τῶν ῥιζῶν πινόμε-
10 να. ἀντιπάχει θανάσιμοις φαρ-
μάκοις· ἐμέτοις κηπύ· κοιλίαν
τα ἐπέχει. τὸ δὲ σπέρμα ὅστιν
οὐρητικώτερον, βοηθοῦν καὶ θη-
ριοδύκτοις, καὶ τοῖς λιθάργεον
πεπωκόσι. πνευμάτων τε ὅτι
15 διαλυτικόν. μύρτυται δὲ καὶ ἀ-
νωδύνους καὶ θηριακάς καὶ βη-
χικάς χρῆσι μως.

Περὶ Ελαιοσελίνου.

Κεφ. οε'.

- Ελαιοσελίον ὀρνυόμενον ἐν τοῖς
20 ἐφύδρσις τόποις, μείζον ἢ ἡμέ-
ρου σελίνου· ποιεῖ δὲ ὅσα καὶ τὸ
κηπευτόν.

Περὶ Ορεοσελίνου. Κεφ. ος'.

- Ορεοσελίον χαμηλὸς ὅτι σπυδα-
μιάιος εἰς ἐκ ῥίζης λεπτής, ὥτε
25 δὲ αὐτὴν κλωναεῖα καὶ κεφάλια
κωνεῖω παρεμφερεῖ, λεπτότερα
μὲν τοι ἰκανῶς, ἐφ' ὧν ὁ καρπὸς ἐ-
πιμήκης, δριμύς, λεπτός, ἐυώ-
δης, εἰκὼς κυμίνω· φύεται δὲ ἐν
τόποις πετρώδεσι καὶ ὄρεινοῖς.

Δύο.

Apium. Cap. LXXIII.

Hortensis apij herba ad ea-
dem ad quæ corianum conue-
nit: inflammationibus oculo-
rum, cū pane aut polenta illi-
nitur: æstuantem stomachum
mulcet: mammarū duritiā ex
lacte concreto contractā re-
primit: urinā ciet, siue crudum
siue coctum edatur. Decoctū
eius radicisque potum, vene-
norum noxæ resistit, quum vo-
mitiones excitet: aluum cohi-
bet. Semen vehementius urinā
pellit: cōtra serpentiū venena,
aut epotā argenti spumā auxi-
liatur: inflationes discutit. Ad-
miscetur medicamētis quæ do-
lorū leuamenta præstāt: theria-
cis quoq; ac tussis remediis.

Eleoselinum.

Cap. LXXV.

Eleoselinum in humidis na-
scitur, satiuo grādius, & ad ea-
dem efficax.

Oreoselinum.

Cap. LXXVI.

Oreoselinum, caule est do-
drantem alto, ab radice te-
nui exeunte: per cuius am-
bitum ramuli, & capitula ci-
cutæ, multò tamen tenuio-
ra: semine cumini oblongo,
acri, & odorato, tenui: na-
scitur in petrosis & montibus.

x iij Urinā

Vrinam ciet, femine ac radice
in vino potis: menses trahit.
Antidotis, nec nō medicamē-
tis vrinam cientibus, & excalfa-
ctoriis, inferitur. Nec halluci-
nari nos oportet, existimantes
oreoselinum esse, quod in fa-
xis prouenit: aliud enim est pe-
trosoelinum.

Petroselinum,

Cap. LXXVII.

Petroselinum in Macedonia
prouenit, in præruptis locis: se-
mine ammij, odoratiore, sapo-
re acri, aroma olente. Vrinam
ciet ac menstrua: contra stoma-
chi & coli inflationes, & tor-
mina prodest: laterū, renum, &
vesicæ doloribus in potu sub-
uenit. Admiscetur antidotis v-
rinam cientibus.

Hipposelinum,

Cap. LXXVIII.

Hipposelinū, Latini olusatrū
appellāt, aliqui smyrnion, quā-
uis aliud sit, quod propriè smyr-
nion dicitur, vt paulò post refe-
remus. Est autē maius & satiuo
apio candidius: caule alto, ca-
uo, molli, habēte veluti lineas:
foliis latioribus, in puniceū ver-
gentibus: coma roris marini, flo-
rū plena, depédētibus in cacu-
mine corymbis, antè q̄ deflo-
rescat: ea femine turget nigro,
oblon-

Δυάμιν δὲ ἔχει ὁ καρπὸς καὶ ἡ
ρίζα οὐρητικὴν, ποθέντες ἐν οἴνῳ.
ἄγει δὲ καὶ ἐμμῆνα. μήνυται
δὲ καὶ ἀντιδόταις καὶ ταῖς διου-
ρητικαῖς καὶ θερμαντικαῖς δυνά-
μεσιν. οὐ δέ τινος πλανᾶσαι νομίζ-
οντες τὸ ὀρεοσέλιον εἶναι τὸ ἐν
πέτραις φυόμενον· ἀλλ' οὐ γὰρ ὅστις τὸ
πετροσέλιον.

Περὶ Πετροσελίου.

Κεφ. οζ.

Σέλιον τὸ καὶ πετροσέλιον, τὸ το-
φύεται ἐν μακεδονίᾳ, ἐν ἀπτερέ-
μοις τόποις· σπέρμα ἔχον ἑοικὸς
ἀμμι, ἐνωδέστερον δὲ καὶ δριμύ καὶ
ἀρώματιζον. οὐρητικόν, ἐμμησίαν
ἀγωγὴν ἀρμόζει δὲ καὶ πρὸς σωμα-
χοῦ καὶ κώλη ἐμπνευματώσεις καὶ ἰσ-
σρόφους· πρὸς τε πλευραῖς πίνους
καὶ νεφρῶν καὶ κύστεως ἐν ποτῷ λαμβανόμενον. μήνυται δὲ καὶ ταῖς
οὐρητικαῖς ἀντιδόταις.

Πρὶ Ἰαποσελίου. Κεφ. οή.

Ἰαποσέλιον, οἱ μὲν, γρίλλον, οἱ
δὲ, ἀχριοσέλιον, οἱ δὲ, σμύρνιον
καλεῖται, ἐτέρη δὲ κινείως λεγομένη
σμυρνίου ὑποφύγοντος ὡς αὐτῆς
ἰσορήσομεν. ἔστι μείζον καὶ λευκό-
τερον τῆς κηπευτῆς σελίου· χαμηλὸς
κοῖλος, ὑψιλὸς, τρυφερὸς, οἰογε-
ται γλαυμὰς ἔχον φύλλα πλατύτε-
ρα, ὑποφωτιστάδια, ἐν οἷς ὅστις
ὡς λιθανωτίδος κόμην μετὰ ἀν-
δοῖς, καὶ κορύμβους πρὶν ἐξανθῆ-
σαι συνιστῶσαι σπέρμα δὲ μέλαν,
ἐπι-

ἐπιμήκεας, νασόν, θριμύ ἀρωμα-
 τίζον· ρίζα ἐνώδης, λευκή, εὐστο-
 μος, οὐ πα χεῖρα φύει· ἐν συσκότις.
 καὶ παρ' ἑλαιο. λαχανεύεται δὲ ὡς
 τὸ σέλινον. καὶ ἡ ρίζα δὲ ἐφθῆ
 καὶ ὡμὴ ἐδίδετο. τὰ τε φύλλα καὶ οἱ
 κλωνοὶ ἐδίδοντο· ἐφθῆ, καὶ ἑαυτὰ
 καὶ καὶ ἰχθύων σκευάζεται καὶ ὡ-
 μα δὲ ταιριχεύεται εἰς δημαίαις.
 Διούαμιν δὲ ἔχει ὁ καρπὸς πινό-
 μινος ἐν οἶνο μέλιτι, ἐπιμύων ἀ-
 γωγόν· διερμαίνει τε τὸν ριζοῦ-
 τας πινόμινος καὶ συγχρίομινος·
 σπαραγουείαις τε βοηθεῖ. καὶ ἡ ρίζα
 δὲ τὰ αὐτὰ ποιεῖ.

Περὶ Σμυρνίου. Κεφ. οθ'.

Σμύρνιον ὅπερ ἐν κιλικίᾳ περὶ ο-
 σέλινον καλεῖται χυμώμινον πλείστον
 ἐν τῷ λεγομένῳ ἀμανῷ ὀρεῖ. καὶ τὸ
 κλωνὸν μὲν ἔχει ὁμοιον σέλινῳ,
 παρσφυάδας ἔχοντα πολλάς· φύλ-
 λα δὲ πλάτυ τῆρα πρὸς τὴν γῆν, καὶ ὑ-
 ποδακλῆ· ὑποκίπαρσ, ῥωμὰ δὲ
 καὶ ἐνώδη σὺν θριμύτητι, φαρμα-
 κώδη τε καὶ ὑπομηνίζοντα τῇ
 χροῖ· σκιάδιον δὲ ἐπὶ τῷ κλωνῷ
 ἀνθηοειδές· σπέρμα στρογγύλον,
 ὁμοιον τῷ τῆ κράμβης, μέλαν, θρι-
 μὸν, γενομένῳ ὡς σμύρνη, ἐν αὐτῷ
 ἐνὸς ποιού· ἡ δὲ ρίζα θριμύταις,
 ἐνώδης, ἀπαλὴ, πολύχυλος, δά-
 κτωσα τὴν φάρυγ· φλοῖον ἔχουσα,
 ἕξωθεν μὲν μέλανα, ἐνδοθεν δὲ
 χλωρόν ἢ ὑπολευκόν. φύεται δὲ ἐν
 περσώδεσι τόποις καὶ μεωλόφοις,
 καὶ

oblongo, acri, solido, aromati-
 co : radix dimittitur odorata,
 candida nec crassa, quæ os cō-
 mendat. In vmbrosis & palu-
 stribus nascitur. olerum gene-
 ris, vt apium. radix cruda co-
 ctæue estur. Folia cum cauli-
 bus decocta māduntur, & per
 se aut cū piscibus præparātur,
 crudāq; muria cōdiuntur. Vim
 hanc habet, vt poto semine ex
 mulso vino mēses cieat: algen-
 tes calfacit potu aut illitu: vri-
 næ stillicidio auxiliatur. Radix
 eosdem præstat effectus.

Smyrnium. Cap. LXXIX.

Smyrnion, quod in Cilicia
 petroselinum vocant, plurimū
 in amano mōte gignitur. Cau-
 lē habet apij, & stolones mul-
 tos : folia latiora, subpinguia,
 ad terram infracta, robusta, o-
 dore medicato, cum quadam
 acrimonia, iucunda, colore
 in luteum languescēte : ca-
 pitibus caulium orbiculatis, vt
 anethi : semine brassicæ, ro-
 tundo, nigro, sapore aspero,
 sicut myrrha, ita vt alterum al-
 terius loco cadat. radix quo-
 que odorata, gustu acri, fau-
 ces mordet, succosa, mollis:
 cortex eius foris niger, intus
 viridis, aut subalbidus. Nasci-
 tur in saxosis, & collibus, at-
 que

DIOSCORIDIS.

que squalidis, & limitibus terrenis. Vis radices, herbæ, & feminis excalfacere. Foliiis muria maceratis ad obsonia vtuntur, aluum fistunt, radicem contra serpentiū ictus bibere conuenit, tusses & orthopnoeas mitigat, vrinæ difficultati medetur: recentes tumores, collectiones, duritiasque discutit, illita, & vulnera ad cicatricem perducit: partus abortu vitiatur, si feruefacta subiiciatur. Semen, lienis, renum & vesicæ vitiis prodest: menses & secundas pellit: commodè datur ischiadicis in vino, inflationes stomachi lenit, sudores ciet, & ructus. Peculiariter datur hydropicis in potu, & contra febrium circuitus.

Elaphoboscum.

Cap. LXXX.

Elaphobosco fœniculaceus caulis est, aut rorimarino similis, geniculatus: foliis duūm digitorum latitudine, vt terebinthi, prælongis, aliquantum asperis, circumfractis: adnata multa habet, ferentia umbellæ anethi similes, & femina eiusdem: florem subluteum: radice ternūm digitorum longitudinis, & crassitudinis vniū, candida, dulci, esui apta.

Caulis

ἡ ἀνίκμοις ἡ γυνίαις χερταίνουσας. Διώκουν δὲ ἔχει ἡ ῥίζα ἡ πόα ἡ ὁ καρπὸς δερματικῶν. λαχαρένῃ δὲ ἡ εἰς τὰς δὴμαῖας τὰ φύλλα, κοιλίαν τὴν ἰσχυρὴν ἡ δὲ ῥίζα πνομὴν ἐρπετοδύκτοις ἀμύζει, παρῶναι δὲ ἡ βήχας ἡ δροσπορίας, ἡ δυσουρίας ἰαταὶ κατὰ πλάστομῶν δὲ τὰ πρὸς ὅσα οἰδήματα, ἡ φλεγμοναί, ἡ σκληρίας διαφορεῖ, τραύματα τε ἀχρεῖς ἐπουλώσεως ἄγει. ἑξεδείσθαι 10 δὲ ἡ προσδεῖται ἐξ ἀμελώσιδος, ἡ τὸ πτέρμα δὲ αὐτῆς, πρὸς νεφροῖς ἡ πλῆνα ἡ κύστη ἀμύζει ἄγει δὲ ἡ ἐμπίνα ἡ δεύτερα πρὸς τὴν ἰσχάδα μετ' οἴνου πνόμῃον ἀμύζει, ἡ στομάχου ἐμπνευματώσις 15 πρὸς πρῶν, ἔστι δὲ ἡ ἰδρωποῖον, ἐρευκτικόν. ἰδίως πνόμῃον πρὸς ὑδρωπας καὶ περὶ πόσιν.

Περὶ Ελαφοβόσκου.

Κεφ. π'.

Ελαφοβόσκον χαλκός 6στ λι- 20 θανωπίδι ἡ μαρσάδρω ἐμφορὴς μηχανισμὸς. φύλλα διδάκτυλα τὸ πλάτος, ἰσχυρὸς ἐπιμήκη ὡς τερεβίνθου, περιεκκλασμένα τραχέα ποσῶς. ἔχει δὲ παρὰ φύλλας ἱκανὰς ὁ χαλκός, σκιά 25 διαέχουρας ὅμοια ἀνίδω, ἀνίδω ἑπομήληνα, ἡ τὸ πτέρμα ἀνίδω ἐμφορὴς. ῥίζα ὡς τριδάκτυλος τὸ μήκος, πάχος δακτύλου, λευκὴ, γλυκεῖα, ἐδάδιμος. 30

καὶ ὁ χαυλὸς ὃ λαχανεύει ἀρι-
 φυνὸς ὢν. ταύτην φασὶ ὅτι πῶς τὰς
 ἐκείνας νεμεθείσας, ἀντέχιν τοῖς
 ὅτι ἐρπετὶ δύνῃσι ὅθεν καὶ τὸ σπέρ-
 μα δίδωσι τοῖς ἐρπετοδύηκτοις σὺν
 οἴνῳ. Πρὶ Μαράδρον. Κεφ. πα.
 Μάραδρον, αὐτὴ ἐδορμύνη ἢ πῶς,
 δίδεται γάλα κατὰ σπῆν, καὶ τὸ
 σπέρμα δὲ πινόμυρον ἢ σινωφό-
 μυρον πηλασάνη. τὸ δὲ ἀφ' ἡμα-
 τὸς κόμης ὑποτετῆν, νεφριτικοῖς
 τοῖς περὶ κῆσιν χηρίσιμον, διερρη-
 κὸν ὑποφύχον ἀσμόζῃ ὃ ἐρπετοδύ-
 ηκτοις σὺν οἴνῳ πινόμυρον, καὶ κα-
 ταμύνια ἄγει ἐν πυρετοῖς ὃ ναυ-
 σίαν καὶ χαύσον στομάχῳ παραλεί-
 ται μὲν ψυχρὸ ὕδατος πινόμενον.
 αἱ δὲ ρίζαι λείπαι σὺν μέλιτι κα-
 ταπλαθεῖσται, κυνὸδνηκτα διερα-
 πεύουσι. ὁ δὲ χαυλὸς ἐκδιβέν-
 των ὅτι χαυλῶν καὶ τῶν φύλλων ἐν
 ἡλίῳ ξηρανθεὶς, εἰς τὰ ὀφθαλμι-
 κα, ὅσα πρὸς ὀφθαλμοκρίαν σκευάζε-
 ται χηρίσιμος. χυλίζεῖ δὲ καὶ τὸ
 σπέρμα πρὸς τὰ αὐτὰ χλωρὸν,
 ἐπὶ σὺν τοῖς φύλλοις καὶ τοῖς ἀκρῶ-
 μοις, καὶ ἢ ρίζα καὶ πῶς πρὸς τὴν
 ἐκβλάστησιν. Ἐν ὃ τῇ πρὸς ἐπὶ
 ραν ἰσχυρία, καὶ ὅπῃ ἀνίστην ὁμοιον
 κόμης ἀπὸ διεκρίσεων ἐν τῇ ἀν-
 θήσῃ μέσον ὃ χαυλὸν ὃ ἐπὶ χερσὶ
 ὢν, καὶ πυρὶ παραπθέντων, ἵνα ὑπὸ
 ὃ θρῆμασίαις οἰογὲν ἀφιδρῶν ἐκβά-
 λη τὸ κόμης. ἔστι ὃ ἐν ῥέσερον ὅτι
 χαυλὸς πρὸς τὰ ὀφθαλμικά ὅτι το-

Πρὶ

Caulis tener pro olerē mandī-
 tur. Contra serpentium ictus,
 datur semen in vino. Fama au-
 tem est, hoc pabulo, ceruas ser-
 pentium moribus resistere.

Foeniculum. Cap. LXXXI.

Foeniculum si herba edatur,
 aut semen cū ptisana bibatur,
 mammas lacte replet. Comæ
 decoctum in renum dolorib⁹
 subditū proficit, quippe quod
 vrinam excitet: contra serpen-
 tium ictus in vino conuenien-
 ter bibitur, menses ciet: in febri-
 bus nauseam & stomachi fer-
 uorem, ex aqua frigida potum
 fedat. Cōtritæ radices & cum
 melle illitæ, morib⁹ cantū me-
 dentur. Succus caule & foliis
 exprimitur, & in sole siccatus,
 in medicamēta adiicitur, quæ
 ad excitandam oculorum a-
 ciem commodè temperantur.
 Extrahitur succus ad eadē va-
 lens, etiam semine viridi, ramu-
 lisque & radicibus prima ger-
 minatione incisis. In Iberia
 quæ ad occidentem spectat,
 succum reddit gūmi similem.
 Caulem medium, dum herba
 floret rustici demetunt, igniq⁹
 admouent, quod facilius vi co-
 loris exudans, gummi remit-
 tat: quod efficacius succo est,
 ad medicamenta oculorum.

Foeniculū

DIOSCORIDIS

Foeniculū erraticū, siue hippomarathrū. Cap. LXXXII.

Est & sylvestre foeniculum, magnūfert autē semē cachryi simile, cuius radix iucūdē olet, potaq; stranguariæ medet: mēses imposita ciet: ventrē fistit, radice aut semine poto, & cōtra serpentium morsus auxilia tur, calculósque cōminuit, & regium morbum expurgat: lactis abundantia facit decoctū foliorū hauistū & foeminas à partu purgat. Traditur aliud hippomarathri genus, longo, exili, & angusto folio: semine coriādri, rotundo, acri, & odorato. Excalfaciendi naturā habet, & viribus foeniculo respōdet, sed ad omnia infirmius.

Daucum. Cap. LXXXIII.

Daucum aliqui Dauciū vocant. Creticum foliis foeniculo simile, minoribus & tenuioribus: caule dodrantali, vmbella coriandri, flore albo: semine acri, cādido, hirsuto, suauissimi odoris in mandendo: radix digitali crassitudine, & dodrātis longitudine adolescit: in saxosis nascitur, & locis sole illustratis. Aliud eius genus, sylvestri apio simile, acre, odoratum, aroma olens, feruentis gustus. Probatissimum Creticum.

Tertium

Πρὶ Ἴππομαράδρου.

Κεφ. πβ.

Ἴππομαράδρον μαράδρον ἐστὶ ἀγρίον μίγα· φέρε δὲ σπέρμα καὶ γρηυὶ ὁμοιον, ῥίζα δ' ὑπεστὶν ἐνώδης, ἢ πτερυγομένη σπαραγμοειδής· ἰσθμὸς ἐμμελὴς τε ἀγρίῳ περὶ τὸ μόνον τὸ σπέρμα καὶ ἡ ῥίζα κοιλίαν ἱσθμὸς πνόμῳ θηριοδύκτοις τε βοηθεῖ, καὶ λίθοις δρῦντι καὶ ἰκτερον ἀποκαθαίρει. τὸ δὲ φύλλον τὸ ἀφ' ἡμῶν πνόμῳ γὰρ λα ἀγρί, καὶ ταῖς ἐν τοκατῶν γυναικῶν ἀποκαθαίρει. καλεῖται καὶ ἕτερον Ἴππομαράδρον, φύλλα ἔχον στενὰ, μικρὰ, περὶ μίγα καρπὸν δὲ στρογγύλον περὶ τὸ κορεῖν, δριμύν, ἐνώδην, θηριοδύκτον· ἀναλογεῖ δὲ αὐτῇ ἡ διώαμις τῷ περὶ μίγα, ἀδυνέστερον ἐνδύσσει.

Πρὶ Δαύκου. Κεφ. πγ.

Δαύκος, οἱ δὲ δίρκαλον καλεῖσθαι. ὁ μὲν πτερυγομένης, μαράδρον ἔχον τὰ φύλλα ὁμοία, μικρότερα δὲ καὶ λεπτότερα· καυλὸν σπιθαμῶν, σκιαδίου ὁμοιον κορυμνῶ, αὐτὴ λευκή· ἐν δὲ τέτοις ὁ καρπὸς δριμύς, λευκός, δασύς ἐν τῷ διαμασπῶν ἐνώδης· ῥίζα δακτύλου τὸ πάχος. τὸ δὲ μήκος σπιθαμῆς ἡμιᾶ· ἐν δὲ περὶ ὅσους τόποις, καὶ ἐν κλίμασι. ὁ δὲ πτερυγομένης ἐστὶ στενὴ ἀγρίῳ παραπλήσιος ἀρωματώδης δριμύς καὶ ἐνώδης γενομένη καὶ πυρᾶδης διαφέρει δὲ ὁ κρητικός.

Τὸ

Τὸ δὲ τρίτον εἶδος κορίω φύλλα
 ἔοικε, καὶ τὰ αὐτὰ λευκά, κεφαλὴν
 δὲ ἔχει καὶ καρπὸν ὁμοίαν ἀνήθω,
 ἐφ' ἧ σκιάδιον ἐμφερές σαφύλινω.
 σπέρματος ἐπιμήκης πλῆρες ὡς
 5 κυμίνης δριμέως. Τὸ δὲ σπέρμα
 πάντων δυνάμειν ἔχει θέρμαντι-
 κὴν πτόμακρον ἐμμήνων, ἐμβρύων,
 καὶ ἔρων ἀρωγόν, καὶ σφόδρα ἀπαλ-
 λακτικόν, βηχῶν χροῖαν παρῶντι
 κόν' ἀρήγει ὅ καὶ φασαλγιοδύκτους
 10 ποθεν σὺν οἶνω διαφορεῖ ὅ καὶ οἰδή-
 ματα καὶ ἀσπλάδεν' ἢ δὲ χυῖσις
 τ' μ' ἄλλων τ' σπέρματος μόνον.
 τ' ὅ κρητικὴ καὶ τ' ῥίζης, ἢ τις μά-
 λιστα πρὸς τὰ θηρία πίνει μετ'
 οἶνω. Πρὶ Δελφίνις. Κεφ. πδ'.

15 Δελφίνιον κλῶνας ἀνίστοι δι-
 σσιθάμους ἢ καὶ μείζοντας ἀπό-
 μίως ῥίζης πρὸς οὐς φυλλάει α-
 ποχρησμένα λεπτά, ἐπιμήκη, δελ-
 φινιοειδῆ ὅθεν καὶ ὠνόμασται. αὐθὺς
 δὲ ὁμοίον λευκοῖω, ἐμπόφυρον.

20 σπέρμα ἐν λοβοῖς μεγάλῳ ἐμ-
 φερές, ὃ βοηθεῖ ποθεν ἐπὶ οἶνω
 σκορπιωλήκτοις, ὡς οὐδὲν ἔτε-
 ρον. φασὶ δὲ καὶ τοὺς σκορπίους πα-
 ρετρεδεῖσθαι τὸ πῶς παραλύει
 ἀποσάκτους τὴν καὶ νερκώδεις γί-
 25 νειδαι, ὑφαίρεμῶν δὲ εἰς τὸ αὐ-
 τὸ καθεστάναι. φύεται δὲ ἐν τρα-
 χέσι καὶ ἐν ἡλίαις τύποις.

Περὶ Δελφίνιου ἑτέρου.

Κεφ. πε'.

Δελφίνιον ἑτερον, οἷ ὅ ὑάκινθον,
 ῥωμαῖος

Tertium assignatur genus fo-
 liis coriandri, floribus albis, ca-
 pite & semine anethi, musca-
 rio pastinacæ: semine oblógo,
 ceu cumini, acri. Omnium se-
 men excalfacit: potū vrinam,
 menses, & partus extrahit, tor-
 minibus liberat, veterem tuf-
 sim mitigat: phalangiorū mor-
 sibus potum in vino auxilia-
 tur: tumores illitu discutit. Se-
 minis duntaxat in aliis gene-
 ribus inualuit vsus: in Creti-
 co, etiam radicis, quæ maxi-
 mē contra venenatorum iniu-
 riam in vino bibitur.

Delphiniū. Cap. LXXXIII.

Delphinium, furculos emit-
 tit à radice vna sesquipedales,
 aut maiores, à quibus folia ex-
 eunt parua, tenuia, diuisa, præ-
 longa, quæ delphinorū effigiē
 repræsentant: vnde tractū no-
 men est. Flos violæ albæ non
 dissimilis, purpureus: & semen
 in siliquis, milio proximū, quo
 nō aliud vtilius bibi potest, ab
 scorpione percussis. Aiūt enim
 obiecta herba, scorpiōes resol-
 ui, atq; ignauos torpescere: se-
 mota verò ea, sese recolligere.
 Prouenit in asperis & apricis.

Delphinium alterum.

Cap. LXXXV.

ALTERum est delphinium,
 quod

quod Romani bucinū vocāt, superiori simile, sed foliis & ramis longè gracilius. Viribus eisdem pollet, sed non ita efficacibus.

Pyrethrū. Cap. LXXXVI.

Pyrethrum Romani salinarem vocant, folia caulēque emittit vt daucum sylvestre & foeniculū: umbellamq; anethi, circinatae rotunditatis. Radix longa est, pollicis crassitudine, gustu feruidissimo. Pituitatem elicit: ideo in dolore dentium, decocta in aceto, colluto inde ore, auxiliatur: mansa pituitam extrahit: sudores ciet, peruncto ex oleo corpore: diuturnis horribus efficacis est & cōtra perfrictiones membrorum, resolutionesque eximiè conducit.

Rosmarin⁹. Cap. LXXXVII.

Duo rosmarini genera: vnū foecundum frugiferūque, cuius semē canchrys vocatur: folia foeniculi habet, crassiora & latiora, in rotæ speciem, humisparsa, iucundè olentia: caulem cubiti altitudine, aut maiorem, multis concavum alis: in cacumine umbellā, in qua semen copiosum, candidū, sphōdylo simile, rotundum, angulosum, acre, resinaceū, quod in mandendo linguam exurit:

radix

ῥωμαῖοι βουκίνους, καὶ αὐτὸ ἐμφερές τῷ ὡρῇ αὐτῆς, τοῖς δὲ φύλλοις καὶ τοῖς κλωνίοις ἰσχυρότερον πολλῶν. δυνάμει ἔχον καὶ αὐτὸ τὸ αὐτὸ τῷ ὡρῇ ἰσχυρῶς ἔχει τῷ δὲ ἐν ῥήματι.

Πρὶ Πυρέθρου. Κεφ. πς. 5

Πύρεθρον πῖα ἔστι χαυλὸν ἀνιέισα καὶ φύλλα ὥσπερ δαυκός. ἄγχιος καὶ μάραθρον. σιῶδιον δὲ ὡς ἀνίδου τειχειδές. ῥίζα δακτύλου μεγάλου τὸ πάχος μακρὰ, γευσάμενός, πικρῶς κατὰ τὴν. 10 φλέγματός ἐστιν ἐπιπαστικὴ, διὸ καὶ ταῖς ὀδονταλγίαις βοηθεῖ μέλ' ὄξους ἐψηθεῖσα καὶ διακλυζομένη. ἄγει δὲ καὶ φλέγμα διαμασσηθεῖσα. συγχρισμένη δὲ μετ' ἐλαίου, ἰδρωτὸς κινεῖ ποιοῦσα. 15 πρὸς τὰ χροῖα ῥίγη, καὶ πρὸς ἐκφυγμένα δὲ ἢ παρειμένα μέρη τῶ σώματος, ἀκρωὶς ἀρμόζει.

Πρὶ Λιβανωτίδος. Κεφ. πς. 6

Λιβανωτὶς διότι, ἢ μὲν τις καὶ πικρὸς, ὡς ἐνίων δὲ ῥέει, ἢ χαμ. 20 φάνημα χαλεκόν, ὥς ὁ καρπὸς καύχους καλεῖται. φύλλα δ' ἔχει μαράθρου ὅμοια, παχύτερα δὲ καὶ πλατύτερα. τειχειδῶς, ἐπὶ τῇ γῆς ἐκφυγμένα, ἐν ὧν χαυλὸν ὃ ὅσον πύχυνος καὶ μέζονα, μακράς 25 ἔχοντα πολλὰς, καὶ ὡς ἄκρα σιῶδιον ἐφ' ἧς καρπὸς πολὺς, λευκὸς εἰκὼς σπονδύλου, ὡς φρήνης, ὡνίας ἔχων, δειμύς, ῥητινίζων, ἐν τῇ τῷ διαμασάει ἐπιπαστικὴ καὶ γευστική. 30 ῥίζα

ρίζα δὲ λευκή ἐν μεγέθους, ὄζουσα
 λιβαίνε. Ἡ δὲ ἑτέρα κατὰ πᾶν τὰ
 εἰκοῦα τῇ περὶ αὐτῆς σπέρμα φέ-
 ρει πλατύν, μέλαν, ὡς σφονδύλιον,
 ἐν ὧδες, ἐ πυρωτικόν, ρίζαν ἐν μ-
 5 τῶν ἐκ τὸς, μέλαιναν, θλαθεῖσαν
 δὲ λευκίῳ. Ἡ δὲ λεγομένη ἄκαρ-
 πος καὶ πᾶν τὰ ὁμοία ἔσται ἢ πορ-
 ρηρὴν αἰσ, ἔτε χαυλὸν ἀνίστην ἔ-
 τε αὐτὸς ἔτε σπέρμα. φύει) ὃ ἐν
 περὶ ὧδες καὶ τραχέσι τόποις. πα-
 10 σῶν δὲ κοινῶς ἢ πῶς κατὰ πλά-
 θεῖσα λεῖα αἰμορροΐδας ἐξελ-
 φλεγμονάς τε καὶ κατὰ* δακτύ-
 λιον περὶ νει, καὶ κονδυλώματα
 καὶ χοιρῶδεις, καὶ τὰ δύσπεπτα
 τῶν ἀποσημάτων συμπέπει. αἰ-
 15 δὲ ρίζα ξηραὶ σὺν μέλιτι ἔλκε-
 ἀνακαθαίρεισι, καὶ ἐρόφεις ἰῶνται·
 καὶ θηριοδύκτοις ἀρμόζουσι σὺν
 οἶνω πινόρνῳ· ἐμμενῶς ἢ ἀγ-
 σι καὶ οὖρα, διαφορεῦσι δὲ καὶ
 οἰδύματα παλαιὰ κατὰ πλάσ-
 20 σόρνῳ. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ρίζης καὶ
 τῆς πῶας ὀξύτερη, μυγνύμνος
 μέλιτι καὶ ἐγχυσίμνος. ὁ δὲ καρ-
 πὸς πινόρνος, τὰ αὐτὰ ποιεῖ.
 βονδεῖ καὶ ἐπιληψίας καὶ ταῖς ἐν
 ὧδε καὶ παλαιαῖς διαθέσεσιν ἰ-
 25 κτεικοῖς τε καὶ πεπτεῖας καὶ οἶ-
 νου διδύμνος· ἐστὶ δὲ καὶ ἰδρωπ-
 κὸς σὺν ἐλαίῳ ἀλειφομένους· ἀρ-
 μόζει καὶ ῥήγματος, καὶ ἀσπασμα-
 ποδάγρας τε κατὰ πλάσσορνῳ
 λεῖος σὺν αἰεῖνῳ ἀλεύρῳ καὶ ὄζει
 ἀφός

radix thus redolet; candida, ῥ-
 grādis. Est & alterum omnino
 consimile, semen ferens latum,
 nigrum vti sphondylium, odo-
 ratum, minimè exurens, radice
 foris nigra, intus si frāgatur, al-
 ba. Verūm id quod sterile dici-
 tur, illorum planè similitudinē
 refert: sed neque caulem, ne-
 que florem, neque semen pro-
 mit. Nascitur in saxosis & aspe-
 ris. Trita omnium herba com-
 munitè hæmorrhoidum pro-
 fluuia sistit, sedis inflammatio-
 nes & condylomata mitigat,
 cōcoquit strumas & abscessus,
 qui ad maturationē ægrè per-
 ducuntur. Siccæ radices cum
 melle vlcera purgant: tormini-
 bus medentur cum vino pote,
 & contra serpentium morsus
 conueniunt: menses & vrinas
 cient, ueteres tumores illitu
 discutiunt. Tam radicis quàm
 herbæ succus, adiecto melle il-
 litus, oculorum aciem exacuit.
 Potum semen ad eadem pol-
 let: si comitialē malum sentia-
 tur, aut vetus pectoris vitium,
 auxilio est: regio morbo labo-
 rantibus cū vino & pipere da-
 tur: sudores mouet, cum oleo
 perūtum: ruptis & conuulsis
 prodest: podagris, cū loliacea
 farina, & aceto tritū illinitur,
 purgat

DIOSCORIDIS

purgat vitilignes, addito aceto quàm acerrimo, Semine in potionibus vtendum, eius quidem quod Canchryn non ferat, quippe illud sua acrimonia arteriam exasperat. Rosmarinum cum erica nasci, foliis lactucæ sylvestris amaræ asperioribus, candidioribusque, radice breui, Theophrastus author est: potiusque idipsū alterutra parte purgare.

Cáchrys. Cap. LXXXVIII.

Canchrys vim habet excalfaciendi, & vehementer excicandi: quare abstergentibus medicamentis inferitur. Contra oculorum fluxiones capiti illinitur: ita vt tertio die solvatur.

Rosmarinū coronarium.

Cap. LXXXIX.

Rosmarinum quo coronarij vtuntur, ramos mittit tenues, & circa eos folia minuta, densa, longa, exilia, subter incana, supernè virentia, graui odore. Excalfactoria vi præditum est: regium sanat morbum, si decoctum in aqua ante exercitationes bibatur: & vbi laboras exercitationi se crediderit, in balnea descendat, & merum potet. Acopis, gleucinóque vnguento admisceri solet.

Sphondyliū.

ἀλφούς τε σμύχει, μινύμους ὅξιν δειμυτάτω. τῷ σπέρματι δ' εἰς τὰ ἀποσήματα χεῖν δὲ τὸ μὴ τὸ κάρχρυ φεροῦσης λιβανωτίδος, δριμύ γὰρ ἐκείνη καὶ βαχυντικὸν τῆς ἀρτηρίας. Θεόφραστος δὲ ἰσορεῖ μετὰ τῆς ἐρείκης λιβανωτίδα δριδάκι ἀγρία. τῇ πικρᾷ ὁμοία φύλλα ἔχουσιν φύεσθαι, ῥίζαν δὲ βραχεῖαν· καὶ ταῖρεν δὲ ἀνω καὶ κάτω ταύτην ποδεῖσθαι λευκότερα μὲν τοῖς καὶ τραχύτερα. τὰ φύλλα τῶν τῆς δριδάκος.

Πρὶ Κάρχρυος. Κεφ. πη.

Τὸ μὲν κάρχρυ διώαμιν ἔχει δειγματικὴν, ἀναξίθεαντικὴν σφοδρὰ ὅθεν ἀρμόζει σμύγμασι μινύμους πρὸς ρευματιζομένοις ὀφθαλμοῖς, ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ἐμπλαστέμενον, καὶ ἀποσμιόμενον καὶ ἡμέρας τρεῖς.

Πρὶ Λιβανωτίδος. Κεφ. πθ.

Λιβανωτίς ὑπὸ ῥωμαῖοις καλοῦσιν ῥοσμαίνουσαν, καὶ οἱ σεφαλονοπλόκοι χεῖνται, ῥάβδοι εἰς λεπταῖς, ὅτε ὡς τὰ φύλλα κετὰ πυκνὰ, ἐπιμήκη καὶ ἰσχνὰ, ἐνδοθεν λευκὰ, ἐκ δὲ τ' ἐντὸς χλωρὰ βαρύσμου. Διώαμιν δὲ ἔχει δειγματικὴν· ἰκτέρεν ἰαπικὴν, ἐὰν τις αὐτὴν ἐψήσας ἐν ὕδατι δῶ πρὸ τῶν γυμνασίων ποιεῖν. εἴτα γυμνάζων λούῃ καὶ οἶνον ποτίζει, μινύεται δὲ καὶ ἀκόποις καὶ τῷ γλευκίνῳ χεῖσθαι.

πρὶ

Πρὶ Σφονδυλίου. Κεφ. ε'.

Σφονδυλίον φύλλα μὲν ἔχει καὶ
ποσὸν εἰκότα πλατύνω * πρὸς
τὰ τῷ πατάκος ἡμυλοῦς ὃ πηχυ-
αῖς ἢ καὶ μείζοντας, εἰκότας μα-
5 ραθρῶ, σπέρμα ὃ ἐπ' αἰρῶ ὁ-
μοιον σπέρματι, διπλοῦν, πλατύτε-
ρον δὲ καὶ λευκότερον καὶ ἀχυ-
ρῶδέστερον, βαρύοσμον· ἀνθὴ λευ-
κὰ ῥίζαν λευκὴν, ῥαφάνῳ ἐμφε-
ρῇ. φυέται δὲ ἐν ἐλώδεσι καὶ ἐν
10 ὕδροις χερσαίοις. Ὁ δὲ καρπὸς αὐ-
τῷ ποδεί, ἐκκρίνει καὶ κοιλίαν
φλεγματοῦδες ἰάται δὲ πνομέ-
νη ἢ πατικῆς, ἢ τερενῆς, ὁρδοπνοϊ-
κούς, ὀπιλητικῆς, καὶ ὑστερικῶν
πίνων. Ἐσθλα μὲν ὁμοῖος δὲ ἀνακα-
15 λείπεται τὸν κατὰ φρεσὶ νόσον. συν-
ελαίῳ δὲ ἐμβρεχόμενος τὴ κεφα-
λῆς, ἀρμόζει φρενιτικοῖς, ληθαρ-
γικοῖς, κεφαλαιαῖς ὅστις ἐπέχει δὲ
καὶ ἐρπητὸς συνὶ πηγῶν κατὰ
πλατύνει. ἢ δὲ ῥίζα διδῶ ἢ ἢ τε-
20 ρεῖται καὶ ἢ πατικοῖς. πρὸς ὕδατι
δὲ καὶ ἐντερεῖται πρὸς τὴν τύλιν
τὸν ἐν σύριγγι δὲ ἀνθὸς χλω-
ροῦ ὁ χυλὸς πρὸς εἰληκωμῆρα ὁ-
τα καὶ πυρρῶντα ἀρμόζει ἀπο-
τίθειται δὲ ὑπὸ ἀζόμορος ὡς τὰ
25 λοιπὰ χυλίσματα.

Πρὶ Νάρθηκος. Κεφ. εα.

Νάρθηξ, τέτε χλωροῦ ὄντος ἢ
ἐντεριῶν πνομῶν αἱμοπηό-
κούς καὶ κοιλιακούς ὠφελεῖ, καὶ
ἐκροδῆκτοῖς διδῶται συνὶ οἶνῳ,
καὶ

Shpondylium. Cap. XC.

Sphondyliū folia quadām-
ten^o platani & panacis habet:
caules foeniculaceos, cubitali
altitudine, aut amplius assurgē-
tes, in quorum cacumine semē
duplex, seseli simile, sed latius,
cādidius, & magis paleaceum,
gravis odoris: flores eius albi,
aut pallentes: radice raphani,
candida. Nascitur in palustri-
bus & aquosis. Potum semen
puitam per alium extrahit:
medetur iocineris vitiis, regio
morbo, comitialibus, ortho-
pnoicis, vulvarum strangula-
tioni. Vternosos suffitu reuo-
cat: cum oleo commodē in-
funditur capitibus phrenetico-
rum, & lethargicorum, item ca-
pitis dolorib⁹: cum ruta illitū,
serpentina vlcera cohibet. Da-
tur radix contra regium mor-
bum, & iocineris vitia: circum-
rasa eadem & iniecta callos fi-
stularum derodit. Recentis flo-
ris succus exulceratis auribus,
purulētisque accommodatur:
qui cæterorum succorum mo-
re exprimi, dein recondi solet.

Ferula. Cap. XCI.

E viridi ferula medulla pota-
vtilis est ad cruentas excrea-
tiones, coeliacosq[;], & cōtra vi-
perarū morsus in vino datur,
erūpentiq[;],

erumpentémque naribus sanguinem indita sistit. Semen potum torminosi auxiliatur: sudores ciet, victo ex oleo corpore. Caules, si edantur, capitis dolores faciunt: muria conduntur. Ferula itaque caulem profert ternum sæpe cubitorum: folia foeniculi, longè asperiora, & latiora. quæ ab imo caule vulnerata sagapenum efficitur.

Peucedanū. Cap. XCII.

Peucedanum, caulem mittit tenuem, gracile tum, foeniculo similem: comam habet statim ab terra copiosam, spissamq;: flore luteo: radice nigra, crassa, graui odore, succosa, gignitur in montibus opacis. Tenera radix cultello conciditur, profluensque è plaga succus umbræ mandatur: in sole siquidè confestim euanescit. Colligitur capite prius & naribus rosaceo perfusis, ne capitis dolor premat, & vertigo sentiatur. Affatione radix inutilis fit. Tam lacq; succus radice & caulibus extrahi solet, sicuti è mādragora: verū inefficacior succo lachryma habet, & velocius expirat. Interdū etiā cōcreta inuenitur lachryma, thuris similitudine, caulibus radicibusq; adhærēs.

Præfertur

καὶ τὰς ἐκ ρινῶν αἰμορροίας ἐπέχει ἐντεθεῖσα. τὸ δὲ σπέρμα σποφυμύες πινόμνον ὠφελεῖ. καὶ ἰδρώτας κινεῖ χρομόνον μετ' ἐλαίου. οἱ δὲ χαυλοὶ βρωθέντες κεφαλαγῆς εἰσὶ. ταριχεύοντ' ὃ καὶ εἰς τὰς ἀλμεύσας. ὃ γὰρ καὶ διὰ χαυλὸν ἀναφέρει βίτην πολλὰς. φύλλα δ' ἔχει μαράσθω ἐμφερεῖ, παχύτερα δ' πολὺ καὶ μέζονα. ἐξ ἧς καὶ τὸ σαράπινον γίγεται, κολαπτομένου πρὸς τῇ ρίζῃ.

Πρὶ Πευκεδανῷ. Κεφ. εβ'.

Πευκίδανος χαυλὸν ἀνίστι λεπτὸν, ἰσχνόν, μαράσθω ὁμοιον· κόμην δ' ἔχει πλεονέκην ὡς ἰσχνὴ καὶ πυκνὴ. ἄνθος μέλινον, ρίζαν μέλαιναν, βαρύτερον, ἀδρανὲς μετὴν ὁπότε φύεται ἐν ἔρεσι συσκήοις. ὁ πίπτει δὲ ἡ ρίζη ἀπαλὴς ἀποτεμνομένης μαχαίρᾳ, καὶ τὸ ἀπορρέον ἐν ὕδρι ἐκ σκευῆς πίπτει. ὑπὸ γὰρ τῷ ἡλίῳ ἀνέεται, ἐν δ' τῷ συλλέγεσθαι κεφαλαγίαν ποιεῖ καὶ σκοτώματα. ἐὰν μὴ τις προδιαχρίσῃ αὐτὴν τὰς ρίνας ῥοδίνῳ καὶ τὴν κεφαλὴν προκαταβρέξῃ, ἄχνητος δὲ γίνεται ὁππότεῖται ἡ ρίζα. ὁπίζονται δὲ καὶ οἱ χαυλοὶ καὶ χυλίζοντ' ὃ καὶ ἡ ρίζα ὡς μαρδραγέρας ἢ πόνος δὲ ἐνεργεῖ τῷ χυλῷ, ὃ ὁπότε καὶ τὰ χροὶ ἐκπνέει. εἴοτε δὲ εὐεῖσκεται προπεπτηγὸς δάκρυον, ὁμοιον λιθωντῷ τοῖς χαυλοῖς καὶ ταῖς ρίζαις προπεπτηγμένον.

Τε

Τὴ δὲ ἐπεὶ διαφέρει ὁ ἐν σάρδωνίᾳ καὶ σαμοθράκῃ ἡ συνώνυμος, βαρύσμιμος, ἑκὶ κέρρος, διερχομένων τινὶ γέυσιν ἀρμόζει δὲ συνὶ ὄξυ καὶ ῥοδίνῳ καταχρῷμενος, λιθαρκίοις, 5 φρενιτικοῖς, σκοτωματικοῖς, ἐπιληπτικοῖς, κεφαλαλγῶσι χρονίως, παρὰλυτικοῖς, ἰσχιαδικοῖς. σπασμῶσι καὶ κατὰ τοὺς περὶ νῆυρα πάθεισι συλχρῷμος μετ' ἐλαίου καὶ ὄξυς. ἔστι δὲ καὶ ὁ σφραγιστικὸς πινυ 10 ρὸς ὑστερικῶς, καὶ τὸ καταφερεμένων ἀναπληρωτικὸς· δίδωκεν ὅτι θηρία συμῶμος ἀρμόζει δὲ καὶ πρὸς ὠταλίαν ἐνταξῶμος συνὶ ῥοδίνῳ καὶ πρὸς ὀδονταλίαν ἐντιξῶμος βρώμασι. ποιεῖ δὲ καὶ 15 πρὸς βήχας μετ' αὐτοῦ λαμβανόμενος δυπνοίας τὴν καὶ σφύρις καὶ πνευματικῶς διαδέσσειν ἀρμόζει, κοιλίαν τὴν ἡπίως μαλάσσει, καὶ σπληνῶα τήκει, καὶ δυσκίαν ἐξόχως ἀρήγει· πρὸς τὴν 20 πῆνους καὶ διατάσεις κύστεως καὶ νεφρῶν πινόμενος ποιεῖ· ἀνασσομοῖ δὲ καὶ ὑστέραν· χρυσόμην δὲ καὶ ἡ ῥίζα πρὸς τὰ αὐτὰ, ἐλαττον ἐν νεφροῖσι· πίνεται δὲ αὐτῇ τὸ ἀφελήμα, καὶ αἰεὶ δὲ λεῖα ἔχει· 25 τὰ ῥυπαρὰ ἔλκει, καὶ λεπίδας ἀπὸ ὀστέων ἀφίστησι, καὶ ἐπουλοῖ τὰ παλαιὰ· μύγνυται δὲ καὶ κηρωτῶς καὶ μαλάγμασι διερχομένη καὶ ἐκλέγει δὲ τινὶ πρὸς σφατον, ἔρωτον, σερῶν, πλήρη ὀσμῆς.

λύεται

Præfertur succus è Sardinia & Samothrace, colore rufo, odore graui, feruens gustu. Ex oleo & rosaceo illitum peucedanum prodest lethargicis, phreniticis, vertiginosis, comitialibus, & longis capitis doloribus, resolutis, ischiadicis, conuulsis : omnibus, in vniuersum, vitiis neruorum, ex oleo & aceto illitum, prodest. Eius olfactu respirant vuluæ strangulatus, & veternos reuocantur: incensum serpentes abigit. Aurium doloribus conuenienter ex rosaceo instillatur, cauernis dentitum inditum, mitigat dolorem: contra tussim efficacissimè ex ouo assumitur, suspiriisque, & torminibus, & inflationibus subuenit: ventrem leuiter emolli, lienem absumit, difficiles partus mirè adiuuat. Facit ad vesicæ cruciatus, & renum distictiones potum & vuluam aperit. Radix ad eadè utilis est, sed inefficacior: eius decoctū bibitur. Farina eius, sordida vlcera purgat, & vetera cicatrice obducit: squamas ofsiū extrahit. In cerata, & calfacientia malagmata addit. Radix eligi debet recens, quæ cariem non senserit, firma, odoris plena.

y

Succus

DIOSCORIDIS

Succus ad potiones amaris nucib⁹, aut ruta, aut pane calido, aut anetho resoluitur.

λύεται δὲ ὁ ὁπὸς εἰς τὰ πηκτήματα ἀμυγδαλοῖς πικροῖς, ἢ πηγματοῖς, ἢ ἀπ' αὐτῶν διεγμῶν, ἢ ἀνῆδα.

Gith, seu Melanthium.

Πρὶ Μελανθίου.

Cap. XCIII.

Κεφ. 57.

Gith exilibus furculis fruticat, sæpe binos dodrantes excedens: foliis vt senecionis minutis, sed multò tenuioribus: capitulo in cacumine tenui, paruo ceu papaueris, oblongo, intercursantibus intus membranis: quibus semen includitur nigrum, acre, odoratum, quod panibus inspargitur. Capitis doloribus illitum fronti, subuenit: discutit recentes oculorum suffusiones, tritum ex irino, & infusum naribus: tollit lepras, lentigines, duritias, tumoresque vetustos, cum acetato illitum: circumscarifatos clauos excutit, cum veteri vrina impositum: dentium doloribus, decoctum cum acetato & teda, prodest: teretes ventris tineas expellit, peruncto ex aqua vmbilico: destillatione laborantes adiuuat, tritum in linteo, & olfactum: vrinam & menstrua ciet, multis diebus sumptum, & lac extrahit: difficultatem spirandi cum vino potum leuat: phalangiorū

Μελάνθιον θαμνίσκος ὅστις λέγεται πτόκαφος διαπίδαμος ἢ καὶ μείζων φύλλα ἔχων μικρὰ ὡσπερ ἡ εὐρέωντος, λεπτότερα ὅ πολλῶν καὶ κεφάλιον ἔσθ' ἄκρη ἔχων, μικρὸν, ὡς μίκανος, ὅπμικας, ἔχον καὶ τὰ ἐντὸς διαφοράματα, ἐν οἷς καὶ τὸ σπέρμα μέλαν, δριμύ, ἐν ὧδες, καταπλάσσειν εἰς αὐτὰς. Ἀρμόζει ὅ καὶ κεφαλὰν τοῦσι καταπλάσσειν τῷ μετώπῳ, καὶ τοῖς ἀρ' ὀφθαλμοῖς. Ἐπο-
15 χεῖσθαι ἐλχέοντον εἰς τὰς ῥίνας καὶ ἰεῖν εὐλείον· αἶμα δὲ καὶ φακόν, καὶ λέπρας καὶ οἰδήματα παλαιὰ καὶ σκληρὰ συνὸν ὅξει καταπλάσσειν· καὶ ἡλούς* πειλάσαι χθόντας ἐκπινάσαι, συνὸν οἶνῳ παλαιῷ
20 ὅπτεσθαι· ὠφελεῖ δὲ καὶ ὁδονταλγίαν μετὰ ὅξους καὶ δαδίου ἐψηθὲν καὶ διακλυζέοντον ἐκπινάσαι δὲ καὶ ἑλμινδας προγύλας καταπλάσσειν τῷ ὀμφαλῷ καὶ ὕδατος, λεανθὲν δὲ καὶ ἐν
25 ἀποδέσμῳ δεσθὲν καὶ ὁσφραυνόμενον, τὸν καὶ ἀρρόιστον ὀφθαλμὸν πινόμενον δὲ πλείους ἡμέρας, ἑμμῆνα καὶ οὐρα καὶ γάλα ἄγει. παύει καὶ δύσπνοiam μετὰ οἶνου πεσέν· βορρῆς

βουθεῖ δὲ καὶ θαλασσιόχοις ὁ-
σον < ἀ. μὲν ὕδατος ποθέν διώ-
κει ὃ καὶ ἐρπετὰ θυμὸν ὕδρον. φασὶ
ὃ καὶ ἀναρεῖν αὐτὸ πλεῖον ποθέν.

Περὶ Σιλφίου. Κεφ. 51.

- 5 Σιλφίον Ἰουδαίᾳ ἐν τοῖς κατὰ
συρίαν καὶ ἀρμενίαν καὶ μέλαιαν
τόποις καὶ λιβύην, ὃ καὶ ὡς μά-
σπετον* καλεῖ ὅτι ἐμφερὲς νάρθηκι,
φύλλα ὃ ἔχει σελίνῳ ὅμοια σπέρ-
μα πλατύ. ρίζα δὲ θερμαστικὴ*
10 δὲ σπερτός, κίσεως κακωτικὴ ἰα-
ται δὲ χοιρᾶδας καὶ φύματα ἀ-
ναληφθεῖσα κυρῶτῃ, ἢ καὶ ὑπώπια
συνὲλαιώ κατὰπλάθεισα* συνὲ
ἐρίνη δὲ κυρῶτῃ ἢ κυρῶτῃ ἰσχυ-
ρα δικοῖς ἀρμόζει τὰς περὶ δακτύ-
15 λιών τε ἐξοχὰς, αἶρει σιδίῳ συνὲ
ὄξει ἐκπύει καὶ κατὰπλάθει-
σα* δανασίμων τέ ὅστιν ἀντὶ φάρ-
μακόν τινο μὲν ἐκ τοῦ σπέρματος τε ὅτι
μυρμηδόν καὶ εἰς βάρματα καὶ ἀ-
λας συλλέγεται δὲ ὁ ὅπως* ἐγχα-
20 ραζομένων τῶν ρίζης καὶ τῶ καυ-
λῶ. Διαφέρει δὲ αὐτὸ ὁ ὑπερῶδρος
καὶ διαφυγῆς, σμυρνήζων καὶ ἐν
τῇ ὁσμῇ εὐτόνος, μὴ περσίζων,
μὴ δὲ ἀπηνὲς πρὸς τὸ γένειν τῇ
γένει ἐν χερσὶν τε διειμένους ἐπὶ
τὸ λευκὸν χρώμα. ὁ μὲν τοι κυ-
25 ρηναικὸς καὶ ἐπὶ ὅλῳ τῷ σπέρματι
τῶ γένει, ἢ ἐκ μέρους κινεῖ καὶ ὁ-
λον τὸ σῶμα τῇ τῇ ὁσμῇ περσισ-
τέστατος. ὡς τε γυναικῶν τὸ σπέρμα,
μὴ δὲ πνεῖν εἰ μὴ ἐπὶ ὅλῳ τῷ σπέρματι
ὃ δὲ

langiorum morfibus ex aqua,
drachmæ pondere, haustu au-
xiliatur: incenso serpentes fu-
gantur. Tradunt largius epo-
tum enecare.

Laserpitium, & Laser.

Cap. XCIIII.

Laserpitium in Syria, Ar-
menia, Media, & Libya na-
scitur, caule ferulaceo, quem
maspetum vocant: foliis apio-
similibus: lato semine. Radix
excalfacit, in cibis ægrè con-
coquitur, vesicæ noxia: fugil-
latis illita cum oleo, & stru-
mis, ac tuberculis cum cera-
to, medetur: ischiadicis con-
uenit cum irino aut cyprino
cerato: excrescentibus circa
sedem tollendis illinitur, cum
putamine mali punici, & a-
ceto decocta: venenis pota
resistit: os commendat, cibis
aut sali permista. Laser è radi-
ce atque caule scarificatis col-
ligitur: præfertur autem rufum,
translucens, myrrhæ æmulum
non porraceum, odore va-
lens, suavi gustu: quod dilutum
facile albescit. Cyrenaicum
si quis degustarit, humorem to-
to corpore ciet, blandissimo
odore, adeò vt ne os quidem
gustanti nisi paululum spiret:

y ij Medi

DIOSCORIDIS

Medicum & Syriacum minus viribus valent, & magis virum reddunt odorem. Lafer omne antequam siccescat, adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento: quod maleficiumprehenditur, gustu, odore, visu, & dilutione. Caulem aliquid sulphurion, radicem magudarum, & folia maspeton vocare. Efficacissimum lafer, mox folia, postremo caulis. Acrem vim habet, inflatones facit: perunctas cum aceto, pipere & vino alopecias sanat: oculorum aciem exacuit, & incipientes suffusiones, illitum cum melle, dissipat: cauernis dentium in dolore inditur, aut cum thure in linteo circumligatur, aut cum hyssopo, ficis coctis in posca, os colluitur: iis prodest, quos bestia in rabiem efferrata momorderit, vulneribus immixtum: valet aduersus venena telorum, & animalia omnia, quæ virus eiaculantur, potum aut illitum: scorpionum plagis oleo dilutum circumlinitur: gangrænis præcoërcitis immittitur: & cum ruta, nitro & melle, vel per se, carbunculis: clauos callosq; prius circumrasos vellit:

cerato

ὁ δὲ μηδικὸς καὶ συριακὸς ἴσῃ δυνάμει εἰσὶν ἀδενέστεροι, καὶ βρωμαδέστεροι ἔχουσι τὸ ὀσμυρὸν. δολεροὶ δὲ πάντες ὅπως παρὰ τὴν ξηρανθῆναι, συναποκνῖν μυχνομήνου, ἢ ἀλεύρου ἐρεγγμίνου ὅπως διακρινεῖς τῇ γούσει, καὶ τῇ ὀσμῇ καὶ τῇ ὁσμῇ καὶ τῇ διέσει ἐνιοὶ δὲ τὸ μὲν χαλκὸν σιλφιον ἐν ἁλῇ λείπουν. τὸ δὲ ῥίζαν μαγδαριν, τὰ δὲ φύλλα μάσπετα. παρὰ κτήν κώτατος δὲ ὅσιν ὁ ὀπός, εἴτα τὰ φύλλα, εἴτα ὁ χαλκός. ἐστὶ δὲ φυ- 10 σώδης, καὶ δριμύς, ἀλωπεκίας τε, ραπύων, συνὸ οἶνω καὶ πεπέρει, καὶ ὄξει καταχρυσόμενος· ὁξύδεξιός τε ποικηλικός, καὶ ἀρχαυρῆς υποχρῶσεως διαπεδασικός συνὸ μέλιτι ἐγχρυσόμενος· παρὰ ὀδονταλ- 15 γίας τε ἐπιτίθεται εἰς τὰ βρώματα, καὶ ἐπιτίθεται συνὸ λίβανω τῷ ἐγχρυσθεῖς εἰς ὀδόντυν, καὶ διακλύζεται συνὸ ὑσώπω, καὶ σύκοις ἀφελιμηδαίοις συνὸ ὄξει κράτω, καὶ ἐπὶ λυσσηδῆκτων δὲ ὠφελεῖ ἐπὶ 20 πιδέμενος τοῖς τραύμασι, καὶ ἐπὶ τῶν ἰοφόλων ζώων παύτων καὶ τῶν φαρμακωδῶν τοξευμάτων, ἐγχρυσόμενος καὶ πινόμενος· ἐπὶ δὲ σκορπιόπληκτων ἐλαίῳ διεθείς φειαλείφεται, καὶ ἐπὶ γαγγραι- 25 νουμένων παρὰ καταχρυσέντων ἐνίσταται παρὰ τε ἀνδρακας μετὰ πηγαίου καὶ νίτρου καὶ μέλιτος, ἢ καὶ ἑαυτὸν, ἡλους τε καὶ τυλούς αἶρε παρὰ φειαχρυσέντας. 30

πορμαλα

περ μαλαχθεὶς κηρωτῇ, ἢ σὺκων
 ξηρῶν τῷ ἐντὸς, & ερπινεὶ καὶ
 λεγλῶας προσφάτως σὺν ὄξει,
 σαρκώματα δὲ πελὺποδας μὲν
 χαλκῆς ἢ ἰοῦ διαχρίόμενος
 5 ἐπὶ ἡμέρας πνῆς, ἐπισπᾶται
 ἐξοχὰς σὺν σαρκολαβίδι ἀρήγει
 δὲ καὶ βερόχων χροῖας βαρύνει
 σιφωνίῳ τῷ αἰφνιδίως διασυνδεῖ
 σαι ὕδατι διεδεῖς καὶ ἐπιρροφη-
 δεῖς, αὐτῆς ἀποκαθαίρει· κόγι-
 10 δὰς τῷ τέλει σὺν μέλιτι διαχρί-
 ομενος· συναγχοῖς τε ἀναγερ-
 εῖσιν μὲν μελικράτε ὠφελίμων·
 ἐν χροῦς ποιεῖ λαμβανόμε-
 νος ἐν διαίτη· βιχί τε ἀμύζει ἐν
 ὧν ῥοφίῳ διδόμενος· πλευριτι-
 15 κοῖς τε ἐν ῥοφίμασιν ἰκτερικοῖς
 τε καὶ ὕδρωπικοῖς ὠφελίμως δι-
 δοται μετὰ σὺκων ξηρῶν· λυεὶ καὶ
 ῥίγη σὺν πεπέρει καὶ λιβάνῳ πο-
 δεῖς καὶ οἶνον· τέτανικοῖς τε καὶ
 ὀστροτονικοῖς ὀβολοῦ ἑλκὴν πε-
 20 ειπλάσας, δίδου καταπίειν·
 βδέλλας δὲ τὰς προσεχρῆσθαι
 τῇ καταπίσει, ἀναγαραίζόμε-
 νος μετ' ὄξος ἀποβάλλει· καὶ τοῖς
 γάλα τεδρομωμένον ἐνδον ποιεῖ-
 σι καὶ ἐπιπλητικοῖς μετ' ὄξυ μέλι-
 25 τος λιφδεῖς βουδεῖ· ποδεῖς δὲ
 σὺν πεπέρει καὶ σμύρνη καταμή-
 νια ἄλφι· κοιλιακοῖς τῷ ἐν ῥαγὶ λαμ-
 βανόμενος σαφυλῆς ὠφελεῖ· με-
 τὰ δὲ κοῖας ποδεῖς, ὠφελεῖ τὰ
 αἰφνιδία σπασίματα, ῥήγματα·
 διαλύει

cerato aut aridorum ficuum
 carne præmolitum, recentes
 lichenas ex aceto sanat. Et ex-
 crescentia in carne, polipó-
 que, si aliquot diebus cum a-
 tramento futorio, aut ærugine
 illinatur: extuberantia cum for-
 fice extrahit. Veteribus fau-
 cium scabritiis opitulatur: gra-
 uem, subitoque irraucescen-
 tem vocem, dilutum aqua, for-
 bitione confestim expedit: v-
 uam illitum cum melle repri-
 mit: anginis ex aqua mulsa v-
 tilissimè gargarizatur: vescen-
 tes latiore colore mangoni-
 zat: tussi commodè in forbili
 ouo datur, & pleuriticis, in for-
 bitionibus: in fellis suffusio-
 ne, & aqua inter cutem, cum
 aridis ficis: horrores discutit
 cum vino, pipere, & thure po-
 tum: neruorum contractio-
 nibus, opisthotonicisque da-
 tur oboli pondere deuoran-
 dum: hærentes gulæ hirudi-
 nes, gargarizatum cum ace-
 to decutit: ad lac intus coagu-
 latum bibitur: comitialibus ex
 aceto mulso proficit: menses
 ciet, cum pipere & myrrha
 potum: coeliacos adiuuat, in
 acino vix sumptum: cum lixi-
 uio autem potui datum, repē-
 tē cōuulsis ruptisque prodest,
 y iij ad

DIOSCORIDIS

ad potiones resolvitur, nucibus amaris, aut ruta aut calido pane. Foliorū succo ad eadem proficitur, sed multò inefficacius: cum aceto mulso manditur, ad expediendam arteriam, maximè cum vox retunditur: eo cum lactucis vtuntur, exitque in vicem erucæ. Fertur & altera magudaris in Libya nasci, radix laserpitio similis, sed minus crassa, acris & fungosa, ex qua non profluit succus: eiusdem cum lasere facultatis.

Sagapenum. Cap. XCV.

Sagapenum ferulaceæ herbæ succus est, quæ in Media nascitur. Optimum est translucens, fuluo forinsecus colore, & intus albo, nescio quid inter laser, & galbanum redolens, gustu acri. Prodest laterum, & pectoris dolorib⁹, tussibus vetustis, conuulsis, & ruptis. Crassam pulmonis pituitā expurgat. Datur comitialibus, opisthotonicis, lienosis: itē contra neruorum resolutionem, perfrictiones, & febrium circuitus in potu: in vnguenta p- bē admittitur: mēses pellit, sed foetum exanimat, cum hydromelite potum: prodest ex vino haustum, serpentium ictibus: olfactum

διαλύεται δὲ εἰς τὰ ποτήματα ἀμυγδαλοῖς πικροῖς, ἢ πιναῖοις, ἢ ἄρτω θερμῷ. ὁ δὲ ὁπὸς τῶν φύλλων τὰ αὐτὰ μὲν ποιεῖται, ἔσχατον δὲ ἔλασσον· ἐπίεται δὲ μετ' ὀξυμέλιτος ἀρμόζων* πρὸς ἀρτηρίαν, μάλιστα δὲ ἀπικοπεῖσιν ἢ χοῖς· χερσὶν δὲ αὐτῷ καὶ μὲν θριδάκων ἐπίοντες αὐτὴ ἐν ζώ- μου. Λέγεται δὲ καὶ ἑτέρα μαγδαλεις ἡνωμένη ἐν λιβύῃ, ῥίζα παρρημία σιλφίω ἥτιον δὲ παρρηία, θριμεία καὶ χαύνη καὶ ὁπὸν μὲν ἔχουσα· ποιεῖ δὲ τὰ αὐτὰ τῷ σιλφίω.

Πρὶ Σαγαπήνη. Κεφ. cē.

Σαγάπηνον ὁπὸς ὅτι ποτὶς νασθηκοειδοῦς ἡνωμένης ἐν μη- δεία. διαφέρει δὲ αὐτὴ τὸ δια- γνῆς, ἔξωθεν μὲν κίρρον, ἐν δὲ τῷ ἐντὸς λευκόν, ὅζον μετὰ ξύ- σιλφίου καὶ χαλβάνης θριμὴν ἐν τῇ γένει· ποιεῖ δὲ πρὸς θώρα- κος καὶ πλεῖστας πόνοις, ῥήγματα, ἀσάσματα, βήχας χρονίους, πά- ρχαι τὰ ἐν πνεύμονι ἀνακαθάρει. δίδεται δὲ καὶ ἐπιληπτικοῖς, ἐπι- δοτονικοῖς, σπληνικοῖς παρ- λυτικοῖς, κατε- ψυχμένοις, πλειο- ποῖς πυρετοῖς ἐν ποτήμασι, καὶ ἐν συλχρίσμασι ὅτε φελίμως πρὸς- ἄγεται· ἄγει καὶ ἔμμηνα καὶ ἔμ- βρυα φθείρει σπινούδην μετ' ὕ-δρομέλιτος ἀρῆγει καὶ θηριοδύ- κτοις μετ' οἴνου λαμβανόμενον· διεγείρει

διεγείρει καὶ ὑπερκαῶς πιγρομύρας
μετ' ὅξους ὁσφαινόμηνον. οὐλαὶ τε
ἀποσμήχει τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς καὶ
ἀμβλυωπίας καὶ τὰ ἐπισκοποῦν-
τα τὰς κόρας καὶ ὑποχόματα.
5 διὰ λυγρὴν δὲ ὡς ὅτ' ὁπός, πηγ-
νω καὶ ὑδατι καὶ πικροῖς ἀμυγδα-
λοῖς ἢ μέλιτι ἢ ἄρτω θερμῷ.

Πῖπ' Εὐφορβία. Κεφ. 55.

Εὐφορβιον δένδρον ἔστι ναρθη-
κοειδὲς λιβυκόν, γληνόμενον ἐν Ἰω-
10 κτ' μαυριστάδα τριώλῳ. ὁποῦ
μεσὸν δριμυτά τε ὄν δεδοκότες
οἱ τῇδε ἀνθρώποι συλλέγουσι διὰ
τὸ ἐπιτίτα μύρον τῆς πυρώσεως,
κοιλίας γυνῶν περὶ ἀπίας πεπλυ-
μύρας ἀειδύσαντες τὸ δένδρον,
15 μακρόθεν ἀκοντίοις διαερῶσιν
αὐτὴ τὸν καυλόν. ἐνδέως δὲ ὡς
ἐκ πινος ἀγγεία πολὺς ἀποχεῖ
ὁπὸς εἰς τὰς κοιλίας καὶ ἀπορ-
ραίνεται δὲ καὶ εἰς τὴν γυνὴν ἐξ-
ακοντίζόμενος. ἔστι δὲ δύο γλῆν-
20 τὰ ὁποῦ τὸ μῖ, διαυγὲς ὡς σαφ-
κοκόλλα, κατὰ μέγεθος ὀρέβου.
τὸ δὲ τι ἐν ταῖς κοιλίαις ὑελῶ-
δες καὶ σπινθώδεις. δολοῦται δὲ καὶ
τῇ σαρκόκλῃ καὶ κολλῇ μυγ-
μύαις. ἐκλέγου δ' ἢ τ' διαυγὴ καὶ
25 δριμυτή. δυσδοκίματος δὲ ἔστι
ὁ τῇ γένει λαμβανόμενος, διὰ
τὸ ἀπαξ διηθείσης τῆς γλώττης
ἐπιμύρειν τὴν πύρωσιν ἐφ' ἰκα-
γὸν χρονον, ὡς τε παρ' τὸ περὶ τα-
γόμενον εὐφορβιον δοκεῖν εἶναι.
ἢ μύ

olfactum ex aceto valuarum
strangulatus excitat, oculo-
rum cicatrices, offusam cali-
ginem, hebetudines, suffusio-
nèsque detergit. Resolui-
tur vt laser, ruta, aqua, &
amaris nucib', aut mel-
le, aut callido pane.

Euphorbium. Cap. XCVI.

Euphorbium Libyca arbor
est, ferulæ speciem habens,
quæ in môte Atlâte iuxta Mau-
ritaniam inuenitur. Ea acerrimo
succo turget. cuius eximiū
feruorem expauescentes inco-
læ, ouillos ventres elutos, ar-
bori circumligant, & eminus
caulem contis incidunt, con-
festumque è plaga, perinde at-
que vase quodam, in ventricu-
los copiosus lactis humor ef-
fluit, præter id quod humi spar-
sum, vulnus eiaculatur. Duo
succu genera: vnum orobi ma-
gnitudine, sarcocollæ modo
emicat: alterum in ventriculis
concrefcit, atque vitreum spe-
ctatur. Eligendum est translu-
cens, & acre. Euphorbium a-
dulteratur sarcocollæ, & gluti-
ni mistione, sed difficile quidē
experimentum: quippe cū leuī
gustu, os accensū diu detineat,
adeo vt quicquid ori obijcia-
tur, planè euphorbiū resipiat.

y iij Eius

DIOSCORIDIS

Eius inuentio tempore Iubæ regis Libyæ cognita extitit. Succus illitu suffusiones discutit, potus tota die exurit: quare melli collyriisq; pro acrimoniæ ratione admisceri debet. Coxarum doloribus prodest in odorifera potione haustus: squamas oſium eadem die eximit: verum eo vtentes, necesse est linamentis aut ceratis communire corpus, quo ossa conueſtiuntur. Aliqui memoriæ prodiderunt, percussos à serpente nihil molesti passuros, si incisa offe tenuis capitis cute, intritus succus infundatur, vulnúsque postea consuatur.

Galbanū. Cap. XCVII.

GALBANVM succus est nascētis in Syria ferulæ, quod nonnulli metopium vocant. Maximè laudatur cartilaginosum, merum, thuris effigiem præbens, pingue, minimè lignosum, retinens nonnihil adiecti seminis, & ferulæ, graui odore, neque valde humidum, neque nimis aridum. Adulteratur faba fresca, resina & ammoniacico, Galbanum excalfacit, vrit, extrahit, discutit: menses ac partus trahit appositu vel suffitu: lentigines aceto

ἢ μὲν τοι οὖρεσις αὐτῆς καὶ ἰόβαν
τὸν βασιλέα τῆς λιβύης ἐπεγρό-
σθη. Διῶαμιν δὲ ἔχει ὁ ὅπος, δια-
φορητικὴν ὑποχυμάτων ἐγχειό-
μυρος, πυρρὴ μὲν τοι δι' ὅλης τῆς
ἡιέρας ποδεῖς ὅθεν μέλιτι μί- 5
γνυται, καὶ κολλυείοις καὶ ἀναλο-
γίαν τῆς δριμύτητος. ἀρμίζει καὶ
ἐγὼν δὴ γήμασι, μυεῖς ἀφώμα-
τικῶ ποτήματι καὶ πινόμυρος· ἀ-
φίσησι δὲ καὶ λεπίδας αὐτῆς μερόν·
δεῖ μὲν τοι χρωμύνης ἀσφαλίζε- 10
σαι τὴν περικυμύλῳ τοῖς ὀστοῖς
σάρκα, μο τοῖς ἢ κηρωταῖς. ἰσορῶ-
σι δὲ πνευ μηδὲν παρακαλεθεῖν
δυαχρὲς τοῖς ἐρπετοδῆκτοις, ἐὰν
τῆς ἐκκόψας ἀρχῇς ὅθεν τὸ δέρ-
μα τῆς κεφαλῆς, ἐλχὲν τὸν ὅπον 15
λεῖον καὶ ῥάβη τὸ τραύμα.

Πρὶ Χαλβάνης. Κεφ. 57.

Χαλβάνη ὅπως ὅστιν γὰρ θηκος
ἐν σεία θυνωμύρου, ἡ ἐνιοι με-
τώπον καλοῦσιν. ἐστὶ δὲ αὐτῆς
αἰεῖσι λιθανωειδῆς, χονδράδης, 20
καθαρὰ, λιπαρὰ, ἄξιλος ἔχου-
σα δὲ π τῷ σπέρματος καὶ τῷ γὰρ
θηκος κυρουμύρου, ὁσμὴ βαρεῖα.
οὐτ' ἄγαν ὑγρὰ, οὐτε πάλιν κα-
τάρχητος. δολοῦσι δὲ αὐτῇ μί-
γνῶντες ῥητίνῳ, καὶ ἐρεγμὸν καὶ 25
ἀμμωνιακόν. Διῶαμιν δὲ ἔχει
θερμαντικὴν, πυρρῶτικὴν, ὀπ-
σαστικὴν, διαφορητικὴν πρὸς
θεμύνην δὲ καὶ ὑποδυμωμύνην,
ἐμμύνη καὶ ἐμβρύνη ἀγχοφάκου

τε αἶρει μετ' ὄξους καὶ νίτρον ὀπ-
 πλαθεῖσα· κατὰ πίνεταί δὲ πρὸς
 παλαιὰν βίηα, δύσπνοιαν, ἁδ-
 ματα, ῥήματα, ἀσπασμῶν· ἀντι-
 πάχει δὲ καὶ τοξικῶν συν * ὄξει καὶ
 5 σμύρνῃ ποθεινῇ· ἐκβάλλει καὶ τε-
 σθηκότα ἐμβρυα ὁμοίως ληφθεῖ-
 σα· ὀπιτίζεται δὲ καὶ πρὸς ὀδύνην
 πλευρᾶς, καὶ πρὸς διδύμους· ὀπ-
 ληπτικοὶ τε καὶ ὑστερικὰς πύλας
 καὶ σκοτωματικοὺς ὀσφρανομῶν
 10 διεγείρει, θηρία τε θυμωμῶν
 διώκει, τοῖς τε συγχριστομῶν ἀ-
 δύκτοις τηρεῖ, σὺν σπονδύλῳ ᾧ καὶ
 ἡ αἰὼν φερεται· εἰσαῖρεται * κτεῖ-
 νη ὀδόντος τὸ πόνον φερεται·
 15 παύει· δοκεῖ δὲ καὶ δυσουρῶσι πι-
 εῖν· λυεῖ δὲ καὶ εἰς μὲν τὰ ποτήμα-
 τα, πικροῖς αὐγυδάλοις καὶ ὕδα-
 τι ἢ πηλῶν ἢ μελικράτων ἢ ἄρτω
 θερμῶ· ἡ δὲ μνησκονεῖ ἢ χαλ-
 κῶ κεχωμῶν, ἢ χολῇ ὑγρᾷ· κα-
 20 θάρσει δὲ αὐτὸ βελόμομος, καὶ εἰς
 εἰς ζῶν ὕδωρ· τακείσης γὰρ αὐ-
 τῆς, ὀπιπλεύσει τὸ ῥυπαρὸν· ὁ δὲ
 χειρῆς ἔστω· εἰς ὀδόντιον καὶ α-
 ρῶν ἀρῶν ἐνδύσας ἀποκρέμασον
 εἰς χαλκὴν πυξίδα ἢ ὀσράκιον
 25 ἀργεῖον, ὥς μὴ ἀπὸ τοῦ πυθμέ-
 νος τοῦ ἀργεῖος τὸν ἐνδεσμον· καὶ
 πωμάσας, εἰς ἀναβραστὸν ὕδωρ
 καὶ εἰς· οὕτω γὰρ τὸ μὲν νόστιμον ἀ-
 ποτακίσεται ὥς δι' ἡμῶν· τὸ δὲ
 ξυλωδες ἐν τῷ ὀδονίῳ μένει·

Πρὶ Αμ-

ceto & nitro perunctas tol-
 lit: deuoratur ad tussim vete-
 rem, difficultatem spirandi, su-
 spiria, rupta, conuulsa: aduer-
 satorum toxicis, potum cum vino
 & myrrha. simili modo sum-
 ptum mortuos partus extrahit:
 imponitur lateris doloribus, &
 furunculis: comitiales, & vul-
 uæ strangulatus, & vertigino-
 sos olfactu fuscitat: si vratur,
 fugat nidore serpentes, & per-
 unctos feriri non patitur: ser-
 pentes cum oleo & sphondy-
 lo circumpositum, necat: den-
 tium dolorem oblitum, aut ca-
 uernis inditum, mitigat: vri-
 næ difficili prodesse existima-
 tur. Resoluitur ad potiones a-
 maris nucibus, aqua, aut ru-
 ra, aut calido pane, multave.
 aliâs meconio, ære vsto, felle
 liquido. Si purgare Galbanum
 voles, in feruentem aquam de-
 mittito: nanque cum liquefa-
 ctum fuerit, eius sordes fluita-
 bunt: quas hoc modo facile se-
 parabis: mundo linteo raro
 que alligatū in fictili aut ærea
 pyxide ita pendeat, vt imum
 vasis ne tangat: opertoque va-
 se in feruidam aquam demitti-
 to: sic enim syncerū, veluti per
 colum eliquescet, & lignosum
 in linteo remanebit.

Ammo-

DIOSCORIDIS

Ammoniacum.

Cap. XCVIII.

Περὶ Ἀμμωνιακοῦ.

Κεφ. 57.

Ammoniacum, ferulæ succus est, quam iuxta Cyrenem Aphrica gignit: cuius fruticem cum radice agasyllim vocant. Probatur bene coloratum, ligni & calculorum expers, thuris similitudine, minutis glebis, densum, syncerum, nulla forde spurcatum, castoreum odore imitans, gustu amarum. hoc genus thrausma, id est, friaturam appellant: quod verò terram, & calculos collegit, phryrama. gignitur in Aphrica iuxta Ammonis oraculum, succum stillante ferulacea arbore. Mollit, extrahit, calfacit: tubercula duritiâsque discutit: potum, aluum soluit: partus extrahit, lienē cōsumit, drachmæ pōdere haustum: articulorum coxendicūmq; doloribus liberat: auxilio est anhelatoribus, orthopnoicis, comitialibus. Itē quibus humor in pectore coit, si cum melle delingatur, aut cū pitisanæ succo forbeatur: cruentam vrinā pellit: albugines oculorum absterget: genarum scabritiā absomit: tritū autem cū aceto, & impositū, iocineris lenisq; duritiâs sedat: discutit tofos, qui in artubus cōcalluerūt,

cum

Ἀμμωνιακόν, καὶ τοῦτο ὅπως
ὅτι ναφθικός, θηνωμένου ἐν τῇ
κατὰ κυρλίην λιβύη· καλεῖται δὲ
αὐτῇ ὁλος ὁ δάμνος (ὡς τῇ ῥίζῃ, ἢ
ἀρασουλίς. ἐγκριτέον δὲ αὐτοῦ
τὸ εὐχρῶσι καὶ ἄξυλον καὶ ἄλι-
δες, λιθανωτίζον τοῖς χόνδροις,
καθαρόν καὶ πυκνόν, μηδεμίαν
ἔχον ῥυπαρίαν, κασοείζον τῇ ὁσ-
μῇ, πικρὸν δὲ τῇ γύσει. καλεῖ- 10
ται δὲ τὸ τοιοῦτον, θραῦσμα·
τὸ δὲ γεῶδες ἢ λιθῶδες, φύρα-
μα. θηνώσκει δὲ ἐν λιβύῃ κατὰ
ἀμμώνα. χυλὸς ὢν δένδρου ναφ-
θικοῦ δού. Διῷαμιν δὲ ἔχει μα-
λακτικὴν, ἐπίσπαστικὴν, θερμαντι- 15
κὴν, διαφροσητικὴν σκληρωμάτων·
τὴν καὶ φυμάτων κοιλίαν τὴν ὡσά-
γει ποθέν· καὶ ἐμβρυα κατὰ σπῆ-
σπλῆνα τήκει μετ' ὄξους. ὁ δὲ πο-
θέν καὶ ἀφ' ἄρων καὶ ἰσίων διγνήματα
παρογιτῆται· βουθεῖ δὲ καὶ ἀσθ- 20
ματικοῖς, ὀρθοπνοϊκοῖς, ἐπληκτι-
κοῖς, καὶ τοῖς ὑγρὰσιαν ἐν θώρα-
κι ἔχουσιν, ἐκλειχόμενον μετὰ
μέλιτος, ἢ πλισσάνης βοφομένου
χυλῶ· ἄγει δὲ καὶ οὖρα αἵματώ-
δη· σμῆχει δὲ καὶ τὰ ἐν ὀφθαλ- 25
μοῖς λευκώματα· καὶ τραχύτητας
βλεφάρων τήκει. λειωθέν δὲ (ὡς
ὄξει καὶ ὀπιτεθέν, παύει τὰς πα-
ρεῖ σπληνῶ καὶ ἥπαρ σκληρίας·
λύει καὶ τὰς παρὰ τὰ ἀφ' ἄρα πώρας

μῆ

ρ^α μέλιτος καταπλασθόμενον, ἢ
 καὶ πείσῃ μίγν^υ· ποιεῖ καὶ πρὸς κό-
 πους καὶ ἰσχάδας συγχριόμενον,
 μίγν^υ ὅξει καὶ νίτρο καὶ κυπρίνῳ ἐ-
 λαίῳ ἀντὶ ἀκόπου.

5 Περὶ σαρκοκόλλας.

Κεφ. εθ.

Η δὲ σαρκοκόλλα ἐστὶ δάκρυον
 δένδρου θηρώμενον ἐν περσίδι,
 ὁμοῖός τις ἀθανάτῳ λεπτῷ, ὑπόκιρ-
 ρον, ἔμπικρον τῇ γούσει. Διῶα-
 10 μιν δὲ ἔχει κολλητικὴν τραυμά-
 των καὶ ἐρεκτικὴν τῶν ἐν ὀφθαλ-
 μοῖς ρευμάτων· μίγνυται δὲ καὶ
 ἐμπλαστροῖς. ὁδοῦται δὲ κόμ-
 μεως αὐτῇ μίγνυμένον.

Περὶ Γλαυκίου. Κεφ. ς.

15 Γλαύκιον χυλὸς ὅστις βοτάνης κα-
 τὰ ἱεράπολιν τῆς συρίας θηρώμε-
 νης, ὅμοιος δὲ αὐτῆς τὰ φύλλα τῆς
 κεραιτίπιδος μίνκωνος, λιπαρότε-
 ρα δὲ καὶ χαμῆϊστα, καὶ βαρύτε-
 ρα καὶ πικρότερα ἐν τῇ γούσει· χυ-
 20 λὸν δὲ ἔχει πολὺν προκίζοντα.
 ταύτης τὰ φύλλα βάλλοντες οἱ
 ἐπιχώριοι εἰς χύτραν, θερμαίνου-
 σιν ἐν κλισαῖοις ἡμιψυγέσῃ ἄχρη
 μαρμαρίου, ἕτα ἐκκόψαντες ἐκ-
 θλίβουσι τὸν χυλὸν· ἐστὶ δὲ ἡ χρῆ-
 25 σις αὐτῆ πρὸς τὰ ὀφθαλμικά, ἐν
 ἀρχῇ ψυκτικοῦ ὄντος.

Περὶ Κόλλας. Κεφ. ςα.

Κόλλα ἢ ἔριος ξυλοκόλλαν κα-
 λῶσιν ἢ ταυροκόλλαν, καλλίστη ἐ-
 στί ἢ ῥοδιανή, ἐκ τῆ βορείων βυρσῶν
 σκευα-

cum melle aut cum pice illi-
 tum. lassitudines, & coxendi-
 cum dolores eo perungi vtile
 est, cum nitro, & cyprino o-
 leo, vice acopi.

Sarcocolla.

Cap. XCIX.

Sarcocolla, lachrima est ar-
 boris in Perside nascentis, pol-
 lini thuris similis, rufa, gustu a-
 mara. Vulnera glutinat, oculo-
 rum fluxiones inhibet: em-
 plastris inseritur. Adul-
 teratur admisto
 gummi.

Glaucium. Cap. C.

Glaucium, succus est herbæ
 quæ ad Hierapolim Syriæ na-
 scitur, foliis ferè corniculati pa-
 paueris, pinguioribus tamen,
 in terram sparsis, odoris te-
 tri, gustus amari: tota croceo
 succo madet. Folia in olla fi-
 ctili semifrigidis clibanis cal-
 faciunt indigenæ, vsque dum
 flaccescant, deinde confusis
 succum exprimunt: cuius est
 vsus ad oculorum medicamen-
 ta, vtpote cum inter initia re-
 frigeret.

Glutinum. Cap. CI.

GLUTINVM, quod xy-
 locollan, alij taurocolla vocât,
 præstantissimum Rhodiaceum,
 quod

DIOSCORIDIS

quod ex bubulis coriis conficitur, id candidū est, & transluces. Nigrū verò minus probatur. Resolutū in aceto, impetigines leprāsque cutis delet: ambustis igni ex aqua calida dilutū illitūque, pustulas erumpere nō patitur. vulneribus prodest, melle aut aceto madefactum.

Glutinum piscium.

Cap. CII.

Ichthyocolla, gluten pisciū, vter est piscis cetacei. Præstat candicans, natione Ponticum, subasperum, minimè scabrū, & quod celerrimè liquefcit. Vtile emplastris, capitis & leprarum medicaminibus, & tetanothis, quæ cutem faciei erugant, & extendunt.

Viscum. Cap. CIII.

Viscum optimum est recēs, intus porraceum, extra fulvū, quod asperi nihil, aut furfurosi conceperit. Fit acinis in robore nascentibus, buxæ fruticis folio: contusum acinum lauat, & postea in aqua decoquunt. sunt qui commanducando ipsum efficiant. Gignitur quoque in malo, pyro, & plerisque aliis arboribus: quinetiā inuenitur in quorundam fruticū radicibus. Emollit, discutit, extrahit:

paro-

σκευαζομένη· ἔστι δὲ λευκὴ καὶ διαυγὴς ἢ τοιαύτη· ἢ δὲ μέλαινα ἢ τινος. Δυνάμει δὲ ἔχει λυθιέσαι ὅξει, λειχῶνας καὶ λέπρας τὰς ἐπιπολαίους ἀφιστρέειν. Πυλὴ καὶ τὰ τε οὐκ ἔα φλυκταίνουσαι μὲν ὅθεν τοῦ δερμοῦ ἐκτεθείσα καὶ κατὰ χρομὴν· ἔστι δὲ καὶ τραυματική, διεθεῖσαι μέλει καὶ ὅξει.

Περὶ Ἰχθυόκολλης.

Κεφ. ςβ'.

Ἡ δὲ Ἰχθυόκολλα λεγομένη ἰοκοιλία ὅστιν ἰχθύος κητώου. Διαφέρει δὲ ἢ ἐν πόντῳ θυνωμένη οὖσα λευκὴ, ὑπότρυαχος, οὐ φαρῶδης, τὰ χεῖρα τικκομένη ὀφθαλμοῖς δὲ εἰς τὰς κεφαλὰς ἐμπαλάσρους καὶ λεπτεῖα δυνάμεις, καὶ εἰς τὰ τὰ ὀφθαλμοῦ τῶν περὶ σῶπων.

Περὶ Ἰξοῦ.

Κεφ. ςγ'.

Ἰξὸς χαλὸς ὅστιν ὁ νέος καὶ περὶ σίζων τῷ χρωματι καὶ τὰ ἐν τῷ σίζων δὲ ὑπόξανθος, μηδὲν ἔχων τρυαχὴ ἢ πικρῶδες. γίνεταί τ' ἐκ πυρὸς κερπύου περὶ φερῆς θυνωμένη ἐν δρυὶ τῇ ἐχούσῃ τὰ φύλλα ὁμοία πύξω· κόπτεται δὲ ὁ κερπύς, εἴτα πλυνέτω, εἴτα ἐν ὕδατι ἔψεται. ἔνιοι δὲ μακρόμενοι αὐτὸν ἐξράζονται. γίνεταί δὲ καὶ ἐκ μηλέας καὶ ἀπίου καὶ ἐξ ἀλῶν δένδρων· εὐείσκειται δὲ καὶ πρὸς ῥίζαις θάμνων πηγῶν. Δυνάμει δὲ διαφορεῖν, μαλάσσειν, ἐπιπλάσσειν, συμ-

συμ-

συμπίπτον φύματα, παρωτίδας,
 καὶ τὰς ἄλλας ἀποστάσεις· μηρὶς
 ῥητίνῃ καὶ κηρῷ ἴσῳ, ἐπινυκτί-
 δας τὲ ἐν σπληνὶ ἰᾶται· σὺν λι-
 βανῶν δὲ ἔλκει παλαιὰ καὶ
 5 κακοήδεις ἀποστάσεις μαλαίνει·
 καὶ σπληνῶς πήκει σὺν ἀσβέ-
 σω ἢ γαγάτῃ λίθῳ ἢ ἀσίῳ ἐψη-
 δείς καὶ ἐπιτεθείς· ἔλκει δὲ καὶ
 ὄνυχας σὺν ἀρτενικῷ ἢ σανδα-
 ράχῃ, ἐπιπλαθεὶς· μηρὶς δὲ ἀσ-
 10 βέσω καὶ τρυγί, ἐπιτείνει τὴν δύ-
 ταν αὐτῆς.

Περὶ Απαρίνης. Κεφ. ρδ'.

Απαρίνη, οἱ δὲ, ἀμπελόκαρ-
 πον, οἱ δὲ, ὀμφαλόκαρπον, οἱ δὲ, φι-
 λαύθρων καλούσιν, οἱ δὲ, ἰζόν·
 15 κλώνες πολλοὶ, μικροὶ, τετραγώ-
 νοι, τραχεῖς· φύλλα δὲ ἐν διαστή-
 ματος κυκλοτερεῶς περικείμενα
 ὡς ὅτε τὰ ἔριθροδάνη· ἀνθὴ λευ-
 κὰ· σπέρμα σκληρὸν, λευκόν, στρογ-
 γύλον, ὑπόκλειον ἐν μέσῳ ὡς ὀμ-
 20 φῆδος, προσέρχεται δὲ καὶ ἱμα-
 τίοις ἢ πύα· χεῶνται δὲ αὐτῇ καὶ
 οἱ ποιωδὲς ἀντὶ ἡθμοῦ ἐπὶ τῷ γα-
 λακτοῖ, πρὸς ἔκκλησιν τῶν ἐν αὐ-
 τῷ τειχῶν. Ταύτης τὸ σπέρμα
 καὶ οἱ χαυλοὶ καὶ τὰ φύλλα χυ-
 25 λιδέντα, φθαλγιοδύνκτοις καὶ ἐ-
 χιοδύνκτοις βοηθεῖ πινόμενον με-
 τὰ οἴνου· καὶ ὠπαλίας ἰᾶται ὁ χυ-
 λὸς ἐγχυματίζομενος· ἢ δὲ πύα
 ἀνελκυσθεῖσα ὀξυγγίῳ λείῳ, δια-
 φορεῖ χοιρέας.

Περὶ Αλύ-

parotidas, tubercula, cæterásq;
 collectiones ad maturationem
 perducit: cum resina autem, &
 cera pari, epinyctidas in sple-
 nio sanat: vetera vlcera abscef-
 susq; quos cachoëthes vocant,
 ex thure mollit: lienem cū cal-
 ce, gagate, aut Asio lapide co-
 ctum & impositum absūmit:
 cū sandaracha, aut auripigmé-
 to illitum, vngues extrahit: mi-
 stum cum calce, & vini sface,
 suam vim intendit.

Aparine. Cap. CIIII.

Aparine ramis multis, &
 paruis fruticat, asperis, qua-
 drangulis, per interualla orbi-
 culato foliorum ambitu, vt in
 rubia: flos albus: semen du-
 rum, rotundum, concavum,
 album, vmbilici figura, aspe-
 ritate vestium tenaci. Ea pa-
 stores coli vice vtuntur, ad
 eximendos è lacte pilos. Sem-
 inis, caulium, ac foliorum
 succus, potu contra vipera-
 rum phalangiorumque mor-
 sus auxiliatur: infusu au-
 rium dolori medetur.

Herba cum axun-
 gia trita stru-
 mas dis-
 cutit.

Alyssum.

DIOSCORIDIS.

Alyssum. Cap. CV.

Alysson exiguus frutex est, vnicaulis, subasper, rotundis foliis: fructu duplicium scutorum effigie, in quo est semen, quadamtenus latū, in montibus, & asperis locis emicat. Eius decoctum singultus sine febris, potu discutit: idē efficit, si quis eā aut teneat, aut odoretur: cū melle trita, vitia cutis in facie, & lentigines emēdat. contusa in edulio, rabiei canis mederi putatur. domibus appensa salutaris esse creditur, & hominibus atque animalibus fascini amuletum. Purpureo linteo circumligata, pecorū morbos abigit.

Asclepias. Cap. CVI.

Asclepias ramos emittit longos: folia hederæ, longa: radices numerosas, tenues, odoratas: floris virus graue: semen securidacæ. nascitur in montibus. Radices ex vino potę torminibus auxiliātur, & contra serpentii ictus. Folia aduersus vuluæ mammarūmq; vlcera, quæ caecœthe vocant, illinuntur.

Atractylis. Cap. CVII.

Atractylis, spina est cnico similis, folia multò longiora ferens in summis virgis, magna parte nuda, asperaque, qua foemine pro fusis vtuntur: capi-

Περὶ Αλύσου. Κεφ. ρε.

Αλυσον φρυγανιόν ἔστιν, ὑπό-
τραχυ, φύλλα ἔχον σπογγύλα παρ
οἷς ὁ καρπὸς ὡς ἀσπίδι σπία δι-
δίπλα, ἐν οἷς τὸ σπέρμα ὑπό-
πλατυ. φύεῖ ἐν ὄρεσιν καὶ τραχέ-
σι τοῖσι. Ταύτης τὸ ἀφέλημα
ποδὲν, λυγμοὺς τοῦ διχα πυρε-
τὸς λύει· καὶ κρατῆδεν ὃ ἢ ὁσφραν-
δὲν, τὸ αὐτὸ δρα· σὺν μέλιτι δὲ
λεῖον, φακοὺς καὶ ἔφηλιν ἀποκα-
θαίρει· δοκεῖ δὲ καὶ λύσαν κυνὸς 10
ἰᾶσθαι. συγκοπὴν ἐδέσμιαι καὶ
δοδὲν, καὶ κρεμὰ μύρον δὲ ἐν οἴκῳ,
ὕμνηδον λέγεται εἶναι καὶ ἀνδρώ-
ποις καὶ ζώοις ἀλάσκατον. πε-
αφδὲν δὲ φοινικῶ ῥάκει, δρεμ-
μάτων νόσοις ἀπελάνει. 15

Περὶ Ασκληπιάδος. Κεφ. ρς.

Ασκληπίας κλωνία ἀνίστι μα-
κρά· ἐφ' ὧν φύλλα μακρὰ καὶ ὡς
ὁμοία· ῥίζας πολλὰς καὶ λεπτάς
ἐνώδης· ἄνθος βαρυόστιον· σπέρμα
ὃ ὡς πελεκύνη. φύεῖ ἐν ὄρεσι. βόη 20
δοῦσι δὲ αἱ ῥίζαι ἐν οἴνῳ πίνου-
ναι, σφοδρῶς καὶ θνητοδύντοις·
καὶ τὰ φύλλα καταπλαττόμενα,
ἀρμόζει πρὸς τὰς ἐν μαστοῖς καὶ
μήτρας κακονδείας.

Περὶ Ἀρακτυλίδος. Κεφ. ρζ.

Ἀρακτυλὶς ἀκανθὰ ἐστὶν εἰσικύα
κνήκῳ, μακρότερα ὃ πολλῶ φύλ-
λα ἔχουσα ἐπ' ἅκρη τ' ῥαβδίων τὸ
δὲ πλεῖον γυμνὸν τραχὺ, ὃ καὶ αἱ
γυνῶκες χεῖνται ἀπὸ τῆς ἀράκης·
ἔχει

ἔχει δὲ καὶ κεφάλια ἐπ' ἄκρου
ἀκανθώδη· ἀνθος ὠχρόν· ῥίζα
δὲ λεπτή ἄχρητος. ταύτης τὰ
φύλλα καὶ ἡ κόμην καὶ ὁ καρπὸς
λεία ποτίζοντα (ὡς πεπείρει καὶ
οἶνω, σιροποπλήκτοις ὠφελεῖ.
ἐνιοὶ δ' ἰσορροῦσι τὸς παληγύτας,
ἄχρητος ἂν κρατῶσι τὴν πᾶν
ἀνωδυνίαν εἶναι. ἀποθευόμενοι
δὲ δὴ γέν.

Περί πολυκνήμου.

10 Κεφ. ρή.

Πολύκνημον δάμνος ἐστὶ θρυγα-
νώδης, ἔχων φύλλα δειγνύω ἐμ-
φρῆ· ἢ καυλὸν πολυγόνον ὡς
τὸ γλήχωνος, ἐκ ἔχει μὲν τοὶ τὸ
σκιᾶδιον, μικρὰ δ' ἐπ' ἄκρῳ κο-
15 ρύμβια μετ' ἑνωδίας τινὸς δρι-
μείας. Ποιεῖ ἢ χαλασπαστόμηνον
χλωρὸν ἢ ξηρὸν μετ' ὕδατος, πρὸς
σφαύματα, κολλᾶσα· δεῖ ἢ πεμ-
πιᾶν λύειν. πίνε' ἢ καὶ πρὸς τραγ-
ουείαν καὶ ῥήγματα συλ' οἶνω.

20 Περὶ Κλινοποδίου. Κεφ. ρθ'.

Κλινοπόδιον θαμνίον ὅστι καὶ
τοῦτο θρυγανώδες διασπιδάμνον,
φυόμηνον ἐν πέτραις, ἔχων φύλ-
λα ἐξ πύκῃ παραπλήσια. καὶ τὰ
ἄνθη ὁμοία ὡς κλίνης ποσὶν, ἐκ-
25 διασημάτων ἐμφερῆ ποσάτω.
Πίνεται δὲ ἡ πᾶσα καὶ τὸ ἀφέλη-
μα αὐτῆς, πρὸς θνείων δήγματα
καὶ σπασματα, καὶ ῥήγμα-
τα καὶ τραγουείαν ἄγει καὶ ἐμμη-
να, καὶ ἐμβρυα, καὶ ἀκροχορδόνες
ἀπο-

capitula in cacumine spinis
horrent: flos luteus: quibusdam
in locis purpureus inuenitur:
radix tenuis, superuacua. Co-
ma, semē & folia cū pipere, &
vino teruntur vtilissimē cōtra
scorpionū ictus. percussos tra-
dūt quādiu ea teneatur herba,
nullū experiri dolorē, ipsumq;
deposita statim recrudescere.

Polycneinum.

Cap. CVIII.

Polycnemon, frutex est sur-
culosus, foliis origani: caule, vt
putegij, geniculis multis inter-
cepto, sine umbella, tenui tamē
in cacumine corymbo, boni
odoris, & acris. Vulneribus ag-
glutinandis recens, aut aridum
cum aqua, efficaciter illinitur:
sed quinto die solui debet. Ad
vrinæ stillicidia ruptaque, cum
vino bibitur.

Clinopodiū. Cap. CIX.

Clinopodium frutex est foliis
serpillo similis, furculosus, du-
ūm dodrantū altitudine. nasci-
tur in petrosis. Flores, marrubij
modo, ex interuallis distincti
speciē lecti pedū præbēt. Bibi-
tur herba & succi ei' decoctū,
ad conuulsa, rupta, stragurias,
serpentiū ictus: menses & par-
tus pellit: & penfiles verrucas,
quas acrochordonas vocant,
eicit,

DIOSCORIDIS

elicit, aliquod diebus potū. al-
uum sistit decoctū ad tertias,
potūmque, si febrim sentiunt,
ex aqua, alioquin ex vino.

Leontopetalum.

Cap. CX.

Leontopetalon caulem e-
mittit dodrantalem, aut altio-
rem, plurimis alis concavum,
& in cacumine semina par-
ua duo aut tria, in filiquis, ci-
ceris modo: flores anemonæ
similes, punicei coloris: folia
brassicæ, sed papaveris diuifu-
ra: radicibus nigris, rapæ simi-
libus, strumosis. nascitur in a-
ruis & segetibus. Radix auxi-
liatur serpétium ictibus, ex vi-
no pota. nec alia res celerius
dolorem finit. Miscetur ischia-
dicorum clysteribus.

Teucrium.

Cap. CXI.

Teucrion, siue vt aliis pla-
cet teucriis, herba est virgæ re-
ferens effigiem, trissaginis si-
militudine, tenui folio, non
multum à cicere alieno. hæc
in Cilicia iuxta Gentiadem
Cissadémque vberim proue-
rnt. Recens cum posca, aut a-
ridæ feruefactæ ius, potu lie-
nem potenter absumit: lienos-
is cum aceto & ficis illinitur:

item

ἀποβάλλει ἐφ' ἡμέρας πέν-
τε ἡμέρας. κοιλίαν τὴν ἐστὶν ἐπὶ βί-
τον ἐξ ἡμέρας καὶ πέντε ἡμέρας, ἀ-
πυρέτοις ἐν οἴνῳ, πυρέτεσι δὲ
δὴ ὕδατος.

Περὶ Λεοντοπέταλου. Κεφ. ρι. ε.

Λεοντοπέταλον χαλκὸν ἀνίστι
σπιδαιμαῖον, ἢ καὶ μείζονα, ἔχον-
τα μαχάλας παλίστας, ἐφ' ὧν ἄ-
κρων λοβοὶ ὅμοιοι ἐρεβίνθοις, ἐν
δὲ τούτοις δύο ἢ τρεῖς σπέρμα-
τα· αὐτὰ φοινικῶς, εὐκότα ἀνέμῳ 10
γῇ· φύλλα δὲ ὅμοια κράμβῃ, ἐν-
τετμημένα ὡς τὰ τῆς μήκωνος·
ρίζα μέλαινα ὅσῃς γογγύλη, ἐξο-
χὰς ἔχουσα κατὰ τὴν κοινὴν δύλιν.
πινάς. φύεται δὲ ἐν ἀρούραις καὶ
ἐν τῷ σίτῳ. ταύτης ἡ ρίζα συνὶ 15
οἴνῳ πινόμενη, βοηθεῖ ἐρπετοδύ-
κτοις. ταχέως ἀπόνους ποιοῦσα.
μίσγεται δὲ καὶ εἰς τὸν ἰσχυρὸν
καὶ κλυσμοῦ.

Περὶ Τευκρίου. Κεφ. ρι. δ.

Τεύκριον, οἱ δὲ καὶ τοῦτο χα- 20
μαῖδρον καλοῦσιν, πᾶσι βλάβει-
δὲς εὐκοῖνα χαμαῖδρυν, λεπτό-
φυλλος, ἔχουσα ἐρεβίνθῳ πέτα-
λον ὅμοιον. φύεται δὲ παλίστον ἐν
κλικίᾳ τῇ κατὰ* γηπάδα καὶ
κισσάδα καλουμένη. Διῶαμιν 25
δὲ ἔχει χλωρὰ μετ' ὀξυκράτου
ποδεῖσα ἢ ξηρὰ ἀποζεδείσα καὶ
πινομένη, σπληνῶν τήκεν ἰσχυ-
ρῶς. κατὰ πλάσεται δὲ μετὰ σπ-
κων καὶ ὄξοις ἐπὶ σπληνικῶν.
ἐπὶ

ἐπὶ θηριοδυνκτῶν δὲ μετ' ὄξους
μύου χρεῖς σύκων.

Περὶ Χαμαίδρου. Κεφ. ριζ'.

Χαμαΐδρις, οἱ δὲ χαμαΐδρωι,
ἢ λινόδρις. διὰ δὲ τὸ σώζειν πνῶ
ἐμφέρειαν τῷ τευκρίῳ, καὶ ταύτῃ
πνῆς τευκρίον ἐκάλεσαν. φύεται
ἐν τραχέσι καὶ πετρώδεσι τό-
ποις· ἐστὶ δὲ δαμνίσκος σπι. δαμι-
αῖος, φύλλα ἔχων μικρὰ τῷ ῥή-
ματι καὶ τῇ ῥίζῃ δρυὸς ὁμοία,
10 πικρὰ· ἄνθος ὑποπέρφουρον, μι-
κρόν. συλλέγειν δὲ αὐτὸν δεῖ ἐγ-
κλῆμονα τοῦ καρποῦ. Δυνάμιν
δὲ ἔχει χλωρὰ ἀφελῆσαι σὺν
ὑδατι καὶ ποπιζομένη, βοηθεῖν
σπλάσμασι, βηλῇ, σπλῶνι ἐσκιρ-
15 ρομένη, δυσουρεῦσιν, ὑδρωπι-
κοῖς ἐν ἀρχαῖς· ἄρει καὶ ἐμμηνα καὶ
ἐμβρυα, σπλῶνι τήκει (ὡς ὅξει
ποδείσα· πρὸς δὲ τὰ θηρία σὺν
οἴνῳ πινόμεν, καὶ καταπλασσομένη
ποιεῖ. λέει δὲ δυνάται καὶ εἰς
20 καταπότια ἀναπλάσσειν πρὸς
τὰ εἰρημνά· καὶ ἀνακαθαίρειν ἐλ-
κὴ παλαιὰ (ὡς μέλιτι· αἶρει δὲ
ἀχνὺς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς σὺν ἐ-
λαίῳ λέει ἐν χειρὶ μὲν καὶ ἀλει-
φομένη. ἐστὶ δὲ δερμαντική.

25 Περὶ Λευκάδος. Κεφ. ργ'.

Λευκὰς ὄρετιν, πλατυφυλλό-
τερα τῆς ἡμέρου ὅτι, δριμύτε-
ρόν τε καὶ παρύτερον ἔχουσα τὸν
καρπὸν καὶ ἀσπομώτερον, δραστικώ-
τερα μὲν τοι τυγχάνει τῇ ἡμέρῳ.

ἐπι-

item serpentium morsibus ex
aceto solo, sine ficis.

Triffago. Cap. CXII.

Chamædri Græcis, aliis cha-
mædrops: Latinis truffago di-
citur. sunt qui eam teucrion
appellauere, propter eā quam
cum teucro feruat similitudi-
nem. Nascitur in petrosis &
asperis: frutex dodrantalis, fo-
lia habens exigua, amara, effi-
gie & diuisura quercus: flore
paruo, penè purpureo. Car-
pitur semine prægnans. Re-
cens in aqua decocta, potu
tusibus, indurato lieni, urinæ
difficultati, incipientibus hy-
dropicis, auxiliatur: cit men-
ses: partus extrahit, lienem ex
aceto pota confumit: aduer-
sus serpentium venena ex vi-
no, potu, illituque efficacissi-
ma. Trita digeritur in pastil-
los ad supradicta: purgat vete-
ra ylcera, cum melle: cum

oleo illita, caliginem o-
culorum discutit:

natura eius

est calfa-
cere.

Leucas. Cap. CXIII.

Leucas montana, latioribus
q̄ vrbana foliis, semine acro-
re, amariore, ori ingrato, effica-
cior tamen q̄ satiuā habetur:

z Vtraq;

DIOSCORIDIS

Vtraque ex vino cōtra anima-
lium venena, præcipuè mari-
norum opitulatur.

Lychnis coronaria.

Cap. CXIII.

Lychnis coronaria, flore est
albæ violæ simili, sed purpu-
reo quo corollæ factitantur.
Contra scorpionum ictus se-
men in vino potum auxilia-
tur.

Lychnis sylvestris.

Cap. CXV.

Lychnis sylvestris, omnia vr-
banæ similis. Bilem per alium
detrahit, femine duabus drach-
mis poto: ictis à scorpione sub-
uenit. Aiunt huius herbæ
appositu, scorpiones
torpescere, & in-
ertes prorsus
reddi.

Lilium. Cap. CXVI.

LILIA coronamentis se-
dedunt, Liria à quibusdam vo-
cata. E quibus vnguētum tem-
peratur quod aliqui lirinum,
alij fusinum appellant, ner-
uos & priuatim vuluæ duri-
tias emolliens. Folia herbæ il-
lita, contra serpentium ictus
auxiliantur: feruefacta, am-
bustis proficiunt: aceto con-
dita, vulneribus opitulantur.

Succus

ἐπιπλαστέμναι ὃ ἀμφοτέραι καὶ
πινόμναι, ἀρμόζοισι μετ' οἴνου
ἐπὶ τῶν ἰοθέλων, καὶ μάλιστα τῶν
θαλασίων.

Πεὶ Λυχίδος σεφανωμα-
τικῆς. Κεφ. ριδ'.

Λυχὶς σεφανωματικὴ, αἴθος
ὅστις ὁμοίον λευκῶϊ, ἐμπέφυγεν
δὲ πλεκόμνον εἰς τὰ σεφάνια.
ἥς τὸ σπέρμα βονδεῖ σὺν οἴνῳ πο-
τὸν σκορποπλήκτοις.

Πρὶ Λυχίδος ἀγείας.

10

Κεφ. ρι'.

Λυχὶς ἀγεία ὁμοία τῇ ἡμέ-
ρῳ κατὰ πάντα. τὸ δὲ σπέρμα
αὐτῆς < β'. πλεῖστος ποτὲν ἄγει
κατὰ κοιλίαν χολώδῃ καὶ σκορ-
ποπλήκτοις ἀρμόζει. φασὶ δὲ καὶ 15
τοὺς σκορπίους νερκάδεις καὶ ἀ-
περάκτους γίνεσθαι παρατεθείσης
αὐτοῖς τῆς πόας.

Πεὶ Κείνου.

Κεφ. ρις'.

Κείνον βασιλικόν, τούτου τὸ 20
αἴθος σεφανωμάτικόν ὅστις καλὴ-
μόνον ἔσ' ἐνίων λείριον. ἀφ' οὗ
καὶ τὸ χρίσμα κατασκευάζεται
ὅτινες λείριον, οἱ δὲ σύσσηον κα-
λοῦσι, μαλακτικόν ὃν τῶν νεύ-
ρων, καὶ ἰδίως τῶν περὶ μῆτραν 25
σκληρῶν. τῆς δὲ πίας τὰ φύλ-
λα καταπλαστέμνα, ἐρπετοδύ-
κτοις βονδεῖ· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ
καύματα ζεδέντα· τὰ ριχνθέν-
τα ὃ ἐν ὅξϊ τρυμαπικὰ γίνονται.
ὁ δὲ

ὃ ὃ χυλὸς αὐτῶν μὴ ἐὶ ὄξει· ἢ μέ-
 λιπ, ἐψηθεὶς τε ἐν χαλκῷ μα-
 τι ὑγρῷ γίνεται φάρμακον πρὸς
 τὰ παλαιὰ ἔλκη, καὶ πρὸς φά-
 γατα τραύματα. ἢ δὲ ρίζα ὀπλῆ
 5 λεία σὺν ῥοδίῳ, πυρίχλωτα ἰσ-
 ται, καὶ ὑπεραν μαλίσται καὶ ἐμ-
 μύωσιν ἀγρίῃ καὶ ἔλκῃ ἐπούλοι· σὺν
 μέλιτι δὲ λεανθεῖσα νεύρων δια-
 κοπὰς καὶ σπέρματα ἰσχύται· ἄλ-
 φοῖς τε ἀποκαθαίρει καὶ λέπρας,
 10 καὶ πίτυρα· καὶ ἀχῶρας σμη-
 ρει, τὰ τε πρὸς ὤπα καθαίρει καὶ
 ἀρρῦν πύθεται ποιεῖ· ὣν ὄξει δὲ
 λεία ἢ σὺν ὑόσχυάμου φύλλοις,
 καὶ ἀλευρῷ πυρίνῳ, ὀρεχῶν φλεγ-
 μονὰς παραιρεῖται. τὸ δὲ σπέρμα
 15 ἐρπετῶν δόγμασιν ἀντιφάρμα-
 κον ποιεῖν· ἐρισιπλάτων δὲ κα-
 τὰ πλάσμα σὺν οἴνῳ λεανθέντα,
 τὸ τε σπέρμα καὶ τὰ φύλλα· φα-
 σὶ δὲ πνεῖς καὶ πορφύρεα ἀνθὴ κρι-
 νου γίνεσθαι. ἐναργέστατα δὲ χυ-
 20 νάται ἐν τῇ στείᾳ καὶ πσιδία τῆς
 παμφυλίας πρὸς τὴν τῆς χρίσ-
 ματος κατασκευὴν.

Περὶ Βαλλωτῆς.

Κεφ. ριζ'.

Βαλλωτὴ ἢ μέλαν πρὸς ὅσον χα-
 λῆς ἀνήκει τετραγώνος, μέλανας,
 25 ὑποδάπτει, ἐκ μιᾶς ρίζης πλείο-
 νας φύλλα δὲ πρὸς πῶ ὁμοία με-
 ζονα δὲ καὶ στρογγυλότερα καὶ διαστέ-
 διασημάτων τοῦ χαμηλοῦ παρα-
 πλήσια μελανοφύλλου, δυσώδη.

ἔστιν

Succus adiecto melle aut ace-
 to, in æreo vase coquitur, con-
 uenienti medicamento vetu-
 stati vlcerum, & ad recentia
 vulnera. Inassata radix & ex
 rosaceo trita, igni ambusta fa-
 nat, vuluam emollit, menses
 ciet, vlcera cicatrice obducit:
 cum melle detrita, neruis præ-
 cisis, luxatisque medetur: vi-
 tiligines, furfures, & lepras e-
 mendat: vlceraque in capite
 manantia expurgat: abstergit
 faciem & erugat: teritur in a-
 ceto cum hyōscyami foliis, &
 farina tritici, mulcendis testi-
 um inflammationibus. Semen
 potum moribus serpentium
 aduersatur: ignibus sacris fe-
 men & folia cum vino illinun-
 tur. Tradunt & rubra esse
 lilia. In Syria autem &
 Pisidia Paphiliæ, effi-
 caciissima vnguen-
 tis nascun-
 tur.

Ballote. Cap. CXVII.

Balloten, nomine alio nigrū
 marrubiū vocant: caules ædit
 quadrangulos, nigros, subhir-
 futos, cōplures ex vna radice:
 foliis maioribus quàm marru-
 bij, hispidis, cingentibus per in-
 terualla caulē, subrotundis gra-
 uelolētib, apiastro proximis.

z ij vnde

DIOSCORIDIS

unde aliqui apiastrum eam vocauerunt: candidi flores vniuersi verticillato ambitu caulem coronant. Vis eius efficax aduersus canis morsus, foliis exsale illitis: feruenti cinere flaccescunt folia, vt condylomata reprimant. purgant & fordida vlcera cum melle.

Apiastrum. Cap. CXVIII.

Melissophyllon siue melitena, id est, apiastrum, id sibi nomen vsurpauit, quoniam apes ipsa herba delectantur, cauliculi & folia ballotæ, de qua paulò antè diximus, similia essent, nisi maiora, tenuioraque, nec ita hirsuta spectarentur: citreum malum olent. Folia cū vino pota aut illita profunt contra ictus phalangiorum, scorpionumque: item aduersus canis morsum. Decoctum eorundem gratia, foueri prodest: defectionibus foeminarum ad ciundos menses conuenit, dentes eodem in dolore colluuntur, dysentericis infunditur. Fungorum strangulationibus folia, addito nitro, potu auxiliantur: torminibus & orthopnoicis, delinctu. Illita cum sale strumas discutiunt, vlcera purgant, articulares dolores illita sedant.

Marru-

ὅθεν καὶ τοῦτο μελισσόφυλλον ἐκάλεσαν· καὶ τὰ αὖθι δὲ ἅμα περιέκειται λευκοῖς τοῖς χαυλοῖς προχειδῶς. Ταύτης τὰ φύλλα καταπλασθέντα μὲν δὲ ὄν, πειτὶ πρὸς τὰ κυνόδηκτα· μαρτυρῶντα δὲ ἐν θερμοσποδίᾳ, κοινωλύματα σέλει· ῥυπαρά τε ἔλκη συν μέλιτι ἀποκαθαίρει.

Πρὶ Μελισσοφύλλου. Κεφ. ριθ.

Μελισσόφυλλον, ὃ ἐγὼ μελίταναν καλοῦσι, διὰ τὸ ἡδεῖσθαι ἐν τῇ πύα ταῖς μελίτταις, ἔοικε ὃ αὐτῆς τὰ φύλλα καὶ τὰ χαυλία, τῇ περὶ κερμύνῃ βελωτῇ, μείζονα ὃ ταῦτα καὶ λεπτότερα, οὐχ οὕτω διασεία· ὅζοντα δὲ κυτρομήλη. Ἀρμόζει δὲ τὰ φύλλα ποτιζόμενα συν οἴνῳ, καὶ καταπλασθέντα πρὸς σκορποπλήκτοις, καὶ φάλαγγιοδύκτοις, καὶ κυνόδηκτοις. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν καταπλήκτρον πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ· εἰς τε ἐγκύσματα, πρὸς ἐμμήνων ἀγωγῶν εὐδετεῖ. ὀδονταγίας τε διάκλυσμα, ἔγκλυσμα ἔδυσεντερικοῖς· βονδεῖ καὶ τοῖς ὑπὸ μυκήτων πνιγμοῖς συν νίτρω τὰ φύλλα πνιγμόντα· καὶ σφοδρικοῖς, καὶ ἐκλεικτὸν ὀρθοπνοικοῖς. καταπλασθέντα ὃ συν αἰσὶ, διαφορεῖ χειρῶν, καὶ ἔλκη ἀνακαθαίρει, τὰ τε ἐπὶ τῶν ἀρθρῶν αἰγλήματα παρσφίεται καταπλασθέντα.

Πειε

Περὶ Πρασίου. Κεφ. ριβ'.

Πράσιον δάμνος ὄν ἀπὸ μι-
αῖς ρίζης πολύκλαδος, ὑπόδαυος,
λευκός, τετράγωνος τοῖς ῥάβδους·
φύλλον δὲ τῷ μεγάλῳ δακτύλῳ
5 ἴσον, ὑποσφύγγιον, δασύ, ἔρι-
σιν, πικρὸν τῇ γεύσει· ἐν διαση-
μάτων ὃ ἐπὶ τῇ χαυλῶν τὸ σπέρ-
μα· καὶ αἰσθάνεται σπόνδυλοι βρα-
χέα· φύεται περὶ τὰ οἰκόπεδα, καὶ
ἐρείπα. Τοῦτου τὰ φύλλα ξηρα-
10 σιν τῷ σπέρματι ἐφόμωρα σιν
ὑδατι ἢ χαλκίδωρα χλωρὰ, δι-
δοται μὲν μέλιος φθιστικοῖς, ἀσ-
μαπτικοῖς, βήουσιον· αἰσθάνεται καὶ πά-
χος ἐν σπέρματι ἱριδος ξηρὰς μι-
γείσης. Δίδοται καὶ τῇ μὴ καρπαιο-
15 μώρῳ γυναιξὶ πρὸς ἀγωγὴν ἐμ-
μείων καὶ δευτέρων, καὶ δυστοκού-
σαις, καὶ θηριοδύκτοις, καὶ τοῖς θα-
νάσιμον πεπωκόσι· κύσει μὲν τοῖς
καὶ νεφερίσι ἀσθενέσι· τὰ δὲ φύλλα κα-
ταπλασθέντα σὺν μέλιτι, ῥυπα-
20 ρὰ ἔλκεα ἀνακαθαίρει· πterygia τε
καὶ νομάς ἀφίστησι, καὶ ὀδυῖας πλευ-
ρῶν παρσφίεται, καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν
δὲ σκευαζόμενον χύλισμα ἐμβλι-
βομόρων τῶν φύλλων, καὶ συσπρε-
φόμωρον ἐν ὑλῇ πρὸς τὰ αὐτὰ
25 ποιεῖ· ἔστι δὲ καὶ ὀξύτερὸς σιν
οἶνῳ καὶ μέλιτι ἐγχερόμενον· ἀ-
ποκαθαίρει δὲ καὶ ἰκτεριν διὰ
τῶν ῥινῶν· ὠταλίαις τε ἀρμύζει
ἐγχεύματα· ὁμοίως καὶ ἐκ αὐτῶν καὶ
μετὰ ῥοδίον.

Maraubium. Cap. CXIX.

Marrubium, frutex est ab ra-
dice ramosus, candicans, sub-
hirsutus, quadrangularibus ra-
mis: folium pollicis æquat: sub-
rotundum, hispidum, rugosum,
gustu amaro: semen in cauli-
bus, & ex interuallis: flores ver-
ticillato ambitu asperi. Nasci-
tur propter ædificia, ruinas, &
rudera. Huius folia sicca, cum
semine decocta in aqua aut vi-
ridium succus datur cum mel-
le suspiriosis, tussientibus, &
ad tabitudinem redactis. Cras-
sam è pectore pituitam, cum
sicca iri eiicit. Mulieribus à
partu non purgatis datur, ut
menstrua & secundas extra-
hat: item in difficili partu, &
his qui venena hauserunt, aut
à serpentibus demorfi sunt: ve-
ficam renescque lædit. Folia
cum melle illinuntur sordidis
ulceribus purgandis: pterygia
nomasque sistunt, laterum do-
lores mitigant. Succus foliis
contusis expressus, & sole co-
actus, ad eadem pollet: cum
vino & melle illitus oculo-
rum claritatem adiuuat: na-
ribus regium morbum expur-
gat: aurium doloribus conue-
nienter instillatur, per se aut
cum rosaceo.

Περὶ Σπι-

z iij Sta-

Stachys. Cap. CXX.

Stachys frutex est, marrubio similis, sed longior: folia ferens numerosa, hirsuta, rara, prædura, cana, odoris iucundi, & complures virgas ab radice exeuntes, marrubio candidiores: nascitur in montibus & asperis. Vim habet excalfactoriam & acrem: foliorum decoctum potu pellit menstrua & secundas.

Phyllitis. Cap. CXXI.

Phyllitis, folia promit rumici similia, longiora, & viridiora, fena aut septena, recta, quæ parte anteriore lævia cernuntur, à tergo autem pensiles quasi vermiculos tenues ostendunt: in ymbrosis & opacis hortorum locis emicat, gustu acerbis: neque caulem, neque florem, neque semen profert. Folia in vino posita serpentium morfibis aduerfantur: quadrupedibus per os infusa auxilio sunt: & si dysenteria aut resoluta alius exaceret, potui datur.

Phalangiū. Cap. CXXII.

Phalangiū à quibusdam phalagites vocatur. ramuli sunt ei duo, aut tres, plurēve, in diuersa tendētes: flos candidus, lilio similis, multas incisuras habēs: femine

Περὶ Στάχους. Κεφ. ρα'.

Στάχος δάμνος ἐμφορὸς παρὰ σίω, ὑπομηκίστερος δὲ καὶ πλείονα φύλλα ἀραυὰ ἔχει ὑποδάσια, σκληρὰ, ἐνώδη, λευκὰ, ῥαβδία ἢ πλείονα ἀπὸ τῆς αὐτῆς ῥίζης, ἡ λευκότερα τῶν τῷ παρὰ σίω. οὕται ἐν δεσφοῖς, ἢ βαχεῖσι χωρίοις. Δυῶσιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, δειμειαν ὅθεν τὸ ἀπὸ ζεμα τῶν φύλλων ἐμμηνα ἢ δευτέρα ἄγει πινόμενον. 10

Περὶ φυλλίπιδος. Κεφ. ραβ'.

Φυλλίπιδος φύλλα ἀνίσχιν ὁμοία λαπάδω, ἐπιμηκίστερα ἢ καὶ ἐνδαλίστερα σ'. ἢ ζ'. ὀρθὰ, λεία ἐν τῶν ἐμφορῶν, ἐν τῶν ὀπιδεν δὲ καὶ δάπαρ σιόλικας ἔχοντα, ἡ ἀπρημύοις, λεπτοῖς· οὕται ἐν κατὰ σιόις καὶ παρὰ δέσις, γυσαμύω σφιγνὴ, οὔτε δὲ κυλιν οὔτε καρπὸν οὔτε αἶδος φέρει. Ταύτης τὰ φύλλα μετ' οἶνου πινόμενα, πρὸς ἐρπετοδύνκεις πίνει· 20 ἐπὶ τέτραπόδων τὲ διὰ σώματος ἐγχυματιθεῖσα βοηθεῖ· πίνεται καὶ πρὸς δυσεντερίαν καὶ διάρροϊαν.

Περὶ Φαλαγγίου. Κεφ. ραβ'.

Φαλάγγιον, οἱ δὲ φαλαγγίον. 25 οἱ δὲ καὶ ταύτων λευκώκανθαν καλοῦσι· κλώνες εἰσι δύο ἢ τρεῖς ἢ πλείονες, διεσπότες ἀπ' ἀλλήλων· αἶδη λευκὰ, παρὰ πλίσια κρήνῃ, ἐντομας πολλὰς ἔχοντα σπέρμα

σπέρμα δὲ παχὺ μέλαν, ὡς παρ
φακοῦ ἤμισυ, ἰσχυρότερον ἢ τοι
πολλῶν ῥιζίων μικρὸν, λεπτὸν, χλω
ρὸν ἅμα τῷ ἐλκυσθῆναι ἐν τῆς
γῆς. ὕστερον γὰρ συνέλκεται φύε-
ται δὲ ἐν χειμῶσιν. Ταύτης τὰ
φύλλα καὶ τὸ σπέρμα καὶ τὸ αἶ-
δος πηρόμυρον μετ' ὄνυα, σκορπο-
πλήκτοις βοηθεῖ, καὶ φαλαγγισθῆ-
κτοις· λυεῖ δὲ καὶ σφόδρα.

Πιεὶ Τριφύλλου.

Κεφ. ρκγ'.

Τρίφυλλον οἱ δὲ ὀξύφυλ-
λον, οἱ δὲ, μέμυανθες, οἱ δὲ
ἀσφάλπιον, οἱ δὲ κνίκιον χαλκῶ-
σι, δάμπος ὅτι πᾶσι χεῖρας
ῥάβδους ἔχον λεπτάς, μελίνας,
σχινώδεις, παραφυάδας ἐχού-
σας, ἐφ' ὧν φύλλα ὁμοῖα λοτῶ
τῷ δένδρῳ, τεῖα καὶ ἐκείνων
βλάστησιν· ὁσμὴ δὲ αὐτῶν ἄρ-
τι μὲν φουρόνων πηγαίου, αὐ-
τῶν δὲ ἐνδέντων δὲ ἀσφάλτου· αἶδος
δὲ ἀνίστι πορφυροῦ· σπέρμα
δὲ ὑπόπλευτον καὶ ὑπόδατον, ἐν
τῇ ἐτέρῃ πτέρᾳ ὡς παρ * κε-
ραῖαν ἔχον, ῥίζα δὲ λεπτή, μα-
κρά, * ἰσχυρά. Βοηθεῖ δὲ τὸ σπέρ-
μα καὶ τὰ φύλλα πηρόμυρα ἐν ὕ-
δατι πλευντικοῖς, δυσουροῦσιν.
ἐπιπληκτικοῖς, ἀρθροῦσιν ὕδρω-
πᾶν, ὕστερκαῖς ἄγει δὲ καὶ κατὰ
μυῖα· δεῖ δὲ διδόναι τ' ἢ σπέρ-
ματος < γ'. τ' δὲ φύλλων < δ'.
ἀρρίγει

femine nigro, lato, ad lenti-
culæ dimidiatæ figuram, mul-
to tenuiore: radice parua, te-
nui, herbacei coloris, dum à
terra eruitur: prouenit in col-
libus. Huius folia, semen, flos
cū vino pota, auxiliantur con-
tra scorpionum phalangio-
rūmque ictus: tormina quo-
que discutunt.

Trifoliū. Cap. CXXIII.

Trifoliū, Græci triphyllon, a-
lij ocytriphyllon, alij meny-
anthes, alij asphaltion, vocāt. Fru-
tex supra cubiti altitudinē at-
tollitur, virgas habens tenues,
iūceas & nigras, vnde ramula-
res enascūtur appendiculæ, in
quibus terna singulis germina-
tionibus exeūt folia, loto arbo-
ri similia: iis recēter enatis ruti
odor inest: vbi autē adoleuerūt,
bitumē olēt. Florē ædit purpu-
reū. semē quadāten^o latū, sub-
hirsutū, ex altera extremitate
exertū, antennæ modo corni-
culū gerēs. Radix tenuis, lōga,
valida. Semē & folia in aqua
pota pleuriticis, vrinæ difficul-
tati, comitialib^o, & iis qui aque
inter cutē p̄cīpia sentiūt, fœ-
minis quoq; vuluæ vitio oppor-
tunis, auxiliantur: mēses ciunt:
ternæ drachmæ è femine dari
debent, è foliis verò quaternæ.

z iiii Con.

DIOSCORIDIS

Contra serpentium ictus trita folia, & ex aceto mulso pota, præsidio sunt. Tradūt aliqui, totius fruticis, radicis, foliorumq; decoctū fotu dolores eorū finire, quos serpentes percusserrint: qua autē aqua sanatus quis fuerit, si ea quispiā alius foueatur, qui vlcus habuerit, perinde afficitur vt à serpēte demorsus. Quidā terna folia aut semina in tertianis, cū vino potui dederunt: & in quartanis, quaterna, vt quæ febriū circuitus discuterēt. Radix antidotis inseritur.

Polium. Cap. CXXIIII.

Duo genera polij: montanū, cui theuthrio nomē est, & cuius est vsus. Tenuis frutex est, cādidus, dodrantalis, semine refertus: capitulo in cacumine quādam corymborū specie præseferēte, paruo, cano hominis capillo simili, grauitè olente, nō sine quadam suauitate. Alterū fruticosius, non vsque adeo valēs odore, & viribus infirmius. Potū feruefacti ius auxiliatur serpentīū ictibus, hydropicis, morbo regio: & lienosis ex aceto: stomachū malè habet: caput doloribus afficit, aluum & menses ciet: substratū suffitūm vt serpentes abigit: illitum vulnera conglutinat.

ἀρήγει δὲ καὶ θηριοδύκτοις τὰ φύλλα λεῖτα σὺν ὀξύμελιτι πινόμενα. ἰσορροῦσι δὲ ἐνίοι ὅτι τὸ ἀφελήματα ὅλον τῷ δαίμονι καὶ τῆς ῥίζης καὶ τῶν φύλλων καταπληθύνον ἐπὶ τῶν ἐρπετοδύκτων παραιεῖται τὸν πόνο, ὃ δ' αὖτε ἐκπιεθῆ τις ὕδατι, αὖτε ἕτερος ἑλκος ἔχων καταπληθῇ, τὰ αὐτὰ πάχει τοῖς θηχθεῖσι. ποτὶ ζῆσι δὲ πινεσὶ ἐπὶ μὲν τριταῖς τεία φύλλα ἢ τεία πύρματα σὺν οἷον· ἐπὶ δὲ τεταρταῖς δ'. ὡς λύονται τὰς περὶ τοὺς μύηταις δ' αὖτε τῆς ἢ ῥίζας καὶ ἀντιδοτοῖς.

Περὶ Πολίης ὀρενῆς. Κεφ. εκδ'.

Πόλιον τὸ μὲν, ἔστιν ὀρενὸν, ὃ καὶ ταύθριον καλεῖται, οὗ καὶ ἡ χηλιδάμων δὲ ἐστὶ λεπτὸν, λευκόν, σπθαμακίον, καρπὸν πᾶν ἔχον κεφάλιον ἐπ' ἄκρου κορυμβοειδὲς μικρὸν ὡς πολיאὶν τείχεα, βαρύσμων μετὰ ποτὶς ἐνυδίας. Τὸ δὲ ἕτερον δαμνωδέστερον, οὐχ ὅπως ἐύτονον τῇ ὀσμῇ, καὶ ἀδρανέστερον κατὰ τὴν δύναμιν. Δύναται δὲ ἀντὶ τῶν τῶ ἀπόζημα πινόμενον, θηριοδύκτοις ἀρῆγειν, ὡς δρωπικοῖς, ἰκτερώδεσι, σπληνικοῖς δὲ σὺν ὀξεί· ἐστὶ δὲ καὶ κεφαλαλγῆς καὶ κακοσμίαχον· ἄγει δὲ καὶ κοιλίαν καὶ ἐμμήλια· ὥσπερ γὰρ μύηται δὲ καὶ θυμώμωρον, θηρία δὶώκει. καταπληθύνον δὲ τὰ πύρματα καλλῶ.

Scor-

Περὶ

Πρὶ σκορδίου. Κεφ. ραέ.

Scordium. Cap. CXXV.

Σκορδίου φέται ἐν ὄρεσι
τόποις καὶ ἐλώδεσι, φύλλα ἔχον
εὐκότα χαμαὶ δρυὶ, μέζονα δὲ

SCORDIVM, in mon-
tibus & palustribus nascitur,
foliis trifraginis, maioribus, nō
sic in ambitu diuifis, aliquan-

καὶ οὐχ οὕτως ἐτετμημένα
5 φεφύεραν, ποσὶς δὲ τῇ ἐσμῇ
σκορδίζοντα, συπληρὰ δὲ καὶ ἑμ-
πικρα κατὰ τὴν γούσιν· χαμάλια

tum allia redolentibus, gustu
amaris & adstringētibus: qua-
drangulis caulibus: subrubro
flore. herba vim excalfacto-

δὲ τετραγώνων· ἀφ' ὧν αὐτὸς ὑ-
πέρυθρον. Διῶαμιν δὲ ἔχει ἡ

riam habet: vrinam cit. Co-
cta recens aridave cum vino,

10 ποτιζομένη χλωρὰ, λεία, καὶ ξη-
ρὰ ἀφελομένη σὺν οἴνῳ πρὸς ἐρ-

aduersus venenatos serpen-
tium morsus bibitur: ad sto-

μαχῶν δόγματα καὶ θαλάσσια·
πρὸς τὴν δὲ σμάχου καὶ δυ-

machi quoque rosiones, dy-
senteriam, & vrinæ difficulta-

σεντερίαν, καὶ δυσουρίαν < β.
σὺν ὑδρομέλιτι καθαίρει καὶ πά-

tatem, binis drachmis cum hy-
dromelite: crassamen purulē-

15 ρος πυῶδες ἐν δώρακος· ποιεῖ
καὶ πρὸς παλαιὰν βήχα καὶ ῥή-

tum pectore expellit. Facit a-
ridæ farina ad veterem tussim,

γυματα, καὶ ἀσπίδια σὺν καρ-
δάμῳ καὶ μέλιτι καὶ ῥητίνῃ μίγει-

rupta, conuulsa, si cum nastur-
tio melle & resinā misceatur

σα ξηρὰ ἐν ἐλεγκτῶ· καὶ ὑπο-
χόνδριον χροῖως φλεγμαίνον, ἀ-

in eclegmate: inflammata mo-
dicè præcordia, cerato excē-

20 ναιφθεῖσα κηρωτῇ παρηγορεῖ·
ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ποδάγραν μετ'

pta, recreat: cum aceto acri
aut aqua, podagris conueniē-

ὄξος δριμύτος ἀειχιομένη, ἢ ὑπὸ
ὑδατος καταπικασομένη· πρὸς

ter illinitur: menses imposita
mouet: vulnera conglutinat:

θεῖσα δὲ ἐμύλω καὶ κνέϊ καὶ τρυά-
ματα κολλᾷ· ἔλλα παλαιὰ ἀνα-

vetera vlcera purgat, & ex
melle ad cicatricem perducit;

25 καθαίρει, καὶ ἀπουλεῖ σὺν μέ-
λιτι· ξηρὰ δὲ ὑπὸ σαρκώματα

ficca excrescētias in carne co-
hibet. Succus ad eadem vi-

τέλλει. πίνεται δὲ καὶ τὸ ἐξ αὐ-
τῆς χύλισμα πρὸς τὰ εἰρημένα

tia bibitur. Inter prima
efficax Ponticum

πάθη. ἐπαργέσατον δὲ ὅτι τὸ πον-
τικὸν καὶ τὸ κρητικόν.

natione, Cre-
ticumq;

Πρὶ

Tussilago.

DIOSCORIDIS

Tussilago. Cap. CXXVI.

Tussilagini folia sunt maiuscula quam hederæ, sex aut septem à radice subalbida à terra, supernè virentia, in plures angulos exeuntia: caulis palmum altus: flos luteus, vere prodit, quo vnà cum caule confestim exuitur: inde nōnulli his vacare existimaerunt. Radix tenuis est & superuacua: nascitur in amoenis & riguis. Folia ex melle trita igni sacro, & omnibus inflammationibus illitu medentur. Aridæ fumus per infundibulum hianti ore raptus, hos sanat qui sicca tussi atque orthopnoea infestantur: pectoris vomicas rumpit. Eundem effectum præbet suffita radix. Decocta in hydromelite, & posita emortuos partus eiicit.

Artemisia. Cap. CXXVII

Artemisia magna ex parte in maritimis nascitur, absinthij modo fruticosa, maioribus & pinguioribus foliis, ramisque huius quidem genera duo. vnum lætius habitiúsque, foliis virgisque latioribus. Alterum tenuius, flore paruo, tenui, candido, graecolente: æstate

Πρὶ Βηχίς. Κεφ. ρξς.

Βήχρον φύλλα ἔχει ὁμοία κισσῷ, μείζονα δὲ 5 ἢ ζ'. ἀπὸ τῆς ῥίζης, ἐν μὲν τῷ πρῶτῳ τὰ ἄνω λευκά, ἐν δὲ τῷ πρῶτῳ τὰ κάτω χλωρά, γωνίας πλείους ἔχοντα. καυλὸν σπινθηροειδὲς ἄνθος ὡχρὸν καὶ τὸ ἔαρ, ὁξείως δὲ ἀποβάλλει τὸ, τε ἄνθος καὶ τὸν καυλὸν. ὁ δὲν πινέξ. ὑπελάβον ἀκαυλὰ καὶ ἀνανθή. ὑπελάβειν τὴν πᾶσαν ῥίζαν λεπτήν, ὡχρῶς φύεται. πρὶ λίαν δὲ καὶ ἐν ὕδρῳ τῶν τοιούτων. Ταύτης τὰ φύλλα λεῖα συνὲ μέλιτι κατανάλασσόμενα, ἐρυσίπτελα καὶ πᾶσαν φλεγμονὴν ἰᾷ. ὑπερδυσμώματα δ' ἐπεὶ εἰς ἀποκαταστασιν, τὸν ὑπερξερῶς βηχὸς καὶ ὁρροπνοίας 15 ὁ χλωμῶν δειραπύει, ὅταν χαλόντες, τὴν καπνὸν τῷ σώματι δέξωνται, καὶ κατὰ πᾶσι ῥήσεται ὅ καὶ τὰ ἐν ὠτῶν ἀποσήματα. τὸ δ' αὐτὸ ποιεῖ καὶ ἡ ῥίζα ὑπερδυσμώματι μεμνῶν τὴν τετληνὸς ἐν ὕδατι 20 καὶ ἐν ὕδατι μεμνῶν τὴν τετληνὸς ἐν ὕδατι.

Πρὶ Ἀρτεμισίας πολυκλώνος. Κεφ. ρκζ.

Ἀρτεμισία φύει ἐν παραθαλάσσις τόποις ὡς τὸ πολὺ, πρὸς δαμνοφθῆς παρόμοιος ἀψινθίῳ, μεί 25 ζω. ὅ καὶ λιπαρότερα τὰ φύλλα ἔχουσα. καὶ ἡ κρῶσις ἐστὶν αὐτῇ εὐρῆς πλατύτρα ἔχουσα τὰ φύλλα καὶ τὰς ῥάβδους. ἡ δὲ λεπτότερα, αὐτῇ μικρὰ, λεπτὰ, λευκά, βαρυόσματα.

μα ἴσους δὲ ἀνδεῖ. Ἐνιοὶ δὲ τὸ
 ἐν μεσογείοις λεπτόκαρπον βοτάνη-
 τιον ἀπλουῶν τῷ χαμυλῷ, σφόδρα
 μικρὸν, ἄνδρες πλείωνων, κίρρον
 δὲς τῇ χροῇ, λεπτόν, χαλοῦσιν ἀρ-
 5 τεμισίαν μονόκλωνον· ἐστὶ δὲ ἐν-
 ωδεστέρα τῇ περὶ αὐτῆς. Αμφοτέραι
 ὅθι θρμαίνουσι καὶ λεπτιώουσι. ἀπο-
 ζεννύμεται ὅθι ἀρμόζουσι εἰς γυν-
 αικεῖα ἐγκυδοσμάτα, πρὸς ἀγ-
 γλὴν ἐμμελῶν καὶ δευτέρων καὶ ἐμ-
 10 βρύων, μύσιν τε καὶ φλεγμονῶν τῇ
 ὑστέρας καὶ θρύψιν λίθων, καὶ ἐπο-
 χλῶ ἔρων. ἡ δὲ πόα κτ' ἡ δὲ ἡρεου
 καταπλασθεῖσα πολλή, ἐμμελῶς
 κινεῖ. ὅθι ἔξ αὐτῆς χυλὸς λειανθεῖς
 σμύρνην καὶ πρὸς δευτεῖς, ἄγει ἀπὸ
 15 μήρας ὅσα καὶ τὸ ἐγκυδοσμά. καὶ
 ποτίζεται δὲ ἡ κόμη πρὸς ἀγ-
 γλὴν τῇ αὐτῇ, πλεονέκτης < γ'.

Περὶ Ἀρτεμισίας λεπτο-
 φύλλου. Κεφ. ρκβ'.

Ἀρτεμισία λεπτόφυλλος, ἡ τις
 20 ἡμῶν πρὸς ὄρεα καὶ φράγμους
 καὶ εἰς χώρας πορείμους. τὸ ἄνθος
 οὐκ αὐτῆς καὶ τὰ φύλλα τελευτῶμε-
 ναῖσι μὲν ἀποδίδωσι σαμψύχου.
 εἰ οὐκ τις πονεῖ τὸν σῶμα καὶ
 κόψει τὴν βοτάνην ταύτην μετ'
 25 ἀμυγδαλίνου ἐλαίου καλῶς, καὶ ποι-
 ῆσει ὥς μάλαγμα καὶ θήσει ἐπὶ
 τὸν σῶμα καὶ, δεξαμένην ὅσιν. εἰ
 δὲ καὶ τὰ νεύρα τις πονεῖ, τῇ χυ-
 λῶν ταύτης μετ' ῥοδίνου ἐλαίου μί-
 ξας χρίει, δεξαμένην ὅσιν.

Περὶ

æstate floret. Sunt qui in me-
 diterraneis vnicaulis nomine
 appellant, tenuem herbulam,
 simplici caule & minuto, flori-
 bus scatete tenuibus, flauo co-
 lore: hæc iucundiorē quā
 præcedens efflat odorē. Vtra-
 que excalfacit, extenuat: fer-
 uēfactæ conuenienter in mu-
 liebres defessus adiiciuntur, ad
 detrahendos menses, partus, se-
 cundāsque: item ad præclusio-
 nes vuluæ, & eiusdem inflam-
 mationes: calculos cōminuūt:
 remorata vrinam cōminuūt: men-
 ses pellunt pubi illitæ. Succus
 vuluæ inditus ex myrrha, eadē
 quæ infesso trahit. Coma tribus
 drachmis eorundem educen-
 dorum gratia bibitur.

Artemisia.

Cap. CXXVIII.

Habetur & Artemisias ge-
 nus aliud, quā minutis foliis cir-
 ca riuulos aggeresque. Item in
 agris frumentariis nascitur. Flo-
 ribus & foliis odorē Sampsu-
 chi referentibus. si quis ex ea
 diligenter tusa cum oleo amy-
 gdalarum malagma stoma-
 cho imponat: vexationem
 partis eius sanabit. Ner-
 uorum dolores succo
 huius cum rosaceo
 inunctis curatur.

Ambrosia.

DIOSCORIDIS

Ambrosia. Cap. CXXIX.

Ambrosia pusillus frutex est, ramosus altitudine trium palmorum: foliis rutæ, circa imum caulem exiguis, cauliculi seminibus, perinde quasi racemulis grauidi, qui nunquam florem pariunt, odore vinoso, suauis: radice tenui, sesquipedali. Coronantur ea Cappadoces. Vis eius reprimere ac repellere, & illitu adstringere humores, qui in aliquam partem incumbunt.

Botrys. Cap. CXXX.

BOTRYS fruticosa herba est, lutea tota, & in multas alas sparsa: semen circa totos ramulos prouenit: folia cichorio similia: tota suauē odorem spirat: quare vestimentis interponitur: inuenitur in torrentium ripis, & conuallibus. Pota orthopnoeas mulcet. Hæc Cappadoces Ambrosiam vocant, alij artemisiam.

Geranium. Cap. CXXXI.

GERANION foliis anemones, diuifuris longioribus: radice subrotunda, cum estur dulci. Quæ drachmæ pondere in vino pota, vuluæ inflationes discutit. Geranium alterum, caulibus minu-

tis

Πρὶ Ἀμβροσίης. Κεφ. ρηθ'.

Ἀμβροσία, οἱ δὲ βόβυς, οἱ δὲ βόβυς ἀρτεμισία, θαμνίσκος ὅστις περὶ ἀμυγδαλῶν τὸ ὕψος, πολὺ κλάδος· φύλλα ἔχων ὡς τῆς ἐμβολῆς, καὶ χαλκῆ μικρὰ ὡς πηγαί· τὰ δὲ χαλκία ὡς πηγαί· ματίων, εὐκόπων βόβυδιος μινδύποτ' ἀνθῶσι, τῇ ὁσμῇ οἰνώδης, ἡ δὲ ἰατρικὴ ῥίζα λεπτή, διασπείθεται. καὶ ἀποκρίνεται δὲ ἐν χαλκίᾳ τοῖς σπέρμασι. Δυνάμει δὲ ἔχει σπαστικὴν τὴν ἐπιφρεστικὴν καὶ ἀποκρυστικὴν, καὶ τοπικῶς ἐν τοῖς ἑσπέραις.

Πρὶ Βόβυος. Κεφ. ρλ.

Βόβυς πᾶσα ὅστις ἐστὶν ὅλη ὑψηλὴ, θαμνίσκος, διακινητικὴ, πολλὰς ἔχουσα μαχάλας. τὸ δὲ σπέρμα ὅλοισι τοῖς κλωνίοις περιπέφυκε· φύλλα κινητικὰ ἐμφερῆ, καὶ τὸ σύμπαν ἐν ὡδὶ ἰκανῶς διδόναι ἰματίοις συντίθει. φύλλον δὲ μαλιστα ὡς καρύδας καὶ χαλκίους. Δυνάμει δὲ ἔχει σπαστικὴν καὶ ἀποκρυστικὴν, καὶ τὸν οἶνον πνέοντα ὁρθοπνοίας περὶ τοῦ σώματος ἀμβροσίαν καὶ χαλκίαν καὶ ἀποκρυστικὴν, πνέει δὲ ἀρτεμισίαν.

Πρὶ Γερανίου. Κεφ. ρλβ'.

Γεράνιον, τὸ μὲν φύλλον ἔχει ὁμοίον ἀνεμώνῃ, ἐλαφύτερον, μακρότερον ῥίζαν δὲ ὑποσπέρμυλον, γλυκεῖαν, ἐπιδοκίμην, ἢ τις ποθεῖται ἐν οἶνῳ ἄγει < πλῆθος, ὑστερα ἐμπνευματώσας λύει. καὶ ἔχει τὴν ἐπιφρεστικὴν καὶ ἀποκρυστικὴν καὶ τὴν τοπικὴν.

λεπτά· χυώδη, δι' σπιδάμα· φύλ-
λα μαλάχῃ ἐμφερῇ, καὶ ἐπ' ἄκρων
τ' μαλακῶν ἐξοχὰς πινὰς ἀναγε-
νευκῆας ὡς γεραῶν κεφαλὰς σὺν
τοῖς ῥάμφεσσι, ἢ κυμῶν ὀδόντας.

5 ἡ ἴσσις ὅ ἂν τ' ἐν ἰατρικῇ ἐδεμεία.

Πρὶ Γναφάλι. Κεφ. ρλβ'.

Γναφάλλον, τοῦτε τοῖς φύλλοις
πρὸς ἀντὶ γναφάλε ἡ ὥν ὅ λευ-
κοῖς ἔστι καὶ μαλακοῖς. ποιεῖ δὲ
συνὸ οἶνον αὐστηρῶ πικρὸν ὄμμα τὰ
10 φύλλα πρὸς δυσεντερίαν.

Πρὶ Τύφης. Κεφ. ρλγ'.

Τύφη, φύλλον ἀνίσσι κυμαίνου-
σιν ὁμοιον· χαλκὸν λεῖον, ὁμαλόν,
ἐπ' ἄκρῳ περικείμενον· ἀνδρὸς πυ-
κνὸν καὶ ἐκπαπτούμενον, ὁ καλῶ-
15 σι ἐννοῖ ἀνδρῶν. ταύτης τὸ ἄν-
δρὸς ἀναληφθὲν σέας παλαιῶ ὑ-
εῖω πεπλυμένῳ, καταχρῶματα
δερεπύει. φύεται δὲ ἐν ἔλεσι καὶ
ὑδροσάσιμοις τόποις.

Πρὶ Κιρκίας. Κεφ. ρλδ'.

20 Κιρκία, οἱ δὲ διρκίαν κα-
λοῦσι· τὰ μὲν φύλλα ἔχει σπύ-
ρχῳ ὁμοία κυμαίνου, παραφύα-
δας δὲ πολλάς· ἀνδρὸς μέλανα,
μικρά, πολλά· καρπὸν δὲ κε-
χρησμένον ἐν πικρῷ οἶνῳ κερατῶν.

25 ῥίζας σπιδάμαίας γ' ἢ δ'.
λευκὰς, ἐνώδεις, δερεματῆας,
μάλας δὲ ἐν πικρῷ πετρώδεσι
φύεται τόποις καὶ ἐν πηλοῖς ἐν-
ηλοῖς. ταύτης ἡ ῥίζα ὅσον μνα-
δ'. θλασθεῖσα καὶ βραχέστα
ἡμέραν

tis & pilosis sesquipedalib⁹: fo-
liis maluae, in summis alis sur-
sum spectantia gruum capi-
tula insunt, cum suis rostris,
aut canini dentes. Nullius in
medicina vsus.

Gnaphaliū. Cap. CXXXII.

GNAPHALII foliis mol-
libus ac albis pro tomento v-
tuntur. Bibuntur efficaciter fo-
lia in vino austero, ad dysen-
teriam.

Typha. Cap. CXXXIII.

Typha folium ædit cyperidi
simile: caulē album, laue, æqua-
bilem: florē in cacumine am-
bientem, defum, qui in pappo
soluitur, quod paniculā aliqui
nominant. Huius herbæ flos,
suillo adipe eloto except⁹ am-
bustis medetur. Gignitur in pa-
lustribus & aquis stagnatibus.

Circæa. Cap. CXXXIII.

Circæa, quam & dircæam
aliqui vocant, foliis est hortē-
sis solani, agnatis crebris: flo-
re nigro, pusillo, copioso: se-
mine milij, nascente in quibus-
dam veluti corniculis: dodran-
tali radice, triplici fermē aut
quadruplici, candida, odora-
ta, excalfaciētē. Nascitur in a-
pricis, faxis, & vento perflatis.
Radicis tusæ pondo quatuor,
in sextariis tribus vini dulcis,
per

DIOSCORIDIS

per diem & noctem macerantur, potique triduo vulvas expurgant. Semen in sorbitionibus datum, lacte mammas nutricum explet.

OEnanthe. Cap. CXXXV.

OENANTHE folia habet pastinacæ: florem candidum: caulem crassum, palmi altitudine: semen atriplicis: radicem magnam, in multa rotunda capitula extuberantem: nascitur in petris. Caulis eius & folia, cum mulso vino pota secundas eiiciunt. Radix è vino, vrinæ stillicidio conuenit.

Conyza. Cap. CXXXVI.

CONYZÆ duo genera: quæ parua vocatur, odore præstantior est: maior verò frutice altior est & foliis latioribus, graui odore. Vtriusque folia oleæ similia, hirsuta, pingua. In maiore caulis binum cubitorum altitudine attollitur. in minore pedem æquat. Flos fragilis, lutei coloris, subamarus qui in pappum abit: radices superuacua. Suffitu substratūque frutex totus serpentes fugat, culices abigit, & pulices necat. Folia conuenienter illinuntur serpentium plagis, & tuberculis, ac vulneribus.

Flores

ἡμέραν καὶ νύκτα ἐν οἴνου γλύκεως κοτύλαις ὥς καὶ ποθεῖται ἡμέρας γ'. ὑσέραν ἀποκαθαίρει ὁ δὲ καρπὸς γάλα κατὰ σπῆν, ἐν ῥοφήμασι λαμβανόμενος.

Περὶ Οἰανάνθης. Κεφ. ρλϛ. 5

Οἰανάνθη, οἱ δὲ λεύκανθον καλεῖσιν· τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὡς ὁρσαφυλίνος. ἀνθὴ δὲ λευκὰ καὶ χαλκὸν παχύν, σπιδάμιαν· καρπὸν δὲ ὡς ὁρσάβας· ῥίζαν μεγάλην κεφαλαῖς ἔχουσαν πλείονας, σφοδρὰ 10 λας. φύεται ἐν πέτραις. ταύτης ὁ καρπὸς καὶ ὁ χαλκὸς καὶ τὰ φύλλα, ποτίξει πρὸς δευτέρων ἐκβολῇ σὺν οἶνῳ μέλιτι. ἡ δὲ ῥίζα σὺν οἶνῳ πρὸς σπληνείας ἀρμύζει.

Περὶ Κόνυζης. Κεφ. ρλδ. 15

Κόνυζα, ἡ μὲν ἵς μικρὰ καλεῖται, σὺν δεσέρεσσιν, ἡ δὲ μείζων, ὡς ἔχουσα τῶν δάμην καὶ τοῖς φύλλοις, πλατυτέρα καὶ βαρύτερος. ἀμφότεραι δὲ προσοίκασι τοῖς φύλλοις ἐλάϊα. ἐστὶ δὲ δασέα ταύτα καὶ λιπερά· ὅπως δὲ χαλκὸς ἡ μὲν μείζων, δύο πῆχεων ἔχει, ἡ δὲ ἐλάττων ποδὸς ἀνδρὸς φαφάρων, μήλων, ὑπόπικρον, ἐκ παππῆμεγον ῥίζα δὲ ἄχρηστοι. Δυνάμει δὲ δάμνος ὡς σπληνόμενος σὺν 25 τοῖς φύλλοις καὶ θυμωόμενος, θιρία διώκει, καὶ κώνωπας ἀπεκλίνει· κλείνει δὲ καὶ φύλλας καὶ ἀπλάσσειται δὲ τὰ φύλλα ὡφελίμως ἐπὶ ἐρπυσσίνων καὶ θυμωμένων, καὶ βαρύνει τῶν.

καὶ τῶν καὶ πίνεῖ) συν οἶνον τὸ ἀν-
 dos καὶ τὰ φύλλα πρὸς καταμυ-
 νίων ἀρωγῶν καὶ ἐμβρύων ἐκβο-
 λῶν, καὶ τραγγέλιαν, καὶ σφόδες καὶ
 ἱκτεργὴν μετ' ὅξος δὲ ἐμπληπτι-
 5 καὶ πινόμην ὡφελεῖ. καὶ τὸ ἀφ' ἑ-
 ψήμα δὲ αὐτ' ἐν καλίσματι, τὰ
 ἐν κούρᾳ δεξαμένη. ὁ δὲ χυλὸς
 πρὸς τοὺς ἐκ βωτῶν ποιεῖ ποιεῖ
 δὲ καὶ πρὸς ῥίγην συγχρομένην ἢ
 πῶς μετ' ἐλαίου. ἢ δὲ λεπτή καὶ κε-
 10 φαλαγγίαν καταπλασσομένη ἰα-
 ται. Γίνεται καὶ τέτοιον εἶδος κο-
 νύτης ἐστὶ δὲ χαλῶ παχυτέρα
 καὶ μαλακωτέρα, τοῖς δὲ φύλλοις
 μείζων τῆς λεπτῆς, ἐλάσσων δὲ τῆ
 μείζονος, ἐκ παραβαρυσομένη
 15 τῇ πολλῇ καὶ ἀνδρῆς καὶ ἀνδρα-
 κτοτέρα. φύεῖ δὲ ἐν ἐφύδρσι.

Πεὶ Ἡμεροκαλλίδος.

Κεφ. ρλζ'.

Ἡμεροκαλλίς, φύλλα ἔχει
 καὶ χαλὸν ὁμοίαν κρίνω, χλωρὰ
 20 δὲ ὡς πρὸς πρῶτα. ἀνθὶ δὲ ἐν
 αὐτῷ κατ' ἐξέλιξιν ἀπὸ φύσιν γ'.
 ἢ δ'. πῶς ἔστιν τῷ κρίνω ἐοικώ-
 τα ὅταν ὀρέξεται χαίρειν πῶς δὲ
 χροῖαν ἰσχυρῶς ὡχρὰν, ῥίζαν ὁ-
 μοίαν βολβῶ ἐμμεγέθει, ἢ πῶς
 25 λεῖα ποιεῖται καὶ συν μέλιτι ἐν
 ἐρίῳ πρὸς τοὺς πρῶτος ὅταν ὕ-
 δραγωγὸς καὶ αἵμαγωγός. τὰ
 δὲ φύλλα λεῖα καταπλασσομέ-
 να φλεγμονὰς μαστῶν ταῖς ἐν το
 κατῶν καὶ ὀφθαλμῶν πρὸς ὕγειν

Flores & folia cū vino ad mē-
 ses partúsque eiiciendos bibū-
 tur: item contra vrinæ stillici-
 dia, arquatum morbum, & tor-
 mina: comitiales pota ex ace-
 to adiuuant. Decoctum in de-
 fefsionib⁹ medetur vuluæ ma-
 lis. Impositus succus abortum
 facit. Ex oleo efficaciter horro-
 ribus oblinitur. Capitis dolo-
 res tenuis illita sanat. Est & ter-
 tium conyzæ genus, caule cras-
 fiore, ac molliore: foliis me-
 dia inter maiorem ac mino-
 rem amplitudinis, minimè au-
 tem pinguibus: multò grauio-
 ris hæc est odoris & iniucun-
 dioris, sed inefficacior. Proue-
 nit locis non riguis.

Hemerocallis, siue lilium

syluestre. Cap. CXXXVII.

HEMEROCALLIS fo-
 lium & caulem habet lilij, por-
 raceo colore: flores in caule
 per singulos exortus, terni aut
 quaterni erumpunt, lilij diuifur-
 ra, quoties dehiscere coeperūt.
 colore perquàm pallido: ra-
 dix magna est atque bulbosa:
 quæ pota, aut cum melle & la-
 na in peffo appofita, aquam
 educit & sanguinem. Folia tri-
 ta mammarum inflammatio-
 nes à partu contractas, oculo-
 rumque collectiones mitigāt.

Radi

καὶ

DIOSCORIDIS

Radix & folia igni ambustis
vtilissimè illinuntur.

Leucoiū, siue viola alba.

Cap. CXXXVIII.

Leucoion vulgaris est noti-
tia, sed in floribus differentia
quædam: nanque aut cœrulei,
aut albi, aut purpurei, aut lutei
inueniuntur. Lutea verò præci-
pui in medicina vsus. Hui⁹ ari-
di flores feruefacti in defessio-
nibus, valent contra vuluæ in-
flammationes, & mēstrua ex-
pellunt: sanāt oris vlcera, cum
melle: cum cerato, rimas sedis.
Semen duūm drachmarū pon-
dere ex vino potum, aut cum
melle inditum, menses, secun-
das & partus extrahit. Radi-
ces cum aceto illitæ, lienē re-
primunt, & podagricos iu-
uant.

Cratægonum.

Cap. CXXXIX.

Cratægonum, siue vt aliis
placet crateonō, foliis melam-
pyro simile est, multis calamis
ex vna radice emicatibus, mul-
torūq; geniculorū: semine mi-
lij: nascitur magna ex parte in
opacis & frutetosis, sūmopere
acre. Traditū est à quibusdam,
hoc si bibat ieiuno ore, ter die
post mēses purgatos, trib⁹ obo-
lis in cyatis aquæ duob⁹ mu-
lier,

καταπλάσσει δὲ ἢ ρίζα καὶ
τὰ φύλλα ὠφελίμως ἐπὶ τῷ πυ-
ρίκαυτων.

Πρὶ λευκοῖς. Κεφ. ρλθ.

Λευκόιον γινώριμόν ἐστι, ἔστι δὲ
αὐτῆς διαφορὰ ἐν τῷ αἵθει. ἢ γὰρ
λευκόν ἐστι ἢ μύλινον ἢ κυανοῦ
ἢ πορφυρεῶν εὐείσχε). Ἐστὶ δὲ
αὐτῶν εὐχρηστον πρὸς τῇ ἰατρικῇ
χρηστον τὸ μύλινον, ἔτι αὐθι-
ξήρα ἀποζωδένει αἰς ἐκκρίσιμα
τα ποιεῖ πρὸς τὰς περὶ ὑστέρα
φλεγμονὰς καὶ ἀγῶρας ἐμμηνῶν
ἀναλκωδέντα δὲ κινεῖται ῥαγάδας
τὰς ἐν δακτύλῳ δεξαμένῃ· σὺν δὲ
μέλιτι ἄφθας. ὃ δὲ καρπὸς αὐτῆς
σὺν οἴνῳ ποδείς δραχμῶν δυοῖν
πληθὺς, ἢ πρὸς τοὺς σὺν μέλιτι, 15
ἐμμηνῶν καὶ δεύτερον καὶ ἐμβρυῶν
ἀγει. αἱ δὲ ρίζαι χαλὰ πλάσσειν
σὺν ὄξει, σέλλοισι σπληνῶν, καὶ
ποδαγρικοῖς ὠφελούσι.

Πρὶ Κραταγόρου.

Κεφ. ρλθ.

20

Κραταγόρον, οἱ δὲ κραταίονον,
φύλλα ἔχει ὅμοια τοῖς τῷ μελαμ-
πύρῳ, πλείους δὲ ἀπὸ μιᾶς ρίζης
φύον). βλαστοὶ ἰσχυροὶ καὶ καρπὸν
δὲ ὁμοίον κέλεον. φύει ἐν συσί-
οις καὶ φρυγανώδεσιν ὡς ἐπιτοπό-
νι τοποῖς, ἰσχυρὸς δὲ δριμύ.

Ἰσχυρῆται δὲ ἐκ τῶν πινῶν ἢ πύσις
τοῦ καρποῦ γινώριμα ἀρρηγοτόκον
ποιεῖν, εἰάν τις μετὰ τινὶ χύδαρ-
σιν τῷ καταμυλῶν πρὸς τὸ πλε-
στάσαι

σπάται πύνη νῆστις τοῖς ἡμέρας,
ὀκλὴν τειρόμενος μὲν ἵστατος κυά-
δων ἑ. ἐπὶ ἡμέρας μὲν ὠσαύτως
δὲ καὶ ὁ ἀγὼρ πνέτω τὰς ἴσας ἡ-
μέρας καὶ πληροσάξτω.

5 Πρὶ Φύλλον. Κεφ. ρμ'.

Φύλλον, οἱ δὲ ἐλαίουφυλλον,
οἱ δὲ βρυονίαν καλοῦσι. φύεται
ἐν πέτραις, τὸ μὲν θηλυρόνον λε-
ρόμενον; ὥστερεὶ βρύον. ἔχον
χλωρότερον ἐλαίας τὸ φύλλον.
10 χαμλὸν λεπτόν, βραχυὸν ῥίζαν
λεπτήν. ἀνθος λευκόν. καρπὸν
μειζονα ὥσπερ μήκωνος. τὸ δὲ
ἀρρhenορόνον, τὰ μὲν ἄλλα ὁμοιον
τῷ περὶ ἐρημύω· καρπὸν δὲ δια-
φέρει· ἔχει γὰρ ὁμοιον ἀνθεὶ ἐξλω-
15 θηκίας ἐλαίας βορβυάδεα. λέγε-
ται δὲ τὸ ἀρρhenορόνον περὶν, ἀρ-
ρhenοτοκεῖν, τὸ δὲ θηλυρόνον θηλυ-
τοκεῖν. ἰσορεῖ περὶ τούτων Κρα-
τεύας, ἐμοὶ δὲ δοκεῖ τὰ τοιαῦτα
μέχρι τῆς περὶ αὐτῶν ἰσοείας
20 περιελθεῖν.

Πρὶ Ὀρχεως. Κεφ. ρμδ'.

Ὀρχης, οἱ δὲ κυνὸς ὄρχιν κα-
λοῦσι, φύλλα ἔχει κατὰ γῆς ἐ-
σπρωγμένα περὶ τὸν χαμλὸν καὶ τὸν
πυθμύα, ἐλαία μαλακῇ ὁμοία,
15 σενώτερα δὲ καὶ λεῖα μακρότε-
ρα χαμλὸν ὡσαύτως τὸ μήκος,
ἐφ' ᾧ ἀνθὶ πορφυροῖ δ' ῥίζαν βολ-
βοειδῇ, ὅπμῃ κη, διὰ πλῶ, σενλὼ
ὡς ἐλαίας πλὴν μὲν ἄνω, πλὴν δὲ
κατωτέρω, καὶ πλὴν μὲν, πλὴν ῥη-
πλὴν

lier, cute conceptum quadra-
ginta diebus, & vir modo cō-
simili totidem dieb⁹ ante coi-
tum hauriat, virilis sexus par-
tum futurum.

Phyllum. Cap. CXL.

Phyllum, quod & elæo-
phyllon vocatur, duum gene-
rum est, quod autem thelygo-
num appellant, in saxosis mu-
sci modo gignitur, folio oleæ,
sed magis herbaceo: caule te-
nui, breui: radice exili: florem
albū profert: semen papaveris
maiusculū. Sed arrhenogonū
cætera huic simile, solo fructu
distat: habet enim racemosum
quiddā deflorentibus oleis nō
dissimile. Arrhenogonō potu,
masculi sexus facere partus, vt
thelygonō foeminei, proditur,
Horū Crateuas author est: sed
huiusmodi historiā tenus, mihi
produxisse visum est.

Testiculus. Cap. CXLI.

Testiculus, quem Græci cy-
nosforchin vocant, foliis cir-
ca imam caulis partem in ter-
ra stratis, oleæ molli simili-
bus, longioribus, angustiorib⁹,
læuibus: caule dodrantali: flo-
ribus purpureis: radice bulbo-
sa, oblonga, oliuæ modo an-
gusta, duplici ordine: superio-
re, quæ plenior est: inferiore,

A quæ

DIOSCORIDIS

quæ mollior ac rugosior. E-
duntur radices coctæ, vt bul-
bi: ex quibus si maiorem edant
viri, mares generari dicuntur:
si minorem foeminæ, alterum
sexum. Addunt, in Theffalia
mollem mulieres in lacte ca-
prino bibere, ad stimulan-
dos coitus: aridam verò,
ad inhibendos: & alterū
alterius potu resolui.

Nascitur in petro-
fis & fabuletis.

Testiculus alter.
Cap. CXLII.

Testiculus alio nomine se-
rapias, Andrea authore voca-
tur, quoniam radix ad multa
utilis sit, foliis est porri, latio-
ribus, oblongis, pinguibus, ex
alarum sinu inflexis: caule pal-
meo: floribus penè purpureis:
radice testiculis simili: quæ il-
lita tumores discutit, vlcera
purgat, & serpere eadem non
patitur. Abolet fistulas, & illi-
tu inflammationes lenit. Ari-
dæ radices nomas inhibent: fa-
nântq; putredines, & oris vl-
cera cacoëthe: aluum fi-
stunt è vino potæ. De
hac, eadem quæ de
testiculo canis
produntur.

Satyrium.

ἡ δὲ μαλακὴν, καὶ ῥυτίαν, ἐδίδετα
ἢ ἡ ῥίζα ὡς βολβὸς ἐν ἡδυσσῶν, καὶ
ὡς ταύτης δὲ ἰσορεῖται, ἢ μὴ μὴ
ζονα ῥίζαν ὑπὸ ἀνδρῶν ἐπιτομή-
νῳ, ἀρρεγορόνον εἶναι. ἢ ἡ ἐλάτ-
τονα ὑπὸ γυναικῶν, θηλυρόνον, ἢ
περὶ σφόδρῃ ἢ καὶ τὰς ἐν θεπάλῃ
γυναικας, τὸν μὴ ἀπαλὸν μὲν αἰ-
γεία γάλακτος ποτίζον, ὡς παει-
σῶν τὰ ἀφροδίσια· τὸν δὲ ξηρὸν
ὡρὸς ἐπιχερσιν καὶ ἐκλίσιν ἢ ἀφρο-
δίσιον, ἀγαλύνει τε ἢ ἐτέρου 10
ὑπὸ ἢ ἐτέρου πινόμενον. φύει δὲ
ἐν λιθώδεσι καὶ ἀμμώδεσι τόποις.

Περὶ Ὀρχέως ἐτέρου.

Κεφ. ρμβ.

Ὀρχις ἐτέρου, ὃν σεραπιάδα
ἐτέρου καλεῖσιν, ὡς καὶ ἀνδρείας 15
διὰ τὸ πολυχρῆστον ἢ ῥίζης. φύλ-
λα ἔχει εὐκότα ὡς σφῶ ἐπιμή-
κη, πλατύτερα δὲ καὶ λιπαρὰ, ἐ-
πιχερσὶ ἐν ἢ μαρμαίαις καυ-
λῷ ἀσπιδωμῶν· ἀνθῆ ἢ ὑποπόρ-
φυρα· ῥίζα δὲ ὑπὲρ ὅρας 20
ὁμοία. ἡ τις διώκειν ἔχει καὶ αἰ-
σθητορὶ, οἰδημάτων σιέδωσι
κινῶν, καὶ ἐκλῶν ἀνακαταρπικὴν, καὶ
ἐρπητος ἐφελτικὴν, ἀνασιευάζει ἢ
καὶ σύειγας, καὶ τὰ φλεγμαίνοντα
παρηγορεῖ κατὰ πλαιοσπορόν. 25
ἐπὶ ἢ νομάς ἰσησι καὶ τὰ ἐν σκίπε-
δόνι καὶ σόματι κακοήθῃ ἰσθμῷ ἰση-
σι δὲ καὶ κοιλίαν συνὸ οἴνω ποτίζ-
σαι. ἰσορεῖται δὲ καὶ ὡς ταύτης,
ἴσα, καὶ ὡς τὸ κυνὸς ὄρχεως.

Πρὶ

Πῖσι Σατυρείς. Κεφ. ρμγ'.

Σατύριον, οἱ δὲ τείφυλλον χα-
λαῦσιν, ἐπειδὴ ὡς ἐπὶ τὴν γλῶ-
φύλλα τεία φέρει κεκλασμένα, λα-
πάτω ἢ κρίνω ὁμοία ἐλάττονα
5 μὲν τοι καὶ ἐν ῥεύσῃ χαυλὸν δὲ ψι-
λόν, μακρόν, ὡς πύχεως, ἄνθος
* κριδοῦ δὲς, λευκόν· ῥίζα βορβο-
ρῇ ὅσον μῆλον, πυρρὴν, τὰ δὲ ἐν-
τὸς λευκὴν ὡς ὅτε ὠδὸν γενομένην
γλυκεῖαν καὶ εὐστομόν· ταύτην
10 δὲ πίνειν ἐν οἴνῳ μέλανι ἀντιστρε-
φὲς ὁπισθότονον. καὶ εἰ βέλαι
γυναικὶ συνουσιάζει, χεῖται, φα-
σὶ γὰρ αὐτὴν καὶ ἐν μὲν κινεῖν τὴν
ἐπὶ συνουσίᾳ.

Πεὶ Σατυρίου ἐρυθρο-
νίς. Κεφ. ρμδ'.

15 Σατύριον τὸν ἐρυθρόνιον, οἱ δὲ
σατύριον ἐρυθραῖον, ἔχει πτέρμα
λινοπέρμα ἐμφερές, μέζον· ἢ καὶ
ῥωμαλέον, καὶ σίλβον, καὶ λεῖον ὅτε
ἰσορεῖται καὶ αὐτὸ συνουσίας ἐγεί-
20 ρειν ὡς ὅτε καὶ ὁ σκύρκος. ἔστι δὲ ἡ
ῥίζη αὐτῆς, ὁ μὲν φλοιὸς ὑπὸ χυνοῦ
καὶ πυρρὸς· τὸ δὲ ἐνδοθεν λευ-
κόν, γενομένην εὐστομόν, καὶ γλυ-
κύν· φύεται ἐν ἐρηλίοις καὶ ὄρει-
νόις τόποις. ἰσορεῖται δὲ ὅτι καὶ εἰς
25 τὴν χεῖρα ληφθεῖσα ἢ ῥίζα ἐρε-
δίζει πρὸς ἀφροδίσα· συνὶ οἴνῳ
δὲ ποθεῖσα μέλαν.

Πῖσι Ορμίνης ἡμέρας. Κεφ. ρμέ.
ORMINON ἡμερὴν πῶτα ἐ-
στὶν ἐμφερέως πρὸς τὴν φύλιν.
καυλὸς

Satyrium. Cap. CXLIII.

Satyrium aliqui trifoliū vo-
cant, quoniam tria fert folia, ad
terram infracta, rumici aut li-
lio similia, minora tamē, ac ru-
bra: caulem cubitalē, nudū: flo-
rem lilij effigie, candidum: radi-
cem bulbosā, māli magnitu-
dine, fulvā, intus vt ouum, can-
didam, gustanti dulcem, & ori
non ingrata: quam in vino ni-
gro austero bibere conuenit,
contra opisthotonium. Utendū
ea dum concumbendi incessit
cupiditas, siquidē ea pronio-
res ad venerem fieri affirmat.

Satyrium erythronium.

Cap. CXLIII.

Est & alterum satyrium e-
rythronium siue erythraicon,
id est rubrum, semine lini, ma-
iore, duro, læui, splendēte:
quod fertur, non secus atque
scincus libidinē excitare. Cor-
tice radice gracili, rufo: intus
autem album includitur, sa-
pore dolci, non ingrato, ori
in montosis & apricis enasci-
tur. Venerem, vt produnt, si o-
mnino manu teneatur radix,
stimulat, eoque magis, si bibe-
tur in vino.

Horminū. Cap. CXLV.

HORMINVM HER-
ba est, folijs marrubio similis:
A ij caule

DIOSCORIDIS

caule semicubitali, quadran-
gulo, circa quem eminentiæ
siliquis similes prodeunt, quæ
ad radicem spectant, in qui-
bus diuersum semen recludi-
tur: siquidem in syluestri ro-
tundum, fuscumque inuenitur:
in altero, nigrum & oblongum,
cuius est usus. Ad venerem sti-
mulandam, cum vino bibi voluit.
Purgat cum melle argemas al-
buginesq; , & illitum ex aqua tur-
mores discutit. Eo etiã extra-
huntur aculei ex corpore. Idem
effectus est illitæ herbæ. Sylue-
stre magis viribus pollet: qua-
re vnguentis, præsertim gleu-
cino, permiscetur.

Securidaca. Cap. CXLVI.

Hedysaron, quod vngueta-
rij pelecium, id est securidaca
vocant, frutex est, foliis ciceris:
femen rufū in filiquis fert: cor-
niculorū modo aduncis, quod
ancipitem securim æmulatur,
vnde nomen accepit amarum
gustu. Stomacho vtile in potu.
Additur in antidota. Cū melle
ante coitus subditum, concipi-
endi spem adimit. Nascitur in
fegetibus & hordeis.

Onofma. Cap. CXLVII.

Onosma, oblonga folia ha-
bet: ad similitudinem anchusæ,
longitudine

χαυλὸς δὲ τετραγώνος ἡμιπ-
 λῆτος, ὅθεν ὄν ἐξοχαὶ ὁμοίαι ἡ-
 ῶσις ὡς ἐπὶ τῷ ῥίζαν νενευκῆαι,
 ἐν αἷς σπέρμα διάφορον· ἐπὶ μὲν
 τῷ ἀγρίῳ στρογγύλον εὐείκε-
 φαιόν· ἐπὶ δὲ τῷ ἐτέρῳ ἐπίμη-
 κες καὶ μέλαν, ὅθεν ἡ χελῖς. δο-
 κεῖ δὲ καὶ τῷ το σὺν οἴνῳ πινόμε-
 νον, συνιοῖσαν παρρημαῖν ἀποκα-
 ταρῆ δὲ σὺν μέλιτι ἄργημα,
 κευκώματα, καταπκαδὲν δὲ
 μὲν ὕδατος καὶ οἰδήματα διαφο-
 ρεῖ, καὶ σκόλοπας ὅπως αὐτῶν. καὶ ἡ
 πῶς δὲ καταπκαδεῖσα, τὰ αὐτὰ
 ποιεῖ. τὸ δὲ ἄγιον ἰχυροτέρων
 ἔχει τὴν δυνάμιν· ὅθεν μίγνυ-
 καὶ συγχρίσασσι, μάλιστα δὲ τῷ
 γλευκίνῳ.

Πρὸς Ἡδυσάρκ. Κεφ. β'.

Ηδύσαρον τὸ ὑπὸ τῶν μυρε-
 ψῶν καλέμενον πεκεῖνος, δά-
 μνος ἐστὶ φυλλαρία ἔχων ἐρεβίνθα
 ὁμοία, λευκὰ δὲ κερατοῖς εἰκό-
 τας ἐν οἷς τὸ σπέρμα πυρρὸν, ὁ- 20
 μοιον πελέκῃ ἀμφισόμῳ, ὅθεν καὶ
 ὠνόμασται· πικρὸν γυναικίῳ ἐν-
 σόμαχον ποτεν. μύγνυται δὲ καὶ
 ἀντιόδοις. σὺν μέλιτι δὲ πρε-
 σκεῖται πρὸς τῆς μύξεως, ἀτόκιον
 εἶναι δοκεῖ. φύεται δὲ ἐν κριθαῖς 25
 καὶ πυρεῖς.

Πρὶ Ὀνόματι. Κεφ. ρμζ'

ὄντομα, οἱ δὲ ὀσμιάδα, οἱ δὲ
 φλογίτην, οἱ δὲ ὄνομα καλῶσι, τὰ μὲν
 φύλλα ἔχει ὁμοία τοῖς τ' ἀγχα-
 ρης

σπς, περιμήκη, μαλακὰ ὡς τε βαν-
δακτύλα τὸ μήκος, τὸ δὲ πλάτος
δακτύλου, ἐπὶ γῆς κατεσπαρμένα,
ἐμφερέστα τοῖς δὲ ἀρχύσις, ἔστι
δὲ ἀχυλός, ἀλαργός, ἀνάνθησ
5 ρίζιον δὲ ὕπερ ἐπέμνηκες, ἀδε-
νές, λεπτόν, ἐρευνδές ἰσχυρὸν φύει
δὲ ἐν τραχήσι τέποις. Τοῦ τε τὰ
φύλλα ἐν οἴνῳ ποθέντα, ἐμβρυα
ἄγει φασὶ δὲ ὅτι καὶ ἐγγυός ὑ-
περβῆ τὴν πύαν ἐν πρώτῃ.

20 Πρὶ Νυμφαίας. Κεφ. ρμῆ.

Νυμφαία φύεται ἐν ἔλειπ καὶ
ὑδασι σασι μοῖς, φύλλα δὲ ἔχει
ὁμοία κισσείῳ σμικρότερα δὲ καὶ
ἐπιμηκέστερα, ποσὺς ὑπερέχοντα
τῷ ὑδατος, τὰ δὲ καὶ ἐν αὐτῷ τῷ

25 ὑδατι πλείονα ἐν τῇ αὐτῇ ρίζῃς.
ἀνδρὸς δὲ λευκόν, ὁμοιον κρίνω, ἔ-
χον κροκώδες τὸ μέσον ὅταν δὲ ἀ-
παυδήσῃ, σπογγύλον, μύλω παρα-
πλήσιον ἢ περιφερείᾳ γίνεσθαι, ἢ μή-
κυνος κεφαλῇ, μέλαν ἐν ᾧ κα-
20 πὸς μέλας, πλατὺς, πυκνός, γυ-
ρομήνῳ γλίχρος ὃ δὲ χαυλὸς λεῖ-
ος, οὐ παχύς, μέλας, ὁμοῖος τῷ
τῷ κισσείῳ ρίζα μέλαινα, τρα-
χεῖα, ῥοπαλοειδής, ἢ πῖς τέμνεσθαι
φθινοπώρῳ. Σηρὰ οὖν σὺν οἴνῳ

25 ποδείσῃ, κοινὰ κοινὰ ὠφελεῖ, δυ-
σεντέικες, καὶ σπλῆνα τήκεσθαι
πλάσσει δὲ πρὸς σωμαχί καὶ κύ-
σεως ἀλγύματα ἢ ρίζα, καὶ ἀλφὸς
σμήχει σὺν ὑδατι. ἀλωπεκίας
τὴ σὺν πίσσῃ ἐπιτεδείσῃ ἰατα-
πίνεται.

longitudine quatuor digito-
rum, & vnius latitudine, mol-
lia, in terra iacentia, sine caule,
sine semine, sine flore: radice
nititur longa, tenui, infirma,
rubescente: gignitur in aspe-
ris. Folia in vino pota par-
tus extrahunt. Prægnans
si eam supergredia-
tur, abortum fa-
cere dicitur.

Nymphæa. Cap. CXLVIII.

Nymphæa nascitur in pa-
ludibus & stagnantibus aquis,
foliis fabæ Egyptiæ, mino-
ribus, & longioribus, aliis in
summa aqua, aliis demersis
pluribus ex radice eadem pro-
deuntibus: flore lilio simili,
albo, & in medio crocos ha-
bente: cum defloruerit, ut ro-
tundum malum, aut papaue-
ris caput, extuberat: nigro se-
mine, denso & lato, lenti gu-
stus: caulis est lævis, niger, mi-
nimè crassus, Egyptiæ fabæ
cognatus: radix nigra, scabra,
clauæ similis, quæ autumnò
secatur. Sicca cum vino po-
ta coeliacis, dysentericisque au-
xiliatur, & lienem absument. Ra-
dix stomachi ac vesicæ dolo-
ribus illinitur, vitilignes ex
aqua emendat: imposita cum
pice, alopecii medetur. Ea-

A iij dem

dem contra veneris insomnia
bibitur, siquidem ea prorsus
adimit, pota assidue aliquot
diebus, genitaléque infirmat.
Idem semen potum efficit.
Nymphææ nomen sibi vendi-
casse videtur, quoniam aquo-
sa amet. Plurima inuenitur in
Elide, in Anygro amne, & in
Bœotiæ Aliarto.

Nymphæa altera.

Cap. CXLIX.

Est & altera nymphæa, cu-
ius flos blephara dicitur, fo-
liis antè dictæ, radice alba,
scabra, flore luteo, nitente,
rosæ simili. Huius semen & ra-
dix, contra foëminarũ proflu-
uia efficaciter ex vino nigro
bibuntur. Nascitur in Thessa-
lia, amne Peneo.

Androsaces.

Cap. CL.

ANDROSACES her-
ba est amara, tenues spargens
iuncos, sine foliis, folliculos
in capitulis habens: in quibus
semen continetur: gignitur in
Syriæ maritimis. Ea drachmis
duabus in vino pota, copio-
sam hydropicis vrinam ci-
et. Idem effectus est se-
mini pota, & herbe
decocto: podagris
vtiliter illinitur.

Asplenium.

πίνεται δὲ ἡ ῥίζα καὶ πρὸς ὀνί-
ρωγμούς, παραιτεῖται γὰρ τέττες,
ἀπνίαν τε ἐργάζεται αἰδοίου
πρὸς ὀλίγας ἡμέρας, εἴ τις ἐν-
δελεχῶς πίνει. τὸ αὐτὸ δὲ ποιεῖ
καὶ τὸ σπέρμα ποθέν. δοκεῖ δὲ ὁ-
νόμασθαι νυμφαία, διὰ τὸ ἐνυ-
δρον φιλεῖν τέπον. εὐρίσκεται δὲ
πολλὴ ἐν ἡλιδι ἐπὶ τῷ ἀνύγρῳ πο-
ταμῷ, καὶ τῷ βοιωτίας ἐν ἀλιαρτῷ.

Πρὶ Νυμφαίας ἄλλης.

Κεφ. ρμθ'.

10

Γίνεται καὶ ἄλλη νυμφαία, ἥς
τὸ ἄνθος βλέφαρα λέγεται, φύλ-
λα ἔχουσα ὅμοια τῇ περὶ ἐρημέ-
νῃ ῥίζῃ μὲν τοὶ λευκὴ καὶ τε-
χεῖαν ἔχει, ἄνθος μύλινον, εἴλεον,
ὅμοιον ῥόδῳ. ποιεῖ δὲ ἡ ῥίζα καὶ ἰς
τὸ σπέρμα πρὸς ῥοῦν γυναικεί-
ον ἐν οἴνῳ μέλανι πινόμενον. φέ-
ται ἐν τοῖς περὶ Θεσσαλίαν τό-
ποις καὶ τῷ πινειδὸν ποταμῷ.

Πρὶ Ἀνδρσακίαις. Κεφ. ρν'.

Ἀνδρόσακες γίνεται μὲν ἐν συ-
εῖᾳ ἐν παραθαλασσίαις τοῖσις,
πόα δὲ ἔστι λεπτὴ, λεπτόκαρπος,
πικρὰ, ἀφυλλος, θυλάκιον ἐπὶ τῷ
κεφαλῇς ἔχουσα σπειρίδιον σπέρ-
ματος. Διῶαμιν δὲ ἔχει ποθέν-
σα συὸ οἴνῳ < β. πηλίδος, οὖρε 25
πολλὰ ἐπὶ ὑδρωπικῶν ἀγειν. καὶ
τὸ ἀφέψημα τῆς πόας καὶ ὁ καρ-
πὸς πινόμενος, τὸ αὐτὸ ποιεῖ κα-
ταπλάσσεται δὲ καὶ ἐπὶ ποδάλ-
γησιν ὠφελίμως.

Πτερί

Πρὶ Ἀσπλῦος. Κεφ. ρνα.

Ἀσπλῦον, οἱ δὲ σκολοπένδριον,
οἱ δὲ σπλῦιον, οἱ δὲ ἡμιόνιον, οἱ
δὲ πῆρυξ, φύλλα ἔχει σκολοπέν-
δρα τῷ θειῷ ὁμοία, πλείονα
ἂπὸ μιᾶς ῥίζης πειερόμυρα.
φύεται ἐν τοῖχοις καὶ πέτραις ἔ-
κτὸς ἀπὸ κοχλάων παλισκίοις ἁ-
κρωλα, ἀναστῆ, ἀκαρπα, ἐν τῇ μη-
ρῷ αὐτοῦ τὰ τῷ πολυποδίν, καὶ τῷ
δεν ὑπόξαντα, καὶ δασέα, ἀνωθεν
δὲ χλωρά. Διώαμιν δὲ ἔχει τὰ
φύλλα ἂπὸ ζεδέντα συν ὄξυ καὶ
πινόμυρα ἐπὶ ἡμέρας μ. σπλῦ-
να τῆκεν· δεῖ δὲ καταπλάσσειν
καὶ τὸν σπλῦνα τοῖς φύλλοις λεί-
οις συν οἶνω βουδεῖ καὶ σπαραγρία
καὶ λυγμῷ, καὶ ἰκτέρω, καὶ λίθοις
τοῖς ἐν κύσει θρύπτει· δοκεῖ δὲ ἀ-
τόκιος εἶναι καὶ εἰς αὐτὸν, καὶ με-
τὰ ἡμιόνου. σπλῦνός περιαπτομέ-
νη ἀσελήνης δὲ νύκτος φασὶ δεῖν
αὐτὸν ὀρύσσειν ἀτόκιον.

20 Πρὶ Ἡμιονίτιδος. Κεφ. ρνβ.

Ἡμιονίτις, οἱ δὲ σπλῦιον,
φύλλον ἀνίστην ὁμοιον δρακον-
τείῳ, μένεται δὲ ῥίζαι δὲ ὑπὸ
σι πολλὰ, λεπταὶ οὐτε δὲ κρυ-
λόν, οὐτε καρπὸν· οὐτε ἄνθος
φέρει. φύεται ἐν πετρώδεσι τό-
ποις, γευσάμενός δὲ ἡ πῶς συ-
πληκνῆ τις συν ὄξυ ποδεῖσα, τῆ-
κει σπλῦνα.

Πρὶ Ἀνθυλλίδος. Κεφ. ργ.

Ἀνθυλλίς διτλή· ἡ μὲν
δ

Asplenium. Cap. CLI.

Asplenium, aliqui scolopen-
drium vocant, alij splenion, a-
lij Hemionium, foliis est mul-
tis, scolopendræ animalī simili-
bus, ab radice vna prodeunti-
bus. Nascitur in parietibus, fa-
xisq; filiceis, & opacis: nec cau-
lem, nec florem, nec semen ha-
bet. folia filiculæ modò diuidū-
tur, subter flauescētia hirsutāq;
supernè viridia. Vim hanc ha-
bent folia in aceto feruefacta,
vt per dies quadraginta pota,
lienem absumāt: quibus etiam
contritis lienem ex vino illini
oportet. Stranguriæ & regio
morbo prodest, singultū sedat,
calculos in vesica comminuit,
Cōceptum adimere creditur,
per sese aut cum muli liene ap-
pensa. Tradūt noctu, silente lu-
na, huius rei gratia effodiendā.

Hemionitis. Cap. CLII.

Hemionitis, quam aliqui
splenion vocant, folium emit-
tit dracunculi, lunæ modò in-
curuū, radicibus cohæret mul-
tis, tenuibus: nunquam flores,
neque semē, neque caulem gi-
gnit: in petrosis nascens, au-
stero sapore. Ea ex aceto pota
lienem absumit.

Antyllis. Cap. CLIII.

ANTYLLIS duplex est
A iij. quedā

DIOSCORIDIS

quædam enim lenti simillima, foliis mollibus, rectis ramulis, palmi altitudine : radice parua, tenui. Nascitur in falsis terris, & à sole illustratis, non infuso gustu. Altera est foliis ramulisque aiugæ similis, hirsutioribus tamé, breuioribus, & asperioribus, flore purpureo, odoris admodum grauis : radice cichorij . Pota drachmis quatuor urinæ difficultati, renibusque plurimum prodest. Tritæ, vuluæ pituitas emolliūt, cum rosaceo, & lacte impo-
tæ : vulneribus medetur. Quæ autem aiugæ similitudinem refert, præter alia, pota cum aceto mulso co-
mitiales sanat.

Anthemis. Cap. CLIII.

Anthemidis genera tria, tantum flore distat : rami dodrantes, fruticosi, alis multis concavi : tenuibus foliolis, paruis, numerosis : rotundis capitulis : floribus in medio aureis, forinsecus orbiculato ambitu cadi-
dis, melinis, aut purpureis, magnitudine foliorum rutæ : nascitur in asperis, & iuxta semitas : colligitur vere. Vim habet radices, flores & herba excalfaciendi, extenuandi : potu, & infusione, pellunt mēstrua, partem, urinam

ἡ φανερὰ παρὰ πλείους φύλλα ἔχει καὶ κλωνία, σπιδαιμῆς ὕψος, ὁρμα δ' ἐκ τῶ φύλλα μαλακά. ῥίζα δ' ἐλεπτή, μικρά. φύεται ἐν ὑψηλοῖς τόποις καὶ ἐν ὑψηλοῖς, γενομένη ὑψηλός. Ἡ δ' ἑτέρα χαμαιπύτι τὰ φύλλα καὶ τὰ κλωνία ἔοικα, δασύτερα, μὴ τοῦ καὶ βραχύτερα, καὶ τεαχύτερα, τὸ δ' ἄνθος πορφυρεῖν, βαρυσμὸν ἰχυρῶς. ῥίζα ὡς περὶ κυχελίου. Διῶνται δ' ἰχυρῶς διουρεῖσι καὶ νεφειτικοῖς πινόμεν βουδεῖν, πλεῖστος δ' ἐκ μαλάσσει δὲ φλέγματα ἐν ὑσέρι, λεία. συν ῥοδίῳ καὶ γάλακτι πρὸς δέμασι τῶν δ' ἐκ τραύματα. ἢ δὲ τῇ χαμαιπύτι ὁμοία, μὴ ἴσ' ἄλλων καὶ ἐπιληπτικούς ἰσται συν ὀξύμεντι πινόμεν.

Πρὶ Ἀνθέμιδος. Κεφ. ρνδ'.

Ἀνθεμῖς, οἱ δὲ λευκαῖς δεμον, οἱ δὲ ἡράνδεμον, διὰ τὸ ἀνθεῖν ἐπὶ ἔαρος, οἱ δὲ χαμαίμικρον, διὰ τὴν πρὸς τὰ μύλα ὁμοιότη-
τα τῇ ὀσμῇ, οἱ δὲ μελαῖς δεμον, οἱ δὲ χρυσοκόμην, οἱ δὲ καλλιαν καλοῦσι ταύτης εἶδη τεῖα ἀνθε-
σι μόνον διαφέροντα. κλώνες σπιδαιμῶνι δαιμοειδεῖς, μαγὰς καὶ ἔχοντες πολλὰς, κλωναῖα μι-
κρά, λεπτά, πολλὰ, κεφάλια πε-
φερῇ ἔνδοθεν μὴ χεῖρ ἰσίζοντα ἄ-
νη, ἔξωθεν δ' ὡς κληνὴ κυκλωτε-
ρῶς λευκά, ἢ μύλινά ἢ πορφυρά,
καὶ

καὶ μέγας πηγάς φύλλων· φύε
 ἐν τόποις τραχείς καὶ παρὰ τὰς ὀ-
 δοὺς συλλέγε· δὲ ἔαρος. Διῶ-
 μιν ὅ ἔχουσι αἱ ρίζαι καὶ τὰ αἶθνη
 καὶ ἡ βοτάνη θέρμαντικὴν, λεπτι-
 5 πικρὴν· πνέμεται δὲ καὶ ἔγκαθιζό-
 μεται, κατὰ μήλια ἄγουσι καὶ ἔμ-
 βρυα, καὶ λίδοις, καὶ ἔρα· ποτίζε· ὅ
 καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις καὶ εἰ-
 λεοὺς, καὶ ἰκτερον δὲ ἀποκαθαίρει
 καὶ ἡπατικούς ἰών· καὶ τὸ ἀφέ-
 10 λημα δὲ αὐτῶν εἰς πυρεῖας λαμ-
 βάνεται τὰς πρὸς κύστιν. πρὸς
 κτικώτερον ὅ τοῖς λιθιδῶσι τὸ πορ-
 φυρανθές, ὃ ὅτ τοῖς ὅλοις ἔστι μετ-
 ρον ἰδίως ἡρανθήμεον καλέμενον.
 τὸ δὲ λευκανθήμεον καλέμενον·
 15 ρητικώτερον καὶ τὸ χρυσανθήμεον.
 δεραπύοισι δὲ καὶ αἰγλώπια κα-
 ταπλασόμεναι· διαμασώμεναι
 δὲ καὶ ἀφθαρῖωνται. χρῶνται δὲ
 πηγες καὶ συγκλύσασιν μετ' ἡαίης,
 λεοτειβουῶντες αὐτὰ πρὸς ἀνα-
 20 σκευῶν τῶν πελοδικῶν πυρετῶν.
 ἀποπίδεσθαι δὲ δεῖ τὰ φύλλα καὶ
 τὰ αἶθνη ἔκαστον αὐτῶν κέπλοντας
 ἰδίως καὶ ἀναλαμβάνοντας τροχί-
 σκους· ὅ ὅ ρίζαν ἐκκαίνοντας· χρεῖ-
 ας δὲ ὀπληρομένης, διδόναι ὃ τὸ
 25 μὲν τῆς βοτάνης μέρι β'. ὃ τὸ ὅ τῆς
 αἶθνης ἡ δὲ ρίζης μέρος ἓν. ὃ τὸ δὲ
 τοῦ αἶθνης, τῆς αἶθνης μὲν β'. τῆς
 ὅ βοτάνης ἓν, ὃ δὲ ἀπὸ διπλασιάζ-
 ζοντας παρ' ἡμέραν πίνειν δὲ δεῖ
 ἐν οἴνομῳ κεκραμένῳ.

Περὶ Παρ-

vrinam, calculosque: aduer-
 sus inflationes, & ilei tormen-
 ta bibuntur: bilem suffusam
 expurgant: iocinerum vitia san-
 nant: decocto earum vesicæ
 fouentur. Ex omnibus his ge-
 neribus ad calculos efficacissi-
 ssima est, quæ florem purpu-
 reum habet, cuius amplitudo
 maiuscula est: hanc propriè he-
 ranthemum vocant. Ea cui leu-
 canthemum nomen est, ite quæ
 chrysanthemum dicitur, vehe-
 mentius vrinam ciunt. Ægi-
 lopiis illitæ medentur: com-
 manducatæ vlcerum eruptiones
 in ore, sanant. Nonnulli
 in clysteribus ex oleo vtun-
 tur, terunturque in farinam,
 ad abigendos febrium circui-
 tus. Flores & folia recondi
 debent, & priuatim tusa, in
 pastillos digeri: radix quoque
 ficcari, dumque ingruit ne-
 cessitas, binæ partes herbæ da-
 ri, modo floris aut radicis pars
 vna, modo contrà, floris par-
 tes duæ, & herbæ vna, per-
 mutatim duplicato pon-
 dere, alternis diebus:

bibere autem o-
 portet in vi-
 no mul-
 so, dilu-
 to.

Par-

DIOSCORIDIS

Parthenium. Cap. CLV.

Parthenium, aliqui amaracon vocant, foliis est coriandri, tenuibus: flore per ambitum albo, intus melino, odore subuiroso, sapore amaro. Siccatur, cum aceto mulso, aut sale potu, non secus atq; epithymu, & bilem & pituita detrahit: suspiriosis prodest, & melancholicis. Herba sine flore à calculosis, & anhelatoribus magna vtilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritia vulvarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionibus, cum flore.

Bupthalmum.

Cap. CLVI.

Bupthalamon (quidam ca-chlam vocant) tenues emittit cauliculos, mollésq; folia foeniculi: luteum florem, anthemide maiore, oculi similitudine, unde nomen traxit: circa oppida nascitur, & in capestribus: Flores cum cerato triti, tumores duritiásque discutunt. Aiunt epotam post exitu à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

Pæonia. Cap. CLVII.

Pæonia siue glycyfide. Græcis aliquibus pentoboron dicitur: sunt qui idæos dactylos radicé

Περὶ Παρθενίου. Κεφ. ρνέ.

Παρθένιον, οἱ δὲ ἀμάρakon, οἱ Ἰ λευκαῖθμων, φύλλα ἔχει ὁμοία κορίω λεπτά· αἴθνη λευκὰ κύκλω, τὸ δὲ μέσον μύλινον, ὁσμὴ ὑπόβρωμον, τῇ δὲ γούσει πικρίζον. Διῶνται δὲ ξηρὰ (ὡς ὀξύμελι) πῆ (ὡς δὲ οἱ ποθεῖσα ὡς το ὀπίθυμον, φλέγμα, καὶ χολῶν ἄγειν κάτω· καὶ τὸν ἀθματικούς ὠφελεῖν καὶ μελαγχολικούς· ἢ πῶς δὲ χρεῖς τοῦ αἵματος, ὠφελίμως ἐπιλεθίωντων καὶ ἀθματικῶν ποτίζει). τὸ δὲ ἀφελίμα αὐτῆς ἐγκάθισμα ὑστέρας ἐσκληρυμένης καὶ φλεγμαινούσης ὁρί. κατὰ πλάσσειται δὲ καὶ πρὸς ἐρισπύλατα καὶ φλεγμονὰς συν τοῖς αἵματι. 15

Πρὶ Βυφθάλμῳ. Κεφ. ρνς.

Βούφθαλμον (οἱ δὲ κάχλαν καλοῦσι) χαυλῖα ἀνίστοι τευφερά, ὑπόλεπτα· φύλλα δὲ μαρὰ θροδῆ· αἴθνη κήληνα, μείζονα τῆς αἵματός, ὁφθαλμοειδῆ· ὅθεν καὶ ὠνόμασαι· φύεται δὲ ἐν πεδίοις· καὶ περὶ τὰς πόλεις. Ταύτης τὰ αἴθνη λεία συν κηρωτῇ, οἷ δὲ ἡματα καὶ σκληρίας διαφορεῖ· φασὶ δὲ ὅτι ἐν τῷ βαλανείῳ μετὰ τὸ ἐξῆσθαι πινόμενον, ὑγροῖαν ποιεῖ πρὸς χροῖον πνὰ τοῖς ἰκτερίκοις. 20

Περὶ Παιονίας. Κεφ. ρνζ.

Παιονία, ἢ γλυκυσίδη, οἱ δὲ πεντόβορον· οἱ Ἰ δάκτυλος τὴν ρίζαν

ῥίζαν παριόναν χαλῶσι. καυ-
 λὸς δὲ διασπιδαμῶς. φύεται πα-
 ραφυσάδας ἔχον πολλὰς· φύλλα
 δὲ ἢ πᾶ ἄρβιλον βασιλικὴ καρύα ὁ-
 μοια· ἢ δὲ θήλειαν ἀπέχουσα τὰ
 5 φύλλα ὡς τῶν σπύργιον. λοβοὺς δὲ
 πῶς ἀνίστην ἐπ' ἄκρου τῷ χαλῶ
 ἀμυγδαλοῖς ὁμοίως· ὧν ἀνωχθύν-
 των ἐνείσπον· ἐνυδρὶ κόκκοι πολ-
 λοὶ, μικροὶ, ἐμφεῖς τοῖς τῆς ροιᾶς,
 ἐν μέσῳ δὲ μέλανες, ἐμπόρφυροι
 10 ἢ ἢ ἢ. ῥίζα δὲ τῆς πᾶ ἄρβενος, πε-
 ρὶ δακτύλου πάχος, μήκος δὲ σπι-
 δαμῆς, γευομένην σφόδρα, λευκὴν
 ἐπὶ δὲ τῆς θηλείας παραφυσάδας
 ὡς τῶν βλαάνοις ἔχουσα ζ'. ἢ ἢ.
 ὡς τῶν ἀσπρόδελος. Δίδεται δὲ γυ-
 15 ναίξιν ἢ ῥίζα ταῖς ἐν τόκῳ μὴ κα-
 θαρσύνουσαι· καὶ δὲ καὶ τὰ χα-
 ταμύρια ἀμυγδαλοῦ μέγεθος
 σπινυμένη· τοῖς τε κατὰ γαστέρα
 ὀδυμέναις βοηθεῖ ποθεῖσαι ἐν οἶνῳ.
 ὠφελεῖ δὲ καὶ ἐκτετακτοῖς, καὶ νεφρι-
 20 τοῖς, καὶ κύστιν δὲ γυναικας. ἐν-
 δεῖσαι ἐν οἶνῳ καὶ σπινυμένη κοι-
 λίαν ἱσησι. τοῦ δὲ καρπού ἢ ἢ
 ἢ ἢ. κόκκοι σπυρροὶ ποθέντες ἐν
 οἶνῳ μέλανι ἀμυγδαλῶν, ῥομῶν ἐνυδρὸν
 ἱσῶσι· σωμαχοῖς τε δακρυμέ-
 25 γοις ἐπιτόμιοι βοηθοῦσι. καὶ ὑπὸ
 τῶν παιδίων σπινυμένοι, καὶ ἐ-
 πιτόμιοι ἀρχαῖς λιθιάσεως πα-
 ραιτοῦνται. οἱ δὲ μέλανες καὶ
 πορὰ τὸς ὑπὸ ἐφιδῶ τῶν πνιγμὲς
 καὶ πορὰ τὰς ὑστερικὰς σπινυμὲς
 καὶ ὁ-

radicē pæoniam vocant. Cau-
 lis altitudine sesquipedis ado-
 lescit, comitâtibus multis stolo-
 nibus. Huius duo genera mas,
 folia iuglandis habet: in foemi-
 na verò, smyrnij more diuidun-
 tur. Summo caule filiquas e-
 mittit, veluti græcas nuces: in
 quibus cum dehiscunt, multa
 granula rubra, acinis punico-
 rum similia, inueniuntur, & in
 medio nigra, quinque aut sex,
 purpurea. Radix maris (te-
 nuis) digitali crassitudine, &
 palmi longitudine, gustu ad-
 stringens, alba: foeminæ ra-
 dicibus ceu glandes circiter
 septem aut octo inhærent, vt
 in hastula regia. Foeminis à
 partu non purgatis sicca ra-
 dix datur: ciet menses nucis
 græcæ magnitudine pota: sic
 ventris doloribus cum vino
 auxiliatur. Valet contra re-
 gium morbum, & renum, ac
 vesicæ dolores. Decocta in vi-
 no aluum fistit. Rubra grana
 rubenteis menses sistunt, de-
 cem vel duodecim pota in vi-
 no austero & nigro: stomachi-
 cis & erosionibus ea esse pro-
 dest: à pueris pota, initia calcu-
 lorū eximūt. Grana nigra auxi-
 liâtur suppressionibus noctur-
 nis, vuluæ strangulationibus,

DIOSCORIDIS

& matricis doloribus, quinde-
cim numero pota, in aqua mul-
sa, aut vino. Nascitur in altissi-
mis montibus & præruptis.

Lithospermum.

Cap. CLVIII.

Lithospermon à feminis du-
ritia nomen accepit : foliis est
oleæ lógioribus, & latioribus,
mollioribus: iacent humi, quæ
ab radice exiliunt: ramulis re-
ctis, tenuibus, firmis, crassitu-
dine acuti iunci, lignosis, in
quorum cacumine bifidi ex-
ortus, cauliculorum speciem
exhibent: foliis longis, inter
quæ paruum semen, rotun-
dum, erui magnitudine, du-
ritia lapidea. Nascitur in aspe-
ris & æditis locis. Vim hanc
habet, vt semine cum vino al-
bo poto calculos frangat, pel-
latque vrinam.

Phalaris. Cap. CLIX.

Phalaris cauliculos emittit
zeæ culmis similes, à minutis ac
nullius vsus radicibus, multos,
duum palmorū, geniculis cin-
ctos, graciliores tamen ac dul-
ces: semé cādidū, oblongū, mi-
lij magnitudine. Tūditur, & in
aqua aut vino succus ad vesi-
cæ cruciatus vtilissimè bibitur.
Semen cochlearis mensura po-
tum, ad eadem efficax est.

Rubia.

ἢ ὀίνῳ, ὅσον ἐ. κόκκοι πινόμενοι,
πρὶ οὗσι. *

Περὶ Λιθοσπέρμου.

Κεφ. ρηθ.

Λιθοσπέρμον, οἱ δὲ αἰγώνιον, ὅ-
σοι δὲ ἐξώνιον, οἱ δὲ ἡράκλειαν,
διὰ τὴν περὶ τὸ σπέρμα ἰσχυρό-
την καὶ λιθοσπέρμον ὠνόμασαν·
φύλλα ἔχει ὅμοια ὕαιας, μακρό-
τερα δὲ καὶ πλατύτερα, καὶ μαλα-
χώτερα, καὶ τὰ περὶ τὸν πυθμένα
ἐπὶ γῆς κείμενα· κλωνία δὲ ὀρ-
θα, λεπτά, πάχος ὀξύγινου, στερεά,
ξύλωδη, ἐπὶ δὲ τῶν ἀκρῶν αὐ-
τῶν δίχρηλος ἐκφύεται, καυλοειδής·
ἔχουσα φύλλα μακρὰ παρ' οἷς
σπέρμα λιπώδες, στρογγύλον, μι-
κρόν, ὁμοῖον ὅσον· φύεται ἐν τρα-
χέσι τόποις καὶ ὑψηλοῖς. Διῶα-
μιν δὲ ἔχει τὸ σπέρμα μετ' οἴνου
λευκοῦ πινόμενον, λιδοῖς θρύπην
καὶ οὖρον ἀγειν.

Περὶ φηλαίης. Κεφ. ρηθ'. 20

Φηλαίη, καυλία ἀνήσπον ἐκ ρι-
ζῶν λεπτῶν καὶ ἀχρήστων πολλὰ,
διπάλαια, γονατώδη καλαμοει-
δῆ, εὐκότα τοῖς ἡΐας· σπέρμα δ'
ἐπὶ μέγεθος κέχρηκε λευκὴν ὑπὲρ
μυκῆς. Διῶαμιν δ' ἔχει κοπιόμην·
ἢ ὅτι καὶ χυλίζομένη δι' ὑδατος
ἢ οἴνου, πρὸς τὰ ἡΐας δὲ γήμα-
τα ποιεῖν πινόμενη· καὶ τὸ σπέρμα-
τος δ' ἢ μὲν κοχλιαρὴ ὑδατος πλῆ-
θος πινόμενη πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ.

Περὶ Ερυ-

Πρὶ Ερυθροδάνῃ. Κεφ. ρζ΄.

Rubia. Cap. CLX.

Ερυθρόδανον, ἢ ἐρευνδόδανον,
 ἔνιοι δὲ τεύθριον χαλοῦσι, ῥίζα δὲ
 ὅσῃν ἐρυθρὰ βαφικὴ· ἢ μὲν τις ἀ-
 γεία· ἢ δὲ σπαρτή, ὡς ἐν θαλασσῇ
 5 ἢ γαλιλαίας, καὶ ῥαβδώνη· ἢ ἰτα-
 λίας, καὶ ἐν κρείᾳ μεταξὺ τῶν Ἰτα-
 λῶν ἀπειρέμυρον ὡς ἔσθ' ἐν τῷ ἀρού-
 ρου. ὁφθίμως ὅ ἀπείρε, διὰ τὸ
 γίνεσθ' ἐν τούτῃ πλείστην ὥρεσιν
 10 δον. εἰσὶ δὲ αὐτῇ οἱ χαλοὶ τεβρά-
 ῳνοι, μακροὶ, ῥαχεῖς, ὅμοιοι τοῖς
 τῆς ἀπαείνης, καὶ παῖτα δὲ μεί-
 ζοντες καὶ ῥωμακεώτεροι ἔχοντες
 ἐν διασημάτων τὰ φύλλα κατ'
 ἑκάστων γόνυ, ὡς ἔσθ' ἀτέρας εἰς κύ-
 κλον ὡς κείμυρα. καρπὸν στρογύ-
 15 λον, τὰ ὡρεθὰ χλωρὸν, εἴτα ἐρυ-
 θρόν, εἴτα πεπαινόμυρον μέλανα,
 ῥίζα λεπτή, μακρὰ, ἐρυθρὰ, δίου-
 ρητικὴ· ὅθεν ἐκτελειοῖς μετὰ με-
 λικρά του πίνου μὲν βοηδεῖ, ἰσχά-
 δικοῖς τὲ καὶ παρὰ λευμοῖς· ἀ-
 20 γει ὅ οὖρα πολλὰ καὶ παχέα. ἔσθ'
 ὅτε δὲ καὶ αἷμα, λούεσθαι μὲν τοι
 δεῖ κατὰ ἡμέραν τὸς πίνοντας. καὶ
 ὅσῃν τῶν κενουμένων τὴν δια-
 φοράν· ἀναισθητοῖς τὲ βοηδεῖ ὁ
 γυλὸς μετὰ τῶν φύλλων ποδεῖς.
 25 ὁ δὲ καρπὸς μετ' ὀξύμηντος πι-
 νόμυρος, σκληρὰ τήκει. ὡρεσε-
 δεῖσα δὲ ἢ ῥίζα, ἔμβρυα καὶ ἔμμη-
 να ἄγει καὶ δεύτερα. δευραπύει
 δὲ καὶ ἀλφοῖς λευκοῖς μετ' ὄξους
 καταπλασσομένη.

Erythrodanum radix rubra
 est, qua tinguntur lana. Vna
 sponte prouenit, altera feritur
 vt in Thebana Gallia, & Ra-
 uenna Italiae: in Caria inter o-
 leas, vt in aruis, solo creditur.
 hanc non sine quæstu ferunt:
 nanque maximum ex ea sen-
 tiunt prouentum. Asperi cau-
 les & quadranguli, longi, apa-
 rinæ non dissimiles, robustio-
 res, & multò prorsus maio-
 res: foliis per interualla certa
 circum articulos, stellatim de-
 cussatis. Semē eius rotundum,
 inter initia viride, mox rubrū,
 postea cum ematuruit, nigrū:
 radix tenuis, longa, rubra. Uri-
 nam ciēt: qua de causa regio
 morbo opitulatur, pota cum
 aqua multa: item ischiadicis,
 & resolutis. Crassum, copio-
 samque urinam pellit, nōnun-
 quam & sanguinem: bibentes
 tamen quotidie lauari oportet,
 & excrementorum quæ
 redduntur differētiam specta-
 re. Aduersus serpentium mor-
 fus, ramulos cum foliis, vino
 bibere prodest. Semē ex aceto
 potum, lienem absumit. Imposi-
 ta radix trahit partus, menses,
 secundasque. Albæ vitilagini, il-
 lita ex aceto medetur.

Lonchitis. Cap. CLXI.

Lonchitis folia habet por-
ri, latiora, rubentia, plurima,
ad radicem circumfracta, ve-
luti in terram procumbentia,
pauca in caule, in quo flores,
ceu galericuli, hiantibus co-
municis personis similes, nigri,
& è rictu albam exerentes ve-
lut linguam, quæ ad labrum
inferius spectet: semen inuo-
lucris clausum lanceæ simile,
triangulum: vnde sibi cogno-
mentum arrogauit: radix dau-
ci. Nascitur in sitientibus, &
asperis. Radix ex vino pota v-
rinam ciet.

Lonchitis altera.

Cap. CLXII.

Altera est lonchitis, quam a-
liqui asperâ lonchitin dicunt: fo-
lia scolopédrij emittit, sed aspe-
riora maioraque, ac multò ma-
gis diuisa: Vulneribus mirû in
modû prodest, in eisq; inflam-
mationes excitari non patitur.
Pota ex aceto liené absumit.

Althæa. Cap. CLXIII.

Althæa, quam alij ibiscû vo-
cât, in syluestrium maluarum
genere est, cui folia vt cycla-
mino, rotunda, lanugine can-
nescunt: flore rosaceo: bicubi-
tali caule: radice lenta: intus
alba. Althæa appellatur, quòd

inter

Πρὶ Λογχίδος. Κεφ. ρξα.

Λογχίτις φύλλα ἔχει παρὰ στα-
χάρτα ὁμοία, πλατύτερα δὲ καὶ
ὑπόφθονα πλείεστα, πρὸς τὴν ῥί-
ζαν περικλόμενα ὡς ἐπὶ τῇ γλῶ-
σσῃ, ἔχει δὲ καὶ πρὸς τὸν καυλὸν ὀλί-
γα, ἐφ' οὗ αὖθις ὁμοία περιίσκοις,
τῶν πύπων δὲ κομμοῖς παρὰ στα-
χείοις κεχλωρόσι, μέλανα μὲν, λευ-
κὸν δὲ πᾶσι αὐτῶν ἐξέχει ἀπὸ
τῆς χάσιματος πρὸς τὸ κατὰ χει-
λος, ὡς ἔστι γλωσσάριον. τὸ πρὸς
ματὶ ὁμοίον λογχίτι, τείρωνόν ἐν
παρὰ καρπίοις. ὅθεν καὶ τῆς παρὰ
στυμίας ἡξιώθη. ῥίζα δὲ ὁμοία
δαύκου, φύεται ἐν τραχέσι καὶ ἀ-
νίημοις τόποις. ταύτης ἡ ῥίζα δι-
ουρητικὴ πνομὴν συνὸν οἶνον.

Περὶ Ἑτέρας λογχίδος.

Κεφ. ρξβ.

Λογχίτις ἑτέρα, ἡ δὲ λογχι-
πιν τραχέαν, φύλλα ἀνίστησι ὁ-
μοία σκολοπενδείῳ, τραχύτερά
δὲ καὶ μείζονα, καὶ μάλλον ἐχρημέ-
να. Δυνάμει δὲ ἔχει παρὰ στα-
χὴν, ἀφ' ἐξήμιαν τὸν τῆκει δὲ καὶ
παλιν αὖ μετ' ὅξοις πνομὴν.

Περὶ Ἀλθαίας. Κεφ. ρξγ.

Ἀλθαία, ἔνιοι δὲ ἰσίοκου κα-
λοῦσι, μάλα χυρὴν ἀγέας εἶ-
δος, φύλλα παρὰ σταχὶν ὡς ἔστι κυ-
κλάμινος, ἐγχρόα. ἔχει δὲ αὖ-
θις ῥόδοις ὡς καυλὸν διπλοῦν,
ῥίζαν δὲ γλυκερὴν, λευκὴν ἐνδο-
θεν. ὠνόμασται ὅτι δὲ αὖθις διὰ τὸ

πλευρά-

πολυαλγές καὶ πολύχρηστος αὐ-
 τῆς. ἐψηθεῖσα γὰρ ἐν μελικράτῳ
 ἢ οἴνῳ, καὶ καθ' ἑαυτῇ ποθεῖται
 ποιεῖ πρὸς ῥαύματα, παρωτίδας
 χοιράδας, ἀποσήματα, μασοὺς
 φλεγμαίνοντας, δακτυλίων θλάσ-
 ματα, ἐμφυσήματα, συντάσεις
 νεύρων· διαφορεῖ γὰρ καὶ ἐκπέσσει,
 ἢ ῥήγῃσι καὶ ἐπουλεῖ. σύμματα-
 λθεῖσα δὲ ἐφθῇ ὡς εἴρηται ἑαπ-
 υεῖνῳ ἢ χινεῖῳ ἢ τερεβινθίνῃ, πρὸς
 10 ὑσέρας φλεγμονὰς καὶ μύσεις ἐν
 πρεσθίματι ποιεῖ, καὶ τὸ ἀφέψη-
 μα δ' αὐτῆς τὸ αὐτὸ ποιεῖ, ἄλγος
 καὶ τὰ καλούμενα λόγια. τὸ δὲ
 τῆς ῥίζης ἀφέψημα σὺν οἴνῳ πι-
 νόμενον, ὠφελεῖ δυσουρεωτάς,
 15 λιθιῶντων ὁμότητας, δυσεν-
 τερικοὺς, ἰσχιαδικούς, τρωμά-
 δεις, ῥήγματίας· καὶ πόνους ὀ-
 δόντων περὶ ἑνὲς συνὸς ὅξει ἀφε-
 ψηθεῖσα καὶ διακλυζομένη. ὁ δὲ
 καρπὸς χλωρὸς τε καὶ ξηρὸς λεί-
 20 ος καταχρίσθαι σὺν ὀξεί ἐν ἡ-
 λίῳ, σμικτικὸς ὅσιν ἀλφῶν μετ'
 ὀξέλαιου δὲ συγχιόμενος, πρε-
 φυλακτικὸς ὅσιν ἰοδόλων. ποιεῖ δὲ
 καὶ πρὸς δυσεντερίας καὶ αἵματος
 ἀναγωγῇ καὶ διάρροϊαν. τὸ δὲ ἀ-
 25 φέψημα τοῦ πύργου πινόμε-
 νον, καὶ πρὸς μελισσῶν καὶ τῶν
 κεπῶν θηρίων πληγὰς πάντων,
 ἐν ὀξυκράτῳ ἢ οἴνῳ ποθέν. καὶ
 τὰ φύλλα δὲ μετ' ὀλίγου ὑδατος
 καταπλάσσεται ἐπὶ τῇ θηλιάτῃ
 καὶ ἐπὶ

inter primas sit utilis, & pluri-
 bus polleat remediis. Decocta
 enim in vino aut aqua malsa,
 & per se cum imponitur tusa,
 efficax est cōtra vulnera: item
 ad strumas, parotidas, absces-
 sus, māmaram inflāmationes,
 fracta sedis, inflationes, neruo-
 rū rigores: siquidem discutit, &
 excoquit, rumpit, & ad cicatri-
 cem perducit. Cocta, vt dictū
 est, adiecto suillo adipe, aut an-
 ferino, terebinthinave, vt ma-
 lagmatis lētor fiat, facit ad vul-
 uæ inflāmationes, præclusio-
 nesq; in pēsis subdita. Deco-
 ctum eodē fungitur munere:
 onera uulvæ, reliquiāsq; à par-
 tu extrahit. decoctæ succus ex
 vino potus, succurrit vrinæ dif-
 ficultati, calculosorū crudita-
 tibus, dysentericis, ischiadicis,
 tremulis, ruptis: dentiū mulcet
 dolorem, cum aceto decocta
 colluto inde ore. Viride semen
 ficcūmq; tritum, vitilignes in
 sole perunctas emendat: eodē
 cum oleo & aceto. peruncti, à
 venenatis non feriuntur. Valet
 cōtra dysenteria, & sanguinis
 reiectiones, aluiq; profluuiū. In
 posca aut vino decoctū bibi-
 tur, cōtra omnes vesparū, apū,
 similiumq; aculeatos ictus. Fo-
 lia cū olei mometo, morsibus,
 &

DIOSCORIDIS

& igni ambustis illinuntur. Constat aquam, trita radice addita, sub diuo addensari.

Alcea. Cap. CLXIII.

Alcea sylvestrium maluarum generi assignatur: folia habet diuisa, verbenacæ proxima, caules treis aut quatuor, cortice canabino vestitos: florem rosæ, paruum: radices albas, latas, quinque aut sex, cum plurimum cubitales: quæ cum vino aut aqua potæ, dysentericis ruptisque medentur.

Cannabis. Cap. CLXV.

Cannabis fatiua planta magni in vita vsus ad robustissimos funes factitandos: foliis fraxini, graui odore: caulibus proceris, inanibus: semine rotundo, quod largiore cibo genituram extinguit. Succus

ex ea recete, conuenien-

ter aurium doloribus

instillatur.

Cannabis sylvestris.

Cap. CLXVI.

Sylvestris cannabis virgas fert althææ similes, minores, nigriores, & asperiores, cubiti altitudinem æquantes: folio fatiux, nigriore & asperiore: flore lychnidis, subrubro: semine & radice althææ.

Deco-

η ἐπὶ τῶν πυρεχάτων. πίνουσι δὲ ἢ ῥίζα καὶ ὕδωρ μεγάλα λεία καὶ σινεζαιδριαθεῖσα.

Πεὶ Ἀλκίας. Κεφ. ρξδ'.

Ἀλκία, καὶ αὕτη εἶδος ὅτιν ἀγρίας μαλάχης, ἔχουσα φύλλα ἐπεχόμενα πρὸς τὰ τῆς ἱερᾶς βοτάνης χαυλοῖς γ'. ἢ δ'· φλοιὸν ἔχοντας καννάβει παραπλήσιον αἵματος μικρὸν, ἐμπερὲς ῥόδω ῥίζας λευκάς, πλατείαις ε'. ἢ ε'. ὅσον πίνχως· αἱ πινες οἶνω ἢ ὕδατι πίνονται, δυσεντερίαν καὶ ῥήγματα ἰῶνται.

Πεὶ Καννάβως ἡμέρα.

Κεφ. ρξε'.

Καννάβω φυτὸν ὅτιν εὐχρηστον ἐν τῷ βίῳ πρὸς τὰς τῶν κυττάρων χοιρίων παλαῖας· φύλλα φέρει παραπλήσια τῇ μελίᾳ, δυσώδη· χαυλοῖς μακροῖς, κενοῖς· καρπὸν στρογγύλον, ἐς ἐπιόμμος πλείων, σβέννυσθαι γονίω. χλωρὸς ὃ χυλιδεύς, ἀρμόζει πρὸς τὰς ὥπων ἀλγηδὼνας ἐνσαζόμενος.

Πεὶ Καννάβως ἀγρίας.

Κεφ. ρξς'.

Καννάβω ἀγρία ῥαβδία φέρει ὁμοία τοῖς τῆς ἀλθείας, μελαντέρα δὲ καὶ τραχύτερα, καὶ μικρότερα, τὸ ὕψος πίνχως· τὰ δὲ φύλλα ὁμοία τῇ ἡμέρῳ, τραχύτερα δὲ καὶ μελαντέρα· αἵ δὲ περὶ ὅρα, λυγρίδι ἐμπερὲς· σπέρμα δὲ καὶ ῥίζαν ὁμοία τῇ δισθαίᾳ.

Δυνάει

Δωάνην δὲ ἔχει ἢ ῥίζα ἐφθὴ κα-
ταπλαθεῖσα, φλεγμονὰς παρη-
γρῆν, καὶ οἰδήματα διαφορεῖν,
καὶ πόρους διαχεῖν. καὶ ὁ ἀπὸ
ταύτης δὲ φλοιός, εὐδαίμων εἰς
5 πολικὴν χοιρίων.

Περὶ Αναγύριος. Κεφ. ρξζʹ.

Ανάγυρις, οἱ δὲ ἀνάγρυν, οἱ
ἃ ἀκοπον καλεῖσι, δάμνος ὅτι φύλ-
λοις καὶ ταῖς ῥάβδοις περισσεμπε-
ρὴς ἄγρῳ, δεινδρῶδης, βαρύσ-
10 μος ἰσχυρῶς· ἀνδρὸς κράμβη ἐοι-
κός· καρπὸς ἐν καρπίοις μα-
κροῖς, τὸ χῆμα νεφρῶν, ποικί-
λος * σερρός, σκληρυνέται δὲ πρὸς
τὸν τῆς σαφυλῆς πεπασμὸν. Ταύ-
της τὰ φύλλα ἀπαλὰ, λεῖα κα-
15 ταπλαστόμυρα, οἰδήματα σέλ-
λει. ποτίζεταί δὲ < πλεῖστος ἐν
γλυκεῖ πρὸς ἄσθμα καὶ ἐμβολὴν
χρῆου, καὶ ἐμμενῶν καὶ ἐμμενῶν
πρὸς δὲ κεφαλῆς γίαν συν. οἶνω.
ἔστι δὲ πλείων δυσκοιτίαις· δεῖ
20 μὲν τοι μετὰ τὸ ἀποτεκεῖν ἐν-
δέως ἀφελόντα ῥιπῆν τὸ πλείον
μα. τῆς δὲ ῥίζης χυλὸς διαφορεῖ
καὶ ἐνπύεται. ὁ δὲ καρπὸς ἐπιόμοι-
νος, ἔμετον συντόνως κινεῖ.

Περὶ Κιπταίας. Κεφ. ρξηʹ.

Κιπταία ἐμφερὴς ὅστιν ἀνδρά-
χην, μελάντερά ἢ ἔχει τὰ φύλλα,
ῥίζαν λεπτὴν. ὁμοῦ δὲ τὰ φύλλα
πινόμυρα συν. οἶνω, τραγυνοῦσι
καὶ ψευδῶς πλὴν κύστι· μάλιστα
ἃ ποιεῖ μετὰ ἐπὶ ἡματος ῥιζὸν ἀ-
σπαράζου

Decocta radix, illitu inflama-
tiones mulcet, tumores discu-
tit, tofos articularum dissipat.
Huius cortex torquendis funi-
bus accommodatus.

Anagyris. Cap. CLXVII.

Anagyris frutex est arboris
instar, perquam grauis odore
foliis agni, virgisque flore bras-
sicæ: semen in filiquis non bre-
uibus gignit, subrotundum, fir-
mum, versicolori facie, simi-
le renibus, quod durefcit vna
maturefcente. Tenera folia tri-
ta tumores illitu reprimunt. si
partus hæreat, & secundæ men-
sesque morêtur, dragmæ pon-
dere bibuntur in passo: sic &
suspuriosis dantur, & contra ca-
pitis dolores in vino: Difficul-
ter parientibus adalligatur, ita
vt à partu statim auferantur.
Radicis cortex concoquendis
discutiendisque adhibetur. Se-
men commanducatum vomita-
tiones vehementer ciet.

Cepæa. Cap. CLXVIII.

Cepæa portulacæ similis est,
sed nigriora habet folia, & ra-
dicem tenuem. Folia in vino
pota, vrinæ stillicidio, & vesicæ
scabiæ laborantibus, opitu-
lantur: maximè id præstat, si
cum decocto radicum aspara-

DIOSCORIDIS

gi eius quem myacáthon, hoc est corrudam vocant, bibatur.

Alisma. Cap. CLXIX.

Alisma, alij damásonion appellant: folia ei plantaginis: nisi angustiora essent, laciniosa, conuexaque in terram: caule simplici, tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, pallescéte: radicibus tenuibus, vt veratri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat tractus. Radix, si drachma vna aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorarunt, aut à rubetis ranis demorfi sunt aut opium hauserunt: torminibus atque dysenteria, per se, aut cum pari modo seminis dauci, potui datur. Conuulsus, & contra vitia vuluæ prodest. Herba fistit aluum, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

Onobrychis. Cap. CLXX.

Onobrychis, folia habet lentis, longiora paulò: caulem dodrantalem: florem puniceum: radicem paruá: nascitur in vliginosis & incultis. Herba suapte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat: cum vino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.

Hype-

ασπράγου τοῦ μυακάτου καλὰ μύρου πινόμεν.

Περὶ Ἀλίσματος. Κεφ. ρξθ.

Ἀλίσμα, οἱ δὲ ἀκκέαν, οἱ δὲ δαμαστανίον, οἱ δὲ ἀκυρον, οἱ δὲ λυρεν καλοῦσι. φύλλα μὲν ἔχει ἀφ' νογλώσῳ ὁμοία, στενότερα δὲ ἐπὶ γλῶ κλώμυρα καμυκὸς δὲ λεπτός, ἀπλοῖς ὑπὸ πῆχυν ἔχων κεφάλια, θυρσοειδής. ἀπὸ λεπτά, λευκά, ὑποχρᾶ. ῥίζα ὡς μέλανος ἐλλεβορου λεπταὶ ἐνώιδεις, δειμῆται, ὑπολίπαροι. ὑδρῆλὰ δὲ φιλεῖ χροεῖα. Ἀρμύζει ἢ ῥίζα πινόμεν σὺν οἴνῳ, ὅσον < α. ἢ β. τοῖς λαχρόν βεβρωκόσι θαλάσσιον, καὶ τοῖς ὑπὸ φύρου διηχθεῖσι, καὶ τοῖς ὅπσιον πιπώ- 15 κόσι, καὶ σρόφοις καὶ δυσεντερίαν κατ' αὐτῶν, καὶ σὺν ἴσῳ δαύκα πινόμεν, ἀρμύζει καὶ ἀσάσμασι καὶ πρὸς τὰ ὑστερικά πάθη. ἢ δὲ πῶα ἰησοι κοιλίαν, καὶ ἐμμηνα ἄγει, καὶ οἰδήματα καταπλά- 20 θείειν πρὸς ὕναι.

Περὶ Ονοβρυχίδος. Κεφ. ρθ.

Ονοβρυχίς φύλλα ἔχει ὁμοία φάκω, μικρὰ μακρότερα καμυκὸν σπιδαμαῖον ἀπὸς φοινικοῦν, μικρὰν ῥίζαν. φύε' ἐν χαδύχοις καὶ 25 ἀφ' ὅις τόποις. Διούκμιν δὲ ἔχει ἢ πῶα ἐπιπλασθεῖσα λεία διαχρῖν φύματα μετ' οἴνου δὲ πινόμεν σπαραγγίαν δεξαπέυει σὺν ὕδατι δὲ ἀψιφομένη ἰδρώτας κινεῖ.

Περὶ Τπερ-

Περὶ Υπερίκου. Κεφ. ροα.

Υπερίκον, οἱ δ' ἀνδρόσαιμον, οἱ
 δ' κόριον, οἱ δ' χαμαιπίτυν, διὰ τὸ
 ὅτι τὸ σπέρμα ὁσμὴν ἰσχυρὰν
 πικρὴν ῥητίνην φύλλα ἔχει πηγαῖον
 ὁμοία, δάκρυος φρυγανοειδὲς, σπι-
 δαμασίος ὑπεύδρος· αὐτὸς ἔχον
 μήλων, ὃ διαβιβέν ἐν τοῖς δακτύ-
 λοις αἵματόδῃ τ' ἡλὸν ἐκκρίνει,
 ὅθεν καὶ ἀνδρόσαιμον ἐκλήθη. κλω-
 νάρια ὑποδάσσει, προμήκη ἐν τῷ
 10 περὶ φέρει, μέγαςτος χρυσεῖ, ἐν ᾧ
 σπέρμα μέγαν ῥητίνης ὄζον. οὗνευ
 δ' ἐν ἐργασίμοις καὶ βάρχεσι τόποις.
 Διούαμν δ' ἔχει διουρητικὴν, καὶ
 ἐμμήνων ἀγωγὴν περὶ σπέρματος.
 τεταρταῖος δ' καὶ τεταῖος ἀπαλ-
 15 λάσσει μετ' οἶνον πινόμυρον· διερ-
 πεύει δ' ἰσχάδας ἐπὶ ἡμέρας μί. τὸ
 σπέρμα πινόμυρον, καὶ τὰ φύλλα
 σὺν τῷ σπέρματι κατὰ πλάτη
 μύρα κατὰ καύματα ἰάται.

Περὶ Ἀσκυρόν. Κεφ. ροβ.

Ἀσκυρον, οἱ δ' ἄσχυροφίδες, οἱ δ' ἐν
 ἀνδρόσαιμον, καὶ τὸ εἶδος ὅστις
 ὑπερίκου, μέγας δὲ διαφέρει, κλωσὶ
 μείζον, φρυγανωδέστερον δ' ἐκ πε-
 φονιγμύρον τοῖς φύλλοις λεπτοῖς·
 αὐτὴ δ' ἐμμήνων φέρει καρπὸν δ' ὁ-
 μοιον ὑπερίκου, ὄζον τὰ ῥητίνης, καὶ
 25 ἐν τῷ περὶ φέρει οἶον αἵμασ-
 σον· ἵα τὸς δακτύλους, ὡς διὰ τῶ
 ἀνδρόσαιμον καλεῖται. Ποιεῖ καὶ ὁ
 τῶ κατὰ πλάτη πινόμυρον
 τὸς μετ' ὑδρομέλιτος κοτυλῶν βί-
 σκει

Hypericum. Cap. CLXXI.

Hypericū, alij androsæmon,
 alij corion, alij chamæpityn
 appellant, quoniam semen o-
 dore refinam imitatur: furcu-
 laceo frutice, dodrantali, sub-
 rubro, folio rutæ: flore luteo,
 qui digitis tritus sanguineum
 succum remittit, qua ex cau-
 sa androsæmon cognomina-
 tur: subhirsuta filiqua, & in
 rotundo oblonga, hordei ma-
 gnitudine: semine intus ni-
 gro, resinosi odoris: gignitur
 locis cultis & asperis. Vrinam
 cit, menstrua pellit appositum:
 tertianis, quartanisque cum
 vino potum liberat. Semen
 quadraginta diebus haustum,
 ischiadicis medetur. Folia cum
 semine illita, ambusta sanant.

Ascyron. Cap. CLXXII.

ASCYRON: siue ascy-
 roides, hyperici genus est, ma-
 gnitudine distans, fruticosius,
 maiores habens ramos, sur-
 culosiores, rubentésque: fo-
 lia tenuia: flores luteos, & fru-
 ctum resinofum, hyperico nō
 abfimilem: cuius attritu digi-
 ti ferè cruentantur, qua de
 causa androsæmon vocauere.
 Vfus seminis ad ischiadicōs, po-
 tum in hydromelitis sextario:

B ij nam

DIOSCORIDIS

nam biliosa recremēta amplif-
simè detrahīt: sed assidue da-
re oportet, donec sanitati re-
stituantur. Illinitur, & ambu-
stis efficaciter.

Androsamum.

Cap. CLXXIII.

Androsamum ab hyperico,
ascyrōque differt, quod fruti-
cet ramulis furculosis, ac te-
nuibus: rubētibus virgis: & fo-
liis rutæ, triplo aut quadruplo
maioribus, quæ trita vinoso suc-
co manant: complureis alas ha-
bet in cacumine, vtrinque ex-
pansas, pinnatasq; circa quas,
flores pusilli, lutei: & in caly-
culis semē papaveris nigri, in-
signe lineis. Huius comæ tri-
tæ resinofum odorem reddūt.
Semen tritum drachmis dua-
bus potum, biliosa alui excre-
mēta pellit: ischiadicis maximè
medetur: sed à purgatione a-
quam exorberē oportet. Her-
ba ambustis illita medetur, vul-
neribus sanguinem cohibet.

Coris. Cap. CLXXIII.

Coris, quod aliqui hype-
ricon vocant, frutex est folio
ericæ, rubro, pinguiore, ac mi-
nore, non altior dodrante, sua-
vis, odoratus, acris. Potum se-
men menses trahit, & vrinas:

contra

ἀγχι γὰρ χολώδη κόπρια πολλά.
συνεχῶς δὲ διδόναι καὶ ἄχρῃς
αὐτῇ γὰρ δώσει. πικρὴ καὶ πρὸς πυρί-
χωντα ἐπιπλαθεῖς.

Περὶ Ἀνδρσαμίου.

Κεφ. ρογ.

Ἀνδρσαμίον, οἷ τ' ἰονισιάδα,
οἷ τ' καὶ τὸ τοῦ ἄσκυρον καλεῖται, δια-
φέρει δὲ τὸ ὑπερικοῦ καὶ τὸ ἀσκύ-
ρου δάμνος ὢν λεπτόκαρπος, φρυ-
γανώδης· πεφονγυμῶς τὰ ῥα-
βδία· φύλλα τετραπλάσινα ἢ τε- 10
τραπλάσινα τ' πηγαῖν, ἀβιθίν-
τα οἰνώδη χυλὸν ἀφίησι μαχάλας
δὲ ἔχει πλείους ἐπ' ἄκρῳ τεταρ-
τωμόδας, πρὸς αὐτὴν δὲ μικρά,
μήλινα· καρπὸς δὲ χάλυξι, ὁμοῖος
τῷ τ' μελαίνης μήκωνος, οἷον ἐστὶ καὶ 15
τὰ λευκῶς. ἀνὰ τειφθεῖσα δὲ ἡ κό-
μη, ῥητινώδη ὁσμὴν ἀποδίδωσι.
Καὶ τοῦτου ὁ καρπὸς λεῖος δυοῖν
ὁλκὴν ποιεῖς, ἀγχι χολώδη κό-
πρια· θέραιπνυει δὲ μάλα τὰ ἰσχά-
δας· δεῖ δὲ μετὰ τὴν χάδαρσιν ὕ- 20
δατος ἐπιρροφῆν καὶ πνεῖ χωντα
δὲ ἡ πῶς καὶ ταπλαθεῖσα ἰάται.
καὶ αἷμα ἐπέχει.

Περὶ Κόρης. Κεφ. ροδ.

Κόρις, οἷ δὲ καὶ τὸ τοῦ ὑπερικοῦ κα-
λοῦται, φύλλον ἔχει παραπλήσιον 25
τῷ τ' ἐρείκης, μικρότερον τ' καὶ λε-
παρώτερον καὶ ἐρυθρόν, δάμνος δὲ
ἐστὶ σπιθαμιαῖος, εὐσμοῦς, δριμύς
καὶ εὐώδης. Τοῦτου ὁ καρπὸς πηρό-
μυθος, οὐρα καὶ κατὰ μίλιον ἀγχι.

βουθεῖ

βοηθεῖ καὶ φθλαγγιοδύνκτοις, ἰ-
σχιαδικοῖς τε καὶ ὀπισθοτονικοῖς
συνὸ ὄϊνον πινόμενος· πρὸς δὲ
ρίην συνὸ πεπερεί, ὅπῃ δὲ
ὀπισθοτονικῶν καὶ σύγ-
5 χεισμῶν ὅτι συν
ἐλαίῳ ἀφ'
μόδι-
ον.*

Πεὶ Χαμαιπίτυος.

10 Κεφ. ροί.

Χαμαιπίτυς, ἣν οἱ ἐν πόντῳ ὀ-
λόκυροι καλεῖσι, ἀθήνησιν ἰωνίαν.
ἐν ᾗ ἐμβόια σιδηρεῖται, πῶς ἔρπυσσα
ὅπῃ ἦς ὑπόκυρτος· φύλλα δ' ἔχει
ὁμοία ἀειζῶφ μικρῶν, λεπτότερα.
15 δὲ πολλῶν καὶ λιπαρώτερα καὶ δια-
σεία, πυκνὰ πρὸς τοὺς κλάδους, ὁσ-
μῶν ἔχοντα πίτυος, αὖθις λεπτὰ
μήλιναν, ἢ λευκὰ· ῥίζαν δ' ὡς κιχα-
εῖς. Ταύτης τὰ φύλλα πινόμενα
μὲν οἶνον ὅπῃ ἡμέρας ζ' ἵκτερον δε-
20 ραπνύει ὅπῃ δὲ μί. ἰσχιάδα δερα-
πνύει μεθ' ὑδρομέλιτος πινόμε-
να· δίδεται καὶ ἡπατικοῖς καὶ δυσου-
ρεῖσι καὶ νεφρικοῖς ἰδίως, ἀρμόζον-
τα καὶ σφοδρῶναις. χεῖν δ' αὖ-
τῇ καὶ οἱ ἐν ἡρακλείᾳ τῇ ποντικῇ,
25 ὡς ἀντιδότῳ πρὸς ἀκόνιτον. πυτί-
ζοντες τὸ ἀφέψημα. καταπλάσ-
σεται δ' πρὸς τὰ σφοδρῶναις μὲν
ἀγρίων δεδευμένων τῷ ἀφέψη-
ματι τῆς πύας· λεανθεῖσα δὲ συνὸ
σύκοις καὶ ἀντὶ καταποτίου δίδο-
μήν,

cōtra phalangiorū morsus, is-
chiadicos, & opisthotonicos
ex vino potū auxilio est: horro-
ribus ex pipere, sed opisthoto-
nicis ex oleo, aptissimè illini-
tur. Radix vino decocta pota-
que, defectis opem ferre creditur,
sed laborantē inter potan-
dū quamoptimè cooperiri li-
cet: siquidem corpus totū de-
sudabit, ex qua repristinā agili-
tatem recuperabit.

Aiuga, siue chamæpitys.

Cap. CLXV.

A I V G A herba in ter-
ra repens: incurvæ similis: fo-
liis semperuiui minoris, mul-
tò tenuioribus, hirsutis & pin-
guioribus, circum ramos den-
sis, odore pinus: flore tenui,
luteo, vel candido: radice ci-
chorij. Folia septem diebus in
vino pota, regio morbo me-
dentur: & quadraginta diebus
ex hydromelite, ischiadicos fa-
nant: dantur peculiariter vri-
næ difficultatibus, iocineris, &
renum vitiis: torminosis pro-
sunt. Et apud Heracleam Pon-
ticam, perinde atque antidoto
contra aconitū vtuntur, biben-
tes decoctum. Ad antedicta il-
linitur, cum polenta iure de-
cocti subacta: trita in farinam
& cum fico in pilulis sumpta,
B iij aluum

aliuum emollit: excepta melle,
cū æris squama & resina deij-
cit: apposita ex melle, vuluæ vi-
tia extrahit: mammarum duri-
tias discutit: vulnera glutinat:
vlcera quæ serpunt, cum mel-
le illita, cohibet.

Aiuga altera.

Cap. CLXXVI.

Alterum est genus aiugæ, cu-
bitalibus ramis, in anchoræ
speciem incuruatis, prætenui-
bus, coma supradictæ: flore
candido: semine nigro: hæc
etiam pinum redolet. Tertia
mas nominatur, paruula, fo-
liis exilibus, albis, pilosis, cau-
le aspero, candido: luteis flos-
culis, semine iuxta alas. Resi-
pit & hæc pinum. Hæ duæ
vim superioris obtinēt,
sed nō vsque adeo
efficacem.

TERTII LIBRI
FINIS.

PEDANI

μύνη, μαλακάζει κοιλίαν· καὶ μέλι-
τος δὲ καὶ λεπίδος, καὶ ῥητίνης ἀνα-
ληφθεῖσα καθαίρει· ἄγει δὲ καὶ τὰ
ἀπὸ ὑστέρας περυσθενέσσης σινὺ μέ-
λιτι. Διαφορεῖ δὲ καὶ σκληρίας μα-
στῶν, καὶ τραύματα κολλᾷ. καὶ σφύ-
πταις ἐπὶ χειρὶ μετὰ μέλιτος κα-
ταπλασσομένη.

Πρὶ Ετέρας χαμαιπί-
τους. Κεφ. ρος.

Εστὶ καὶ ἑτέρα χαμαιπίτους. κλά-
δοις ἔχουσαι πηχυαίους, ἀγκυροει- 10
δεῖς, λεπτοκάρφους· κόμην δὲ ἐοι-
κῆσαν τῇ πρὸς αὐτὴν, καὶ αὐτὸς λευ-
κὸν σπέρμα ὃ μέλαν ἀπὸ ζῆς καὶ
αὐτὴ πίτους. Καὶ τέτις τις ὅστις
ἄρρην καλουμένην. ἔστι δὲ βοτασίον
λεῖον. ἔχον φυλλάρια λεπτά, λευ- 15
κὰ, δασέα· χαυλὸν δὲ βραχύν, λευ-
κὸν ἀνθήλαια μήλιγα· σπέρμα πον-
δὲ πρὸς ταῖς μαχαλας. ὅζει δὲ καὶ
τὸ τοπίπος. Διῶαμν δὲ ἔχουσαι
καὶ αὐτὰ ὁμοίαν τῇ περσειρημένην
οὐ μὲν οὐτω περικτημένην. 20

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘ-
ΓΟΥ ΤΡΙΤΟΥ.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ

Π Ε Δ Α - P E D A N I I

ΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙ-
ΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕ-
ΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙ-
ΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ.

DIOSCORIDIS
Anazarbei de medicinali ma-
teria Liber quartus.

Io. Ruellio Sueßionēsi interprete.

ΕΝ τοῖς περὶ τέπου
τεισὶ βιβλίοις φίλ-
τατ' ἄρξε, παραδόν-
τες περὶ ἀρωμάτων
καὶ ὕψων καὶ μύρων καὶ δένδρων καὶ
ζώων καὶ σιτηρῶν καὶ λαχαύων καὶ
ρίζων καὶ χυλισμάτων καὶ βοτανῶν
καὶ σπερμάτων, ἐν τούτῳ τετάρ-
τῳ ὅντι περὶ τῶν λειπομένων βο-
τανῶν καὶ ρίζων διαλεξόμεθα.

Περὶ Κέσρων. Κεφ. α΄.

Κέσρον τὸ καλὸν μύρον ψυχρότερο-
νον, ἐπεὶ δὲ ἐν τοῖς ψυχροτάτοις
εὐρίσκεται τοῖς ὀρώμασι βετονί-
κην καλεῖσθαι, ἢ ῥοσμαρίνα μ. πῶς ἐστὶ
καυλὸν ἔχουσα λεπτὸν πύχυνος τὸ
ὑψος, καὶ μείζονα, τετράγωνον φύλ-
λα μακρὰ, μαλακὰ, ὁμοία δρυὶ,
τυλὴν πεφύκειαν ἐρασιμένην, ἐν ᾧ δὲ
μείζονα ὅτι πρὸς τὴν ρίζαν ἐπ' ἄ-
κρῳ ὅτι τὸ καυλὸν ἐνεστὶ τὸ σπέρμα
ἐσαχυρῶν μύρον ὡς περὶ θυμύρας. ταύ-
της τὰ φύλλα δὲ συλλέγοντας ξη-
ραίνον. ὧν ἐστὶ καὶ ἡ παλαιοὶν χρῆσις·
ρίζαι δὲ ὑπὲρ λεπταῖς ὡς ἐλλεβορίς,
αἱ πηγὲς φλέγμα τῷ δὲ προσκαλεῖσθαι
ἐμέλιον, μὲν ὅτι δρομυλῆτος πινόμεναι.

τῶν

Tribus antè libris,
amâtissime Aree,
tradidimus odora-
menta, olea, arbo-
res, vnguenta, animalia, fru-
menta, olera, radices, succos,
herbas, seminâque. In hoc
autem quarto differemus de
radicibus, & eis quæ restant
herbis.

Betonica. Cap. I.

Cestron psycotrophon vo-
citur, quoniam frigidis locis
inueniatur. Latini betonicam
appellant. Herba est, caulem fe-
rens tenuem, cubiti altitudine,
aut maiorem, quadratum: fo-
lia quercus, mollia, longa, in
ambitu diuisa, odorata, pro-
pe radicem maiora: in sum-
mis caulibus, semen veluti fa-
tureiæ spicatum inest. Decer-
pta huius folia siccantur, plu-
rimos ad vsus. Radicibus niti-
tur, vt veratri, tenuibus. Quæ
ex hydromelite in potu, pitui-
tosam vomitionem euocant.

B iij Folia

Folia dari debent ruptis, cōuul-
 sis, mulieribus vuluæ malo o-
 portunis, & ad laxandos vteri
 strangulatus, denarij pondere
 cum hydromelite: tres in vini
 sextario drachmæ, contra fer-
 pentiū morsus ebibuntur. Her-
 ba magna vtilitate illatis à fer-
 pēte vulneribus illinitur: aduer-
 sus etiā venena drachma ex vi-
 no pota cōuenit: pręsumpta ea,
 si venenū hauriatur, nihil noce-
 bit: vrinā ciet: aluum subducit:
 medetur comitialibus & infan-
 nis, pota ex aqua: & iocineris
 lienisq; vitiiis, drachmæ ponde-
 re in aceto mulso: cōcoctionē
 adiuuat, si quis eā fabæ magni-
 tudine secundū cœnam cum
 melle cocto deuorarit: modo
 cōsimili acida ructātibus pro-
 pinatur. Stomachicis eā mādū-
 care & succū deuorare pro-
 derit, si postea dilutū vinū for-
 beatur. Datur sanguinē excreā-
 tibus, tribus obolis, cū diluti vi-
 ni egelidi cyatho: ischiadicis,
 renum & vesicæ doloribus, ex-
 aqua: aquæ intercutem binis
 drachmis ex hydromelite, si fe-
 bricitāt: sin aliter, ex mulso: re-
 gio morbo laborātes recreat,
 menses pellit, drachmæ pon-
 dere cum vino pota: aluū pur-
 gant drachmæ quatuor potæ,

in

τῶν δὲ φύλλων δίδουαι πρὸς τὰ
 σπλάγνα, ῥήγματα, καὶ πρὸς
 τὰς ἐν ὑστέροι διατρίσεις, καὶ πνίγας
 ὑστερικὰς < ἄ. ὀλκὴ μὲθ' ὑδρομέ-
 λιτος πινόμεναι. θηριοδύνκτοις δὲ
 ὀλκῇ γ'. μετ' οἴνου κοτυλῶν β'. 5
 κατὰ πλάσσομένη δὲ ἢ πύα, ὠφε-
 λεί τὸν θηριοδύνκτοις, καὶ πρὸς
 τὰ θανάσιμα ὀλκὴ μετ' οἴνου πο-
 δεῖσα ἀρμόζει· ἐὰν δὲ τις πρε-
 πῆν, οὐδὲν βλαβήζεται λαβὼν φάρ-
 μακον θανάσιμον· ἐστὶ δ' ἐρηκτικὴ, 10
 κοιλίας τε ὑποβίβαστικὴ· διερα-
 πύει δὲ καὶ ἐπιπληθίους, καὶ μα-
 νομένοις μεθ' ὕδατος πινόμενῃ,
 καὶ ἡπατικοῖς σπληνικοῖς δὲ μετ'
 ὀξύμέλιτος ὀλκῇ < ἄ. ἐπιπο-
 δεῖσα· ποιεῖ δὲ καὶ πέπλιν ἐὰν 15
 τις μετὰ τὸ δεῖπνον αὐτῷ κνέ-
 μου μέγιστος κατὰ πῆν μετὰ μέ-
 λιτος ἐφ' οὗ ὁμοίως καὶ ὀξυρρυσμῶ-
 σι δίδουται· σωμαχικοῖς δὲ δια-
 μασαῖσαι καὶ κατὰ πίνειν τὸν χυ-
 λὸν, εἴτ' ἐπὶ ῥοφᾶν οἶνον κεκρα- 20
 μένῳ δίδουται· καὶ αἱμοπθοῖκοις
 ὀλκὴ τριωβόλου μετὰ κράματος
 κνέου ἐνὸς γαλακτώδους· ἰσχα-
 δικοῖς τε μεθ' ὕδατος καὶ νεφρι-
 τικοῖς καὶ κύστιν ἀλγούσιν· ὑδρω-
 πικοῖς δὲ < β'. μεθ' ὑδρομέλι- 25
 τος πυρέσσειαν· ἀπυρέτοις δ' οὖν
 οἰνομέλιτι· ἰκτερινῶν τε καὶ δι-
 σησι, καὶ κατὰ μύα ἄγει ὀλκὴ
 < ἄ. μετ' οἴνου πινόμενῃ· κοιλίαν
 δὲ < δ'. ποδεῖσαι καὶ δαίρυσαι
 μὲθ'

ὑδρομέλιτος κιάδων δέκα .
ποιεῖ καὶ πρὸς φθισικούς, ἐμπυ-
ικούς μετὰ μέλιτος. ἀποτίθειται
δὲ δειτὰ φύλλα ξηρὰ, λεία ἐν
κεράμειω ἀγρείῳ.

Πρὶ Βρετανικῆς. Κεφ. β΄.

Βρετανικὴ ἢ βετιονικὴ, πῖα ἐ-
στὶν ἔχουσα φύλλα ἐμφερῆ λαπά-
θω ἀγρίῳ, μελάντερα δὲ καὶ θα-
σύτερα, εὐφροντα ἐν τῇ γούσει· ῥί-
ζαν λεπλὴν καὶ βραχεῖαν. χυλί-
ζεται δὲ αὐτῆς τὰ φύλλα, καὶ
ἐν ἡλίῳ ἢ πυρὶ συστέφεται. Δύ-
ναμιν δὲ ἔχει εὐπικρὴν ἰδίως
ἀρμόζουσαν πρὸς τὰς ἐν σώμα-
τι καὶ παειθρμίοις νομούς. ποιεῖ
15 δὲ καὶ πρὸς τὰ λοιπὰ ὅσα εὐ-
ψως χρύζει.*

Πρὶ Λισμαχίης. Κεφ. γ΄.

Λισμαχίον, οἱ δὲ λύβρον κα-
λῶσι, χαυλὸς ἀνίστη πηχυαίους ἢ
καὶ μείζοντας, λεπτοὺς, θαμνώδεις,
20 ὧν παρὰ τὰ γόνατα, φύλλων λε-
πτῶν ἐκφύσας παρὰ πηλοσίῳ τοῖς
πῆς ἰτέας, εὐφρόντων ἐν τῇ γούσει·
ἀνθος πυρρὸν ἢ χρυσοειδές. φέει
ἐν ἐλώδεσι τέποις, καὶ παρὰ τὰ ὕ-
δατα. Ἀρμόζει δὲ ὁ χυλὸς τῶν φύλ-
λων εὐπικρὸς ὧν, πρὸς αἵματος
ἀναγωγὰς καὶ δυσεντερίας πόμα
καὶ ἐγκλυσμα· ῥοιῶτε γυναι-
κείον ἴσησιν ἐν πρὸς δέ τω καὶ πρὸς
τὰς ἐν μυκτῆρων αἱμορροαγίας
ἐμφρασομένην ἢ πῖα ἀρμόζει.
ἔστι

in hydromelitis decem cya-
this. facit cum melle ad ta-
bem & purulentam excrea-
tionem. Folia sicca tritaque fi-
ctili vase reconduntur.

Britanica. Cap. Cap. II.

Britanica aut vetonica, fo-
lia habet sylvestris lapathi, sed
nigriora, & pilosiora, gustu ad-
stringentia: radicem tenuem
& breuem: caulem paruum
emittit. Folii exprimitur suc-
cus, qui igni aut sole cogitur.
Vim habet adstringentem, pri-
uatim depascentibus oris &
tonfillarum vlceribus accom-
modatam. Valet etiam ad re-
liqua, quibus adstrictione est
opus.

Lysimachia. Cap. III.

Lysimachia, quam aliqui ly-
tron appellant, caules emittit
cubitales altioresve, frutico-
sos, tenues, prodeuntibus ge-
niculatim foliis, tenuibus, sali-
cis figura, gustu adstringentibus:
flore rufo, aut aureo: gignitur
in aquosis & palustribus. Fo-
liorum succus adstringente sua
vi sanguinis reiectionem sup-
primit, dysentericis potui da-
tur, aut infunditur: mensium
abundantiam sistit, in pello:
sanguinis profluvio subuenit,
si nares ea herba obturentur:
vulnerum

DIOSCORIDIS

vulnerum cruorem cohibet: acerrimum nidorem suffita red-
dit: qua de causa serpentes fu-
gat, & muscas interficit.

Sanguinaria, seu poly-
gonum. Cap. III.

POLYGONVM mas-
ramos habet teneros & exi-
les, copiosos, geniculis cinctos,
qui per terram, vt gramen, re-
punt: folia rutæ, sed molliora
longioraque: semine sub om-
nibus foliis turgescente: vnde
marem appellari volunt: flos
ei candidus, aut puniceus. Vis
epoti succi est, spissare ac re-
frigerare: prodest cruentæ ex-
creationi, cholera, alui fluxio-
nibus, & urinæ stillicidio: nam
urinam apertè ciet. Cum vino
potus, contra serpentiū mor-
sus auxiliatur, datúrque in fe-
bribus per horam ante signi-
ficationes: foeminarum pro-
fluua impositu sistit: idem suc-
cus purulentis auribus instilla-
tur. Facit eximiè ad genitalium
vlcera, cum vino, adiecto mel-
le, decoctus. Stomachi feruo-
ri, sanguinis reiectionibus, vl-
ceribus quæ serpunt, igni-
bus facris, collectionib⁹,
tumoribus, & recē-
tibus vulneribus fo-
lia illinuntur.

Sanguina-

ἔστι δὲ καὶ τραυματικὴ καὶ ἰσχυ-
ρὸς θυμιαθεῖσθαι δὲ δριμύτατον
ἔχει τὸν καρπὸν ὥς τε καὶ ἔρπετα
διώκειν καὶ μύϊας ἀποκτείνειν.

Πρὶ πολυζώνη ἄρρεος.

Κεφ.

Δ.

5

Πολύζονον ἄρρεον πῶς ἔστι
κλώνας ἔχουσα λεπτοὺς τρυφε-
ροὺς πολλοὺς ζῶντας περικλημ-
μύρους, ἔρποντας ἐπὶ τῆς γῆς
ὥς περ ἄχρωσις. φύλλα δὲ πι-
γαίου ὅμοια, ἐπιεικέστερα. ἔχει 10
δὲ καρπὸν παρ' ἑκάστην φύλλον.
ὁδὸν καὶ ἄρρεον καλεῖται. αἷδος
δὲ λευκὸν ἢ φοινικοῦν. Διω-
κὼν δὲ ἔχει συπικνὴν, ψυκτι-
κὴν ὁ χυλὸς πινόμμος. ἀρμό-
ζει δὲ αἱμοπτοικοῖς, καὶ τοῖς κα- 15
τὰ κοιλίαν ρεύμασι, χολεικοῖς
τε καὶ σπασμοειδῶσι, ἄχει γὰρ
οὐρα ἐναργῶς. βοηθεῖ καὶ θηλιο-
δύκτοις μετ' οἴνου πινόμμος καὶ
πρὸς πελιδνοῖς πρὸς μύϊας ὥρας
τῆς ἐπισημασίας λαμβανόμε- 20
νος. ἴσῃσι καὶ δὲ ροῦν γυναι-
κείον πρὸς τεδείας, καὶ πρὸς ὠταλ-
γίας καὶ πυορροίας ἐνταζόμενος
ἀρμόζει. σινευληθεῖς δὲ οἴνον καὶ
μέλι πρὸς λαβὼν, ἄκρως ποιεῖ
πρὸς τὰ ἐν αἰσδόοις ἔλκη, κα- 25
ταφλάσεται. ὅτι τὰ φύλλα πρὸς
σομάχου ἐγκαυσθῇ, καὶ αἵματος
ἀναζωγῇ καὶ ἔρποντας, ἐρυσσιπέ-
λατά τε καὶ φλεγμονὰς, καὶ εἰδύ-
ματα καὶ τραύματα πρὸς φάτα.

Πρὶ Πολυ-

Πρὶ Πολυρόνη θήλειος.

Κεφ. ε'.

Πολύρονον θῆλυ θαμνίον ὅστι
μονόκλωνον, τρυφερόν, χαλαμοει-
δές, γόνατα συνεχῆ ἔχον ἐγκεί-
15 ρηνα ἀλλήλοις ὥσπερ σάλπιγος·
καὶ περὶ τοῖς γόνασιν ἐν κύκλῳ ἐξ-
οχρὰς πίτυος, φυλλαείοις ἐοικύας,
ρίζα ἀρχαία φύει παρὰ τοῖς ὑ-
δατώδεσι. Δυάμιον δὲ ἔχει συ-
πτικὴν, ψυκτικὴν, ποιεῖ τὰ αὐτὰ
10 τῷ περὶ αὐτῆς ὅτι μὴ ἀδυνέστερον.

Πρὶ πολυγόνου. Κεφ. ς'.

Πολυγόνατον φύεται ἐν ὄρεσι,
δάμνος μείζων πύχνης· φύλλα
ἔχον ὅμοια δάφνης, πλατύτερα
δὲ καὶ λεϊότερα, γυνουμώρῳ ὁμοίον
15 π μῆλῳ κυδωνίῳ ἢ ροιᾷ, καὶ σύ-
ψως γὰρ περὶ σβάλλει, καθ' ἐκάσ-
την δὲ ἐκφοινῇ τῶν φύλλων ἀνδρὶ
λευκῇ, τῷ παλῇ δὲ ὑπερῆχοντα τῶν
φύλλων τῶν ἀειδιμῶν ἀπὸ τῆς ρίζης
γινομένης· ρίζαν δὲ λευκὴν, μαλα-
20 κήν, μακράν, πολυγόνατον, δα-
σείαν, βαρύοσμον, πάχος ἔχουσαν
δακτύλῳ, ποιεῖσαν περὶ τρυμά-
τα κατὰ πλάτος μόνον· αἶψα δὲ καὶ
αἰόλοις τοῖς ἐν περὶ σῶματι.

Πρὶ Κληματίδος. Κεφ. ζ'.

25 Κληματίς, οἱ δὲ διαφορδές, οἱ δὲ
συμμενορδές, οἱ δὲ πολυρονορδές·
καλῶς φύει ἐν ἐν γείοις, κλήμα-
τα δὲ ἔχει μικρὰ ὅσον ὅλυν τὸ πᾶ-
χος, πέταλον δὲ μικρόν, δάφνη ἐμ-
φερὲς τῷ τε γήματι καὶ τῇ χροῇ,
μικρότερον

Sanguinaria foemina.

Cap. V.

Sanguinaria foemina fruti-
cat vno caule, arundini tene-
ro, simili, densis geniculis, & in
se tubarum modo farctis: ar-
ticulos in orbem cingunt api-
ces, foliolis piceæ similes. Radi-
cis nullus usus: nascitur in ri-
guis. Huic quoq; spissandi re-
frigerâdique natura, ad eadem
valens, sed inefficacior.

Polygonatum. Cap. VI.

Polygonatum nascitur in
mōtib; frutice cubito altio-
re: foliis lauri, latioribus, & læ-
uioribus, sapore mali cotonei,
aut punici, cum quadam adstri-
ctione: flores p singulos folio-
rum exortus promit, candidos,
foliis numerosiores, incepta à
radice supputatione: radicem
habet albam, mollem, lōgam,
crebro geniculatam, densam,
grauē olentem, digitum crassi-
tudine æquātem: quæ vulneri-
bus efficaciter illinitur. Quin-
etiam maculas in facie delet.

Clematis. Cap. VII.

CLEMATIS HUMILI
serpit, læto, pinguique solo
prouenit, viticulas spargens
crassitudine iunci exiguas:
folio lauri figura & colore,
multò

multò minora. Ea cum caulibus in vino pota, alui profluvia & dysenterias sedant: subdita in pello cum lacte & rosaceo, aut cyprino, cruciatibus vulvæ medentur. Dolores dentium commanducata finit: imposita serpentium morfibus, iuvamentum præstat. Fertur etiam contra aspidum ictus ex aceto pota opitulari. Gignitur in terrenis.

Polemonia. Cap. VIII.

Polemoniam alij philæteriā, Cappadoces chiliodynamin appellant, ramis exilibus, utrinque pinnatis: foliis paulo quàm rutæ maioribus, ac longioribus, calaminthæ aut sāguinariæ proximis, quibus in summis velut corymbi dependent, nigro semine: radice cubitali, albicāte, radiculæ simili: nascitur in montosis & asperis. Bibitur in vino radix contra serpentes & dysenteriam, & ex aqua aduersus urinæ difficultatem, & coxendicum cruciatus. Datur ex aceto drachmæ pōdere lienosis. Eadem scorpionis plagæ aligatur. Tradunt, eum qui radice gustauerit à scorpione non feriri: eūque, si ictus sit, nihil molesti passurum. Dentium dolorem mansa mitigat.

symphytū

μικρότερον δὲ πολλῶν. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ οἱ κλωνοὶ συνὸν πινόμενα, διαρροίας καὶ δυσεντερίας παύει· μετὰ γάλακτος δὲ καὶ ῥοδίνου ἢ κυπρίνου ἐν πρῶτῳ πρὸς τὸ δέμας, ὑστέρας δὲ πόνους δερραπύει· παύει δὲ καὶ ὀδόντων πόνους διαμασπεμένη. βοηθεῖ καὶ θηριοδύνκτοις ἐπιπιδέμεν. ἰσορρεῖται δὲ καὶ ἀσπιδόδύνκτοις μετ' ὄξους πινόμεν. βοηθεῖν. φύεται δὲ ἐν χέρσοις. 10

Πρὶ Πολεμωνίης. Κεφ. 8.

Πολεμώνιον, οἱ δὲ φιλεταίειον, κατὰ πάσδας μὲν χιλιodynamin καλοῦσι, κλωνία ἔχει λεπτὰ τεταρσσωμένη· φύλλα δὲ ὀλίγα, μείζονα πηλὰ, ἐπιμηκύτερα δὲ πρὸς τὰ τὰ πολυγώνου ἢ τῆς χαλαμίνθης, ἐπ' ἀκροῦ δὲ αὐτῶν ὡσπερ κόρυμβοι, ἐν οἷς σπέρμα μέλαν· ῥίζα πηχραία, ὑπόλευκος, ἐμφερὲς σφαιρῶν· φύεται ἐν ὄρειοις καὶ τραχύσι τόποις. Ταύτης ἡ ῥίζα πινέται ἐν οἶνῳ πρὸς θηρία καὶ δυσεντερίαν, δυσουρίαν τε καὶ ἰσχάδα μὲν ὕδατος. πωλεωνικοῦ δὲ μετ' ὄξους ὅσον ἄ. ὀλίγον. καὶ περιέπεται ἡ τοῦτου ῥίζα πρὸς σκορπίου πληγῇ. φασὶ δὲ μὴ τύπτεσθαι τοὺς ἔχοντας αὐτὴν ἢ καὶ πληγῶσι μηδὲν πάγειν· παύει δὲ καὶ ὀδονταλγίας διαμασπεμένη. 25

Πρὶ

Πρὶ Συμφύτου πετράϊκ.

Κεφ. θ'.

- Σύμφυτον πετράϊον φύεται ἐν πέτραις, κλωνία δὲ ἔχει ὁμοία δειγάνῳ, λεπτὰ κεφάλια δὲ ὡς δύμου· τὸ δὲ ὅλον ὅτῃ ξυλῶδες καὶ συλῶδες, γλυκύ τ' ὡρὸς τῇ γούσει, καὶ πινέλου περικλητικόν· ῥίζαν δὲ ἔχει μακράν, ὑποπόρφυρον, ὅσον δακτύλου πάχος. Τοῦτο ἐψηθὲν συνὶ μελικράτῳ καὶ πο-
- 10 δὲν ἀνακαθαίρει τὰ ἐν πνεύματι καὶ τοῖς αἵματι ἀνάροισι, καὶ νεφρικοῖς συνὶ ὕδατι δίδεται· συνὶ οἶνῳ δὲ ἐψηθὲν πίνεῖται ὡρὸς δυσεντερίαν, καὶ ροῦν γυναικῆον ἐρυθρόν· συνὶ ὀξύμυλῳ δὲ ὡρὸς
- 15 ἀσπασματα καὶ ῥήγματα. καὶ ἀδιδόν ὅτῃ διαμασώμενον, ἀρμόζει καὶ ταῖς βρογχίου τραχύτησι· κολλᾷ καὶ νεύρωτα καὶ ἐντεροκήλας, ἀποκρατεῖ κατὰ πλάσσομένον, καὶ τὰ κρέα δὲ συμπτέπει
- 20 ἐφόμῳ συνὶ αὐτοῖς.

Πρὶ Συμφύτου ἄλλου.

Κεφ. ι'.

- Σύμφυτον ἄλλο, οἱ δὲ πικτόν· χαυλὸν ἀνίστοι διπυχναῖον ἢ καὶ μέζονα, κοῦφον, παχύ, καὶ
- 25 γωνιοειδὲς, κανὸν ὡσπερεὶ σόκχου, ὡπεὶ ὃν οὐκ ἐν μεγάλῳ διασημάτων, φύλλα δασέα, στενὰ, ὑπομήκη ὡρὸς τὰ τῆ βουγλώσεως· ἐξοχὰς δὲ ἔχει ὁ χαυλὸς παρὰ τὰς γωνίας πηλὴς τεταμύας.
- φύλλον

Symphytum.

Cap. IX.

Symphyton petræon, id est alus, nascitur i petris, ramis tenuibus, paruis, origano similibus: capitulis thymi: furculosum totum, odoratum, gustu dulce, saluam ciens: longa radice, subrufa, digitali crassitudine. Decoctum in aqua mulsa & potum pulmonis vitia purgat: sanguinem reiicietibus, & renum malis, ex aqua datur: ad dysenteriam, rubramque foeminarum profluuia, in vino decoctum: ad conuulsa verò & rupta ex aceto mulso bibitur. Quin & commanducatum sitim sedat, faucibus asperis subuenit, vulnera recentia enterocelasque conglutinat, & illitu cohibet. Carnes autem cum symphyto decoctæ coalescunt.

Symphytum alterum.

Cap. X.

Est & alterum symphyton, quod aliqui pecton vocant: id caulem emittit bicubitalē, aut maiore, crassum, leuē, angulosum, vt sonchi inanē: circa quē breui interuacante spatio, folia exeunt angusta, buglossa proxima, oblonga, hirsuta: caule secūdū angulos quosdā striato: foliis

DIOSCORIDIS

foliis tenuibus ex alarum sinu
prodeuntibus, in quibus flores
lutei, & circa caulem velut ver-
basci semina emicant. Tā cau-
lis quàm folia, aspera lanugine
horrent, tactuque pruritū cō-
citant: radices demittuntur fo-
ris nigræ, intus candidæ, visco-
sæ: quarum est vsus. Tritæ &
potæ cruentis excreationibus,
ruptisque proficiunt: recentia
vulnera illitæ conglutinant:
carnes quoque, si concoquā-
tur, cogunt additæ: inflami-
nationibus, præsertim se-
dis, cum senecionis fo-
liis, vtiliter illinūtur.

Holostium. Cap. XI.

Holostion herba est pusilla,
tribus quatuorve digitis super-
eminens extra terrā, foliis vi-
tiliculisq; coronopo aut gra-
mini proximis, gustu adstringen-
tib⁹: radice alba, prætenui vsq;
in capillamenti speciē, longitu-
dine quatuor digitorū: nascit⁹
in collib⁹ terrenis. Vfus eius ad
rupta, i vino potē: nā & carnes
cogūtur, decoctionib⁹ addita.

Stoebe. Cap. XII.

Stoebe vulgaris est notitiæ: cu-
ius semē & folia stringūt: qua-
propter decoctū dysentericis
infundit⁹: auribus quoq; purulé-
tis instillatur. Illita folia oculis
ab ictu

φύλλων λεπτῶν πρὸς ὤφει-
μας μαλακῆς, τὰ ἄνθη ἐπεσι-
μύλιναι καὶ καρπὸς πρὸς τὸν καυ-
λὸν ὡς φλόμου. ὅλος δὲ ὁ καυλὸς
καὶ τὰ φύλλα ἔχει χροῖν ὑποβρα-
χυν, κατὰ τὴν περὶ σφαιρῶν κνη-
σμὸν ἐμποιοῦντα ῥίζαν ὅτι ὑπερσιν-
τὴν μὲν ὀρθοῦσαν μέλαινα,
ἐνδοθεν δὲ λευκαὶ καὶ γλίσχρα ὦν
καὶ ἡ χροῖς. Ποιεῖσι δὲ λείαν πι-
νόμηναι αἰμοπτοικοῖς καὶ ῥήγμα-
τίας καὶ τὰ νεόβρωτα κολλῶσι κα-
ταπλάσας ὀμῶν καὶ τὰ κρέα δὲ
συνεφόμηναι συνάγειν κατὰ
πλάτηνται δὲ πρὸς φλεγμονὰς
μάλιστα τὰς ἐν δακτύλῳ ὠφελί-
μως μετὰ φύλλων περιέχοντος.

Πρὶ Ολεσίε. Κεφ. ια'. 19

Ολεσίον* πῶς ὅτι μικρὰ ὑπερ-
γῆς ὡς τριῶν δακτύλων ἢ τεσσά-
ρων. φύλλα δὲ ἔχει καὶ κλήματα
κορυμβοῦ παρὰ πλάγια, ἢ ἀ-
χρώσει, συπληρῶ. ῥίζαν δὲ σφῶδρα
λεπτὴν ὡς τείχεα, λευκὴν τῷ
εἶδει, μήκος δακτύλων τεσσά-
ρων φύεται ἐν μεσολόχοις. Διώ-
ται δὲ καὶ ἀπὸ κρέα συνάγειν
συνεφομῶν, καὶ πρὸς ῥήγματα
συνάγειν ποτίζεται.

Πρὶ Στοιβῆς. Κεφ. ιβ'. 29

Στοιβή* ἥς ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλ-
λα σφῶδρα καὶ δυσεντέλεισι τὸ
ἀφέψημα ἀπὸ τῶν εἰλεται ἐγκλύ-
ζεται δὲ καὶ εἰς ὅτα πυορροῦν-
τα κατὰ πλάτηνται ὅτι τὰ φύλλα
ὠφελί

ὁφείλει σύχιστον ἰφθαλμῶν τῶν
ἐν πληγῇ, καὶ αἰμορραγίαν ἵκει.

Περὶ Κλυμενῆος. Κεφ. γ'.

Κλυμενον χαλὸν ἀνίσει τετρα-
γωνον, ὁμοιον τῷ τῷ κυάμου φύλ-
λα δὲ πρὸς τὰ τῷ ἀρογλώσσου.
5 φυλάκια δὲ ἔχει ἐπὶ τῷ χαλῷ
εἰς ἀμύλα νέοντα, ἵεοκότα ἵει-
δι καὶ πολυπόδης πλεκτύνης.
ἀεισον δὲ τὸ ὀρεγνόν. Χυλίζεται
δὲ ὅλον σὺν τῇ ῥίζῃ, ποιεῖ δὲ ὁ
10 χυλὸς πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν
πινόμμος, καὶ κοιμακοῦς, καὶ
ῥοῦν ἐρυθρὸν σύφον καὶ ψύχον.
ἐπέχει δὲ καὶ τὰς ἐν μυκθήρων
αἰμορραγίας. τὰ δὲ φύλλα λεῖτα
ἢ τὰ φυλάκια τοῖς νεοτερότοις ἐ-
15 πιπιδέμενα, μέχρι τῆς ἐπουλώ-
σεως ἐνδρῆ.

Πρὶ περικλυμενῶν.

Κεφ. ιδ'.

Περὶ κλυμενον θαμνίσκος ἐ-
στὶν ἀπλοῦς, ἔχων ἐν διασημά-
20 των φυλλάρια περικληρότα ἀν-
τόν, ὑπόλευκα, κισσεῖδῃ, καὶ
παρὰ τὰ φύλλα ἐκβλαστήσεις.
ἐφ' ὧν ὁ καρπὸς κισσῷ παραπλή-
σιος ἀνδρος* λευκόν, κυάμου ἐμφε-
ρὲς, ὑποστρογγύλον, οἰοεὶ ἐπικεί-
25 μενον τῷ φύλλῳ* καρπὸν σκλη-
ρὸν καὶ δυσάποσπαστον. ῥίζαν*
παχεῖαν πεμφερῆ. φύεται ἐν ἀ-
ρούραις καὶ θραγαυοῖς. περικλί-
τεται δὲ τοῖς πλησιάζουσι θά-
μνοις. Τέτου ὁ καρπὸς πέπειρος
συλλεγείσθαι

ab ictu cruētis p̄sunt, & erūpē-
tis sanguinis impetus cohibēt.

Clymenum. Cap. XIII.

Clymenum caulem fert fa-
bæ, quadratum : folia planta-
ginis, folliculis supra caulem
in sese inflexis, vt in iride, &
polyporum cirrhis. Probatif-
simum est è montibus. E fru-
tice toto cum radice succus
exprimitur, qui ad sāguinis re-
iectiōnes, in potu efficax est :
coeliacos, rubræque foemina-
rum profluvia, refrigerando
infranat : sanguinem naribus
erumpentem supprimit. Trita
folia, aut filiquæ recentibus
vulneribus impositæ, ea ad ci-
catricem perducunt.

Periclymenum.

Cap. XIII.

Periclymenon, simplex fru-
ticeat, ex interuallis parua folia
habens, ipsum amplectentia,
subcandida, hederacea : inter
folia surculi exeunt, in quibus
baccæ, hederæ similes : flos fa-
bæ cādidus, aliquantū rotūdus,
& quasi in foliū procumbens :
femen durū, & quod difficile
euellatur : radice rotūda, cras-
sa. Nascitur in aruis ac sepib*,
conuolues se adminiculis, pro-
pter assidentibus. Semen eius
postquàm ematuruit collectū,

&

& in vmbra ficcatū, si drachmæ pōdere detur in vino, quadragenis diebus, lienem absūmit, lassitudinem discutit: sed vrinam ciet, statim à sexto die cruentam. Orthopnoeæ, & singultui prodest: partum accelerat. Folia sunt eisdem viribus prædita, quæ tricenis septenis diebus epota, sterilitatē facere prodūtur: perunctis ex oleo, febrium algores abigūt.

Tribulus. Cap. XV.

TRIBULI genus vnum terrestre, foliis ad effigiē portulacæ, tenuioribus, viticulis in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, præduris: iuxta amnes & rudera nascitur. Est & alterum genus, aquis familiare, quod in fluminibus natum comā exerit, aculeos condens: foliis latis, & pediculo longo: caule parte summa, quam ima crassiori, ad sunt ei & capillamenta quædam spicacea: semen durū, ab altero non abhorrens. Vterque refrigerātis & inspissantis est naturæ: ideo inflammationes omneis cataplasmate adiuvant. Vlcera in ore erūpentia, putredines, gingivas, tonsillāsque perfanat. Succ^o ex his colligitur ad oculorū medicinas.

Semen

συλλεγείς κὺ ξηρανθεὶς ἐν σκιά, πίνεται μετ' οἴνου < α. ὀλίγη ὀπὶ ἡμέρας μ. κὺ σπλῦνα τήκει, κὺ κόπον λύει, κὺ ὀρθόποιον ὠφελεῖ κὺ λυγμόν· οὐρα ἄγει ἀπὸ τῆς ἑκτῆς ἡμέρας αἵμα τώδην. ἔστι δὲ 5 καὶ ὠκυτόκιον, τὴν αὐτὴν δὲ κὺ τὰ φύλλα διώων ἔχει ἡμέρας λζ' ποθέντα, καὶ ἀρότοις ἰσορεῖται ποιεῖν· ἀλειφόμενα δὲ μετ' ἐλαίου ὀπὶ τῶν πελοδικῶν, τὰ φρικία παραιτεῖται.

10

Πρὶ Τειβόλου. Κεφ. ιε.

Τειβόλος ὁ μὲν χερσαῖος ἀνδράχη τὰ φύλλα ἔοικε, λεπτότερα δὲ καὶ τὰ κλήματα κατὰ γῆς ἐσπρωμένα, κὺ πρὸς αὐτοὺς ἀκανθαὶ σφυραὶ, σκληραὶ. φύεται 15 δὲ παρὰ ποταμοῖς καὶ οἰκοπέδοις. ἔστι δὲ τις καὶ ἑνδρὺς παρὰ ποταμοῖς θυόμβρος, ὑπερέχων τὴν κόμην, τὴν δὲ ἀκανθὰν κρύπτων· φύλλα πλατέα, μόρον ἔχοντα μακρόν, χαλκὸς δὲ 20 ἐξ ἄκρου παχὺς, μᾶλλον τοῦ ἐμβαίνει. πρὸς ἐστὶ δὲ καὶ τειχόδι πινὰ ἀποπεφυκότα σαχρεῖδν· καρπὸς σκληρὸς ὡς καὶ ὁ δατέρου. Ἀμφότεροι δὲ σύφοισι, λυχοισιν· εἰσὶ τε πάσης φλεγμονῆς 25 γῆς καταπλάσματα. συνὲ μέλιτι δὲ ἄφθας καὶ παείδμας, καὶ τὰς ἐν σώματι σπηδόνας, καὶ οὖλα θέρει πνεύοισι· χυλίζονται δὲ καὶ εἰς τὰ ὀφθαλμικά. ὁ δὲ

ὁ δὲ καρπὸς αὐτῶν, χλωρὸς λι-
 διῶντας πνύμενος ὠφελεῖ. τὸ δὲ
 χειραῖς ὅσον < α. πνύμενη καὶ κα-
 ταπλάσσομένη, τοῦ ἐχιδνικοῦ
 ἀποκαθίστησι· ἀρμύζει καὶ θανα-
 σίμοις μετ' οἴνου πνύμενος. κτεί-
 νη δὲ καὶ φύλλας τὸ ἀπόζευμα αὐ-
 τῆς ῥαυθίνης. οἱ δὲ πρὸς τὸν στυμό-
 να πύτα μὲν θράκες, τὸ μὲν πᾶν
 χλωρὰν ἰπποβοφῆσιν· τὸ δὲ καρπὸν
 γλυκῶς ὄντα καὶ περὶ μὲν, σίλοποι
 10 οὖν, χλωμενοὶ αὐτῶ ἀντὶ αὐτῆς.

Πρὶ Λιμώνιος. Κεφ. ις'.

Λιμώνιον, οἱ δὲ, νευρείδης.
 τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὁμοία σέυ-
 τλω, λεπιότερα δὲ καὶ μακρότε-
 ρα, δέκα ἢ πεντέκαυτον λεπτόν,
 15 ὀρθιον, ἴσον ὡς πρὸς κρίνου, γέμων-
 τα καρποῦ ἐρυθρῆς σφόντος πύ-
 γευσιν. Διῶνται δὲ ὁ καρπὸς
 λεῖος συν οἴνω ποθεῖς, ὅξυβάφει
 πλῆθος δυσεντερικοῖς καὶ κοιλια-
 κούς ὠφελεῖν· ῥοῦν δὲ γυναικείον
 20 ἐρυθρὸν ἐφιστάνειν. φύεται δὲ ἐν
 λιμῶσι καὶ ἐλώδεσι τόποις.

Πρὶ Λαγώποδος. Κεφ. ιζ'.

Λαγώπης διῶαμιν ἔχει σαλι-
 κὴν κοιλίας πνύμενον μετ' οἴνου·
 ἐπὶ δὲ τὸ πύρεσσόντων μετ' ὕδατος.
 25 πειράζει δὲ καὶ πρὸς φλεγμαίνην
 βελώνων· φύεται δὲ ἐν περσισαῖς.

Πρὶ Μήδης. Κεφ. ιη'.

Μήδιον φύεται ἐν παλίσκοις τό-
 ποις καὶ περὶ ὠδῆσιν· ἔχει φύλλα
 ὁμοία ἰριδι· χαμηλὸς τείων χυς,

αὐτῆς

Semen dum recēs bibitur, cal-
 culosis iuuamentum affert.

Drachma terrestris tribuli po-
 ta, illitave, ictos à vipera re-
 creat : contra venena cum vi-
 no aptissimè bibitur. Decto-
 ctum eius sparsum pulices ne-
 cat. Thraces qui ad Strymona
 amnem habitat, virenti tribu-
 lo equos fagināt, & ē dulci se-
 mine & esculento panem, quo
 vescuntur, faciunt.

Limonium. Cap. XVI.

Limonion, folia habet be-
 tæ, tenuiora & longiora, de-
 cem, sæpe plura : caulem te-
 nuem, rectum, lilio æqualem,
 feminibus rubris scatentem,
 quæ gustata adstringunt. Se-
 men tritum, & ex vino ace-
 tabuli mensura potum, dysen-
 tericis coeliacisque prodest : ru-
 bra foeminarum profluvia si-
 stit. Nascitur in pratis & palu-
 stribus.

Lagopus. Cap. XVII.

Lagopus herba sistit aluum
 in vino pota : aut in febrī, ex
 aqua. Eadem inguini alligatur,
 in inflammatione. Nascitur in
 segetibus.

Medium. Cap. XVIII.

MEDION in saxi &
 opacis nascitur : folia habet
 iridis : caulem tricubitalem,

ε

ε

& in eo florem grandem, purpureum, rotundū: semine cnicī, minuto: radicem dodrantalem, crassitudine baculi, gustu acerbo. Quæ trita in farinā, & ex melle decocta, rubros menses foeminarū sistit, eclegmate per aliquot dies sumpto. Semē in vino potum, mēstrua pellit.

Epimedium. Cap. XIX.

Epimedium, caulis est non magn⁹, hederæ foliis, denis atque duodenis, neque florē, neque fructum ferens: radice tenui, nigra, graui odore, gustu fatuo: nascitur in humidis. Folia cum oleo trita, imposito cataplasmate, mammas increfcere non sinunt. Radix conceptum adimit. Folia trita quinis drachmis, post mēstruas purgationes, quinq; dieb⁹ in vino pota, præstāt mulierib⁹ ne cōcipiāt.

Gladiolus. Cap. XX.

Xiphion, alij phasganon, alij machæroniō, Romani gladiolum, vocant. nomen inde accepit, quod foliū gladij præbeat speciem. Iridi simile erat, nisi minus & angustius videretur, & gladij modo mucronatum, neruosumq;. In caulem exit cubitalem, in quo purpurei flores, in ordinē digesti, inter se distant: rotundo semine: radicibus

ἀνθι πορφυρείδῃ μέγιστα καὶ
 περιφερῇ • καρπὸς μικρὸς, εἰκὼς
 κνίκῳ • ρίζα σπιθαμαία, βακτη-
 είας ἑχουσα πᾶχος, σφυγὴν γε-
 ομνῶ. Ἡ τις ξηρὰ λεία ἐκλει-
 χομένη σὺν μέλιτι ἐφθὶ ἐφ' ἡμέ-
 ρας ἡμέρας, ῥεῖν τ' ἐρυθρὸν ἰση-
 σι. τὸ δὲ σπέρμα σὺν οἴνῳ ποθέν,
 ἄγει ἐμμῆνα.

Πρὶ Ἐπιμυδίου Κεφ. ιθ'.

Ἐπιμύδιον χαμλὸς ὅστιν οὐ
 μέγας, κιστῶ παραπλήσια φύλ-
 λα ἔχων ὅσον ι. ἢ ιβ'. οὔτε δὲ
 καρπὸν οὔτε ἀνθὶ φέρει • ρίζαι δὲ
 λεπταὶ, μέλαιναί, βαρύνουσαι, γε-
 ομνῶ μωραί • φύεται ἐν τόποις
 ὑδροῦσι. Ταύτης τὰ φύλλα
 λεία μετ' ἐλαίου, κατὰ πλάσσει
 μασῶν εἰς τὸ μὴ αὐξέειν. ἀπό-
 κός τε ἡ ρίζα καὶ τὰ φύλλα λεία
 ποθέντα ἐν οἴνῳ μετὰ πλὴν κα-
 δασιν < ἐ. πλῆθος ἐπὶ ἡμέρας
 ἐ. ἀσυνλήπτους τηρεῖ.

Περὶ Ξιφίου.

Κεφ. κ'.

Ξιφίον, οἱ δὲ φάσγανον, οἱ
 δὲ μαχαίρανιον καλοῦσι, διὰ τὸ
 τῆ φύλλου χῆμα, εἰκε ᾧ ἰει-
 δι, ἐλαττον μὲν τοι καὶ στενότε-
 ρον, καὶ ὀποξὺ ὡς μαχαίριον,
 ἰνῶδες. χαμλὸν δὲ ἀνίστι πη-
 χαῖον, ἐφ' οὗ ἀνθὶ πορφυρε-
 ῖ σπυρδόν, ἀπ' ἀλλήλων διεσῶ-
 τα • καρπὸν δὲ στρογγύλον • ρίζας β.
 πλὴν

ἡ μὲν μία ἐπὶ τῇ ἑτέρῃ καὶ
 μὲν ὡς βολβία μικρά· τέ-
 τω· ἢ μὲν ἁπλῶς, ἰσχυρὴ ὅστις, ἢ δὲ
 ἄνωθεν, ἀδροτέρῃ· φύει δὲ μά-
 λις ἐν ἀρούρας. Δυνάται δὲ
 5 ἢ ἄνωθεν ῥίζα κατὰ πλάτος ὡς
 μετ' οἶνον καὶ λιβανωτῆς, ἀκίδας
 καὶ σκόλοπας ἐπαπλάσσει· συν ἁ-
 λῶσιν δὲ αἰρίνῃ καὶ ὑδρομέλιτι
 διαρτίζει φύγει δὲ ὅθεν τῆς
 τοιαύτης ἐμπλάσσει μύρουται.
 10 ἄγει δὲ καὶ κατὰ μύρια πρὸς τε-
 δεῖται. φασὶ δὲ καὶ ἀφροδίσι πα-
 ρεμφῶν τὴν ἁνωτέρω ῥίζαν συν
 οἶνῳ ποτεῖσθαι, τὴν κατωτέρω δὲ
 αἰώνας ποιεῖν. ἐν περὶ κληκρῆς τῇ
 πτωσίῳ ὡφελίμως δίδωται τὴν
 15 ἐπὶ αὐτῇ ῥίζαν ἐν ποτῶ συν ὕδατι.

Περὶ Σπαργανίου. Κεφ. κα.
 Σπαργανίον φύλλα ἔχει ὁμοί-
 ατα ξιφιδίου, στενωτέρω δὲ καὶ ἐπι-
 κλινέστερα· ἐπ' ἄκρῃ δὲ τὰ χυμ-
 λοῦ ὡς πρὸ σφαίρας ἐν οἷς ὁ καρπός.
 20 δίδεται ἢ ῥίζα καὶ ὁ καρπὸς συν
 οἶνῳ θηριόδηκτοις.

Περὶ Συείδους. Κεφ. κβ.
 Συεῖς, τὰ μὲν φύλλα ἔχει
 ἰερίδι ὅμοια, πλατύτερά δὲ καὶ
 ἐξ ἄκρῃ ὀξεία· χυμὸν δὲ ἐν μέ-
 σε τῶν φύλλων πηχυαῖον, ἰσχυρὸς
 25 παχυῦ, ἐφ' ᾧ λαβοὶ τείρωνοι καὶ
 ἐπ' αὐτῶν αἰστος πορφυρεῶν· τὸ
 δὲ ἐν μέσῳ φοινικουῦ· καρπὸς
 δὲ ἐν συλακίοις κυάμοις ὅμοιος,
 στρογγύλος, ἐρυθρὸς, δειμῆς·
 ῥίζα

radicibus geminis, vna pusil-
 lorum bulborum modo, super
 alteram insidente, quarum in-
 ferior gracilis est, superna vbe-
 rior: nascitur in aruis. Super-
 rior cum thure illita, admisto
 vino, spicula & aculeos è cor-
 pore extrahit: panos cum lo-
 lij farina & hydromelite discu-
 tit: qua de re huiusmodi em-
 plastris inferi solet. Menses im-
 posita trahit. Superiori radice
 ex vino pota, venerem stimu-
 lari, & inferiore sumpta ste-
 rilescece tradunt. Superio-
 rem quoq; vtiliter infan-
 tiū enterocelis, cū aqua
 potui dare præcipiūt.

Sparganium. Cap. XXI.
 Sparganion, aliq. xiphidion vo-
 cāt, folia habet gladioli, sed ar-
 ctiora, & ī terrā magis p̄cūbē
 tia: in sūmo caule veluti pilulæ
 p̄minēt, ī q̄b⁹ semē. Cōtra ser-
 pētis venena radix cū vino da-
 tur. Xyris. Cap. XXII.

X Y R I S, folia habet iri-
 dis, latiora, & in cacumine
 mucronata: quorum medio
 caulis erumpit, satis crassus,
 cubitalis, ex quo filiquæ trian-
 gulares dependent: in quibus
 purpureus flos, in medio puni-
 ceus: semen in folliculis, simile
 fabis, rotundum, rubrum, acre:

DIOSCORIDIS

radix fonga, geniculata, rufa. Contra capitis vulnera fractaque efficax est: aculeos & spicula omnia citra molestia extrahit, adiecta floris æris tertia parte, & radice centaurij ac mellis quinta: tumoribus & collectionib⁹ illita cum aceto medetur. Radix ex passo bibitur, ad conuulsa, rupta, coxendicum dolores, stranguerias & alui profluuia. Semen tribus obolis potum, vrinam vehementius impellit: & cum aceto, lienem absumit.

Anchusa. Cap. XXIII.

ANCHUSA, quæ alio nomine calys, aut onoclea appellatur, folia habet lactucæ in acumen, fastigiata, hirsuta, aspera, nigra, multa, ab radice quoquoersum humi sparsa, spinis horrida: radici crassitudo digitalis, quæ æstate provenit, ac manus inficit sanguineo colore: læto solo nascitur. Radix adstringit: ad ambusta & vetera vlcera, ex oleo & cera efficax est: igni sacro cum polenta medetur: lepris & vitiliginibus illinitur ex aceto: partus extrahit, vulvæ indita. Eius decoctum

ρίζα ὅ πολυγόνατος, μακρὰ, πυρρὰ, ποῖσα πρὸς τὰ ἐν κεφαλῇ τραύματα καὶ κατὰ γυμνατὰ ἀνάγει δὲ σκόλοπας, καὶ πᾶν βέλος ἐπισπᾶται καὶ ἀπονίας μυήματος αὐτῇ χαλκοῦ ἀνδρὸς μέρες τεῖτον, καὶ κενταυρίου ρίζης μέρος ἑ. καὶ μέλιτος. Διεραπύει δὲ καὶ οἰδήματα καὶ φλεγμονὰς καταπλάσσει μύρην μετ' ὅξους πίνει δὲ καὶ πρὸς σπλάγχνα, ῥήματα, ἰσθμίδας τὴν καὶ σπαραγγείας. καὶ διάρροιας ἢ ῥέζα μετὰ γλυκέος τετρασμήνη. ὁ δὲ καρπὸς οὐρητικώτατος ὅσον τειωόκορον ποδεῖς ἐν οἴνω τῆς καὶ σωλῶνα συν' ὅξει ποδεῖς.

Πρὶ Ἀρχέσης. Κεφ. κα' 14

Ἀρχῆσα, ὡς ἔνιοι κάλυκα, οἱ δὲ, ὀνόκλησαν καλῶσι τὰ μὲ φύλλα ἔχει θρίδακι τῇ ὀξυφύλλῳ παρσπλήστα, δασέα, βραχέα, μέλανα, πολλὰ. παντ' ἀρόθεν ἢ ῥήζης πρὸς πεπλασμένα τῇ γῇ, ἀκανθώδη. 20 ἢ ὅ ρίζα δακτύλου τὸ πάχος, πλὴν χροῖαν ὕψαιμος, ἐν τῷ δέξῃ γυμνωμένη καὶ βάπτειται ταῖς χεῖρας φέεται ἐν ὑγροῖς τόποις. Εἰς ὃ ἢ ῥέζα συπληνῇ ποῖσα πρὸς κατὰ κράμα καὶ παλαιὰ ἔλκη, ἐναφε 25 φομένη κηρὶ καὶ ἐλαίῳ ἐρισπέλατα ὅ συν' ἀλφίτῳ καταπλασθεῖσι θραπύει καὶ ἀλφὸς καὶ λείπεται συν' ὅξῃ καταπλάσσει μύρην πρὸς διεμένην καὶ ἐμβρυα κατὰ σπᾶ, τὸ δὲ

δὲ ἀφέψημα αὐτῆς δίδεται καὶ
 ἰκτερικοῖς, νεφριτικοῖς, σπλιν-
 κοῖς, πυρέσσει μὲν μελικράτῃ τὰ
 5 φύλλα κοιλίαν ἱσησι μετ' οἴνου
 πινόμῃ. χρῶν δὲ καὶ οἱ μωροὶ
 ἢ ἢ ρίζῃ περὶ τὰς σὺψας τῶν μύρων.

Πρὶ Ἀγχύσης ἐτέρας.

Κεφ. κδ.

Αγχύσα ἐτέρα, ἧν ἔνιοι δι-
 κιδιάδιον, ἢ ὀνοχίλες ἐκάλε-
 σαν. αὐτὴ διαφέρει τῆς περὶ τῆς
 10 τῶν μικρότερων ἔχει τὰ φύλλα,
 τραχέα δὲ ὁμοίως· καὶ τὰ κλωνία
 λεπτὰ ἐφ' ὧν αὐτὸς πορφυρε-
 ῖς ὑποφωινκίζον· ρίζας δὲ ἐρυ-
 θράς, ἐυμήκεις, περὶ τὸν πυ-
 ραμντὸν ἐχούσας τὸ αἷμα τῶ-
 15 δεσφύεται δὲ ἐν ἀμμόδεσι τό-
 ποις. Δυσάμεις δὲ αὐτῆς, καὶ
 τὰ φύλλων θηριοδύκτοις βοηθεῖν,
 μάλιστα δὲ ἐχιδνικοῖς, ἐδιδόμα-
 να, καὶ πινόμῃ, καὶ περὶ τὰ πό-
 μῃ καὶ μασσητὰ μῆρος πρὸς εἰς
 20 τὸ σῶμα τῶν θηρίων ἀποπύσῃ,
 ἀποκτενεῖ αὐτό.

Πρὶ Ἐτέρας ἀγχύσης.

Κεφ. κε.

Ἔστι δὲ καὶ ἄλλη ἐμφερὲς ταύ-
 τη, ἐλάτῃ δὲ καρπὸν ἔχουσα φοι-
 25 νικοῦν. ὃν ἐάν τις μασσησόμε-
 νος ἀποπύσῃ εἰς τὸ σῶμα τῶν
 περὶ τῶν ἀποκτενεῖ. ἢ δὲ ρίζα με-
 τὰ ὑσώπου καὶ καρδάμυ ποθεῖ-
 σα, ὅξυ βλάφει πλῆθος, πλατείαν
 ἑλμύνει, ἐκπνέεται.

decoctum renum vitiis, lieni,
 & bile suffusis datur: & si fe-
 bris sit, ex aqua mulsa. Siftunt
 aluum folia in vino pota. Ra-
 dice pigmetarij vtuntur ad vn-
 guentorum spiffamenta.

Anchusa altera.

Cap. XXIII.

Est & altera, quam aliqui al-
 cibiadion, aut onochiles appel-
 larūt. Hec à priore distat, quòd
 minora habeat folia, sed simili
 modo aspera: ramulos exiles
 in quibus flos purpureus in pu-
 niceum vergens conspicitur:
 radices rubræ, prælongæ, quæ
 melsibus sanguineum succum
 fundunt: in fabulosis nascitur.
 Vis ei folijsq; inest, quæ contra
 virus cū reliquorum serpen-
 tium, tum maximè viperarum
 auxilietur, siue cibo, siue po-
 tu, siue alligatu: nam si quis
 quam mandens, in serpentis os
 inspuat, eum necabit.

Anchusa tertia.

Cap. XXV.

EST & alia huic haud dis-
 similis, semine puniceo, mi-
 nore. Cuius semen manduca-
 tum, si in serpentis fauces in-
 spuat, eam interficiet. Radix
 acetabuli mensura cum hyffo
 po & nasturtio pota, latas ven-
 tris tineas excutit.

Πρὶ

C iij. Lyco.

DIOSCORIDIS

Lycophis. Cap. XXVI.

Lycophis, quæ & anchusa à nonnullis vocatur, folijs lactuæ, longioribus, asperioribus, latioribusque, crassis, ad radicis caput recidentibus: caule longo, recto, scabro, hirsutis adnatis, multis, cubitalibus: flore in iis paruo purpurascens: radice rubra, & adstringente: nascitur in campestribus. Cum oleo radix illita, vulneribus medetur: & cum farina hordeacea, ignib^o sacris: sudores peruncta mouet, adiecto oleo.

Echium. Cap. XXVII.

ECHION, folia habet prælonga, aspera, aliquantum tenuia, anchusæ proxima, minora tamen, subrubra, & pingua, spinulis tenuibus horridula: cauliculos exiles, numerosos: minutæque utroque latere folia, expansa, pinnatæque, nigra, in summo caule breviora: flores secundum folia purpureos, in quibus semina capiti viperarum similia insunt: radix nigricat, digito tenuior. Quæ non percussis modò a serpentibus ex vino prodest, sed eos qui antea biberint, feriri non patitur. Folia & semen idem præstant munus.

Lumborum

Πρὶ Λυκόψεως. Κεφ. κς'.

Λύκοψις, οἱ δὲ, καὶ ταύτην ἄλχουσαν ἐκάλεσαν, τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια θρίδακι, μακρότερον δὲ καὶ τραχύτερον καὶ παχέα καὶ πλατύτερον, πεπωκότα ὥστε τῆς ρίζης κεφαλὴν χαμηλὸν ἀγίνουσι μακρὸν, ὀρθόν, βραχὺν, παραφυάδας ἔχοντα πολλὰς, πυκναίας, βραχέας· καὶ ἐπ' αὐταῖς αἴθνη μικρά, πορφυρίζοντα· ρίζα δὲ ἐρυθρά, συπληνέ· φύε' ἐν πεδίοις. καὶ τὰ πλαστομῆν δὲ μετ' ἐλαίου ἢ ρίζα, βάνματα ἰά'· καὶ ἀγρίου καὶ ἐρυσσιπέλατα· λεία δὲ συναλέφου μῆν μετ' ἐλαίου ἰσθρῶτας κινεῖ.

Περὶ Εχίου. Κεφ. κς'.

Εχίον, οἱ δὲ, αείδαν, οἱ δὲ, ἀγρίον κισιάδιον, τὰ μὲν φύλλα ἔχει περὶ μήκην, τραχέα, ὑπολεπία, ὡς τὰ τῆς ἀγχεσπῆς, ἡ πύονα δὲ καὶ λιπαρὰ, ἀκαύδια λεπτὰ ἐπικείμενα, καὶ ἃ καὶ διασωφύει τὰ φύλλα· χαμηλὰ λεπτὰ, πολλὰ· ἐκατέρωθεν δὲ φυλλάδια λεπτὰ τασσόμενα, μέλανα, ἐλάττωκα δὲ ὡς λόγον δὲ ἐπ' ἄκρην δὲ χαμηλὰ. τὰ δὲ αἴθνη παρὰ τὰ φύλλα πορφυροεῖ· δὴ ἐν οἷς ὅστις καὶ ὁ καρπὸς κεφαλῇ ἔχει ὅμοιος· ρίζα δὲ λεπτοτέρα δακτύλου, ὑπομέλαινα. ἢ τις ἢ μόνον τοῖς δὴ χθεῖσιν ὑπὸ ἐρπετῶν βοηθεῖ ποθεῖσαι μετ' οἶνου, ἀλλὰ καὶ τὸς ὡς πόντας ἀδύκτους ποιεῖ. ὁμοίως δὲ καὶ τὰ φύλλα καὶ ὁ καρ-

πες. παύει δὲ καὶ ὁσπύρος ἀγγήμιον,
καὶ γάλα κατὰ πᾶσι μετ' οἴνου ἢ
ροφήματος ληφθεῖσα.

Πρὶ Ὀκυμοῖδους. Κεφ. κη΄.

Ὀκυμοῖδεις, οἱ δὲ φιλεταίριον,
5 φύλλα μὲν ἔχει ὠκύμοι ὁμοία,
κλώνας δὲ σπιθαμαίους, διατεῖς·
λοβὸς δὲ παρὰ πηλίας ὑποκύν-
μω, πλήρης σπέρματος μέλανος,
εὐκότας μελανόφωνοι. Διὰ μιν δὲ
ἔχει τὸ σπέρμα πινόμορον ἐν οἴ-
10 νω, ἐχιδνέτους καὶ τὰ ἄλλα τῶν
έρπετων δῆγματα θεραπεύειν.
δίδεται δὲ καὶ ἰσχυρικοῖς μετὰ
σμύρνης καὶ πεπέρως· ῥίζα δὲ ὑ-
περὶ λεπτή καὶ ἀχρυσός.

Πρὶ Ερίνου. Κεφ. κθ΄.

15 Ερίνος φύς· παρὰ ποταμοῖς καὶ
κρήναις, φύλλα ἔχει ὠκύμοις ὁ-
μοία, μικρότερα δὲ καὶ ἐπεχρημέ-
να ἐκ τῶν ἀνδρῶν μερῶν, κλώνία ὅ
ἐ. ἡ σ'. σπιθαμαῖα, ἀνδρῶν λευκῶν
καρπὸν ὃ μέλανα, μικρὸν, σφυρόν·
20 ὁ πᾶς δὲ μεσὺς ὅστις ὁ καρπὸς καὶ
τὰ πέταλα. Τύπων ὁ καρπὸς ὡς
β'. πηλίδος μυγίς πρὸς μέλιτος
κυνάδοις τέσσαρας, ῥύματα ὀφ-
θαλμῶν ἐγχερόμενος ἰσχυρῶν. ὁ δὲ
χυλὸς ὧτων πόνον παύει μετ' εὖ
25 ἀπύρε καὶ νίβει ἐν σαζόμορος.

Πρὶ Ἀχρωσέως. Κεφ. λ΄.

Ἀχρωσις κλημάτις ἔχει γονα-
τώδη ἔρποντα ἐπὶ τῇ γῆς, καὶ ἀπὸ
τῆς κλάδων περιέμενα· ῥίζας γλυ-
κείας γονατώδεις· φύλλα ὀξέα,
σεληρεῖ.

Lumborum dolores sedat, in
vino aut sorbitione sumpta, &
lac extrahit.

Ocimastrū. Cap. XXVIII.

Ocimoides, Latini ocima-
strum vocant, folia fert ocimi,
& ramos dodrātales, hirsutos:
filiquas hyoscyamo similes, se-
mine, vt gith, nigro prægnan-
tes. Vim habet semen in vino
potum, qua viperarum cæte-
rarumque serpentium mor-
sibus medeatur. Datur ischia-
dicis cum melle, vino, myrrha,
& pipere. Radice nititur te-
nui, & superuacua.

Erinus. Cap. XXIX.

Erinus nascitur apud fontes
& fluuios, foliis ocymi, sed mi-
noribus, parte superna diuifis,
dodrantalibus furculis quinif-
senisve, flore candido: semine
nigro paruo & acerbo: folia
& caules lacteo succo turgēt.
Semen drachmis duabus, in
quatuor mellis cyathis, obli-
tum, oculorum fluxiones co-
hibet. Succus cum sulphure &
nitro instillatus, aurium dolo-
res sedat.

Gramen. Cap. XXX.

GRAMEN geniculatis
serpit ramulis, à quibus radi-
ces spargit dulces, articulis
præcinctas: folia acuminata,
C iiij dura,

dura, & vt arundinis parua, lata, in exilitatem fastigiatur, eaque iumenta & boues pascunt. Trita radix illitu vulnera conglutinat. Decoctum eius in potu torminibus medetur, & vrinae difficultatibus: calculosa etiam vesicae excrementa comminuit.

Gramen arundinaceum.

Cap. XXXI.

EST & arundinaceum graminē, priore multo maius, quod iumenta necare traditur, praefertim in Babylone id quod iuxta vias nascitur.

Gramen Parnasaicum.

Cap. XXXII.

QUOD in Parnaso monte gignitur, densius fruticat: foliis hederaceis: flore odorato, candido: semine paruo, non inutiles: radicibus quinque aut fenis, digitali crassitudine, candidis, mollibus, robustis, ac dulcibus. Succus si in vino cum melle pari, & myrrhae dimidio decoquatur, adiciaturque piperis & thuris tertiae portiones, probatissimum erit oculorum medicamentum: id in aerea pyxide reconditur. Decoctum radice idem quod herba, praeficit. Semen vehementius urinam impellit, aluum vomitionesque sistit. Natum in Cilicia graminē, quod

σκληρὸν, πλατέα, ὡς καλὰ μὲν μακροῦ, τρέφοντα βόας καὶ κτήνη. Ταύτης ἡ ρίζα καταπλαπτομένη λεία, τρυμάτα κοιλῆ. τὸ δὲ ἀφελήμα αὐτῆς πινόμενον, πρὸς σφόδρα ποιεῖ καὶ δυσουρίαν. καὶ τὰ περὶ τὴν κύστιν πεπληρωμένα λιθώδη δρῦται.

Πρὶ Καλαμαζώσεως.

Κεφ. λβ.

Καλαμάζεωσις μείζων ὅτι κατὰ πάντα τῆς ἀρρώστιας. ἐστὶ 10 κίλυων ἀνααιρετικὴ βρωδεία, καὶ μάλιστα ἡ ἐν βαθυκλῶνι παρὰ τὴν ὁδοῖς φουμώρη.

Πρὶ τῆς ἐν παρνασσῷ ἀρρώστιας. Κεφ. λβ.

Ἡ δὲ ἐν τῷ παρνασσῷ ἡγομένη 15 γνη ἀρρώστια, πολυκλαδωτέρα ὅτι φύλλα δὲ κισσῷ ὅμοια φέρει ἀνδρὸς λευκόν, καὶ ἐν ὧδες καρπὸν μικρόν, οὐκ ἀρχησον· ρίζας ἑ. ἢ 5. δακτύλου πάχος, λευκὰς, μαλακὰς, γλυκείας ἰχυρῶς. ὧν ὁ 20 χυλὸς ἐφελδεῖς αὐτῷ οἶνῳ καὶ μέλιτι συμμείτρω καὶ σμύρνης ἡμίσει μέρει, πεπέσει τε καὶ λιβανῷ τῷ τεύτῳ, φάρμακόν ἐστιν αἰεσον πρὸς ὀφθαλμοῦς ἀποτίθεται δὲ ἐν χαλκῇ πυξίδι. 25 τὸ δὲ ἀφελήμα τῶν ριζῶν, ποιεῖ πρὸς αὐτῇ καὶ αὐτῇ. τὸ δὲ σπέρμα ταύτης ἰχυρῶς διουρητικόν, καὶ ἐμέτων καὶ κοιλίας ρέσεως σταλτικόν. Ἡ δὲ ἐν κυλικῇ ἡγομένη, 30

ὡς οἱ ἐπὶ χεῖροι κίτταν καλεῖσθαι,
ἐν ἧς βρωδεῖσα πολλάκις, πίμ-
νωσι τὸν βόας.

Περὶ Σιδνεΐπιδος. Κεφ. λγ'.

Σιδνεΐπιδος, οἱ ὅτι ἡράκλειαν, πᾶς
5 ὅτι φύλλα ἔχουσα ὁμοία πρε-
σίω, ἐπιμηκύτερα δὲ πρὸς τὰ
τοῦ ἐλελισφάκου ἢ δρυὸς, μικρό-
τερα μὲν τοι καὶ τραχέα· καυλοὶ
δὲ ἀνίστοι τετραγώνους, σπιθα-
μαίοις ἢ καὶ μείζονας, οὐκ αἰδεῖς
10 ἐν τῇ γένει, καὶ ποσὶς ὑποσφον-
τας· ἐν οἷς ἐκ διασημάτων σπόν-
δυλοι περιφέρεις ὥσπερ πρεσίου,
καὶ ἐν αὐτοῖς σπέρμα μέλαν· φέ-
ται δὲ ἐν ὑποπέτραις χερμαίοις.
Δυνάμει δὲ ἔχει τὰ φύλλα κα-
15 ταπλαστόμυρα, τραυματίων κολ-
λητικὴν καὶ ἀφλέγματον.

Περὶ Ἑτέρας σιδνεΐπι-
δος. Κεφ. λδ'.

Ἄλλη σιδνεΐτις κλεῖνας ἔχει
διπλῆς, λεπτοῖς φύλλα δὲ ἐπὶ
20 μόσχον μακρῶν, ὁμοία τοῖς ὅτι πτε-
ρίδος, ἀκροχρῶν πολλὰ ἐκαστέρω-
δεν, ἐκ ὅτι τ' ἀνωτέρω μακρῶν,
ἀποφύσεις μακρὰς, λεπταῖς, ἐπὶ
ἄκρῳ σφαιροειδεῖς, κεφαλὴν ἔχου-
σας βραχεῖαν, ἐν οἷς σπέρμα ὁμοι-
25 ον σεύτλῳ, στρογγυλότερον δὲ καὶ
σκληρότερον. δυνάμει δὲ καὶ ταύτης
ὅτι καὶ τῶν φύλλων τραυματικὴ.

Περὶ Ἑτέρας σιδνεΐπιδος.

Κεφ. λε'.

Ἐπὶ καὶ ἑτέρα εἶναι λέγει σιδνεΐ-
πιδος, ὡς καὶ

quod incolæ cinnā appellant,
boues inflammat, si eo virenti
sæpe pascantur.

Sideritis. Cap. XXXIII.

Sideritin aliqui heracleā vo-
cant: folia habet marrubij, sed
longiora, satis ad frondē quer-
cus aut saluix accedētia, mino-
ra tamen, & aspera: caules ædit
quadratos, dodrantē altos, ac
quandoq; etiam maiores, non
iniucūdi gustus, aliquātūmque
substringētis: in quibus per in-
terstitia orbiculatæ vertebræ,
vt in marrubio, spectantur, &
semē in eis nigrum: nascitur in
petrosis. Illita folia suapte vi,
vulnera sine inflammationis pe-
riculo iungunt.

Sideritis altera.

Cap. XXXIII.

Altera sideritis binūm cubi-
torū ramulis, exilibus: folio fili-
cis, numerofo, vtrinq; per oras
diuifo: pediculo lōgo, prodeū-
tibus ἐκ summo alarū finu fur-
culis, longis, tenuibus: capitulo
in cacumine orbiculato, aspe-
ro, in quo semen continetur, q̄
betæ rotūdius aliquantō, ac du-
rius. Huius vis, foliorūmque, ad
vulnera, præcipua est.

Sideritis tertia.

Cap. XXXV.

Sideritin aliam esse tradunt,
quam

DIOSCORIDIS

quam Crateuas heracleam vocat, in materiis, & vineis nascētem, foliis ab vna radice multis, coriandro similibus, circa coliculos dodrantes, teneros, læues, subcādidos atq; subrubicūdus: flore puniceo, paruo, gustanti amaro, & lēto. Huius ea vis est, vt quauis recenti vulneri imposita, sanguinem supprimat.

Achillea. Cap. XXXVI.

Achillea, quibusdā Achillea fideritis, dodrātales aut maiores gerit scapos, fusorū effigie, minutulis foliis circūdatus, ex obliquo crebras habētibus incisuras sectionibus, coriandro similibus, subfuluo colore lentis, odore multo, nō insuauis, verum medicato: vmbella in cacumine rotunda, floribus candidis [purpureis] & aurū æmulatib⁹: prouenit lēto solo. Trita coma sanguinolēta glutinat, & ab inflātionū periculo tuetur: erūpentē sanguinē inhibet, & cruēta vuluę pfluuia in velere. Decocto quoque infidēt foeminæ fluxione vuluę laborantes. Ad dysenteria bibitur.

Rubus. Cap. XXXVII.

Rubus, notitię vulgaris. Vim habet siccandi, & adstringendi: capillum tingit. Ramorum deco-

πς, ὡς καὶ αὐτὴν κρατεύας ἡρά-
κλειαν χαλεῖ, φουμύλῳ ἐν ποί-
χοις καὶ ἀμπελῶσιν, ἔχουσα φύλ-
λα πολλὰ ἀπὸ μίας ῥίζης ὅμοια
κοριάνῳ ὡς χαυλίοις σπιθαμι-
αίοις, λείοις, τρυφερῶς, ὑπολευ-
κοῖς, ἐνερευδέσιν· ἀνθὶ δὲ φοινι-
κᾶ, μικρὰ, γενομύῳ πικρὰ, γλί-
γξα, καὶ ταύτης ἡ δυνάμεις ἐ-
πιπτερόνης, κολλητικὴ ἐν αἵμων
καὶ νεοτρώπων.

Περὶ Ἀχilleΐς.

10

Κεφ. λς.

Ἀχίλλειος, χαλοῦσι πνὺς καὶ
τὴν ἀχίλλειον σιθνεῖ πν, φέρει δὲ
ῥαβδία σπιθαμιᾶ ἢ καὶ μεί-
ζω, ἀτρακτοειδῆ, καὶ ὡς αὐ-
τὰ φυλλάρια λεπτά, ἐν πλα-
γίων ἐντομας ἔχοντα πυκνάς,
πρὸς σφιμερῇ κοίῳ, ὑπόπυρα,
γλίγξα, πολύοσμα, οὐκ ἀνθῆ,
φαρμακώδη δὲ τὴν ὀσμὴν σιτά-
διον ἐπ' ἀκρου περιφέρεις, ἀνθὶ
λευκὰ καὶ χερσίζοντα· φύεται
ἐν ἐρυθείοις τόποις. Καὶ τούτου
ἡ κόμη λεία, ἐν αἵμων ὅτι κολ-
λητικὴ, καὶ ἀφλέγματος, αἰ-
μορράγίας τὲ ἐφεκτικὴ, καὶ τῆς
ἐν μήτρας ἐν πρὸς δέτω. καὶ τὸ
ἀφέλημα δὲ αὐτῆς ὅστιν ἐγχε-
θῆται ῥοϊκαῖς· πίνεται δὲ καὶ
πρὸς δυσεντερίαν.

Περὶ Βάτου. Κεφ. λζ.

Βάτος, ὡς γνώσκομῳ. συ-
φει καὶ ξεραίνει· τέχαις βάρπτε-
το

τὸ δ' ἀφέψμα τῶν ἀκρεμόνων
 αὐτῆς, κοιλίαν ἱσησι πνόμῳ, καὶ
 ῥοῦν ἐπέχει γυναικῶν· καὶ ὡρη-
 σῆρος δὴγματι ἐνδετεῖ. κρατύ-
 νει δὲ καὶ οὐλα καὶ ἄφθας ὑγιάζει
 5 διαμαστόμῳ τὰ φύλλα, καὶ ἐρ-
 πταις ἐπέχει, καὶ ἁχῶρος τὸς ἐν
 κεφαλῇ διεραπύει, καὶ ὀφθαλ-
 μῶν περὶ ὥσεις, καὶ κονδυλώ-
 ματα, καὶ αἰμορροΐδας κατα-
 πλαστόμῳ τὰ φύλλα. καὶ ἐπὶ σο-
 10 μαχικῶν δὲ καὶ καρδιακῶν λεία
 ἐπιπείθει. ἀρμόζει. ὁ δὲ χυλὸς
 αὐτῆς ἐκθλιβέντων τῶν χαλῶν
 καὶ τῶν φύλλων, συσφαεῖς ἐν ἡ-
 λῶ, βύβρον ποιεῖ εἰς πάντα τὰ εἰ-
 ρημῶν. ἢ καὶ περὶ αὐτῆς ὁ χυλὸς
 15 πεπείρευ ὄντος τελείως εἰς τὰ σο-
 ματικὰ ἀρμόζει· ἱσησι δὲ καὶ κοι-
 λίαν ἐδιόμῳ ὁ μέσος πέπειρος,
 καὶ τὸ αἷδος δὲ αὐτῆς ποδὲν συν-
 οῖν, κοιλίαν ἱσησι.

Περὶ Ἰδαίας βάρου.

20 Κεφ. λη.

Βάρου Ἰδαία ἐκλήθη μὲν διὰ
 τὸ πολλὴν εἶναι τῇ ἰδίᾳ χυλῶν.
 ἔστι δὲ ἀπαλωτέρα πολλῶν τῶν
 αὐτῆς, ἀκάνθας μικρὰς ἔχουσα.
 διώεται δὲ τὰ αὐτὰ τῇ περὶ αὐ-
 25 τῆς. ἐκ περὶ αὐτῆς αἷ-
 δος συν μέλιτι λεανθὲν, ὀφθαλ-
 μικαῖς φλεγμοναῖς περὶ χεῖρας
 νον βοηθεῖ, καὶ ἐρσιπέλατα σθέν-
 νισι· σομαχικοῖς τε μετ' ὕδατος
 εἰ ποτὶ δίδεται.

Περὶ Ελ-

decoctum, potu alui sinit, &
 foeminaru profluvia: presteris
 morfu accommodatissimu. Gin-
 guas firmant, & oris vitijs fo-
 lia comanducata medetur, co-
 hibentque illita, vlcera quæ fer-
 punt. Vlcerebus in capite ma-
 natibus, oculisq; procidentibus
 remedio sunt, & codylomatis,
 & hæmorrhoidibus folia illi-
 nuntur. Cardiacis, & stomachi
 doloribus, trita couenieter im-
 ponuntur. Caules cum foliis tun-
 duntur, exprimiturque succus,
 mox sole cogitur, singulari re-
 medio, contra omnia quæ mo-
 do dicta sunt. Mori in rubo na-
 scetis, quam optimè maturi suc-
 cus, ad oris medicamenta coue-
 nit: sistitur alius præmaturi ci-
 bo, nec nõ flore in vino poto.

Rubus Idæus.

Cap. XXXVIII.

Idæus rubus appellatus est,
 quoniã copiosus in Ida proue-
 nit. Est autè lógè tenerior prio-
 re, ac minoribus spinis horres-
 quanquã & sine spinis inuenia-
 tur. Iusuper eadem prestat, quæ
 supradictus. Cæterum flos cum
 melle oculorum collectioni-
 bus commodissimè illinitur, &
 ignem sacrum extinguit: sto-
 machicisque ex aqua biben-
 dus datur,

Hel-

DIOSCORIDIS

Περὶ Ελξίνης. Κεφ. λθ'.

Ελξίνη ἔχει φύλλα ὅμοια κισσῷ, ἐλάτῃνα δὲ, καὶ κλωνία μικρά, περικλεόμενα ὅπου αὐτὸ φύεται δὲ ἐν φραγμοῖς καὶ ἀμπελώσι καὶ σίτω. Διώαμιν δὲ ἔχει τῶν φύλλων ὀχλὺς πινόμενος λυτικὴν κοιλίαν.

Περὶ Ελατίνης. Κεφ. μ'.

Ελατίνη τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὅμοια τῇ ἐλξίνῃ, μικρότερα δὲ καὶ στρογγυλωτέρα, διατέτακται κλώνας λεπτοῖς, σπιδαιμαίοις ἐν ἡσυχίᾳ ἀπὸ τῆς ῥίζης, φύλλων πλήρης σφυγῶν ἐν τῇ γαύσει. φύεται ἐν σίτοις καὶ τόποις ἐρρασίμοις. Διώαμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα καταπλαττόμενα σὺν ἀλφίτοις, φλεγμαίνοντας καὶ ῥευματιζομένους ὠφελεῖν ὀφθαλμοῖς. Ἐψηθεῖσα δὲ καὶ ῥοφουμένη δυσεντερίαν ἰσθισθ.

Περὶ Εὐπατωρείου. Κεφ. μά.

Εὐπάτωρειον πόα ὅτι φρυγανώδης, ῥάβδον ἀναφέρεισά μίαν, λεπτήν, ξυλώδη, ὀρθὴν, μέλαιναν, ἐνδασυν, πηχραίαν ἢ καὶ μείζονα φύλλα δὲ ἐν διασημάτων, ἐχρησμένα μάλιστα πού εἰς ἐμοίρας ἢ καὶ πλείους, τοῖς δὲ πενταφύλλοις ἢ καννάβεως μᾶλλον εἰσκότα, καὶ αὐτὰ δὲ ὑπομέλανα ὀρθοειδῶς ἐξ ἄκρων ἐν τετραμυρία. σπέρμα δὲ περὶ πύκνυν ἀπὸ μέσης τῆς καυλῆς, ὑπόδαυ, καὶ τὸ γεννηκὸς, ὡς καὶ τοῖς ἰματίοις ἐνίχεται ξηρὸν δέν.

Ταύ-

Helxine. Cap. XXXIX.

Helxine cognomēto cissampelos, foliis est hederæ, minoribus: ramulis exilibus, quibus cōplectitur quodcūq; contigerit adminiculū. Nascitur in sepibus, vinetis, & segetibus. Foliorū succus potu deicit aluū,

Elatine. Cap. XL.

Elatine folia habet helxinæ, minora, rotundiora, pilosa: tenuibus & dodrantalibus ramulis, quinis senisve, à radice foliosis, gustu adstringētibus. Nascitur in segetibus & cultis. Oculorū fluxionibus, & inflammationibus auxiliatur, foliis cū polenta tritis, & impositis. Eadem cocta sorbitionis vsu dysenteriam sistit.

Eupatorium. Cap. XLII.

Eupatorium, fruticosa herba est, vnicum efferens caulem, lignosum, nigricantem, rectum, tenuem, hirsutum, cubitalem, interdum ampliorem foliis per intervalla quinquefolij, aut cannabis potius similibus, quinquepartito aut amplius diuisis, nigricantibus, & ipsis per ambitum ferratis: semen medio caule erumpit, pilosum, deorsum spectans, quod siccatū vestibus inhæret,

Con-

Contrita huius folia, & cū fuillo adipe imposita, vlcerib⁹ quę egrę cicatricę trahunt, medentur. Herba & semē in vino potū, dysenteria, iocineris vitiis, & serpentiū ictibus liberat. Nec defunt, qui aberrātes argemonē hanc appellarint, cū tamen longē alia sit, vti exposuimus.

Quinquefolium.

Cap. XLII.

- 10 Quinquefoliū ramulos fert festucarum similitudine, tenues, dodrantes, in quibus semen : folia menthæ, quina singulis pediculis, raro plura, in ambitu ferrata : florem ex
 15 candido pallescentem, auri æmulum. Nascitur in riguis, & aquariis ductibus. Subrubram habet radicem, oblongam, verratro nigro crassiorem. Plurimis pollet remediis. Ius radicis
 20 decoctæ ad tertias, si in ore contineatur, dentium dolores sedat: putrida oris vlcera, colutione sistit: arteriæ scabritias, gargarizatu læuigat: contra alui profluvia, & dysenterias auxiliatur: item articulo-
 25 rum coxendicūmque cruciatis potum. Cocta in aceto, & illita, serpentina vlcera cohibet: strumas, tumores, duritias, abscessus & collectiones discutit ignes

Ταύτης τὰ φύλλα μετὰ ξέστος χοιρείου παλαιοῦ λεία ἐπιτεθῆν-
 τα, τὰ δυσσπούλων τῶν ἐλκῶν
 ἰᾶται. τὸ δὲ σπέρμα καὶ ἡ πόα
 μετ' οἴνου πινόμενα, δυσεντερι-
 κοὺς καὶ ἐρπετοδύκτους ὠφελεῖ.
 ἔνιοι ταύτῃν ἀρτεμισίαν ἐκάλε-
 σαν παλαιότεροι, ἐτέροι γὰρ ὅστιν
 ὡς ὑπεδείξαμεν.

Περὶ Πενταφύλλου.

Κεφ. μβ'.

Πεντάφυλλον κλώνας φέρει καρ-
 φοειδεῖς, λεπτεῖς, σπθαμναίους, ἐφ'
 ὧν ὁ καρπός· φύλλα δ' ἔχει εὐκό-
 τα ἡδυσόμῳ, πέντε καθ' ἑκάστων
 μόχον, σπανίως δὲ πλεονόν, κύκλωθεν
 ἐκρησμένα. πρηνεσδῶς· αἶθος δ'
 ὡς χρολέων, χρυσόδεος. φύε' δ'
 ἐν ἐφύδρσις τόποις καὶ παρ' ὀρε-
 χετοῖς. ρίζαν δ' ἔχει ὑψυθρον, ἐ-
 πιμήκη, παχυτέραν ἐλλεβόρου μέ-
 λανος. ἐστὶ δὲ πολύχρηστος. Δύνα' δ'
 τὸ δὲ ρίζης ἀφέλημα ἄχρι βίτης
 καταβιβασθὲν ἐν τῇ ἐλίσσῃ, ὁδον-
 τολγίας παύειν διακρᾶλέμων ἐν
 τῷ σώματι καὶ σπινθῶνας τὰς ἐν
 τῷ σώματι διακλυζόμενον ἰσῆσι·
 καὶ τραχύτητας ἀρτηρίας ἀναγα-
 γαιζόμενον παραλείπει· κοιλία τε
 ρεοῦσι καὶ δυσεντερίᾳ βοηθεῖ· ἀρ-
 θρῆτικοῖς τε καὶ ἰσχυρικοῖς πιό-
 μων. ἐφθ' δ' ἐν ὅξει λεία κατα-
 πλασσομένη, ἐρπητὸς ἐπὶ χειρὶ δια-
 φορεῖ χοιράδας, σκληρίας, οἰδήμα-
 τα, αἰνυρόματα, ἀποστήματα
 ἐρεσι-

DIOSCORIDIS

ignes sacros, reduuias, condylomata, pforasque fanat. Terneræ radicis succus, contra iocineris, pulmonumq; vitia prodest: item aduersum venena. Cum hydromelite autem, vel diluto vino, & piperis exiguo, bibuntur folia, contra febrium circuitus, in quartana quidem, quaternum ramulorum: in tertiana verò, ternum: in quotidiana, vnus. Ea quoque folia, tricenis pota diebus, comitialibus profunt. Foliorum succus, tribus cyathis aliquot dies potus, celerrimè regio morbo medetur. Illita cum melle & sale, tam vulneribus quàm fistulis remedio sunt: enterocolicis auxilium præstant, Quinquefoliū sanguinis profluvia & potu & illitu sistit. Ad expiationes, castimonias, & incantamenta inciditur.

Phoenix. Cap. XLIII.

Phoenix folia habet hordei, sed breuiora, & angustiora, spicam lolio similem: calamos digitorum senum, radici aduolutos: septenas octonasve spicas. In aruistectisque recen-ter illitis nascitur. Harum viriū compos, vt in vino austero pota, alui profluium, & emanantem vulua sanguiné sistat, vrinæ

ἐρεσιπέλατα, πηρύμα τὰ ἐν δακτύλῳ, καὶ κονδυλώματα καὶ ψώρας ἰᾶται. ὁ δὲ χυλὸς τῆς ῥίζης ἀπαλῆς, ποιεῖ πρὸς τὰ ἐν ἡπατι καὶ πνεύμονι πάθη καὶ τὰ θανάσιμα. τὰ δὲ φύλλα πίνονται, καὶ μετ' ὑδρομέλιτος ἢ οἴνου κεκρανίου καὶ πεπέρως ὀλίγου πρὸς πενιόδους, ἐπὶ μὲν τοι τεταρταίου, τεσσαρῶν κλωναρίων φύλλα, ἐπὶ δὲ τριταίου τριῶν, ἐπὶ δὲ ἐφημερινοῦ ἐνός. ἀρήγει δὲ καὶ ἐπιληψίας πινόμενα ἐφ' ἡμέρας λ'. ὑμᾶζει δὲ καὶ ἱκτερινταχέως ὁ χυλὸς τῶν φύλλων ποθείς ἐπὶ πηγῆς ἡμέρας τριῶν κωάδων παλῆδος. τεταύματό τε καὶ σύειγας μετ' ἁλῶν καὶ μέλιτος καταπακκῆθόμενα ἰᾶται. βοηθεῖ δὲ καὶ ἐντέρων κληκῶς, καὶ αἱμορραγίας ἴσησι πινόμενον καὶ καταπλασόμενον. τέτυγται δὲ καὶ πρὸς καρδιαμοῖς καὶ αἱμορραγίας καὶ ἀγρίας. 10

Πεὶ Φοίνικος. Κεφ. μγ'. Φοίνιξ, οἱ δὲ ῥοῦν, οἱ δὲ ἀρχινῶπα, τὰ μὲν φύλλα ἔχει ὁμοίαν κρηθῇ, βραχύτερα δὲ καὶ στενότερα, σάχυν δὲ ἐμφερῆ τῇ αἰθακλῶνας δὲ ἐξ αδακτύλης κύκλῳ τῆς ῥίζης καὶ σάχυν ζ'. ἡ φύεται δὲ ἐν ἀεθύραις, καὶ ἐπὶ τῶν τεχνῶν τῶν νεοκταχρίων. Διώαμιν δὲ ἔχει πινόμνον ἐν οἴνῳ αὐστηρῷ, διὰ ῥοίαν καὶ αἱμορραγίαν τὴν ἐκ μήτρας καὶ 25

ἡ οὐρανὸν πλείονα φορὰν ἰσάν. ἰσο-
εσῶσι δὲ πνεῖς ἡ ἰχθυοὶ ἀντὶ τὸ
εἶναι ἐνδεσμοῦ μὲν ἡ φοινικῶν ἐ-
εἶω ἡ περικυρῶν.

Περὶ Ἰδαίας ρίζης. Κεφ. μδ'.

Ἰδαία ρίζα, ὅξυ μυρσίνη τὰ φύλ-
λα ἔοικε παρ' αὐτὰ δὲ ὡς ἑλικες
μικραὶ πεφύκασιν, ἐξ ὧν ἡ τὸ ἀν-
δρος. ταύτης ἡ ρίζα συπικνὸς σφό-
δρα, ἀρμόζουσα ἐφ' ὧν σύψευος ἐστὶ
ῥεῖα. πίνεται ἡ ἡ πρὸς κοιλίας
10 ῥεύματα ἡ ῥοῦν γυναικείον· αἰ-
μορράγιαν τε πάσαν ἰσησι.

Περὶ Ροδίας ρίζης.

Κεφ. μέ.

Ροδία ρίζα ῥιζοῦται ἐν μακε-
δονίᾳ, ἔοικε ἡ κόρυς, κουφοτέρα δὲ
15 ἡ ἀνώμαλος ῥόδων ἐν τῇ διαβί-
ψει ἀποφορὰν ποιεῖται ὁμοίαν· ῥη-
σιμεύει ἡ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν γυναι-
κῶν συνῶν ῥόδων ὀλίγω λεπτὴ ἐπι-
πτεμεμένη ἡ ἐμβρεχομένη μετώ-
πῳ ἡ κροτάφοις.

20 Περὶ Ἰστωπύριδος. Κεφ. μς'.

Ἰστωπυρίς φύεται ἐν τόποις ἐ-
φύδρσις ἡ τάφροις· καυλὸς ἔχει
κενὰ, ὑπερθερὰ ὑποβάρη, στερεὰ,
ῥόνασι διειλημμένα, ἐμπεφυκό-
σιν εἰς ἄλληλα, περὶ δὲ αὐτὰ γρι-
25 νώδη φύλλα πυκνὰ, λεπτά. αὐξέ-
ται δὲ εἰς ὕψος ἀναβάνουσα ἐπὶ
τὰ παρακείμενα στελέχη ἡ κατὰ
κρημνῶν περικυρῶν κόμαις
πολλαῖς μελαιναῖς καὶ δάσπερ ἰσ-
του οὐρά. ρίζα ξυλώδης, σκληρά.

Στυπτική

vrinæ impetus infrænēt. Sunt
qui adalligatā in puniceo vel-
lere & suspensam, sanguinem
supprimere prodant.

Idæa radix. Cap. XLIII.

Idææ radici folia sunt ea
quæ rusco: circum ea veluti
exigui capreoli sunt, in quibus
flos. Radix spissandi naturam
habet, his conueniens quibus
adstrictione opus est. Pota,
citam aluum: mensesque, &
omnem abundantiam sangui-
nis sistit.

Rhodia radix.

Cap. XLV.

Gignitur Rhodia radix in Ma-
cedonia, costo similis, leuior,
inequabilis: quæ contrita rosas
redolet. Vtilissima capitis do-
loribus, si madefacta fronti &
temporibus cum rosacei mo-
mento imponatur.

Equisetum. Cap. XLVI.

Equisetum in riguis & scro-
bibus nascitur: cauliculi pro-
deunt inanes, geniculati, in
se farcti, rubescences, leniter
scabri, duri, & iunceæ circa
eos folia, crebra, exilia. In su-
blime attollitur, vicinos ar-
borum caudices scandens, ob-
uolutumque dependet, co-
mis multis, nigris, vt equo-
rum cauda: radix lignosa dura.

Vis

DIOSCORIDIS

Vis herbæ spissare : quare sanguinè naribus erumpenté fucus ipse sistit:prodest dysentericis in vino potus: vrinam cit. Sanguinolenta vulnera glutinantur tritis foliis, & illitis. Radix cū sua herba tussim, orthopnoeam, ruptaque adiuuat. Folis in aqua potis, dissectiones vesicæ & intestinorum, enterocelæq; in vnum coalescere, cogiq; feruntur.

Equisetum alterum.

Cap. XLVII.

Alterū equisetum caulis est rectus, æqualis, cubito maior, inanis: comisper interualla breuioribus, cādidioribus, & mollioribus. Id cum aceto tritum vulneribus remedio est, eadēque fungitur facultate.

Coccum infectorium.

Cap. XLVIII.

Coccū quo infectores vtuntur, frutex est furculosus, paruius, cui grana ceu lētes adhærēt, quæ electa cōgerūtur. Optimum gignitur in Galatia, & Armenia, deinde Asia, & Cilicia: vltimū ex omnibus Hispanicū. Vis huic spissandi · vulneribus, neruisq; præcisis, cōueniēter ex aceto tritum illinitur. Nascitur quoq; in Cilicia, è quercubus, cochlearū exiliū similitudine, quod

Στυπτική δὲ ἢ πῶς ὄθεν ὁ χυλὸς αὐτῆς αἰμορραγίας ἴσῃσι τὰς ἐκ μυκτήρων καὶ δυσεντερίας ὥφρ' εἰ πινόμενος μετ' οἴνου· κινεῖ δὲ οὖρα· τὰ δὲ φύλλα ἔναιμα τραύματα κολλᾷ· λεία ἐπιπλάσσομενα· ἢ δὲ ῥίζα καὶ ἡ πῶς βήσοσι τε καὶ ὀρθοπνοικοῖς καὶ ῥιγμιατίαις ἀρήγει· ἰσορεῖται δὲ καὶ ἐντέρου διαρροαῖς καὶ κίστεως διακοπὴν, καὶ ἐν τεροκήλει συνάγειν τὰ φύλλα πινόμενα ἐν ὕδατι.

10

Περὶ Ἐτέρας ἰσχυροῦς.

δός. κεφ. μζ'.

Ἰσχυροὺς ἐτέρας κόμας ἐκ διασημάτων ἐχούσα βραχυτέραι καὶ λευκότεραι καὶ μαλακότεραι· ἢ τις καὶ αὐτὴ λεανθεῖσα συνὶ ὄξει τραύματα ἰᾷται τὴν αὐτὴν ἐχούσα δυνάμιν.

Περὶ Κόκκου βαφικῆς.

κεφ. μη'.

Κόκκος βαφικὴ δάμνος ὅτι μικρὸς φρυγανώδης ὥς πρὸς κεν- 20 ται οἱ κόκκοι ὡς φακοὶ, οἱ πνεῖ ἐκλερόμενοι συνήθιζενται. αἰεσι δὲ ὅστις ἢ γαλαπιατικὴ καὶ ἢ ἀρμενριακὴ, ἑπεντα ἢ ἐν ἀσίᾳ καὶ ἢ κιλίκειος· ἐχάτη δὲ πασῶν ἢ ἐν ἰαπωνίᾳ. δυνάμιν δὲ εἰς ἔχει στυπτικὴν· ἀρμόζουσαν τραύμασι καὶ νεύρων τρώσεσι, λεία μετὰ ὄξους καταπλασσομένη· γίνεται δὲ ἢ ἐν κιλίκῳ ἐν τοῖς δρισὶν ὁμοίως κοχλῆα μικρῶ, ἐν

ὡς αἱ τῆςδε γυναικες τὸ σῶμα-
τι αὐτῶν γίνονται κόκκον χαλοῦσιν.

Περὶ Τραγίου. Κεφ. μθ'.

Τράγιον φύεται μὲν ἐν κρήτη
μόνη, ἔχει δὲ τὰ φύλλα ῥῖνον ὅ-
μοια, καὶ τὰς ῥάβδους καὶ τὸν καρ-
πὸν, μικρότερον δὲ πάντα, φέρει
δὲ ὅπῃν κόμμιει παρὰ πλῆστον.

Ταύτης τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς καὶ
τὸ δάκρυον χαλὰ πλάσσειν μύρα σὺν
οἴνῳ, ἐπιπᾶσται σκολοπας καὶ πᾶν
10 τα τὰ ἐμπηγνύμυρα. πινόμενα
δὲ στραγγουεῖαν ἰᾶται. καὶ λί-
θους τοὺς ἐν κύσει θρύπτει, καὶ
καταμύωια ἄγει. λαμβάνεται
δὲ ἑλκὸν < α. φασι δὲ καὶ τὰς
ἀγρίας αἴγας τοξευδεῖους καὶ νε-
15 μιδείους πλὴν πᾶν, ἐκβάλλειν
τὰς αἰσίδας.

Περὶ ἄλλου τραγίου.

Κεφ. ν'.

Τράγιον ἄλλο τὰ μὲν φύλλα
ἔχει ὅμοια σκολοπενδρίῳ, ῥίζαν
20 δὲ λεπτήν, λευκὴν, παρὰ πλῆ-
στον ῥαφανῶ ἀγεία. Ἡ τις βοή-
θει δι' οὐρανὸν καὶ ἐν μήτε καὶ
ἐφ' ἣν ἐδιδόμην. πρὸς βάλλει δὲ καὶ
τὰ τὸ φθινόπωρον τὰ φύλλα
τραγίου ἐσμίλῃ. ὅθεν καὶ ὀνόμα-
25 σται τραγίου.

Περὶ Τράγου Κεφ. νά.

Τράγος, οἱ δὲ σκορπίον, οἱ δὲ
ῥάγανος φύει παρὰ θάλαττην μά-
λισα, δαυμάσιος ἐπὶ γῆς, ἐπιμή-
κος, ὁ μέγας, ὅσον ἀσθαμῆς ἢ μεί-
ζον,

quod illius regionis mulieres
ore legunt, & coccū vocitant.

Tragium. Cap. XLIX.

Tragiū nascitur in Creta tan-
tū insula, lētisco semine, folio,
& ramis simile, singulis tamen
minorib⁹, succus ei lacteus, gū-
mi non dissimilis. Semen, folia,
lachrymāq;, illitu spicula è cor-
pore eiiciunt: omnia quoque
corpori impacta, euocant: po-
ta stranguriæ medentur, calcu-
los vesicæ frangunt, menses tra-
hūt. Modus in sumptione est,
drachma vna. Fama est sylue-
stres capras sagittis confossas,
eius herbæ pabulo spicula ex-
cutere.

Tragium alterum.

Cap. L.

Est & alterum tragium, quod
tragoceros aliqui vocant, fo-
lia scolopendrij habet, & radi-
cem sylvestris raphani, tenuē,
candidam: quam crudam vel
coctam esse dysentericis pro-
dest. Folia autumno, hirci vi-
rus olent: exinde sibi tragij no-
men adoptauit. Prouenit in
montibus, & præcipitiis.

Tragium. Cap. LI.

Est etiā herba tragos, quā al-
qui scorpiō aut traganō vocāt
maximē in maritimis nascens,
palmum alta aut amplior, fru-
D tiosa,

DIOSCORIDIS

ticosa, humilis, oblonga, sine foliis, pusillis circa ramos acinis, rufis, multis, magnitudine tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente. Racemorum acini decem ex vino poti, coeliacis, & foeminis fluxione vuluæ laborantibus, auxiliantur. Tunduntur à plerisque, & in pastillos digesti asferuantur, quibus vtuntur cum opus est.

Iuncus. Cap. LII.

Iunci duo genera: vnū læuis nominati, alterum acuti, qui in mucronem fastigiatur. Cuius etiam duo assignantur genera: vnū sterile, reliquum fert semē nigrū, rotudū, & crassiore constat calamo, carnosiorq; . Tertius est iuncus qui vocatur oloscoenos, priorib⁹ carnosior, asperiorq; , is similem supradicto fructum in cacumine parit. Semen vtriusque tostum, ex diluto vino potū, fistit aluum, & rubra foeminarum profluvia: vrinam cit, capitisque dolores facit. Quæ proxima sunt radici folia tenera, conuenienter illinuntur, aduersus phalangiorum morsus. Æthiopici iunci semine somnus allicitur: sed modus in potione feruandus est, ne sopor fiat.

Lichen.

ζων, φύλλα δὲ οὐκ ἔχει, ἐπὶ δὲ τῶν κλάδων πρὸς κεντα οἰογὰ ῥάγες μικραὶ, πυρραὶ, κατὰ μέγεθος πυρρῷ, ὀξείαι ἐπ' ἄκρου, πολλαὶ λίαν γευσιμῶν συμπι-
κταί. τούτου ὁ καρπὸς ὡς ῥάγες, δέκα (ὡὸ οἶνον ποδεῖσαι, κοιλια-
κοὺς ὅ καὶ ῥοιχὰς γυναικας ὠφε-
λοῦσιν. ἐγιοι ὅ καὶ κόπτοντες αὐ-
τὸν, ἀναπλάθουσι τροχίσκοις εἰς ἀπόδεσιν καὶ οὕτω χρώνται.

Περὶ Σχίνου. Κεφ. ιβ'. ¹⁰

Σχίνος τούτου διὸν εἶδος. τὸ μὲν τοι αὐτὲ καλεῖται σχίνος λείος, τὸ δὲ, ὀξύσχιος ἀποξίς ἐπ' ἄκρου, διὸν ὅ καὶ ταύτης εἶδος· ἢ μὲν ὅδ' ἄκαρπος, ἢ ὅ, καρπὸν μέλανα ἔχει-
τες περὶ φερῇ, παχύτεροι δὲ ταύτης οἱ κλάμοι, καὶ σαρκωδέτεροι. Ἐστὶ δὲ καὶ τέτλη πολλῶν σαρκω-
δέσερα καὶ τραχυτέρα τοῖν δυοῖν, ὀλόσχινος λευκομύκης καὶ δὲ καὶ αὐ-
τὴν καρπὸν ἐπ' ἄκρου ὁμοίον τῷ ²⁰ πρὸς αὐτῆς. Ἀμφοτέρων δὲ ὁ καρ-
πὸς φρυγίς καὶ πινόμενος μὲν κρά-
ματος, κοιλίαν καὶ ῥοιῶν ἐρυθρὸν ἰ-
σησι, καὶ ἔρα κινεῖ· ἐστὶ ὅ καὶ κεφθαλ-
γός. τὰ δὲ πρὸς τῷ ῥίζαν ἀπα-
κὰ φύλλα καταπλασθὲν ὀμύρα, ²⁵ θα-
λασσιόδηκτοις ἀρμόζει. Ἡ δὲ αἰ-
διοπικὴ σχίνος, ὑπνωτικὸν ἔχει τὸν
καρπὸν· φυλλάθεται δὲ δεῖ αὐ-
τῷ ἐν ταῖς πίσεσι τὸ πάλιν εἶδος, κα-
ρὸν γὰρ λίαν.

Περὶ Λει-

Περὶ Λειχῶος. Κεφ. νγ'.

Λειχῶ, ὃ ἐπὶ τῶν πετρῶν, οἱ δὲ βρύον καλοῦσι, βρύον ὅτι περσέχρῳρον ταῖς ἐνδρόσοις πέτραις. τοῦτο καταπλαδὲν αἰμορραγίας ἴσῃσι, καὶ φλεγμοναῖς παρσιτεῖται, καὶ λειχῶας θεραπεύει· ὠφελεῖ δὲ καὶ ἰκτερικοῖς μὲνιτος· διαχρῆσθον· σόματος δὲ καὶ τῆς γλώττης ρευματισμοῖς παρσιτεῖται.

10 Περὶ Παρωνυχίας. Κεφ. νδ'.

Παρωνυχία φύεται ἐν πέτραις θαμνίσκιον ὁμοιον πέπλω, τῷ δὲ μήκει ἑλαττον, τοῖς δὲ φύλλοις μείζον. ὅπερ καταπλαδὲν λεῖον ὅλον παρωνυχίας καὶ κηρία θεραπεύει.

Περὶ Χρυσόκομης. Κεφ. νε'.

Χρυσόκομη ῥαβδίον ὅτι σπιθαμαῖον· ἔχον κόμην κορυμβοειδῆ, ὁμοίαν ὑπό τῷ ῥίζαν διασειαν, λεπτήν, ὡς ἐλλαβόρε μέλανος· γευσάμεν δὲ ἀπὸ τῆς κυπέρου ἴσῃν ἔσαν, ἐν τῷ γλυκεῖ ὑπαύσηρον· φύεται ἐν παλίσκίοις καὶ πετρῶδεσι. Δύναμις δὲ ἔχει θερμαστικὴν καὶ συπτικὴν ἢ ῥίζα· ἡπατικοῖς καὶ πνευμονικοῖς ἀρμόζουσιν· λαμβάνεται δὲ καὶ συν ὑδρὸς μέλιτι ἐφθὴ πρὸς χυδαρσιν ὑστέρας.

Περὶ Χρυσόγονου. Κεφ. νς'.

Χρυσόγονον φύλλα ἔχει ὁμοία δρυῖ, ὃ δὲ θάμνος ὅτι πυκνὸς· αὐτὸς δὲ παρσιτρίσιον τῷ σεφανώματι·

Lichen. Cap. LIII.

Lichen, qui saxis est familiaris, aliquibus bryon appellatur: asperginosis petris adhæret, ut muscus. Is illitus sanguinis profluvia sistit, inflammationes arcet, impetigini medetur. Iuuat regio morbo correptos, cum melle illitus: oris & linguæ defluxiones inhihet.

Paronychia.

Cap. LIII.

Paronychia exiguus frutex, in petris nascens, peplo similis, minor longitudine, maioribus foliis. Illita paronychiis atque duritiis, remedio est.

Chrysocome.

Cap. LV.

Chrysocome palmi altitudine fruticat: coma specie corymborū, hyssopo similis: radice hirsuta, veratri nigri modo, tenui, cyperum æquante: gustu non iniucundo, ex dulci austero: in petrosis opacisque nascitur. Radix calfacit, & adstringit: his conueniens, quos iecur aut pulmonis inflammationes vuluæ, decocta cum hydromelite assumitur.

Chrysogonum. Cap. LVI.

Chrysogonū dense fruticat, quernis foliis: flore coronarij

D ij Ver:

DIOSCORIDIS

verbasci: radi: vt rapum extuberat, intus ruberrima, foris nigra. Quæ trita cum aceto, atq; imposita, muris aranei moribus auxiliatur.

Elichrysum. Cap. LVII.

Elichryson quidam chrysanthemon, nonnulli & id amaranton vocant, quo deorū simulacra coronant: ramulū habet candidum, virentem, rectum, firmum: folia intercedentibus spatiis angusta, abrotono similia: comam aureæ lucis in orbem, vmbella rotunda veluti ficcis corymbis dependentibus, radice tenui: nascitur in asperis, & torrentiū alueis. Contra serpentium ictus, coxendicū dolores, vrinæ stillicidia, ruptaque, coma è vino pota opitulatur: ciet menses. Sanguine concretū ventris ac vesicæ absumit, pota cum mulso: ieiunis, triū obolorū pōdere, fistit de stillationes, data in vino albo diluto: vestibus inferitur, vt eas ab erodentiū iniuriis tueatur.

Chrysanthemum.

Cap. LVIII.

Chrysāthemū aut caltha, nonnullis buphthalmos: herba est tenera, fruticosa, leues proferēs caules, & multifida folia: flores supra modū splēdentes, luteos, orbem

μαπκῶ φλόμα. ρίζαν ὁμοίαν γογύλη, ἐνδοθεν ἰσχυρῶς ἐρυθραν, ἐξωθεν δὲ μέλαιναν. ἢ τις βοηθεῖ σὺν ὄξει λεανθεῖσα καὶ ἐπιτεθεῖσα μυγαλῆς δήγμασιν.

Περὶ Ελὶχρύσου. Κεφ. νζ. 5

Ελίχρυσον, οἱ δὲ χρυσανθέμον, οἱ δὲ, καὶ τοῦτο ἀμάραντον καλοῦσιν, ὃ καὶ τὰ εἶδωλα σεφανοῦσι· ῥαβδίον λευκόν, χλωρὸν, ὀρθόν, στερόν· φύλλα στενὰ, ἐν διασημάτων ἔχον πρὸς τὰ 10 τοῦ ἀβροτόνου· κόμην, κυκλωτέην, χρυσοφανή, σπιάδιον περὶ φέρει, ὥς περ κορύμβοις ἐρηγὲς, ρίζαν λεπτήν· φύεται δὲ ἐν τραχέσι καὶ χαραδρῶδεσι τοπίοις. Βοηθεῖ δὲ ἡ κόμη σὺν οἷ- 15 νῳ ποθεῖσα, δυσουρίας καὶ ἐρπετῶν δήγμασι, καὶ ἰσχύσι καὶ ῥήγμασι· καὶ ἐμμίσιν ἀγει. καὶ θρόμβοις αἵματος τὸς ἐν κίσει ἢ κοιλίᾳ τήκει (ὡν οἰνομέντι πινομένη· ἔχει δὲ καὶ κατάρρου 20 ὅσον τριώβολον γήσει δοθεῖσα ἐν κράματι οἴνου λευκοῦ· σιωπιδεται δὲ καὶ μετὰ ἱματίων ἀβρωτα τηρούσα αὐτά.

Περὶ χρυσανθέμου.

Κεφ. νη. 25

Χρυσανθέμον, ἢ χαλκὰς, οἱ δὲ βούφθαλμον· τευφερεῖ τις πῶς, θαμνοειδὲς δὲ, λείους ἀναφύρουσα ἱανλοὺς ἢ φύλλα πολυχιδῆ· αἴδη μίλιν, ἰσχυρῶς σίλβοντα,

ἢ ὀφθαλμῶν κυκλοτερῆ, διὸ καὶ
 ἕως ὀνόμασαι· φύεται δὲ τὰς
 πόλεις· οἱ χαμηλοὶ δ' αὐτῆ λαχα-
 νεύονται. Τὰ δ' αὖθι λέϊα μὲν κη-
 ρωτῆς, σεαυμάτα λέγεται δια-
 5 φρεῖν· ἱκτερικοὺς δὲ περὶ σκαίρων
 εὐχρεῖν ποιεῖ πεδεῖσα μετὰ τὴν
 ἐν τοῖς λουτροῖς ἀπὸ τῆς μακρᾶς
 διατεικῆς ἔξοδον.

Περὶ Ἀγέρου. Κεφ. νθ'.

Ἀγέρον δάμνος ἔστι φρυγα-
 10 γῶδης, σπιδάμωδης, ταπεινός, ἀ-
 πλοῦς, ἐμφερὲς μάλιστα ὀριγάνω·
 σκιάδιον ἔχων, ἐφ' οὗ αἶθος πομ-
 πολυγῶδες, χυσοειδές, ἐλαττον
 ἐλαχρύσου. ὀνόμασαι δὲ ἀγέ-
 15 τον, διὰ τὸ ὀπιπολὺ τὸ αἶθος ὀ-
 μοιοειδές φυλλάττειν. Διῶα-
 μιν δὲ ἔχει τὸ ἀφέψημα αὐτοῦ·
 πυρωπικὴν· ἢ αὐτὴ ἢ πόα ὑπο-
 θυμιωμένη ἔρα ἀγειν, καὶ τὰ πι-
 εῖ ὑσέραν μαλάττειν.

Περὶ Πειριστεριῶνος.

20 Κεφ. ξ'.

Πειριστεριὼν φύεται ἐν ἐνυδρίοις
 τόποις. Δοκεῖ δὲ ὀνομάσθαι ἐν τῇ
 τὰς περιστερᾶς ἡδέως διατεῖβειν
 ἐν αὐτῇ· πόα δὲ ἔστι σπιδάμνην ἔ-
 25 χουσα τὸ ὕψος, ἢ καὶ μέζον, πέτα-
 λα ἐντέλει μηδὲν ἀνέλευκα, ἐν πε-
 ρυκότα ἐκ τῆ χαμηλῆς μονόκλωνος
 ὡς τοπολὺ καὶ μονόρριζος εὐρίσκα-
 30 ται. Δοκεῖ τε τὰ φύλλα σύν ῥο-
 δίνῳ ἢ σέαπχοιρεῖω νεαρῷ προσ-
 θέτωμα, ἀνωδυνίαν ὑσέρας ποιεῖν.

τέλλει

orbé oculi imitantes, unde bu-
 phthalmi nomé traxit: propter
 oppida nascitur. Cuius caules
 oleris vice manduntur. Flores
 cū cerato triti, steatomata dif-
 cutere produntur: regio mor-
 bo correptis, coloré breui red-
 dunt, si sequente longo balnei
 vsu, post exitum ebibantur.

Ageratum. Cap. LIX.

Ageraton fruticosa herba
 est, palmari longitudine assur-
 gens, simplex, humilis, origa-
 no maximè similis: umbellam
 gerit, in qua flos bullis aureis
 emicat, elichryso minor. No-
 men ei inditum est, quoniam
 diutissimè flos in sua coloris
 specie conseruetur. Vis deco-
 cti feruens: huius vstæ nidor
 vrinam cit, & vuluæ duritias
 emollit.

Verbenaca. Cap. LX.

Peristerion, siue verbenaca
 nascit in aquosis. Nomé ex eo
 duxisse videtur, q̃ colúbæ cir-
 ca hāc perquàm libéter versari
 soleant. Dodrantis altitudine,
 & interdum amplius adolescit:
 folia è caule prodeūt incisa, &
 subalbida: ea singulari ramo,
 radicēq; sola, cōstare sepius in-
 uenitur. Folia cum suilla adipe
 recenti, aut rosaceo imposita,
 vuluarū dolores finire putatur:

D iij ignem

DIOSCORIDIS

ignem sacrum illita ex aceto reprimunt: putrida vlcera cohibent: vulnera glutinant: veteraque ex melle, ad cicatricem perducunt.

Sacra herba. Cap. LXL.

Sacra herba, quæ & peristereon nominatur, ramulos emit tit cubitales, aut maiusculos, angulosos, in quibus ex interual- lis folia querc^o, sed minora angustioraq; eisdem diuisuris in ambitu, colore aliquatenus ce- ffo: radix longa, tenuis: flores purpurei, graciles. Folia cū ra- dice in vino pota, illitave, ad- uersus serpētes pollent: eadem drachmæ pōdere cū thuris o- bolis tribus, in vini veteris he- mina, quadragenis diebus, ieiū no ore, cōtra regiū morbū bi- būtur: veteres tumores & inflā mationes mitigāt: fordida vlce- ra purgāt. Tota in vino deco- cta, tonsillarū crustas abrum- pit: oris nomas gargarizatu co- hibet. Aiunt, si aqua spargatur tricliniū, qua maduerit, lætio- res cōuictus fieri. Datur potā- dum in tertianis febribus, ter- tium à terra geniculū, cum fo- liis circumdantibus: quartanis, quartū. Sacra vocant herbam, quoniam multum ad amuleta, expiationesq; commendetur.

Astra-

τέλλει δὲ καὶ ἐρισπέλαια συν- ὄξει κατὰ πλάθεισα, καὶ σιπι- δόνας ἐπὶ χει. καὶ τραύματα κο- λᾷ, καὶ ἀπουλοῖ τὰ παλαιὰ συνὺ μέλιτι.

*Πρὶ Ἱεραῶ βοτάνης. Κεφ. ξα. 5

Ἱεραῶ βοτάνη, οἱ δὲ περὶ τρεῖς ὄντα ἐκάλεισαν, ῥάβδος ἀνίσι πηχυαί- οισ ἢ καὶ μέζοντας γωνιοφθεῖς, περὶ αἷ τὰ φύλλα ἐν διασημάτων ἐοι- κότα δρυϊ, πλὴν σενώτερα καὶ ἥπι- να, ἐν τετμημένῳ δὲ τῷ κύκλῳ, ὡ- 10 πόγλου καὶ ῥίζαν δὲ ὑπομήκη, λε- πτὴν ἀπὸ πορυγὰ, λεπτή. Ταύ- της τὰ φύλλα καὶ ῥίζα ποτιζόμε- να μελὶ οἶνε καὶ καταπλασθέντα, ποιεῖ πρὸς ἐρπετά· πρὸς δὲ ἵκτερον τὰ φύλλα ὅσων ὀλκὴν μελὶ λίσαις 15 νωτὲς τειρωδὸς, σὺν οἶνου παλαιῆ κατὰ λη μᾶ νῆσει ἐφ' ἡμέρας μί- πινόμενα· οἱ δὲ ῥάβδος τὴν χεῖρα καὶ φλεγμασὰς καταπλασθέντα, περὶ νει· καὶ ῥυπαρὰ ἔλκη καθαίρει. Ἐ- 20 δείσα δὲ ὅλην σὺν οἶνῳ, ἐσχάρας τὰς ἐν παειδμήοις. περὶ ῥήπει καὶ νο- μάς τὰς ἐν σώματι ἀναγκαρι- ζομένη ἐφίστησι. ῥανόμενον τε ἐν συμποσίοις τὸ ἀπόθερμα, ἐν δια- γωνιότοις ἰσορεῖ· ποιεῖν δὲ δὲ 25 δὲ τειταλίζουσι πρὶν τὸ τέτον γό- νυ ἀπὸ τῆ γῆς συνὺ τοῖς περικυμέ- νοις φύλλοις· περὶ ταύτοις δὲ τὸ τέτατον. καλοῦσι δὲ αὐτοὶ Ἱεραῶ βοτάνην διὰ τὸ εὐχεσθαι ἐν τοῖς καθαρμοῖς εἶναι εἰς πελάγματα.

Περὶ

Πρὶ Ἀσραγάλῃ. Κεφ. ξβʹ.

Ἀσράγαλος θαμνίσκος ἐστὶ μὲν
κρὺς ἐπὶ γῆς, φύλλοις καὶ κλωνίοις
ὁμοίως ἐρεβίνθου· αἶθρι πορφυρὰ,
μικρά ρίζα ἣ ὑπεστὶ στρογγύλη ὡς
ἡ ῥάβδανος ἐν μεγέθει, παραφυά-
δας ἔχουσα στερεάς, μεζαίνας, σκλη-
ροτέρας ὡς κέρατα αὐτῆς πεπλεγ-
μῶδες διήλκας, γευσάμενός τε συγ-
κρῆς. φύεται δὲ ἐν ἐνανέμοις καὶ
συσκήοις καὶ χονιζομένοις τόποις.
πολλὴ δὲ ἐν μέμφιδι τῆς ἀρχα-
δίας. Ἰσησι δὲ κοιλίαν ρευματι-
ζομένην ἐν οἴνῳ ποδεῖται ἢ ρίζαν·
κινεῖ τε καὶ ἔρα· ποιεῖ καὶ πρὸς πα-
λαιὰ ἔλκη ξηρὰ ἐπιπασσόμεν· καὶ
αἷμα ἵκει· κόπτεται δὲ δυσχερῶς
διὰ τὸ στερεὸν αὐτῆς.

Περὶ Τακίνθου.

Κεφ. ξγʹ.

Τάκινθος φύλλα ἔχει ὁμοίαν
βολβῶ· χαμλὸν σπιδαμαῖον,
λεῖον, λεπτότερον τοῦ μικροῦ θα-
κύνου, χλωρὸν· κόμην ἐπι-
κειμένην κυρτὴν αἶθροις πλήρη
πορφυρείδους· ρίζαν καὶ αὐτὴν
ἐμφορῇ βολβῶ. Ἡ τις συνὶ οἴνῳ
καταπλαθεῖσα λευκῇ ἐπὶ παί-
δων, ἀνήβοις τηρεῖν πέπισνται·
ἴσησι δὲ καὶ κοιλίαν, καὶ οὖρα ἄγει
ποδεῖσαι, καὶ φθλαγγισθῆναι ὡς
φελεί. ὁ χερσὶ δὲ συμπλεκώτερος
ὢν, καὶ αὐτὸς, θηριακοῖς ἀρμό-
ζει· ἵκετόν τε ἀποκαθαίρει συνὶ
οἴνῳ πινόμενος.

Περὶ

Asragalus. Cap. LXII.

Asragalus, parvus à terra fru-
tex, foliis & ramis ciceri similis:
flore purpureo, paruo: radice
rotunda, raphani modo gran-
di, quæ adnatas appendices
firmas habet, nigras, prædu-
ras, veluti cornua inter se im-
plicatas, gustu adstringentes.
nascitur in ventosis, opacis, &
in niualibus: ea Memphis Ar-
cadix scatet. Aluum sistit ra-
dix in vino pota: vrinam mo-
uet: vetustis vlceribus, sicca
efficaciter inspargitur: san-
guinem supprimit: ægrè
propter duritiam
tunditur.

Hyacinthus. Cap. LXIII.

Hyacinthus folia habet bul-
bi: dodrantalem caulem, læ-
uem, minimo digito tenuio-
rem, herbacei coloris: comam
procumbentem, florum pur-
pureorum plenam, incuruam:
radicem quoque bulbaceam.
Quæ, vt creditur, pueris cum
vino albo illita, pubertatē coër-
cet, & non patitur erumpere:
sistit aluum pota & vrinam im-
pellit, phalangiorumque mor-
fibus auxiliatur. Semen adstrin-
gentius est, theriacis expetitū:
regium morbū emendat, cum
vino potum.

Di iij. Papa.

DIOSCORIDIS

Papauer erraticum.

Cap. LXIIII.

Papauer erraticum, quod rhœada vocant, vere quidem in aruis cum hordeo nascitur, flore protinus deciduo, vnde & nomen apud Græcos accepit. Folia erucæ, aut origano; aut cichorio, aut thymo similia spectantur, sed lōgiora, diuisa, scabra: iūceus ei caulis, rectus, cubitalis, asper: flos syluestris anemones, puniceus, interdum albus: oblōgū caput, sed quā anemones minus: semē rufum: radix longa, subalbida, minoris digiti crassitudine, gustu amara. Huius capita quinq; aut sex, in vini cyathis tribus ad dimidias decocta, potui dabis, quibus somnus accersendus est. Semina acetabuli mēsurā ex aqua mulsa pota, aluum leniter emolliunt: ad idem præstandū mellitis placentulis. & dulcariis libis admiscuntur. Folia cū calycibus illita, inflammationes sanant: eorundem fotu & perfusione, somnus allicitur.

Papauer fatium.

Cap. LXV.

E fatiui papaueris genere, quod hortense est, semen in pānem densatur, qui sanis in vsu fit: eo etiā ex melle pro sesama vtuntur:

Περὶ Μήκωνος ροιᾶς.

Κεφ. ξδ'.

Μήκων ροιᾶς, ὀνόμασται ἡ διὰ τὸ ταχέως τὸ αἶθος ἀποβάλλειν, φύεται ἐν ἀρεύραις ἔαρος, ὅτε καὶ συλλέγεται. ἔοικε δὲ τὰ φύλλα δειγάνῳ, ἢ ἐνζώμῳ ἢ κίχιδι ἢ δύνῳ ἐπεγραμμένα, μακρότερα δὲ καὶ τραχέα· καυλὸν δὲ γυνώδην, ὀρθοῖον, τραχυὲς ὡς πήχεως· αἶθος φοινικοῦ, ὅτι τε καὶ λευκὸν ὁμοίον τῷ τῆς ἀγρίας ἀνεμώνης, κεφαλὴ δὲ περιμήκης, ἥτων μὲν τοι ἢ τῆς ἀνεμώνης· καρπὸς πυρρός· ῥίζα ἐπιμήκης, ὑπόλευκος, δακτύλου ἔχουσα μικροῦ πάχους, πικρά. Ταύτης τὰ κεφάλια πέντε ἢ σ'. μετ' οἴνου κυάδων τειῶν ἐψήσας ὡς εἰς β'. ἀγαγεῖν, πόπῃς οἷς αὐτὸ βούλει ὑπνώσαι. τοῦ δὲ σπέρματος ποτὲν ὅσον ὀξύβαφον συνμελεκεράτω, κοιλίαν ἢ πῶς μάλασει· μύζυται δὲ καὶ μελιτήω· μασί καὶ ἰτείοις πρὸς τὸ αὐτὸ. τὰ δὲ φύλλα συν ταῖς κωδίαις καταπλαθέντα φλεγμοναῖς ἰᾶται· καὶ τὸ αἵτημα δὲ αὐτῶν αἵτηθεν, ὑπονοποῖον ὄσι.

Περὶ Μήκωνος ἡμέρου.

25

Κεφ. ξε'.

Μήκων ἢ μὲν τις ὅστις ἡμέρας, κηπευτῆ, ἥς τὸ σπέρμα ἀποτοπιέται εἰς τὴν ἐν ὑγείᾳ χεῖρσιν καὶ σὺν μέλιτι ἢ αἰτὶ σποάρις αὐτῇ ἔσται.

- ρεῖνται, χελεῖται δὲ θυλακίτις. vtuntur: thylacitin vocant: Ca-
 πίμυκες ἔχρουσα τὸ κεφάλιον, καὶ pitulum habet longum, & fe-
 τὸ σπέρμα λευκόν. Ἡ δὲ τις ἀ- men cādidum. Syluestre verò,
 ρεῖα ἐγκειμένη ἐχρουσα τὸ κα- caput infidens, demissumque;
 δίδαν, μέλαν σπέρμα. ὃ καὶ πῖθι- & nigrum semen, quod pithi-
 5 τις ὀνομάζεται ὑπὸ ἐνίων ἢ ροι- tis nominatur: nonnullis tamé
 ἀς καὶ αὐτῇ, διὰ τὸ εἶναι ἐξ αὐτῆς & ipsum rhoeas dicitur, quo-
 τὸν ὀπέν. Τεῖτη ἢ ἀραιωτέρα καὶ niam eius scapolacteus succus
 φαρμακωδέστερα καὶ μακροτέρω emanat. Tertium magis sylue-
 τέτων, ἔχρουσα τὴν κωδίαν ἐπι- stre, et ad medicinas valentius,
 μύκη. Κοινὴ δὲ αὐτῶν δυνάμις multò his longius, productio-
 10 ψυκτικὴ ὅθεν τὰ φύλλα καὶ αἱ re capitulo. Omnium in com-
 κωδίαι καθεψιδεῖσαι ἐν ὕδατι mune natura refrigeratrix:
 καὶ προσαντλήσθαι, ὑπονοπιε- quare si capita ipsa, & folia de-
 σι, πίνεται δὲ πρὸς ἀρχυρνήϊαν τὸ coquantur in aqua, somnum
 ἀφέψιμα, καὶ εἰς τὰ καταπλά- fotu conciliabunt. Bibitur de-
 σματα δὲ λείπει αἱ κωδίαι μετὰ coctum contra vigilias. Cali-
 15 ἀλφίτων μυγνύσθαι, πρὸς φλε- ces cum polenta triti, & cata-
 φμοναί καὶ ἐρυσσιπέλατα ἀρμύζε- plasmatis admisti, ignib⁹ sacris,
 σι. δεῖ δὲ κόπηντας αὐταὶ χλω- & inflammationibus profunt.
 ρεῖς ἀναπλάττειν εἰς βροχίσκας, καὶ Tunduntur quoque virides, &
 ξηραίνοντας ἀποπίδεσθαι, καὶ οὕτω digeruntur in pastillos, qui sic-
 20 ρεῖσθαι. καὶ ἑαυταὶ ἢ ἐψιδεῖ- cati ad vsum recōduntur. Ca-
 σαι αἱ κωδίαι ἐν ὕδατι μέχρις pita quoque per se in aqua co-
 ἡμίσεως, εἴτα συνὶ μέλιτι πάλιν quuntur ad dimidias, iterumq;
 ἐψιδεῖσαι, ἄχρις ἂν συσραφῇ τὸ adiecto melle, dū humor co-
 ὑγρὸν, ποιοῦσι φάρμακον ἐκλει- ēat in eclegmatis lentorem. Id
 25 κτήν. ἀνώδυον πρὸς βύχρας καὶ medicamentū in tussi, arteriæ
 ρευματισμοὺς ἀρθρίας καὶ κοιλίᾳ fluxionibus, & coeliacorū affe-
 25 καὶ διαδέσεις. ἐνεργέστερον δὲ γί- ctu doloris leuamentum præ-
 νεται μυγνύτων αὐτῶ ὑποκυδί- bet. Efficacius tamé redditur,
 δος χυλοῦ καὶ ἀγκυρίας. τὸ δὲ σπέρ- addito hypocistidis succo et a-
 μα τῆς μελαίνης μήκωνος λεῖον cacia. Papaueris nigri semé tri-
 συνὶ οἴνῳ ποτίζεται πρὸς ρεύ- tum cū vino bibitur, cōtra ci-
 μα κοιλίας καὶ γυναικείον ροῦν, tā alium, & foeminarum pflu-
 καταπλάσ- uia:

DIO SCORIDIS

uīa: in pernigiliis fronti tempo-
ribusque illinitur, ex aqua. O-
pium eius magis refrigerat, in-
spissat, siccátque: sumptum erui
magnitudine, doloré finit, cō-
coquit, & somnum allicit: tussi,
atque coeliacorum valetudini
auxiliatur: verum si copiosius
hauriatur, nocet, cum lethargi-
cos efficiens interimat. Ad do-
lores capitis cum rosaceo per-
fufum efficax est: auriū dolo-
ri, cum amygdalino, myrrha et
croco instillatur: inflammatio-
nibus oculorum cum torrefa-
cto oui luteo pficit: igni sacro
& vulneribus, cum aceto: po-
dagris, cum lacte mulieris &
croco somnum accersit, sub-
ditum fedi pro balano: Opti-
mum habetur graue, & den-
sum, gustu amarum, odoratu
foporiferum, quod facile aqua
diluitur, læue, candidū, neque
asperū, neq; grumofum, quod
inter colandum non vt cera
coëat, & in sole diffundatur:
dein admotum lucernis, non
atra luceat flamma: extinctum
denique, odoris vim cōseruet.
Sed opion glaucio, gummi, aut
fyluestris lactucæ succo, adul-
terant. Verum glaucio fuca-
tum, in dilutione croci coloré
reddit lactucaceo succo fi ctū,
exiliter

καταπλάσσεται δὲ ἐπὶ τῷ ἄρην-
προύτων μὲν ὕδατος, κατὰ τῆς
μετώπου καὶ τῶν κροτάφων. ὁ δὲ
ὁπὲς καὶ αὐτὸς ψύχων ἐπιπλέον
καὶ παχυῶν καὶ ξηραίνων· λι-
θοδαίς βραχὺς ὅσον ὄρεος, ἀνώ-
δυνός ἐστι καὶ ἑνοποιὸς καὶ πε-
πτικός· βοηθῶν βίβει καὶ κοιμια-
καὶς διαδέσσει· πλείων δὲ πο-
δαίς βλάπτει, ποίων λιθασμικούς
καὶ ἀναρεῖ. ποιεῖ δὲ καὶ κεφαλα-
γούσι συνὸ ροδίνῳ ἐμβρεχόμενος· 19
ὠταλγούσι δὲ συνὸ ἀμυγδαλίνῳ
καὶ κρόκῳ καὶ σμύρνῃ ἐγχεόμενος·
ἐπὶ δὲ φλεγμοναῖς ὀφθαλμοῦ
συνὸ λευκῷ ἐπὶ καὶ κρόκῳ· καὶ
πρὸς ἐρυσιπέλατα δὲ καὶ τραύ-
ματα συνὸ ὄξει· πρὸς δὲ ποδά- 15
γρῳσιν συνὸ γάλακτι γυναικείῳ καὶ
κρόκῳ· πρὸς δὲ δακτύλῳ
ἀντὶ βαλάνου ὑπὸν ποιεῖ. κρᾶπ-
τος δὲ ἐστὶν ὁπὲς ὁ πυκνὸς καὶ βα-
ρὺς, ἐν δὲ τῇ ὀσμῇ καρωπικός, π-
κρὸς ἐν τῇ γούσει, ἐν χερσὶ δὲ μέ- 20
νος ὕδατι, λεῖος, λευκός, ἔραχίς,
οὔτε δρομβοειδὴς, ἔτε συστρόμε-
νος ἐν τῷ διηδεῖσθαι ὡς κηρὸς,
ἐν τε τῷ ἡλίῳ τεταίς, διαχόμε-
νος καὶ πρὸς λύχρον ἐξαπτόμενος
οὐ ξοφώδει φλογί· φυλάσσειν τὰ 25
μετὰ τὸ σβεδίῃναι τῶν ἐν τῇ
ὀσμῇ δυνάμιν. δολοῦσι δὲ αὐτὸν
γλαυκίον μυρμύρες ἢ κύμμι,
ἢ χυλὸν ἀγρίας θρίδακος· ἐστὶ δὲ
ὁ μὲν ἐν τῷ γλαυκίῳ κρακίζων

ἐν τῇ ἀνέσει. ὁ δὲ ἐν τῇ θρίδακος
 ἐξίτηλος τῇ ὀσμῇ καὶ βαρύτερος·
 ὁ δὲ ἐν τῇ κόμμεως ἄτονος καὶ δι-
 αμής. ἐγίοι δὲ εἰς τοσούτον ἀνοίας
 παρσύνον, ὥς καὶ σέαρ παρσυ-
 5 μύσαι αὐτῶν. φάρμακον δὲ εἰς τὰ
 ὀφθαλμικά· ἐπεὶ ὁ σράκκω καὶ ἕως
 ἂν μαλακώτερος καὶ κρρότερος
 φανῇ. Ερασίστρατος μὲν τοι δια-
 γόσαν φησὶν ἀποδοκιμάζειν αὐτῶν
 τὴν χρῆσιν ἐπὶ τῶν αἰταλγικῶν,
 10 καὶ ὀφθαλμίωντων. διὰ τὸ ἀμ-
 βλωπῆς εἶναι καὶ χαρωπικόν. ἀν-
 δρείας δὲ φησὶν. ὅτι εἰ μὴ ἐδολοῦ-
 το, ἐτυφλοῦντο ἂν οἱ ἐγχερίοι μοι
 ὥς αὐτῶν. μησιδῆμος δὲ φησὶ μὴ
 νύμ αὐτῶν χρῆσιν εἶναι τὴν κατ'
 15 ὁσφρησιν εἰς ὕπνον ἀρμόζουσαν,
 ἄλλως δὲ ἐπιβλαβὴν τυγχάνειν.
 ἄσπρ' ὅτι ψευδὴ ὥστε τῆς πείρας
 ἐλεγχόμενα· διὰ τὸ ἐπιμαρτυρεῖ-
 σθαι τοῖς ἔργοις τῇ ἐλέργειαν τῶν
 φαρμάκων. καὶ ἄτοπον δὲ ὥστε γά-
 20 λαι καὶ τῇ βόπην ὅτι συλλέγῃσι τὴν
 ὀπὴν· ἐνίοι μὲν ἂν τὰς κωδίας μὲν τῇ
 φύλλων κόπῃοντες ἐκτείνῃσι διὰ
 πειρήρος, καὶ τείνοντες ἐν πυρὶ, ἀ-
 ναπλάτῃσι βόχρως καλεῖν· δὲ
 τὸ τοιοῦτον μηχανήσιν ἀδρανέσε-
 25 σθαι τῶν ὀπῶν. ὁπότε δὲ δεῖ μὲν
 τὸ τὰς δρόσους ἀνικμαδῶναι,
 περὶ γὰρ μαλακίῳ τὸν ἀστέρι-
 σιον, ὥς μὴ εἰς τὰ ἐντὸς διαστῇ-
 σαι, καὶ ἐν παλγίων δὲ τῇ κωδίας
 ἐπεὶ εὐθείας ἐκτέμνῃν ἐξ ἐπιπολῆς,
 καὶ

exiliter spirat, & asperius spe-
 ctatur: gūmi vitiatum, splende-
 scit, & infirmū est. Nec desunt
 qui eò demétia deuenierint, vt
 adipem ei admiscerent. Fictili
 nouo torretur ad oculorū me-
 dicaméta, dum mollius atque
 rufius appareat. Diagoras, vt
 Erasistrat⁹ author est, vsū eius
 damnauit, oculorū lippitudini
 bus, & auriū vitiis infundi ve-
 tans, quoniā visus acie hebeta-
 ret, et soporé gigneret. Addidit
 Andreas, illitos eo protin⁹ ex-
 cæcari, si non adulteraretur.
 Mnesidemus vsū dūtaxat ol-
 factandi probauit, quoniā ad
 conciliādum somnū conueni-
 ret, alioqui nobis vt noxio in-
 terdicat. Quæ cōmentitia esse,
 experimento deprehendūtur:
 siquidē effectus, viriū huiusce
 medicamēti, fidē faciūt, quare
 non alienū fuerit scriptis mā-
 dare, quonā modo is excipia-
 tur succus. Aliqui capita ipsa et
 folia tundunt, & prælo expri-
 munt, terétesq; in mortario, di-
 gerūt in pastillos: id meconiū
 vocatur, multū opio ignauius
 Porro opij faciendi ratio hæc
 est: Cū ros in eo exaruerit, cul-
 tro decussatim in stellas, ne pe-
 nit⁹ adigat, ex obliquo i rectū
 summā cutē incidere oportet,
 lachrymam

DIOSCORIDIS

lachrymam exeuntem, digito in conchâ abstergere, nec mul-
tò post redire, vt cōcreta inue-
niatur: etenim quæ tum, aut po-
stero die etiâ offenditur, in ve-
tere pila teri debet, & in pastil-
los cogi. Cū tamē inciditur,
retrocedendum est, ne vestib⁹
succus deradatur.

Corniculatum papa-
uer. Cap. LXVI.

PAPAUER ceratites, id
est, corniculatum, folia habet
candida, hirsuta, verbasco si-
milia in ambitu syluestris pa-
paueris more ferrata : caule
non dissimili : flore pallido :
calyculo foenigræci, in cor-
niculorum modum inflexo,
vnde nomen mutuatur : seme-
ne papaueris, pusillo nigró-
que : radice per summa cespi-
tum, nigra, crassa : nascitur in
maritimis & asperis. Radici
ea vis inest, vt in aqua deco-
cta ad dimidias, coxendicum
& iocineris affectus, potu fa-
net : prodest his qui crassa
quædam, aspera, aut araneo-
sa cum lotio reddunt. Aluum
leniter purgat semen, aceta-
bulo in aqua mulsa poto.
Crustas emarginant, illita ex
oleo folia, florésque, & ar-
gema

καὶ ἀποψῶν τὸ δάκρυον ἐκτρέχου-
νον δακτύλῳ εἰς μύακα· καὶ πά-
λιν ἐμπορεύεσθαι μετ' ἐπὶ πολὺ· εὐ-
ερίσκετο γὰρ ἐπισπινόμενος, καὶ τῇ ἐ-
πιπύσει δὲ ἔτι πλεονέσκει, δὲ δὲ
ἐν θυλάκῳ τεύχεσθαι καὶ ἀποτίθεσθαι ἀ-
ναπαύσαντας, ἐν μὲν τοῖς τῷ τέ-
μειν ὁπίσω ἀναχωρεῖν δεῖ πρὸς
τὸ μὴ ἀποψῶσθαι τὰ ἱματίων τὸν
ὀπὶν. Πρὶς Μήκωνος κερατὶ-
τιδος. Κεφ. ξς'.

Μήκων κερατῆτις, οἱ δὲ, πα- 10
ράλιον, οἱ δὲ, ἀγρίαν μύκωνα, οἱ
δὲ, θαλάσσιον· φύλλα ἔχει λευκά,
δατέα, ὁμοία φλόμῳ, περιτριμ-
νὰ πλὴν περιφέρειαν, ὥσπερ τὰ τῆς
ἀγρίας μύκωνος, καὶ τὸν χαλκὸν
ὁμοιον, αἰσθῶς ὡχρόν· καρπὸν δὲ
μικρὸν, καμπύλον ὥσπερ κέρατος,
ὁμοιον τῷ τῆς τήλεως· ὅθεν καὶ
ἐπωνόμασται· σπέρμα δὲ μικρὸν,
μέλαν, ὁμοιον τῷ τῆς μύκωνος,
ρίζαν ἐξέπιπλῆν φυομένην, μέ-
λαναν, παχεῖαν· φύεται ἐν πα- 20
ραθαλάσσις τοῖς τοῖς καὶ τραπέ-
σι. Διὰ μὲν δὲ ἔχει ἢ μὲν ρίζα
ἐκείνη δὲ ἄλλῃς ἡμῶσις ἐν ὕδα-
τι καὶ ποτὶ δὲ, ἰσχυράς καὶ ἡπα-
τιδὸς διαθέσεις θεράπειν· καὶ
τοῦ παχέος ἢ ἀραχνώδη ὑπὸντας 25
ἀφελῆν· τὸ δὲ σπέρμα παλιν
ὀξυέστερον πρὸς συνελκράτω,
κοιλίαν ἐπὶ κῶν καθαίρει· τὸ δὲ
φύλλα καὶ τὰ αἰσθῶς ἐκείνης περι-
ρήνῃ καὶ ἀπλεθέντα σὺν ἐλαίῳ·
ἐγχεῖσθαι

ἐγχεῖντα δὲ τὰ ἐπὶ κτύων
αἴγρεμα καὶ νεφέλια ἀποκαθαίρει.
ἔνιοι δὲ ἐπλανήθησαν νομίσαντες
ἐκ ταύτης τὸ γλαυκίον γίνεσθαι
διὰ τὴν τ' φύλλον ἑμοφείραν.

5 Πρὶ Μήκωνος ἀσπράδου.

Κεφ. ξζ'.

Μήκων ἀσπράδου, ὑπὸ δὲ π-
των ἡράκλεια κληθεῖσιν, χαλὸν
ἔχει σπιδαιμαῖον, καὶ τὰ φύλλα
σφόδρα μικρά, σπιδίω ἑοικότα,
10 καὶ καρπὸν παρ' αὐτοῖς λευκόν, καὶ
τὸ ὅλον δὲ βοτανίον λευκόν ὅτι καὶ
ἀφρώδες· ῥίζαν δὲ λεπτήν ἐπι-
πλέον. Ταύτης ὁ καρπὸς συλλέ-
γεται ὅταν τελείως ἀδρυμνῇ θέ-
ροις, καὶ ξηρανθεὶς ἀποπέσῃ χα-
15 θαίρει δὲ δι' ἐμέτων ὀξύβλου
πληθὺς σὺν μελικράτῳ λαμ-
βανόμενος· ἰδίως δὲ ἡ τοιαύτη
χάθαρσις ἐπληπτικοῖς ἀρμόζει.

Πρὶ Ὑπνίου. Κεφ. ξη'.

Ὑπνίου, οἱ δὲ, ὑπόφρων καλεῖ-
20 σι· φύεται δὲ ἐν τῷ σίτῳ καὶ ταῖς
ἀρέραις· φύλλον δὲ ἔχει πηγά-
νω ὁμοιον, κλώνας μικρὰς. Δύ-
ραμιν δὲ ἔχει ἀναλογεῖσθαι τῷ
τῆς μήκωνος ὅπῳ.

Πρὶ Τοσκυάμου.

25 Κεφ. ξθ'.

Τοσκυάμος, δάμνος ὅτι χαλὸς
ἀνιῖς παχεῖς, φύλλα πλατέα,
ἐπιμήκη, ἐχρημένα, μέλανα, δα-
σέα, παρὰ τ' ἡ χαλὸν ἐφεξῆς πε-
φύκεσθαι αἴθῃ ὥσπερ ῥοῖας κύπ-
ροι

gema ac nubeculas iumento-
rum perunctas, abstergūt. Sūt
qui glauciū, hoc papaueris ge-
nere factitari existimarūt, falsū
quadā foliorum cognatione.

Spumeum papauer.

Cap. LXVII.

Aliud papaueris genus, aphro-
des, id est, spumeū vocatur, ab
aliis heracleum, caule dodran-
tali: foliis admodum paruis, ra-
diculæ similibus: fructu inter
ea candido. Nam herbula alba
est, & spumea tota: radice in sū-
mo cespite. Legitur æstate se-
men, cū integrè adoleuit, deci-
ditque exiccatum. Datum ace-
tabuli mensura in aqua mul-
sa vomitione expurgat: priua-
tim huiusmodi purgatio, co-
mitialibus prodest.

Hypecoum. Cap. LXVIII.

Hypecoon, aliqui hypo-
pheon vocant: nascitur in se-
getibus arvisque, foliis rutæ,
exilibus ramis. Natura eadem,
quæ papaueris succo.

Apollinaris, siue hyoscy-
mus. Cap. LXIX.

Hyoscyamus, frutex est cau-
les emittens crassos: folia lata,
oblonga, diuisa, nigra, hirsuta:
flores è latere caulis, ordine p-
deunt, tāquam puniceorū cyti-
ni,

DIOSCORIDIS

ni, scutulis septi seminū plenīs,
vt papaueris. Tres eius differē-
tiā: Vna semine nigro, floribus
penē purpureis, smilacis foliis,
cytinis præduris, & spinosis. Al-
terius semen subflauū, vt irio-
nis: flores lutei, folia, & siliquæ
simpliciores. Ambo insaniā gi-
gnunt & soporem, ideo in cō-
muni vsu dānantur. Tertiū ge-
nus, vt quod mitissimum esset,
medici recepere: pingue, lanu-
ginosum, molle, candidi floris
feminisque, in maritimis rude-
ribusque nascens. Cuius occa-
sio si non adfit, rufum vsurpa-
ri oportet: niger, vt deterrim⁹,
improbatur. Recenti semine,
caulibus, foliisque tuis, succus
in sole exprimitur, & exicca-
to humore, vsus ad annum vf-
que prorogatur: nam facile
corruptionem sentit. Extrahi-
tur etiam ex sicco semine se-
paratim in aqua calida tuso, &
expresso. Liquamentum au-
tem succo lacteo præstantius
est, & magis dolores finit. Cō-
tusa herba recēs, addita trime-
stri farina, digeritur ī pastillos,
& reconditur. Liquamentum
primum, & quod à sicco se-
mine exemptum est, collyrijs,
quæ doloris sensum auferunt,
commodissimè inseri solent:

contra

νοι, πεφραγμένοι ἀποδύσκει·
σπέρματος μεσσίς, ὡς τὸ μύκη-
τος. ἔστι δὲ αὐτῆς διαφορὰ τριῶν:

Ὁ μὲν γὰρ ἀνθὴ ὑποπέρφυρα
φέρει, φύλλα σμύλακι ὁμοία, σπέρ-
μα μέλαν, καὶ τοὺς κνήκινους σιλη-
ρὺς καὶ ἀκωνόδεις. Ὁ δὲ πρὸς
ἀνθὴ μηλοειδῆ, φύλλα καὶ λοβοὺς
ἀπλωτέρους, σπέρμα ὑποξανθὸν
ὡς τὸ ἐρύσιμον· ἀμφοτέροι δὲ
τοὶ μακρόδεις ὑπάρχουσιν καὶ καρ-
πικοὶ, δύχρηστοι. Εὐχρηστος δὲ εἰς
θραπέειαν ἡ πτωχάκος ὣν ὁ βίτος
λιπαρὸς καὶ ἀπαλὸς καὶ χροώδης,
ἀνθὴ λευκὰ ἔχων, καὶ τὸ σπέρμα
λευκόν· φύεται παρὰ θαλάττη καὶ
ἐρειπίοις. εἰ δὲ μὴ παρέη οὗτος,
χρηστὰ δει τῶ ξανθῷ, τὸν δὲ μέ-
λανα ἀποδοκιμάζειν ὡς χείρι-
στον. Χυλίζεται δὲ ὁ καρπὸς ἀπα-
λὸς καὶ τὰ φύλλα καὶ οἱ κερκοὶ κό-
πτομενοι καὶ ἐκδιβόμενοι ἐν ἡ-
λίῳ, ξηρανομένης τῆς ὑγρῆς· χρηστὸς
δὲ αὐτὴ πρὸς ἐνιαυτὸν διὰ τὸ
εὐσπῆλον. χυλίζεται δὲ καὶ τὸ σπέρ-
μα αὐτὸ κατ' ἰδίαν κοπιόμενον
ξηρὲν, ὑφ' ὑδατος θερμοῦ παρὰ
χειρὸς καὶ ἐκδιβόμενός. ἔστι δὲ
βέλτιον τῷ ὁποῦ τὸ χύλισμα, καὶ
ἀνωθυώτερον. ἡ δὲ χλωρὰ κο-
πιεῖσθαι καὶ μῆραισθαι σιτανίῳ ἀλεύ-
ρῳ, ἀναπλάσσει εἰς ἀρίστοις καὶ
ἀποτίσει. ἀεμύζει δὲ τὸ πρῶ-
τον χύλισμα καὶ τὸ ἀπὸ ξηροῦ τῷ
σπέρματος εἰς κολλύρια ἀνώδυ-
τα, καὶ

- τά, καὶ πρὸς ῥεύμα δριμύ καὶ
 θερμόν· ὠταλίαν τὲ καὶ τὰ
 πρὸ ὕστερον, σὺν ἀλεύρεσι δὲ
 ἢ ἀλφίτοις, πρὸς τὸ ὀφθαλμῶν
 φλεγμονὰς καὶ ποδῶν καὶ τὰς
 5 ἄλλας. τὸ δὲ σπέρμα τὰ αὐτὰ
 παρέχει. ποιοῦν καὶ πρὸς βή-
 χας καὶ κατάρροον καὶ ῥεύμα
 ὀφθαλμῶν καὶ πτερυγίας, πρὸς
 τὸ ῥοῦν γυναικῶν καὶ τὰς ἄλ-
 λας αἱμορροίας, ὅσον ὁλοῦς
 10 σὺν μήκωνος σπέρματι καὶ μελι-
 κράτῳ ποθέν. ἀρρῶζει καὶ πρὸς
 ποδάγρας, ὅς τις πεφυσιμένους,
 μαζοὺς ἐν τοκετῷ ἐπαυρομένους,
 λείον μετ' οἴνου καταπλασά-
 μνον, καὶ εἰς τὰ ἄλλα ἀνώδυ-
 15 να καταπλασάμενα μίγνυται ὁ-
 φελίμως. καὶ τὰ ἀναπιπλά-
 σμένα φύλλα, εἰς πάντα τὰ ἀνώ-
 δυνα εὐχρηστα μισγόμενα ἀλ-
 φίτοις, καὶ κατ' αὐτὰ κατα-
 πλασόμενα. τὰ δὲ πρὸς φάρμακα
 20 φύλλα καταπλασθέντα, ἀνώδυ-
 νά τε καὶ πρὸς πάντα πόνον. * τεῖα
 δὲ ἢ τῆς ἡμέρας ποθέντα σὺν οἴ-
 νῳ, ἡ πάλους πυρετὸν διερε-
 πύει· ἐψηθέντα δὲ ὡς λάχανα
 καὶ βρωθέντα τρυβλίου πηλίδος,
 25 μετεῖαν παρασκευῇ ἐργάζεται.
 φασὶ δὲ ὅτι ἐὰν τις ἑλκος ἔχον-
 τα ἐν κήλῳ ἐγκλύσῃ τὸ αὐτὸ ἀ-
 περγάζεται. ἢ δὲ ῥίζα μετ' ὀ-
 ξους ἐψηθεῖσα, ὁδονταλγίας ὅστι
 διάκλυσμα.

contra acutas calidasque flu-
 xiones, dolores aurium, atque
 vulvæ mala, prosunt: cum fa-
 rina autem aut polenta, oculo-
 rum, pedum, cæterarumque
 partium inflammationes pla-
 cant. Semen eadem præbet:
 tussi, destillationibus, oculo-
 rum fluxioni, & doloribus, effi-
 cax: contra mensium abundan-
 tiam, & rumpentem aliunde
 sanguinē, oboli pondere cum
 papaveris semine, & aqua mul-
 sa, bibitur: podagris subuenit:
 testibus inflatis, mammisque
 tumentibus à partu, tritum ex
 vino illinitur. Aliis quoque ca-
 taplasmatis, quæ doloris leua-
 mentum præstant, admisceri
 solet. Folia omnibus medica-
 mentis dolorem sedantibus,
 per sese, & ex polenta, utilissi-
 mè imponuntur: recentia, ad
 mitigandos omne genus do-
 lores, oblinuntur: cum vino
 terna, quaternave pota, sanant
 algidas febres, quas epialos vo-
 cant. Cocta olerum modo
 folia, si acetabuli mensura mā-
 duntur, mediocrem insaniam
 gignunt: idem efficere tradūt,
 si, colo vlcus sentiēte, infun-
 dantur. Radice in aceto
 decocta, dentes in
 dolore colluuntur.

DIOSCORIDIS

Psyllium. Cap. LXX.

Psyllion foliis coronopo nō dissimilibus, hirsutis, longioribus: farmetosa foeni modo, in totum herbula: ramis dodrantalib⁹: coma à medio caule exoritur, duob⁹ tribusve cōvolutis in cacumine capitulis: ī his femine duro, nigro, pulicū simili vnde & nomen: in aruis & incultis nascit. Vis ei ad refrigerandū, inspissandū, & molliendū conueniens: articulorū morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, vulsis, illitū auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cū rosaceo, aqua, aut acetō: enterocelis infantīū, & prominētī vmbilico, illitū ex acetō, medet. Terit acetabuli mēsurā, & ī aquæ sextario madefactū, vbi cōcreuit aqua, illinit: siquidē vehementer refrigerat, & in feruentē aquā deiectum calorē reprimat. Contra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domū importet, nō finire in ea pulices gigni. Cū adipe tusū, fordida vlcera, & q̄ ca coēthe vocant, expurgat. Succus vermiculosis aurib⁹, aut fluxiōe laboratib⁹, ex melle pdest

Hortēse solanū. Ca. LXXI.

HORTENSE solanum frutex cibus idoneus, pusillus, multis

Πρὶ Ψυλλίου. Κεφ. δ.

Ψύλλιον φύλλον ἔχει κορωνόποδι ὁμοιον, δασύ. * κλώνας δ' ἀσπιδαιμαῖους καὶ τὸ ὅλον βοτάνιον χορτῶδες ἀφ' ἧται δ' αὐτῇ ἡ κόμη ἀπὸ μέσου τῆς καυλοῦ, καὶ φάλια δὲ δύο ἢ τεῖα ἐπ' ἀκροῦ συνεσταλμένα ἐν οἷς σπέρμα φύλλοις ὁμοιον, μέλαν, σκληρὸν φύεται ἐν ἀερίαις καὶ χέρσις. Διώαμιν δὲ ἔχει * ψυκτικῶφιλεῖ δὲ καταπλαττόμενον, ἀδριπιδά, παρωτίδας, φύματα, οἰδύματα, * σπέρματα, κεφαλαλίαν, μὲν ῥοδίνου ἢ ὄξους ἢ ὕδατος ἐν τρυκίαις τὲ τὰς ἐπὶ πᾶσι δυν καὶ ἐξομφάλους ὑγάζει καταπλασσομένην συν ὄξει. δει δὲ ὀξυβάφης πλῆθος λεύκοντας βρέχειν ἐν δυσιν ὕδατος δακτύλοις, καὶ ὅταν παρῇ τὸ ὕδωρ ἐπιπλάττειν ψυχεῖ ἢ ἐκάνως, καὶ εἰς ὕδωρ δὲ ζέον ἐπιπτεμελὲν κατατέλλει πλὴν δέρμιν, ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ἐρυσιπέλατα. φασὶ δὲ ὅτι κομιθεῖσα ἐν οἴκῳ χλωρὰ, οὐκ ἔα ψύλλας θύεσθαι κοπιεῖσα δὲ μετὰ σέατος, τὰ ῥυπαρὰ καὶ χακοῦνη τῶν ἐλκῶν ἀνακαθαίρει. ὁ δὲ χυλὸς μετὰ μέλιτος πρὸς ὧτα ῥευματοῦ ὀφθαλμοῦ ποιεῖ καὶ σκώληκας ἔχοντα.

Πρὶ Σπύρχου. Κεφ. οα.

Σπέρχους κηπαῖος ἐδώδεμος ὅτι δαμνίσκος, οὐ μέγας μαχαλάς

μαράλας ἔχων πολλάς· φύλλα
 μέλανα, ὠκύμου μείζονα καὶ
 πλατύτρα· καρπὸν περὶ φερεῖν, χλω
 ρόν, μέλας δὲ ἢ κίτρινος γίνεσθαι με
 τὰ τὸ πεπαισθῆναι· ἀβλαβὴς δὲ
 ἢ βοτάνῃ πρὸς γαστρίῃ. Διῶν
 μιν δὲ ἔχει ψυκτικῶς· ὁδὸν τὰ
 φύλλα κατὰ πλάτος ὁμοῦ, ἀρμό
 ζει πρὸς ἐρυσιπέλατα καὶ ἐρ
 πητας μετὰ παιπάλης ἀλφίτου·
 καὶ ἑαυτὰ ἢ ὀπιπιδέμεναι λεία,
 10 αἰγίλωπα θεραπεύει καὶ κεφα
 λαλγίαν· καὶ τομάχῳ καυσου
 μένῳ βοηθεῖ· παρωτίδας δὲ δια
 φορεῖ σὺν ἄλοις λεία κατὰ πλάσ
 σόμενα, καὶ ὁ χυλὸς δὲ αὐτῆς ποιῇ
 πρὸς ἐρυσιπέλατα καὶ ἐρπητας,
 15 σὺν ψιμμιδίῳ καὶ ῥοδίῳ καὶ
 λιθαργύρῳ· πρὸς αἰγίλωπα δὲ
 σὺν ἀέτω. ἀρμόζει καὶ σινεῶ
 σι παιδίῳ σὺν ῥοδίῳ ἐμβρε
 γόμενος· μίγνυται δὲ καὶ κολλυ
 εῖοις ἀντὶ ὕδατος ἢ ὠοῦ πῖς
 20 πρὸς ρεύματα δριμύτα εἰς τὰς
 ἐγχεῖσεις· ὠφελεῖ καὶ ὠταλγίαν
 ἐνταχείς. ἔχει δὲ καὶ ῥοῦν γυ
 ναικεῖον ἐν εἰώ πρὸς εὐδαιμόνιαν· ὁ δὲ
 χυλὸς ἀναγκῆς ὅτι πρὸς αἰγί
 λωπας, συμμάλασόμενος ἀφὸ
 25 δὴ πυρρῶν ὀρνέων κατὰ κινδύνῳ καὶ
 ῥάκει ὀπιπιδέμενος.

Πρὶ Σβύχης ἀλικακάβου.

Κεφ. οβʹ.

Ἔστι καὶ ἕτερον σβύχον, ὃ ἰδίως
 ἀλικακάβον καλεῖσθαι, οἱ δὲ φουσα
 λίδας

tis concavus alis : folio nigro,
 maiore quam ocimi, & latio
 re : fructu rotundo, viridi, qui
 post maturitatem nigricat, aut
 fulvescit : herba innocentis gu
 stus. Natura ei refrigerandi :
 quare folia ulceribus quæ ser
 punt, & ignibus sacris, conue
 nienter cum polline polentæ
 illinuntur : ægilopia, capitif
 que dolores, trita & imposita
 per se sanant : æstuantī stoma
 cho auxiliantur : parotidas, cū
 sale detrita, illitu discutiunt :
 Valet succus ei⁹ aduersus ignē
 sacrum, atque vlcera quæ ser
 punt, cum cerussa, rosaceo &
 argenti spuma : ad ægilopas
 cum pane : infantium adustio
 ni, quam syriasim vocant, cum
 rosaceo perfusus proficit : in
 collyriis, aquæ vel oui vicem
 exhibet, contra acutas fluxio
 nes illitus : aurium dolori in
 stillatus prodest. Mensium a
 bundantiā sistit, in vellere sub
 ditus. Succus fuluo gallinarum
 cortalium fimo subactus,
 & linteo appositus, ægi
 lopiis præsentaneo
 est remedio.

Solanum halicacabon.

Cap. LXXII.

Est & aliud solanū, qd̄ peculia
 ri nomine halicacabō aut psy
 E salida,

DIOSCORIDIS

salida, id est vesicariam vocāt, foliis antedicto similibus, verū latoribus: cuius caules, postea- quā adoleuerunt, prona ter- ram spectant: folliculis orbicu- latis vesiculis similibus: semine intus fuluo, rotundo, læui aci- norum vuae effigie: quo coro- narij vtuntur, corollis intor- quentes. Vim vsūmque hortē- sis solam habet: verum cibus nequaquam expetitur. Regiū morbum purgat, semine po- to, & vrinam pellit. Ex vtraque herba succus extrahitur, qui ficcatus in ymbra, reconditur, ad eadem valens.

Solanum somniferum.

Cap. LXXIII.

SOLANVM somnife- rum, aliqui etiam halicaca- bon appellant, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fra- ctu contumacibus, pinguium foliorum, cotoneæque mali similium plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis cro- cato: radice grandi, subrubro cortice vestita: nascitur in sa- xis, non procul à mari. Ra- dicis cortex, in vino drachmę pondere potus, somnificā vim habet, opio mitiorem. Semen veheméter vrinā cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur: si quid

λίδα φύλλοις ὁμοιον τῷ περιε-
μύῳ, πλατυτέροις μὲν τοῖς οἰ-
καυλοῖς ὃ αὐτῇ μὲν τὸ ἀνέκνηδυνον
χαμαακηνεῖς γίνονται καρπὸν δὲ
ἔχει ἐν θυλακίοις περιφέρειν ὁ-
μοιον φύσας, πυρρὸν, περιφερῆ,
λεῖον, ὡς ῥῶγα σαφυλῆς, ὃ καὶ οἱ
σεφανοπλόκοι χερῶν ἢ κατὰ πλέ-
κοντες τῶν σεφάνοις. Διῷαμιν
δὲ ἔχει καὶ χερσὶν πλὴν αὐτῶν
τῷ κηπαίῳ ἐρύχῳ· χερεὶς τοῦ
βιβρώσκειται. διῷαται δὲ ὁ καρ- 10
πὸς αὐτῇ πινόμμος, ἵκτεριν ἀπο-
καθάρειν ἐρετικὸς ὢν χυλίζεται
δὲ ἀμφοτέρων ἢ πύα, καὶ ξηραίνει
ἐν σκιά, πρὸς ἀπόδεσιν, ποιεῖ δὲ
πρὸς τὰ αὐτῇ.

Πρὶ Σβύχου ὑνωπικῆ. 15

Κεφ. ογ'.

Στρυγὸν ὑνωπικόν, οἱ δὲ,
ἀλικάκαβον, δάμνος ὅτι κλά-
δος ἔχων πολλοὺς, πυκνοὺς τε-
λεχόδεας, θυδραύσεις, φύλλων
πλήρεις λιπαρῶν, ἐμπερῶν μύλων 20
χυδωνίῳ· ἄνθος ἐρυθρὸν, ἐυμέ-
γεδες· καρπὸν ἐν λοβοῖς κροκί-
ζοντα· ῥίζαν φλοιὸν ἔχουσαν ὑπὲρ
ερυθρον, ἐυμεγέθη· φύεται ἐν πε-
τρώδεσι τόποις ἢ πέρρῳ θαλάσ-
σης. Ταύτης ὁ φλοιὸς τῆς ῥίζης 25
ἐν οἴνῳ πιθεῖς. < ὅλην ὑνωπι-
κὴν ἔχει διῷαμιν ἢ ὅπου ἢ μύ-
κωνος ἐπικεστέραν. ὁ δὲ καρπὸς
οὐρετικὸς ὅστιν ἄγαν· δίδονται
δὲ ὑδρωπικοῖς κόρυμβοι ὡς ἰβ.
πλείονες

πλείονες δὲ ποθέντες, ἔκτισον
ἐργάζονται. βοηθοῦνται δὲ μέ-
λιχράτω πολλῷ πινυμένων. μί-
γνυται καὶ ἀνθρώποις ὁ χυλὸς
αὐτῆς καὶ τροχίσκες· ἐναφε-
15 θείας δὲ οἶνω καὶ διακράτου μύρου
ὁδὸν ταλγίως ἀρῇσι. ὁ δὲ χυλὸς
τῆς ῥίζης ἀμβλυώπιας μετὰ μέ-
λιτος ἐν χειρὶ δέξι παρατίθεται.

Πρὶ Σβύρχος μασηκῆ.

Κεφ. οἶ.

- 10 Σπέρυχον μασηκόν, ὃ ἐνοῖ πέρ-
στον, οἱ δὲ, θρύον ἐκάλεισαν. τέ-
του τοῦ μύρου φύλλον παραπλήσιον
ὅστιν ἐνζύμω, μείζον δὲ πρὸς τὰ
τῆς ἀκαθίας, ἢ τῆς καὶ πύδε-
ρος καλεῖται χαμλοῦς δὲ ἀγίστην
15 ἀπὸ τῆς ῥίζης ὑσφουεῖς δέκα ἢ
ἑξ. ὀργυὰς ἔχοντας ὑψόσ-
τιν κα-
φαλῶ ἐπικειμένον ὥσπερ ἐ-
λάαν, δασυτέραν δὲ ὡς πλα-
ταίου σφαῖραν μείζονα δὲ καὶ
πλατυτέραν ἄνδρος μέλας. με-
20 τὰ δὲ τὸ τοῦ καρπὸν ἔχει βοβυ-
ειδῆ, σφηγύλον, μέλανα*, ῥαγά-
δας ἢ ἢ β'. ὁμοίως κιστὸς κορύμ-
βος, μολαχὸς ὥσπερ σαφυλή. ῥί-
ζα δὲ ὑπερὶ λευκῇ, παχεῖα, κόι-
λη ὡς πηχέως· φύεται ἐν ὄρεινοῖς
25 χερσίν καὶ περὶ σπηλαιῶν καὶ πλα-
ταμῶσι. Διῶαμιν δὲ ἔχει ἢ ῥί-
ζα πινυμένη μετ' οἶνον < ἀπλῆ
δος, φαντασίας ἀποτελεῖν οὐκ
ἀνδρείας· δὲ δὲ < ποθεῖται,
ἐξιστοῦσιν ἄλλοι τειῶν ἡμερῶν,
δ', δ'

si quid numero adiciat, alie-
natione mentis faciunt. Reme-
dio est aqua copiosa mulsæ, po-
tui data. Succus pastillis inseri-
tur, & medicamentis quæ dolo-
ris leuamētū præbēt: decoctus
in vino, si in ore cōtineat, den-
tium doloribus auxiliatur. Ra-
dicis succus, cum melle illitus,
oculorum hebetudines tollit.

Manicū solanū. Ca. LXXIII.

Solanū manicū, aliqui per-
sion, alij thryon appellauere.
Huic foliū erucæ simile, maius
aliquāto, satis acantho, quæ pæ-
derota vocant, accedēs: caules
à radice proceros emittit decē
aut duodecim, vlnæ altitudine
adolescentes: caput in cacumi-
ne, oliuæ figura, sed vt platani
pilulæ hirsutius, verū maius,
latiusque: florem nigrum: post-
quam eo exuitur, racemus exit
rotundus, niger, denis aut duo-
denis acinis cōstans, similibus
hederæ corymbis, vt vix mol-
libus: radice firmatur candida,
crassa, caua, cubitali: gignitur
in montibus, vento perflatis, &
platanetis. Radix drachmæ v-
nius pondere pota ex vino, fa-
cit species vanas, imaginésque
nō iniucūdas obuersari, sed du-
plicat^r hic modus, ad treis vsq;
dies mentis alienatione affert:

E ij qua-

DIOSCORIDIS

quadruplicatus, interimit. Remedio est aqua multa copiosiora, & vomitione reiecta.

Dorycnii. Cap. LXXV.

Dorycnion Crateuas halicabon, aut caleā vocat, frutex oreæ nuper prodeunti similis: nascitur in petris, non procul a mari, ramis cubito minoribus, foliis oleæ similibus colore, minusculis, firmioribus, præter modum scabris: flore candido: siliquis i cacumine, ceu ciceris, densis, rotundis, quinis intus, aut senis feminibus, exigui erui magnitudine, læuib, firmis, versicoloribus: radix ad digiti crassitudine & cubiti longitudine adolescit. Id somniferum esse constat. Copiosius haustum mortem adfert. Nec defuere, qui dicerent, semē in amatoria expeti.

Mádragoras. Cap. LXXVI.

Mádragorá, aliqui antimalū, alij circeam vocāt, quoniā videatur radix ad amatoria conducere. Duo eius genera: niger, quæ foemina existimatur, thridacias appellatus, angustioribus foliis, ac minoribus quam lactucæ, virosis ac graueolentibus, in terrā sparsis: mala gerit forbis similia, pallida, odorata, in quibus semen veluti pyrorum: radicibus inheret bene magnis, binis,

δ'. ἢ ποδεῖσαι, καὶ ἀναιρεῖσιν, ἀντὶ φάρμακον ἢ ὅτιν αὐτὸ μελίκρατον, πολὺ πνόμενον καὶ ἐξεμύμενον

Πρὶ Δορύκνιου. Κεφ. οἷ

Δορύκνιον κρατεύας ἀλικάβον ἢ καλέαν καλεῖ, δάμνος ὁμοιος ἐλάει ἀρπυγεῖ κλώνος ἔχων ἐλάσσονας πύχους φύεται ἐπὶ πέτραις, οὐ πέρρω θαλάσσης, φύλλα δὲ τῷ χρώματι ἐλάει παρῶπλήσια, μικρότερα δὲ καὶ στερότερα, καὶ τραχέα ἰχυρῶς ἰοῦντος λευκόν, ἐπὶ ἄκρου ἔχει πυκνὰ θυλάκια ὡς περ ἐρεβίνθου ἐν οἷς σπερμάτια στρογγύλα ἐστὶν ὅσον ὀρεοβοὶ μικροῖ, λεία, ἰχυρὰ καὶ ποικίλα· ῥίζαν πάχος δακτύλου, μήκος δὲ πύχους· δοκεῖ ἢ ἰσκαὶ τοῦτο ὡνωπικόν εἶναι πλεοναδὲν δὲ ἀναιρεῖν. φασὶ δὲ πινεσκαὶ τὸ σπέρμα αὐτὸ εἰς τὰ φίλτρα παρελαμβάνεσθαι.

Πρὶ Μανδραγόρος. Κεφ. ος'.

Μανδραγόρος, οἱ δὲ ἀντίμυλλον, οἱ δὲ θρηκίαν, οἱ ἢ κρηκίαν καλεῖσιν, ἐπεὶ δὴ δοκεῖ ἢ ῥίζα φίλτρον εἶναι ποιητικὴ· ἐστὶ ἢ αὐτῆς ὁ μόνος τις θῆλυς ὁ μέλας θριδακίας καλούμενος· φύλλα ἔχων σενώτερα καὶ μικρότερα θριδακος, βερμώδη καὶ βαρὴα κατὰ πύλιν, κεχυμύα δὲ ἐπὶ γῆς καὶ παρ' αὐτὰ μῆλα οὖοις ἐμφεσθῶν, ὡχρὰ, ἐυώδη, ἐν οἷς καὶ καρπὸς ὡς περ ἀπίου· ῥίζα ἐυμεγέθης

δύο ἢ τρεῖς, ἀντιμπεπλεγμέναι
 ἐμύκηται μέλαινα καὶ πῦν ἐπι-
 φάνεια, ἐνδοθεν λευκαὶ καὶ παχύ
 φλοιοὶ χαυλὸν δὲ ἐξέφρη. Τῷ δὲ
 ἄρρεος καὶ λευκῷ, ὃν ἐνιοὶ νώρειον
 5 ἐκάλεσαν, φύλλα ὅσῃ μεγάλα,
 λευκὰ, πλατέα, λεῖα καὶ ἀσπ-
 τή. τὰ δὲ μύλα διπλάσια,
 κροκίζοντα τῇ χροίᾳ, ἐσώδη μὲν
 ἑσάρεις πνύς ἂ καὶ ἐπίοντες οἱ ποι-
 μένες ποσὺς ὑποκαρουῦνται ῥίζα
 10 δὲ ὁμοία τῇ πρὸς αὐτῆς, μείζων
 δὲ καὶ λευκότερα ἄκαυλος δὲ καὶ
 αὐτῇ. Χυλίζῃ δὲ ὁ φλοιὸς τῆς
 ῥίζης χλωρὸς κοπεῖς καὶ ὑποτε-
 ποτεῖς περὶ τὴν διεσπείη ἡ λεόγαντας
 μὲν τὸ συσραφῆναι ἀποτίθειται ἐν
 15 ὁσρακίῳ ἀργεῖο· χυλίζεται δὲ καὶ
 τὰ μύλα ὁμοίως, ἀντιμύρον δὲ γί-
 νεται τὸ ἐξ αὐτῶν χύλισμα. καὶ ὁ
 φλοιὸς δὲ τῇ ῥίζῃς περιαρθεῖς καὶ
 διαβληθεῖς λίνῳ, κρεμᾷ δὲ εἰς ἀ-
 πύθεσιν. ἐνιοὶ δὲ καὶ τοῦτον οἶνω
 20 παρὰ ῥίζας ἄχρι βίτης, καὶ διυλίζ-
 τες ἀποτίθειν· χρωμῆροι ἐπὶ τῷ
 ἀργύπνῳ καὶ περὶ διωόντων κυδ-
 δω ἐνὶ, καὶ ἐφ' ὧν βέλονται ἀναι-
 δησίαν τεμπομύρων ἢ χαμομύρων
 πύθεσιν. ὁ δὲ ὅπως ποθεῖς ὁβολῶν
 25 διὸν πλήθος ὁλκῆς, σὺν μεμικρά
 τῷ, ἄρα ἄνω φλέγμα καὶ μέλαινα
 χολὴν ὡς ἑλλέβορος· πλείων δὲ πο-
 θεῖς ἐξ ἀργύρου (λίω, μύρον) καὶ εἰς
 τὰς ὀφθαλμικὰς καὶ ἀνωδύνους δι-
 νάμεις, καὶ περὶ τοῖς μαλακτικαῖς.
 καὶ

binis, ternisve, inter se conuo-
 lutis, nigris foris, int^o albis, cras-
 so cortice vestitis: caule viduus
 est. Alter candidus, qui mas di-
 citur, nonnullis norion vocita-
 tus: huius folia magna, alba, la-
 ta, lævia vt betæ: mala quàm al-
 terius duplo maiora, colore in-
 crocum inclinante, iucundè
 cum gravitate quadam olen-
 tia: quorum pomorum cibo,
 aliquantum opiliones fopora-
 tur. radix, alterius similis, ma-
 ior & cādidiior, orbata & hæc
 caule. Succus fit è cortice re-
 cētis radicis tuso, & prelis sub-
 iecto: qui insolatus vbi con-
 creuerit, fictili reconditur. Ma-
 lis quoq; succus depromitur,
 sed aliquanto ignauior. Deli-
 bratur radix, & traiectus lino
 cortex, ad vsum suspenditur.
 Aliqui radices in vino ad ter-
 tias coquunt, & defœcatū ius
 seruant: cyatòque vno vtun-
 tur, in peruigiliis, & doloribus,
 & ante sectiones vñtionésque
 ne sentiantur. Succus duobus
 obolis ex mulso potus, vt ve-
 ratrum, per vomitiones bilem
 atram pituitámq; extrahit: ve-
 rùm potu largiore, vita adi-
 mitur. medicamentis oculari-
 bus, & his quæ dolores finiunt,
 pessis quoque emollientibus,

DIOSCORIDIS

admiscetur: semijoboli pódere indit⁹, per se mēses & part⁹ expellit: subdit⁹ sedi p balano, so-
mnificus est. Radix ebur emol-
lire fertur, q̄ senis horis cū eo
decocta sit: & ad accipiēdam,
quam effingere optaueris, for-
mā, ipsū facile prestat. Folia re-
cētia cōueniēter oculorū inflā-
mationib⁹, & collectionibus,
quas vlcera citarūt, cū polenta
illinunt: duritias omneis suppu-
rationes, strumas, & tubercula
discutiūt: stigmata sine exulce-
ratioe delēt, si quis senisve die-
b⁹, sensim perfricent. Folia ser-
uant in muriis, eosdē ad vsus.
Trita radix ignib⁹ sacris ex ace-
to, & serpētium ictib⁹ ex mel-
le aut oleo, medetur: strumas
atq; tubercula, cum aqua dissi-
pat: articulorū cruciatus, cū po-
lēta sedat. Fit citra coctionem
vinū ē cortice radiceis, ad hunc
modum: Ternæ minæ in vini
dulcis metretam coniiciuntur.
Dantur ex eo terni cyathi, iis
q̄ secari aut amburi debent, vt
antē dictū est: siquidem nullo
tūc afficiūtur dolore, sed veter-
no quodam pressi, torpescunt.
Mala soporē afferūt olfactu, &
etiā si mandātur: item expres-
sis ex eis succus: nimio tamen
odore percussi, obmutescunt.

Semen

καθ' ἑαυτὸν δὲ ὅσον ἢ μισθολον
πρεσεδεῖς, ἐμμύλω καὶ ἐμβρυα-
ῶν, σακτυλῶ τὲ ἀντὶ βαλάνου
ἐπιτρεῖς ὕπνον ποιεῖ. μαλάσκει
ἢ καὶ ἐλεφανταλέγει ἢ ῥίζα συν-
εφομένη αὐτῷ ἐπὶ ὄρας ε'. καὶ σὺ-
πλᾶσεν αὐτ' εἰς ὃ αὐτὸς βελήθη
ῥῆμα παρσθενάζει. τὰ δὲ φύλ-
λα πρὸς ὄφθαλμοὺς ἀρμόζει πρὸς τε
ὀφθαλμῶν φλεγμονάς, καὶ ταῖς
ἐπὶ τῶν ἐλκῶν καὶ ἀλφίτου κα-
ταπλάσσειν. διαφέρει δὲ καὶ
πᾶσαν σκληρίαν καὶ ἀπασήμα-
τα, χοιρέας, φύματα παρσπει-
βόμενα πρὸς συχρῆ ἐπὶ νύκτας ε' ἢ
ε'. σῆματα αὖτε ἐλκουῖ ἀ-
φανίζονται. χυδέντα δὲ τὰ φύλ-
λα, ἀποπίπτει πρὸς ταῖς αὐτὰς ἰσ-
χρείας. ἢ δὲ ῥίζα συνὸ ὄξει λεία,
ἐρισπύλατα ἰάται. πρὸς δὲ ἐρ-
πετῶν πληγὰς, συνὸ μέλιτι ἢ ἐ-
λαίῳ: συνὸ ὕδατι δὲ χοιρέας καὶ
φύματα διαχεῖ. καὶ ἄρδρων πόν-
τοις παύει μετὰ ἀλφίτων. σκευά-
ζεται δὲ καὶ δι' ἡμέρας οἶνος
ἐν τῷ φλοιῷ τῆς ῥίζης. δεῖ δὲ ἐμ-
βάλλειν μύσας γ'. εἰς μετρητῶν οἶ-
νου γλυκέος, διδέναι τε ἐξ αὐτῆς
κυάδος γ'. τοῖς μέλλουσι τέμνειν.
ἢ καίεσθαι ὡς πρὸς ἰσχυρῶν, οὐ γὰρ
ἀνίσταται μισθολονταῖς τὸ ἀλγὺματός
διὰ τὸ καταφέρειν. τὰ δὲ φύλλα
ὀσφραίνονται καὶ ἐπιόσφραίνονται κατὰ
πλάτῃ καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν χυλός. πλεον-
ναδέντα δὲ καὶ ἀφώγους ποιεῖ.

τὸ δὲ

τὸ δὲ σπέρμα τῶν μύλων ποδῶν,
 ὑτέρῃ καὶ αἰρεῖ· περσεῖν δὲ
 μετ' ἀπύρου δαίρου ροῦν ἴσησιν
 ἐνυδρόν· ὁπίζεταί δὲ περ χαλα-
 τολοῦνς τῆς ρίζης πολυειδῶς, καὶ
 5 τὰ συρρέοντες εἰς τὴν κοιλοτήτα
 συλλεγόμενον. ἔστι δὲ ἐνεργέστερος
 τῆς ὁποῦ ὁ χυλός· οὐκ ἐν παντὶ δὲ
 τόπω φέρεσιν ὅπῃ αἱ ρίζαι, ὑ-
 ποδείκνυσιν δὲ τὸ τοῦτον ἢ περ-
 10 ρα. Ἰσορῶσι δὲ καὶ ἑτέραν μώ-
 ριον λεγομένην, φουμένην ἐν
 παλινκίσι καὶ περ τὰ ἄντρα·
 φύλλα ἔχουσαν ὁμοία τῷ λευκῷ
 μανδραγόρα· μικρότερα δὲ ὥς
 σπιδαιμαῖα, λευκά, κύκλω περ
 τὴν ρίζαν, οὖσαν ἀπαλῶ καὶ
 15 λευκῶ, μικρῶ μείζονα σπιδαι-
 μῆς πείρος δακτύλου μεγάλῃ.
 φασὶ πνομένην ὅσον < αἰ· ἢ με-
 τὰ λήφιδων ἐπιονμένη ἐν μύ-
 ζῃ ἢ ὄψῳ, ἀπομωρῶν καὶ δεύ-
 20 ρει γὰρ ὁ ἀνθρώπος ἐν ᾧ περ ἂν
 φάρι· ὅλματι, αἰθανόμενος οὐ-
 δένος ἐπὶ ὥρας γ'. ἢ δ'· ἀφ' οὗ
 περ ἂν περσενέγκται. χερῶνται
 δὲ καὶ ταύτῃ οἱ ἰατροὶ ὅταν τέ-
 μνειν ἢ χαίειν μέλλωσι. φασὶ δὲ
 καὶ ἀντίδοτον εἶναι τὴν ρίζαν
 25 πνομένην μετὰ σπύρχου τῆς κα-
 λουμένης μαρικοῦ.

Πρὶ Ακόνιτε. Κεφ. οζ'.

Ακόνιτον, οἱ δὲ, παρδάλια χέεις,
 οἱ δὲ, χάμμορον, οἱ δὲ, θηλυφο-
 ρον, οἱ δὲ, μυοκτόνον* περσφόνον.

φύλλα

Semen malorum potum vul-
 uas purgat: appositumq; cum
 sulphure ignem non experto,
 rubra foeminarum profluvia
 sistit. Scarificata punctisq; mul-
 tifariam aperta radice, erum-
 pens lachryma, cauo vase re-
 cipitur. Liquamentum autem
 succo lacteo præstātius est: sed
 non vbiq; ut experientia do-
 cet, radices lacteum succū de-
 lachrymant. Alium tradūt esse
 mādragorā, nomine morion,
 in opacis iuxta spec⁹ enatum:
 folijs albi mandragoræ, mino-
 ribus, albis, dodrantalibus, radi-
 cem ambiētib⁹: quæ mollis est
 & cādida, paulò maior palmo,
 pollicēq; crassitudine æquat.
 Tradūt eam in pane, offa, ob-
 foniōve, drachmæ pōdere de-
 uoratam, vsum rationis inter-
 cipere. Obdormiscit enim ho-
 mo, eo ferè quo comederit ha-
 bitu, sensus impos, ternis qua-
 ternisve, ex quo data est, horis.
 Hac medici vtūtur, cū scindē-
 di vrēdiq; necessitas adest. An-
 tidotū esse volunt radicē, cum
 manico solano potam.

Aconitum. Cap. LXXVII.

ACONITVM, aliqui
 pardalianches, alij cammoron,
 alij theliphonon, alij myocto-
 non, alij theriophonon vocāt:

E iiij folia

DIOSCORIDIS

folia habet cyclamini, aut cucumeris, tria aut quatuor, minora & subhirsuta: caulem palmo altū: radix scorpij caudam emulatur, & alabaſtri modo ſplendet. Torpeſcunt, vt fama eſt, ſcorpiones admota radice, ſtupētq; qui rurfum hellebori cōtactu excitantur. Oculorum medicamentis leuandi doloris gratia adiicitur: Enecat pantheras, ſues, lupos & feras omnes in carnibus obiectum.

Aconitū alterū. Ca. LXXVIII.

Eſt & alterū aconitū, qđ aliq̃ cynoctonon, aliq̃ lycoctonon appellāt. Huius genera ſūt tria: vñū, quo vtūtur venatores: alia duo in vſum ſuū vertere medici, è quib⁹ tertiu qđ Pōticū nominat, plurimū in Italia, mōtibus Iuſtinis exilit, à priore diſtās, qm̃ folia faciat effigie platanī, crebriore diuiſura, lōgiora, & multò nigriora: caulē ſiſciliſ pediculo ſimilē, nudū, cubitali altitudine, aut ampliōrē: ſemē in ſiliq̃s oblōgis recōdit: radices in modū ſquillæ marinæ cirrorū nigreſcūt. Quib⁹ ad venationem luporū vtūtur, infertæ ſiquidē crudis carnibus, & deuorata, lupos enecant.

Cicuta. Cap. LXXIX.

Cicuta caulē ædit geniculatū,

φύλλα ἔχει τεῖα ἢ τέσσαρα, ὁμοία κυκλαμίνῳ ἢ συκίῳ, μικρότερα δὲ καὶ ὑποτρύχέα· χαυλὸς δὲ σπιθαμῆς ῥίζα ὁμοία σκορπίου ἔρῃ, σίλβουσι ἀλαβαστροειδῶς. Τέτε ῥίζαν φασὶ πρὸς σαρχεῖσαν σκορπίῳ, παραλύειν αὐτόν· διεγείρεται δὲ πάλιν ἐλλεβορου πρὸς ἐξέντος. μίγνυται δὲ καὶ ὀφθαλμικῇς ἀνωδυνοῖς δυνάμεσι. κτείνῃ δὲ καὶ παραδάλεις καὶ σὺς καὶ λύκοις καὶ παν̄ θηρίῳ κρεαδίῳ· ἰσθμὶ δὲ ἐν πιδέμεθρον καὶ παραβαλλόμεθρον.

Πρὶ ἑτέρῳ ἀκονίτι.

Κεφ. οἱ.

ΑΚΟΝΙΤΟΝ ἑτέρον, ὃ ἔθιοι κυνοκτόνον, οἱ δὲ λυκοκτόνον καλοῦσι. ἤνυσται μὲν ἰς πελῆσον ἐν ἰταλίᾳ, ἐν τοῖς χαλουμένοις* ἰουστίνοις ὄρεσι διαφύειν τὸ πρὸς αὐτῇ· φύλλα δὲ ἔχει ὁμοία τοῖς τοῦ πλατάνου, μᾶλλον δὲ ἐπεχρησμένα καὶ μικρότερα, πολλῶ καὶ μεκάντε- 20 ρα· χαυλὸν δὲ καδὰ πρὸς πῖειδος, μόρον ψιδόν, ὕψος πύχως, ἢ καὶ μείζονα· καρπὸν δὲ ἐν λοβοῖς ἐπιμήκεισι ποσῶς· ῥίζας ὡς πρὸς πελεκτάνας καρίδων μελαίνας· αἷς χερῶνται πρὸς τὰς 25 λύκων θηρῶς, ἐν πιδέντες κρέασι, ὡμοῖς. βρωθεῖσα γὰρ ὑπὸ τῶν λύκων, ἀναμῖξιν αὐτούς.

Πρὶ Κωνείν. Κεφ. ο.β.

Κώνηον χαυλὸν ἀγίνισι γοναπόδη

ὡς μάραθρον, μέλαν, φύλλα δὲ
 καύθητι ἐμφερῆ, στενότερα δὲ καὶ
 βαρύτερα. ἐπ' ἄκρων δὲ ἀπο-
 φύσεις καὶ σκιάδια· αὐτὸς ὑπό-
 λευκον· σπέρμα ἐμφερές ἀνίστα,
 5 λευκότερον· ῥίζα κοίλη καὶ οὐ
 βαθεῖα. Ἐστὶ δὲ καὶ αὐτὸ τῶν
 φαρμακῶν, κατὰ Ἰβήην ἀναρῶν.
 βοηθεῖται δὲ ἀκράτω· χυλίζον-
 ται δὲ τὰ ἄκρα παρὰ τοῦ ξηραν-
 θῆναι τὸ σπέρμα, ἢ ἡ κόμη, καὶ
 10 ἐκθλίβεται κοπιόμην, καὶ συσφί-
 ρεται ἐν ἡλίῳ· ἔστι δὲ πολὺ χρῆσιν
 εἰς τὴν ὑγιαστικὴν χρῆσιν ξηραν-
 θέν· μνηστῆρον ἐπιτηδείως τοῖς
 ἀνωδυνόις κολληείοις τὸ χύλι-
 μα· ἐρπεταί τε καὶ ἐρσιπέλατα
 15 κατὰπλασθέν σβέννισιν· ἢ δὲ πᾶσα
 καὶ ἡ κόμη λεῖα κατὰπλασθόμε-
 νη τῶν διδύμων, ἐν ῥώτοις βο-
 θεῖ· παείησι δὲ καὶ αἰδοῖα κα-
 τὰπλασθέντα· καὶ γάλα σβέννισι,
 μασούς τε ἐν παρθενίᾳ κολλύει
 20 αὐξέειν, καὶ διδύμοις ἀπρόφοις
 ποιεῖ ἐπὶ παιδίῳ· ἐνεργέστατον
 δὲ ἔστι τὸ κρητικὸν καὶ μεγαρι-
 κὸν καὶ τὸ ἁπικὸν, καὶ τὸ ἐν τῇ
 χίῳ καὶ κυλικῇ θηονόμῳ.

Περὶ Σμύλακος.

Κεφ. α'.

25 Σμύλαξ, οἱ δὲ, δύμαλον, ῥω-
 μαῖοι ᾧ τάξον καλεῖσι, δένδρον ἐστὶ
 παραπλήσιον ὅσπερ τοῖς φύλλοις καὶ
 μεγέθει, ἐν ἰταλίᾳ καὶ ἐν ναρβωνίᾳ
 τῇ κατὰ τὴν ἰσπανίαν θυονόμῳ.

vt foeniculi grādē, folia ferulæ,
 angustiora, graui odoratu: ra-
 mi, mox umbellę in summo p-
 deūt: flores quoq; albicātes: &
 semē aniso cādidius: radice nō
 alta, cōcaua. Cicutæ letale ve-
 nenū inest, suāq; vi refrigerato
 ria necat. Remedio est vini me-
 raculi potus. Succ⁹ exprimitur
 cōtulis cacuminibus, priusquā
 femina & comē siccescāt, q; so-
 le dēfatur in pastillos. Mult⁹ ad
 medendi rationē vsus est aridi:
 cōmodē miscet collyriis, q; le-
 uādi doloris gratia tēperātur:
 ignes sacros, & vlcera quæ fer-
 pūt, illitu restinguit. Herba cū
 coma trita, & testib⁹ circūlita,
 libidinū imaginationes in som-
 no, cōpescit: sed genitale resol-
 uit. lac puerperarū māmīs ap-
 posita extinguit: in virginitate
 māmās coērcet, & in crescere
 nō patit: pueris prestat, vt eorū
 testiculī cibū nō sentiētes, inta-
 bescāt. Efficacissima vis Creti-
 cæ, Megarési, mox Atticæ, & in
 Chio & Cilicia nascenti.

Taxum. Cap. LXXX.

SMILAX à Græcis, ta-
 xus à Latinis appellatur, ar-
 bor abietis magnitudine, &
 foliorum eiusdem figura, in
 Italiā & Narbonensi Gallia
 Hispaniæ contermina nascent.

Auicu-

DIOSCORIDIS

Auiculæ quæ Italicæ taxi bac-
cas deuorant, denigrantur : &
qui ederint easdē homines, al-
ui profluuiio corripit̃ur. Nar-
bonæ tam præsentis est vene-
ni, vt si qui dormiāt sub ea, aut
eius vmbra subsideant, lædan-
tur, & sæpenumero morian-
tur: quare de taxo hæc tradun-
tur, vt ab ea caueamus.

Apocynum. Cap. LXXXI.

Apocynon, siue cynocrābe,
brassica canina, frutex est lon-
gis viticulis cōstans, malè olēti-
bus, lētis, vitiliumq; modo ob-
sequiosis, fractu ferè inuictis:
folio hedere, molliore tamē, &
per extremū acutiore, lēto, gra-
ui odore: id luteo succo tur-
get. Siliquæ, ceu fabarū, follicu-
lari specie, digiti longitudine
protenduntur: semine intus al-
bo, duro, paruo. Folia cum adi-
pe in panes coacta, canes, lu-
pos, vulpes, & pantheras ene-
cant, in cibo data, & protinus
eorum coxendices resoluunt.

Neriū, seu rhododendrū.

Cap. LXXXII.

Nerion aliqui rhododaph-
nen, alij rhododendron vocāt,
frutex est vulgaris notitiæ, lon-
gioribus quàm amygdala fo-
liis, crassioribusque. flore in ro-
sam conformato: fructu nuci
græcæ

τοῦ δὲ ἐν ἰταλίᾳ γλυνωμένου τὸν
καρπὸν ὀρνίδια ἐδίδοντα, μελάνε-
ται· οἱ δὲ προσενεγκάμενοι, διαρ-
ροίαις περὶ πῆποισι. τὸ δὲ ἐν τῇ ναρ-
βωνίᾳ, τοσαύτης δυνάμεως μετέ-
χει, ὥς καὶ ἐν τῇ σκιά τῶς ὑπο-
καθίσαντας ἢ κοιμυζέοντας βλά-
πτειναι, πολλάκις δὲ καὶ θήσκειν.
ἰσορεῖται δὲ πρὸς αὐτῆς χάειν τὸ
προφυλάττειν.

Περὶ Αποκύνου. Κεφ. πα.

Απόκυνον, οἱ δὲ, κύναρχον, οἱ 10
δὲ, παραδισαχῆς, * οἱ δὲ κυνό-
μορον, οἱ δὲ κυνοκράμβη καλοῦ-
σι, ἕξνος ὅτι ῥάβδοις ἔχων μα-
κρά· λυγρόεις, δυσπράστοις, φύλ-
λα κυνῶ ὅμοια, μαλακώτερα
δὲ καὶ ὀξύτερα κατ' ἄκρον, βα- 15
ρύσομα, ὑπόγλυρα, ὅπου μετὰ
μυλίνου· καρπὸς δὲ ὥσπερ λοβὸς
κυνάμων πρὸς δακτύλῳ τὸ μῆκος,
δυσλακώδης· ἐφ' ὃν σπερμάτια,
σκληρὰ, σμικρὰ, μέλανα. ταύτης
τὰ φύλλα σὺν σέατι ἀρτοποιηθέν- 20
τα καὶ παραβληθέντα, κτείνει κύ-
νας, λύκοις, ἀλώπεκας, παραδά-
λεις· παραχρήμα δὲ παραλύνει
αὐτῶν τὰ ἰχθῆα.

Περὶ Νηείου.

Κεφ. πε.

Νήειον, οἱ δὲ, ῥοδιδάφνη, οἱ δὲ,
ῥοδιδένδρον, δάμνος γινώμενος,
ἀμυγδαλῆς μακρότερα καὶ πα-
χύτερα ἔχων φύλλα. τὸ δὲ αἰ-
σῶς ῥοδιδέες· καρπὸν δὲ ἐμφρῶν ἀ-
μυγδαλῶν 25

μυγδάλω, ὡς κέρει ἀνεωγμέ-
νον, πλήρη ἐριώδους φύσεως, ὁ-
μοίων τοῖς ὑακινθίοις πάσποις·
ῥίζα δὲ ἄπεξυς καὶ μακρά, ξυ-
λώδης, γυσαμύρῳ ἀλμυρά. φύε-
ται ἐν παρὰ δέισις καὶ παρὰ θα-
λασίοις τόποις καὶ παρὰ ποτα-
μοῖς. Διυάμιν δὲ ἔχει τὸ αἶθος
καὶ τὸ φύλλα, κυνῶν μὲ καὶ ὄνων καὶ
ἡμιόνων καὶ τῶν πλείστων τετραπόδων.
δὲ ζώων φαρμακίῳ· ἀνδρώπων
10 ὃ σπασίην σὺν οἴνῳ πινόμενα πρὸς
δύγματα θηρίων καὶ μᾶλλον εἰ
πυλαῖα παρὰ μίξεως· τὰ δὲ ἄδε-
νέστερα τῶν ζώων ὡς αἶγες καὶ κρη-
νέες, ἐπὶ τὸ ἀπύρεγμα αὐ-
τῶν πῆρ ἀπαθνήσκει.

15 Περὶ μυκήτων.
Κεφ. πγ'.

Μυκήτων διαφορὰ διττή· ἢ
γὰρ βρώσιμοι εἰσὶν, ἢ φαρμα-
κοί. παρὰ πολλὰς δὲ αἰτίας
γίνονται τοιοῦτοι, ἢ γὰρ ἡλοῖς
20 καρπωμοῖς, ἢ ῥάκεσι σεσηπό-
σιν, ἢ σφύπτων φωλεῖς παρὰ
φύονται, ἢ δένδρεσιν ἰδίως βλα-
στικαὶ φέρουσι τοὺς καρπούς·
ἔχουσι δὲ καὶ γλοιώδη οἱ τοιοῦ-
τοι ὅππασιν· κατὰ τὰς δέντες δὲ
25 μετὰ τὸ ἀφαιρεθῆναι, ταχέως
διαφθείρονται σηπόμενοι, οἱ δὲ
μὴ τοιοῦτοι ζωοποιοὶ, ἢ δέεις·
πλεοναδέντες μὲρ τοι καὶ οὐ-
τοι βλάπτουσι δυσπεπτούμενοι,
πρίοντες ἢ χολέραν ἐπάγοντες.

βον-

græcæ simili, corniculato, qui
patefactus quandam lanosam
naturam ostendit, spinarum
pappos repræsentantem, radi-
ce longa, acuta, lignosa, gu-
stanti falsa : nascitur in amœ-
nis, maritimis, & secus amnes.
Flores & folia mulis, canibus,
afinis, & quadrupedum pluri-
mis venena sunt : hominibus
verò contra serpentium mor-
fus præsidia, è vino pota : eo
magis ruta addita : imbecillæ
etiam animantes, vt pecus &
capræ, si aquam bibant, in qua
folia ea maduerint, moriuntur.

Fungi. Cap. LXXXIII.

Fungorū differentia duplex:
aut enim māduntur, aut perni-
ciales sunt. Multis de causis ve-
nenosi gignūtur, vbi videlicet
clauus ferre⁹, in quo sit rubigo,
aut pāni marcor adfuerit, aut si
iuxta serpētis cauernā, arboréf-
ve, quæ priuatim pariūt noxios
fructus, erumpāt. Continēt qui
tales sunt, nescio quod strigmē-
tū concretāmq; pituitā, terrā-
que eruti, quam celerrimè cō-
putrescunt, atq; marcore vitiā-
tur. Sed qui veneno imbuti nō
sunt, suauē in iuribus gratiā ha-
bēt: largius tamē sumpti nocēt,
& ægrius concocti strangulāt,
aut choleram morbum citant.

Reme-

DIOSCORIDIS

Remedio est nitri pot^o, aut lixi-
uiū cū acida muria, aut feruefa-
ctæ fatureiæ, aut origani iuscu-
lū: debellātur etiā gallinacei fi-
mi potu ex aceto, aut eiusdem
delinctu cū melle multo. Cor-
pus alunt, sed ægrè dissoluūtur:
cū magna ex parte integri ipsi,
cum recremētis alui reiiciātur:

Colchicū. Cap. LXXXIII.

Colchicon, aliqui epheme-
ron, sunt qui agrestē bulbū vo-
cant, autumnī exitu florē ædit
croci, candicantem, ab eo tem-
pore, folia bulbi, sed pingui-
ora: caulē palmo altum, ferētem
rufum: semen: radicem foris è
nigra rufescētem, quæ delibra-
ta, cādida & mollis spectatur,
lacteο succo madet, atque gu-
stato dulcis inuenitur: bulbus
eius mediam habet rimam, fis-
surāmque, qua flos erūpit: plu-
rimum in Messenia, & Colchis
enascitur. Ea comeſa, fungo-
rum more, strangulando ene-
cat. Hanc autem depinximus,
ne à quoquā imprudenter pro
bulbo deuoretur: mirum enim
in modū saporis voluptate im-
peritos allicit. Remedio sunt
eadem quæ fungis: bubulum
etiam lac potū auxiliatur. ita-
que cum adfuerit, nō aliud de-
sideratur auxilium.

Ephe-

βοηθουῦται δὲ πάντες ποτιζόμε-
νοι νίτρω ἢ κονίᾳ, μετὰ ὀξάλμης,
ἢ σύμμερας ἀποζέματι, ἢ οὐρί-
αν, ἢ ὀρνιθεῖω κόπρω μετ' ὅμοις
πινόμενοι, ἢ μέλιτι ἐκλειχόμε-
νοι πολλῶ. τρώφιμοι δὲ εἰσὶ καὶ
δυσδιάλυτοι. ὀλοχερεῖς δὲ ὡς ἐ-
πιτοπολὺ σὺν τοῖς περὶ τῶμασιν
ἀποδίδονται.

Περὶ Κολχικοῦ. Κεφ. πδ'.

Κολχικόν, οἱ δὲ, ἐφήμεσαν, οἱ
δὲ βολβὸν ἄρειον, λήγοντος τοῦ
φθινοπώρου ἀνίστην αἴδος ὑπό-
λευκόν, ὁμοίον κρόκου αἴδει. ὕ-
στερον δὲ τὰ φύλλα φέρει βολβῶ
παρὰ πλῆσιν, λιπαρότερον. καυ-
λὸν σπιθαμαῖον, καρπὸν ἔχοντα
πυρρόν· ῥίζαν φλοιὸν ἔχουσαν. ἔγ-
κηρρόν ἐν τῷ μέλανι, ἢ πρὸς λεπι-
ζομένη λευκὴ καὶ ἀπαλὴ καὶ ὁποῦ
μεσθὴ εὐείσεται καὶ γλυκεῖα. ἔρ-
χει δὲ ὁ βολβὸς διάφισιν μύσιν
καθ' ὧν τὸ αἴδος ἀφίησι. ἦν ὁ
τὸ δὲ πλείστον ἐν τῇ μεσσηνίᾳ. 20
καὶ κόλχῃς. βρωδεῖσα δὲ κτείνει
κατὰ τὸν πινυμὸν ὁμοίως μύ-
κησιν. Ανερχόμενον δὲ αὐτῷ
ἵνα μὴ λάθῃ βρωδεῖσα αὐτὴ βολ-
βοῦ· παρὰ δόξας γὰρ ὅστιν ἐπακτι-
κὴ διὰ τὴν ὑδρονύχου τοῖς ἀπεί- 25
ρεσις. βρωδεῖ δὲ τοῖς φαρυγγί-
οις καὶ τοῖς μύκητας φαρυγγί-
οις καὶ τῶν βόειον πινόμενον. ὡς τε ὁ-
ταν παρῇ τοῦτο, μηδενὸς ἄλλου
δεῖσθαι βοηθήματος.

Περὶ Εφη-

Περὶ Εφημέρου. Κεφ. αΐ.

Εφήμερον, οἱ δὲ, ἵεν ἀρείαν,
 φύλλα καὶ καυλὸν ὁμοία ἔχει κρί-
 νω, λεπτότερα δὲ ἀπὸ λευκῆ, πι-
 κρὰ, ἡερπὸν δὲ μαλακὸν· ῥίζα δὲ
 5 ὑπὲρ σακτύλου πάχος μία, * μα-
 κρὰ, συπικνὴ, ἐυώδης· φύεται ἐν
 δρυμοῖς καὶ παλιταίοις. Τούτου ἡ
 ῥίζα ὁδονταλγίαν ἔχει φάρμα-
 κὸν διακλυζομένη. τὰ δὲ φύλλα
 ἐν οἴνῳ ἐψηθέντα καὶ καταπλα-
 10 σθένει οἰδήματα καὶ φύμαλα δια-
 φορεῖ, μύπω ὕγρον ἔχοντα.

Περὶ Ελξίνης. Κεφ. ας΄.

Ελξίνη, οἱ δὲ, παρθένοιον, οἱ δὲ,
 σιδνεῖπν, οἱ δὲ, ὑράκλειαν, οἱ δὲ,
 ἀσυείαν, οἱ δὲ, ὑμνὸν ἀρείαν, οἱ
 15 δὲ, κλισάδιον, οἱ δὲ, πελυνουμιον
 καλεῖσθαι· ἐπὶ θρηγοῖς καὶ τοί-
 χους· καυλίαν δὲ ἔχει λεπτὰ, ὑερ-
 δρα· φύλλα ὁμοία λινὸς ὥσει, δα-
 σέα· ὡς δὲ τὰς καυλὸς οἰογὲ ἀπερ-
 μάπα βαχέα, ἀνπλαμεανόμενα
 20 τῇ ἰματίῳ. Διώαμν δὲ ἔχει τὰ
 φύλλα συπικνὴν, συπικνὴν ὅθεν κα-
 ταπλασόμενα ἰατρῇ ἐρισπέλαια,
 κονδυλώματα, καὶ ἀκαυμάτια, φύ-
 μεθλα ἀρχόμενα, καὶ πᾶσι φλεγο-
 νῆν καὶ οἰδήματα· ὃ δὲ χυλὸς αὐτῆς
 25 μυχὸς ψιμυιδίῳ, ἐρισπέλαια καὶ
 ἐρπιδας ὡφθεῖ καταχευόμενος, καὶ
 ποδάγρας σὺν κηρωτῇ κυπρία ἀ-
 ναλφθεῖς ἢ τραχείῳ ἑσέπῃ, ὡφε-
 λεῖ καὶ βήτηντας χρονίως ὁ χυ-
 λὸς καταρροφόμενος ὅσον κύαθος,
 καὶ

Ephemerū. Cap. LXXXV.

Ephemeron, aliqui sylvestre
 irin appellant, folia habet lilij,
 sed tenuiora: caulem parem:
 florem candidum, amarum: se-
 men molle: radicem vnam, di-
 gitali crassitudine, longam, ad-
 stringentem, odoratam: nasci-
 tur in syluis & opacis. Huius
 radix dentibus præcipua, si de-
 cocto colluatur. Folia in vino
 cocta, discutiunt tumores, & tu-
 bercula, quæ nihil adhuc humi
 di contraxerunt.

Helxine, id est, muralis her-
 ba. Cap. LXXXVI.

Helxine nascitur in parieti-
 nis, sepibus, vineis & segeti-
 bus: folia ei mercurialis insunt,
 hirsuta: cauliculi subrubentes,
 & circa eos veluti semina as-
 spera, adhærentia vestibus. Fo-
 lia refrigerandi spissandique na-
 turam habent, qua ex causa sa-
 nant illitu sacros ignes, adusta
 condylomata, panos incipien-
 tes, tumores, inflammationes-
 que. Succus eius cum ceru-
 fa, ignibus sacris, & vlceri-
 bus quæ serpunt, commodè il-
 linitur, imponiturque poda-
 gris cum hircino adipe aut ce-
 rato cyprino: veterem tussim
 emendat instar cyathi haustus:
 consil-

DIOSCORIDIS

ton illis inflammatione sentiē-
tibus vtiliter & gargarizatur, &
oblinitur: auriū dolorem cum
rosaceo instillatus leuat.

Alcine. Cap. LXXXVII.

Alfinen, aliqui anthillion, nō-
nulli myos ota vocant, quoniā
musculorū aures folia imitan-
tur. Lucis opacisq; gaudet, vn-
de alfine dicta est. Hęc erat ea-
dē quæ helxine, nisi humilior
esset, & foliis minorib⁹, nec hir-
futa. cū teritur odorē cucumis
reddit. Vim refrigerādi, astrin-
gēdiq; obtinet: oculorū inflam-
mationibus cū polēta illinitur.
Succus auriū doloribus infun-
ditur: quin & emēdat oīa quæ
helxine, id est, muralis herba.

Lens palustris.

Cap. LXXXVIII.

Lens palustris, inuenitur in
aqua non fluente, muscus len-
ticulæ similis, refrigeratoriæ
naturæ. Propter quod conue-
nienter collectionibus, igni sa-
cro, & podagris, illinitur per
se, & cum polenta: glutinat,
& procidentia puerorum in-
teranea.

Semperuiuum magnū, seu
sedū. Cap. LXXXIX.

Semperuiū magnū ideo no-
minatur, quoniā perpetuò fo-
lia vireant: cuius caules cubiti
alti-

ἢ περιθμίοις φλεγμαίνουσι ἀν-
ταρραχίσμα ἢ διάρχισμα ὠφέ-
λιμὸν ὄντι· καὶ ὠταλίαν συν ῥο-
δίνῳ ἐγχεόμενον ὠφελεῖ.

Περὶ Αλσίνης. Κεφ. πζʹ.

Αλσίνη, οἱ δὲ, μὲν ὧτα, ἀπὸ τʹ ἔ-
χειν φύλλα ὁμοία μὲν ὧτις.
ἀλσίνη δὲ, διὰ τὸ σιέροις ἢ ἀλ-
σώδεϊς φιλεῖν τόποις.. πόα ὅτιν ὁ-
μοία ἐλξίνη, ταπεινότερα δὲ καὶ
μακροφυλλότερα, καὶ οὐ διασιεῖα.
διατεφθεῖσά τε, συκίων ὄζει. 10
Δυνάμειν δὲ ἔχει ψυκτικὴν. συ-
πτικὴν· ἀρμόζουσιν πρὸς φλεγ-
μονὰς ὀφθαλμίων, μετὰ ἀλφί-
των καταπλασσομένη καὶ πρὸς
ὧτων πόνον ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐντα-
ζόμενος. καὶ κετόλου δυνάμει 15
τὰ αὐτὰ τῇ ἐλξίνῃ.

Πρὶ φακῶ τʹ ἐπὶ τʹ τελε-

μάτων. Κεφ. πηʹ.

Φακὸς ὁ ἐπὶ τʹ τελεμάτων, οὐ-
εῖσκεται ἐπὶ τῶν εἰσόμενων ὑδά-
των, βρύον ὃν ὁμοιον φακῶ, ψύ- 20
χων τῇ δυνάμει. πάσαις φλεγμα-
ναῖς ἢ ἐρισπέλασι ἢ ποδάγρας
ἀρμόζει καταπλαστέμενος, καὶ
ἐαυτὴν τε ἢ συν ἀλφίτῳ· παρ-
κολλᾷ δὲ καὶ ἐντεροκήκας τὰς
ἐπὶ παίδων. 25

Περὶ Αἰζώου τοῦ μεγάλου.

Κεφ. πθʹ.

Αἰζώον τὸ μέγα ὀνόμασται
διὰ τὸ αἰδαλεῖς τῶν φύλλων·
χλωροῖς δʹ ἀνίστοι πηχυαίοις, ἢ ἢ
μεῖζο-

μειζονας, πάχος δακτύλου μεγάλου, λιπαρού, ευθαλείς, εντομάς έχοντας ὡς ὅτι τὸ χασκίς πιθυμάλου φύλλα λιπαρά, μέγεθος δακτύλου μεγάλου, * γλωσσίδι κατὰ τὸ ἄκρον, καὶ τὰ μὲν κατὰ τέρμα τῶν φύλλων ὑψηλόμενα, τὰ δὲ καὶ πῦν κεφαλῇ περιστελλόμενα ἐπ' ἀλλήλα, κύκλον ὀφθαλμοειδῆ περιγράφοντα. φύεται δὲ ἐν τόποις ὄρεσι καὶ ὄρεσιν. ἔνιοι δὲ φυτεύουσιν αὐτὸ ἐπὶ τῶν οἰκημάτων. Δυνάμει δὲ ἔχει ψυκτικὴν, σύφουσαν, πιεῖν πρὸς ἐρισπέλαια, ἔρπτας, νομάς, ὀφθαλμῶν φλεγμονάς, πυνέλαια, ποδάγρας, καταπληκτικὴν τὸ μῆκος τὰ φύλλα καὶ ἑαυτὰ καὶ μετὰ ἀλφίτων. ὁ δὲ χυλὸς πρὸς κεφαλαλγίαν μετὰ ἀλφίτου καὶ ῥοδίνου ἐμβρέχεται. καὶ φλογιστοῖς ἐν ποτῶν δίδοται, καὶ διαῖται ῥοδίνῳ, καὶ δυσεντερικοῖς, σπογγύλαις τὸ ἔλκεος ἐκπνέσει σὺν οἶνῳ πιεῖς. ἴσθαι καὶ ῥοῦν γυναικείον ἐν περὶ τῶν ἐγχεῖται δὲ ὁ χυλὸς καὶ ἐπὶ τῶν ὀφθαλμῶν τῶν ὠφελίμως ἀπὸ αἵματος.

25 Περὶ Αἰζῶος τὸ μικροῦ.
Κεφ. 5.

Αἰζῶον τὸ μικρὸν φύεται ἐν τοῖς τοῖχοις καὶ πέτραις, καὶ ὄρεσιν καὶ τὰς τοῖς ὑποσπίοις, καὶ ἀπὸ μίας ῥίζης πολλὰ, λεπτὰ, ὡς

altitudinem implent, interdum excedunt, pingues, crassitudine pollicari, virentes, characixi thymali modo infecti: folia pin-
guia, carnosae, magnitudine pollicari, in cacumine linguæ similia alia in terram conuexa, alia in capite stantia inuicem, ita ut ambitu effigiem imitentur oculi: nascitur in montibus, & testaceis: supra domicilia etiam feritur. Eius vis refrigerare, & adstringere: medentur igni sacro, nomis, viceribus quæ serpunt, oculorum inflammationibus, ambustis igni, podagris per se, & cum polenta illita folia. Succus capiti, in doloribus, cum polenta aut rosaceo perfunditur: datur in potu contra phalangiorum ictus, dysenteriam, aluique profluvia: teretes tineas potus in vino excutit: subditus in vellere, mulierum abundantiam sistit: succus oculorum lippitudinibus, sanguinis vitio conceptis: inungitur.

Semperuium paruum.

Cap. XC.

Semperuium paruum in petris, parietinis, & maceris, nec non scrobibus opacis nascit, caulibus ab una radice multis, tenuibus, crebro

DI OSCORIDIS

crebro foliatis : exilibus foliis, rotundis, pinguibus, mucronatis : caule à medio emicante, palmum alto umbellam herbidosque flores, & tenues gerente. Folia eisdem cum priore viribus prædita sunt.

Semperuium tertium.

Cap. XC I.

Tertium videtur semperuii genus, quã aliqui andrachnen agriam, aut telephion vocauerunt, Romani illecebram, puffillis, crassioribusque foliis, hirsutis, portulacæ proximis: nascitur in faxis. Vis ei excalfactoria, acris, exulcerans: illita cum axungia strumas discutit.

Umbilicus Veneris.

Cap. XC II.

Cotyledon, siue umbilicus Veneris, folio est in acetabuli formam tornato, inevidenter concauo, breui in medio cauliculo, in quo semen inest: radice oliuæ modo rotunda. Succus cum vino circumlitus, instillatusve, contacta genitalia nudat: inflammationibus, facris ignibus, strumis, pernionibus, illitu auxiliatur: stomachi ardorem refrigerat. Folia cum radice comesta, calculos frangunt, urinam cient, hydropi-

δείπλεα φυλλαρίων περιφερών λιπαρών, μικρών, ὀξέων ἐπ' ἄκρῃ ἀγίνῃσι δὲ καὶ χαυλὸν ἐν μέσῳ περισπιδάμην τὸ μέγεθος, ἔχοντα σκιάδιον καὶ ἀνθὴ λεπτὰ καὶ χλωρά. τούτου τὰ φύλλα δυνάμειν ἔχει πλὴν αὐτῶν τῶ περιεπιρμόν.

Πεὶρ Αἰζώων ἑτέρου.

Κεφ. σά.

Δικεῖ δὲ εἶναι καὶ τείτον εἶδος αἰζώων, ὃ ἔνιοι ἀνδράχην αἰρίαν ἢ τηλέφιον ἐκάλεσαν, ῥωμαῖοι δὲ ἰοῖλλον ἐκάλεσαν· ἔχει δὲ αὐτὴ παχύτερα τὰ φυλλάρια πρὸς τὰ τῆς ἀνδράχνης καὶ δασέα. φύεται ἐν πέτραις. Δυνάμειν δὲ ἔχει διερμαντικὴν, δριμύτιαν, ἐλκωτικὴν· χοιράδων διαφορητικὴν σὺν ὀξυγυῖω καταπλασθέν.

Πεὶρ Κοτυληδόνης. Κεφ. σβʹ.

Κοτυληδὼν, οἱ δὲ, στυτάλιον, οἱ δὲ, κυμβάλιον, φύλλον ἔχει ὡς περ ὀξύβαφον, περιφερὲς, λεληδότης κοῖλον· χαυλὸν δὲ ἐν μέσῳ βραχὺ, ἐν ᾧ τὸ σπέρμα ῥίζαν ὡς ἐλαίαν στρογγύλην. Ταύτης καὶ τῶν φύλλων ὀχυλὸς μετ' οἴνου περιχειρόμενος, ἢ ἐγκυζόμενος, φύμῳι τῶν ἐν αἰδοίοις χαλὰ φλεγμονὰς τε καὶ ἐρυσιπέλατα καὶ χιμέτλας καὶ χοιράδας καταπλασθῆναι ὥφελει, καὶ σόμαχον χαυστούμενον. ἐπιτόμενα δὲ τὰ φύλλα σὺν τῇ ῥίζῃ λίθοις δρῦνται, καὶ ἔρα κινεῖ καὶ ὕδρω-

καὶ ὁ δροπικὸς σὺν οἶνο μῆξι (διδό).
 ἔξω) δὲ αὐτῇ καὶ εἰς τὰ φίλτρα.

Πρὶ Εἰτέρας κοτυληδόνος.

Κεφ. 57.

Εἰς δὲ καὶ ἕτερον εἶδος κοτυ-
 5 ληδόνος, πλατύτερον ἔχον καὶ λι-
 παρὰ φύλλα ὡς γλωττάρια, πυ-
 κλά περὶ τὴν ῥίζαν, οἷον ἐφ' ὁθαλ-
 μὸν ἕνα μέσον περιεχάφοντα ὡς
 περὶ τὸ μείζον αἰρίζων, τῇ γένεσι
 εὐφρόντα· χαυλίον λεπτόν, καὶ ἐπ'
 10 αὐτῷ ἀνθὶ καὶ σπέρματα ὅμοια
 ὑπερικοῦ ῥίζαν δὲ μείζονα ποιεῖ
 δὲ περὶ αὐτὴν τὸ αἰρίζων.

Πρὶ Αγκλήφης. Κεφ. 58.

Αγκλήφη, οἱ δὲ κνήδη, διὸς ἐν εἰ-
 δος ἐστὶν αὐτῇ, ἢ μὲν γὰρ ὅστιν ἀγρίω
 15 τέρα, βαχυτέρα καὶ πλατυτέρα καὶ
 μακροτέρα τοῖς φύλλοις· καρπὸν δὲ
 ὅμοιον λινοσπέρμου ἔχει, πάλιν ἐ-
 λάτλον αἰ. ἢ ἕτερα λεπτόσπερμος
 καὶ ἔχ' ὁμοίως βαχεῖα. Αμφοτέ-
 ρων δὲ τὰ φύλλα καταπλαστούμε-
 20 να μὲν ἀλῶν, κινώθηκα ἰσάται καὶ
 γαστρανικὰ, καὶ τὰ κακώθη καὶ καρ-
 κινώθη, καὶ τὰ ῥυπαρὰ τ' ἐλκῶν καὶ
 σρέμματα, φύματα, παρωτίδας,
 φύρεθλα, ἀποσμήματα· ἀσληνικοῖς
 δὲ μὲν κινώτης ἐπιτίθεν· ποιεῖ δὲ
 25 καὶ πρὸς τὰς ἐκ μυκτῆρων αἰμορ-
 ράγας τὰ φύλλα σινὲ τῷ χαλῶ
 λεῖα ἐπιτίθεται· κινεῖ δὲ καὶ ἡμι-
 να, λεῖα μὲν σμύρνης ἐπιτίθεται,
 καὶ ὑστέρας προπιώσης ἀποκαθίστησι
 περὶ τὰ φύλλα περὶ πτόμωα.
 τὸ δὲ

dropicis ex melle dantur. Her-
 ba vtuntur ad amatoria.

Vmbilicus Veneris alter.

Cap. XCII.

Est & alterum genus eiusdē,
 cymbalion aliqui vocant, pin-
 guibus foliis, latioribus, ligula-
 rum modo densis circa radicē,
 medium oculi ambitum descri-
 bētibus, vt in maiore semper-
 uiuo, adstringentis gustus: cau-
 liculo tenui, in quo flores &
 semina hyperici: radice ma-
 iuscula. Facit eadem, quæ sem-
 peruiuum.

Vrtica. Cap. XCIII.

Duo vrticæ genera: sylue-
 stris, asperior, latioribus, ni-
 grioribusque foliis: semine li-
 ni, sed minore. Altera non æ-
 quē aspera, minuto semine. Fo-
 lia vtriusque illita, canis mor-
 sibus, addito sale medentur:
 gangrenas, carcinomata, for-
 dida vlcera, & quæ cacoē-
 the vocantur, item luxata, pa-
 nos, tubercula, parotidas, sup-
 purationesque sanant. lien-
 sis cum cerato imponuntur:
 faciunt ad profluvia narium,
 cum succo trita, & naribus
 indita: menses ciunt, eadem
 detrita cum myrrha, & im-
 posita procidentes vuluas, re-
 centia contactu resilere cogūt.

F Semen

DIOSCORIDIS

Semen potum ex passio, venere-
rem stimulat, vulvæ ora pate-
facit: cum melle delinctum, or-
thopnoæ, lateris & pulmo-
num inflammationibus pro-
dest: thoracem expurgat: ero-
dentibus medicamentis admi-
scetur. Cocta cum conchis fo-
lia, aluum emolliunt, vrinæ
mouent, inflationes discutiunt:
decocta cum ptisana, vitia pe-
ctoris extrahunt: mulierum men-
ses euocant, cum myrrhæ mo-
dico pota. Inflammatione tur-
gentē vnam, gargarizatus suc-
cus exprimit.

Galiopsis. Cap. XC V.

Galiopsis, frutex in totum
caulem, & folia habet vrticæ,
læuiora, & quæ grauem odo-
rem trita reddant: flore pur-
purascente, tenui: nascitur cir-
ca sepēs, ædificiorum areas, ac
feminas vbique. Folia, caules,
femen, succusque, duritias &
carcinomata dissipat: strumas,
panos, & parotidas discutiunt.
Oportet bis die tepidum ex a-
ceto cataplasma imponere, &
eius decocto fouere: ad pu-
trescentia, gangrænas,

& nomas cum sa-
le efficaciter
illinum-
tur.

Galion

τὸ δὲ σπέρμα ἐπὶ στυφοσίαν πα-
ρορμαῖ πνιγνόν μὲν γλυκύος, καὶ
ὑγείαν ἀνὰ σπομῶν· συνὲ μέλιτι δὲ
ἐκλειχρόν μὲν ὀρεδοποιῶς ὠφελεῖ
καὶ πλευρίτιδας καὶ πεπνεύμονιας.
ἀνάγει δὲ καὶ τὰ ἐν θώρακος· μί-
γνυται δὲ καὶ σιππῶν· σινελη-
θέντα δὲ τὰ φύλλα κογχάριοις
ταῖς κοιλίαις μαλάττει· καὶ ἐμπνευ-
ματώσεις. οὐρα κινεῖ. συνὲ πλι-
σάνη δὲ ἐκλεθέντα τὰ ἐν θώρα-
κος ἀνάγει. τὸ δὲ ἀφέψημα τῶν ἰο-
φύλλων συνὲ ὀλίγη σιμύρνη πιθέν,
κινεῖ κατὰ μιλύρια· ὃ χυλὸς ἀνα-
γαρμαίνει ζῶντος, σέλλει κινεῖδα
φλεγμαίνουσαν.

Περὶ Γαλιόψευος. Κεφ. εἰ.

Γαλιόψευοι δὲ, γαλιόβουλον, ἰς
ὅλον τὸ θαμνιονὸν συνὲ τῷ χαμυλῷ καὶ
τοῖς φύλλοις ἐμφρὲς ἐστὶ κνίδη, κα-
ότερα ὅτι τὰ φύλλα καὶ ἱκανῶς δυ-
σώδη ἐν τῷ διατείναν· ἀνὰ λε-
πιδὰ τορφεύζοντα· φύεῖ ἐν φραγ-
μοῖς καὶ παρὰ ταῖς ὁδοῖς καὶ οἰκόπε-
δα πανταχοῦ. Δυνάμει δὲ ἔχει
τὰ φύλλα καὶ ὁ χυλὸς καὶ ὁ χαμυλὸς
καὶ ὁ καρπὸς, διαχυτικὴν σκληρω-
μάτων καὶ καρκινωμάτων, χοιρέ-
δων, παρρωτίδων, φυγέθλων· δεῖ δὲ
μετ' ὅξος ἢ ἡμέρας κατὰ πλάσσειν
χλιαρὸν πιόντας τὸ κατὰ πλάσ-
μα. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτὴ κα-
ταπλεῖ ὠφελίμως· ποιεῖ καὶ πρὸς
γομαῖς, γαγγραιναῖς καὶ σιππιδόνας
καὶ ἄλλων κατὰ πλάσσειν.

Περὶ

Περὶ Γαλίου. Κεφ. 55.

Γάλλιον, οἱ δὲ, γαλλέριον, οἱ
δὲ, γαλάπον· ὀνόμασται δὲ ἀπὸ
τοῦ γάλα πηγνύειν ἀπὸ πίπτας
αὐτό· τὸ δὲ κλωνίον, καὶ τὸ φύλλον
ἔχει ἐμφερέστατον ἀπαρίνη, καὶ ὀρ-
δὸν δὲ καὶ ἐπ' ἀκροῦ αὐτοῦ μήλι-
ρον, λεπτόν, πυκνόν, πολὺ εὐοσμόν·
οὗ τὸ αὐτὸς περὶ τὰ πυρίχλω-
τα καταπλάσσεται, καὶ αἱμορ-
ρίας ἴσησι· μίγνυται δὲ καὶ κη-
10 ρωτῇ ροδίῃ ἡλιαζόμυρον ἄχρως
αὐτὸ λευκὸν γίνεσθαι· καὶ ἐστὶ τὸ τοιοῦ-
τον ἀκόπον. ἡ δὲ ῥίζα περὶ σὺν-
οισίαν πάρερμα· φύεται δὲ ἐν
ἐλώδεσι τόποις.

Περὶ Ηειρέροντος. Κεφ. 56.

15 Ηειρέρων καυλίον ὅτι πηχυ-
αῖον, ὑψύθρον, συνεχθῆενον φυλ-
λάεια, ἀκροαθῆν ὡς περὶ εὐζώ-
μων, παρὰ πολὺ δὲ ἐλάττω· αὐ-
τὴ μὲν ἰσχυρὰ, ταχέως αἰζόμυρα
καὶ ἐξανδουῶντα εἰς τοὺς λεγομέ-
20 νοις πάσχοις· ὅθεν καὶ ηειρέρων
ὠνομάσθη, διὰ τὸ ἕαρος τὰ αὐ-
τὴν τειχειδῶς πολιούδαι· ῥίζα
ἄχρως· φύει· μάλιστα ἐπὶ θρυγ-
ροῖς καὶ περὶ τὰς πόλεις· Δυνά-
μιν δὲ ἔχει ψυχτικὴν τὰ φύλλα
σὺν τοῖς αὐθροῖς· ὅθεν καταπλάσ-
35 σόμυρα τὰ φύλλα ἐν ὀλίγῳ οἴῳ
ἢ καὶ κατ' αὐτὰ φλεγμονὰς ὀρ-
χέων καὶ δακτυλίου θεραπεύει·
σὺν δὲ μαίνῃ, τὰ τε ἄλλα τραύ-
ματα καὶ τὰ ἐν νεύροις ἴσται·
καὶ οἱ

Galion. Cap. XCVI.

Galion, nomen ex eo tra-
xit, quod in contrahendo la-
cte, coaguli vicem impleat: ra-
mulum foliumque habet apa-
rinæ simillimum, rectum: flo-
rem in cacumine luteum, te-
nuem, densum, copiosum, o-
doratum. Flos igni ambustis
illinitur, sanguinis profluvia
sistit. Cerato rosaceo galion
admiscetur, insolatum usque
dum albescat: lassitudines re-
ficit. Radix venerem concitat.
Nascitur in palustribus.

Senecio. Cap. XCVII.

Senecio cauliculo est cubi-
tali, subrubro, foliis continuis,
erucæ modo per extrema-
tes diuisis, sed minoribus mul-
tis: luteis floribus, qui cele-
riter dissecti vanescunt in pap-
pos. Nomen verò sibi vendi-
cauit, quoniam flores capil-
lorum ritu, vere canescant: ra-
dice superuacua: nascitur ma-
ximè in maceris, & circum
oppida. Folia cum floribus re-
frigerant: quare illita cum vini
modico, vel per sese, testium &
fedis inflammationes sanant:
quoniam & ex manna thuris me-
duntur, cum reliquis vulneribus,
tum iis quæ nervi acceperunt.

DIOSCORIDIS

Illiti per se cum aceto pappi, idem munus præstant: verum recentes epoti, strangulant. Totus caulis, si coctus in passo potui detur, stomachi dolores à bili contractos, perfanat.

Thalictrū. Cap. XC VIII.

Thalictron folia coriadi habet, pinguiora paulò: coliculum rutæ crassitudine, in quo folia. Quæ trita, illitu antiqua ulcera ad cicatricem perducunt. Nascitur maximè in campestribus.

Marinus muscus.

Cap. XC IX.

Marinus muscus nascitur in scopulis, testaceisq; haud procul à mari, gracilis, capillaceus, caulis expers. Præcipua ei spissandi vis, & collectiones cohibendi, & podagras, quas refrigerare opus sit.

Phycus marinus. Cap. C.

Phyci marini generib⁹, quoddam latum, & alterum sublongius, & rubens: tertiū candidū, nascens in Creta iuxta terram, floridū valdè, quod nulla corruptionis labe polluit. Omnia vim habet refrigeratorem, nõ podagræ modò, sed etiā inflammationib⁹, in cataplasmatisefficaciter vtilè: verū iis vti humiliscōuenit, priusquā exarescāt.

Nican-

καὶ οἱ πάπποι δὲ, καὶ ἑαυτοὺς καταπλαθέντες ἐν ὀξεί τὸ αὐτὸ δρῶσι· πυθέντες μὲν τοὶ νεαροὶ, πνιγμὸν ἐπιφέρουσιν. ὅλος ὃ ὁ χαυλὸς ζυὼ ὕδατι ἐψηθεὶς καὶ σιμὴ γλεύκει πηρόμυρος, σωμαχοῦ πίνουσιν τὸς ἀπὸ χολῆς διαρροίας.*

Περὶ Θαλίτρου. Κεφ. 58.

Θάλικτρον φύλλα παραπλήσια κορίω ἔχει, λιπαρώτερα δὲ, καὶ χαυλίον πηγαίου πάχους. ἐφ' οὗ τὰ φύλλα ἄνωρ καταπλαθόντα λεία, τὰ χρόνια τῶν ἐλκῶν ἐπουλοῖ. φέεται δὲ μάλιστα ἐν πεδίοις.

Περὶ Βρύου θαλασσίου.

Κεφ. 59.

Βρύον θαλάσσιον φέεται ἐπὶ ἰσλίδων καὶ ὀσφράκων παρὰ θάλασσαν, περὶ χῶδες ἰσθμὸν, ἀκαυλόν, ἱκανῶς συμπικρὸν, ποιοῦν πρὸς φλεγμονὰς καὶ ποδάγρας, τὰς σφύματος διαμεύρας.

Περὶ φύκους θαλασσίου. 20

Κεφ. 60.

Φύκος θαλάσσιον γίνεται, τὸ μὲν τοὶ αὐτοὶ πλατὺ, τὸ δὲ ὑπόμικτες καὶ φοινίαστος, τὰ δὲ, λευκὸν, φούμυρον δὲ ἐν κρήτι πρὸς τῇ γῆ· ἐναντὶς ἄγαν καὶ ἀσπῆλον. 25
Ψυκτικὴν ὃ ἔχει πάντα τὴν δύναμιν, ποιοῦσαν ἐν καταπλάσμασι, ποδαγρικαῖς καὶ ταῖς φλεγμοναῖς· δεῖ δὲ αὐτοῖς χρῆσθαι ἐνέκμοις πρὸς τοῦ ξηρανθῆναι.
γίγαν-

ἡ γὰρ δὲ φησι καὶ θηριακὸν
εἶναι τὸ φοινικοῦ. ὃ τῷ ἔδοξεν.
• ἔνι εἶναι δ' αἱ γυναικες χερῶν-
ται, ὄντος ἐκείνου ρίζης. ὁ μωνύμως
δὲ χαλουμένου φύλλοις.

5 Περὶ Ποταμογείτονος.

Κεφ. ρά.

Ποταμογείτων φύλλον ὅστιν ὁ-
μοιον σέυτλω, δασὺ καὶ ὀλίγον ὑ-
περκίπτον τῆ ὕδατος. ὕχει δ' καὶ
σύφει ἀρμόζον κνησμοῖς καὶ νεμο-
10 ῖμοις καὶ παλαιοῖς ἑλκέσι. ὠνό-
μασται δὲ διὰ τὸ ἐν τέλμασι καὶ
ἐν ὕδροις τόποις φύεσθαι.

Περὶ Στραπώτου. Κεφ. ρβ'.

Στραπώτης, ὃ ἐπὶ τῇ ὕδατων
φύλλοις οἱ δ' ἐπὶ τῇ ποτάμῳ στραπώ-
15 τῶν χαλοῦσιν. ὠνόμασται δὲ διὰ
τὸ ἐπὶ ἡχεῶς τοῖς ὕδασι καὶ χωρὶς
ρίζης ζῆν. φύλλον δ' ἔχει ἀειζώου
ὁμοιον, μείζον μύρτοι, καὶ ψυκτι-
κὸν ἔχον δύναμιν. ἐφιστάνον τὰς ἐκ
νεφρῶν αἰμορραγίας πηρόμενον.
20 τρώματα δ' ἀφλέγμαντα τηρεῖ
καὶ ἐρσιπέλατα καὶ οἰδήματα (ὡς
ὅξιν καταπλασόμενον).

Περὶ Χιλοφύλλου στρα-

πώτου. Κεφ. ργ'.

• Στραπώτης ὁ χιλοφύλλος ἔστι
25 δαμίσκος μικρὸς, ἀπιδαμῖος
καὶ μείζων. ἔχων τὰ φύλλα ὁ-
μοια νεπῆ πτερό. ἐστὶ δὲ αἱ ἐκ-
φύσεις τῶν φύλλων σφόδρα βρα-
χεῖαι, ἐλασμοῖς. ὅμοια δὲ μά-
λισα τὰ φύλλα τῇ βραχύτητι,
καὶ τῇ

Nicáder, puniceū aduersus ser-
pētes dedit. Hoc fūco quidā pu-
tant mulieres suū colorē men-
tiri, tūm tamē sit radícula eiūs-
dem nominis, qua sese fucant.

Potamogeton. Cap. CI.

Potamogeton, foliū betæ si-
mile, hirsutū, paululum supere-
minens extra aquā. Refrigerat
& inspissat: pruriginibus vtile,
& cōtra veterum vlcerum no-
mas. Nomē ex eo inditum est,
quod palustribus, & aquosis e-
nascatur.

Stratiotes. Cap. CII.

Stratiotes in aquis nascens,
iisdem supernatat, & sine radi-
ce viuit: vnde cognomentum
traxit. Herba semper uiuo simi-
lis, ni maiora haberet folia: quæ
refrigerant. Sanguiné qui de-
fluit à renibus, pota sistunt: vul-
nera quæ inflammationem mi-
nātur, intumescere non sinunt:
ignibus sacris, & tumoribus ex
aceto illinuntur.

Stratiotes millefolium.

Cap. CIII.

Stratiotes millefoliū exiguus
frutex, palmi altitudine, aut am-
plius affurgit: foliis auicularum
pennas imitantibus, breui ad-
modum dissectoq; foliorū ex-
ortu. Folia sylvestre cuminum
simulant, præsertim breuitate
F iij atque

DIOSCORIDIS

atque scabritia, breuiora paulò, densiore umbella, & pleniore. Surculos in cacumine gerit exiguos, & capitula in modum anethi: flores paruos, candidos. Nascitur in asperis agris, præcipuè circa semitas. Eximij vsus ad vlcera vetera, recentiaque, profluentem sanguinem, & fistulas.

Verbasum. Cap. CIIII.

VERBASCUM differtias summas habet duas, hoc nigrum, illud album: in quo mas & foemina intelligitur. Foemine igitur folia sunt brastice, pilosiora multò, & latiora, candida: caulis albus, cubitalis, aut amplior, subhirsutus: flores albi, aut subpallidi: semen nigrum: radix longa, gustu acerba, crassitudine digiti: nascitur in campestribus. Verbasum, qui mas appellatur, oblongius, albis folijs, & angustioribus, tenuiori caule. Sed nigrum prorsus albo simile esset, nisi nigriore latioreque constaret folio. Sylvestre folia fert saluix, altas virgas, & lignosas, & circa eas ramulos quales marrubium: flores luteos, auræmulos. Sunt & phlomides duæ, hir-

καὶ τῇ τραχύτητι κυμίνω ἀγρίω, καὶ ἐπιβραχύτερα, καὶ τὸ σκιάδιον δὲ πυκνότερον τούτου καὶ δροότερον. ἔχει γὰρ ἐπ' ἀκροῦ καρφία μικρά, ἐφ' ὧν τὰ σκιάδια ἐστὶν ἀνήδου τρόπον· αἵθνη μικρά, λευκά· φύει δὲ ἀγροῖς ὑποτραχέσι καὶ περὶ τὰς ὁδοὺς μάλιστα. ἐστὶ δὲ αὐτῇ ἡ βοτάνη σφόδρα ἀγασθὴ πρὸς αἱμορρογίαν καὶ ἑλκὴ παλαιά, καὶ πρὸς σφατὰ καὶ σύειγους.

Περὶ Φλόμου. Κεφ. ρδ'. 10

Φλόμος ἔστι μὲν αἰσινάτω διαφορῶν ἔχει διττήν, ἡ μὲν γὰρ ἐστὶν αὐτὴ λευκή, ἡ δὲ μέγαν· καὶ ἡ λευκὴς ἡ μὲν θήλεια, ἡ δὲ ἄρρην. τῆς μὲν οὖν θηλείας τὰ φύλλα παρὰ πηλοῖα ὅτι κράμβη, διασύτερα δὲ πολλὰ καὶ πλατύτερα καὶ λευκά· χαυλὸς πυχυαῖος καὶ μερίζων, λευκός, ὑπόδαυος· αἵθνη λευκή, ὑπόπωχε· σπέρμα μέγαν· ῥίζα δὲ μακρά, σφυγμὴ, πάχος ἔχουσα δακτύλου· φύει δὲ ἐν πεδίοις. ἡ δὲ ἄρρην χαλαρομένη, λευκόφυλλος, ὑπομήκης δὲ καὶ σενώτερα τοῖς φύλλοις, καὶ τῶν χαυλῶν δὲ λεπιοτέρη. ἡ δὲ μέγαν· αἰμοῖα δὲ λευκαῖς καὶ πάντω, πλατυφυλλοῖς· ῥα μὲν τοὶ καὶ μέγαν τέρα τοῖς φύλλοις ὑπάρχει. Γίνεται καὶ ἡ λεορμένη ἀγρία, ῥάβδος ὑψηλὰς φέρουσα καὶ δένδρῳ δὲ φύλλα ἡλισσοειδῆ· ὁμοία ἔχει δὲ κλύνας περὶ τὰς ῥάβδους ὡς σφῆρα· αἵθνη μάλιστα, χυσοειδὲς, εἰσὶ δὲ καὶ φλομίδες διπλαῖαι, δια-

διπλαῖ, δασεῖαι, περιφύει τῇ γῇ,
 σπογγύλα ἔχουσαι τὰ φύλλα. Καί
 τεῖτη φλομὶς ἢ καλουμένη λυχνί-
 τις, ὑπὸ δὲ πινῶν θρυαλλίς, φύλ-
 λα γ' ἢ δ', ἢ καὶ πλείονα, ἔχου-
 σαι παχέα, λιπαρὰ, δασέα. εἰς ἑλ-
 λήνια χρησίμη. τῶν μὲν ἐν περὶ-
 πον δύο, ῥίζα συπληκὴ· ὅθεν διαφ-
 ροιζομένοις, ὅσον ἀσράχαλος συν-
 οῖνῳ ὠφελίμως ἐν ποτῷ δίδεται.
 τὸ δὲ ἀφ' ἡμῶν αὐτῆς ῥήγματος
 καὶ σπύσματος καὶ θλάσματος καὶ
 βήξι παλαιαῖς ἀρήγει. ὁδονταλ-
 γίας τε παύσινει διακλυζόμε-
 νον. ἢ δὲ χρυσοειδὴς τὰ αὐτῇ,
 τεύχας βάπτει, καὶ ὅπου αὐτῇ
 τῇ σίλφας συνάγει. τὰ δὲ φύλ-
 λα ἐφθὰ ἐν ὕδατι, πρὸς οἰδήματα
 καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς κατα-
 πλάσσεται, καὶ πρὸς σφακελίζον-
 τα ἔλκει συν μέλιτι ἢ οἶνῳ· σὺν ὁ-
 ξει δὲ τραύματα δεραπύει, καὶ
 σκορπιόπληκτοῖς βοηθεῖ. τὰ δὲ
 τῆς ἀγρίας φύλλα* πνευμαύτων
 ὅτι καταπλάσματα. τὰ δὲ τῆς
 θηλείας φύλλα φασὶ μετὰ σύκων
 ξηρῶν συνπιεσμένα, ἀσπλην αἰ-
 τὰ διαφυλάττειν.

Περὶ Αἰθιοπίδος. Κεφ. ς.
 25 Αἰθιοπὶς, καὶ αὐτὴ παρὰ πλεί-
 στα φλόμῳ ἔχει τὰ φύλλα, δασέα
 δὲ λίαν καὶ πυκνά, κύκλῳ περι-
 τὸν πυθμένα τῆς ῥίζης· χαλκὸν
 τετράγωνον, παχὺ, καὶ τρα-
 χύν, εὐκράτα μελιτάνει ἢ ἀγκύρω,
 μαζάρι

hirsutæ, rotundis foliis, humiles.
 Tertia lychnitis appellatur, ab
 aliis autē thryallis, foliis ternis,
 aut quaternis, vel paulo pluri-
 b⁹, hirsutis, crassis, pinguib⁹sq[;]
 apta ad lucernarū lumina. Ra-
 dix priorum duarum astringit:
 quare quod magnitudine ludi-
 crū talum æquet, in alui proflu-
 uio, cōueniēter ex vino datur.
 Decoctum ruptis, cōuulsis, fra-
 ctis, antiquæ tussi, auxiliatur.
 Dentium dolorem collutione
 mitigat. Verbasum cui flos
 aureus, capillos tingit, & quo-
 cunque abiiciatur, blattas in
 se contrahit. Cocta in aqua
 folia, aduersus tumores, in-
 flammationes oculorum, sy-
 derata vlcera, ex vino & mel-
 le illinuntur: cum aceto quo-
 que vulneribus medentur: con-
 tra scorpionum ictus, sunt au-
 xilio. Sylvestris folia ambustis
 igni, sunt cataplasmata. Aiunt
 in foliis eius, quam fœminam
 dicimus, aridos ficus omnino
 non putrescere.

Æthiopis. Cap. CV.

Æthiopis folia habet verba-
 sco similia, perquam hirsuta,
 densaque, in orbem circa ra-
 dicem imam redacta: caulem
 quadrangulum, crassum ac sca-
 brū, simile apiastro, aut arctio,
 F iij multis

multis concavum alis: semē e-
rui magnitudine, geminum, in
vno conceptaculo: radices ab
eodem cespite numerosas, lon-
gas, plenas, glutinosas gustu,
quæ siccæ nigrescunt duran-
túrque, vt cornua possint videri:
plurima nascitur in Ida monte
Throadis, & in Messenia. Aux-
liatur purulentis excreationi-
bus, ischiadicis, pleuriticis, ar-
teriæ scabritiis, decocta radix,
& pota: quin & cum melle, ec-
legmatis vicem præbet.

Arction. Cap. CVI.

Arction, aliqui potius ar-
cturon vocant, similis est ver-
basco foliis, nisi quod hirsu-
tiora, & rotundiora sunt: cau-
le longo, molli: semine cumini,
paruo: radice tenera, alba, dul-
cique. Decocta cum semine ra-
dix in vino, dentium dolorem
mulcet, si continueatur ore de-
coctum: ambusta pernionésq;
fouentur eodem: bibitur ad-
uersus coxédicum dolores, &
stranguriam, è vino.

Arction, siue Personata.

Cap. CVII.

Personata folia habet cu-
rbitæ, maiora & hirsutiora,
nigriora & crassiora: caulem
albicantem, quanquam & in-
terdú vidua caule reperiatur:
radice

μαχάλας ἀνέντα πολλάς· καρ-
πὸν δὲ πρὸς μέγεθος ὁρέβου συν-
δύο ἐν ἐνὶ ἀγγείῳ· ρίζας ἀπὸ τοῦ
αὐτοῦ πυθμῆος πολλὰς, μακρὰς,
παχέας, γευσθῆναι κολλώδεις· γί-
νονται δὲ ζηρανόμεναι μέλαναι·
καὶ σκληραὶ, κέχρησιν ἰοικῆσαι· πλεί-
στη δὲ θηναῖται κατὰ τὴν πελο-
πόννησον καὶ τὴν ἰδίαν. Ταύτης ἡ ρί-
ζα ἐφορμῇ καὶ πινουμένη βο-
θεῖ ἰσχιάδι, πνευρίτιδι, αἵμα-
τος πύσει, καὶ ἀρτηρίας τραχύ-
τητι· λαμβάνεται δὲ μετὰ μέλι-
τος ἀντὶ ἐκλεκτοῦ.

Περὶ Ἀρκίου. Κεφ. ρς'.

Ἀρκιον, οἱ δὲ ἀρκιούρον, φλό-
μων καὶ αὐτὴ ἔχει ἰοικῶντα τὰ φύλ-
λα, δασύτερα δὲ καὶ στρογγυλότε-
ρα· ρίζαν ἀπακλὴν, γλυκείαν,
λευκίαν· χαμλὸν δὲ μαλακὸν,
μακρόν· καρπὸν δὲ κυλινδρῶ μικρῷ
ὅμοιον. Ταύτης ἡ ρίζα διώσεται
καὶ ὁ καρπὸς ἀφεψηθέντα ἐν οἴ-
νῳ, ὁδονταλγίας διακροτούμενα·
παραύγειν, καὶ πνευμαίων καὶ
χμέτης ὅτι κατὰ τὸ πνεῦμα πνε-
ται δὲ καὶ πρὸς ἰσχιάδας καὶ δι-
στυρίαν ἐν οἴνῳ.

Περὶ Ἀρκίου. Κεφ. ρζ'.

Ἀρκιον, οἱ δὲ, πρὸς τὴν πίδα, οἱ δὲ, 25
προσώπων καλεῖται, φύλλα ἔχει ὁ-
μοία τοῖς τῆ κολοκύνθης, μέζονα
μὲν τοῖς καὶ σκληρότερον καὶ μελαίν-
τερον καὶ δασύ· χαμλὸν ὑπόλευ-
κον, ἐνίοτε δὲ καὶ ἀχαμλὸς ἢ πᾶσι
ρίζα

ρίζα μεγάλη καὶ λευκὴ ἐνδοθεν, ἔξωθεν δὲ μέλαινα. Ἡ πρὸς βο-
θεΐσα < ἀ. πλῆθος μετὰ σποδίσ-
λων, αἰμοπηϊκοῖς, ἐμπνικοῖς,
παύει· καὶ τὰ ἐν τῶν λυγισμῶν
5 πρὸς τὰ ἄρθρα δὴ γήματα κα-
ταπλασσομένη λεία. καὶ τὰ φύλλα
δὲ ὠφελίμως ἐπὶ τῶν παλαιῶν
ἐλκῶν καταπλάττεται.

Πρὶ Πετασίτης. Κεφ. ρή.

Πετασίτης μῶρος ὅστις μέ-
10 ζων πῆχους, δακτύλου μεγάλου
πάχους, ἐφ' οὗ φύλλον πετασῶδες
μέγα, περσικέμβρον ὡς περ μύ-
κης ποιοῦν πρὸς τὰ κακοήδη καὶ
φαρμακινὰ ἔλκη λείον κατα-
πλασσομένον.

15 Πρὶ Επιπακτίδος. Κεφ. ρθ'.

Επιπακτίς, οἱ δὲ, ἡλεβορίων, θα-
μνίσκος μικρὸς, ἡ ἄρα φυλλά-
ρια ἔχων. πρὸς τὰ θανάσιμα δὲ
πίνε', καὶ πρὸς τὰ ἐν ἡπατὶ πάθη.

Πρὶ Καπνός. Κεφ. ρι'.

20 Καπνός βοτανίον ὅστις θαμνοει-
δής, κορίων ὅμοιος, τρυφερόν πά-
νυ· τὰ δὲ φύλλα λευκότερα καὶ
τεφροειδῆ πολλὰ παλιν ἀχόθεν ἄν-
θος πορφυροῦν. τέτε ὁ χυλὸς δρι-
μύς, ὀξύδερκης, δακρύων ἀρω-
γός· ὅθεν καὶ τοῦτομα εἰλημσε.
25 δύναται δὲ καὶ τὰς ἐν τῶν βλε-
φάρων διπλᾶς τείχας σὺν κόμ-
μει καταχρυσίζει μὴ ἔαν φύεσθαι.
βρωθεῖται δὲ ἢ πῶς, οὗρα ἄγει
χολάει.

radice grandi, intus candida,
foris nigra. Hæc drachmæ v-
nius pondere pota, cum pi-
neis nucibus, purulenta & cru-
enta extusisientibus auxiliatur:
trita dolores à contorsioni-
bus artuum contractos, illitu
sedat. Folia vtiliter antiquis vl-
ceribus illinuntur.

Petasites. Cap. CVIII.

Petasites pediculus cubito ma-
ior, crassitudine pollicis, à quo
prægrande folium, galeri mo-
do amplum, ceu fungus depē-
det. Contra phagedænas, & vl-
cera quæ cacoëthe vocant, ef-
ficaciter illinitur.

Epipactis. Cap. CIX.

Epipactis ab aliis hellebori-
ne, parua herba, exiguis foliis.
Iocineris vitiis utilis, & contra
venena pota.

Capnos, seu fumaria. Ca. CX.

Fumaria fruticosa herbula
est, prætenera, coriandri simi-
lis: foliis candidioribus, vndi-
que numerosis, cineracei co-
loris: flore purpureo. Huius
succus claritatem facit oculis,
delachrymationemque: vnde
nomen traxit. Illitus cū gum-
mi, euulsas palpebras rena-
sci prohibet. Commā-
ducata herba bilio-
sam vrinam trahit.

Πρὶ

Lotus

DIOSCORIDIS

Lotus urbana. Cap. CXI.

Lotum urbanam alij trifoliū vocāt: nascitur in hortis. Extractus succus, addito melle, oculorum argema, nubeculas, cæterásque caligines discutit.

Sylvestris lotus. Cap. CXII.

Sylvestris lotus, quam trifolium minus appellant, plurimum in Libya gignitur, caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multis: foliis trifolij pratenfis: semine foenigræci, multò minore, gustu medicato. Vim calfaciendi, & leniter adstringendi obtinet: vitia cutis in facie, maculásque, cum melle peruncta expurgat: trita per sese aut cum maluæ semine, in vino aut passo bibitur aptissimè contra dolores, qui vesicam malè habent.

Cytisus. Cap. CXIII.

CYTISVS, frutex est albus in totum, vt rhamnus, ramos spargens cubitales, sæpe maiores, in quibus folia foenigræci, aut loti trifolia, minora, dorso medio prominente. Ea digitis trita erucam olent, gustatáque cicer recens sapiunt. Folia refrigerant: tumores inter initia discutiūt, si cum pane trita illinantur.

Decoctū

Πρὶ Λωτῷ ἡμέρας. Κεφ. ριζ.

Λωτὸς ἡμερος, οἱ δὲ τείφυλλον φύεῃ ἐν παραδείσοις. ὅς χυλιδεὶς καὶ μηρεὶς μέλιτι, ἄργεμα καὶ νεφέλια καὶ λευκώματα καὶ τὰ ἐπισκοτουῦντα τῇ κόραις ἀποκαθαίρει.

Πρὶ Λωτῷ ἀγρίῳ. Κεφ. ριβ.

Λωτὸς ἀγρίος, οἱ δὲ λίβυον καλεῖσι, φύεῃ μὲν πλείους ἐν λίβυῃ, καυλὸν φέρων δίπυχον ἢ καὶ μείζονα, μακράς ἔχοντα πολλὰς φύλλα ὅμοια λωτῷ τειφυλλῷ, τῷ ἐν χορτοκοπέοις ὁμωνυμῶς σπέρμα ἰσικὸς τίλειδι, μικρότερον ὃ πολλῷ, φαρμακάδες ἐν τῇ γύσφι. Διώαμιν δὲ ἔχει θερμαστικὴν, ἢ πῶς συμπικνὴν ἀποκαθαρτικὴν σπύλων τῇ ἐπὶ τῇ περὶ σῶτος καὶ ἐφελδῶν σὺν μέλιτι κατὰ χροῖον μῆκος. πινόμῆρος δὲ καὶ εἰ αὐτὴν λείος ἢ καὶ μὲν μαλάχης σπέρματος σὺν οἶνῳ ἢ γλυκεῖ, τοῖς περὶ κύστιν ἀλγύμασι βοηθεῖ.

Πρὶ κυτίσῃ. Κεφ. ριγ. ια

Κύπτοςος θάμνος ἐστὶ λευκὸς ὅλος ὡς ῥάμνος, κλάδεις ἀνιέει πύχαις καὶ μείζονας, περὶ ἑς τὰ φύλλα ὅμοια τίλειδι, ἢ λωτῷ βιφυλλῷ μικρότερα ὃ καὶ ῥάχιν ἔχοντα μείζονα. ἐν τῇ τῷ διαβιβῆναι τοῖς δακτύλοις ὅζοντα ἐυζώμεν, ἐν δὲ τῇ γύσφι ὅμοια ἐρεβίνθοις χλωροῖς. Διώαμιν ὃ ἔχει τὰ φύλλα πυκνὴν διαφορικὴν τῇ ἐν ἀγρίῳ οἰδνωμάτων σὺν ἄρῳ λεία καὶ ἀπακατέντα.

διέντα κηεὶ δὲ καὶ ἔρρ. τὸ ἀφέ-
μα αὐτῶν πινόμενον. ἐνιοὶ δὲ φυ
τεύουσιν αὐτὸν παρὰ τοῖς σιμύε
σιν ὡς ἐπακτικὸν τῶν μελισσῶν.

Πρὶ Ἀωτὸς αἰγυπία. Κεφ. ριδ'.

5 Ἀωτὸς, ὃ ἐν αἰγυπίῳ γηινώμα
νός ἐν τῷ ὑδατι τῶν ἐπιπλακιδέν-
των πεδίων χαλαρός ὅστις τῷ ἥτις
κυάμας ἐμφυῖται. ἔχων ἀνδρὸς μι-
κρόν, λευκόν, εἰκότος κρίνον, ὃ φασὶ
κτ' ταῖς ἀνατολὰς ἔχει ἥλιος* ἀπλῶ-
10 νται, δυνάμενος δὲ μύθον καὶ ὀλλυ
τῶν κωδίσαν κρύπτειν ἐν τῷ ὑδα-
τι, πάλιν τὸ πρὸς τῶν ἀνατολῶν
ἥτις ἥλιος ἀπὸ κρύπτειν. εἰκοίς δὲ ἡ κω-
δίστα μύκωνι μεγίστη ἐν ἡ καρπὸς
ὡς κέγχρος, ὃν ξηροῦντες οἱ ἐν
15 αἰγυπίῳ, βάλαντον εἰς ἀπὸ ποιῶν.
ρίζαν ἣ ἔχει ὁμοίαν μήλω κυδω-
νίῳ, ἡ πρὸς καὶ αὐτὴ ἐδίδεται ἀμύ-
τε καὶ ἐφθί. ἀναλαορεὶ δὲ ἐκ δει-
σα τῇ πριότῃ λεκιδῶ ὥς.

Πρὶ Μυριόφυλλον. Κεφ. ριε'.

20 Μυριόφυλλον χαλίσκος ὅστις μο-
νοφυῖς, τρυφερός, μονόριζος. πρὸς
ὃν φύλλα πολλὰ, λεῖα, μαρμαίρω
ὁμοία. ὅθεν καὶ ὠνόμασται. ὃ ἡ χα-
λός ὅστις ὑποκίρρος, * διαποίμι-
λος, ὡς ἐπίτηδες διαρρέεινισμέ-
25 νος*. φέρεται ἐν ἐλῶσι τοποῖς.
ἥτις το πρὸς ἀφλέγμαντα τὰ νεό-
πρωτα τῶν ἐλῶν συλὸς ἐξεί χλω-
ρὸν τε καὶ ξηρὸν κατὰ πλάτος με-
κόν. ποτίζεται δὲ καὶ πρὸς πῶ-
ματα συλὸς ὑδατι καὶ ἁλσίν.

Decoctum potu vrinam ciet.
Nonnulli, quod apes adiiciat,
prope aluearia ferunt.

Lotus Ægyptia.

Cap. CXIII.

EST & in Ægypto lotus,
quæ in campis flumine inun-
datis prouenit, caule fabæ: flo-
re paruo, candido, lilio simi-
li, quem tradunt occidente so-
le comprimi occludique, ad
ortum autem aperiri: addunt-
que, caput ipsum vespera a-
quis condi, & ad exortum so-
lis emergere. Caput quale pa-
paueris, maximū: & intus gra-
na ceu milij, quæ Ægyptij exic-
cant, & in panes cogunt. Radi-
cem lotos hæc habet, mali co-
tonei similitudine, quæ cruda
coctaquē māditur: decoctaquē
lutei oui qualitatem exhibet.

Millefoliū. Cap. CXV.

Myriophyllum, siue millefo-
liū, caulis est tener, singularis,
unica nixus radice: plurimis fo-
liis, læuibus, fœniculo similib⁹:
vnde nomē accepit. Caulis fla-
uescit varius, ac veluti ex indu-
stria delimatus: nascitur in pa-
lustribus. Vulnere recentia ab
inflammatione vindicat, si vel
viride, vel siccū ex aceto, obli-
natur: præcipitatis in potu cum
aqua & sale datur.

Πρὶ

Myrrhis,

DIOSCORIDIS

Myrrhis. Cap. CXVI.

Myrrhis, simillima est cicuta, caule foliisque: radix ei oblonga, mollis, rotunda, odorata, cibo non insuavis. Quæ pota in vino, phalangiorum moribus auxiliatur: cit menstrua, & partus secundos, purgâtque à puerperio foeminas: subuenit & phthificis cocta in forbitione. Aiunt quoq; eadem bis die terve potam ex vino, in pestilentia salutaré esse, & ne morbi cõtagia sentiantur obstaré.

Myagrum. Cap. CXVII.

Myagron, aliqui melampyron vocant, herba est furculacea, foliis rubiæ, pallidis, tripedanea: semen oleosum, fœnogræco simile. Quod contusum igni torrent, perunctisq; virgis ad lucernarum lumina vtuntur hoc pingui, scabritias corporis leuigari, atque expoliri constat.

Onagra. Cap. CXVIII.

ONAGRA, siue onothera, aut onuris, frutex est arboris instar, prægrandis, amygdalino folio, sed latiore, lilio non dissimili: flore rosaceo, magno: radice candida, longa: cum ficcata est, vinum olente: nascitur in montibus, Aqua in qua radix maduerit, in potu

Πρὶ Μύρριδος. Κεφ. ρις'.

Μύρρις, οἱ δὲ μύρραν καλεῖσιν, τῷ καυλῷ καὶ τοῖς φύλλοις ἔοικε κωνεῖω· ῥίζαν δὲ ἔχει ἐπιμήκη, ἀπαλὴν, περὶ φερεῖν, ἐν ὧδῃ, ἡ δὲ ἴαν βρωθῆναι. Ἡ τις πινόμενη σὺν οἴνῳ φθαγγιδήκοις βοηθεῖ· καὶ θάλασσε δὲ ἐμυλῶσα, καὶ λοχίᾳ καὶ δὲ ἰηθεῖσαι δ' ἐν ῥοφίμασιν, ὡφελίμως φθιστικοῖς δίδωται. ἰσορροῦσι δὲ ἐνιοὶ πνομῆς αὐτῆς δις ἢ τρίς τῆς ἡμέρας σὺν ἰοοῖν ἐν λοιμικαῖς καὶ ἀσάσει, βοηθεῖν περὶ τὸ ἀνόσους διαμῆναι.

Πρὶ Μυάγρου. Κεφ. ριζ'.

*Μυάγρος, οἱ δὲ μελάμπυρον, πόα σφυρανώδους διπλῆς, φύλλα ἔχουσα ἐμφερῆ τοῖς τῷ ἐρυθροδάκτυλῳ, ὡς ἁπλόμα ῥαχίῳ ἔοικος λιπαρὴν. ὧς ὡν, κόπτοντες αὐτὸ πεφωγμένον, καὶ περὶ πλάθοντες ῥάβδοις, καὶ ἀντὶ λύχνης ῥεῶμενοι. δοκεῖ δὲ ἐξ αὐτῶν λίπος ὁμαλίζεσθαι καὶ λεαίνειν τὰς τῷ σῶματι τῆς αχύντης.

Πρὶ Ονάγρας. Κεφ. ριη'.

Ονάγρας, οἱ δὲ ὀνοθήραν, οἱ δὲ ὄνηρίν, θάμνος ὅστις δεινδροειδὴς, ἐν μαγέθῃς, φύλλα ἔχων ἀμυγδαλῆ παρὰ πηλίσσῃ γλυκύῃ ῥα καὶ ἐμφερῇ τοῖς τῷ κρέμῳ ὡς ῥοδοειδῇ, μεγάλῃ· ῥίζαν δὲ λευκὴν, μικρὰν, ἡ ἰσχυροῦς, οἶνον ὀσμὴν ἀποδίδωσι. φύλλον ἐν ὄρεσιν τοῖς τοῖς. Διὸ καὶ μὴν ὅτι ἔχει τὸ ἀπόβρεγμα τῷ ῥιζίῳ ὑπο

ὑπὸ τῷ ἀγρίῳ ζῶον πρόμῳρον,
ἡμερῶν αὐτὰ καταπλαθεῖσα
δὲ τραίνει τὰ θηριώδη ἔλκη.

Πρὶ Κίρσιου. Κεφ. ριβ'.

Κίρσιον χαυλός ἐστιν ἀπαλός,
ὡς δὲ πηχὺς, πείρωνος, τὰ χάτω-
θεν συλλάχεια ῥοδοειδῆ ἔχοντα
ταὺς ῥωνίας ἀκανθώδεις ἐκ δια-
σημάτων μαλακὰς. τὰ δὲ φύλλα
βυγλώσῃ ἐμφερῆ, δασέα μετε-
ως καὶ μακρότερα, ὑπόλευκα,
10 ἀκανθώδη τοῖς πέρασι. τὸ δὲ
ἀνωτάτω τῷ χαυλοῦ πεφυρὲς,
δασὺ καὶ ἐπ' αὐτῷ κεφάλια ἀκρο-
πέφυρα, ἐκ πασπύμῃνα. ταύ-
της τινὲς ῥίζαν ἀνδρείας ἀναρχά-
φει ὑπὸ τὸν ἀγριώτατόν τινος ἀ-
15 γαδέρμῳρον, παύειν κιστῶν πόγους.

Πρὶ Ἀσέριος ἀπικῆς.

Κεφ. ρκ'.

Ἀσὴρ ἀπικὸς ῥαβδίων ἔξυλῶδες,
ἐπ' ἀκρὰ ἔχον ἀνδρὸς πορφυρῆν,
ἢ μήλινον, ὅσῳ ἀνδρεμίδος κε-
20 φάλιον περιελθὲς ἔχει δὲ φυλλά-
εια ἀσέρι οἰοία. τὰ δὲ περὶ τὸν
χαυλὸν φύλλα ὑπομήκη καὶ δα-
σέα. Ωφελεῖ δὲ σῶμα χρόν ἐκ πυ-
ρέμῳρον καταπλαστέμῳρον, καὶ
ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς καὶ βεβώ-
25 νας, καὶ τὰς περιπλώσεις ἑδρας.
φασὶ δὲ καὶ τὸ περιφύριζον τῷ ἀν-
δρὶ μετ' ὕδατος ποδῶν, συμαγ-
χικοῖς βοηθεῖν καὶ ἐπιληψίας παύ-
σων. ἀρμόζει δὲ καταπλαστέμενον
ἐν ῥῶν περὶ βεβώνων φλεγμονὰς.
ἐνερῶν

in potu data, feras mitigat, &
cicures facit: illitu quoque te-
tra vlcera mulcet.

Cirsum. Cap. CXIX.

Cirsum, caulis est tener, duo
rum cubitorum, triángulo simi-
lis: ab imo foliola, rosæ spe-
ciem referentia: anguli spinosi,
per interualla molles: folia
buglossio similia, maiora, subcā-
dida, modicè hirsuta, partibus
extremis aculeata: cacumen
caulis orbiculatum, hispidum,
in quo capitulo in summo pur-
purea, quæ soluuntur in lanugi-
nes. Radicé huius loco laborā-
ti adalligatā, dolores varicum
sedare Andreas scripsit.

After Atticus. seu ingui-
nalis. Cap. CXX.

After Atticus cauliculus ligno-
sus, florem in cacumine habes
purpureū, luteūve, per ambi-
tū, anthemidis capituli modo
diuisum, foliolis stellæ modo ra-
diatis: quæ autē caulē circūdāt
folia oblonga sunt ac hirsuta.
Feruenti stomacho, oculorum
inflammationibus, p̄ciduæ sedi,
ac inguinibus illitu auxiliatur.
Tradunt purpureum florem, si
ex aqua bibas, anginis, & pue-
ris comitiale malum sentiēti-
bus opitulari. Inguinū inflāma-
tioni recentē illinire cōuenit.

Si aridus

DIOSCORIDIS

Si aridus flos sinistra dolentis manu decerpatur, & inguinibus adligetur, dolore liberat.

Isopyrum. Cap. CXXI.

ISOPYRON, aliqui phasiolon ob similitudinem vocant, quoniam foliū quod est aniso simile in pampinos torquetur: capitula sunt in summo caule, tenuia, plena feminis, melanthij gustum imitantis. Contra tussim, & cætera pectoris vitia, semen ex aqua mulsa bibitur: hepaticis, & sanguinem excreantibus vtile.

Viola purpurea.

Cap. CXXII.

VIOLA purpurea folium habet hedera minus, tenuius ac nigrius, nec multò dissimile: cauliculus à radice medius prodit, in quo flosculus, suavisimè olens, purpureus: opacis & asperis nascitur. Refrigerandi naturam habet. Folia per se, & ex polenta illinuntur apertissimè stomacho estuanti, & oculorum inflammationibus, sedique pro-

cidenti.

Cacalia. Cap. CXXIII.

CACALIA, quæ leontice vocatur, folia fert magna, alba, è quibus medius caulis emicat,

ξηρὸν ὃ ἀναρεθρὸν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ* τῷ δὲ ῥευμῶτος, καὶ περὶ τοῦ βελῶνι, ἀπὸ λλάσας τὸ δόνην.

Πρὶς Ἰσοπύρου. Κεφ. ρκα.

Ἰσόπυρον, οἱ δὲ φασόλον καλεῖσθαι, ἀπὸ τοῦ εἰκέναι φασόλον, τὸ ἔχει ἄκρον τὸ πένταλον ἑλικα φέρειν* ἐπὶ δὲ κεφαλὰ ἐπ' ἄκρον τῷ καυλοῦ, λεπταῖς σπέρματιν ὁλῆρης, παρὰ πηλίσιν μελανθίῳ τῷ γεῦσθαι. τὸ δὲ φύλλον ἀνίσταται τὸ σπέρμα πνέοντα σὺν ἰομελικράτῳ, τὸς περὶ τὸν πόνους καὶ βῆχας ὠφελεῖ αἰμοπηόκοις τε καὶ ἡπατικοῖς ἀμύξαι.

Πρὶς Ἰου. Κεφ. ρκβ.

Ἰον* φύλλον ἔχει μικρότερον καὶ λεπτότερον, μελάντερον δὲ καὶ ἐκ ἀνόμοιον καυλίον μέσον ἀπὸ τῆς ρίζης, ἐφ' ἧς ἀνθῆλον σφόδρα ἐν ὧδες, πορφυρεῶν. φύεται ἐν παλαιοῖς καὶ τραχέσι τοῖς. Δωάμιν δὲ ἔχει συκπικλῶ. οὗ τὰ φύλλα κατὰ πηλασόμενα εἰσὶ καὶ ἐαυτὰ καὶ μετὰ ἀλφίτων, βοηθεῖ τομάχῳ καυσσομύχῳ καὶ ὀφθαλμῶν φλεγμοναῖς, καὶ ταῖς τῆς ἕδρας περὶ πῶσεσι. φασὶ δὲ τὸ πορφυρεῖον τῷ ἀνδρὶ μετ' ὕδατος ποδῶν, συναγχαλεῖν βοηθεῖν καὶ ἐμπληρίαις ταῖς ἐπὶ παιδῶν.

Πρὶς Κακαλίας. Κεφ. ρκγ.

Κακαλία, οἱ δὲ λεοντικῶν φύλλα φέρει λευκά, ἐν μεγέθει καυλὸς ὃ ἐξ

5 δὲ ἐξ αὐτῶν μέσος ὀρθός, λευκός,
 ἄνθος ἔχων οἰκὸς δρυὶ ἢ ἐλαίᾳ·
 ἐν ὅρεσι δὲ φύεται. Ταύτης ἡ ῥίζα
 ἐν οἴῳ βρεχυμένη ὡς τραγάκαν-
 10 θα καὶ ἐπληχυμένη ἢ διαμαστω-
 μένη καὶ ἑαυτῇ βῆχας καὶ βραχύ-
 τητας τῇ ἀρτηρίᾳ θεραπεύει, οἱ δὲ
 μὲν τὴν ἐξ ἀνδρῶν ὀπθουόμηναι
 κόκκοι λείοι, ἀναλυσθέντες κη-
 15 ρωτῇ καὶ ὀπχιδέντῃ, τετυμένον καὶ
 ἀρρυσίδωτον τινέσι τὸ πρὸς ὥπιν

Πρὶ Βύνι. Κεφ. ρκδ'.

10 Βύνιον καυλὸν ἀνήισι τε βράχ-
 ιον, ἐν ἡμῇ, πάχος δακτυλίου,
 φύλλα δὲ ὁμοία σελίνῳ, λεπτό-
 15 τερα δὲ πολλὰ πρὸς τὰ ἑστῶκο-
 εῖου ἄνθος ἀνήδον· σπέρμα ἐν-
 ὄδες, ὑοσκυάμει μικρότερον. Ἐστὶ
 20 δὲ ἔρηπικόν, δερματικόν, καὶ δευ-
 τέρων ἄνωγόν σπλινί τε καὶ νε-
 φροῖς καὶ κύσει ὀπτήθειον· χυλὸς
 δὲ αὐτοῦ ὑγρὸς τε καὶ ξηρὸς, καὶ
 25 χυλιδέντος σὺν ταῖς ῥίζαις καὶ
 τοῖς καυλοῖς καὶ τοῖς φύλλοις με-
 τὰ μελικράτῃ.

Πρὶ Πευδοβύνι. Κεφ. ρκε'.

25 Πευδοβύνιον θαμνιον ὅστις ἀπὸ
 θαμναῖον ἐν κρήτῃ, ἔχον φύλλα
 βενόφῳ ὁμοία δριμέα· δυνάμει δὲ
 30 καὶ τὰ ἐξ αὐτοῦ πνόμηναι κλωνία
 ὅσον δ'· σὺν ὕδατι, σφόδρα καὶ
 τραχηεῖαι, καὶ πλευρὰς πόνον
 θεραπεύει· διαφέρει δὲ καὶ χυ-
 ράδας μετὰ ἄλτων καὶ οἴνου κα-
 35 ταπλαστόμηναι χλιαρὰ.

Πρὶ

emicat, rectus, albus, florem fe-
 rens robori aut oleæ similem:
 nascitur in montibus. Radix in
 vino madefacta, ut tragacantha,
 delinctu aut manducatu
 per se tussibus, scabritiis arte-
 riæ, medetur. Grana quæ post
 excussum florem innascun-
 tur, trita & cum cerato
 illita, faciem erugant,
 & cutem extēdunt.

Bunion. Cap. CXXIII.

Bunion caulē ædit quadrangulum, procerum, digiti crassitudine, in quo ramuli minutis
 foliis ac floribus scatent: folia
 proximè radicē, apio similia,
 longè tenuiora, coriadrinis p-
 xima: flores anethi: fermen odo-
 ratum, hyosciamo minus. Vri-
 nā ciet, excalfacit, secundas euo-
 cat: lienī, vesicæ, renibus utile:
 Tam humidi q̃ sicci, expressiq;
 succi caulib*, foliis, radicibusq;
 vsus inualuit ex aqua mulsa.

Pseudobunion. Cap. CXXV.

Pseudobunion palmi alti-
 tudine fruticat in Creta, folia
 ramulosque napi ferens, acri
 gustu. Tormina, atque stran-
 guriā, laterumque dolores,
 sanant quaterni rami eius
 poti in aqua illiti quoque
 cum sale & vino, tepen-
 tes, strumas discutiunt.

Chamæ.

DI OSCORIDIS

Chamæcissus. Cap. CXXVI.

Chamæcissos, folio est hederæ, tenuiore, longiore, ramulis à radice quinis senisve, dodrātalibus, foliosis: flore violæ albæ simili, candidiore, ac tenuiore, gustu supra modum amaro: ra dice tenui, candida, inutili: nascitur in cultis. Bibunt conuenientissimè ischiadici folia, tribus obolis in aquæ cyathis tribus, tricenis quadragenisve diebus. eodè pota modo, senis aut septenis diebus, regium morbum purgant.

Chamæleuce. Cap. CXXVII.

Chamæleuce lumborū doloribus propitia est, herba virens: incuruis foliis, furculisq; flore rosaceo.

Buglossum, seu lingua bubula. Cap. CXXVIII.

Buglossum verbasco simile est, folium in terra sparsum, nigrius, asperum, bubulas imitās linguas. Quod in vinum deiectum, animi voluptates auget.

Cynoglossum. Ca. CXXIX.

Cynoglosson folia latifolia plantaginis habet, arctiora, minora, lanuginosa: caule vacat, & humi sternitur: puenit in sabuletis. Folia cum fuillo adipe veteri, medentur moribus canum, alopeciiis,

&

Πρὶ Χαμαίκισσε. Κεφ. ρκς'.

Χαμαίκισσος φύλλα ἔχει ὁμοία κισσοῖς, μακρότερα δὲ καὶ λεπτότερα, πολλὰ, κλωνία ἀπιδάμ-
αια, πένταλεα φύλων ἀπὸ τῆς γῆς ἐν τῇ ἀνθῇ λευκοῖς ὁμοία, μικρότερα, καὶ πικρὰ πρὸς τὸ γέυσιν ἰσχυρῶς ῥίζα λεπτή, λευκή, ἄχρητος· φύεται ἐν ἐρησίοις χωείοις. Ἀρμόζει δὲ τὰ φύλλα ἰσχυρὰ, ὅσον τριώβηλος ἐν ὕδατι κιάδοις τρισὶ πινόμηναι ἐπὶ ἡμέρας μὴ ἦν. καὶ ἰκτερινὴ δὲ ἀποκαθαίρει, ὁμοίως πινόμηναι πρὸς τῇ ἡμέρας.

Πρὶ χαμαίλευκῆς.

Κεφ. ρκζ'.

Χαμαλεύκη ποιεῖ πρὸς ὁσφύ-
ος ἀλγήματα ἐν ὕδατι λεία πινόμην.

Πρὶ Βεγλώσσου.

Κεφ. ρκθ'.

Βεγλώσσον ἔοικε φλόμα, φύλλον δὲ ἔχει χαμαίπετες, τραχύ-
τε καὶ μελάντερον, ὁμοιον βόδου γλώσσῃ. ὁ πρὸς κατὰ μέτρον εἰς τὸν οἶνον εὐφρόσιμον δοκεῖ εἶναι.

Πρὶ Κυωόσσω. Κεφ. ρκθ'.

Κυωόσσω φύλλα ἔχει ἀρνο-
βλώσσῳ ἴσῳ πλάτυ φύλλῳ ἐμφρε-
σενώτερα καὶ μικρότερα, χροῶδη, ἀκαυλον, ἐπὶ γῆς ἐσπρόμυρον· φύεται ἐν ἀμμόδεσι τόποις. Διῶκεται καὶ τὰ φύλλα λεία σὺν σέσπι παλαιῷ ὑεῖω, κυωόσση καὶ ἀλωπεκίαις,

περίας, καὶ καταχρῶματα ἰατρικῶν
 ἔστι δὲ αἰσθάνειν ἢ πᾶσι καὶ πονοῦν
 οὐκ οἶνον, κοιλίας ὅτι μαλακίαν.

Πρὶ φυτεύματος. Κεφ. ρλ'.

Φυτεύμα φύλλα ἔχει ὁμοία
 5 σπουδίω, μικρότερον δὲ καρπὸν
 πολὺν τετραμήριον ὅτι ῥίζαν μι-
 κρὰν, λεπλὴν, ἐπιπλάταιν ὡς
 ἀναρχάφοισι τινες ἐνδεῖν πρὸς
 φίλτρον.

Πρὶ Λεοντοπόδιου. Κεφ. ρλβ'.

10 Λεοντοπόδιον διδακτυλίου
 ἐστὶ βοτανιον, ἔχον φυλλάρια σενὰ
 ἰσχυρὰ, ὡς τεσσάρων δακτύλων
 ἢ καὶ πέντε τὸ μήκος, διατέτακται
 δέ τε καὶ τὰ πρὸς τῇ ῥίζῃ καὶ ὑπὸ
 λευκὰ ἔσθ' ἀκρὸν δὲ τῶν καμ-
 15 λῶν κεφάλαια ὡς ὅτι τετραμήρια,
 ἐν οἷς αὖτις μέλανα ὅτι καρπὸς
 αὐτῶν δουδερόντος διὰ τὸν πρὸς
 κεχυμένον αὐτῶν χροῦν ὅτι ῥίζα δ'
 ὑπερβαίνει μικρά. φασὶ δὲ καὶ ταύτην
 ὡς χρῆσθαι εἰς φίλτρα.

20 Πρὶ Ἰππογλωσσου.

Κεφ. ρλγ'.

Ἰππογλωσσον δαυλίσκος ὅτι
 μυρομένη ἀγρία καὶ λεπλὴ τὰ φύλλα
 ὁμοίως κόμην ὅτι ἀκρὸν δὲ ἔχει,
 καὶ ἐπ' ἀκρὸς ὡς ὅτι γλωσσίδα πα-
 25 ρὰ τοῖς φύλλοις δοκεῖ δὲ ἢ κόμη
 πρὸς αἰμία εἶναι χρήσιμον κεφα-
 λαλγὸς μύρον ὅτι καὶ εἰς μαλά-
 γματα ἢ τε ῥίζα καὶ τὸ χυλίσμα.

Πρὶ Αντιρρίνου. Κεφ. ρλδ'.

Αντιρρίνον, οἱ δὲ ἀγάρρηνον
 ἔστι

& ambustis. Emollit aluum;
 decoctum herbæ ex vino po-
 tum.

Phyteuma. Cap. CXXX:

Phyteuma folia habet radi-
 culæ, minora: copiosum semē;
 perforatum: radicem parvā, te-
 nuem, per summa terræ niten-
 tem: quā ad amatoria cōueni-
 re, nonnulli scriptū reliquerūt.

Leontopodiū. Cap. CXXXI:

Leontopodiū duūm digito-
 rum herbula est, folia ferēs an-
 gusta, lōgitudine ternūm qua-
 ternūmve digitorū hirsuta, q̄
 iuxta radicē lanosiore flocco
 canescunt: capitula in summo
 caule quasi perforata: flores ni-
 gri: semē vsq; adeo spissa lanu-
 gine inuolutum est, vt sæpe fal-
 lat: radice parua cohæret: quā
 tradunt appēsam ad amatoria
 prodesse, & tubercula discul-
 tere. Hippoglossum.

Cap. CXXXII.

Hippoglosson, frutex est fo-
 lia habens rusci tenuis figurā,
 & spinosam comā, & in sum-
 mo ceu linguas ē foliis exeun-
 tes. Capitis dolorem caronā
 ex comis imposita minuit: Ma-
 lagmatis radix succūsque ad-
 miscetur.

Antirrhinū. Cap. CXXXIII:

Antirrhinō, alij anarrinō vo-
 cant,

DIOSCORIDIS

cant, herbam caule & foliis anagallidi similem : flore albæ violæ, purpureo, minore tamen, ideóque sylvestris lychnis nominata est : semine vituli narium simili. Tradunt perunctos ea, cum oleo lilino, venustiores fieri: nec vilo medicamento lædi posse, si quis appensum gestet.

Catanáce. Cap. CXXXIII.

Ex eo genere vna, folia cornopi habet longa, radicé iunci modo prætenuem: capitula sena, septenave, in quib⁹ erui semen inest. Arescens in terram flectitur, & se contrahit ad speciem vnguium milui exanimati. Altera mali parvi magnitudiné explet, radice exiguæ oliuæ magnitudine: foliis quoque oliuæ colore, & figura, mollibus, diuifis, humi inclinatis: semen, vt cicer, minutum, in virgulis dependet, punicei coloris, multis foraminibus pertusum. Vtráque narrant in amatoria expeti. Thessalicæ mulieres his vti traduntur.

Tripolion. Cap. CXXXV.

Tripolion in marinis nascitur locis, quæ allidit vnda, recedensque dimittit, neque in mari, neque in sicco: folio glasti

ἔγινι ὃ καὶ ταύτην λυχνίδα ἀγρίαν ἐκάλει, πῶς ὅτιν ἐμφερὲς ἀναγαλλίδος φύλλοις καὶ χαλῶ· τὰ δ' ἄνθη πορφυρᾶ, ὅμοια λευκοῖσιν. μικρότερα δὲ, διὸ καὶ ἀγρία λυχνὶς ἐκλήθη· καρπὸν δὲ φέρει μόχκο ῥισὶν ὅμοιον, ῥέστον ἰδεῖν. ἰσορεῖται δὲ τὸτο ἀντιπαθὲς εἶναι φαρμάκοις πτερυγίου μύμον· ἐπιχαεῖν τε ποιεῖν ἀλειφόμυμον σύν ἐλαίῳ κρινίνῳ, ἢ κυπρίνῳ.

Πρὶ Καταράγκης. Κεφ. ρλδ'. 10

Κατανάγκη, ἡ μὲν τις αὐτῆς ἔχει φύλλα μακρὰ ὡς κορωνόποδος, ῥίζαν λεπτὴν, χρονώδη· κεφαλὰς δὲ ε', ἢ ζ'. ἐν αἷς καρπὸς ὅμοιος ὀρέβω· κάμπηται δὲ ξηραίνόμενος ἐπὶ τῷ γλῶϊ, καὶ ἐκπίπτει ὅνυχιν ὁμοιωταὶ νεκρῷ. τὸ δὲ ἕτερον μήλις μέγας ἔχει μακρῷ ῥίζαν δὲ μικράν ὅσον ἐλαίᾳ· τὰ δὲ φύλλα χήματι καὶ χροίᾳ ἐνικότα ἐλαίᾳ, μαλακὰ δὲ ἐπὶ γῆς ἐσθαιμύα καὶ ἐπεχρισμένα· καρπὸν ἐπὶ ῥαβδόις μικρόν· τετραμήριον καὶ πολλὰ μέρη ὡς ἐρέβινθον φοινικοῦ ἀμφοτέρως δὲ ἰσορροῦσι πνὲς εἰς φίλτρα ἀρμόζουσιν. χρῆσθαι δὲ ὃ λέγουσιν αὐταῖς ταῖς δεσπυλὰς γυναικῶς.

Πρὶ Τειπολίου. Κεφ. ρλέ. 25

Τριπόλιον φύει ἐν παραθαλάσσι τοῖς τόποις ὅς ἐπιπλύζει ἢ δαλασσα καὶ ὑποχωρεῖ, οὔτε δὲ ἐν ξηρᾷ, οὔτε ἐν θαλάσσῃ· φύλλα

ἢ ἔχει ἰσότη παρὰ πλήσια, παρὰ
 ἴσα μὲν τοι καμλὸν σπιδαιμαί-
 ον ἀνὼθεν ἐπερσιμένον. ταύτης ἰσο-
 ρεΐῃ τὸ ἀνδρὸς τοῖς ἡμέρας με-
 ταβάλλειν τὸ χροῖμα, πρὸς μὲν
 5 λευκὸν, καὶ ἢ τὴν μεσημβρίαν πορ-
 φυρίζον, ὁπὲρ ἡ φοινικῶν ῥίζα λευ-
 κὴ, ἐν ὥδῃς, θρηματικῇ γενομένη.
 ἢ πρὸς πινόμῳ ἐν οἴνῳ < β. πλῆ-
 θος, καὶ κοιλίας ὕδωρ ἄγει καὶ ἔρα-
 τέαυτε) δὲ καὶ εἰς ἀλεξίφαρμακα.
 10 Πρὶ Ἀδιάντε. Κεφ. ελς.
 Ἀδιάντον, οἱ δὲ, πολὺν τεύχον,
 φυλλάδια ἔχει κοιλάνδρῳ ὁ-
 μοία, ἐπερσιμένα ἐπὶ ἄκρῳ· τὰ
 δὲ καμλῖα ἐφ' ὧν ἐκπέφυκε μέ-
 λαντα, ἰσχυρῶς λεπτὰ, σπιδαιμα-
 15 αῖα, σίλβοντα· φύλλα ὁμοία πτε-
 ρειδι, μικρὰ λίαν· οὔτε δὲ καμ-
 λὸν, οὔτε ἀνδρὸς, οὔτε καρπὸν φέ-
 ρει· ῥίζα ἄχρηστος. Δυνάται ἢ τὸ
 ἀφελήματα τὸ πᾶς πινόμῳ, βοη-
 θεῖν ἀδριατικοῖς, δυσηνοϊκοῖς,
 20 ἰκτερικοῖς, σπληνικοῖς, δυσουρῆ-
 σι· θρύπτει δὲ καὶ λίθοις, καὶ κοι-
 λίαν ἴσησι, καὶ θηριοδύκτοις βοη-
 θεῖ· καὶ σωμαχοῦ ρεύματι σὺν
 οἴνῳ πινόμῳ· ἄγει δὲ καὶ ἔμ-
 μῶνα καὶ λόγια· ἴσησι δὲ καὶ αἰ-
 25 ματος ἀναγωγῇ· καταπλάτ-
 τεται δὲ καὶ πρὸς θηριοδύκτα
 ὦμῃ, καὶ ἀλωπεκίας διασύνε, χρι-
 σάδας σκορπίει· ἀποσιμᾷ πῆ-
 τυρα καὶ ἀχόρας σὺν κονία·
 σὺν λαδάνῳ δὲ καὶ μυρσινῶ,
 καὶ

glasti crassiore: palmeo cau-
 le, in mucrone diuiso. Eius, vt
 tradunt, flores colorem ter die
 mutant, mane candidi, meri-
 die purpurei, fero punicei cō-
 spiciuntur. Radice alba, odo-
 rata, calidi gustus. Quæ drach-
 mis duabus in vino pota, aquâ,
 vrinâmque per aluum extra-
 hit. In medicamenta digeritur,
 quæ venena arcent.

Adiantū. Cap. CXXXVI.

Adianton, polytrichon, pusil-
 la gerit folia, similia coriandri,
 in summo incisuris diuisa, cau-
 liculi, quibus exoriuntur, nigro
 colore nitent, prætenues, pal-
 mum alti: radice superuacua:
 neque caulem, neque fructū,
 neque florem profert. Deco-
 ctum herbæ potum, prædest
 spirandi difficultati, fustorio-
 fis, lieni, & felle suffusis, & v-
 rinæ difficili. Calculos frangit,
 aluum sistit, serpentium mor-
 fibus auxilio est. Cōtra stoma-
 chi fluxiones in vino bibitur.
 Secundas ciet & menstrua, san-
 guinis reiectiones inhihet. Cō-
 tra serpentiū morsus cruda her-
 ba illinitur, alopecias desat, stru-
 mas discutit: furfures et manā-
 tia capitis vlcera, ex lixiuio e-
 medat: defluētes capillos con-
 tinet, cum ladano & myrtino,

& fusino aut hyssopo, vinó-
que. Decoctum eius cum li-
xiuio & vino infusum, idem
præstat: coturnices & galli-
naceos pugnaciores facit, in
cibos eorum additum. Seritur
gratia utilitatis pecorum, cir-
ca ouilia. Umbrosis, & palustri-
bus, circa parietum aspergines,
& fontium specus enascitur.

Trichomanes.

Cap. CXXXVII.

Trichomanes nascitur eis-
dem in locis quibus adianton:
filici simile, sed exilius: foliis lé-
ticulæ, tenuibus, in ordinem
vtrinque digestis, aduersis in fe,
in ramulis tenuibus, acerbis, fu-
fco colore splendentibus. Ea-
dem quæ & adianton præsta-
re posse constat.

Xanthium siue lappa.

Cap. CXXXVIII.

Xanthium, alij phasganon,
alij antithesion, alij chascanon,
alij choeradosethron, alij & a-
parinem ipsam vocant, nasci-
tur lato, & pingui solo, & la-
cubus exiccatis, caule cubi-
tali, anguloso, pingui, prode-
untibus ex eo crebris alis: fo-
lia atriplicis habet, insecta, na-
sturtium odore imitantia: fru-
ctum grandis oliuæ modo, ro-
tundum, & vt platani pilula,
spinosum,

ὡς σισίνω ἢ ὡς ὠπώπω καὶ οἶνω βί-
χας ρεύσας παρεκρατεῖ. καὶ τὸ ἀ-
φελήματα ὃ αὐτὸ σὺν κανίᾳ καὶ οἶνω
σπινχόρῳ συνποιεῖ καὶ ἰδὲς ἀκνίδας
καὶ τὸν ὀρετυγας μαχματέ-
ρες μυχθῶδον τῇ βοφῇ φυτεύει. 9
δὲ ἐπὶ ὠφελείᾳ περὶ ἀπὸν ἐν τῇ
μανδραῖς φύεται δὲ ἐν πακιστί-
οις καὶ ἐλάδεσι τόποις καὶ τοίχοις
ἐν ἡμῶις καὶ περὶ τὰς κρήνας.

Περὶ Τριχομανοῦς.

Κεφ. ρλζ.

10

Τριχομανές, οἱ δὲ καὶ τὸ ἀδι-
αντον καλεῖσι, φύει καὶ τὸν ἀν-
τὸν τόπος, ὁμοιον πέλιδι, μι-
κρὸν λεῖαν σπινχῶδον ἐξ ἑκατέρου
μέρους τὰ φύλλα ἔχον λεπτά, φα-
κοειδῆ ἐναντία ἀλλήλοις, ἐπὶ ῥαβδῶ
δίων λεπτῶν καὶ σπινθῶν καὶ σπυ-
ρριῶν, ὑπομελάνων. δοκεῖ δὲ τὰ
αὐτὰ διῶαδι τῷ περὶ τριχιδῶν.

Περὶ Ξανθοῦ. Κεφ. ρλθ.

Ξάνθιον, οἱ δὲ φάσανον, οἱ δὲ 20
ἀντιθέσιον, οἱ δὲ χάσανον. οἱ δὲ,
χοιρεδολεθρον, οἱ δὲ, καὶ ταύτῃ
ἀπαείνῃ καλοῦσι, φύεται ἐν ὑ-
γροῖς τόποις καὶ λίμναις ἀναξερὰ
μύραις, καρπὸν ἔχει πικρῶν, λε-
παρὸν, γωνιδῶν, καὶ ἐπὶ αὐτῇ κα- 25
χύλας πλείονας, ἀβαφάξ δὲ τὰ
φύλλα ἐμπερὶ ἔχει, ἐντομὰς ἔ-
χοντα κατὰ δάμνα δὲ πῶς ὀσμὴν
παρεπλήσια καρπὸν ὃ σπινθῶν
ὡς ἐλάαν μεγάλῃ ἀκνίδῃ
ὡς

ὡς πλαταῖς σφαίρας, ἀνπλαμ-
 ξανόμενον τῶν ἱματίων μὲν τὴν
 ψαύσῃ. Διῶα δὲ ὅ καρπὸς ὡρὴν
 τελείως ξηρανθέντι, συλλεγείς
 καὶ κοπείς καὶ ἀποτεθείς εἰς κε-
 ραμεῦν ἀγχείον ξανθὰς τείχας
 ποιεῖν. εἰάν τις ἐπὶ τῇ χρίσεως λα-
 βὼν βυβλίς πλῆθος ἐξ αὐτῆς, δι-
 εῖς τε ὕδατι χλιαρῷ, καὶ περὶ κνί-
 βώπας τὴν κεφαλὴν καταπλά-
 σῃ. πινὲς δὲ καὶ μετ' οἶνον κόψαντες
 10 αὐτὸ, ἀποτίθειν. καταπλάθει-
 ται δὲ, καὶ πρὸς οἰδήματα ὁ καρ-
 πὸς ἐπιτηδείως.

Πρὶ Αἰγίλωπος. Κεφ. ρλθ'.
 Αἰγίλωπος βοτάνιον ὅτι φύλλα πυ-
 ρῶ ἔχον ὁμοία, μαλακώτερα δὲ,
 15 ἐπ' ἀκρας δὲ τῇ κεφαλῇς, καρπὸς
 ἔχον β' ἢ γ'. ἐρυθρὸς, ἐφ' ὧν ἀδέ-
 ρεις οἰογὲν τείχας ἐκπεφύκησι. δε-
 ραπέυει δὲ ἢ πῶς μὲν ἀλεύρε κατα-
 πλαθεῖσαι αἰσινώπια, καὶ σκληρίας
 διαφορεῖ. ἀποτίθειν δὲ ὁ χυλὸς.
 20 πρὸς τὰ αὐτὰ μυγίς ἀλεύρεω καὶ
 ξηρανθείς. Πρὶ Βρώμης. Κεφ. ρμ.
 Βρώμιος πῶς ὅτιν αἰγίλωπι ἐμ-
 φερής. Διῶα μιν ἔχουσα ἐπ' ἐξήραν
 πικρὴν, ἀφελθεῖσαν ἐν σαυῇ τῇ ρί-
 ζαις μὲν ὕδατος, ἕως ἀποτειπῶ
 25 δὴ τὸ ἀπόζεμα, διυλίζων αὐτὸ
 ἐπίμυσεν μέλι ποσσόν, καὶ ἐλκε-
 ραὶ αὐτῇ πᾶχος ὑγρῷ μέλιτος.
 καὶ ποιεῖ ἐπὶ τῇ ὀζανικῶν, εἰ βρέχων
 ὀδόνην περὶ δὲ τῷ μυκτῆρι, καὶ
 κατ' εἰς τὸ μὲν τοι ποιεῖ οὕτως.

ἐγίρει

spinosum; qui contactu vesti-
 bus adhærescit. Is antè colle-
 ctus quàm perfectè siccescat,
 tunditur, & fictili vase recon-
 ditur. Flavos autem facit ca-
 pillos, si acetabili instar tepi-
 da aqua madescat, mox caput,
 nitro antè perfrictum illi-
 natur. Alij in vino tun-
 dunt, & ita asseruant.
 Semen aptissime
 tumoribus im-
 ponitur.

Ægilops siue festuca.

Cap. CXXXIX.

Ægilops herbula folia tritici
 habens, sed molliora, in sum-
 mo capite semina bina ternā-
 ve rubra, quibus aristæ quasi
 capillaceæ exeunt. Illita cū fa-
 rina herba ægilopiis medetur,
 duritias discutit. Succus farinæ
 admixtus, siccatur, & eorundē
 gratia reponitur.

Bromus. Cap. CXL.

Bromus herba ægilopi simi-
 lis, exiccatoriam vim habens,
 decoquitur cum sua radice in
 aqua ad tertias, & iuri colato
 par modus mellis adiicitur: rur-
 sus incoquitur, dū liquidi mel-
 lis crassitudo fiat. Linteum
 eo humore imbutum, & nari-
 bus inditum, contra graueo-
 lentiam vlcerum efficax est.

G iij Aliqui

DIOSCORIDIS

Aliqui tritam aloën addunt, & eo modo vtuntur. Cum ficcis rosis cocta in vino, grauem oris halitum emendat.

Glaux. Cap. CXLI.

Glaux cytifo aut lenticulæ foliis similis, quæ supernè virent, auersaq; candidiora spectâtur: ramuli à terra exiliunt quini fenive, tenues ab radice, dodrâ tem alti: flores violæ albæ, purpurei exeunt, minores tamen: nascitur iuxta mare. Coquitur cum hordeacea farina, sale, & oleo in sorbitione, ad renocandam extincti lactis vbertatē.

Polygala. Cap. CXLII.

Polygala palmi altitudinem petit, foliis lenticulæ, gustu adstricto. Quæ pota, lactis abundantinam facit.

Osyris. Cap. CXLIII.

Osyris, frutex est niger: ramulos ferens tenues, lentos, fractuq; contumaces: & in his folia, quaternâ, quina, fenave, ceulini, nigra in initio, dein colore mutato rubescētia. Decoctum eius potum, iuuat arquatos.

Aspera smilax. Ca. CXLIIII.

Smilax aspera folia habet periclymeni, farmēta tenuia, multa rubi modo aut paliuri aculeata: arbores scādit ab imo ad sūma perreptās, se cōuoluēs eis.

Fert

ἐνιοι δὲ ἀλόλῳ λήωθ' τις παρὰ μύσσει, καὶ ἔτω χλῶν. περὶ ἣ καὶ μὲν ῥόδων ξηρῶν ἀφεψηθεὶς συνοίνῳ πρὸς τὰς ἑξήκοντα δυσεῖας. Πρὶ Γλαυκός. Κεφ. ρμά.

Γλαυξ κητῶ ἢ φακῶ τὰ φύλλα ἔοικεν, ὡν τὰ κατώτερα λευκότερα, ἄνωθεν δὲ χλωρά· κλωνία ἣ ἀπὸ γῆς ἀνίστοι πέντε ἢ ἑξήκοντα, σπιδάμαϊνα ἀπὸ τῆς ῥίζης ἀνθὴ λευκοῖας ὁμοία, μικρότερα δὲ πορφύρεα· φύεται παρὰ θάλατταν. αὕτη ἐξομύνη μετὰ ἀλεύρου κριθίνου καὶ ἁλὸς καὶ ἐλαίου, καὶ ῥοφιδεῖται, γάλα σθεννύμῃον ἀνακαλεῖται.

Πρὶ πολυγάλα. Κεφ. ρμβ.

Πολύγαλον δαμνίον ὅστις σπιδάμαϊον, ἔχον φύλλα φακοειδῆ, γένυται ὑπὸ στυφονο· περὶ δὲ καὶ τούτο, γάλα δοκεῖ πλείον ποιεῖν.

Πρὶ Οσύριδος. Κεφ. ρμγ.

Οσυρίς φρυγανίον μέλαν, λεπτόεσθρον, δύσθραυστον, καὶ πρὶ αὐτὸ φύλλα ἄρια γ' ἔστι δὲ καὶ δ' ἢ ε' ἢ ἑξήκοντα ὡς σφ' ἰνὸς μέλανα κατὰ τὰς ἑξήκοντα· μεταβαλλόμενα δὲ ὑπερδρα γίνονται. ταύτης τὸ ἀφεψημα πινόμῃον ἱκτέρῳ βοηθεῖ.

Πρὶ σμίλακος βραχείας. Κεφ. ρμδ' 25

Σμίλαξ τραχέα, τὰ μὲν φύλλα ἔχει περικλυμνύου ὁμοία, καὶ κλήματα πολλὰ, λεπτά, ἀκανθώδη ὡς παλίκρος ἢ βάτος. ἐλίσσεται ἢ πρὶ τὰ δένδρα ὡς ἄνω καὶ κατώτερον.

νεμωδῶν καρπὸν δὲ φέρει βορῶ-
 δη ὡς ἐπιφυλλίδα πεπαισθέντα
 δι' ἐρυδρὸν, ὑποδακνόντα ἡρέμα
 ἐν τῇ γεύσει· ῥίζαν σκληράν, πα-
 χεῖαν· φύει ἐν τόποις ἐλώδεσι καὶ
 βαθέσι. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ ὁ
 καρπὸς δασύμων ὄσιν ἀντίδο-
 τος, πρεπινόμω, καὶ ἐπιπνόμε-
 να. παρεξέδεται ὅτι εἰς πρὸς ἀρ-
 πηγῶν παιδίῳ τείψας τί τέτων
 δῶκεῖν. ὧ· οὐδενὸς δηλητηρίου
 10 φαρμάκου βλαβήσεται. τέμνεται
 δὲ καὶ εἰς ἀλεξιφάρμακα.

Πρὶ Σμύλακος λείας.

Κεφ. ρμέ.

Σμύλαξ λεία, ὁμοία κισσῷ τὰ
 φύλλα ἔχει, μαλακώτερα δὲ καὶ
 15 λεϊότερα καὶ λεπτότερα· τὰ δὲ κλή-
 ματα ὥσπερ ἡ περὶ αὐτῆς ἀκα-
 δας ἐκχρόντα ἐλίσσεται δὲ περὶ
 τὰ δένδρα. ὡς ἡ περὶ τέρα· καρ-
 πὸν δὲ ἔχει ὥσπερ θέρμου μέλα-
 να, μικρόν· αἶς δὲ ἐπαίῳ ἔχοντα
 20 ἄνθη λευκὰ, πολλά· καὶ πᾶσαν τὴν
 σμύλακα καὶ περιφερῆ, καὶ σκη-
 ναὶ δὲ αὐτῆς γίνονται τὰ θέρους·
 φυλορροεῖ δὲ τῷ φθινοπύρῳ.
 Τέτερος καρπὸς μετὰ δρυκνίου
 πινόμωρος, τειωβόλου ὀλκὴν ἐκάτε-
 25 ρον ἐνύπνια πολλά, καὶ παρεξέ-
 δη ὄσιν ἰσορεῖται.

Πρὶ Μυρσίνης ἀλείας.

Κεφ. ρμς.

* Μυρσίνη ἀλεία, τὸ μὲν φύλλον
 μυρσίνη ἔχει ὁμοίον, πλατύτε-
 ρον

Fert racemos exiles, qui ma-
 turi rubescunt, gustumque le-
 niter mordent. Nascitur in pa-
 lustribus & asperis: radice du-
 ra, crassaque. Folia & acini, &
 antè & post epoti, venenorum
 antidota sunt. Tradūt, si infan-
 tibus nuper in lucè æditis, quid
 ex his trium propinetur, nulla
 postmodum venena nocitura.
 Inciditur etiam ad alexiphar-
 maca, id est, ad ea medicamēta
 quibus venena arcentur.

Læuis smilax.

Cap. CXLV.

Læuis smilacis folia hederæ
 similitudinem habent, mollio-
 ra, læuiora, tenuiora: huius sar-
 menta nullis horrent spinis: cō-
 uoluitur arborib⁹ vt prior: fru-
 ctū parit lupini modo nigrū,
 exiguum: flores circunquaque
 exiliunt candidi, copiosi, orbi-
 culati. Hac smilace, quadam to-
 piariorum arte, tentoria con-
 tra æstus molestiam factitan-
 tur: folia per autumnum deci-
 dua. Semine cū dorycnio po-
 to, ternis singulorū obolis, va-
 ria & tumultuosa in somnis
 obseruari traduntur.

Ruscus.

Cap. CXLVI.

Sylvestris myrtus, aliquibus
 oxymyr sine, aut myrtacātha.

G iij Latinis

Latinis ruscum appellatur: folium fert myrti, latius, in formā lanceæ mucronatū; bacca per maturitatē rubescūt, rotundæ, à medio folio depēdentes, offeo intus nucleo; cubitales ramuli ab radice exeunt, vitilium modo lenti, fractu cōtumaces, foliosi: radice graminis simili, acerba, & subamara. Folia & bacca in vino potæ vrinā ciēt, menses pellunt, vesicæ calculos frangunt, stillicidio vrinæ medentur, dolores capitis sanant, & regium morbū. In asperis & præcipitibus locis enascit. Decoctum radice in vino potū, eisdem præbet effectus. Cauliculi recētes, asparagorū vice, in cibo sumūtur. Amari autem sunt, sed vrinam mouent.

Laurus Alexandrina.

Cap. CXLVII.

Laurus Alexandrina, folio est rusci maiore, molliore, & candidiore: semine inter folia rubro, ciceris magnitudine: ramos spargit in terra dodrātāles, interdum longiores: radice sylvestri myrto simili, maiore, molliore, odorata: inuenitur in montosis. Difficiles partus accelerat, radice pota sex drachmarum pōdere in vino dulci:

&

ἐν δὲ λογχρείδες, ὅξυ ἐστὶ ἀκρὴ τὸν δὲ καρπὸν στρογγύλον, ἐν μέσῳ δὲ τῷ πετάλῳ ἀειφερῆ, ἐρυθρὸν ἐν τῷ πεπαίνεσθαι, ἔχοντα τὸ ἐν τῷ ὁσώδεσ· κλωνία λυγρὰ δὴ πολλὰ ἐκ τῆ ρίζης αὐτῆς δίδουσι δραυστα. ὅσον πηχεὺς, φύλλον μεστὴ· ρίζαν παρὰ πηλίσαν ἀγρώσει, γενομένην σφυγμὸν, ὑπόπικρον. Διῶμαιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς ἐν οἴνῳ πινόμενα, οὐρα κινεῖν, καταμύμια ἀγειν, καὶ λίθοις τῶν ἐν κύστει θρύπτειν. Σεραπεία δὲ καὶ ἰκτερον καὶ σπασμοὺς, καὶ κεφαλὰν γίαν· φύεται ἐν τραχέσι τόποις καὶ κρημνώδεσι. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ τῆς ρίζης σὺν οἴνῳ ποτὴν, τὰ αὐτὰ ποιεῖ. καὶ ἀντὶ ἀσπαραγῶν δὲ οἱ κλωνιοὶ νεοθαλεῖς λαχανοκόμοι ἐδίδον. εἰσι δὲ ἔμπικοι καὶ διερπητικοί.

Πρὶ Δάφνης. Κεφ. ριζ.

Δάφνη ἀλεξάνδρεα, οἱ δὲ ἰδαία, οἱ δὲ δανάη, οἱ δὲ ὑπόγλωπτον, οἱ δὲ ζάλας, οἱ δὲ σεφάνη, φύλλα ὀξυμυρσίνη ὁμοία ἔχει, μείζονα δὲ καὶ μαλακώτερα, καὶ λευκώτερα. καρπὸν δὲ ἐν μέσοις ἐρυθρὸν ἐρεβινθε τὸ μέγεθος κλώνας ἐπὶ γῆς σπιδαιμαίοις ἢ καὶ μείζονας. ρίζαν παρὰ πηλίσαν τῇ ὀξυμυρσίνῃ μείζονα. καὶ ὑπόδην καὶ μαλακώτεραν· φύεται ἐν τέτοις ὄρεσιν. Διῶμαιν δὲ ἔχει ἢ ρίζα πινόμενα < 5. πολλὸς μετ' οἴνου γλυκέος, & οὐδὲν

βοηθεῖν τὰς δυσκούσαις καὶ τρα-
γουεῖσθαι. ἄγει δὲ καὶ αἷμα.

Πρὶ Δαφνοειδούς. Κεφ. ρμθ.

Δαφνοειδές, οἱ δὲ ἐν πέλταλον,
οἱ δὲ χαμαιδάφνη, οἱ δὲ πέπλι-
ον καλοῦσι, θαμνίσκος ὅστις πηχυ-
αῖος, κλάδεις πολλοὺς ἔχων ἱμα-
τώδεις πρὸς τὸ ἀνῶθεν ἡμισυ, φυλ-
λοφόροις· φλοιὸς δὲ ὡς τὰς ῥά-
βδους γλίσχρος ἰσχυρῶς· φύλλα δά-
φνη εὐκρότα, μαλακώτερα δὲ καὶ
10 ἰσχυρότερα καὶ οὐκ ἐν κλάσσι, δά-
κνοντα καὶ πυρεῶντα τὸ σῶμα
καὶ φάρυγγα· ἀνθὶ λευκὰ· καρπὸν
μέλανα, ὅταν πεπανθῇ· ῥίζα ἄ-
χρηστος· φύεται ἐν ὄρεσιν τοῖσι·
ἄγει δὲ καὶ τὸ φύλλον αὐτῆς ξηρὸν
15 ἢ νεαρὸν ποδὲν καὶ κοιλίαν φλεγ-
ματώδη, κινεῖ καὶ ἐμέτοις καὶ ἐμ-
βλίμῃ· καὶ διαμασσηθὲν ἀποφλεγ-
ματίζει· ἐστὶ δὲ καὶ πηαρμικόν· κα-
θαίρει δὲ καὶ ὁ καρπὸς αὐτῆς ὅσον
κόκκοι ἐκ πινούμενοι.

20 Πρὶ Χαμαιδάφνης. Κεφ. ρμθ.

Χαμαιδάφνη, οἱ δὲ καὶ ταύτιν
αἰετὸν ἀνδρείαν ἐκάλεσαν, ῥάβδους
ἀνίστοι πηχυαῖος, ὅς θάξας λεπτὰς καὶ
λείας· καὶ ταύτης δὲ τὰ φύλλα ὁ-
μοία δάφνη, λεϊότερα δὲ πολλῶ
25 καὶ χλωρότερα· καρπὸν δὲ ὡς ἐπι-
ρῆ, ἐρυθρὸν, τοῖς φύλλοις ὀπιπτεφυ-
κότα. Ταύτης τὰ φύλλα λεῖα κα-
ταπλαδύντα, κεφαλῇ καὶ καὶ σῶ-
μάχου ἐξαλάσειν ἀρήγει· ποδὲν-
τα δὲ μετ' οἴνου σφόδρα παύει·

ὁ δὲ

& fillicidio vrinæ auxiliatur,
sed sanguinem extrahit.

Daphnoides.

Cap. CXLVIII.

Daphnoides cubiti altitudi-
ne fruticat, ramis flexilibus ob-
sequiosisque, multis, inde sur-
sum versus foliosis: cortex su-
pra modum viscosus ramos ve-
stit: folia lauri, graciliora, &
molliora, fractu contumacia,
quorum gustatu os & fauces
incenduntur: flores candidi:
bacca, cum ematuruit, nigra:
radix inutilis: nascitur in mon-
tosis. Pituitas extrahit folium re-
cens vel aridum in potu, men-
ses ciet & vomitus: caput ina-
nit commanducatum, ster-
nutamenta mouet, Baccæ
quindecim potæ al-
uum resoluunt.

Chamædaphne.

Cap. CXLIX.

Chamædaphne virgas emit-
tit cubitales, singulari ramulo
constantes, rectas, tenues, læues:
folia lauri similitudine, lævio-
ra multo, ac viridiora: semen
rotundum, rubens, annexum
foliis. Illinuntur capitis dolo-
ribus trita folia, & stomachi
ardores mulcent: ad sedan-
da tormina cum vino bibuntur.

Potus

DIOSCORIDIS

Potus cum vino succus, menses & vrinam ciet: idem facit pello appositus.

Veratrum album.

Cap. C L.

Helleborum album, Latini veratrum album vocat, fert folia plantaginis aut betæ sylvestris similia, sed breuiora, & nigriora, rubescentia: caulem cauum, quadrantalem, tunicis cōuolutum quas abdicat cum arescere incipit: radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblōgo & exiguo capite ceparum modo exeuntibus: nascitur in montibus & asperis. Radices melsibus colligendę. Optimū habetur candidum, friabile, carnosum, modicē extensum, nec tamen iunci modo mucronatū, quod frangēdo puluerē emit, & tenuē habet medullā, gustu non admodū feruens, neq; saliuā subinde ciens (huiusmodi autē strangulat.) Primitum Cyrenaicum tenet. Galaticum autē & Cappadocicum, candidiora, & puluere quodā obfita, celerius strāgulatus mouent. Vomitione autem varios extrahit humores. Collyriis admiscetur, quæ caliginem oculorum discutunt. Partus impositum necant, menses pellit, ster-

ὁ δὲ χυλὸς συνὸ οἶνω ποτιζόμενος χαταμύνια καὶ οὖρα ἄγει καὶ ἐν πρῶτῳ περσσεδεῖς τὸ αὐτὸ ποιεῖ.

Περὶ Ελλέβορου λευκοῦ.

Κεφ. ρν.

Ελλέβορος λευκὸς φύλλα ἔχει ὅμοια τοῖς τοῦ ἀρνογλώσσου, ἢ στυττικοῦ ἀγρίου, βραχύτερα δὲ καὶ μελάντερα, καὶ ἐνυδρὰ τὴν χροάν * καυλὸν δὲ παλαισταῖον, κοῖλον, περσσοιζόμενον ὅτε ἀρξεται ξηραίνεσθαι * ῥίζαι δὲ ὕπαισι 10 πολλαὶ, λεπταὶ, ἀπὸ κεφαλίου μικροῦ καὶ ἐπιμήκους, ὡς περὶ χρομμίου συμπεφυκῆαι * φύεται ἐν ὄρεσιν τοποῖς καὶ τραχείσι. Συλλέγειν δὲ δεῖ τὰς ῥίζας περὶ τὸν πυραμντόν. ἄριστος δὲ ὅστις αὐτοῦ, ὁ μετεῖως τεταμένους καὶ λευκός, καὶ * σῦδραυστος καὶ σαρκώδης, οὐκ ἄποξιν δὲ καὶ ξηρῶδης, ἢ γρουῦ ἀφιεῖς ἐν τῷ θραυένει, ἔχων δὲ καὶ τὴν ἐντεριώνην λεπτὴν, ἐκ πυρῶν τὴν γένεσιν οὐ 20 λίαν, οὐδὲ ἀθρόως, στέγον ἐπισσώμενος, πνιγώδης γὰρ ὁ τοιοῦτος περσσεύει δὲ ὁ * κυρλωαῖκος * ὁ δὲ χαλαπὸς καὶ κατωπαδοκίος, * λευκότερος καὶ χροώδης καὶ πνιγώδεστος. Καθαίρει δὲ δι' 25 ἐμέτων ἄγων ποικίλα * μύγνυται δὲ καὶ κολλυείοις τοῖς διωαμένοις τὰ ἐπισκίοισιν τὰς κόρας ἀποκαθαίρειν * καὶ ἐμῆλιν ἄγει, καὶ ἐμβρυα κτείνει περσσεδεμένους. πῖαφ=

πῆαρμούς τε ἐρεδίζει, καὶ μύας
 κτείνει σὺν μέλιτι καὶ ἀλφίτῳ
 φουραδεῖς, συγκαθεύδοντός τε
 κρέας, σπυθήκει αὐτά. δίδο-
 ται ὅ νήσεται καὶ ἑσπὸν καὶ με-
 5 τὰ σπασάμου καὶ θαψίας χυλοῦ,
 ἢ ἄλυκος, ἢ μελικράτου, ἢ πόλιν,
 ἢ φακοῦ ἢ ἄλλου ῥοφήματος. συσ-
 σιτοποιεῖται δὲ καὶ ἄρτω καὶ ὀπι-
 ται. ἢ δὲ περὶ τῶν καὶ ἐπι-
 διαίτησις, ἐξείργασαι παρὰ τοῖς
 10 περὶ τῶν καὶ δόσεως
 αὐτῆς γράψαι, μάστιγα δὲ συγ-
 καταπνέμεναι φιλονεικῶν τῷ σι
 καλῶ τῷ ἀπὸ ἐννης, μακρὸν γὰρ
 ὅστις ἐν ὕλης παρὰ δόσει περὶ τῶν
 καὶ δόσεως περὶ τῶν καὶ δόσεως
 15 ἐγὼ γὰρ. δίδωσι δὲ ἐνιοὶ σὺν *
 πολλῷ ῥοφήματι ἢ χυλοῦ πλῆ-
 ρει, ἢ καὶ τρυφῶν ὀλίγῳ περὶ δι-
 δόντες, ἐπιδιδόσιν τὸν ἐλλέβο-
 ρον ὑψέως, ἐφ' ὃν μάστιγα πνι-
 γμὸς ὑποπίπτει ἢ ἀδένδεα σῶ-
 20 ματος ὑποκείται, ἀκίνδυνος γὰρ
 ἐπὶ τῶν οὕτω λαμβανόντων ἢ καὶ
 διαρροῖς. διὰ τὸ μὴ ἀκρίως τὸ
 φάρμακον παρὰ τῶν καὶ δόσεως
 μασι. καὶ βάλλουσι δὲ ἐξ αὐτοῦ
 περὶ τῶν καὶ δόσεως τῇ ἑδρᾷ μετ' ὅξους,
 25 ἐμέτοις κινουσίην.

Περὶ Ἑλλέβορου μέλανος.

Κεφ. ρνά.

Ἑλλέβορος μέλας, οἱ δὲ με-
 λαμπόδιον, οἱ δὲ ἕκτομον, οἱ δὲ
 πολύρριζον, μελαμπόδιον ὅτι λέ-
 30 γεται

sternutamenta excitat, mures
 interficit cum melle & poléta
 subactū, absumit carnes si co-
 quatur vnά. Datur per se ieiun-
 nis, & cum sesama, aut ptisanæ
 succo, aut halicæ, aut létis cre-
 more, cū aqua mulsa, aut pul-
 te, aut quauis alia forbitione.
 Cogitur cū pane, & ita inassat-
 tur. Præparatio corporū, ac vi-
 ctus ratio, diligēter tradita est,
 cum ab his qui de medica eius
 potione scriptitarūt, tum maxi-
 mē à Philonide Siculo Ennéfi,
 cui nūc assentimur: quippe lō-
 gum nimis esset, in hac præfer-
 tim æditione de materia, simul
 medicā curandi rationē expo-
 nere. Dant nonnulli in pultis
 forbitione, aut copioso halicæ
 cremore: aut paucū antea ci-
 bum dari præcipientes, statim
 veratrū offerunt, iis præsertim,
 quibus stragulationis suspicio
 imminet, aut si valetudo corp⁹
 infirmat: hoc enim modo deie-
 ctio nihil periculi minatur, &
 cibo munitis nō intempestiuē
 medicamentū corporibus of-
 feratur. Vomitiones concitant
 subdite ex eo balani, cū aceto.
 Veratrum nigrum.

Cap. CLI.

Helleborū nigrū, appellatur
 melampodion, quoniam ca-
 35 prarū

DIOSCORIDIS

prarū pastor, nomine Melampus, furētes in se proetidas, primus purgasse, & sanasse fertur. Folia ei viridia, platani similia, minora, foliis sphondylii proxima, subaspera, nigriora, pluribus diuisuris incisa: caulis asper: flores purpurei, candidi racematum coherentes: semen cnicici, quod in Anticyra sesamoides vocant: quo deiectiones moliantur: radicibus cohæret nigris, tenuibus, à capitulo, cephæ simili confibratis: quarū est vsus: in collibus, asperis, & siccis locis nascitur. Optimum est quod ex huiusmodi petitur terris, vt ex Anticyra: Nigrum inibi probatissimum gignitur. Eligi debet corpulentum & plenum, in quo tenuis sit medulla, acris gustu, feruensque: cuiusmodi est in Helicone, Parnaso, & Ætolia natum: attamē Heliconium præcellit. Veratrum nigrum purgat ventrem, detrahit bilem pituitasque: datum per se, aut cum scammonia, & tribus obolis, siue drachma salis: decoquitur vel cum lente & iusculis, quæ purgationis causa sumptantur. Prodest morbis comitialibus, melancholicis, infanientibus, articulariis doloribus, & resolutis.

Menses

μεν, ἐπεὶ δὲ δοκεῖ μελάμπυς πρὸς αἰπόλος τὰς πορείας συγκατέρας, μακίνας ἐν αὐτῷ καθαῖραι ποσὶν καὶ θεραπεύειν. ἔχει δὲ τὰ φύλλα χαλκρὰ, πλατάνω πορσεμφορῇ, ἥ ἀπὸνα δὲ πρὸς τὰ τ' ἀπονδύλιν καὶ πολυχιδέσσερα καὶ μετάντερα καὶ ὑποβάχεια· χαλκρὸς τε ἀχρὸς αὐτῇ δὲ λευκὰ, ἐμπόρφυρα, τῷ δὲ σχήματι βορυνώδη· καὶ ἐν αὐτῷ καρπὸς κνίκω ὁμοιος, ἐν καὶ αὐτὴν καλεῖσθαι οἱ ἐν ἀντικύρῃ σισαμοειδῇ. ἰοχρώμιοι πρὸς τὰς καθάρσεις αὐτῶν ῥίζαι δὲ ὑπὸσι λεπταί, μέλαιναί, οἷον ἐκ πινός· κεφαλὴς κρομμυώδεις· ἡ ἡμυρία, ἐν καὶ ἡ χηστὶς· φύε δὲ ἐν τε ἀχρῶσι καὶ μεσολοφίῃ καὶ καταξήροις τόποις. Καὶ αἵματος δὲ ἐκ τῶν τοιούτων λαμβανόμενος χολέων· οἷός ἐστιν ὁ ἐξ ἀντικύρας· καὶ γὰρ ὁ μέγας καὶ κάλλιστος ἐν αὐτῇ γυνῆ· ἐκλέγεται δὲ τὸ εὐσάρκον καὶ εὐβορρον, λεπτήν ἐχούσαν τὸ ἐν τριώνυμῳ δριμύτην ἐν τῇ γένεσι καὶ πυρώδη. τοιοῦτος δὲ ἐστιν ὁ ἐν τῷ ἐλικῶνι καὶ παρνασσῷ καὶ αἰτωλῷ φύομενος· διαφέρει μὲν τοῖς ὅξιν· ὁ γὰρ καὶ πρὸς τὸ ἀνω κοιλίαν, ἀγρὸν φλέγμα καὶ χολήν, καθ' ἑαυτὸν ἢ μετὰ σκαμμονίας διδόμενος, καὶ ἄλλων < αὐτῶν ἢ βρωβόλου ὁλοκῆς· συνέψεται δὲ καὶ φακῇ, καὶ ζωμοῖς τοῖς εἰς καθαράν λαμβανόμενοις. ὠφελεῖ δὲ ἐπιληπτικούς, μελαγχολικούς, μαινομένους, ἀρθριτικούς, παραλελυμένους.

μεν

πρὸς τὰς δὲ ἐμύλων ἄγει, καὶ
 ἐμβρυα κτείνει, σύειργας τε κα-
 θάραι κατὰ τὰς καὶ μετὰ τεί-
 τω ἐξαιρεθεὶς. ὁμοίως καὶ ἐπὶ
 δυσκοιλιῶν καθεύεται εἰς τὸ ἕς,
 5 ἐν ὧ μὲν ἐπὶ β'. ἢ γ' ἡμέρας. Σε-
 ραπύει δὲ καὶ ψώρας μετὰ λι-
 βανωτοῦ ἢ κηρύ καὶ πύσης καὶ
 κεδρίνου ἐλαίου κατὰ χυμὸν
 μετ' ὅροις δὲ καὶ ἑαυτὸν κατὰ
 πλαστούμην, ἀλφοὺς καὶ λει-
 10 γύνας καὶ κέρας Σεραπύει.
 ἔφη δὲ τὸν οὗ ὅρι οὐδονταλγί-
 ας παρῖναι διακλυζόμενος. σπ-
 ηλαῖς τε μύγνυται. μετὰ δὲ κρι-
 σίνου ἀλεύρου καὶ οἶνου, κατὰ
 πλασμά ὅστιν ὑδρωπικοῖς ὠφέλι-
 15 μόν. συμφυτευθεὶς δὲ ἀμπέλοις
 πρὸς τῇ ῥίζῃ, τὸν ἐξ αὐτῶν οἶνον
 καθαρπκὸν ἐργάζεται. πειρ-
 ραίνοισι δὲ καὶ οἰκίαις αὐτὸν κα-
 θαρπκὸν εἶναι νομίζοντες. ὅθεν
 καὶ ὀρύσσοντες ἴσανται παρῶν.
 20 γόμφοι ἀπόλωνι καὶ ἀσκληπιῶ
 φυλαπτόμενοι ἀετὸν, ἐφίπιασαι
 γὰρ φασιν οὐκ ἀκινδυνῶς. εἴδω-
 σι γὰρ θάνατον ὁ ὄρνις ἐάν τις ἴδῃ
 τὴν ὀρυγὴν τῷ ἐλλεβόρου. σιωπό-
 μως δὲ δεῖ ὀρύσσειν, διὰ τὸ καρη-
 25 βαεῖαν ἐκ τῆς ἀποφοράς γίνεσθαι.
 ὅθεν εἰς παρῶν οἱ ὀρύλλον-
 τες, ἐδίοισι σκόροδα, καὶ οἶνον πί-
 νοισιν. ἀβλαβέστεροι γὰρ οὕτω δια-
 τίθενται. ἐξεντερίζεται δὲ ὡς ὅτε
 καὶ ὁ λευκὸς ἐλλέβορος.

Πρὶ Σπ-

Menses inditum trahit, partus
 necat, purgat fistulas imposi-
 tum, & tertia die detractum.
 Item contra gravitatem audi-
 tus in aurem demittitur, ibiq;
 in alterum aut etiam tertium
 diem esse finitur. Scabiem fa-
 nat, illitum cum thure, aut ce-
 ra, & pice, & cedrino oleo: vi-
 tiliginibus, lepris, impetigini-
 bus, ex aceto medetur: den-
 tium dolorem collutione mi-
 tigat: erodentibus medicamen-
 tis commiscetur: hydropico-
 rum ventri vtilissimè imponi-
 tur factum ex eo, farina hordea-
 cea, & vino, cataplasma: confi-
 tum proximè radices vitii, vi-
 num purgandi facultate donat.
 Huius res parsum domos expiari
 arbitratur: quare inter fodien-
 dum stantes, Apollinem, Æscu-
 lapiumque precantur, ac vitat
 aquilæ volatus, aduolare enim
 nō sine periculo tradunt: nan-
 que si avis effossionem helle-
 bori conspexerit, moriturum
 qui succidit, augurium est. Cele-
 riter effodiatur oportet, quo-
 niam halitu caput aggravat:
 quapropter, ad id arcendum, fos-
 furi, alliū præsumere, & vinum
 bibere cōsueverūt: nulli ita no-
 xæ opportuni redduntur. Ve-
 ratri albi modo emedullatur.

Sesa-

DIOSCORIDIS

Sesamoides magnum.

Cap. CLII.

Sesamoides magnū, in Anticyra helleborū vocant, quoniam albo veratro in purgationibus misceatur. Simile est senecioni aut rutæ: longo folio: flore candido: radice gracili, ignaua: semen gustu amaro, cætera sesamæ simile. Ventrem detrahit: datur tritum ad bilis pituitæque deiectiones, quantum tribus digitis capitur, addito veratri albi sesquiobolo, ex aqua mulsa.

Sesamoides paruum.

Cap. CLIII.

Sesamoidi paruo cauliculi sunt dodrantes: folia coronopi, minora, hirsutiora: & in cauliculorum cacumine capitula, florum penè purpureorum, medio eorum albo: semen sesamæ, fuluum, amarum: radix tenuis. Detrahit bilem pituitasque, semen ex aqua mulsa potum dimidio acetabulo: illitum ex aqua, tumores ac tubercula discutit. Nas citur in asperis.

Sylvestris cucumer.

Cap. CLIIII.

Cucumis sylvestris fructu solo distat à satiuo cucumere, quem

Πρὶ Σησαμοειδοῦς τὸ μέ-
γαν. Κεφ. ςνβ.

Σησαμοειδὲς τὸ μέγα, ἐν ἀν-
τικύρῃ ἐλλέβορον καλοῦσι, διὰ
τὸ μίγνυσθαι ἐν ταῖς καθάρσεσι
τῷ λευκῷ ἐλλέβορῳ. ὁμοίον ἢ πᾶσι
ἡειγέρωντι ἢ πηχάω· φύλλα μα-
κρά· αἶδος λευκόν· ῥίζα ἰσχυρὰ
σπέρματος· σπέρμα ὁμοιον σπασ-
μῷ, πικρὸν ἐν τῇ γούσει. Ο κα-
θαίρει * αἶμα φλέγμα τε καὶ χολήν
ὅσον τοῖς τοῖσι δακτύλοις ἰο-
λεῖον ληφθὲν μετὰ ἐλλέβορου
λευκοῦ τειδῶν ἡμιωβόλων σὺν με-
λικράτῳ.

Πρὶ Σησαμοειδοῦς τὸ μι-
κρὸν. Κεφ. ςνγ.

Σησαμοειδὲς τὸ μικρὸν καυ-
λὶα ὅτι ἀνταμαῖα ἔχοντα φύλ-
λα κορωνόποδι ὁμοία, δασύτε-
ρα, μύτοι καὶ μικρότερα· ἐπὶ
ἀκροῦ δὲ τῶν καυλίων κεφάλια
ἀνδίων ὑποπορφύρων, ὧν τὸ μέ-
σον, λευκόν· ἐν οἷς σπέρμα σπασ-
μῷ ὁμοίον, πικρὸν, κερρὸν· ῥίζα
λεπτή. Καθαίρει * δὲ χολήν καὶ
φλέγμα καὶ τὸ πικρὸν τὸ σπέρμα,
ὁξύχολον ἡμῖν σὺν μελικράτῳ·
καταπλαθὲν δὲ μετ' ὕδατος,
φύματα καὶ οἰδήματα διαφορεῖ.
φύεται ἐν τραχέσι χωρίοις.

Περὶ Σίκκος ἀγρίου.

Κεφ. ςνδ.

Σίκκος ἀγρίος τῷ καρπῷ μό-
νῳ διαφέρει τοῦ ἡμέρου σίκκος,
ἐλάσσον.

ἐλάσσονα πολλῶν ἔχων βδελανείοις
 ἐπιμήκεσσι εὐοικότα· τὰ φύλλα καὶ
 τὰ κλήματα ἡμέρῳ ὁμοία· ῥί-
 ζαν δὲ λευκὴν καὶ μεγάλην· φύε-
 ται ἐν οἰκοπέδοις καὶ ἀμμόδε-
 5 σι τόποις, ὅλος δὲ ὁ θάμνος πι-
 κρός. Ἀρμύζει δὲ ὁ τῶν φύλλων
 χυλὸς ἐν σαζόμυθος ὠταλγίαις· ἡ
 δὲ ῥίζα καταπλαθεῖσα μετὰ
 ἀλφίτου παῦν οἶδημα παλαιὸν
 διαφορεῖ· μετὰ ῥητίνης δὲ τερε-
 10 σινθίνης ἐπιτεθεῖσα, φύματα
 ῥήπει· μετ' ὅμοις δὲ ἐψηθεῖσα
 καὶ καταπλαθεῖσα, ποδάγρας
 διαφορεῖ· καὶ ἰσχιάδος δὲ ὅστιν
 ἔγκλυσμα καὶ ὀδονταλγίας διὰ
 κλυσμα τὸ ἀφέψημα· ξηρὰ δὲ
 15 λεία ἀλφοῖς, λέπτερας καὶ λειψή-
 νας σμήχει· οὐκὰς τε μελαίνας
 καὶ σπύλους τοὺς ἐν πρὸσώπῳ ἀ-
 ποκαθαίρει· καὶ ὁ χυλὸς δὲ τῆς
 ῥίζης, πλῆθος τειῶν ἡμωβολίων
 τὸ ἐλάττει· καὶ ὁ φλοιὸς δὲ ὅσον
 20 τέταρτον ὀξύβαφου καθαίρει φλέγ-
 μα καὶ χολῶν, καὶ μάλιστα ἐπὶ ὑ-
 δρωπικῶν, δίχα δὲ τὸ πὺν σῶμα
 χον ἀδικεῖν πεῖται τὴν καθα-
 σιν, δεῖ δὲ τῆς ῥίζης λαβόντα ἡ μί-
 λητρον, μετὰ δυοῖν ξεσῶν οἴνε μά-
 25 λις αἰθυκοῦ λεαίνειν καὶ διδόναι
 ἐν τούτου κυάθους γ' * ἕως αὖ ὁ
 ὄγκος ἱκανῶς συσταλῇ.

Περὶ Ελατηρίου. Κεφ. ρνέ.

Τὸ δὲ λεγόμενον ὕαθριον, ἐν
 τῷ χειρῶν τῶν σπύων σκευά(ζε)ται
 τῶν

quem longè minorem parit,
 oblongis glandibus non dis-
 fimilem: folia atque sarment-
 a fatiui refert: radice candi-
 da, magna: nascitur in fabu-
 letis, & ruderibus, frutice in
 totum amaro. Instillatus fo-
 liorum succus, aurium dolori
 conuenit. Illita ex polenta ra-
 dix, veterem omnem tumo-
 rem discutit: imposita cum re-
 sina terebinthina, tubercula
 rumpit: ischiadicis infunditur:
 podagras discutit, decocta ex
 aceto, & illita. Eius decocto
 dentes in dolore colluuntur.
 Arida farina impetiginem, le-
 pras & vitilignes absterget: ni-
 gris cicatricibus colorem red-
 dit, & in facie maculas ex-
 purgat. Radicis succus sesqui-
 oboli pondere, & item cor-
 tex, acetabuli quarta parte,
 bilem pituitamque deiciunt,
 præsertim in hydropicis: (de-
 iectiones autem circa stoma-
 chi iniuriam mouet) radicis
 felibra, in vini præsertim Li-
 byci hemina conteritur, dan-
 tisque ex eo terni cyathi tri-
 duo, dum tumor abunde de-
 primi cernatur.

Elaterium. Cap. CLV.
 E fructu huiusce cucumeris, fit
 medicamentum quod elaterium voca-
 tur, ad hunc

tur, ad hunc modum : Decer-
pti cucumeres, qui tacti pro-
tinus exiliunt, feruantur nocte
vna : postridie imposito supra
craterem rariore cribro, vtrif-
que manibus prehensi, figilla-
tim supino cultro, sursum ver-
sus aciem habente, finduntur,
atque per cribrum humor in
subiectum vas exprimitur : si-
mulque carnosum quod hæsit
cribro, quò facilius excidat, e-
liduntur, quod ita pressum est, re-
sidere finitur, atque in vicinā
peluim demittitur. Coacerua-
ta autē in cribro segmina, dul-
ci aqua perfunduntur, & de-
nudò pressa abiiciuntur. Humor
in pelui agitatur, & linteo o-
pert⁹, soli exponitur: dūmq; ste-
terit, tota supernatans aqua cū
humore concreto, effunditur.
Hoc verò idētidem fieri solet,
donec existens aqua liquefcat:
qua stillatim exhausta, sedimē-
tū mortario suscipitur, & con-
terendo cogitur in pastillos.
Sunt qui ad hauriendam pro-
tinus succi abundantia, cribra-
tos cineres humi inspargant,
& medium cauantes, triplica-
tū linteū obtundant, per quod
eleterium cum sua humidita-
te diffundunt, ficcātūque, in
pila, vt dictum est, conterunt.

Aliqui

τὸν τρόπον τοῦτον • τοὺς ἅμα τοῖς
ἀλάδῃ σπύγες ἀποπιθώντας ἐκ-
λέγων, ἀποτίθουσιν, ἕως νύκτα • τῇ
δὲ ὑστεραίᾳ ἐπὶ κρατῆρι κόσκι-
νὸν μὴ πυκνὸν ἐπίθεις, καὶ μα-
χαίρειον ὑψηλὸν ἀερόσας, τὴν ἀκ-
μὴν ἔχον ὄνω, λαμβάνων ἀμφο-
τέραις ταῖς χερσὶ καθ' ἓνα τῶν σί-
κων, διαίρει καὶ ἐκθλίβει διὰ τοῦ
κοσκίνου τὸ ὑγρὸν εἰς τὴν ὑποκί-
μυλῳ κρατῆριαν • περὶ σκεθλίβων
καὶ τὸ ἐν αὐτοῖς σαρκοῦδες ὁ δὲ
περὶ πίπῃ τῷ κοσκίνῳ • ἵνα καὶ
αὐτὸ διεκπίπῃ καὶ εἰς λεκανίῳ
παρσκειμυλῳ τὰ ἐκθλιβόμενα
βάλῃ • σωρεύσας δὲ τὰ τετυμμέ-
να ἐπὶ τῷ κοσκίνῳ, ὑδατι γλυκεῖ
πείχας καὶ ἀποπίσας, ταῦτα
μὴ ῥίπτῃ • τὰ ῥόξας δὲ τὸ ἐν τῇ λε-
κανίᾳ ὑγρὸν καὶ σκεπάσας ὁ δόνη, τί-
θουσιν ἐν ἡλίῳ καὶ ὅτε σῆ πᾶν τὸ ἐ-
πινηχόμενον ὑδὼρ μετα τὸ ἐπι-
πάρου, ἀπόχει • καὶ τὸ τοιοῦτον πολ-
λάκις ἄρχεις οὗ κατὰ τὴν ἐφιστά-
μενον ὑδωρ • ὁ δὲ ἐκτραγίσας ἐ-
πιμελῶς, ἢ ὑποσάδμυλῳ βαλὼν
εἰς θυρίαν, λέανει, καὶ ἀνὰ πλατῆ
πρόχυσκους • ἐνιοὶ δὲ πρὸς τὸ τά-
χεως ἀνικμαδίῳαι τὸ ὑγρὸν, τί-
θουσιν σεσοσμένῳ ἐπὶ γῆς κατὰ
σπώσαντες καὶ κοιανάντες τὸ μέ-
σον, ὁ δόνηιον βίπλυν ἐπὶ εἰσαντες,
καὶ τούτῳ τὸ ὑγρὸν ἐπὶ εἰσαντες,
καὶ διὰ τὸ ἐπιχεύον, ἀναξερῶν δὲν, εἰ
δὲ θυρίᾳ λεάνουσιν ὡς περὶ εἰρηταιῶν

ἐνιοὶ

ἔνιοι δὲ ἀντὶ τοῦ ὕδατος θάλατ-
 ται παρέρχοντες, πλυούσιν. οἱ
 δὲ, τῇ τελευταίᾳ πλύσει μελί-
 κρατον παρέρχουσι. δοκεῖ δὲ ἐλα-
 τήριον χάλλισον εἶναι τὸ μετὰ τοῦ
 λευκοῦ ἢ συγῇ ἐνικμῶν, κοῦφον,
 λείον, πικρότατον τῇ γένει, καὶ
 περσαχθὲν λύχῳ ὑγρῶς. τὸ μὲν
 τοι περσίζον καὶ τραχὺ καὶ θο-
 λερὸν τῇ ὁλῇ, γέμων ὀρεβρίου καὶ
 τέφρας, βαρὺ τέ βεσι καὶ φαῦλον.
 10 ἔνιοι δὲ καὶ τῷ χυλῷ τοῦ σκυλίου,
 μνηστύουσι ἀμύλον, πρὸς τὸ μι-
 μῆσαι αὐτὸ λευκὸν καὶ κοῦ-
 φον. εἰς μὲν τοι τὰ χυμάρτικα ὁ
 διεπὴς ἀρμόζει ἄχρι δεκάτων·
 ἢ δὲ τελεία * πόσις ὀβολός· ἢ ὅτι
 15 λαχρή ἡμιόβολον· πυνδοίσι δὲ
 δι' χαλκόν. πλείον γὰρ περὶ κύν-
 θυον ὀπιφέρει. κινεῖ δὲ τὴν κα-
 τὰ καὶ τὴν ἀνω χυμάρσιν ἄρον
 φλέγμα καὶ χολήν. αἰεὶσι δὲ
 τοῖς δυσπνοοῦσιν ἢ δι' αὐτοῦ κα-
 20 χυμάρσι. εἰ μὲν οὖν θέλεις καὶ κοι-
 λίαν χυμάρειν διπλάσιον ἄλτων
 μύξας καὶ σιμῶν ὅσον χυμῶσι δι'
 ὕδατος ὀρεβριᾶ κατὰ πότιν δι-
 εδυ, ὀπρὸφείτω ὅτι χυμάρῃ ὕδα-
 25 τος κύαθον ἑνα· εἰς ὃ ἕμετον ὕδα-
 τὶ ἀνιείς, περὶ τοῦ ὑπο γλῶσσαν
 διὰ χρεῖ τόποις ὡς ὅτι ἐσωτάτω·
 εἰ ὅτι δυσπνέεις εἴη ἢ ἐλαῖον ἢ λείον
 μύξῳ διείς, κάλυε δὲ κοιμάσθαι.
 τοῖς δὲ ὑπερχυμάρμοις, συν-
 ἔχῃς περσφίξεν δει· οἰνέλαιον·
 ἐμουσ-

Aliqui pro dulci aqua marinā
 perfundentes, ita eluunt. Alij in
 nouissima lotionē, mulsam a-
 quā respergunt. Elateriū opti-
 mū esse constat, leue, nō pōde-
 rosum, cū candore leniter hu-
 mectum, gustu amarissimum,
 quōdque lucernarū luminibus
 obiectū, facillē flagret. Porra-
 ceū tamen scabrumq; si turbi-
 dū spectetur, atq; erui cinerisq;
 plenū sit, graue & vitiosum es-
 se solet. Nec desunt, qui cucu-
 mis succo amyli immisceāt, vt
 candore ipsū & laxitate imite-
 tur. A bimatu ad decenniū de-
 iectionib; vtile est. Integer mo-
 d; obolus est: minim; semiobo-
 lus: puēris, chalci duo: siq; de co-
 piosis, periculū adfert. Bilē ac pi-
 tuitā vtriusque parte extrahit. O-
 ptima suspiriosis est purgatio,
 q; si i animo sit deiectionē mo-
 liri, adiecto salis duplo, & stibij
 qd colorare sufficiat, ex aqua,
 erui magnitudie catapotia da-
 to, postea cyath; vn; aquę tepi-
 dę forbeat: ad citādas tñ vom-
 itioes aqua diluēs elateriū, sub-
 iectas lingue partes peritissimē
 pēna oblinito: q; si qsq; diffici-
 li; euomat, oleo aut vngueto i-
 rino resoluito, somnū ihibet.
 Porro his q; eximie vacuāt cōti-
 nuē vinū, & oleū dari cōuenit:

H etenim

etenim vomendo restituuntur. Quod si vomitiones non finiantur, aqua frigida, polenta, posca, poma, & quæ stomachum densando corroborant, offerenda sunt. Ciet elaterium menses, & partus enecat, in pefso subditum: morbo regio medetur, cum lacte naribus infusum, & diuturnis capitis doloribus liberat: efficacissimè anginis il-

linitur, cum veteri oleo, melle, aut felle taurino.

Staphis agria.
Cap. CLVI.

Staphis agria, siue herba pedicularis, folia habet labruscæ, diuisa: & cauliculos rectos, molles nigrosq;: fert floré glasti. & folliculos virides, similes ciceri, & in his nucleum triangulum, scabrum, ex nigro subfuluescentem, intus album, gustu acrem. Grana quindecim, si trita in aqua mulsæ dentur, crassum humorem per vomitum purgât: sed qui hauserūt, ambulare debent. prudenter tamen attendere oportet, & aquâ mulsam cōtinuò potui dare: quoniâ pericula strangulationis inferūt, &

ἐμουῦντες γὰρ ἀποκαθίστανται. μὴ παυομένων δὲ τῶν ἐμέτων, ὕδωρ ψυχρὸν καὶ ἀψιτον καὶ ὀξύκρατον καὶ ὀπώραν, καὶ ὅσα διυλάνται ἢ σῶμα χρόν πικρῶσαι προσενεκτέον. κινεῖ δὲ τὸ ἐλατήριο καὶ ἐμμήνα, καὶ ἐμβρυα κτείνει ἐν προσδέτῳ. ἐρχομέν τε μετὰ γάλακτος εἰς τὸν ῥώδωνα, ἵκτερον ἀποκαθαίρει, καὶ κεφαλαλγίας τὰς χρονίους ἀπαλλάττει συνασχυκοῖς ἢ διαχυσίᾳ προσκτικόν μετ' ἐλαίου ἰοπαλαιοῦ ἢ μέλιτος ἢ χυλῆς ταυρείας. τῷ δὲ ἡμέρου σκύου ἢ ῥιζαλεῖα ποδῆσαι συνὸ ὕδρομέλιτι < ἁ. ὁλική, ἐμέτοις κινεῖ. εἰ δὲ τις μετὰ τὸ δεῖπνον προσέως ἐμέσαι ἐθέλει, ἀρκοῦσιν ὀβολοὶ β'. 15

Πρὶ Σταφίδος ἀγρίας.

Κεφ. ρνς.

Σταφίδος ἀγρία φύλλα μὲν ἔχει ὡς τὸ ἀμπέλκ ἀγρίας ἐπεχρησμέναι* χαυλία ὀρθὰ, μαλακὰ, μύα- 20 να τὸ ὃ ἀνδρος φέρε ἰσότηρ ὁμοιον. ἢ δὲ καρπὸν ἐν θυλακίοις χλωρῶς ὡς τὸ ἐρεβίνθου, τέγωνον, τραχύν, ὑπόκιστον ἐν τῷ μέλανι, τὰ δὲ ἔνδον λευκόν, γευσάμεν ὀδριμύ. Τούτῃ κόκκοις ἢ ἢ ἐάν τις λεάνας ἐν μελικρατῷ δῷ, 25 καθαίρει δι' ἐμέτων πάχιν. ὡς πατέτωσαν ὃ οἱ πεπωκότες. δεῖ μὲν τοι προσέχειν συνετῶς μελίκρατον διδόντας, διὰ τὸ ἐπιδέρεν τὸν κατὰ πνιγμὸν κινδυνόεις, καὶ

ἢ καίεν τ' φάρυγγα. ἀρμόζει δὲ
 τοιούτῃσιν καὶ ἡ αἰὼν συχρίσθαι
 πρὸς φθειράσιν καὶ κηκασμοῖς καὶ
 ψώρας. Διαμασηθεῖσα δὲ φλέγ-
 μα ἄγει πλεῖστον· καὶ ὁδονταλ-
 5 γίας ὠφελεῖ συνὲ ὅξιν ἐψηθεῖσα
 καὶ διακλυζομένη· οὐδ' αὖτε ρευ-
 ματιζομένα τέλλει· καὶ ἄφθας
 τὰς ἐν στόματι διεραπύει μετὰ
 μέλιτος. μίγνυται καὶ τοῖς πυρε-
 τικοῖς μαλάγμασιν.

- 10 Περὶ Θαψίας. Κεφ. ρνζ.
 Θαψία ὀνόμασται μὲν ἀπὸ τ'
 δοκεῖν περὶ τὸν εὐρεθῆναι ἐν θαλάσσῃ
 τῇ νήστῃ τῇ ὁμονύμῃ. τῇ δ' ὅλη
 φύσει ὅμοιον ναρθηκί, ἰσχυρότερος
 δ' αὐτῆς μάλλον ὁ* καρπὸς καὶ
 15 τὰ φύλλα μαρὰ θρόνῳ ἐμπερῆ· ἐπ'
 ἄκρως δὲ σκιαδία καὶ ἑκάστην ἀ-
 πόφισιν, ἀνήθω ὁμοία· ἐφ' ὧν ἀν-
 θος μέλιτον· πτέρμα ὑπόπλευτον,
 πῶ τ' ναρθηκος ἐμφρὲς, ἑλάττον
 μὲν τοιρίζα ἐνδοθεν λευκή, μεγα-
 20 λή, μέλαινα δ' ἐξωθεν παχύφλοι-
 ος, δειμῖα. Ἡ πρὸς ὀπίσταν πε-
 ριορρυχθεῖσα καὶ ἐγκοπισομένη τὸν
 φλοιόν, ἢ κοιλανθεῖσα αὐτὴ ἐν ἐ-
 αὐτῇ δολοφθῶς ἢ ῥίζα καὶ πῶμα-
 ζομένη πρὸς τὸ καθαρεῖν μύειν
 25 τὸν ὀπὸν τῇ ὅ ὑπερῶα δειῖ ὀπὸν-
 τὰς ἀναρεῖσθαι. τὸν ὀπισυλληθῆ-
 τα ὀπὸν. γυλίζεται δὲ κοπείσα ἢ
 ῥίζα καὶ διὰ κυρπίδος καὶ ὀργάνου
 ἐκδιλβεῖται καὶ ξηρανθεῖσα ἐν ἡ-
 κίῳ δὲ ὁσπράκινε παχέως ἀγρίε.

& fauces adurunt. Trita & ex
 oleo illita, phthiriasi prodest:
 item prurigini & psoris. Cit
 plurimam pituitam comman-
 ducata: decocta in aceto, den-
 tium dolori, colluto ore, sub-
 uenit: rheumatismum gingiva-
 rum sistit: vlcera oris manan-
 tia cum melle sanat. Vrentibus
 malagmatis imponitur.

Thapsia. Cap. CLVII.

Thapsia nomē ideo accepit,
 quod in Thapso eiusdē nomi-
 nis Insula, primum inuenta sit.
 Tota verò natura ferulæ simi-
 lis est: graciliore caule: foliis
 foeniculi: umbella anethi in ca-
 cumine, à singulis furculis erū-
 pente: flore luteo: semen qua-
 le ferulæ, latiusculum, sed ali-
 quanto minus: radix foris ni-
 gra, intus candida, longa, ac-
 cris, crassiore libro vestita. La-
 ctis extrahendi ratio hæc est:
 Facto in ambitu scrobe, cor-
 tices inciduntur: aut radix in
 fornicis speciem in se excana-
 ta, coöperitur, quò merus suc-
 cus confluat: oportet illuc se-
 quenti die se conferre, & con-
 gestū succum extrahere. Tun-
 ditur etiam radix in pila, &
 succus organo per quallū ex-
 pressus fictili crasso insolatur.

DIOSCORIDIS

Aliqui foliū vnā terunt: sed in-
ualidior huiuscemodi succus.
Hoc autem interest, quoniam
qui ab radice manauit, graui-
us olet, & humidus permanet:
ē foliis autē extractus, excicca-
tur, atq; teredinū iniuriā sentit.
Qui succū colligit, stare debet
non obuersus vēto: aut potius,
cū dies apricus est, & à flatu si-
let: quoniā ob halitus acrimo-
niā facies vehemēter intume-
scit, nudāq; corpora inuādunt
pustulę: ob id prius liquido ce-
rato, & adstringēte, nudas par-
tes illinunt, & ita muniti acce-
dūt. Tam cortex radicis, q̃ suc-
cus, purgandi vim habēt, & la-
cteus succus in aqua mulsa po-
tus: nā vtrinq; bilē extrahūt. Ra-
dicis modus, quaterni oboli, cū
trib⁹ feminis anethi drachmis:
succī, terni oboli: lactis, obolus
vnus: quod eo amplius assumi-
tur, periculosum est. Huiusmo-
di purgatio cōuenit suspiriosis,
& diuturnis laterū doloribus,
reiectionib⁹sq;, datur in cibis
aut obsonio, quibus difficile sit
vomere. Tā radix, q̃ succ⁹ om-
niū maximē, quę pares cū eis
vires adeptæ sunt, vim habent
extractoriā ex alto, vbi ex imo
aliquid euocādū est, aut mea-
tuū laxitas aliò transferēda est.

vnde

ἐνιοι δὲ καὶ τὰ φύλλα συναπτέ-
θλίσουσιν. ἀδενής δὲ ὁ τοιοῦ-
τος. Διακρίνεται δὲ τῷ βρωμα-
τωδέσειν εἶναι τὸν ἀπὸ τῆς ρί-
ζης καὶ μύρειν ἐνικμῶν. ξηραί-
νεσθαι δὲ τὸν ἀπὸ τῶν φύλλων
καὶ περιδονίζεσθαι. ἐπίζοντα δὲ
δεῖ μὴ κατ' ἀνέμου ἴσασθαι. μακ-
ρον δὲ νιμερίας οὖσις. ἐπειδὴ
δεῖ γὰρ ἰχυρῶς τὸ πρῶτον
καὶ φλυκταίνουσι τὰ γυνὰ
μέρη. διὰ τὴν δριμύτητα τῆς
ἀποφορῆς. δεῖ οὖν κρηστωῖς συ-
φούσαις ὑγραῖς προχρῆσθαι τὰ γυ-
μνά τῶν μερῶν, καὶ οὕτω πρῶ-
τ' ἐρχεσθαι. Δυνάμει δὲ ἔχει
καταρτηκῶς, ὅτε φλοῖος τῆς ρί-
ζης καὶ ὁ χυλὸς, καὶ ὁ ὀπὸς συν-
μεικράτω πινόμενος. ἀγὰρ γὰρ
καὶ κάτω χολῶς κατὰέρουσι.
δίδοται δὲ τῆς μὲν ρίζης τε-
τρώβολον μετὰ ἀνήδου σπέρμα-
τος γ. τοῦ δὲ χυλίσματος
τετρώβολον. τοῦ δὲ ὀποῦ ὀβολός. 20
πλεον γὰρ δοθέν, κηδυνώδες.
ἀρμόζει δὲ ἢ δι' αὐτοῦ κατάρ-
σις παιδεσθαι ἀσθματικοῖς, πλε-
ρῶν ἀλγέμασι χρονοῖς, καὶ ἀνα-
γνώστῃ. τοῖς δὲ δυσμέσθῃ ἐν σι-
τίοις ἢ ἐν ἡμέρᾳ δίδοται. κέκτη- 25
ται δὲ καὶ μετασυγκριτικῶς δύ-
ναμιν ὅτε ὀπὸς καὶ ἡ ρίζα παί-
των μάλιστα τῶν ἰσχυραμυνώ-
των ὅπου τὶ δεῖ ἐκ βάθους
ἐλκύσαι, ἢ μετὰ προετοιῆσαι.
ὁ δὲ

ὅθεν ἀλωπεκίας καταχρίομενος ὁ
 χυλὸς ἢ ἡ ῥίζα χλωρὰ, πορροτει-
 βωιδὴν, διασώμην, ὑποπὰ τε αἶρει
 καὶ περιώματα λεῖα ἢ ῥίζα ἢ ὁ
 χυλὸς συν λιβανωτῶ καὶ κηρῶ ἰ-
 5 σοις· δεῖ δὲ μὴ πλέον δυοῖν ὥρων
 εἶν· μὲν δὲ ταῦτα πνεύαν διερχο-
 μένη· αἶρεν δὲ καὶ ἐφθην συν μέ-
 λιτι καταχρίσθεις, καὶ λέπες α-
 φέσιν· φύματά τε ῥήτιν μὲν δείου
 καὶ αχρίομενος ὁ χυλὸς· χηρὸς μω-
 10 δὲ καταχρίε· καὶ ἐπὶ τῶν χροῖας
 ἐχόντων διαδέσεις, ὡς παλευρὸν
 ἢ πνεύμονα, ἢ πόδας ἢ ἄρθρον· χη-
 σιμεύς δὲ καὶ πρὸς ἐπαγώγια ἐπὶ
 τῶν μὴ ἐκ φειτομῆς λειποδέ-
 μων οἵδημα ἐγείρων, ὅπως κατα-
 15 τλούμενον καὶ τοῖς λιπαίνουσι μα-
 λατίζομενον, τὸ ἐλλειπὲς τῆς πό-
 δος ἐκπληροῖ.

Περί Σπαρτίου. Κεφ. ρνή.

Σπάρτιον δάμπος ὅστις φέρων ῥά-
 βδοις μακράς, ἀφύλλοις, στερεάς,
 20 δυοδράντοις, αἷς παρὰ ἀμπέλους
 δεσμεύουσι· φέρει δὲ λοβοὺς ὡς ὅτι
 φασίλως, ἐν οἷς σπερμάτια φακο-
 δὴ· ἀνδρὸς μήληρον ὡς ὅτι λευκοῖα·
 Τούτου ὁ καρπὸς καὶ τὰ ἀνδρὶ πα-
 25 ρόντα συν μελικράτῳ ὀκλὸν ὀβο-
 λῶν ἐ. καθαίρει ἄνω μετ' ἐντά-
 σως ὡς ὅτι ἐλλείβορος ἀκινδύνως,
 ὁ δὲ καρπὸς κινεῖ τιμὴν καὶ πω-
 δαρσιν, καὶ αὐτῶν δὲ τῶν ῥά-
 βδων ἐν ὕδατι βραχυσῶν, εἴ-
 τα κοπείων καὶ χυλιδειῶν,
 ἰσχυ-

vnde succus illitione, aut radix
 recens affrictu, alopecias ex-
 plent. Radix succusque cum
 æquis ceræ thurisque portio-
 nibus, fugillata liuorésque tol-
 lunt: sed non plus binis horis
 dimittantur: locus deinde a-
 qua maris calida foueatur. Vi-
 tia cutis in facie emendat, cum
 melle illitus succus: lepras tol-
 lit: tubercula discutit, perun-
 ctus cum sulphure. In diutur-
 nis pulmonum, laterum, pe-
 dum, articulorumque valetu-
 dinibus vtiliter illinitur. Valet
 ad integendam colic glandem,
 iis qui natura, non circunci-
 fione, curti sunt: tumorem e-
 nim excitat, qui pinguium fo-
 tu emollitus, præputij iacturā
 refarcit.

Spartium. Cap. CLVIII.

Spartion frutex est, longas
 ferens virgas, sine foliis, firmas,
 fractu contumaces, quibus vi-
 tes vinciuntur: semen lenticu-
 læ, in folliculis phasiolorū mo-
 do nascēs: florem, vt albæ vio-
 læ, luteum. Purgant per super-
 navehementer, hellebori vice,
 citra periculū flores, & semi-
 na, quinis obolis in aqua mul-
 sa pota. Semen deiectionem
 mouet. Ramis in aqua macera-
 tis, mox tufis, extractus succus.

H iij ischia-

DIOSCORIDIS

ischiadiciſ, & angina laborati-
bus auxiliatur, ſi cyathi modū
ieiuni bibant. Quidam mari-
na aqua macerare malunt, &
infundere iſchiadicis clyſtere:
ſtrigmenta autē elicit cruenta.

Silybum. Cap. CLIX.

Silybon, lata ſpina eſt, fo-
lia ferens chamæleonis albi.
Hæc recens cum fale oleoque
cocta eſtur. Radicis ſuccus
drachmæ pondere potus, vo-
mitiones ciet.

Glans vnguentaria.

Cap. CLX.

Glans vnguentaria, fructus
eſt arboris myricæ ſimilis, ma-
gnitudine auellanæ nucis, cu-
ius nucleus Græcarum nucum
more tritus, humorem red-
dit, quo ad pretioſa vnguen-
ta pro oleo vtuntur: naſcitur
in Æthiopia, Ægypto, Ara-
bia, & Petra oppido ſecus Iu-
dæam. Præfertur plena, recens,
cândida, quæ facilè delibre-
tur. Ea drachmæ pondere po-
ta, lienem abſumit, cum lolij
farina, & aqua muſſa poda-
gricis illinitur: pſoras leprâſ-
que decocta in aceto, vitili-
gines & nigras cicatrices cum
nitro, emendat: & cum lo-
tio lentigines, varos & papu-
las in facie, & cutis vitia tollit.

Vomi-

ιſχιαδικῶν καὶ ſυναγχικῶν βε-
βοήθημα, ὅσον κύαθος εἰς πινόμε-
νος νήσεσιν. ἐνίοι δ' ἐναποβεβέλτες
ἀγμὴν ἢ θαλάττης, ἐγκλύζουσι τὰς
ιſχιαδικαῖς· ἄρει δὲ αἵματῶδες
καὶ ἔρυσματῶδες.

Περὶ Σιλύβου. Κεφ. ρνθ'.

Σιλύβον ἀκανθὰ βεβηλὰ πλάτεια,
φύλλα ἔχουσα χαμαιλέοντι ὁμοία
τῷ λευκῷ. ἢ τις ἀπ' τρυφῆς ἐδίδεται
ἐφ' ἣν σὺν ἐλαίῳ, καὶ ἀλσί. τ' δὲ ῥι-
ζῆς ὁ ὅπου ὅσον ὀλκὴ ποδῆς σὺν ἰο-
μελικράτῳ, ἐμέτοις κινεῖ.*

Πρὶ Βάμανος μυρεφικῆς.

Κεφ. ρξ'.

Βάμανος μυρεφικὴ καρπὸς ἐστὶ
δένδρου μυρίκη ἐοικότου, ὁμοιος
τῷ λεγομένῳ πνυτικῷ καρπῷ, οὗ ἰς
τὸ ἐν τῷ θλιβόμενῳ ὥσπερ τὰ πι-
κρὰ ἀμύγδαλα, ἐξίησιν ὑγρὸν, ὃ
εἰς τὰ πολυτελῆ μύρα ἀντ' ἡγίας
χρῶν. γινώσκται δὲ ἐν αἰθιοπία
καὶ αἰγύπτῳ καὶ ἀραβίᾳ καὶ ἐν τῇ κτ'
ἰσδαμῶν πέτρᾳ. διαφέρει δὲ αὐτὴ
ἢ νέα καὶ παλῆς, λευκὴ τ' καὶ εὐλέ-
πιτος. Ἡ τις μετ' ὀξύκεράτου πο-
δεῖσθαι λέει ὅσον < ὀλκῇ, σπληνῶα
τίκει καὶ καταπλάσσει. δ' ἐπ' αὐ-
τῷ μετ' αἰείνου ἀλεύρου, καὶ μετὰ
μελικράτου καὶ ἐπὶ ποδαγρικῶν. 25
σὺν ὀξεί δὲ ἐφ' ἡδεῖσθαι ἀπὸ σμῆχει
ψώραν, λέπρας· σὺν ἵππῳ δὲ
ἀλφοῖς, οὐλαὶ μελαίναι· σὺν ἔρω
δὲ αἶρει φακοῖς, ἰόνδοις, ἐφ' ἡ-
λεις, ἐξανθήματα ἐν περὶ σῶματι.
ἐμέτοις.

ἐμέτοις δὲ κινεῖ, καὶ κοιλίαν λύει
μετὰ ὑδρομέλιτος· χακοσόμαχος
δὲ ὅστιν ἰκανῶς, καὶ τὸ ἐξ αὐτῆς
ἐλαιον ποδὲν τῇ κοιλίᾳ ἐπά-
γει, συπικώτερος δὲ ὅστιν ὁ φλοιὸς
5 αὐτῆς· τὸ δὲ ἐκ κοκοπέσις καὶ ἐκ
θλαθείσης αὐτῆς ἐκπίεσμα, μί-
γνυται σμύγμασι τοῖς πρὸς τρα-
χύτητας καὶ κνησμοὺς ἐνδε-
τοῦπν.

- Πεὶδ Ναρκίσσου. Κεφ. ρξά.
10 Νάρκισσος, ἐνιοι καὶ τὸ τοῦ ὡς ὅτι
τὸ κρίνον λεῖον ἐκάλεισαν, τὰ μὲν
φύλλα πρὸς τὸ εἶναι λεπτὰ δὲ καὶ
μικρότερα καὶ πλὴν, καὶ σενώτερα·
χαλὸν κενὸν, ἀφυλλον μείζων σπι-
δαμῆς· ἐφ' οὗ ἀνδρὸς λευκὸν ἔστω-
15 θεν ὃ κροκῶδες ἐπ' ἐνίων δὲ πορ-
φυροειδές· ῥίζα δὲ λευκὴ, ἐνδοθεν
στρογγύλη, βολεθεῖδης, καρπὸς ὡς
ἐν ὑδρὶ, μέλας, πρὸς μῆκος· φύε-
ται ὁ ἑλλῆς ἐν ὄρεσιν τοῖς τοῖς,
ἐν ὧδης· ὁ δὲ λοιπὸς πρὸς τὸ εἶναι,
20 καὶ βοτανῶν τῇ ἀποφορᾷ ἐ-
χει. Τούτου ἡ ῥίζα βρωθεῖσα ἐ-
φθὴ καὶ ποδῆσαι, ἐμέτοις κινεῖ·
ἀρμόζει δὲ καὶ πνευματικῶς συν-
μίλιτι λεία· καὶ τὰς πρὸς νεύρα
διακοπὰς παρακολλᾷ καὶ ἀπλᾶσ-
25 σσύνῃ· ἐρέμματα τε σφυρῶν καὶ
τὰ πρὸς ἀρῶν χροῖα ἀλγύμα-
τα λεία συνὲς μίλιτι καὶ πλά-
σσειν ὀνίνησι· καὶ ἀνδρὶ καὶ ἑφθην
καὶ ἀλφὸν συνὲς κνίδης σπέρματι
καὶ ὄζει· συνὲς ὀρέβω δὲ καὶ μίλιτι
πρὸς

Vomitiones mouet, & aluum
cum hydromelite resoluit: sto-
macho aduersatur. Oleum
quod ea exprimitur, alui po-
tu ciet. Cortex eius magis ad-
stringit: verum tussæ & expres-
sæ succus abstergentibus me-
dicamentis adiicitur, quæ ad-
uersus pruriginēs & scabritias
idonea sunt.

Narcissus. Cap. CLXI.

Narcissum sunt qui vt liliū,
lirium appellarint, folia por-
ro similia, tenuia, multò mino-
ra, & angustiora: caulis vacu⁹,
& sine foliis, supra dodrantem
attollitur: flos albus, intus cro-
ceus, in quibusdam purpureus:
radix intus alba, rotunda, bul-
bosa: semen velut in tunica,
nigrum, longum: probatissi-
mus nascitur in montibus, sua-
ui odore: cæteri porrum imi-
tantur, atque herbaceum vi-
rus olent. Radix cocta, siue
estur siue bibitur, vomitoria
est: ambustis igni prodest, cum
exiguo melle trita: præcisos
neruos illitu glutinat: luxa-
tis malleolis, diuturnisque ar-
ticulorum doloribus, trita ex
melle & imposita, subuenit:
vitia cutis in facie, vitiligenæq;
cum semine vrticæ, & aceto
emaculat: cum eruo & melle,
H iij vlce.

DIOSCORIDIS

ulcerum fordes expurgat: abscessus rumpit cōcoctioni repugnantes: infixa corpori extrahit, illita cum lolij farina, & melle.

Hippophaës. Cap. CLXII.

Hippophaës, quo fullones vestes interpolant, in sabulosis maritimisque nascitur, surculaceo frutice, vndique denso & largo, foliis oleæ, longioribus, mollioribusq; inter quæ candicantes spinæ emicant, ficcæ, angulosæ, interstitio quodam distantes: flores hederæ corymbis similes, racematim cohærent, minusculi tamen, & molles, candidi, ex parte rubescentes: radix lacteo succo madet, crassa, mollis, amara gustanti: ex qua, perinde ac thapsia, succus eximitur, qui per se, & cum erui farina subactus, ficcatur, & ad vsum reconditur. Syncerus pituitas, bilem, aquasque detrahit, oboli pondere: erui verò farina subactus, quatuor obolis, cum aqua mulsæ. Frutex cum radicibus ficcatus tūditur, & cum aquæ mulsæ dimidia hemina tritus datur. Radice & herba liquamentum depromitur, vti in thapsia: huius in purgationibus modus est drachma.

Hippo-

τὰς ἀκαθαρσίας τῶν ἐλκῶν ἀποκαθαίρει· καὶ τὰ δύσπεπτα τῶν ἀποσημάτων ῥέσσει· ἄγει ἔν σόλοπας συνὲ ἀείνω ἀλεύρω καὶ μέλιτι καταπλασσομένη.

Περὶ Ἰπποφαοῦ. Κεφ. ρξβ'. §

Ἰπποφαῖς, ᾧ γνάθος τὰ ἱμάτια, φύνεται μὲν ἐν παραθαλάσσις καὶ ἀμμώδεσι τόποις, δάμνος δὲ ὅτι φρυγανώδης, πυκνὸς ἀμφιλοφῆς, φύλλα ἔχων μακρὰ πρὸς τὰ ἑλκείας, σενώτερά δὲ καὶ λεπτότερα καὶ μετὰ ξυ ἀκαθάρτας ξηρὰς ὑπολευκοῖς, γυννιδεῖς, ἀπ' ἀλλήλων διεστώσας· ἀνθὶ κορυμβοῖς εἰκότα κιστῆ, ὡς βοξύδια προσκείμενα διήλοις, πλὴν μικρότερα καὶ μαλακὰ, καὶ μὲν τοῦ λευκοῦ φοινίσκοντα ἐν μέρους· ῥίζα παχεῖα καὶ μυδακῆ, ὅπῃ μεσθὶ γευσάμεν πικρὰ, ὅπῃ ζομένη ὡς ἑσθὶ δαΐσια. Αποτίθει· ὅ κατ' ἐαυτὸν ὁ ὅπος καὶ συνὲ ὀροβίνω ἀλεύρω ἀναλαμβάνόμενος καὶ ξηραρόμενος· καθαίρει ὅ χολῶδες, ὑδατῶδες καὶ φλεγματῶδες χάτω, ὅσον ὀβολὸς ἀκέραιος· ἡ δὲ μὲν τῶ ὀροβίνω τε βώβολον συνὲ μελικράτῳ καὶ ὁ δάμνος δὲ συνὲ ταῖς ῥίζαις ξηραρόμενος κόπτεται, καὶ δίδεται λείος μετὰ μελικράτου κοτύλης μᾶς ἡμισείας· γίνεται δὲ καὶ χύσμα τῆς ῥίζης καὶ τῆς πτεῖας ὡς ἑσθὶ ἐπὶ τῇ δαΐσι· δίδεται δὲ τούτου ἡ εἰς τὰς κατάρσεις.

Περὶ Ἰππο-

Πρὶ Ἰπποφάεσσι. Κεφ. ρξγ'.

Ἰπποφάεσσι, οἱ δὲ καὶ τὸ ἰπποφάεσσι καλεῖται ἐν τοῖς αὐτοῖς τοῖς τοῖς, ἐν οἷς καὶ τὸ ἰπποφάεσσι, καὶ αὐτὸ γναφίης ἀκνίης
 5 εἶδος ὑπαρχόν· ἐστὶ δὲ χαμαιπιτῆς, ἔχον μόνον φυλλάκια μικρά, ἀκνίης, καὶ κεφάλια χαῖνα· οὐτε δὲ χαμλὸν οὐτε αἰθῆρος φέρει· ῥίζαν δὲ παχέαν καὶ μαλακλήν. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ ῥίζαν καὶ τὴν κεφαλὴν χυλίσας, ἐν
 10 ρανῇ καὶ δίδου ὁλικῶς τεινωσίου μετ' μελικράτῃ ὡς βέλῃ· ἢ γὰρ διὰ τῆς κηδείας, ὕδωρ καὶ φλέγμα ἀλείψιδως ὅπου ποιοῖς ἀρμόζῃ καὶ ἐπιληψίας καὶ τοῖς περὶ νεύρα
 15 πάθεισιν ἢ διὰ τῆς κηδείας.

Πρὶ Κίκεως. Κεφ. ρξδ'.

Κίκιν ἢ κρότων, οἱ ὅτι σῖσιν μόνον αἰσιν, οἱ ὅτι σῖσει κύκλιον, οἱ ὅτι κρότωνα ἀνόμασιν κρότων, διὰ τὸ
 20 ματος· ἐν δὲ ὅτι συνῆς μικρὰς μέγας ἔχον· φύλλα δὲ ὁμοία πλατύνω, μείζονα ὅτι καὶ λεῖότερα καὶ μελαίνετα· τὰ ὅτι στελέχη καὶ τὰς κλάδας κοίλα καλὰ μὲν βόπον ἔχει· κατὰ δὲ ἐν βόρσι βα
 25 χέσι, λεπιδέντα, ὁμοίον κρότωνι τῷ ζώῳ. Ἐξ ὧ καὶ ἀποθλίβεῖ τὸ λεῖόμενον κίκινον ἑλαμον· ἀβρῶλον μὲν, ἀλλ' ὡς ὅτι χηλίσμον εἰς λήχης καὶ ἐμπλάσσης κηδείας δένει· ὅτι
 30 ὅτι κόκκοι τὸ ἀριθμὸν καὶ περὶ τῆς λεῖον,

Hippophæstū. Cap. CLXIII.

Hippophæston, id quod aliqui hippophaës appellant, nascitur eisdem locis quibus hippophaës, estque spinæ fullonis genus, humilis herba, sine cauliculo, sine flore: inanibus tantum capitulis: foliis parvis, spinosis: radículas habens molles, crassas. Succus radice, foliis & capitulo exprimitur, & exiccatur. Datus, cui voles, tribus obolis, in aqua mulsa, aquam pituitasque detrahit: priuatim comitialibus morbis, neruorum vitiis, & orthopnoæ cōuenit humiscemodi purgatio.

Ricinus. Cap. CLXIII.

CICI, aut croton, nomen accepit à ricini animalis similitudine: arbor prouenit parua ficus altitudine, folio platani, maiore, læuiore, & nigriore: ramis, caudicibusque cauis in arundinis morem: femine in vuis asperis, quod corticibus exutum, ricinum animal representat: ex quo oleum, nomine cicinum, exprimitur, cibis foedum, luccernis emplastrisque vtile. Grana triginta numero purgata, trita potu, pituitas bilem

DIOSCORIDIS

lem, aquámque per aluum extrahunt, vomitionésq; mouét, sed iniucúda admodum est, & molesta purgatio : siquidé stómachum vehementer subuertit. Tusa & imposita, vitia cutis in facie, varósque expurgat. Folia cum poléta trita, inflammationes oculorū, tumorésque leniunt: rigentes mammas cohibent: eadem ex aceto illita, ignes sacros restingunt.

Tithymali. Cap. CLXV.

Tithymali genera septem, quorū masculus characias appellatur, ab aliquib⁹ amygdaloides: alter, myrtites, qui foemina existimatur, eumq; myrsiniten aut caryiten vocā: tertius, paralius, quem tithymalida appellarunt: alius, helioscopius: quintus, cyparissias: sext⁹, dendroides: septimus, platyphillos dicitur. Characiæ caules supra cubiti altitudiné atolluntur: rubri, lacteo succo atque acri madétes: foliis oleæ circum ramos, angustioribus, & longioribus: radice crassa, lignosa: pendet in cacumini- bus caulium, coma iunci, sub qua caueolæ foliolis balnearū similes, in quibus semé cótinetur: nascitur in asperis, & mótibus. Succus aluum purgat; trahit

τες λείον, ἄγυσιν κτ' κοιλίαν φλέγμα κ' χολῆν κ' ὕδωρ· κινῶσι δὲ κ' ἔμετον, ἔστι δὲ λίαν ἀηδὺς καὶ ἐργώδης ἢ τοιαύτη καὶ παρσις· ἀναβέβησται σόμαχον ἰσχυρῶς· κοπεῖται ὃ κ' κατὰ πλάθειται ἰόνθες κ' ἐφ' ἡλῆς καὶ αἰρέ. τὰ ὃ φύλλα τειβέντα μὲν πτωπάλις ἀλφίτη, ὀφθαλμῶν οἰδήματα κ' φλεγμαῖς παύει· κ' σπασμῶντας μαστῆς, ἐρυσσιπέλατά τ' σθένεισι καὶ ἑαυτὰ κ' μετ' ὅξος κατὰ πλάτος ἰσχυρῶς. 10

Πρὶ Τιδυμάλων. Κεφ. ρξέ.

Τιδυμάλων εἶδη ζ'. ὧν ὁ μὲν ἄρριον χαράκις καλεῖται, ὑπὸ δὲ πινῶν κομῆτης, ἢ ἀμυγδαλοειδὴς ἢ κωβίος ὀνομάζεται· ὁ δὲ τις δῦλις ἢ μυρτίτης, ὃν κ' καρυίτιν 15 ἢ μυρσινίτιν καλοῦσιν· ὁ δὲ παρῆλιος, ὃν ἔνιοι τιδυμαλίδα ἐκάλεσαν· ὁ δὲ τις ἡλίσκοπος· ὁ δὲ κυπαρισσίας· ὁ δὲ δένδρωδης· ὁ δὲ πλατύφυλλος. Τὸ δὲ χαράκις καλεῖται, καυλοὶ μὲν, ὑπὸ 20 πῆχυν ἐπερυνθεῖς, ὅπως δριμύτος καὶ λευκοῦ μεσοῖ φύλλα δὲ πᾶσι τὰς ῥάβδους ὁμοία ἐλαία, μακρότερα ὃ κ' στενώτερα· ῥίζα ἀδρά καὶ ξυλώδης· ἐπ' ἄκρων δὲ τῶν καυλῶν κόμη γρηγορῶν ῥαβδίων, 25 καὶ ὑπὸ αὐτῶν ὑπόκοιλα ὁμοία πύελοισιν, ἐν οἷς ὁ καρπὸς φύεται· ἐν τῇ χειρὶ καὶ ὀρεινοῖς τόποις. Δυνάμειν δὲ ἔχει ὁ ὅπως κατὰ ρηκὺν τῆς κατὰ κοιλίας· ἄγων

ἄγων φλέγμα καὶ χολῶν ὀβολῶν
 β' πλῆθος λαμβανόμενος μετ'
 ὀξύκράτους συν μελικράτῳ δὲ καὶ
 ἕμετον κινεῖ. ὁπίζεται δὲ πρὸς
 τὸν τραχηλόν. συναχθεῖσιν τῶν
 ῥάβδων καὶ ἀποτμηθεῖσιν, ἐγκα-
 κλέιδῃ ἢ αὐτὰς δεῖ εἰς ἀγγεῖον.
 ἔνιοι ἢ ὀρέβινον ἄλκυρον μυρω-
 νες, συναναπλάσσοισιν ὀροβιάδα
 μέγιστη. πνὲς δὲ εἰς τὰ ξηρα-
 νόμῳ συκα ἀποσάζουσι σαλα-
 10 γμαρὶ γ' ἢ δί'. καὶ ξηραίνοντες
 ἀποτίθενται. καθ' ἑαυτὸν δὲ τρι-
 βόμῳ ἐν θυιά ἀναπλάσσεται
 καὶ ἀποτίθεται ἢ δὲ τῷ ὁπίζειν ἢ
 δεῖ κατὰ ἀνέμον ἰσταδα, ἢ ἢ τὰς
 χεῖρας ἄγειν τοῖς ὀφθαλμοῖς.
 15 ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ ὁπίζειν τὸ σῶμα
 δεῖ χεῖρην στέατι ἢ ἐλαίῳ μετ'
 οἴνῳ καὶ μάλιστ' ἀρόσωπον καὶ βά-
 χιον καὶ ὄρχον, τραχυλεῖν δὲ καὶ
 τιλὸν φάρυγγα· ὅθεν δεῖ κατὰ πό-
 τιν ἐπιπλάττειν κηρῷ ἢ μέλιτι
 20 ὁφθαλμῷ, καὶ ἔτιως διδόναι· ἰσχυρὰ δὲ
 μὲν τοι δύο ἢ τρεῖς λαμβανόμε-
 ναι, αὐτάρ κεις εἰς πρὸς χάσμα-
 σιν. ψιλοῖ δὲ καὶ τείχας ὅπως
 ἀρόσωπος ἐπιχειθεῖς μετ' ἐ-
 λαίου, ἐν ἡλίῳ, καὶ τὰς ἐπινομέ-
 25 γας δὲ ξανθὰς καὶ λεπτὰς ποιεῖ·
 καὶ τέλος ἐμφεῖρει πάσας. ἐν-
 τίθεται δὲ καὶ τοῖς βρώμασι τὸ
 ὀδόντων κομφίζων τὰ ἀλγύμα-
 τα· κηρῷ δὲ δεῖ τοῦ ὀδόντας
 ἐπιπλάττειν, ἵνα μὴ παρερρεῖς
 κακώσῃ

trahit pituitam bilémque, bi-
 nis obolis in posca sumptis: &
 cum aqua mulsa, vomitiones
 mouet. Appetente vindemiarū
 tempore, succus congeffis ra-
 mulis, mox diffectis, & vase cō-
 clusis, excipitur. Aliqui adiciūt
 farinam erui, & in pastillos di-
 gerūt, qui erui magnitudinem
 impleant. Alij in aridas ficos,
 ternas quaternásve guttas in-
 stillant, vt cum his inarescant:
 quas ad vsus recondunt. Per
 se etiam tufus in pila, & in pa-
 stillos coactus reponitur. Por-
 rò cum extrahitur lac, neque
 quò ventus aspiret, stare quē-
 quam, neque manus oculis
 admouere conuenit: sed an-
 tequam colligas, corpus, præ-
 fertim faciem, collū, scrotum-
 que genitalis, adipe aut oleo
 cū vino perungere. Fauces au-
 tem exasperat: quapropter ca-
 tapotia cera aut decocto mel-
 le oblini par est, & hoc mo-
 do dari: binas tamen ternásve
 ficos, purgationis gratia sum-
 plisse, satis est. Recens lac ex o-
 leo, perunctos in sole capillos
 euellit, renascentesq; flauos, &
 exiles efficit: denique omnes
 perimit. Dentiū cauernis inclu-
 sum, leuat dolores: sed cera dē-
 tes oblinendi ne suo delapsu,
 fauces

DIOSCORIDIS

fauces & linguam vitiet. Tolle illitu impetigines, formicantes verrucas, pensiles, & quæ thymi florem repræsentant. Valet aduersus pterygia, carbunculos, phagedænas vlcerum, gangrænas, fistulasque. Legitur semen autumnò, & siccatum sole leuiter tunditur, feruefactumque loco mundo reponitur. Folia item siccantur. Semen & folia lactei succi effectum præbent, dimidio acetabulo pota. Sunt qui inueterant, admisto cum lacte lepidio, & caseo còtuso. Radix drachmæ pondere in hydromelite pota per inferna trahit. Decocta cum aceto, dentium dolori auxiliatur, colluto ore.

Tithymali foemina.

Foemina, quam myrsiniten, aut caryiten vocarunt, similis suapte natura daphnoidi: foliis myrthi, sed maioribus, firmis, in cacumine acutis, & pungentibus: ramulos ab radice mittit dodrantes: fructum fert alternis annis, nuci similem, mordaci gustu: nascitur & hæc in asperis. Succus, radix, semine, folia, consimilem antedicto fortiuntur facultatem: sed ad citandas vomitiones inualidior hæc est.

Aliud

κακάσῃ τῷ φάρμακῳ ἢ γλῶτταν. αἰρεῖ δὲ καὶ μυρμηκίας, καὶ ἀκροχορδόνες καὶ θυμὸς καὶ λεχῶνας ἐπιχειρίδιμος. ἀρμύζει καὶ πρὸς πτερυγία καὶ ἀνδράκας, φαγεδαίνες, γαγγράνας, σύριγγας. καὶ ὁ καρπὸς δὲ φθινοπώρῳ συλλεγείς, καὶ ξηρανθεὶς ἐν ἡλίῳ, κοπείς τε καὶ φῶς καὶ ἀποβρασθεὶς καὶ θαρῶς ἀποπίπτει. καὶ τὰ φύλλα ὁμοίως ξηρά. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα τὰ αὐτὰ τῷ ὅπῳ, πλὴν ἰσδοῦς ἡμίσεισι δρύϊάφει πιτίζόμενα. ἐνιοὶ δὲ καὶ ταριχεύουσιν αὐτὰ, μυρμιώτες τῷ διὰ τῆς γάλακτος λεπίδιῳ, καὶ τυρῷ κοπιῶ. καὶ ἡ ρίζα δὲ ἐπιπαθεῖσα αἰσιν ὕδρος μέλιτι καὶ ποτίζει, ἀγχι καὶ κοιλίαν ἐμειδίσει ὅτι σὺν ὄξει καὶ διακλυζομένη ὁδονταλγίας βοηθεῖ.

Πρὶ τῆς θήλειος.

Ὁ δὲ θήλυς, ὃν ἐνιοὶ μυρσίνην ἢ καρυῖ τῷ ἐκάλει, πρὸς μεμερηὶς τῷ δαφνοειδεῖ τῷ φύσιν καὶ τὰ φύλλα ὁμοία ἔχει μυρσίνῃ, μέζονα δὲ καὶ στερεὰ, ἐπ' ἀκρὸς ἔξεται καὶ ἀκανθώδη κλήματα δὲ ἀπὸ τῆς ρίζης σπιδαρμαῖα ἀφίονται τὸν δὲ καρπὸν φέρει παρ' ἐνιαυτὸν καρπῷ ὁμοίον, ἵσχυρὸν δάκνυντα τῷ γλῶσσῳ ἐν βράχεσι δὲ χλωρίοις καὶ οὖτος φύει. Διῶαμιν ὅτι ἔχει ὁ ὅπτος καὶ ἡ ρίζα καὶ ὁ καρπὸς καὶ τὰ φύλλα ὁμοίαν τῷ πρὸ αὐτῆς ἐμεικνότερος μὲν τοὶ ἐκείνης τέτυκται.

Πρὶ τῆς

Πρὶ τῆ παραλίας.

Ο δὲ παραλίος λεγόμενος πύ-
μαλτος, ὃν ἔνιοι πτυμαλίδα ἢ μύ-
κωτα ἐκάλεζον φύε' ἐν παραθα-
λασίοις τόποις. κλώνας δὲ ἔχει
5 σπιθαμαίνας ὑψύθους, ἐν δ' ἀπὸ
τῆ ρίζης, ποτὶ ὅς τὰ φύλλα σιγ-
δὸν μικρά, ὑπόστενα, περιμυκ-
τικώτα λίγω· κεφαλῶν δὲ ἐκ' ἄ-
κρε περιφέρει, ἐν ᾗ ὁ καρπὸς ὡς ὀ-
ρθος, ποικίλος, ἀνθη λευκός. ὅλος
10 ὅ δ' ὁ δάμνος καὶ ἡ ρίζα, ὁ ποτὶ λευκὸς
μετὶ καὶ τέττε χερσὶς καὶ ἀπόδε-
σις, ὁμοία ὅτι τοῖς περιφρημένοις.

Πρὶ τῆ ἡλιοσκοπίου.

Ο ὅς ἡλιοσκοπὸς λεγόμενος, ἀγ-
δράχη ὁμοία φύλλα ἔχει, λεπτό-
15 τερα ὅ καὶ περιφρέσθαι κλώνας ὅ
ἀφίστην ἀπὸ τῆ ρίζης δ' ἢ ἐ. σπιθα-
μαίνας, λεπτὺς καὶ ἐρυθρὺς, ὁ ποτὶ λευ-
κός, μετὸς πολλὰ κεφαλῶν ὅ ἀνη-
δοειδής· καὶ ὁ καρπὸς δὲ ὡς ποτὶ ἐν
κεφαλίοις. συμπεριφέρει' ὅ τέττε
20 ἡ κόμη τῇ τῆ ἡλίου κλίσε'. ὅθεν καὶ
ὠνόμασαι ἡλιοσκοπὸς ἐν ἐρηίοις
ὅ μάλιστα καὶ ποτὶ τὰς πλάγας φύε-
ται. συλλέγε' ὅ δ' ὁ ποτὶς καὶ ὁ καρ-
πὸς ὡς ποτὶ καὶ τῶν ἀγίων. Δυνάμει
ἔχων τ' αὐτὴν τοῖς περὶ τέρεσις,
25 ἀλλ' ἐκ' ὅπως ἐπιτεταμένω.

Πρὶ Κυπαρισσίας.

Ο δὲ κυπαρισσίας, χαλδὸν μὲν
ἀνίστη σπιθαμαίων, ἢ καὶ μείζο-
να, ὑψύθρον, ἐξ οὗ βεβλάσθηκα
τὰ φύλλα τοῖς τῆς πίπτος ὁμοία,
περιφρέ-

Aliud tithymali genus.

Aliud tithymali gen^r dicitur
paralios, quē tithymalida, aut
mecona aliqui appellauere: na-
scitur ī maritimis, ramis subru-
bētibus, palmū altis, quinis, fe-
nisve à radice exeūtibus: foliis
lini, angustis, paruis, oblōgis, in-
versus quosdā digestis: capite
in cacumine orbiculato, ī quo
semen, vt eruum, vario colore
emicat: flos albus. Frutex totus
cū radice lacteo succo turget.
Similes ad vsus reconditur.

Helioscopius.

Helioscopius dicit foliis por-
tulacæ, tenuioribus, rotūdiori-
busq;: ramulis prodeunbus à
radice, quatuor aut quinq;, ru-
bentibus, dodrantali altitudi-
ne, tenuibus, lactis copiosi ple-
nis: capite anethi: semine velut
in capitulis incluso: Helioscopi
nomen accepit, quoniā comas
cum solē circumagat: circa op-
pida nascitur, potissimū in ru-
deribus. Colligitur succus se-
ménque, vt aliorum. Eadem
quæ superioribus vires, non ta-
men vsquē adeò validæ.

Ciparissias.

CIPARISSIAS in cau-
lem exit dodrantalem, vel ma-
iorem, subrubrū: ex quo folia
picæ similitudine exoriuntur,
molliora

DIOSCORIDIS

molliora tamē, & tenuiora: &
in totum nascētem piceam æ-
mulatur, vnde nōmen traxit.
Candido succo madet, cui ea-
dem vis quæ superioribus,

Aliud dendroides
nominatum.

In pētris nascens, dendroi-
des cognominatur. ampliter
opacat, in cacumine frondo-
sam spargens comam, succo
lacteο prāgnans, cauliculis ru-
bētibus: foliis myrti tenuioris:
fructu characiæ. Eiusdem effe-
ctus, cuius superiores, similiq;
modo reconditur.

Platyphyllos.

PLATYPHILLOS, ver-
basco similis est. Radix, succus,
& folia, per inferna trahunt
aquas. Pisces necat, tufus, &
aquæ insparsus. Reliqua tithy-
malorū genera quæ suprà scri-
buntur, idem efficiunt.

Pityufa. Cap. CLXVI.

Pityusam specie à cyparissia
differre constat, etsi tithymalo
rum generi assignetur. caulis
supra cubiti altitudinem assur-
git, geniculatus: foliis piceæ, a-
cutis, exilibus: flore paruo: ve-
lut purpureo: semine instar
lenticulæ, lato: radice crassa,
candida, succo referta, quibus-

τρυφρώτερα μὲν τοι καὶ λεπτότε-
 ρα· καὶ καθόλου ἔοικε πύττῃ ἀρπ-
 φυεῖ· ὁ δὲν καὶ ὠνύμασιν ἀπεκλήρω-
 ται δὲ καὶ ἕτος ὁπ᾽ ἐλευκῆ. Διούα-
 μιν ὃ ἔχει ὁμοίαν τοῖς περὶ αὐτῆς.

Πρὶ τῶ ἐν ταῖς πε-
ταῖς θυομένη.

Οδὲ ἐν τῇ πέτραις φυόμενος γεν-
νησθε δὲ χαλκήμβρους, ἀμφι-
φῆς ἀνῶθεν καὶ πολυκάμους, ὅπως
μεσσοὺς, ὡς ὕδρος τῶν κλάδους·
ὡς οὖν τὰ φύλλα μυροσίνης λεπτὴ
παρασχοικόντα· καρπὸς δὲ ὁμοιος
τῷ τῆς χαρᾶς, παραπλησίως
δὲ καὶ ἕτος ἀποτίθεται, καὶ ἐνεργεῖ
ὁμοίως τοῖς παραρηγμένοις.

Πρὶ Πλατυφύλλῃ.

Ο δὲ πλατύφυλλος φλόμα, ε-
οικε, καὶ αὐτὴ ἡ ῥίζα καὶ ὁ ὅπος καὶ
τὰ φύλλα, ἄγει ὑδατὸς διηγε-
λίαν ἀποκτείνῃ καὶ τοὺς ἰχθύας
κοπτεῖς καὶ διεσθεις ἴσῃ ὑδατὶ καὶ οἱ
ποροειραγμένοι καὶ τὸ αὐτὸ δρῶ-
σι. Πρὶ Πιτύσης. Κεφ. ρξς'. 20
Πιτύσαι, οἱ δὲ κλῆμα, οἱ καὶ κρα-
μεῖον, οἱ δὲ παράλιον, οἱ καὶ κανοπι-
κὸν χαλῶσιν· εἴδει δοκεῖ διαφέρειν
τῇ κυπαρισσίᾳ πύσμαλα· ὅθεν καὶ
εἶδος ἐν αὐτοῖς καταειθμείῃ. ἀ-
νίστοι δὲ καυλὸν πύχεως μεῖζονα 25
πολυρόνατον φυλαγείοις ὀξέσι, λε-
πίοις κατεληγμένον, ἐμφρέσι τοῖς
καὶ πῖλος· αὐτὴ μικρὰ ὥσπερ περὺ
ρά· καρπὸν καὶ πλάτῃν ὡς φακὸν· ῥέ-
ζαν λευκὴν, παχεῖαν ὅπερ μεσὴν
εὐρίσκεται

εὐείσκειται δὲ κατὰ τόπους σφό-
δρα ἐν μεγάλης ὁ δάμνος. Κα-
δαίρει δὲ καὶ τὸ ἡ μὲν ρίζα, &
β. ὁλὴν δοθεῖσα συν μελικρά-
τῳ· τὸ δὲ καρπὸς α. τὸ δὲ ὅπου
5 ὅσον κοχλιάειον ἐν καταποτίῳ
ἀναληφθέντος ἀλεύρω· τῶν δὲ
φύλλων ὁ καὶ γ.

Πρὶ Λαδυείδος. Κεφ. ρξζ'.

Λαδυεῖς, οἱ δὲ, καὶ τὰ τῶν
πιδύμαλον καλοῦσι, κατὰριθμῶν-
10 ται πένες καὶ αὐτῶν ἐν τοῖς πιδυ-
μάλοις, χαυλὸν ἀνίσκει πύχυνος τὸ
ὑψος, κενὸν, πύχυνος δακτύλος· ἐπ'
ἄκρου δὲ αὐτῆς μαχάλα· φύλλα
δὲ τὰ μὲν ἐπὶ τῇ χαυλῇ ἐπιμή-
κη, ὁμοία τοῖς τῆς ἀμυγδαλῆς,
15 πλατύτερά δὲ καὶ λεϊότερα· τὰ
ἢ ἐπ' ἄκρων τῶν κλωνίων μικρό-
τερα, ὥσπερ ἀειρολοχίας ἢ κισ-
σοῦ τῆς ἐπιμήκους. καρπὸν δὲ ἔχει
ἐπ' ἄκρων τῶν κλάδων τείχε-
ρον, περὶ φερῇ ὥσπερ καππάειν,
20 ἐν ᾧ τεία σπερμάτια διεργόμε-
να ἐκλύττοις ἀπ' ἀλλήλων, περ-
φερῇ, μείζονα ὁρόεων· λεπιδέν-
τα δὲ λευκά καὶ γλυκεὰ ἐν τῇ γού-
σει. ρίζα λεπτή, ἄχρηστος, ὁλος δὲ
ὁ δάμνος ὅπου μεσὸς ὥσπερ πι-
25 δύμαλος. Διῶαμν δὲ ἔχει
κατασπικλὺ κοιτίας τὰ σπέρμα-
τα, ὅσον ζ' ἢ ἥ. τὸν ἀριθμὸν λαμ-
βανόμενα ἐν καταποτίῳ, ἢ ἐδιό-
μω καὶ καταπινόμω μτ' ἰσά-
δων ἢ φοινίκων, ὑδατος ἡυχροῦ
ἐπιρροφου-

dam in locis frutex hic pragra-
dis inuenitur. Detrahit per al-
uum radix, drachmis duab' da-
ta in aqua mulsa: item semi-
nis drachma: succi cum farina
subacti cochlearium, in cata-
potio datur: modus foliorum
drachmæ tres.

Lathyris. Cap. CLXVII.

Lathyris, quam aliqui tithy-
malum appellant, eamq; tithy-
malorum numero adscribunt,
caulé emittit cubiti altitudine,
& digitali crassitudine, inanē:
gignuntur in cacumine alæ, &
folia in caule oblóga, amygda-
linis proxima, latiora, & leuio-
ra: quæ autē in summis ramu-
lis exierunt, minora conspici-
untur, aristolochiæ, aut oblon-
gæ hederæ figura. In cacumine
fructum summis furculis gerit,
triplici loculamēto insignem,
rotundū, ceu capparim, in quo
grana incurfantibus membra-
nis inter se distincta continen-
tur, eruis maiora, rotunda: quæ
dum corticibus exuuntur, cádi-
da sunt, & gustu dulcia: Nul-
lus radicis vsus. totus frutex la-
cteo succo turget, vti tithy-
malus. Grana sex aut septem
in catapotio, aut cum ficis,
aut palmulis deuorata, aluum
purgant: sed aqua frigida po-
stea

stea forbenda : trahunt autem bilem, pituitam, & aquas . Succus, tithymali modo exceptus, eundem effectum præbet. Cum gallinaceo aut ole- ribus folia decoquuntur ad e- osdem effectus.

Peplus. Cap. CLXVIII.

PEPLOS frutex est lactei succi plenus, foliis parvis, ut ru- tæ, paulò latioribus : rotunda coma, ferè dodrantali, humi respersa : femine sub foliis ro- tundo, minore quàm candidi papaueris : pluribus scatet au- xiliis, vnicam radicem habet, superuacuum, ex qua fruticat : nascitur inter vites, & in hor- tis. Colligitur mæsisibus : fic- catur in umbra, & continuè versatur. Fructus tufus, & fer- uifactus reconditur. Bilis ac pituita detrahitur, aceta- bulo eius in hydrome- litis cyathio poto : ob- sonij inspersa con- turbat alium : muria con- ditur.

Peplis. Cap. CLXIX.

Peplis, quam aliqui syluestre portulacam vocant. Hippo- crates peplid, in maritimis ma- ximè nascitur, latè opaco fru- tice : candidi succi pleno : foliis fatiua

ἐπιρροφαιμύρῳ· ἄγει δὲ φλέγμα καὶ χολῶν καὶ ὑδρῶν. καὶ ὁ ὁπὸς ἀνα- ληφθεὶς ὡς περὶ ὁ τῆς πιτυμάλου τὸ αὐτὸ ποιεῖ. συνέφε δὲ καὶ ὀρ- νίδι ἢ λαχαίνοις τὰ φύλλα πρὸς τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν.

Περὶ Πέπλου. Κεφ. ρξή.

Πέπλος, οἱ δὲ συκῆν, οἱ δὲ μή- κωνά ἀφραδὴ καλῶσι, δαμνίσκος ὅστις ὁπὸ λευκῆ μεσὸς, ἔχων φύλ- λον μικρὸν, ὁμοῖον πιτάνῳ, πλά- 10 τύτερον δὲ ἢ δὲ σύμπασα κόμη ὡς ἀπὸ δαμνῆς, πεφρῆς, ἐκλεχυ- μύρῃ ἐπὶ τῇ γῆς· καὶ ἀπὸ τοῖς φύλ- λοις καρπὸς μικρὸς, σφόνδυλος, ἡτῶν τῆς λευκῆς μήκωνος· πολύ- χητος δὲ ἢ πῶτα ῥίζαν ἔχουσα 15 μίαν ἀχρηστον, ἀφ' ἧς ὅλος ὁ δά- μνος πέφυκε· γλυνᾷ δὲ ἐν κήποις καὶ ἀμπελώσι. Σιωάφει ἐν πυ- ραμντῷ ξηρανομύρῃ ἐν σκιά, καὶ συνεχῶς σφεφομύρῃ. ἀποτίσεται δὲ ὁ καρπὸς κοπείας καὶ ἀποβρά- 20 σθεὶς. ἄγει δὲ φλέγμα καὶ χολῶν ὀξύσάφει πλεῖστος, μᾶλλον δὲ ρομέλι- 7ος· κυάθει πινόμυρος· καὶ ἐν* πρὸς ὁ ἡμίσει δὲ μυγυμύρος παράσσει τῇ κοιλίᾳ, ταραχύνει δὲ εἰς δι- μαίαις. Περὶ πεπλίδος. Κεφ. ρξθ'. ε.

Πεπλῖς, οἱ δὲ ἀνδράχλων ἀ- γρίαν, Ἰπποκράτης δὲ πέπλιον καλεῖ· φύει μάλιστα ἐν παραδά- λαοῖς τοῖς, δάμνος ἀμφι- λαφῆς, ὁποῦ μεσὸς λευκῆ· φύλλα δὲ ἔχων

ἔχων ὁμοία τῇ κηπαίᾳ ἀνδρά-
 ρη, περὶ δὲ καὶ ἐκ τῆς κέρας ἔ-
 χοντα ἐρρενδές· καὶ ὁ καρπὸς δὲ
 στρογγύλος ὑποκάτω τῶν φύλλων,
 ὡς περὶ τῆς πέπλου, πυρώδης τῇ γεύ-
 σει· ῥίζα λεπτή, μία, ἄχρηστος. συλ-
 λέγει δὲ καὶ ἀποτίθει, καὶ δίδω
 ὡς περὶ ὁ πέπλος, καὶ ταιριχέυεται.
 Διῶαμιν δὲ ἔχει πλὴν αὐτῶν.

Πρὶ Χαμαίσυκης.

Κεφ. ρθ.

- 10 Χαμαίσυκιν, οἱ δὲ συκλὴν κα-
 λῶσι, καλῶνας ἀνίστοι τετραδακτύ-
 λης ἐπὶ γῆς ἐρριμμένους, περὶ φε-
 ρείς, ὅπερ μεσοῦς φύλλα φακοει-
 δῆ, τῶν πέπλων ὁμοία, μικρὰ, λε-
 πτὰ περὶ τῇ γῇ· καρπὸς δὲ ὑπό-
 15 τοῖς φύλλοις στρογγύλος ὡς πέ-
 πλου· οὔτε δὲ ἀνδρός, οὔτε κη-
 λων ἔχει· ῥίζαν λεπτήν καὶ ἄχρη-
 στον. Διῶαμιν δὲ ἔχουσιν οἱ χαλῶ-
 νες λεανδέκτες συνὸ οἶνον, τὰς πε-
 20 μύβαν ὀδυώνας παύειν, ἀντὶ πεσ-
 οῦ περὶ φερέντες· κατὰ πλάσσο-
 μῶμοι δὲ οἰδήματα ἀκροχορδῶ-
 νας καὶ μυρμηκίας ἀγριὸν ἐφδοῖ
 δὲ ἐδπόμῶμοι κοιλίαν ἐκλύουσι.
 καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν δὲ ὅπως τὰ αὐτὰ
 δρᾶ καὶ κατὰ χυμῶμοι, σκορπίου
 25 πλῆν βονδεῖ· ἀρμόζει καὶ περὶ
 ἀμβλυπίας καὶ ἀχλὺν, καὶ ἀρ-
 χυμῶνας ὑποχόσεις, οὐλὰς, νεφέ-
 λια, συνὸ μέλιτι ἐγχεῖομῶμοι.
 φύεται ἐν πετρώσει καὶ ἀνχμη-
 εῖς τόποις.

Πρὶ

fatuae portulacæ, rotundis, in-
 fernè rubentibus : semine sub
 foliis rotundo, vti in peplo, fer-
 uente gustu : radice singulari,
 superuacua, tenui. Colligi
 & reponi ac dari, vti
 peplos, & sale cōdi-
 ri solet. Easdem
 habet vires .

Chamæfyce. Cap. CLXX:

CHAMÆSYCEN ali-
 qui fycen nominant, ramos
 emittit quaternum digitorum,
 teretes, succosos, in terram
 deiectos : folia lentis, parua,
 peplum planè referentia, te-
 nuia, quæ à terra non attollū-
 tur : semine sub foliis rotundo,
 vt in peplo : neque caulem, ne-
 que florem promit : radice fir-
 matur tenui, superuacanea. Ra-
 mi ex vino triti vuluæ dolores
 sedant in pello appōiti : tol-
 lunt tumores ac verrucas om-
 nium generum illiti : decocto-
 rum cibo, alius resoluitur. Suc-
 cus simili effectū prodest : illi-
 tus contra scorpionis ictum
 auxiliatur : aduersus caligines
 oculorum utilis, & hebetudi-
 nes, incipientes suffusiones, nu-
 beculas, cicatrices, cum melle
 inunct⁹. In squallidis petrosif-
 que nascitur.

I Scamonia

Scámonia. Cap. CLXXI.

Scámonia, ramos ab vna radice emittit trium cubitorum, multos, pingues, & qui nonnihil crassitudinis præ se ferant: foliis helxinæ, aut hederaceis, mollioribus tamen, hirsutis, & triangulis: flore candido, rotundo, in calathi modum cauo, graueolente: radice prælonga, crassitudine cubitali, candida, graui odore, succo grauida. Legitur ad hunc modum succus: Capite exempto, radix in testudinis speciem cultro excavatur, quo fit ut in cauum confluat succus, qui conchis demum excipitur. Alij scrobes in terra concamerato sinu fodiunt, in quos, subiectis iuglandum foliis, profundum succum, siccatumque extrahunt. Laudatur autem scámoniū leue, nitidum, rarum & colore quassimilimum taurino glutini, fungosum, tenuibus fistulis, quale ex Mysia regione Asiæ deportatur. Nec attendere solum par est, si linguæ tactu albescat (hoc enim euenit adulterato, quod admisto fit tithymali lacte) sed longè magis antea narratis. item si non vehemèter linguam exurat, id quod misti tithymali argumentum est. Natione autem Syriacum & Iudaicum deterrima habetur, grauia,

Πρὶ Σκαμμωνίας. Κεφ. ρα.
Σκαμμωνία κλώνας ἀνίστα πολλοὺς, ἀπὸ μιᾶς ῥίζης τετράχρεις, λιπαροὺς, ἐμφαίγοντάς τι παχύτητος· καὶ τὰ φύλλα δὲ δασέα. ὁμοία ἐλξίνη ἢ κιστῶ, μαλακώτερα μὲν τοι καὶ τετραγωνοειδῆ· αὐτὴ λευκὰ, περὶ φερῇ, κοίλα ὥς οἱ κάλαδοι, βαρύνουσα· ῥίζα δὲ κυμίνης, παχεῖα ὅσον πῆχυς, λευκὴ βαρύνουσα, ὅταν μεσῇ. Συλλεγεται δὲ ὁ ὅπως τῆς κεφαλῆς ἀπὸ τῆς ῥίζης ἀφαυρῶν, καὶ διολοιδῶς ἱερομῶν εἰς κοιλότητι, συρρεῖ γὰρ εἰς αὐτὴν ὁ ὅπος καὶ οὕτως ἀναλαμβάνει εἰς μόσχος. ἔνιοι δὲ τὴν γλῶττιν ὀρύξαντες, διολοιδῶς χαρύας φύλλα ὑποθέντες, κατὰ χεῖρας τὸν ὅπον, καὶ οὕτω ξηρανθέντα ἀναερῶνται. ἔστι δὲ χαλὸς ὁ διαυγὴς καὶ κοῦφος, ἀραιὸς, παντοκλήδης τὴν χεῖρα, σύραγας ἔχων λεπτὰς, σφογγώδης, τοιοῦτος δὲ ὅστις ὁ ἐκ μυσίας τῆς κατὰ τὴν Ἀσίαν κομίζομενος. μὴ προσέχειν δὲ μόνον τῷ λευκάνεσθαι αὐτὸν, κατὰ τὴν τῆς γλῶττις διέξιν (τοῦτο γὰρ γίνεται καὶ παραμυθύντος αὐτῷ ὅπῃ πιδυμάλου) μᾶλλον δὲ τοῖς περὶ κληῖοις. καὶ τῷ μὴ λίαν πυρρῶν τὴν γλῶττιν, ὅπερ γίνεται πιδυμάλου μεγάλους. ὁ δὲ συριακὸς καὶ ὁ ἐν Ἰουδαίᾳ φηρόμενος χεῖριστοι βαρεῖς, πυκνοὶ, δολιχοί

ἰδοὺ κίμβροι πῖνυ μάλα, καὶ ὁρβίνω
 ἀλφύρω. Διῶαιμιν δὲ ἔχει ὁ
 πὸς ληφθεὶς σὺν μελικράτῳ, ἢ
 ὑδαππλῆθος < ἢ περὶ οὐλοῦ,
 καθαίρει καὶ τὸ χολικὸν καὶ φλέ-
 γμα. εἰς τὸ λῦσαι τὴν κοιλίαν
 ἀρκέσουσιν ὀβολοὶ β'. μετὰ σιτά-
 μου ἢ πνὸς ἄλλου σπέρματος
 λαμβανόμενοι. εἴδοται καὶ πρὸς
 ἐπεργασέσθαι καὶ θάλασσαν τοῦ μὲν
 ὁπῶ περὶ οὐλοῦ, ἐλλεβορέ δὲ μέ-
 10 λανος ὀβολοὶ β'. καὶ* ἀλφῆς < α'.
 σκευάζονται δὲ καὶ ἄλλες καθα-
 ρικαὶ πρὸς κυάθους ε'. τῶν ἀ-
 λῶν ὀλκῶν κ'. τῆς σκαμνῶνίας
 τῆς ὁπῶ μνημύρου. λαμβάνε-
 ται δὲ πρὸς διῶαιμιν τὸ μὲν
 15 τέλειον, πεία κοχλιάεια μέσον
 δὲ β'. τὸ δὲ ἐλάττω α'. καθαί-
 ρει δὲ καὶ τῆς ρίζης < α'. ἢ β'.
 σὺν οἷς εἴρηται. ἐνίοι δὲ ἀφεί-
 λοντες αὐτὴν, πίνουσιν. συνελ-
 θεῖσα δὲ ὄξει καὶ λεανθεῖσα μέ-
 20 τὰ ἀλεύρου κριθίνου, ἰσχυρὰ καὶ
 ἐστὶ κατὰ πλάγια. ὅτ' ὁπὸς πρὸς
 στένυθος ἐν ἐτέρῳ τῇ μήτρᾳ, ἐμ-
 βρυα φθείρει. διαφόρεται δὲ καὶ φύ-
 ματα σὺν μέλιτι ἢ ἐλάτῳ κατὰ
 χροῖον. ἐφ' ἡμεῖς δὲ ἐν ὄξει καὶ
 25 κατὰ χροῖον, καὶ πρὸς ἐξάγει
 κεφαλῆς τῆς χροῖας ἐστὶν ὅπῳ
 βρεγμα σὺν ὄξει καὶ ῥοδίνῳ.

Πρὶ Χαμελαίας. Κεφ. ροβ'.

Χαμελαία, οἱ δὲ πυρὸς ἔχρη
 ἢ ἀκνητος, οἱ δὲ κόκκος κινδύος
 κλῶνας

graua, densa, erui farina, & ti-
 thymalo vitiata. Succ^o drach-
 mæ vnius aut quaternum obo-
 lorum pondere haustus, ex a-
 qua pura vel mulsâ, per infer-
 na bilem & pituitam extrahit.
 Ad resoluendam alium binos
 obolos cum sesama, alioue se-
 mine, sumplisse satis est. Dan-
 tur efficacioris purgatiōis cau-
 sa, succi tres oboli, cum duo-
 bus veratri nigri & aloës dra-
 chma vna. Fiunt purgatorij sa-
 les, drachmis viginti succi scā-
 moniæ, in senos falis cyathos
 adiectis. Horum modus pro-
 portione virium: integer qui-
 dem, tria cochlearia: medius,
 duo: minimus, vnum. Radicis
 drachmæ vna aut altera pur-
 gat, cum iis quæ retulimus.
 Nonnulli decoctum radicis e-
 bibunt. Coquitur in aceto, &
 cum ordeacea farina teritur,
 cataplasmate ischiadicis utili.
 Partus enecat succus, vuluæ in
 lana subditus: tubercula disci-
 tit cum melle aut oleo illitus:
 decocto in aceto perunctæ le-
 præ abiguntur: diuturni capi-
 tis dolores ex aceto & rosaceo
 perfunduntur.

Chamelæa. Cap. CLXXII.

Chamelæa furculosa fruti-
 I ij cat,

DIOSCORIDIS

cat, ramis dodrantalibus : folia oleæ similitudinem habent, tenuiora & amara, quæ gustata linguam mordent, & arteriam deradunt. Detrahit pituitam bilēque, foliis præsertim in catapotio deuoratis: nāque duæ absinthij partes, adiecta chamelææ vna, hydromelite excipiuntur, & in catapotia coguntur : ea autem in ventre non liquescunt : siquidem quotquot fuere deuorata, regeruntur. Folij cum melle tritis fordida vlcera & crustosa repurgantur.

Thymelæa. Cap. CLXXIII.

THYMELÆA est, quæ granum gnidium, quod est semen ipsius, colligitur. Hoc Syri apolinum vocant, quoniam satiui lini frutex suapte natura similitudinem referat. Virgas ædit perpulchras, multas, tenues, binum cubitorum altitudine : foliis chamelææ, angustioribus, & pinguioribus, viscosis, gummosisq; si mordeatur: flore candido: fructu myrti in modum rotundo, qui inter initia viret, & tandem rubeſcit: inuolucrum fructus durū, foris nigrum intus album. Hoc per inferna bilem, pituitam, aquasq;

κλῶνας μὲν ἔχει ἀπὸ θαυμαίης, ὃ καὶ δάμνος φρυγανώδης· φύλλα ἔχει ἐλαία παρὰ πλῆσι, λεπτότερα δὲ καὶ πυκνά, καὶ πικρά, δάκνοντα τὸ γαστρὶ καὶ χαράττοντα τὸ ἀσθμητικόν. Ταύτης τὰ φύλλα καὶ πικρὰ καὶ δαίρει φλέγμα καὶ χολήν, μάλιστα ἐν καταποτίῳ λαμβανόμενα. μινυμύου διωλασίονος ἀψινθίου πρὸς ἐν μέρος τὸ χαμελαίας ἀναλαμβάνεσθαι δὲ ὕδατι ἢ μέλιτι εἰς καταποτίον· ἐστὶ δὲ ἀτηκτα. δι' αὐτὴν αἰσθάνεται ὅσα λαμβάνει. ἀναλαμβάνόμενα λεία τὰ φύλλα μὲν μέλιτος ἀνακαταίρει τὰ ῥυπαρὰ ἔλκη καὶ ἐξαρωμύνα.

Πρὶ Θυμελαίας. Κεφ. ρογ.

Θυμελαία, οἱ δὲ χαμελαίαν, οἱ δὲ πρὸς ἀχλὺν, ἢ κέσπον ἢ κλέσπον καλεῖσιν, ἐκ ταύτης ὁ κνίδειος κόκκος καρπὸς ὢν συλλέγεται. ὃν ἔυβοεῖς μὲν αὐτόλιον καλοῦσιν, οἱ δὲ λῖνον, διὰ τὸ εἶναι τῷ σπάρτῳ λίαν δάμνον τῇ φύσει παρόμοιον. ῥάβδος δὲ ἀνίστη καλὰ καὶ πολλὰ ὅσον διπλή χειρ· τὰ δὲ φύλλα χαμελαία ὁμοία, πλὴν σενώτερα καὶ λιπαρώτερα ὑπογλήχρα ἐν τῷ διαμασάδῃ καὶ κολλώδῃ· αὐτὴ λευκὰ καὶ μετὰ τοῦ αὐτοῦ ὁ καρπὸς, ὡς μύρτον μικρὸς, στρογγύλος, ἐν ἀρχῇ μὲν χλωρὸς, αὐτὸς δὲ ἐρυθρός· τὸ δὲ πρὸς ἐκείνῳ σκληρὸν καὶ μέλαν, τὸ δὲ ἐν τῷ λευκόν. ὁ πρὸς καταίρει καὶ πικρὰ καὶ χολήν καὶ φλέγμα καὶ

- καὶ ὕδωρ, ὅσον κ'. κόκκων τὸ ἐν τῷ
 ποτίνῃ· καίει δὲ τὴν φάρυγγα διὸ
 μετὰ ἀλῦρου ἢ ἀλφίτου δότεον,
 ἢ ἐν ῥαγὶ σαφυλῆς ἢ μέλιτι ἐφθῶ,
 περιελημμένον καταπίειν. συγ-
 5 γρῆν δὲ καὶ τὸν διυσιδρῆς λεῖον
 μετὰ νίβου καὶ ὄξους. τὰ δὲ φύλλα
 ἀπορίδως καλεῖται κλέων, συλ-
 λήγειν δὲ πρὸς τὸν πυρεμνόν,
 καὶ ἀποτίσκειται ξηρόν· αὐτὰς ἐν
 σκιᾷ. διδόντας δὲ δεῖ κόπην καὶ
 10 ἀφαιρεῖν τὰς ἐν αὐτοῖς ἵνας. κα-
 θάρξει δὲ ἐπιπλαστόμυλον ὅσον
 ὄξυβόφου πλῆθος μετὰ κράμα-
 τος ἄρον ὑδατῶδες· μετεωτέραν
 δὲ ποιεῖ τὴν καθαράν· μίχθῃ
 ἐφθῆ φακῇ καὶ λαχαίοις τεπτοῖς.
 15 ἀποτίσκειται δὲ λεῖα ἀνολιφθέν-
 τα ὁμφακος χυλῶ εἰς ἀπτίσκας.
 ἔστι δὲ κακοστόμαχος ἢ βροταῖος
 περσεδεῖσα δὲ ἐμβρυα κτείνει·
 φύεται ἐν ὄρεινοῖς καὶ τραχέσι τό-
 ποις. Πλανῶνται δὲ νομίζοντες
 20 τὸν κνίδιον κόκκον, τῆς χαμε-
 λαίας εἶναι καρπὸν, ἡ πατόμενοι
 διὰ τὸ τῶν φύλλων ὁμοιεῖς.

Πρὶ Ακτῆς. Κεφ. ροδ'.

- Ακτὴ διόση ὅστις ἡ μὲν, γὰρ τις
 ὅστις δὲν δρώδης, κλάδους καλα-
 25 μοειδῆς ἔχουσα, στρογγύλης, ὑπο-
 κοίλης, ὑπολευκοῦς, ἐν μήκῃ· τὰ
 φύλλα γ' ἢ δ'. ἐν διασημάτων
 πρὸς τὴν ῥαβδόν, καρπὸς βασιλι-
 κῇ ὁμοία, βαρύσμητά τε καὶ τρυπι-
 κώτερα· ἐπ' ἄκρην δὲ τὴν κλάδων
 ἢ τῶν

aquasq; detrahit, si viginti gra-
 norum pars interna bibatur:
 verum fauces adurit. Itaq; cum
 farina aut polenta, aut in vuae
 acino dari debet, aut melle co-
 cto obductum deuorari. Qui
 ægrè defudant, trito semine cū
 nitro & aceto, inunguntur. Fo-
 lia, quæ peculiariter cneorum
 appellantur, per messes colligi
 debent, & ficcata in vmbra re-
 condi. Quibus dare libeat, an-
 teà tundere, & neruos exime-
 re conuenit. Illitum acetabuli
 modo cū diluta vini potione,
 aquā extrahit: mediocrius pur-
 gat, addita lente cocta, aut cō-
 tritis oleribus. Thymelææ fari-
 na vuae acerbæ succo excipit,
 & in pastillos diuiditur. Herba
 stomacho infesta, partus impo-
 sita necat. Nascitur in mōtib^{us}
 & asperis. Hallucinatur, q^{ui} coc-
 con gnidium fructū esse cha-
 melææ existimāt, decepti qua-
 dam foliorum similitudine.

Σάβucus. Cap. CLXXIII.

Sábuci duo genera: vnū in ar-
 boré affurgit, surculos spargēs
 arūdinaceos, teretes, cauos, cā-
 dicātes pceros: folia iuglandis,
 terna quaternave, ex interual-
 lis circa ramos exeunt, grauiā
 odore, minutim in ābitu secta:
 & in ramulorum cacuminib^{us},

I iij cauli-

DIOSCORIDIS

cauliculisq; circinatæ umbel-
læ, quæ florem candidum pa-
runt, mox acinum terebin-
tho similem, in nigredine sup-
purpureum, racemosum, suc-
co madentem, vinosumq;.

Chamæacte. Cap. LXXV.

Alterum genus, Chamæ-
acte vocatur, Romanis ebu-
lum longè humilius est, magis-
que herbaceo generi assignā-
dum, caule quadrangulo, ge-
niculato: foliis amygdalæ, ex
interuallo longioribus, geni-
culatim expansis, pinnatisque,
græueolentibus, in ambitu fer-
ratis: muscario sambuci: flore
& acino eiusdem: radice niti-
tur longa, crassitudine digita-
li. Eadem vtriusque vis, & usus
exiccans, aluo detrahens a-
quam, stomacho inutilis. Fo-
lia, olerum more coquuntur,
ad pituitam bilémque detra-
hendam. Caules teneri in pa-
tinis cocti, eadem efficiunt.
Radix in vino decocta, & in
cibis data, hydropicos adiu-
uat: prodest viperarum mor-
sibus, eodem pota modo: vul-
vas emollit insidentium deco-
cto, patefacit earum spiracu-
la, & vitia corrigit. Acini in vi-
no poti eodem funguntur mu-
nere: denigrant capillos illiti.

Folia

ἢ τῶν χαυλῶν, σκιάδια παρὰ
ρῇ, ἔχοντα ἀνθὸν λευκόν· καρπὸν δὲ
εὐοικότα* τερμίνθῳ ἐν τῷ μέλανι
ὑποπόφυρον, βοτρύωδι, πικρῷ
χυλῶν, οἶνώδι.

Πρὶ Χαμαιάκτις. Κεφ. ροθ.

Τὸ δὲ ἕτερον αὐτῆς χαμαι-
άκτι καλεῖται· αὕτη χαμαιπε-
τῆς ἔστι ἐλάστων ὅστις καὶ βοτρυ-
ώδης ἐστίν, χαυλὸν ἔχουσα τεβάρη-
ρον καὶ πολυρόνατον· τὰ δὲ φύλλα
ἐκ διασημάτων παρὰ ἑκαστον γό-
νυ τεταρσσωμένα, ὁμοία ἀμυγδα-
λῇ, καχαραγμένα δὲ κύκλῳ καὶ
μακρότερα, βαρύνοντα· σκιάδιον
δὲ ἐπὶ ἄκρῃ ὁμοιον τῇ πρὸς αὐτὴν
ἔχουσα, καὶ ἀνθος καὶ καρπὸν· ῥίζα
δὲ ὑπερὶ μακρὰ, δακτύλου πά-
χος. Δυνάμεις δὲ ἡ αὐτὴ ἀμφο-
τέραις καὶ χρεῖσις, ξηραντικὴ, ὑ-
δραγωγὸς, κακὸς μαχρὸς μὲν τοῖς
ἐφόμοις δὲ τὰ φύλλα ὡς λάχα-
κα, καδαίρει φλέγμα καὶ χολήν, καὶ
οἱ χαυλοὶ δὲ ἀπαλοὶ ἐν κοπῇ δι-
έφθάντες τὰ αὐτὰ πεισιν· ἡ ῥίζα
δὲ αὐτῆς ἀφελμδαῖσα αὐτὸν οἶνον,
καὶ διδομένη παρὰ πλὴν διαταγῶν,
ὑδρωπικούς ἀφελεί· βοηθεῖ καὶ ἐ-
χρόδῃ τοῖς ὁμοίως πνομένῃ ἀφελ-
μδαῖσα δὲ μετ' ὕδατος, ἐγκό-
μισμα· μαλαίνει ὑστέραν καὶ ἀ-
ναστομοί, καὶ διορθοῦνται τὰς παρὰ
αὐτὴν διαθέσεις, καὶ ὁ καρπὸς δὲ σὺν
οἶνῳ ποθεῖς, τὰ αὐτὰ ποιεῖ· με-
λαίνει δὲ καὶ τείχας ἐγκρίομενος.

τὰ

τὰ δὲ φύλλα πρὸσφατα καὶ ἀπα-
λά, φλεγμονὰς θεραπεύει μὲν ἀλ-
φίτων καταπλασθῆναι καὶ κα-
ταχρῆμασιν ἀρμόζει καὶ κνω-
δῆκτοισι καταπλασθῆναι· κολ-
λὰ δὲ ὑποφρεῖς, καὶ ποδαγρί-
κοις βοηθεῖ, μὲν σῆατος ταυρίνου
καὶ βουρίνου καταπλασθῆναι.

Πρὶ πυκνόκομυ. Κεφ. ροζ'.

Πυκνόκομον φύλλα ἔχει ὁμοία
εὐζώμα, βαρέα δὲ καὶ παχέα καὶ
10 δριμύτερα καυλὸν τεβάζοντο·
ἀνδρὸς δὲ τῷ τῷ ὠκίμου ἐμφρὲς·
καρπὸν δὲ, ὡς* περασίαν· ῥίζαν μέ-
λαναν, στρογγύλην, ὡχρὰν, ὡς μι-
κρὸν μύλον, γεωδὲς ὅζοντα· φύε-
ται ἐν πετρῶδεσι τόποις. Διῶμα-
15 μιν δὲ ἔχει ὁ καρπὸς ποδαγρί-
κοις ἀπαλῆτος, τὰ καὶ χῶδι καὶ
δεινὰ ἐνύπνια ποιεῖν· διαφορεῖ δὲ
καὶ οἰδήματα ἐπιπλασθῆναι
συν' ἀλφίτῳ, καὶ ἀκίδας καὶ σπό-
λαστας ἐξάγει, καὶ τὰ φύλλα ὅ κα-
20 ταπλασθῆναι, φύματα καὶ δο-
διῶμας διαφορεῖ. ἡ δὲ ῥίζα αὐτῇ
λυτικὴ κοιλίας καὶ κινητικὴ χολῆς,
διδόται β'. ἐν μελικράτῳ.

Πρὶ Ἀπίου. Κεφ. ροζ'.

Ἀπίος, οἱ ὅ, ἰσχυρά, οἱ ὅ, χαμαι-
25 βάλανος, ὀρθὴν ἢ ἀγρία, οἱ ὅ, λινο-
ζώσις, κλωρία δύο ἢ τεῖα ἀπὸ
γῆς ἀνίστοι, χρωδὴν, λεπτὰ, ἐρυθρὰ
μικρὸν ὡς τῇ γῆς αἶροντα· φύλ-
λα παχέα εὐκότα, ἐπιμηκέτε-
ρα μὲν τοῖς καὶ στενότερα, χλωρά·
καρπός

Folia, si pratenera ac mollia
ex polenta illinantur, inflāma-
tionem mitigant : ambustis &
canis morfib⁹ illitu pfunt, vlce-
ra quæ dehiscunt in fistulā, ag-
glutinant : iis qui podagra ten-
tantur, cum seuo taurino aut
hircino profunt illita folia.

Picnocomū. Ca. CLXXVI.

Picnocomon constat eru-
cæ foliis, acrioribus, scabris,
& crassis : caule quadrangu-
lo : flore ocymī : semine maru-
bij : radice nigra, aut pallida,
rotunda, exigui mali figura,
terram redolēte : inuenitur in
saxosis locis. Semen grauia so-
mnia & tumultuosa facit, dra-
chmæ instar potum : tumores
discutit, illitum cum polenta
& spicula, adactosque corpo-
ri aculeos, extrahit. Folia il-
litu tubercula, panosq; dis-
cutiūt. Radix eius in qua
mulla duūm drachma-
rum pondere, al-
uum soluit, & bi-
lem extrahit.

Apios. Cap. CLXXVII.

APIOS RAMVLOS
duos, siue tres iunceos spar-
git, rubros, tenues, qui à ter-
ra parum attolluntur : foliis
rutæ, oblongioribus tamen,
& angustioribus, herbaceis :

I iij semine

DIOSCORIDIS

femine paruo, radice hastula regiae, in formam pyri turbinata, rotundiore tamen, succi foecunda, intus habet corpus candidum, extra cortices nigros. Superior pars eius vomitione bilem pituitasque extrahit: inferior, per alium; tota vtrinque purgationes movet. Succum si libet eximere, tusa radix in fictili mergitur, & agitata aqua, quod supernatat pena selectu, exiccat. Purgat utraque parte is succus, sesquibolo pot.

Colocynthis. Cap. LXXVIII.

Colocynthis sarmenta foliaque sativi cucumeris emitit, per terram repentia, diuisa, fructum in speciem mediocris pilae conglomeratum vehementer amarum: quem legere oportet, cum coeperit in pallidum colorem permutari. Medulla fructus purgatoriam vim habet, si quatuor oboli cum aqua mulsæ, melle cocto, myrrha & nitro excipiatur, & cogatur in catapotium. Arefactæ pilæ teruntur, & infusa clysteribus profunt nervorum resolutioni, coxendicæ doloribus, & coli vitiis, ut quæ bilem, pituitam & strigmenta, interdum

καρπὸς μικρὸς. ρίζα* ἀποδέλω παρὰ πλῆσια καὶ πρὸς τὸ ἄπυμα, στρογγυλωτέρα δὲ, μετὰ πῦ. φλοῖον ἔχουσα ἔξωθεν μέλανα, ἐνδθεν ὃ λευκόν. Ταύτης τὸ μὲν ἐνδθεν μέρος τὸ ρίζης λιφθὲν, δὲ ἐμείων ἀγὰ χολὴν καὶ φλέμα: τὸ δὲ πρὸς τῇ ρίζῃ καὶ τῷ καθαίρει: ὅλη δὲ λιφθεῖσα, ἀμφοτέρωταὶ καθαίρουσιν ἐν ἐὶ. ὅπου τὸ βελήθεις, καὶ πῇ ταὶ ρίζας, καὶ βαλὼν εἰς κρατῆρα ὕδατος συντάρασσιν, καὶ τὸ ἐφιστάμενον ὅπῃ πρῶτον ἀγαλῶν ἔξω αἶνε. τέττε τεία ἡμῶς ἡμα ποδένια, ἀνω καὶ κατω καθαίρουσιν.
Πρὶ κολοκυνθίδος. Κεφ. ροή. Κολοκυνθίς, οἱ ὃ, κολοκυνθα αἰγρὸς, οἱ δὲ, σικύαν πικράν, οἱ ὃ, κολοκυνθα ἀλεξανδρινή, κλημάλια καὶ φύλλα ἐσρωμενὰ ἐπὶ τῆς γῆς ἀνίστησιν, ὅμοια τοῖς τῆς ἡμέρας σικύς, ἐπεχρησμένα καρπὸν δὲ φειφεῖν, ὅμοιον σφαῖρα μέση, πικρὸν ἰσχυρὸς. ὃν δεῖ συνάγειν ἀρχόμενον μετεβάλλειν ἐπὶ τὸ ὠχρότερον. Δυνάμειν δὲ ἔχει ἢ μὲν ἐν τεινῶν καὶ καρπῷ καθαρτικῶν, τεβωλόκε πλῆθος μὲν ὕδρουμιλιτος λαμβανομένη συν νέρω καὶ σμέρην καὶ μέλιτι ἐφθῶ εἰς καταπόπον. αὐτὰ δὲ αἱ σφαῖραι ἐν ῥαὶ λεία, ὠφελίμως μύζωνται κλύσμασιν ἐπὶ ἰσχυρὰν καὶ παρὰ λυτικῶν, καὶ κωλικῶν, ἀρουσαι φλέμα καὶ χολὴν καὶ ξύσμα, ἔξ.

ἔσθ' ὅτε δὲ καὶ αἵματόδες ἔμ-
 βρυά τ' ἐκείνοις περιεσφίμεναι·
 ὁδονταλγίαι τε διάκλυσμα, ἐάν
 τις ἐκκαθάρας αὐτὴν καὶ πει-
 πλάσας πηλῷ, ἐναποζέσας τε ἐν
 5 ὄξει καὶ νίτρῳ, δυνάκελ' ἔσται·
 εἰ δέ τις ἐναφελήσας μελίκρα
 τοῖς καὶ γλυκὺ καὶ ἐξαιθριάσας
 δυνάσειν, καθαίρει πάχος καὶ
 ξύσμα· ἐστὶ δὲ κακοστόμαχος λί-
 αν· περιεσφίεται δὲ καὶ βάλανος
 10 ἐξ αὐτῆς, πρὸς κομιδῇ τῶν πε-
 ριπλωμάτων καὶ χλωρῆς δὲ αὐ-
 τῆς ὁ χυλὸς, ἐπὶ ἰσραδικῶν ἀνα-
 τειδόμενος ἀρμόζει.

Περὶ Ἐπιθύμης. Κεφ. ρθ'.

Ἐπιθύμων θυμου ὄξιν αἴδος
 15 τὸ σκληρότερον καὶ δύμβρα εἰκό-
 τος, ἔχει τὴν κεφαλὴν λεπτήν, καὶ φαι-
 κροαροῖς ἔχοντα ὡς τεύχας. Πι-
 νόμενον δὲ συν μέλιτι, κατὰ κα-
 θαίρει φλέγμα καὶ χολικὴν μέλαι-
 ναν, ἰδίως ἀρμόζον ἐπὶ μελαγχ-
 20 νικῶν καὶ ἐμπνεύματορμόων, ὁξύ-
 βίου πολλῶς πρὸς ὀκλήν < δ'.
 συν μέλιτι καὶ ἄσιν καὶ ὀλίγῳ ὄξει.
 γινώσκει δὲ πλεῖστον ἐν καππα-
 δοκίᾳ καὶ παμφυλίᾳ.

Περὶ Ἀλύπης. Κεφ. ρθ'.

Ἀλυπον φρυγανώδης ἐστὶ πόα, ὑ-
 25 πέρυθρος, *λεπτόκαρπος, λεπτόφυλ-
 λος· αἴδοις μαλακῇ καὶ κούφῃ με-
 σῇ, ὡς ῥίζα τεύτλης λεπτή. μεσὴ δ'
 ποῦ δειμέος· ὡς ἔμα ὡς ἐπιθύ-
 μου. γινώσκει τὴν ἐν τοῖς παρὰ
 θαλασσίῳις,

interdum etiam cruoré eliciāt:
 foetus admotē enecant: dentiū
 dolorem tollit, si vna repurge-
 tur & luto oblita cū aceto &
 nitro inferuescat, hocque iure
 decocti dentes colluantur: si
 aqua mulla aut passum in ea-
 dem incoquatur, & sub diuo
 refrigescat, potu crassum hu-
 morem & strigmenta alui de-
 trahet: stomacho supra modū
 aduersatur: subdita ex ea bala-
 no alui excreméta eiiciuntur.
 Virétis succo vtilissimè ischia-
 dici perfricantur.

Epithymū. Cap. CLXXIX.

Epithymon, flos est è thymo
 duriore, satureiē simili: capitula
 habet tenuia, & leuia, & in eis
 caudiculas, quasi capillaméta.
 Potum cum melle detrahit pi-
 tuitam bilémq; atram, per in-
 ferna. Priuatim prodest melā-
 cholicis, & inflatis, acetabuli
 mēfura, ad quatuor drachmas,
 cū melle, sale, & aceti exiguo.
 Plurimum in Cappadocia &
 Pamphylia gignitur.

Alypum. Cap. CLXXX.

Alypon furculosa herba est,
 subrubra: gracilibus ramulis:
 tenuibus foliis: flore molli, le-
 ui, & copioso: radice betæ, te-
 nuī, referta acri succo: femi-
 ne epithymi: gignitur in mari-
 timis,

DIOSCORIDIS

timis, maximè Libyæ, quam alibi quoque plurima prouenit. Semen atram bilem deicit, si mensura epitymo pari cum sale & aceto sumatur: verùm interanea leuiter exulcerat.

Empetrum seu calcifraga.

Cap. CLXXXI.

Empetron aliqui phacoides vocant, nascitur in montibus, & maritimis, falso gustu: sed quo propius terreno fuerit, amarius sentitur. Trahit bilem, pituitam, & aquâ si bibatur in iure aliquo, aut hydromelite.

Clematis. Cap. CLXXXII.

Clematis viticulosum emit tit ramulum, rubescenté. Lentum, folium gustu admodum acre ac exulcerans, repit per arbores, vt smilax, semen tritum, pituitam bilémque detrahit, in aqua, aut hydromelite potum. folia eius illita lepras purgant, cum lepidio conditur ad cibos.

Vitis syluestris.

Cap. CLXXXIII.

Vitis syluestris sarmenta vitis modo prælonga emittit, aspera, lignosa, rimoso cortice foliis hortensis folani, longioribus a clatioribus: muscoso flore, & capillaceo: fructu exiguis

θαλασσίοις, μάλιστα τοῖς τῆς λιβύης τόποις πλείστον, καὶ ἄλλοις δὲ χωρίοις πλείστη. Καθαίρει τὸ σπέρμα μέλαναν χολὴν καὶ πικρὰν ἀνόθυμον τὸ ἴσον πικρῆς καὶ ἁλῶν τῷ σπινθύνῳ καὶ ὄξει· τὰ δὲ ἔντερά ἐλαφρῶς ἥκῃ.

Περὶ Εμπετρῶν.

Κεφ. ρα΄.

Εμπετρον, οἱ δὲ, φακοειδές, ἐν παραλίαις καὶ ὄρεινοῖς φύεται, ἄλυκόν τῇ γεύσει· τὸ δὲ ἰσχυρότερον, πικρότερον. διδόμενον δὲ ἐν ζυμῷ ἢ ὑδρομέλει, καθαίρει φλέγμα καὶ χολὴν καὶ ὑδατώδη.

Περὶ Κληματίδος. Κεφ. ρβ΄.

*Κληματίτις κλήμα ἀγρίον ὑπέρυθρον, λυγρὸν δένδρον, φύλλον δριμύτιαν γευόμενον καὶ ἡκωπικόν· φειλίττει δὲ τοῖς δένδροις ὡς σμίλαξ. Ταύτης ὁ καρπὸς λεῖος ὑδατος ἢ ὑδρομέλιτος ποτεῖς, ἀγὴν καὶ πικρὸν φλέγμα καὶ χολὴν. τὰ φύλλα καταπλαθέντα, λεῖα ἀφίστησι· τὰ ἐκχέυεται ἢ μετὰ λεπιδίου εἰς βρογχίτιν.

Περὶ Ἀμπέλου ἀγρίας.

Κεφ. ργ΄.

*Ἀμπελος ἀγρία κλήματα ἀγρία μακρὰ, ὡς ἀμπέλου, ξυλώδη, τραχέα, φλοιορραγούσα, φύλλα δὲ ὅμοια σπύργῳ κηπίῳ, πλατύτερα δὲ καὶ μακρότερα· αἶθος ὡς βίχας βρυώδεις· καρπὸς δὲ βε

δὲ βοτρυδαῖς μικροῖς ὁμοιον, πε-
παιγμένον ἐρυθρόν. ὁμοφρεὲς δὲ
ἔστι τὸ γῆμα τῶν κόκκων. Ταύ-
της ἡ ρίζα ἀποζεδείσα ἐν οἴνῳ καὶ
μετ' ὕδατος πηρομένη τεταλασ-
σασμένη κινάδων β'. ὕδατος δὲ
καθαίρει· δίδεται δὲ καὶ ὕδρω-
πικοῖς. οἱ δὲ βόρυνες ἐφήλεις ἀπο-
καθαίρουσι καὶ πάντα σπύλον. τα-
ειχύνονται δὲ καὶ οἱ ταύτης ἀκρέ-
μονες ἀρπυγεῖς εἰς βρώσιν.

10 Πρὶ ἀμπέλου λευκῆς. Κεφ. ρπδ'.

Ἀμπέλος λευκή, ἢ βρυονίαν, οἱ
ἢ ὀφιοσάφυλον, οἱ δὲ χελιδόνιον, ἢ
μύλωθρον, ἢ ψίλωθρον, ἢ ἀρχέζω-
σιν, ἢ ἀρχεσιν, ἢ κέδρωσιν καλεῖται.
ταύτης τὰ κλήματα καὶ τὰ φύλλα
καὶ οἱ ἔλικες, ὅμοια τῇ ἡμέρῳ ἀμ-
πέλου, δασύτερα ἢ πάντα, καὶ ἐμ-
πλέκεται τοῖς παρεκκειμένοις δά-
μυροις ἐλλαμβανόμεναι τοῖς ἔλκεσι
καρπὸν δὲ ἔχει βοτρυδαῖδ', πυρ-
ρόν, ὥς ψιλοῦν τὰ δέρματα ταύ-

20 τῆς οἱ ἀπώρατοι καὶ τ' ὁρεότην
ἐκβλάσιν ἐφ' οἷς ἐδίονται ἔρητον
καὶ κοιλίαν κινουῦντες. Δυνάμει
δὲ ἔχει τὰ φύλλα καὶ ὁ καρπὸς καὶ
ἡ ρίζα δριμύτην. ὁθεν ἐπὶ τ' χει-
ρῶν καὶ γαγγραινικῶν καὶ φαρ-
μακικῶν καὶ σαρκηκῶν ἐλκῶν
μετ' αἵδος καὶ ἀπλάστωμα ποιεῖ.
ἡ δὲ ρίζα ζωτὰ ῥίπτει καὶ τετανοῖ
καὶ ἐφελειν ἀπακαθαίρει ἰόνθους, φα-
κὰς, οὐλὰς, μυχάνας σὺν ὁρόβῳ καὶ
γῆν χιὰ καὶ πῆλει καθεψυδαῖσα δὲ
μετ'

exiguis vuis similis, post matu-
ritatem rubente: rotunda est
acinorū facies. Feruefacta ra-
dix in aqua, & in cyathis duo-
bus vini aqua marina diluti, po-
ta, humorem alui ciet: idē hy-
dropicis datur. Vux eius, vitia
cutis in facie, & maculas om-
neis expurgant. Enascentes vi-
ticulæ, cibi gratia sale con-
diuntur.

Vitis alba. Cap. CLXXXIII.

Vitem albam aliqui bryo-
niam vocant. Foliis viticulis,
pampinisque, sativam vitem
imitatur, sed hirsutiora sunt om-
nia: ea quos prope se nacta
sit frutices, suis claviculis com-
plectitur: fructus rubens in
vua dependet, quo coria pilis
spoliantur. Ex ea asparagi, qui
prima germinatione exeunt,
decocti in cibo, aluum & v-
rinam ciet. Folia, fructus, ra-
dix, acrem vim sortiuntur: i-
taque ulcerum phagedænis,
gangrænis, chironiis, putren-
tium tibiæ tædio, efficaciter
ex sale illinuntur. Radix
corpus abstergit, & cutem e-
rugat: vitia cutis in facie, va-
ræque, lentigines, & cicatri-
ces nigras emendat, cum eruo,
creta Chia, & foenogrecæ. Eo-
dem effectū prodest decocta

in

DIOSCORIDIS

in oleo, vsque dum lique scat: fugillata tollit, & reduuias cōmittit: inflammationes discutit illita ex vino: suppuratio nes rumpit: medicamento aptē immiscetur, quod carnem ex est: infracta ossa extrahit, tri ta & imposita. Datur comi tialibus in potu drachmę pon dere, quotidie, anno toto. Pro dest attonitis, & vertigine la borantibus, confimiliter assum pta. Contra viperarum ictus pota drachmis duabus, auxilia tur: partus necat: mentem in terdū subturbat: foeminarū lo cis apposita, partus secundasq; morantes trahit: cit vrinam po ta. Eclegma ex ea fit cum mel le, difficile spirantibus strangu latu oppressis, tussietibus, vul fis, ruptis, & laterū doloribus. Lienem ternis. obolis pota ex aceto, triginta diebus, consu mit: illinitur ad eadem cum fi co. Ad muliebres infessus de coquitur: siquidem vuluas pur gat, sed abortum facit. Succus ē radice vere exprimitur, qui trahit pituitam, cum aqua mul sa potus. Ad psoras & lepras, semen efficaciter illinitur. La ctis abundantiam facit succus eius, si cum tritico decocto forbeatur.

μέλι' ἐλαίῳ μέγχι τακερωθῆν, πρὸς τὰ αὐτὸν ἀρμύζι' αἶρει ὃ καὶ ὑπό πια, καὶ πηρύγια τὰ ἐν δακτύλοις συσέλλει· σὺν δὲ οἶνῳ καταπλασ σομένη, διαφορεῖ φλεγμασ' καὶ ἀποσημαία ῥήσσει· ἀνὰ γὰρ ὃ καὶ ὄσα, ἡ κεία καταπλασσομένη, σηπταῖς τ' μύρου ὅπιτι δέειωσ'· πίνεται δὲ καὶ πρὸς ὀπληψίας ὀκλή α'. καθ' ἡμέραν πρὸς ἐν αὐτόν. ὠφθεῖ ἀπο πλῆκτοις καὶ στοματικὰς ὁμοίως λαμβανομένη. δυοῖν ὃ < ὀλ- 10 καὶ ποθεῖσα, ἐχροδύνκοις βοηθεῖ, καὶ ἔμβρυα φθεῖρει· ἔσποτα ῥά τῃ δι' ἐπίσπε τ' διαύοιαν· * καὶ ἔρα κινεῖ πνομένη, καὶ προσεδείσα ὑστέρα ἔμ βρυα καὶ δεύτερα ἐπισπάται. καὶ * ἐκλεικτον ὃ καὶ μέλιτος δι' αὐ- 11 τῆς τοῖς πνιφομένοις, καὶ δυσπνεύσι, καὶ βήασοισι· πλευράν τ' ἀγρῶσι καὶ ῥήγμασι, καὶ σπασμασι δίδεται. καὶ σπλῆνα τήκει τεινωδὸν ὀκλή ποθεῖσα σὺν ὅξει ἐπὶ ἡμέρας λ'. καὶ καταπλάσσει ὃ καὶ καὶ σὺν πρὸς 20 τὰ αὐτὰ χηνοῖ μωσ. ἀφέλεται δὲ καὶ εἰς ἐγκάσθημα καὶ δαρπικὸν ὑστέρα ὄν, καὶ ἐκβόλιον. χυλίζεῖ δὲ ἡ ῥίζα αὐτῆς ἔαρος· πίνεται ὃ σὺν μελικράτῳ ὃ χυλὸς πρὸς τὰ αὐτὰ ἄγων φλέγμα. ὃ ὃ καρπὸς ποιεῖ 25 πρὸς ψώρας καὶ λέπρας συγχρῖσμος καὶ καταπλαστέμενος. κατὰ σπῆν ὃ καὶ γάλα ὃ καρπὸς αὐτῆς χυλιδεῖς. καὶ μετὰ πυρῶν ἐν μένων βοφιδεῖς.

Περὶ Ἀμπέλης μελαίνης.

Κεφ. ρπῆ.

- Ἀμπέλος μέλαινα, οἱ δὲ βρυωνία μέλαινα, οἱ δὲ χειρῶν φον ἄμπέλον, φύλλα ἔχει κισσῶ ὅμοια, 5 μάλλον δὲ πρὸς τὰ ἴσμιλακος. καὶ οἱ χαυλοὶ, μείζονα δὲ * ταῦτα. ἑλλαμβαίνεται δὲ καὶ αὐτὴ τῷ δένδρων ἢ ἑλισί. καρπὸς βόρυθνης, χλωρὸς καὶ ἀρχῶ, πεπαισῆς ὃ μέλας γίγεται ῥίζα μέλαινα 10 καὶ ἔξωθεν, ἐνδοθεν δὲ πυξοειδής. Καὶ ταύτης οἱ χαυλοὶ κατὰ τὴν πρῶτον ἐκελάσθην λαχανεύονται· εἰς δὲ καὶ οὐρητικοὶ καὶ χαταμυλίων ἀγρωρί, τηκτικοὶ σπληνός, ὀπληπτικοὶ, καὶ σκοτωματικοί, καὶ παραλυτικοί ἀμύζουσι. ἔχει δὲ ἡ ῥίζα διῶαμιν ὁμοίαν τῇ λευκῇ πρὸς τὰ αὐτὰ ἀμύζουσαν, ἥ ἴσον μὲν τοι ἐνεργεῖ. περὶ δὲ πρὸς τοῦ τῶν ὑποζυγίων λόφους ἐπεδαν ἐλκώ- 20 θῶσι τὰ φύλλα σὺν οἴνῳ κατὰ πλαγύμην καὶ πρὸς σφέμματα ὁμοίως ἐπιτίθενται.

Περὶ Πτέρειδος. Κεφ. ρπς'.

- Πτέρεις, οἱ δὲ βλήχρον, οἱ δὲ πολὺ ῥίζον χαλοῦσι, φύλλα ὅσιν ἄ- 25 χαυλα, καὶ ἀνὰ δὴ, καὶ ἀκαρπα ἐξ ἐνὸς μόρου, πρὸς πῆχυν τὸ μέγεθος, ἐντεῖ μνημῶνα καὶ ἀνὴ πλωμῶνα ὡς πῆγυξ, ὑποδυσῶν ῥίζαν ὃ ἔχει ἐπιπλάσιον, μέλαιναν, ὑπομήκη, ἐμφύσεις ἔχουσαν πολλὰς, 30 ὑπο-

Vitis nigra.

Cap. CLXXXV.

Nigra vitis. quam aliqui nigram bryoniam vocant, folia fert hederæ, smilaceis proxima, sed maiora: caules etiam cognatos, capreolis suis arbores, quasi adminicula, comprehendit: fructus racematim coherant, qui inter principia virent, & post maturitatem nigrescunt: radix foris nigra, intus buxæ colore. Viticulæ quæ primo germinum partu erumpunt, in olera recipiuntur: menses pellunt, urinas cient, lienem absumunt, vertiginosis, comitialibus, nervorum resolutione tentatis, profunt. Radix eadem, quæ vitis alba præstat, sed inefficacius. Folia cum vino exulceratis iumentorum ceruicibus commodissimè illinuntur: luxatis itidem imponuntur.

Filix. Cap. CLXXXVI.

Filici folia sine caule, sine fructu, sine flore, ex vno pediculo, cubitali longitudine exeunt multifida, & lateribus pinnata, subgravi odore: radice per summa cespiti nigra, oblonga, filices multas fundente, subastrin-

DIOSCORIDIS

subastringēte gustu: nascitur in
mōtib; & saxosis. Radix latas
tineas excutit, sumpta drach-
mis quatuor ex aqua multa:
melius si cum scammonix aut
veratri nigri totidem obo-
lis detur: sed qui sumunt, al-
lia prægustare debent. Labo-
rantes lienis incremento re-
creat. Radix & potu & illitu
cum axungia vulneribus sagit-
ta arundinea factis, est auxilio:
cuius rei probatio talis fertur:
Peribit filix, quam per ambitū
fata copiosior arūdo coronet:
& contrā, euanescēs abibit a-
rundo, quam obsepiens multa
filix in orbem cinxerit.

Filix foemina.

Cap. CLXXXVII.

Filix foemina foliis est filicis,
furculosis, altioribusq; & quæ
non singulari, vt illa, pediculo
fulciantur: radicibus lōgis, plu-
ribus, obliquis, quæ ex nigro in
luteū flauescunt: aliquæ etiam-
num rubræ inueniuntur. Pel-
lunt lata interaneorum ani-
malia, cum melle, eclegmate
sumpto: potæ cū vino, drach-
mis tribus, teretes tineas eūci-
unt: datæ foeminis, sterilita-
tem faciunt, & prægredientibus
abortum, si supergrediantur.
Farina humidis vlceribus & cica-

ὑποσυφούσας τῇ γένει· φύεται
ἐν ὄρεινοῖς καὶ πετρῶδεσι τόποις.
Ταύτης ἡ ῥίζα ἑλμινδα πλατεῖ-
αν ἐκπνέουσι < δ'. ὅλην μετὰ
μελικράτου λαμβανόμεν· βέλ-
πον ᾗ εἰ μετὰ σκαμμωνίας ἢ ἐλ-
λεόρου μέλανος ὀβολῶν τετρά-
ρων δόσιν τίς. Δεῖ δὲ πρὸς σιροδο-
φαγεῖν τοὺς λαμβάνοντας. ποιεῖ
δὲ καὶ πρὸς ἀποκατάστασιν σπλη-
νιῶσι. καὶ μετὰ ἀξουργίου δὲ ἡ
ῥίζα ποθεῖται καὶ κατὰ πλάσσει-
σθαι, ποιεῖ πρὸς τοὺς ὑπὸ χαλκά-
μου πληγύτας· ἡ δὲ δοκιμὴ τοι-
αύτη. ἔνθα ὅστις πολὺ χέλαμος καὶ
πολὺ βλάχρον, τεφρώσων. ἀφα-
νίζεται τὸ βλάχρον.

Περὶ Θηλυπτείδος.

Κεφ. ρηζ'.

Θηλυπτεῖς, οἱ δὲ νυμφαῖαν
πτεῖν ὀνομάζουσι, τὰ μὲν φύλλα
πτεῖει δὲ ὁμοία, οὐ μονόμορα ᾗ ὡς
τὰ ἐκείνης, ἀλλὰ πολλὰς ἔχοντα
ἀποφύσεις καὶ ὑψηλότερας ῥίζας ᾗ
ὑπὲρ μακρὰ, πλαγεῖαι, πλείεις,
ὑποξανθοὶ ἐν τῷ μέλανι· τινὲς δὲ
ἐρυθραί. Καὶ αὗται δὲ (ὡς) μέλι-
τι ἐν ἐκλεκτῷ λαμβανόμεναι,
πλατεῖαν ἑλμινδα ἐκβάλλουσι.
συν οἶνω δὲ πνόμεναι, < γ' πλῆ-
θος στρογγύλιον ἐκπνέουσι ἐλ-
μινδα· γυναιξὶ δὲ ποθεῖται, ἀ-
σπληνίαν ποιεῖσι, καὶ ἔγκυος δὲ
διαβῆναι ἐκτιτρώσκει. ξηραὶ δὲ ἐπὶ
τῷ δυσαισθητῶν καὶ χολύχων ἐλκῶν
ἐπι-

ἐπιπλάσσονται· λόφοις τὲ ὑπο-
ζυγίων ἰσθύνται. τὰ δὲ φύλλα αὐ-
τῆς ἀρ' ἴβλαστα λαχαρεύει· ἐφ' ὧ δὲ
βιβρωσκόμῳ, καὶ κοιλίαν μα-
λάσουσιν.

Πεὶ Πολυποδίου.

Κεφ. ρπθ'.

Πολυπόδιον φυτόν ἐστι πέτραις
βρύα ἐχούσαις καὶ ἐν τοῖς ἀγρίοις
πορέμοις τοῖς ἐπὶ τῷ δρυῶν, σπι-
δαμῆς ἔχουσα τὸ ὕψος, ὁμοίον τῇ
10 πῖρειδι, ὑπόδαυ, τετμημένον,
οὐ μὴν οὐτω λεπτομερές· ῥίζα δ'
ὑπερὶ δασεῖα, πελεκταῖας ὥστε
ρεῖ πολὺ πῦς ἔχουσα, πάχος μικρὸν
δακτύλου, ξυδεῖσα δὲ ἐνδοθεν,
χλωρὰ, σφυγνὴ, τῇ δὲ γένουσι ὑπό-
15 γλυκος. Διῶαμιν ἔχουσα καὶ θαρ-
πικὴν· δίδεται δὲ συγκαταφορμὴν
ἔρνιδι, ἢ ἰχθύσι, ἢ στυτλῶ, ἢ μα-
λάχῃ πρὸς καὶ θαρσύνει. ξηρὰ δὲ ἐ-
πιπασσομένη ἐν μελικράτῳ, ἄγει
φλέγμα καὶ χολήν. πίνει καὶ πρὸς
20 σπέρματι, ἢ ῥίζα λεῖα καὶ ταπλεσ-
σομένη, καὶ πρὸς ῥαγάδας ταῖς ἐν
μεσοδακτύλοις.

Πρὶ δρυοπτείδος. Κεφ. ρπθ'.

Δρυοπτερίς φυτόν ἐστι τὰ βρυώ-
δι μέρη τῶν παλαιῶν δρυῶν, ὁμοία
25 πῖρειδι ἐλάτῳ, ὃ πολλὴν τῇ ῥι-
σει ῥίζας ὃ ἔχει κατ' ἐπιπλοκὴν
δασεῖας, σφυγὰς καὶ τὴν γένουσι, ἐν
τῷ γλυκεῖ ῥέπουσα. Αὕτη ἐπι-
πλαθεῖσα λεῖα σὺν ταῖς ῥίζαις,
τείχας ψιλοῖ· δεῖ δὲ ἀποψαῖν το-
πρῶτον

cicatrici repugnātibz inspar-
gitur: iumentorū ceruibus me-
detur. Folia recentia, in oleri-
bus cocta manduntur, vt ven-
trem emolliant.

Filicula, siue polypodiū.

Cap. CLXXXVIII.

Filicula nascitur in muscosis
petris, & vetustis arborū cau-
dicibus, præsertim quercuum,
palmi altitudine, filici similis,
subhirsuta, non tenui perinde
diuisura: radix pilosa, in qua
continentur cirri, ceu poly-
porum, crassitudine digiti mi-
nimi, coloris intus herbacei,
austera aliquantum, & gustu
subdulcis. purgandi vim habet:
coquitur cum gallina, aut pi-
scibus, aut beta, aut malua, ad
aluum soluendam. Arida fa-
rina aquæ mulsæ insparfa, de-
trahit bilem & pituitam: trita
luxatis efficaciter illinitur, &
aduersus rimas quæ inter digi-
tos fiunt.

Dryopteris. Ca. CLXXXIX.

Dryopteris nascitur in ve-
terum roborum musco, filici
similis, multo minore folio-
rum incisura: radicibus inuicē
implēxis, hirsutis, gustu acer-
bis, in dulcedinem vergenti-
bus. Psilothrum est cum radi-
cibus trita: illinitur enim pri-
mum

mum usque dum sudorem euo-
cet, mox sudor abluatur, & re-
cens imponitur.

Cnicus. Cap. C X C.

Cnicus foliis constat oblon-
gis, per ambitū diuifis, asperis,
spinosis: caule sesquipedali: ca-
pitulo magnitudine grādis o-
liuæ: flore croci: semine candi-
do, alioqui rufo, lōgo, angulo-
fo. Huius flore in obsoniis vtū-
tur. Seminis tusi & expressi suc-
cus, cū aqua mulsā, vel iure gal-
linacei aluū purgat, sed stoma-
cho aduersatur. Ex eo autē fiūt
offulx, quas placentulas vocāt,
adiectis succo amygdalis, ni-
tro, aniso, & melle decocto,
quæ aluū emolliunt. Hæ in par-
tes quatuor finduntur, quæ nu-
cis iuglandis magnitudinē im-
pleant: ē quibus ante coenam
duas vel tres sumpsisse satis est.
Ratio temperādi hæc est: Cni-
ci candidi sextarius, amygda-
lorum tostorum & delibrato-
rum cyathi tres, anisi sextarius
vnus, aphronitri drachma vna,
cum carnibus triginta carica-
rum. Seminis succus lac cogit,
& magis ipsum resoluēdæ alui
facultate donat.

Mercurialis. Cap. C X C I.

Lynozostis, aliqui partheniō;
alij hermūbotanion appellāt:
foliis

πρεσβύτον μετὰ τὸ ἱκμάσαι τὸν
χρῶτα καὶ νεαρὴν ἐπιπλάσσειν.

Περὶ κνίκου.

Κεφ. ρς'.

Κνίκος φύλλα ἔχει ἐπιμήκη,
ἐντετμημένα, τραχέα, ἀκα-
τάδη· καυλοὺς δὲ πηχαίους ἐφ'
ῶν κεφαλῇ κατὰ μέγεθος θαλ-
λίας· αὐτὸς κρόκω ὁμοίον· σπέρ-
μα λευκὸν καὶ πυρρὸν, ἐπίμη-
κες, γωνιωδύρον. Τούτῳ τῷ
αὐτὲι χρῶνται εἰς τὰ πρεσο-
ψήματα. τὸ σπέρμα κοπτόμε-
νον καὶ χυλιζόμενον (ὡς ὑδρ-
μέλιτι ἢ ζωμῷ ὀρνίθου, κοιλίαν
καθαίρει, κακασόμαχον δὲ ὄστ-
ρίνεται δὲ καὶ κοπίαει κοιλί-
ας μαλακτικὰ, τοῦ ὁποῦ αὐτοῦ 15
μυηλὸς ἀμυγδαλῶ καὶ νίτρω,
καὶ ἀνίσου, καὶ μέλιτι ἐφθῶ. δεῖ
δὲ πρὸ δείπνου λαμβάνειν εἰς
δ'. διελόντα, ὡς βασιλικῷ κα-
ρύου μέγεθος β'. ἢ γ'. σκευάζειν
δὲ τὸν τρόπον τοῦτον δεῖ. κή- 20
κε λευκοῦ ξέσσην α'.* θαλασσίων πε-
φωγμένων καὶ λελεπυσμένων κυά-
θους τρεῖς ἀνίσου ξέσσην ἓνα, ἀ-
φρονίτρου < α'. ἰχθῶν τῆς σαπ-
κὸς ἀριθμῷ λ'. πύσσει δὲ καὶ γά-
λα ὁ χυλὸς τοῦ σπέρματος, καὶ 25
λυπκώτερον ποιεῖ.

Περὶ λινοζώσεως.

Κεφ. ρςά.

Λινοζώσις, οἱ δὲ παρθένιον;
οἱ δὲ ἑρμού βοτάνην καλοῦσι·
ἔχει

ἔχει τὰ φύλλα ὅμοια ὠκύμῳ
 πρὸς τὰ τῆς ἐλείνης, ἐλάπινα
 δὲ κλωνία διγνάντα, μαχα-
 λας πολλὰς, πυκνὰς ἔχοντα· τὸν
 δὲ καρπὸν, ἢ μὲρ θήλεια βορβο-
 5 ρῶν καὶ πλῆμ· ὁ δὲ ἄρρεν, πρὸς
 τοῖς πετάλοις μικρὸν, στρογγύλον
 ὡς ὅτ' ὀρχήδιᾳ καὶ τὰ δύο προσκεί-
 μῃνα· ὅλος δὲ ὁ θαμνίσκος ἀπὸ
 θαμνιάων ἢ καὶ μείζων. Κινουσι
 δ' ἀμφοτέρω κοιλίαν λαχανεύο-
 10 μῃνα καὶ ἐπιόμῃνα· καθεξέ-
 μῃνα δὲ ἐν ὕδατι καὶ πινόμῃνου
 τοῦ ὕδατος, ἄγρως χολῶν καὶ ὕ-
 δατώδη. δοκεῖ δὲ τὰ μὲν τῆς θή-
 λείας φύλλα λεῖα πινόμῃνα καὶ
 πρὸς τὴν ἐμῃνα μετὰ τὴν καθεξ-
 15 ὄν τοῖς ἀνδρῶσι, σύλληψιν θήλε-
 ως πιεῖσθαι, τὰ δὲ τοῦ ἄρρενος
 ὁμοίως ἐπιτηδεύοντα ἄρρενοζώ-
 ῃ γίνεσθαι.

Περὶ Κυνόκράμβης.

Κεφ. ρςβ.

20 Κυνία ἢ κυνοκράμβη, οἱ δὲ, λι-
 νόζωσις ἀγρία ἄρρεν, χαυλίων ἀ-
 νήσις διὰ θαμνιάων, τριφερὲν, ὕ-
 πτελευκόν· φύλλα ἐμφερῆ κινόζω-
 σιδι ἢ κισσῶ, ὑπτελευκὰ ἐκ διαση-
 μάτων· τὸν δὲ καρπὸν πρὸς τοῖς
 25 πετάλοις προσκείμενον μικρὸν,
 στρογγύλον. Δυσάμην δὲ ἔχει ὁ
 χαυλοῦς καὶ τὰ φύλλα πινόμῃνα,
 κοιλίας κεντηκῆν, λαχανεύομῃνα.
 καθεξέμῃνων δὲ, τὸ ὕδωρ ἄγει
 χολῶν καὶ ὕδατώδη.

Πρὶ Ἡλίου

foliis constat ocymi, helxinæ
 cognatis, sed minoribus: ramu-
 lis duplici geniculorum nodo
 cinctis, alarū cavis multis: fru-
 ctu foeminæ, copioso, quan-
 dam racemorum speciem præ-
 bente: mari, è foliorum sinu
 dependente, paruo, rotundo,
 ceu binis testiculis vñà cohæ-
 rentibus: frutice dodrātali aut
 maiore. Vtraque in oleribus
 manditur, ad aluum cfendam:
 cocta in aqua, epoto iure, bi-
 lemi aquámque detrahit. Con-
 stat vt mares gignantur, hunc
 facere: vt foeminæ, illam, si
 à purgatione bibantur,

& trita folia geni-
 talibus admo-
 ueantur.

Cynocrambe.

Cap. CXCII.

CYNIA aut cynocrām-
 be, cauliculus binūm dodran-
 tum altitudine emittit, mol-
 lem, subalbidum: folia mera-
 curiali aut hederæ similia, cer-
 tis interstitiis subalbida: semen
 foliis adhæret, paruum, rotun-
 dum. Folia cum caulibus po-
 ta, aluum cient: oleribus com-
 mendantur. Ius decocti & pi-
 tuitam & bilem aquámq; de-
 trahit.

Κ Ηλίου

DIOSCORIDIS

Heliotropium magnum.

Cap. CXCIIL

Heliotropio magno flos est effigie scorpionis caudæ, unde scorpuiro ei nomen: & quoniam folia cum sole circumagat, heliotropion dicitur. Folia ocymi habet, hirsutiora, candidiora, & maiora: ramuli à radice terni, quaterni, aut sæpe quini exiliunt, multis alis concaui: flos in cacumine candidus, aut subfulvus incuruatur ut scorpionis cauda: radix tenuis est, & inutilis: nascitur in asperis. Decoctum herbæ ex aqua, fasciculo manus plenæ, potu pituitam bilémque per aluum extrahit: contra scorpionum ictus ex vino potum, & illitum prodest: adalligatur ad conceptus arcendos. Aiunt per horam unam ante accessiones, seminis grana quatuor cum vino quartanas finire: tria vero, tertianas. Illitum semen formicantes verrucas pensilefque, & thymos, & epinyctidas exiccat. Folia infantium destillationibus, quas syriaseis vocant, podagris, luxatisque utilissimè illinuntur: menses ciunt: partus trita & imposita pellunt.

Heliotro-

Πρὶ Ἡλιοβοπίου ἡ μεγάλη.

Κεφ. ρςγ.

Ἡλιοτρόπιον τὸ μέγα, ὃ ἔγιος ἐκάλουν σκορπίουρον ἀπὸ τοῦ ὡς τὸ αὐτοῦ σχήματος, ἡλιοτρόπιον δὲ ἀπὸ τοῦ συμπεριτρέπεσθαι τὰ φύλλα τῇ τοῦ ἡλίου κλίσει. ἔχει δὲ τὰ φύλλα ὡκύμα παρὰ πλῆστα, διὰ σύτερα δὲ καὶ * μελαντέρα, καὶ μείζονα· κλωνία ἀπὸ τῆς ῥίζης ὅσον γ'. ἢ δ'. ἢ ε'. καὶ ἐν τούτων μαρῶδες παλαιοῖς· ἐπ' ἀκρων δὲ αὐτοῦ λευκόν, ὑπόπυρρον, ὀπκιμύδες, καὶ δάκτυλιν σκορπίου οὐρά· ῥίζα δὲ λεπτή, καὶ ἀχρυσός· φύεται ἐν τραχέσι τοῖσι. Τοῦτου ὅσον δέσμη ἀφευδῆσαι μετ' ὕδατος καὶ ποτίσαι, ἄγει φλέγμα καὶ χολικὸν καὶ κοιλίας· ἀρμόζει δὲ καὶ σκορπιόπληκτοις μετὰ οἴνου πινομένη καὶ καταπλασσομένη· πρὸς ἀτόκιον δὲ πεινᾷται. Φασὶ δὲ πρὸς μίαν ὥραν τῆς ὀπσημασίας, τοῦ καρποῦ δ'· κόκκοις μετ' οἴνου ποθέντας, τετρατάτοις καταπαύειν· πεντάτοις δὲ τρεῖς. καταπλασσομένης δὲ ὁ καρπός, μυρμηκίας καὶ ἀκροχορδόνας καὶ δύμοις καὶ ἐπινυκτίδας ξηραίνει. τὰ δὲ φύλλα ποδάγρας καὶ σπέρμασι καὶ σιελῶσι παιδίοις ὀππλάττεται ὡφελίμως· κινεῖ δὲ καὶ ἐμμύα, καὶ ἐμβρυά ἄγει λεία πρὸς τέντα.

Πατ

Πρὶς Ἡλιοτρόπιον τὸ μικρὸν φύεται.

Κεφ. ρςδ'.

Ἡλιοτρόπιον τὸ μικρὸν φύεται
ἐν τελευτάτωδεσι τόποις καὶ πα-
ρὰ λίμναις, ἔχον φύλλα παρα-
πλήσια τῷ περὶ τὸν ἡλίου, στρο-
γυλώτερα δὲ ἡ καρπὸν στρογγύλον
ἀποκρεμάμενον ὡς ἀκροχορδὴ-
νας. Διῶνται δὲ ἢ πῶς μετὰ τῷ
καρποῦ πιγμύνη σὺν νίτρω ἢ ὕσ-
σωπῳ ἢ καρδάμῳ ἢ ὕδατι, ἔλ-
10 μιν δὲ πλάττειν ἢ στρογγύλην ἐκ-
πινάσκειν· αἰεὶ δ' ἢ ἀκροχορδὴνας
ζωὰς ἀλλοτὶ καταπλάσσειν.

Πρὶς Σκορπιοειδὲς. Κεφ. ρςε'.

Σκορπιοειδὲς βοτάνιον φύλλα
ἔχον ὀλίγα καὶ σπέρματα, οὐραῖς
15 σκορπίου ἐμφερῆ. βοηθεῖ δὲ κα-
ταπλάσσειν σκορπιοπλήκτοις
ἐκράως.

Heliotropium paruum.

Cap. CXCIIL.

Heliotropion paruum, na-
fcitur in palustribus, iuxta la-
cus, foliis antedicto proximis,
rotundioribus: semine, acro-
chordonum verrucarum mo-
do, pensili, rotundo. Herba
cum suo semine pota, adiecto
nitro, hyssopo, nasturtio, &
aqua, latas tineas teretēsq; ex-
cutit. Pensiles verrucas, quæ
acrochordones vocātur, cum
sale illita tollit.

Scorpioides. Cap. CXCV.

Scorpioides herbula est, fo-
liis paucis, semine caudæ scorp-
ionis effigie. Illita scorpio-
num ictibus præsentaneo est
auxilio:

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙ-
ΒΛΙΟΥ ΤΕ-
ΤΑΡΤΟΥ.

QUARTI LIBRI
FINIS.

ΠΕΔΑΚΙΟΥ

PEDANII

PEDANII Π Ε Δ Α -

DIOSCORIDIS

Anazarbei de medicinali ma-
teria Liber quintus.

Io. Ruellio Sueſſionēſi interprete.

ΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙ-

ΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕ-
ΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙ-
ΩΝ ΠΕΜΠΤΟΝ.



VPERIO-
ribus quatuor
libris, amicissi-
me Aree, tra-
didimus de a-
romatibus, o-

leis, vnguentis, & earundem
lachrymis ac fructibus: item
animalibus, melle, lacte, adipe,
cerealibus, oleribus, necnō
de omni radicum, herbarum,
succorum, seminumque ratio-
ne. In hoc autem totius operis
quinto differemus de vinis &
metallicis, à vite nostram com-
mentationem auspicati.

Vitis vinifera.

Cap. I.

Folia vitium & triti capreo-
li, capitis dolores illitu mitigāt,
& inflammationem stomachi
ardoremque, cum polenta fo-
lia etiam per se, vt quæ refrige-
rent & adstringant, imponi so-
lent. Potus eorū succus dysen-
tericis, sanguinē excreantibus,
stoma-



ΠΟΔΟΝ-

1ες ἐν τοῖς πει-
ρασθεῖσι τέτρα-
σι βιβλίοις φησὶ 10
ταῦτ' ἀρθεῖν τὸ
εἰς ἀρώματων

καὶ ἡαίων καὶ μύρων καὶ δένδρων, καὶ
τῶν ἐξ αὐτῶν καρπῶν τε καὶ δακρύων·
ἐπὶ τῇ ζώῳ καὶ μέγιστος ἡγάλακτος
καὶ σπῆλαιων καὶ τῶν καλαμῶν σπη- 15
ραίων καὶ λαχαίων καὶ τὸν σύμπαντα
πρὸς ῥιζῶν καὶ βοτανῶν καὶ χυλισμά-
των, καὶ σπασμάτων λόγον. ἐν τῇ πε-
τελευταίῳ ὑπάρχοντι τῷ ὅλῳ πρὸς
μαλίστας. διὰ τὴν ἐξόμθεα πρὸς οἴνων καὶ
τῶν καλῶν μελῶν ἀμικτῶν ἀρξάμενοι 20
ἀπὸ τῶν πρὸς ἀμπελὸς παραδόσεως.

Πρὶ Ἀμπελὸς οἰνοφόρος.

Κεφ. α.

Ἀμπελὸς οἰνοφόρος τὰ φύλλα καὶ
αἱ ἥλικες λείπαι καταπλασθεῖσθαι
κεφαλῆς καὶ πρὸς ἀνέμοις, φλεμονήν 25
τῇ σωματικῇ καὶ καὶ σὺν ἀνέμοις
καὶ καθ' ἑαυτὰ ἐπιτίθεμενα τὰ φύ-
λλα ψυκτικὰ καὶ συπτικὰ ὄντα. καὶ ὁ
ἐξ αὐτῶν δὲ χυλὸς ποδὲς ὡφε-
λεῖ δυσεντερικοὺς καὶ αἱμοποιοικοὺς
καὶ

- καὶ στομαχικοὺς καὶ κοστώσις. ἀ-
ποβραχῆται δὲ καὶ αἱ ἑλίκες
ἐν ὕδατι καὶ ποδεῖται, τὰ αὐτὰ
ποιοῦσι τὸ δὲ δάκρυον αὐτῆς ὁ-
μιον ὃν κόμει, πεποιηγυμνον
5 τοῖς σελέχεσι, λίθοις ἐκπινάσει
πινόμνον σὺν οἴνῳ· ἴαται δὲ καὶ
λειχῶας καὶ ψόρας καὶ λέπρας
καταχρῖόμενον, δεῖ δὲ περιεπι-
τροῦν τὸν τόπον· σὺν ἑκαίῳ δὲ
ἐγχρῖόμενον σινεχῶς, ψιλοὶ τὰς
10 τείχας, καὶ μάλιστ' ὁ ἀπὸ τῆς χλω-
ροῦ κηλομένης κλημάτος ἀφιδρέ-
μενος ἰχθῶς· ὅς καὶ μυρμηκίας ἐπι-
χρῖόμενος ἐκβάλλει· ἢ δὲ ἐν τῶν
κλημάτων καὶ σεμφύλων τέφρα,
τὰ περὶ δακτύλιον ἀφαιρεθέντα
15 κονδυλώματα καὶ θύμια, (σὺν
ὄξει καταπλαθεῖσα θεραπεύει,
καὶ σρέμματα, καὶ ἐχιδνικοὺς
ὠφελεῖ, καὶ σπληνὸς φλεγμονὰς
(σὺν ῥοδίῳ καὶ πιγανῳ καὶ ὄξει
καταπλασσομένη.
- 20 Πρὶ Ἀμπέλης ἀγείας. Κεφ. β'.
Ἀμπελος ἀγεία διττή, ἢ μὲν γὰρ
αὐτῆς οὐ περιχάζει τὴν σαφυλὴν,
ἀλλ' αὐτῆς αὐθιγῶς ἀγεί τὴν λε-
γομένην οἰανῶν. ἢ δὲ τις τελε-
σφορεῖ μικρόρραξ οὔσα, καὶ μέλαι-
να, καὶ συπικνῇ. Διῶσιν δὲ ἔχει
25 ταύτης τὰ φύλλα καὶ αἱ ἑλίκες καὶ
οἱ κλωνοὶ ὁμοίως τῇ ἡμέρῳ.
- Περὶ Σταφυλῆς. Κεφ. γ'.
Σταφυλή, ἢ μὲν πρὸς φά-
τος πᾶσα ἐκταράσσει κοιλίαν
καὶ ἐμ-

stomachicis, & gravidarum
malaciæ medetur. Eadem effi-
ciunt madefacti in aqua ca-
preoli & poti. Lachryma vi-
tium, quæ veluti gummi in cau-
dibus concrefcit, ex vino po-
ta calculos pellit: illita lichenas
& psoras lepræque nitro prius
perfrictas sanat: eadem cū o-
leo sæpius pilis illitis, psilothri
effectum habet: maximè que
fanies, quam accensa farmen-
ta vitium viridia exudarunt:
qua & perunctæ verrucarum
informicationes extrahuntur.
Cinis farmentorum & vina-
ceorum, detractis in sede con-
dylomatis, & thymiis, illitus
ex aceto medetur: prodest lu-
xatis & viperarum morsibus:
contra lienis inflammationem
illinitur, cum rosaceo & ruta
& aceto.

Labrusca. Cap. II.

Labrusca duorum generum
est: alterius vua non mature-
scit, sed flore tenuis cœnanthen
nominatam perducit. Altera
ad frugem pervenit, parvis a-
cinis, nigra, & adstringens.
Folia, caules, & clauiculæ qui-
bus repunt, vim habent cultæ
viti similem.

Vua. Cap. III.

Vuæ recentes aluū turbant,

DIOSCORIDIS

& stomachum inflant : innocentiores, quæ decerptæ diu pependere, (ideo quod in eis copia humoris exiccatur) vtilisq; fuit stomacho, ægrisque, atque cibi aviditatem excitât. In vinaceis & ollis servatæ, ori & stomacho gratæ sunt: aluum sistunt (sed vesicam & caput tentant) & sanguinem excreantibus conueniunt. Similesque, quæ in musto fuerunt. Sapa aut passo conditæ, stomachum magis infestant. At quæ solem prius passæ in aqua coelesti conduntur, minus vinosæ sunt, siticulosis, ardentibus & longis febribus salubres. Reconditi vinacei inflammatis mammis, rigentibus ac præduris, cum sale illinuntur: decoctura eorum dysentericos, coeliacos, & foeminas fluxione vulvæ laborantes iuvat infusa: ad defeciones, ac fetus assumitur. Nuclei acinorû adstringendi vim obtinêt, stomacho vtilis sunt: inspargitur farina tostorû, polentæ modo, dysentericis, & coeliacis, & solutis stomacho.

Vua passa alba.

Cap. IIII.

Vua passa alba adstringetior est:

καὶ ἐμπνευματοῖ σόμαχον· ἡ δὲ ἐπὶ χρόνον πνὰ χρεμαδεῖται, ὁλὶ γον μετέχει τούτων (διὰ τὸ πολὺ τῆς ἰκμάδος ἀνέξηραίνθαι) εὐσόμαχος τε ὅτι καὶ ὀρέξεως αἰσθητικῇ, καὶ ἐπιτήδειος πρὸς τὸν ἀδενουῶτα. αἱ δὲ ἐν τῶν σεμφύλων καὶ ἐν τῶν βυκῶν, εὖσε μοι, εὐσόμαχοι κοιλίας ἐφεκτικαί (κύσεως δὲ καὶ κεφαλῆς ἀπὸνται) ἀρμόζουσι δὲ καὶ αἰμοπτοικοῖς. ὁμοίαι δὲ εἰσι καὶ αἱ εἰς τὸ γλεύκος ἐμβεβημέναι. αἱ δὲ ἐν τῇ ἐλῆματος καὶ γλυκέως κακοσομαχότεραι. ζυμίζονται δὲ καὶ μετ' ὀμβρίου ὕδατος πρὸς σφιδαίνουσαι, γίνονται δὲ αἱ ταιαῦται ἐπὶ ὀλίγον οἰνώδεις, διψώδεις δὲ καὶ ἡμισώδεις καὶ χρονοῖς πυρετοῖς χρήσιμοι. τὸ δὲ σέμφυλον αὐτῶν ἀποτιθέν, καταπλάττεται μετ' ἄλων πρὸς φλεγμονὰς καὶ σκληρίας καὶ σπάργωσιν μαστῶν τὸ δὲ ἀφέψημα τῶν σεμφύλων, δυσεν- εικοῖς καὶ κοιλιακοῖς καὶ ῥοιχὰς ὠφελεῖ ἐνέμεινον· καὶ εἰς ἐκταδίματα καὶ προσκλύσματα λαμβάνεται. Τὰ δ' ἐξ αὐτῶν γήρατα συπικνὰ, εὐσόμαχα· φρυγῆτα δὲ καὶ αὐτὰ ἀλφίτου ἐπιπλοσόμενα καὶ λεῖα, ἀρμόζει δυσεντερικοῖς, καὶ κοιλιακοῖς καὶ τοῖς τὸν σόμαχον ἀναλευμενοῖς.

Περὶ Σταφίδος. Κεφ. δ'.

Τῆς δ' σταφίδος συπικωτέρα ἐστὶν ἡ λευκή.

ἢ λευκή· ὁφθαλμοὶ δὲ καὶ ἡ σὰρξ αὐ-
τῶν ἐδιοικῶν ἀπ' αἵματος καὶ βίχας
καὶ νεφροὺς καὶ κύστιν καὶ δυσεντερίαν
συνὸ τοῖς γράφοις ἐδιοικῶν καὶ
ἐαυτῶν· μαγεία δὲ ἀλεύρου κε-
2 γρίνου καὶ κριθίνου καὶ ὄψου, καὶ τη-
ραθεῖσα μετὰ μέλιτος καὶ λαμ-
βανομένη, εἰς τὴν ἀποφλεγμα-
τισμοὺς καὶ ἐαυτῶν καὶ συνὸ πε-
πτερί μαλακῶν ἐνδετέ. διδύ-
μων τὴν φλεγμοναὶ παύει, κατα-
πλαθεῖσα μετὰ ἀλεύρου κυαμίνου,
καὶ κυμίνου. Ἐπινυκτίδα δὲ καὶ
ἀνδρακας καὶ κνέια καὶ τὰς πε-
πτερί σιμπεδνάδας καὶ γαγγράνας,
χρυσὸς γράφων ἰᾶται λεία συνὸ
τηγαύου ἐπιπιδεμένη· πρὸς τὴν πο-
25 δάγραν ἀμύζει μετὰ τῷ ὀποπά-
νακος καταπλασσομένη· καὶ ὄνυ-
χας ὅτι δάπνον ἀφίστησι σαλευθέν-
τας ἐπιπλαθεῖσα.

Περὶ οἰνάνθης. Κεφ. εἰ.

Οἰνάνθη καλεῖται ὁ τῆς ἀγρίας
20 ἀμπέλης κερπὸς, ὁπότε ἀνθεῖ. ἀ-
ποτίθεται δὲ δεῖ εἰς ἀκόνιτον
ἀγρίον ὁσράκιον, συλλέγοντας
καὶ ξηραίνοντας ἐπὶ ὀδονίου, ἐν
σκιά, καλλίστη δὲ γίνεται ἐν συ-
είᾳ καὶ κιλικίᾳ καὶ φοινίκῃ. Δύ-
25 ναμὸς δὲ αὐτῆς συπικνὸς ὁδὸν πι-
νομένη ἐν σόμαχος καὶ οὐρητικῷ
κοιλίαν ἐφισώσα καὶ αἵματος πύ-
σιν ἐνερθε δὲ καταπλαθεῖσα, καὶ
πρὸς ἀσπιδὶ καὶ ὀξύγοντα σόμα-
χον ποιεῖ· ἐστὶ δὲ καὶ κεφαλδαγίας
ἐμ-

est: prodest esitata caro earum
tusi, faucibus, renibus ac ve-
fica. Estur in dysenteria per se
cum nucleis: & decocta in pa-
tinis cum melle, admista milij
ac hordei farina & ouo, va-
let ad purgandum caput: eius-
demq; gratia cum pipere com-
manducatur. Testium inflam-
mationes sedat, illita cum lo-
mento fabarum, aut cum inifa-
rina. Fauos, epinyctidas, car-
bunculos, enatas in articulis
putredines, & gangrænas, si-
ne nucleis trita, & cum ru-
ta imposita sanat: podagræ
conuenienter cū pana-
cis succo illinuntur:
mobiles vngues
illita celerius
extrahit.

Oenanthe. Cap. V.

Oenanthe vocatur vitis syl-
uestris fructus, cum floret. Re-
condi debet fictili non pica-
to, collectaque substrato lin-
teo, in vmbra siccatur. Lau-
datissima in Syria & Cilicia
& Phœnice. Vis ei adstricto-
ria: quare pota stomacho ac
ciundæ vrinæ utilis: aluum fi-
stet, ac sanguinis excreatio-
nes: contra fastidia, & aco-
rem stomachi, sicca & illita
efficax est: capitis doloribus

K iij tam

DIOSCORIDIS

tam viridis, quàm sicca: ex aceto & rosaceo perfunditur: sanguolenta vulnera cataplasmate, & incipientes ægilopas, oris ulcera, & genitalium nomas, trita cum melle, croco, myrrha, & rosaceo, ab inflammatione vindicat: pefsis miscetur, ad sistendum sanguinem: contra oculorum delachrymationem, & stomachi ardores, cum pollinæ polentæ & vino illinitur. Cinis crematæ in testa, candentibus prunis, facit ad oculorum medicamentum: reduvias & pterygia, abscedentes gingivas, cruentasque, cum melle sanat:

Omphacium. Cap. VI.

Omphacion, succus est acerbæ vuæ, nondû maturefcentis, è Thasia vite aut Aminæa. Oportet auté ante Canis ortum, expressam melliginé in rubro ære, linteo cooperto, insolare, vsq; dum cogatur, semperque quod ceruici vasis cōcretû hæsit, reliquo humori permiscere: noctûq; à subdialibus locis in lectû referre: quâdoquidē nocturni rores ipsum cōcrescere non sinunt. Eligendû est flauû, friabile, veheméter adstringēs, & linguam mordens. Sunt qui coquendo mellignem cogant.

Prodest

ἔμβρεγμα, σὺν ὄξει καὶ ῥοδί-
νῳ χλωρῷ τε καὶ ξηρῷ κατὰ
πλασματὶ ἐναίμων ἀφλέγμα-
τον, καὶ ἀρχιδρύων αἰγλώπων,
καὶ τῶν ἐν σόματι οὐλῶν, καὶ
νομῶν τ' ἐν αἰδοίοις, σὺν μέλιτι
καὶ κρόκῳ καὶ ῥοδίῳ καὶ σμύρ-
νῃ λεανθεῖσα· εἰς τε περὶ τοὺς μύ-
χουται πρὸς ἐπίχρουν αἵματος
καὶ ρεύματα ὀφθαλμῶν ἢ κρυ-
σούμυρον σόμαχον καταπλάσ-
σεται σὺν παπάλῃ ἀλοῖτου ἢ
οἴνου. κρυθεῖσα δὲ ἐπ' ὀφθαλμοῦ
διαπύρεται ἀνδραξί, ποιεῖ πρὸς
τὰ ὀφθαλμικὰ παρουνυχίας τε
καὶ πτερύγια καὶ οὖλα ἀφεσώ-
τα καὶ αἱματώδηρα σὺν μέλι-
τι διερεπύει.

Περὶ Ομφακίου.

Κεφ. 5.

Ομφάκιον, ἐστὶ μὲν χυλὸς ὁμ-
φακίος δασίας σαφυλῆς μέπω
περικαλούσης, ἢ ἀμναίας. δεῖ
δὲ πρὸ κυνὸς ἐκδιλίσσοντα τὸν
χυλὸν ὑπιάζειν ἐν χαλκώμα-
τι ἐρυθρῷ ἐσκεπασμένῳ ὀδονίῳ
μέχρις οὗ συσσεφῇ ὅλον αἰὲ τὸ
περιπληγύμυρον μίσχοντα τῷ ὕ-
γρῳ· νύκτωρ δὲ αἶρεν αὐτὸ ἀ-
πὸ τοῦ ὑπαιδείου· κολούου-
σι γὰρ αἱ δέροι· πλὴν σύσασιν
αὐτῶν. ἐκλέρου δὲ τὸ ξανθόν,
καὶ οὐδρυπῆον, σφόδρα ἰκανῶς καὶ
δάκνον πλὴν γλῶσσαν· ἐνίοι δὲ
ἐξοργιστὸς τὸν χυλὸν συσρέφουσιν.

Ἀρμύζει

Αρμόζει δὲ πρὸς παρείδματα καὶ
 σαφυλῶν ἄφθας, οὐλα παλαδου-
 ρθ, ὧτα πυορροῦντα σὺν μέλιτι
 ἢ γλυκεῖ· πρὸς δὲ σύειγας καὶ
 παλαιὰ ἔλκη καὶ νομάς σὺν ὀ-
 ξεί. ἐγκλύζεται δὲ ἐπὶ δυσεντε-
 ρικῶν καὶ ροϊκῶν· ἐστὶ δὲ καὶ ὀξύ-
 διερχές, τραχύτησι δὲ ὀφθαλμῶν
 ἀρμόζει καὶ φειβερώσεσι καυ-
 δῶν· πίνεται καὶ πρὸς αἵματος
 πύσιν τὴν πρὸσφατον καὶ κατὰ
 91 ῥήξιν γλυκύρην· ὑδαρεῖ δὲ δεῖ
 χρῆσθαι λίαν καὶ ὀλίγη· ἐπικραεῖ
 γὰρ ἱκανῶς.*

Πρὶ πειότητος τῶν οἴνων ἐν
 τῇ ἡλικίᾳ. Κεφ. ζ'.

Οἶνοι οἱ μὲν παλαιοὶ νεύρων βλα-
 25 πτικοὶ καὶ τῶν λοιπῶν αἰσθη-
 εῖων, πρὸς δὲ γεῦσιν ἡδίστους· ὀ-
 θυν ἐπὶ τῷ ἀδυνέει π μέρους ἐχόν-
 των ἐνδον, παραγιτητέον. ἐπὶ μὲν
 τοι τῷ ἐν ὑγείᾳ χρῆσεως ὀλίγος τὲ
 καὶ ὑδαρὲς λαμβάνειν ἀβλαβῶς.
 30 ὁ δὲ νέος ἐμπνευματικὸς, δύσπε-
 πτος, δυσόνηρος, οὐρετικὸς. ὁ δὲ
 μέσος τῇ ἡλικίᾳ, ἐκπέφυγε τὰ
 ἀμφοτέρω ἐλαττώματα· ὅθεν ἐκ-
 κριτέος ὅστις ἐν τε ὑγείᾳ καὶ ἀδυν-
 εείᾳ χρῆσεται.

25 Ἐκ τῆς χροῆς Κεφ. η'.

Ἐπὶ ὁ μὲν λευκὸς λεπτός τε καὶ
 ἐνανάδοτος καὶ ἐυσόμαχος ὑπερ-
 χει. ὁ δὲ μέλας παχύς καὶ δύσπε-
 πτος· μέλιτος καὶ σαρκῶν γλυκῆρος.
 ὁ δὲ

Prodest contra tóssillas, vuam,
 vlcera oris, humida gingiuarū
 vitia, purulétas aureis, cú melle
 aut passo: ité ad fistulas, vetera
 vlcera, nomásq; ex aceto. Dy-
 sentericis, & mulierib; fluxio-
 ne vuluæ laborátibus clystere
 infunditur: oculorum claritati,
 & scabritiæ, & erosionib; an-
 galorū cóuenit. Bibitur ad re-
 centé sanguinis excreationé,
 etiá si rupta parte aliqua cótin-
 gat, sed pauco, et aquatiore est
 vtendū: valde siquidé exurit.

Vini natura.

Cap. VII.

VINO vetere nerui lædū-
 tur, & reliqui sensus, quod ta-
 men gustu suauius est: quare
 cauendum ijs qui intestinæ a-
 licuius partis imbecillitaté sen-
 tiunt. Attamen in secunda va-
 letudine paucum, aqua dilutū,
 innoxie sumitur. Nouū inflat,
 ægrè coquitur, insomnia parit
 grauia, & vrinam ciet. Ætate
 medium, vtræque vitia fugit
 quare ad victus sanorū ægro-
 rúmque vsurpatur.

Vinū album. Cap. VIII.

Albū, tenue, stomacho vtile
 est, ac facile in membra distri-
 buit. Nigrum verò, crasum
 est, & concoctu difficile: car-
 nem alit, & ebrietatem creat.

Giluum,

DIOSCORIDIS

Giluū, vtpote quod mediū est, medias inter vtrūque vires habet: in secūda tamen & sinistra valetudine, cū primis laudat albiū. Quin & vina sapore distāt.

Vinum sapore differens, & mixtione. Cap. IX.

Siquidem dulce crassis partibus cōstat, & difficilior a corpore expirat: stomachū inflat: aluum & interanea, vt mustū, turbat: sed minus inebriat, renibus & vesicæ aptissimū. Auste- rum, per vrinam celerius transi- tit: sed capita dolore tentat, & temulētiā gignit. Acerbū, ad ciborum per mēbra digestio- nem accommodatissimū: aluum, & cæteras fluxiones cohibet, minusq; vrinā expellit. nouum nervos minus tentat. Vinum aqua marina factū, stomacho aduersatur: sitim stimulat, ner- uos infestat, aluo aptum, a va- letudine se recolligentibus in- utile. Passū, quod vis sole sic- catis in area, aut in sarmento torrefactis exprimitur, Creti- cū cognomine, aut pramnion, aut protropon: & sapa quæ fit musto igni decocto, Græci si- rion aut hepsēma appellāt: ni- gra quidē, & quæ dicūtur me- lāpsithia, crassa sunt, & corpo- ra multū alūt: candidū, tenui- &

ὁ ὅ κερρὸς μέσος ὢν, μέσῃ ἐχει, καὶ τὴν πρὸς ἐκείνῃ τῶν δυνά- μιν ἀεὶ τῶν τε καὶ λευκός. ἐπὶ καὶ πρὸς τῶν ποιότητε διαφέρεισιν.

Ἐκ τῆς γούσεως καὶ τῆς με- μιλῶν. Κεο. θ'.

Ὁ μὲν γὰρ γλυκὺς οἶνος, ἀ- δρομερὴς τε ὄντι καὶ δυσδιά- πνευστος· σωμαχοῦ πνευματωπι- κός. κοιλίας τε καὶ ἐντέρων τα- ρακτικός, ὡς ὅτε καὶ τὸ γλεύκος· ἰο- ἥτιον δὲ μεθύσκει. κῦστι δὲ καὶ νεφροῖς εὐδαιμονος. ὁ δὲ αὐστηρὸς ἐ- ρητικώτερος· κεφαλῆς τε καὶ μέθης ποικηλικός, ὁ δὲ σφυγνός εὐδαιμονώτατος πρὸς ἀνὰ δόσιν σι- πίων· κοιλίας τε σαλτικός, καὶ τῶν ἄλλων ρεύμασι πῶν. ὁ δὲ ἀπαλὸς ἥτιον ἀπλεται τὸ ἐνερῶ- δος, καὶ ἥτιον ὄντι οὐρητικός. ὁ δὲ πεδαιατωμένος, κακοσό- μαχος, διψοποιός, νύκτων κα- κωτικός, εὐκοίλιος, ἀνεπιτήδει- ος τοῖς ἐξ ἀδενείας. ὁ δὲ ἐκ τῆς δειλοπεδευθείσης σαφυλῆς ἢ ἐπὶ τῶν κλημάτων ὀπληθείσης, καὶ πειλομένης γλυκὺς, γλυκὺς καλούμενος κρητικός ἢ πρὸς το- πος ἢ πρὸς μέλιος· καὶ ὁ καδε- φομένης τῆς γλεύκος σείριος, ἢ ἐφίμα καλούμενος· ὁ μὲν μέ- λας, καλούμενος δὲ μελαμφο- διος παχύς ὄντι καὶ πολύτρο- φος· ὁ δὲ λευκός, λεπτότερος, ὁ δὲ

5 δὲ μέσος, μέσῃν ἔχει καὶ τὴν δύ-
 ναμιν. συπλητικός δὲ πᾶς ἔστι, σφυ-
 γμῶν ἀνακνητικός· ποιῶν πρὸς
 πάντα τὰ θανάσιμα ὅσα κατὰ
 ἔλκωσιν ἀναίρει. πηρόμυρος συν-
 10 ἑλαίῳ, καὶ ἐξερμούμυρος καὶ πρὸς
 μικρὸν δὲ καὶ φαικόν, καὶ το-
 ξικόν, καὶ κόνειον. καὶ γάλα θρομ-
 βωδέν καὶ πρὸς κύστιν καὶ νεφροὺς
 ὀδαξομύρους καὶ εἰλκομύροις. εἰ-
 15 σοὶ δὲ πνευματικοὶ καὶ κακόςμα-
 ροι. ἰδίως δὲ ἐπὶ τῶν τὴν κοι-
 λίαν ρευματιζομένων ἀρμόζῃ* ὁ
 κελαμφίδιος. ὁ δὲ λευκὸς μα-
 λακτικός κοιλίας τῶν ἄλλων μάλ-
 λον. ὁ δὲ τὴν γύφον ἔχων κακω-
 20 τικός* τῶν νευρῶν, καρδιακός,
 πυρώδης, κύσει ἄδετος* πρὸς δὲ
 τὰ θανάσιμα τῶν ἄλλων ἐνδε-
 τώτερος. οἱ δὲ πᾶσαν ἢ ῥητίνην
 πιτυρίην ἔχοντες δερματικοὶ,
 καὶ πεπτικοὶ ἄδετοι ὅ τοις αἵμο-
 ποιοῖσι. οἱ δὲ καλὲ μύροι ἀπαρά-
 25 χυτοι, ἔχοντες δὲ ἑψημα μυμ-
 γμύρον, κεφαλῆς εἰσὶ πληρωτικοί,
 μέσης γυνήτικοι, δυσδιάπνευστοι,
 κακόςμαρκοι.

Πρὶ Διαφορᾶς ἐν τῶν
 τόπων. Κεφ. ι.

25 Ο μὲ οὖν δοκῶν πρῶτεύειν τῇ ἐν
 ἰταλίᾳ οἶνων φάλογρος δὲ καλὲ-
 ρμος, παλαιοδεὶς ἄραν εὐπε-
 πτος, σφυγμῶν ἀνακνητικός, κοι-
 λίας τετριπτός, καὶ ἐνόςμαχος*
 κύσει ἄδετος, καὶ ἀμβλυπόους,
 καὶ

& heluola iter hec media, me-
 dias fortiuntur vires. Omnia
 tamē adstringunt, & pulsus re-
 uocant: faciunt aduersus vene-
 na, quæ exulcerando necāt, ex
 oleo pota, & vomitionib⁹ red-
 dita, cōtra cicutas, meconium,
 pharicon, toxica & cōcretum
 in grumos lac: item contra re-
 num ac vesicæ pruritus, rosio-
 nes, exulcerationesque. Inflan-
 tamen, & stomacho aduersan-
 tur. Priuatim, prodest melam-
 psithium, si vēter rheumatismū
 sentiat. Albū, magis cæteris e-
 mollit aluum. Gipso conditum
 neruis officit, caput aggrauat,
 & incendit, ac vesicæ aduersa-
 tur: cōtra venena cæteris apti⁹.
 Picata, aut refinata, excalfaci-
 unt, concoquunt: sanguinem
 excreantibus inimica. Quæ ve-
 rò aparachyta vocant, vt quæ
 admistam sapam recipiunt, ca-
 put implent, temulentiam gi-
 gnunt, ægrius in halitum expi-
 rant, stomachum malè habent.

Vinū loco differēs. Cap. X.

INTER Italica vina Faler-
 num principem locū obtinet,
 quod inueteratū perquā facile
 coquitur, pulsus exuscitat, al-
 uum adstringit, stomacho vtile:
 sed vesicæ nocet, atque iis qui
 visus hebetudinem sentiunt,
 &

& ad potus crebros minimè idoneum. Albana crassioribus constant partibus, dulcia stomachum inflant, ventrem emolliunt (sed concoctionem non æquè adiuuant,) & nervosa minus, infestant: vetustate, eadem austerum saporem concipiunt. Cecubum cum sit dulce, est & Albano crassius: corpus & colorem alit: ægrè tamè coquitur. Surrentinū valde austerum est: quare intestinorum & stomachi fluxiones cohibet, & cum tenue sit, caput minus tentat: inueteratū suavius redditur, & stomacho vtile. Adrianum & Mamertinū in Sicilia æquè crassis partibus gignunt: modicè adstringunt, & ocysimè inueterantur; minusq; ob suam tenuitatē, nervos tētant, Paratypianum, quod ex Adriatico sinu defertur, odoratū ac tenuius est: quare liberaliter epotum fallit, diu seruat ebrietatem, & soporem adfert. Istri- cum Paratypiano simile est, sed vrinam vehementius pelit. Chium tamen antedictis mollius, et aptū potui est: bene alit, & min⁹ inebriat, fluxiōes cohibet, oculorū medicamētis vtile. Lesbium facilè mēbra subit, Chio leuius, & aluo idoneū. Ephesium

ἢ πρὸς πολυποσίαν ἀναρμόσις. ὁ δὲ ἁλβανὸς ἀδρομερέστερος τῷ θαλερίνῃ ἐγγλυκός· ἐμπνευματίζοντα, κοιλίαν τὴν μαλάκην (πέλει τὴν ἑχὸς οὐκ ὁμοίως συνδρῶν) τῷ δὲ νευρώδεις ἦτον κακωτικὸς· παλαιώδεις δὲ ἢ ἔτος αὐστηρὸς γίνεσθαι. ὁ δὲ κέκρυβος γλυκὺς ὢν, ἀδρομερέστερος ὅτι τὸ ἁλβανὸς σαρκῶν τε καὶ ἐνχρῶας θνητῶν πέλει δὲ ἀδύτος. ὁ δὲ συρεντίνος αὐστηρὸς ἱκανῶς ὅτι νῦν ὅθεν ἐντέ- 10 ρων ἢ σωμαχοῦ ρεύμα ἴσῃσι, καφάης τε ἦτον ἀπλεται λεπτομερὴς ὢν παλαιώδεις δὲ ἐν σωμαχοῦ ἢ ἡδῶν γίνεται. ὁ δὲ ἀδριανὸς ἢ ὁ μαμερτιανὸς θνητῶν ἐν σκελίᾳ, κατ' ἴσον εἰσὶν ἀδύ- 15 μερεῖς μετεῖως σφόνδρες, ἢ τὰ χροῖον παλαιώδεις, ἦτον τὸ τοῦ νευρώδους ἀπλεται, διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς λεπτόν. οἱ δὲ περτιανὸς ἢ αὐτὸς ἐν τῶν κατ' ἀδρίαν κομζόμενος τόπων, ἐν ὁδῷ ἢ λήθ- 20 τέρως ὅτιν. ἢ δὲ λανθάνει πολὺς πινόμνος, φυλάττει τὴν ἐφ' ἱκανὸν πλὴν μέθην ἢ καρδίαν. ὁ δὲ ἱστρὸς λεγόμενος, εἰσὶν τῷ περτιανῷ, οὐκ ὁμοίως ὡς ἀφ' ἑαυτοῦ ὁ μὲν τοῦ χιῶς ἀπαιώτερος τῶν 25 περτιανῶν, οὐκ ὁμοίως, πίπ- μος, ἦτον μεθύσκων, ρεύματος σαλπικὸς, χηρῆσιμος εἰς τὰ ὀφθαλμικά· ὁ δὲ λέσβιος ἐνανάδοτος, καφότερος τῷ χιῶν καὶ ἐνκοιλίᾳ, πλὴν

τὴν αὐτὴν δὲ τέτρω κέκτη) δὲ
 ναμιν, ὁ κατὰ ἔφεσον ἡγνώμενος,
 χαλκίμενος δὲ φυγελίτης· ὁ δὲ ἐκ
 τῆς ἀσίας μεσηγείτοισ ἐκ τῆς μῶ
 λα, κεφαλαιῆς καὶ νέρων βλα-
 5 πτικός. ὁ δὲ κῶος, καὶ κλαζομένιος
 διὰ τὸ θαλάττης πολλῆς μετέ-
 χειν εὐφάρτος, καὶ ἐμπνευματώ-
 δης, κοιλίας τὲ παραπικός καὶ νέρ-
 ρων ὅτι βλαπτικός.

Πρὶ δυνάμεως τῶν
 οἴνων. Κεφ. ια.

10

Κοιτῶς δὲ πᾶς ἀμυγῆς οἶνος
 καὶ ἀκέραιος, ἀνσηρὸς δὲ τὴν
 φύσιν, θερμαντικός, ἐνανάδοτος,
 ἐνσώμαχος, ὀρεκτικός, σρεπτι-
 κός, ὑπονοπιός, ῥωστικός, ἐν-

15 χροίας παρσικευαστικός. ἰκανῶς
 δὲ ποδεῖς, βονδεῖ τοῖς κώνιον,
 ἢ κόρειον, ἢ φαρικόν, ἢ ἰξίαν, ἢ
 μυκῶνειον, ἢ λιθάργυρον, ἢ σμί-
 λακα, ἢ ἀκόνιτον, ἢ μύκητας εἰ-
 ληφόσι. πρὸς τε ἐς πετῶν δι-

20 γμούς καὶ πηλὰς πάντων, ὅσα
 πλῆξαντα ἢ δακόντα κατὰ ψύ-
 ξιν ἀναιρεῖ ἢ ἀνατρέπει σώμα-
 χον. ποιεῖ καὶ πρὸς ἐμπνευ-
 μάτωσιν χροῖαν καὶ δῆξιν ὑ-
 ποχονδεῖον, καὶ πλατυσιόν,

25 καὶ λύγγα σωμαχου, ἐντέρων τὲ
 καὶ κοιλίας ρευματισμόν. καὶ
 ἐφιδροῦσι καὶ διαφορευμένοις
 ἀεμιόζοις, μάλιστα δὲ οἱ λευ-
 κοὶ καὶ παλαιοὶ καὶ ἐνώδεις.
 οἱ μὲν τοὶ παλαιοὶ καὶ γλυκεῖς,

Ephesium eandem vim habet,
 quod Phygelites nominatur:
 verum Asianū è Tmolo mōte,
 Mesogites appellatum, capitis
 dolores ciet, & nervos lædit.
 Coum verò et Clazomenium,
 quoniā multā sibi maris aquā
 vendicant, facillè corrūpuntur:
 flatus movent, alium turbant,
 nervis officiunt.

Vini facultas. Cap. XI.

Vinum omne (ut reliqua in
 commune dicatur) merum ac
 syncerum, & sua natura auste-
 rum excalfacit, facillè in mem-
 bra distribuitur, stomachū ad-
 iuvat appetentiam ciborū in-
 uitat, vires alit, ac robur auget:
 somnum conciliat, & cōmen-
 dat colorem. Potum liberalius
 auxilio est contra assumptā ci-
 cutam, coriadrū, pharicum,
 ixiā, meconiū, argēti spumā,
 taxum, aconita, fungosve: con-
 tra serpentiū morsus, et omniū
 ictus quæ refrigerando necāt,
 aut stomachum in vomitiones
 effundunt. Facit ad lōgas infla-
 tiones, rosionesq; p̄cordiorū,
 ac distétiones, stomachi resolu-
 tionē, & si véter aut interanea
 rheumatismū sentiant. Cōue-
 niūt sudatoribus. & quib⁹ cor-
 pus immodico sudore digerit,
 maximè alba vetera et odora-
 ta. Quæ

Quæ tamē vetustate dulcescūt,
renibus ac vesicæ accōmoda-
tiora reddūtur: vulneribus, in-
flammationibūsq̃ue in succida
lana imponuntur: tetra vlcera,
& phagedænica, & fluxionib⁹
obnoxia, cōmodè perfundun-
tur. Quæ marinam nō recepe-
runt, austera & alba, ad fano-
rum victus vsurpantur. In his
præstāt Italica, Falernū, Sur-
rentinū, Cecubum, Signinū,
& permulta Campaniæ, & Pa-
rætypianū ab Adriatico finu,
& Siculū quod Mamertinum
appellatur. Ex Græcis Chium,
Lesbium, & Phygelites ex E-
pheso. Crassa verò & nigra,
stomacho negotium exhibēt,
inflationem pariunt, corpus
augment. Tenuia tamen & au-
stera stomacho profunt, & mi-
nus carnes alunt. Vetera val-
de tenuia, & candida vehe-
mentius vrinam ciunt, & do-
lores capitis mouent, neruof-
que largius pota tentāt. In me-
dia ætate, vt à septimo anno,
potui saluberrima sunt. Modus
autem pro ætate, & tempore
anni, & cōsuetudine, & quali-
tate vini definiatur. Non fitire,
& modicè cibos proluī, opti-
mū est præceptū. Nocet ebrie-
tas omnis, & maximè afsidua:
liquidem

καὶ πρὸς τὰ πρὸ κύστιν καὶ νεφροῦς
ἐπιτηδεύουσι. πρὸς τε τραύ-
ματα καὶ φλεγμονὰς συν᾽ ἐρείοις
οἰσυπρεῖς ἐπιτιθέμενοι. κατὰ
τὸν πρὸς τὸν φελλὸν καὶ φαρμακικὸν καὶ
ῥευματικὸν ἔλκεα. πρὸς δὲ
τὴν ἐν ὑγείᾳ χρεῖσιν εὐθετοὶ οἱ
ἀδάλαστοι αὐστηροὶ καὶ λευκοί.
διαφέρει οἱ τῶν οἱ ἰταλικοὶ
ὡς ὁ φαλεινός, συρεγγίνος καὶ
κέκουβος, ὁ τε σιρηνός καὶ ἄλλοι τῶ
πολλοὶ οἱ ἀπὸ τῆς χαμπανίας,
καὶ ὁ τραυτιανός ἀπὸ τῆς ἀδρια-
νοῦ, καὶ σικελιώτικος ὁ μαμερτι-
νός χαλούμενος. ἑλληνικῶν δὲ
χῖος, λέσβιος, φυγελίτης ὁ ἐν ἐφέ-
σῳ θηρώνμενος. οἱ δὲ παχεῖς καὶ
μέλανες χακασόμαχοι, φυσώ-
δεις, σαρκὸς μὲν τοὶ θηρητικοί.
οἱ μὲν τοὶ λεπτοὶ καὶ αὐστηροὶ ἐμ-
σόμαχοι, ἤπλον δὲ σαρκοποιοί. οὐ-
ρητικώτεροι δὲ καὶ κεφαλαλγῆς
οἱ σφόδρα παλαιοὶ καὶ λεπτοὶ
καὶ λευκοί, ἀπλοῦται δὲ τῶ νε-
φρῶδιν πλεοναδέντης. οἱ μέσοι τῶ
τὴν ἡλικίαν ἀείρου πρὸς πόσιν.
ὡς οἱ ἀπὸ τῶ ἔτος, ἢ δὲ ποσὶ
τῆς παρὰ τὴν ἡλικίαν καὶ τὴν
τῶ ἔτος ὥραν, καὶ ἔσθιν καὶ ποιο-
τητα τῶ οἴνου δεῖξιν. καὶ τὸ μὴ
δι᾽ ἡν δὲ ἀείρου ὅτι παρὰ γνη-
μα, καὶ τὸ μετεῖως βραχυῶαι
τὴν τροφήν. μέση δὲ πάντα, καὶ
μάλιστα ἡ συνεχὴς ἐπιλαβὴς
τὰ

τά τε γὰρ νευρα πολιορκούμενα
καὶ ἐκείνην ἐλπίδωσι καὶ παύσων
ἔξωθεν ἀρχαῖς ἐμπιέει καὶ ἡμέραν
ἢ πολυποσία. μετεῖως δὲ οἴνου
ἔσαι ἐπὶ πινών ἡμερῶν, καὶ μάλιστα
ἐπὶ ὑδροποσίᾳ ὠφελίμων. μέ-
τα συγκρίνει γὰρ πως τοῖς. τε αἰ-
δηταῖς ἀναγκαστῶρον ἐκκρίσεις, καὶ
ἀδύνατος πορροποιῶν. δὲ μὲν τοι-
κα μετὰ πλὴν οἴνωσιν ὑδὼς πί-
νῃν ἀπὸ θεραπείας γὰρ πινος χά-
ριν τῆς συγκριμένης οἰνώσεως, βό-
πον ἀπάγει βοηδεύας.

Πρὶ ὀμφακίτε οἶνε. Κεφ. ιε΄.

Ο δὲ χαλέμνος ὀμφακίτης
σκευάζει ἰδίως ἐν λέσβῳ, Σηλο-
παιδενομήνης μὴ πῶ καὶ παύτα.
πεπεῖρεται δὲ σαφελῆς ἔσσης, ἔπ δὲ
ὀξυζέσης, ἐπὶ ἡμέρας γ' ἢ δ' ἔως
ἀν ῥυσσώδωσιν οἱ βόβυες, καὶ μετὰ
τὸ ἐκδιελύσασθαι ἡλιζέται ἐν κα-
ραμίῳ οἴνω. Στυπτικὴν δ' ἔχει
πλὴν δύναμιν καὶ ἐνσώμαχον, καὶ
κυσσώδεις καὶ εἰλεώδεις καὶ τοῖς δι-
σπείτοις καὶ ἐκκελυμένῳ τὸν σό-
μαχον ἀρμόζουσιν δοκεῖ δὲ καὶ λοι-
μικῶς διαδεύσει βοηδεῖν κατὰ
ροφάμνος. χεῖρόισι δὲ ἢ τοιοῦ-
τοι οἶνοι ἐπὶ πλεονόντων, ἀλλως
γὰρ ἐν εἰσὶ πίπμι.

Πρὶ Δευτερίας καὶ ἀδύ-
νάμου. Κεφ. ις΄.

Ο δὲ χαλέμνος δευτερίας, ὃν
ἐνιοι πίπμιον καλεῖσι, σκευάζεται
θετον δὲ τῶσπον εἰς τὰ σέμφυλα,
ᾧ

liquidé obsessos nervos quoti-
die remittit: largiorq; pot^{us}, acu-
torum morborū adfert initia.
Mediocris tamen vinolentia,
aliquot diebus, maximè post
aquæ potus, utilis: nanq; modo
quodā ex alto euocat, sensilés-
que expurgat excretus, & per
cæca corporis ducit spiracula.
Sed aqua post vinolentiâ bibe-
re oportet: liquidé valetudinis
alicuius gratia factæ temulen-
tiæ remedium affert frigida.

Omphacites. Cap. XII.

OMPHACITES nomi-
ne, peculiariter fit in Lesbo,
ficcata sole acri vva, paulò an-
te maturitatē decerpta, triduo
aut quatrduo, donec racemi
in rugas contrahantur, expres-
sumque vinum cadis insola-
tur. Vim adstringendi habet:
prodest dissolutis stomacho, &
ilei dolore laborantibus: item
pregnantium malaciæ, & cru-
dis: in pestilentia quoque
sorptum auxiliari dici-

tur. Huiusmodi vina
non nisi post mul-
tos annos bi-
bi possunt.

Lora. Cap. XIII.

Lora, quâ deuteriâ, alij poti-
mó appellât, fieri solet, adiectis
metretis trib^{us} aquæ, i vinacea,
quibus

quib⁹ triginta vini metretę ex-
tractę fuerint: calcatis vinace-
is, expressoq; decocto ad ter-
tias parteis, & additis in singu-
los congios modi eius qui re-
manfit, binis salis sextariis, post
hyemem transfunditur in va-
sa. Lora intra annum vtędum:
etenim celeriter exolefcit. Cō-
uenit ægris quib⁹ timemus no-
xam vini, coacti sæpe defide-
riis eorum obtemperare: item
à longa valetudine se recolli-
gentibus. Fit & vinum quod
adynamon vocant, lorę vires
habens, hoc modo: Pares a-
quæ, & musti mensurę coquū-
tur molli igne, donec absuma-
tur aqua: quod, vbi refrixerit,
elutriaton, picato vase recon-
ditur. Alij marinæ, & coele-
stis aquæ, mellis & musti pa-
res miscent portiones, decapu-
lant, & quadraginta dieb⁹ in-
solant: quo ad annum vtuntur
ad omnia eadem.

Vinum è syluestri vua ex-
pressum. Cap. XIII.

VINVM è syuestri vua
nigrum adstringit: prodest
alui & stomachi fluxioni-
bus, & cæteris quibus
constrictione, &
contractione
opus est.

Vinum

ὡν ἐξέδραψας οἴνου μετρητὰς ἅ-
βάλε ὕδατος μετρητὰς γ' . καὶ μί-
ξας καὶ πατήσας ἐκδραψον, καὶ ἀ-
φέλῃσιν εἰς τὸ τρίτον, χοεῖ δὲ
ἐκάστῳ τῶν ὑποληφθέντων μερῶν
τῶν, μίξον ἁλὸς ξίσας β' . καὶ μετὰ
τῶν χειμῶνα διὰ χειρὸς εἰς καρχα-
μία . καὶ ὅ ἅπῃ μετ' ἐνιαυτὸν
ταχέως γὰρ ἐξίτηλος γίνεται, ἀρ-
μόζει δὲ ἐφ' ὧν διατάσσουσι οἶνον
διδόγειν, ἀνακαζόμενοι δὲ ἐπι-
θυμίαν τῆ νοσοῦντος . καὶ ἐπὶ
τῶ νόσων ἀναλαμβάνοντων χρο-
νίως . Γίνεται δὲ καὶ ἀδυνάμως
λεγόμενος τὴν αὐτὴν ἔχων τῷ
δευτερίῳ δυνάμην . δεῖ δὲ ἴσον
μέτρον ὕδατος τῷ τῷ γλεύκοις
μίξαντας, ἐψησάτω περὶ ἡμέρας
μαλακῶ ἄρχῃς ἂν ἐξαυαλωθῇ
τὸ ὕδωρ· καὶ μετὰ τῷ τοῦ μίξαν-
τας καταγίγειν εἰς ἀργεῖον πε-
ποσσωμένον . ἔνιοι δὲ θαλάττης
πεκαγίος καὶ ὕδατος ὀμβρείου καὶ
μέλιτος καὶ γλεύκοις ἴσα μίξαν-
τες καὶ καταγίσαντες, ἡλιάζουσιν
ἐπὶ ἡμέρας μ' . καὶ ὧν δὲ αὐτῶν
πρὸς τὰ αὐτὰ μετ' ἐνιαυτὸν .

Πρὶ οἶνου ἐκ τῆς ἀρχίας
σαφυλῆς . Κεφ. ιδ' .

Ὁ δὲ ἐκ τῆς ἀρχίας σαφυ-
λῆς μέλας, συπτικός ἐσάρ-
χων, ἀρμόζει κοιλίᾳ ρευματι-
ζομένη, καὶ σωμαχῶ, καὶ πρὸς
τὰ δῆα ὅσα σφύφως καὶ συσο-
λῆς χροῖζει .

Πρὶ Μελι-

Πρὶ Μελίτις οἶνε. Κεφ. ιε.

Οἶνος μελιτίτης, δίδωθ' ὡς ἐν
 ῥεονίοις πυρετοῖς ἀδενῇ σόμα-
 χον ἔχουσι· ὑπομαλάτῃ γὰρ τὴν
 κοιλίαν, ἔρα κινεῖ, σόμαχον ἀπο-
 καθαίρει, ἀρμόζει καὶ ἀρθριτικοῖς,
 καὶ νεφριτικοῖς, καὶ τοῖς ἀδενῇ καὶ
 φασίαν ἔχουσιν· ἡσυχίαν δὲ καὶ γυ-
 ναικίαν ὑδροπεττωταῖς· ἐν ὧδῃ γὰρ
 ὄσι καὶ ἀρεπτικός. Διαφέρει δὲ τῷ οἶ-
 νο μέλιτος, ὅτι κλεινός μὲν ἐξ αὐτοῦ
 10 ῥε οἶνε, καὶ παλαιῷ καὶ ὀλίγῳ μέλι-
 τος σκευάζεθ'. ὃ δὲ μελιτίτης πρὸς
 ἐχράς αὐσησθ' ὑαλύνει, μέλιτος
 γὰρ ἔνα καὶ ἀλὸς κύματον ἔνα. σκευ-
 αζέτω δὲ εἰς ἐν μεγάλῳ ἀγείῳ ἵνα
 τὸ πονέηται, ὡς τὸ ὑποζέτω παρὰ
 15 πᾶσι τοῖς τῷ περὶ ῥεονίοις ἀλὸς
 καὶ ὀλίγον ἄρσις ἂν ἐκρίσῃ, παυ-
 σαμένη δὲ καὶ ἀγίγῃ εἰς ἑῖρα καὶ
 ῥάμια. Πρὶ οἶνο μέλιτος. Κεφ. ις.

Οἶνο μέλι δὲ διαφέρει τὸ ἐν τῷ
 παλαιῷ οἶνε καὶ αὐσησθ' καὶ μέλι-
 20 τος καὶ γινόμενον ἢ πον γὰρ πνευ-
 ματοῖ καὶ ταχέως παρίσταται τὸ
 τοῖς τῷ. ἔστι δὲ τὸ μὲν παλαιὸν ἀρε-
 πτικόν· τὸ δὲ μέσον ἐν κοιλίῳ, ἔρη-
 πτικόν· βλάτῃ δὲ ἐπὶ ῥοφῇ ληθέν·
 πνόμενον δὲ ἐν ἀρσῇ, πωλησθ' ὁ-
 25 ρεῖται δὲ μὲν ταῦτα κινεῖ, σκευάζε-
 ται δὲ ὡς δύο μερίται ὡς ἐπὶ
 το πολὺ οἶνε ἐνὸς μερίτης μέλιτος
 μνησθ' οἱ δὲ, ἵνα τάχῃ αὐ-
 τὸ παρὰ τῇ σῶσι, σῶμα ἔσται τὸ μέ-
 λι τῷ οἶνε, καὶ ἔτω καὶ ταγγίζουσιν.
 ἐμὸι

Vinū melitites. Cap. XV.

Melitites datur in longis fe-
 bribus, quæ stomachum infir-
 marunt: nanque alium leuiter
 emollit, vrinam ciet, stomachū
 expurgat. Prodest articulario
 morbo, renum viciis, imbecil-
 lo capiti, & mulieribus abste-
 mis: odoratum siquidem est, &
 corpus alit. Distat à mulso quod
 fit è vino vetere, austero, &
 melle exiguo. Melitites autem
 adiecto ad quinq; cōgios au-
 steri musti, mellis cōgio, & fa-
 lis cyatho. Cortinis magnis,
 quo magis ad efferuescendum
 locus pateat, fieri oportet, sen-
 sim asperso sale: cūque effer-
 uere desierit, in alia vasa trās-
 funditur.

Mulsum. Cap. XVI.

Mulsum è vetere vino auste-
 roque, & bono melle factum,
 præfertur: minus enim inflat,
 ac celeriter id genus in vsum
 venit. Vetus, corpus alit: me-
 dia ætate, aluo prodest, vrinā
 pellit: à summo cibo sumptū,
 nocet: & inter initia potum,
 implet: dein appetendi aui-
 ditatem reuocat. Fit mulsum
 duabus vini metretis, admixta
 vna mellis. Aliqui, quo celeri⁹
 præberi possit, mel cum vino
 coquunt, & ita transfundunt.

L Alij

Alij vtilitatis gratia, ad sextarios sex multi feruentis, vnum mellis adiiciunt: & vbi ferbuerit vase recondunt. Dulce autem permanet.

Aqua mulsa. Cap. XVII.

Aqua mulsa easdē quas mulsum vires possidet. Cruda vtimur, cū moliri deiectionē, aut vomitionē incitare volum⁹, vt iis qui venena hauserunt, ex oleo. Decocta datur imbecillis, & hominibus elāguescētis pulsus, quos illi dixere microsphyctos, tussiētib⁹, peripneumoniacis, & iis q̄ immodico sudore digerunt. Iā paratū cōdituūq̄, quod aliqui hydromeli ppriē vocant, mediā ætate adynamo vino, aut loræ in recreādis viribus respōdet, & similem vim adipiscitur: quare inflāmationibus alicuius mēbri plus q̄ lora pdest. Inueterati tamē vsus dānatur, inflāmatis, aut cōstrictis: sed laborāti stomacho, aut cibū fastidiēti, sudatorib⁹ve cōuenit. Fit, duabus pluuiæ aquæ veteris ad vnā mellis partē additis, & insolatis. Alij fontanam aquam adiiciunt, & ad tertias parteis decoquūt, & ita recondunt. Nec desunt q̄ hydromeli appellēt, q̄ à melle elutis aqua fauis confici ac feruari soleat: sed

ἐνιοι δὲ διὰ λυστέλειαν, γλυκοῖς ζέοντος ξέσας ε'. πρὸς ξέσας α'. μέλιτος μνηστῆρες μετὰ τὸ ἀποζέσαι καταγγίζουσι. μὲν δὲ γλυκύ.

Πρὶ Μελικράτε. Κεφ. ιζ. 5

Μελίκρατον δὲ τ' αὐτ' τῷ οἴνῳ μέλιτι δυνάμιν κέκτηται. χρώμεθα δὲ τῷ ἀφελιμύρῳ, ἐφ' ὃν κοιλίαν μαλάξαι βελομένη. ἢ ἐμετον κινῆσαι, ὡς ἐπὶ τ' θανάσιμον πεποκότων. διδόντες αὐτὸ μετ' ἐλαίῃς, τῷ δὲ ἀφελιμύρῳ ἐπὶ τ' μικροσφύκτων καὶ ἀδενῶν καὶ βροσπύκτων καὶ πνευμονικῶν καὶ διαφορεμύρων. τὸ δ' σκευάσθον καὶ ἀπόδετον ὁ ἰδίως, ἐνιοι ὑδρόμελι καλοῦσι, μέσον μὲν τῇ ἡλικίᾳ ὑσάφρον ἀναλογεῖ τῷ δευτερίᾳ καὶ ἀδυνάμῳ οἴνῳ ὅσον ἐπὶ τῷ πατρὶ δυνάμεις ἀνακτᾶσθαι. ὅθεν ἐπὶ τῶν φλεγμαινόντων τί μέρους ὅσῃν εὐδετον μάλλον ἢ δευτερίᾳ. τὸ δ' παλαιότερον. ἀδόκιμον ἐπὶ τ' φλεγμαινόντων καὶ σερπῶν. ἐπὶ δ' τ' σόμαχρον πεπονδόντων ἢ ἀγορέκτων ἢ διαφορεμύρων ἐπιθήδειον. Σκευάζει δ' πρὸς ἓν μέλιτος μέρος, δύο ὕδατες ὀμβρίου παλαιῆς μνηστῆρας καὶ ἡλιαζομένης. οἱ δὲ, πηγαῖον μίξαντες ἀφελῶσιν εἰς τὸ βίτον καὶ αποτίθεν. καλῶσι δὲ πνες καὶ τὸ ἀπὸ μέλιτος ἐκπλωμομένων τ' κρείων ὕδατι σκευάζομενον, ὑδρόμελι, καὶ ἀπαπιδέμενον.

πυρεθρον. δεῖ ὃ αὐτὸ καὶ ἀκρατέ
τερον ποιεῖν. οἱ ὅ, καὶ τὸ τοῦ ἐφοισι.
ἐστὶ δὲ ἀδετον ἐπὶ νοσούντων, διὰ
τὸ πλεῖστον ἔχειν κηραίνεμα.

Πρὶ ὕδατος. Κεφ. ιθ.

3 Ὑδωρ, πῶς μὲν ἐν τῷ κατὰ φύσιν
ἐπικρίσιν θυρεῖν ἔχει διὰ τὰς
τῶν τόπων ιδιότητας καὶ ιδιουσ-
κρίσις, καὶ τὰς αἰτίας καὶ ἄλλα ἐκ
ὁλίγα. ὥς δὲ ἐπιτοπολὺν αἰεὶ
ᾧ τὸ κατὰ φύσιν καὶ γλυκὺ, ἀμεί-
10 τοχον δὲ οἷας δύνανται πύοσι-
τος καὶ τοῖς ὑποχρόνδρσις μὴ δ'
ἐλάττωσον χροῖον ἐπιμάνον. ἐπὶ τῇ
ἀλύπτως ἐνοδοῦν καὶ ἐμπνευμα-
τουῦ μὴ δὲ διαφθερέμενον.

Πρὶ θαλασσίου ὕδατος.

15 Κεφ. ιθ'.

Θαλάσσιον ὕδωρ θερμὸν, δρι-
μὺν, κακὸς μίχρον (κοιλίας γὰρ τα-
ρακτικόν) ἄρην φλέγμα. θερμὸν
δὲ κατὰ φύσιν, ἐπιπᾶται
καὶ διαφορεῖ· ἀρμόζον τοῖς πρὸς
20 νεύρεσι πάσας καὶ χιμέτοις πρὸς
τὸ ἐκκαθίσαι. ὡς κλύσει τὴν
ἐπιπᾶσιν μίχρον, καὶ ἐμπλῶ-
σιν καὶ μαλάγμασι διαφορε-
πικοῖς εὔδετον. καὶ πρὸς τὰ κα-
νόματα ἐνέμενον χλιαρόν· καὶ
25 πρὸς σφόδρα θερμὸν, ἴσως τὴν
καὶ κνησμῶν καὶ λειχμῶν καὶ
κονίδων, καὶ μάσων ἀσπαραγ-
των κατὰ τὴν φύσιν. διαφορεῖ καὶ
περιώματα πυρεθρον, καὶ
πρὸς τὰ τῶν πυρεθρον δύνανται

ἴσως

sed meracius confieri cōuenit:
aliqui id coquunt. Egrotanti-
bus noxium est, quoniam plu-
rimum ceraginis sibi vēdicat.

Aqua. Cap. XVIII.

De aquis in vniuersum decer-
nere, ppter locorū proprietates,
& peculiare naturas, cœ-
lum, & alia pleraq; difficile est.
Magna tamē ex parte optima
est dulcis, sincera, nullius om-
nino qualitatis particeps, & q̄
ne minimo quidē tempore in
præcordiis cōmoratur: ad hæc,
quæ & facili via fertur, & citra
molestiā, nec inflationes creat,
& minimē computrescit.

Aqua marina. Cap. XIX.

A Q V A maris calida est, &
acris: stomacho aduersatur (al-
uum enim conturbat) pitui-
tam expellit. Si verò calida ad
fetus adhibeatur, elicit & dis-
cutit: neruorum vitis, & per-
nionibus, ante vlcera prodest.
Miscetur cataplasmatibus ex hor-
deacea farina, & emplastris, &
discutientibus malagmatis. Ad
mouendas deiectiones tepefa-
cta infunditur & ad tormina:
calida, psoras, pruritus, impe-
tigines, lentes, & mamas rigē-
tes, foueri vtile est: liuores fo-
tu discutit: ad venenatos ictus,

L ij qui

DIOSCORIDIS

qui tremorem & refrigerationem adferunt, salutaris intelligitur, maximè scorpionum, phalangiorum, aspidumque: etiam si quis in calidam descendat, auxiliatur. Et malo habitu confectis iam diu corporibus, nervisque, balneæ ex ea vtilis: hydropicos, capitis dolores, auriū gravitates, feruentis vapor leuat. Syncera, & sine potabilis aquæ mistione repofita, virus deponit. Sunt qui etiam præcoquant, & ita reconcant. Datur ad purganda corpora per sese, aut ex posca, aut cum vino, aut melle: verum post deiectionem, dant gallinæ aut piscium iuscula, ad domandā morsus acrimoniam.

Thalassomeli.

Cap. XX.

QVOD thalassomeli vocatur, vehementer purgare cōstat. Temperatur autem æquis portionibus maris, mellis, & imbris ex alto, defæcatis, & picato vase per Canis æstus insolatis. Alij ad binas marinæ coctæ singulas mellis adiciūt, & vase condunt: huiusmodi moderat⁹ est aqua marina & mitius.

Acetum. Cap. XXI.

Acetū refrigerat, & adstringit: stomacho

ὅσα τρώμοις καὶ ψυγμοῖς φέρεται, μάλιστα δὲ σκορπίων καὶ φαλαγγίων, καὶ ἀσπίδων, καὶ εἰ προσεμβαίνει τις εἰς θερμὸν αὐτὸ ὠφελεῖ. καὶ ταῖς ρεονίαις καχεξίαις τῆ σώματος καὶ τῶν νευρῶν, ὠφέλιμον τὸ δι' αὐτῆς λουτρὸν ὑποαίμιζόντων ὃ θερμὸν, ὑδρωπικὰς, κεφαλαλγίας καὶ δυσηχοίας παρηγορεῖ. ἀποτεδεῖσθαι δὲ ἢ ἀκέραιος θάλασσα καὶ ἀμυγνῆς ποτίμου ὕδατος, ἄβρωμος γίνεταί. οἱ δὲ, πρὸς τοῖς αὐτῶν καὶ οὕτως ἀποτίθενται. δίδεται δὲ καὶ πρὸς κήλησιν καὶ ἐν αὐτῶν ἢ μετὰ ὀξύκρατῃ, ἢ οἴνῃ ἢ μέλιτος· καὶ μετὰ τὸ καθαρίσθαι, ἐπιδιδόσθαι ζωμὸν ὀρνιθὸς ἢ ἰχθύων, πρὸς τὸ κατακερᾶσαι τῆς δυνάμεως δριμύτητα.

Πρὶ Θαλασσωμέλιτις.

Κεφ. κ'.

Θαλασσωμέλι δοκεῖ καθαίρειν ἀνδρικόως. σκευάζεται δὲ ἐν μέλιτος καὶ ὕδατος ὀμβρείου καὶ θαλάσσης, ἴσων διυλιδέντων καὶ ἡλιαδέντων ἐν ἀγρείῳ πεπιστωμένῳ ἐν τοῖς ὑποκυῖα καυμάτων. οἱ δὲ, δύο μέρη θαλάσσης ἀφελήμενης καὶ ἐν μέλιτος καταμίξαντες, καταγγίζουσι μετεωτέρον δὲ γίνεται καὶ ἐπικέστερον τὸ τοῦτον τῆς θαλάσσης.

Πρὶ Οξοῦς. Κεφ. κα'.

ΟΞΟΣ ψύχει καὶ σφίγει, ἐν σῶμα χρόν

ἐν τῷ μαστῶν τε ὅτι καὶ ἐν ὁρέκτον
 σαλπικὸν τε αἰμορρῶσιν πάσης,
 πινόμενον τε καὶ ἐγκαθιζόμενον καὶ
 ἐπὶ ρευμάτων κοιλίας σιναψι-
 μένον τῶν τροφῶν ἀρμόζει· ἐ-
 ναιμόν τε ὅτι καὶ ἀφλέγματον
 σὺν εἰοῖς οἰσπηρῶν ἢ ἀπόγ-
 ροῖς ἐπιπιδέμενον· σέλλει καὶ ὑ-
 σέραν καὶ ἔδραν περὶ πῶ-
 κῆαν καὶ οὖλα ἀφισώτα καὶ αἰ-
 μορρῶν ὡντα· ποιεῖ καὶ πρὸς νο-
 10 μᾶς καὶ ἐρυσιπέλατα, ἔρπητας,
 λέπρας, λειχῶνας, πτερυγία, σὺν
 πινι τῶν ἐπιπιδέων μινυόμενον·
 φαρμακικά τε ἔλκεα σιναψὶ
 ἀπαντλέμενον, καὶ νομῶς ἰση-
 σιν· ὠφελεῖ καὶ ποδαγρικούς κα-
 15 τὰ τλέμενον θερμὸν μετὰ δέινῃ
 ὑπόπῃ τε αἰρεῖ σὺν μέλιτι κα-
 ταχρίόμενον· πρὸς τὴν ἐγκώ-
 σιν τῆς κεφαλῆς σὺν ῥοδίνῳ καὶ
 οἰσπηρῶν εἰοῖς ἢ ἀπόγγῳ· ὑ-
 δρωπικούς τε καὶ δυσηκούς ὑ-
 20 πατμιδὲν θερμὸν ὠφελεῖ, καὶ
 ἥχους καὶ σπειγμούς· ἐν σιχθὲν
 δὲ κτείνει τὸν ἐν ὧσιν σκώλη-
 κας· σέλλει καὶ φύγεθλα χλια-
 ρὸν κατὰ τλούμενον, ἢ διὰ σπῆ-
 ρων ἐπιπιδέμενον, καὶ κνησμούς
 25 παρηγορεῖ· πρὸς τε θηρίων δυν-
 ῖματα ὅσα ψύχει κατὰ τλη-
 μα θερμὸν· ψυχρὸν δὲ τοῖς πυ-
 ρῶσι τὸ ἰσθλῶν· ποιεῖ καὶ πρὸς
 τὰ θανάσιμα πάντα πινόμενον
 θερμὸν καὶ ἐξεμούμενον, μά-
 λιστα

stomacho vtile, & appetētiā
 excitat: erumpentem vnde cū-
 que sanguinem, potu infesū ve-
 sistit: prodest alui fluxionibus
 coctum cū cibis: cruentis vul-
 neribus inditur, & inflāmatio-
 nes arcet, in succidis lanis aut
 spongia impositum: reprimat
 procidentia sedis, vuluāq;: itē
 abscedētes gingiuas, & sangui-
 ne manantes. Ad nomas, & i-
 gnem sacrum, vlcera quæ ser-
 pūt, lepras, impetigines, ptery-
 gia, cū aliquo conuenienti ef-
 ficax est: phagedēnas vlcerum,
 nomasque fotu continuo co-
 hibet: podagricis calido fotu,
 cum sulphure auxiliatur: fugil-
 lationes rapit, cum melle illitū.
 Contra capitis ardores cū ro-
 faceo in succidis vellerib⁹, aut
 spongia imponitur. Ad aquam
 inter cutē, grauitatē aurium, &
 sonit⁹, sibilosq; feruētis vapor
 proficit: instillatū quoq; aurii
 vermes necat. Panos coërcet
 tepidi fotus, aut si imbuta ace-
 to spōgia admoueat, & pruritus
 pmulcet. Cōtra venena-
 tos serpentiū ictus, qui refrige-
 rādo nocēt, calidū cōmodē fo-
 uetur: & frigidū, iis q̄ exurēs vi-
 rus eiaculant. Calidū potū, atq;
 vomitionibus redditū, aduer-
 sus omnia venena efficax est,

DIOSCORIDIS

præfertim contra meconium, & haustam cicutam, conglobatum in ventre sanguinem, lac coagulatum, fungos, ixiā, taxūmque, cum sale. Haustu voratas hirudines, si forbeatur, eiicit: tulsim veterem mitigat, & recentem lacepsit. In orthopnoea calidum commode sorbetur: gutturi fluxiones gargarizatum inhibet, anginis & vix procidenti conuenit: contra dentiū dolorē, calidum colluitur.

Acetū mulsū. Cap. XXII.

Acetum mulsū, quod oxymel vocant, hoc modo temperatur: Aceti heminas quinque, salis marini pondo, mellis minas decē, aquæ sextarios quinque pariter coquito, decies effervescente cortina: atque vbi refrixerit, diffundito. Sumptum crassos humores extrahere, & ischiadicis, comitialibus, & articularū morbo conflictatis prodesset credi. Contra morfū eius viperæ quam sepa vocant, haustu meconiū, ixiāmye, auxilio est. Anginis vtiliter gargarizari.

Acida muria. Cap. XXIII.

Acida muria, quā Græci oxalmen vocāt, cōtra nomas foetū, putrida vlcera, canū morbo, &

λεπὰ πρὸς μυκάνειον καὶ πονείον
πόσιν, καὶ αἵματος καὶ γάλακτος
δρομέωσιν ἐν κοιλίᾳ, πρὸς τε μύ-
κντας καὶ ἰξίαν, καὶ σμίλακας
συνὸ ἀλσί. βδέλλας τε ποδείσας
καταρροφόμενον ἀποβάλλει· καὶ
βήχα χροῖαν πρῶτον, τὴν δὲ
πρῶτον ἐρεδίζει. ἀρμόζει καὶ
πρὸς ὀρθόπνοιαν διεκὸν κα-
ταρροφόμενον· στέλλει δὲ ἀναγ-
γαιζόμενον καὶ τὰ ἐν βρογχῶ
ρεύματα, συναγχοῖς τε ἀρμό-
ζει καὶ πρὸς κιοῖδα καχασμέ-
νῳ καὶ πρὸς ὀδόντων πόνον διε-
κὸν διακλυζόμενον.

Πρὶ Οξύμελιτος.

Κεφ. κβ'.

Οξύμελι σκευάζεται οὕτω· λαί-
ων ὄξους κοτύλας ἑ. καὶ ἄλδος
θαλασσίον μῶν μίαν, μέλιτος
μῶν ἑ. ὕδατος κοτύλας ἑ. μί-
ξας ἐψησον ἄχρις οὗ δεκάκις ἀ-
ναβράσῃ. καὶ ψύξας κατάργισον,
δοκεῖ δὲ λαμβανόμενον πάχος
ἄγειν, ὠφελεῖν ἰσχυρικοὺς, καὶ ἀρ-
θριτικοὺς καὶ ἐπιπληθικοὺς. ἀρήξ-
ει καὶ τοῖς ὑπὸ ἐχθρῆς τῆς κα-
λουμένης σπητὸς διεχθεῖσι, καὶ
τοῖς μυκάνειον ἢ ἰξίαν ποῦσιν.
ἀναγγραείσιν τε συναγχοῖν
ὠφέλιμον.

Πρὶ Οξάλλης. Κεφ. κγ'.

Οξάλλη ὠφελεῖ καταντλημένη
πρὸς νομάς, σπητὸν δόνας, κυνόδον-
τα, καὶ

κτα, & τὰ ἀπὸ τῶν ἰοδόλων δή-
 Γματα. σέλλει ὃ καὶ τὰς ἐπὶ τῶν
 λιθοτομικέντων αἱμορραγίας,
 εὐθείας μὲν πλὴν χειρουργίαν διε-
 μιῇ ἐγκλυζομένη, & ἔδραν παρ-
 5 πεπιωκῆσαν ἐγκλύζεται δὲ ἐπὶ
 τῶν μὲν νομῆς δυσεντερικῶν· δεῖ
 δὲ ἐπελχυματίξιν γάλακτι. κα-
 τορροφικῶν δὲ & ἀνασφαριζο-
 μένῃ βδέλλας κτείνει· σμήχει δὲ
 & πίτυρα & ἀχῶρας.

19 Πρὶ θυμοξάλμης. Κεφ. κλ'.

Θυμοξάλμη, ἣ ἐχθῶντο οἱ
 ἀρχαῖοι ἐπὶ τῶν ἀδενῶν τὸν σό-
 μαχον ἐχόντων. κατὰ τρεῖς ἢ
 τέσσαρας κνύδους παρὰ τὴν ὕδωρ
 διεκὼν κεραινωῦτες καὶ διδόν-

15 τες, καὶ ἐπὶ ἀρθριτικῶν & πνευ-
 ματουμένων. ἄγει δὲ παχέα &
 μέλανα. σκευάζεται δὲ οὕτω. θυ-
 μου λείου ὀξύβαφον, ἁλῶν ἴσον
 ἀλφίτων, πηλῆς, γλήχωνος, ἐκεί-
 σου ὀλίγον βαλὼν εἰς ἄγγος, ἐπὶ-
 20 χει ὕδατος κοτύλας ε'. ὀξους
 ἡμικοτύλιον παρὰ τρεῖς τε ὁδοῖον
 ἐξαιθρίαζε.

Πρὶ σκυλλητικῆς ὀξέος.

Κεφ. κέ.

Τὸ δὲ σκυλλητικὸν ὄξος σκευά-
 25 ζεται τῶτον τὸν τρόπον· κατὰ
 ρας λευκὴν σκύλλαν καὶ κατὰ
 τεμῶν καὶ διείρας λίνω ὥς τε
 μὴ διαγαίνειν πρὸς τόμοις ἀλλή-
 λων, ξεράνας ἐν σκιά ἐπὶ ἡμέ-
 ρας μ', λαβὼν μῆλιν μίαν ἐξ αὐτῆς
 χέει

& venenatos ictus auxiliatur.
 Sanguinis fluxiones post exci-
 sos calculos sistit, si statim cali-
 da in vulnus iniiciatur, & pro-
 ciduam sedem reprimit: dysen-
 tericis, si nomas sentiant, infun-
 ditur: oportet autem ex lacte
 instillare. Hirudines sorbitio-
 ne aut gargarizatu necat fur-
 fures, & manantia capitis vlce-
 ra extergit.

Thymoxalme. Cap. XXIII.

Thymoxalme veteres teba-
 tur, dabātq; laborātibus imbe-
 cillitate stomachi, ternos qua-
 ternosve cyathos, aqua calida
 dilutos, in articularib⁹ morbis,
 et inflationib⁹. Crassos humo-
 res, atrósq; trahit, Hoc modo
 factitat: Thymi triti acetabulū,
 falis idē mod⁹, rutæ, pulegij, po-
 lentæ, singulorū exiguæ portio-
 nes in vas coniiciuntur, aquæ
 terni sextarij, & aceti terni cy-
 athi infunduntur, & circūposi-
 to linteo sub dio madescunt.

Scillinum acetum.

Cap. XXV.

SCILLINVM acetum
 hoc modo fit: Scilla, quæ can-
 dida fuerit, expurgata concidi-
 tur, traiectaque lino segmenta
 modicis interuallis, ne se con-
 tingāt, siccātur in vmbra qua-
 draginta diebus: mina eorum

L iiii in

DIOSCORIDIS

in aceti boni sextarios duodecim immergitur, & vase diligenter operto septenis diebus in sole madescit: post cum numerum dierum scilla eximitur, & expressa abiicitur: defæcatum acetum transfunditur, & reponitur. Aliqui scillæ minā, quinque aceti sextariis miscent. Alij circa exiccationem repurgantes, parem mensuram adiciunt, & senis mensibus macerari patiuntur. Multo magis humorem sentitias digerit: gingivas humore prægnâtes collutione stringit firmatq; & motos dentes stabilit: putredines oris, & graues halitus tollit: durat fauces sorbitione, & callosas facit: vocem expedit, & lymphidâ canoramq; reddit. Datur stomachicis, ægrè cibum concoquantibus, melancholicis, comitialibus, vertiginosis, mēte captis: item vuluarum strangulationibus, lienis incremento laborantibus, ischiadicisq;. Imbecillos admodū recreat: corpus sanū reddit, & bonum colorē præstat: oculorum aciem exacuit: tarditatem quoque auriū infusione purgat. In sūma, ad omnia efficax. Cauēdum tamē in testinis exulcerationibus, in capitis dolore, aut neruorū vitiis.

Datur

κάθετος εἰς ξέσας ὄξους καλοῦ ἰβ' ἄφες τὴν ἡμέραν ζ'. βρέχεται, πομώσας τὸ ἀγγεῖον ἐπιμελῶς: μετὰ δὲ ταῦτα ἀνελόμενος πλὴν σκίλλαν καὶ ἐκπίσας, αὐτὴν μὲν ῥίπον: τὸ δὲ ὄξος ὑλίσσας, κατὰ γινίξῃ καὶ ἀποτίθεισθαι. ἔνιοι δὲ μὲν πρὸς ὄξους ξέσας ἐμίσχουσιν. οἱ δὲ, αὐτὸν καθάρισαντες διχα τῷ ξηρῶναι, τὸν σπυγμὸν ἴσον βάλλουσιν, καὶ ἕως μῆνας ε'. γίνεσθαι τὸ τοιοῦτον τμη- 10 πικώτερον. Εὐδετεῖ δὲ διακλυζόμενον, πρὸς ἕκα μυδῶντα σέλαλον καὶ σερρόπολιον αὐτά: καὶ ὀδόντας κινεμένας καὶ τὰς τοῦ σώματος σπινθῶνας καὶ δυσωδίας, ἰκανῶς ἀνασπένδον. κατὰ ῥ. φέ- 15 μνον τὸν τε βρόγχον σπέρσῃ καὶ πυλῶν ποιεῖ καὶ τὸν ἥχον εὐτονον καὶ λαμπερὸν ἀποτελεῖ. παρὰ λαμβάνεται δὲ πρὸς σωματικούς καὶ δυσπεπτοῦντας, ἐκληπτικούς, σκοτοδινηδόντας, με- 20 λαγχολικούς, ἀπικλιθιμένους: ἐπὶ δὲ καὶ πρὸς ὑστερικές πνίγας, καὶ σπληνίας ὑπὸ γόμοις καὶ ἰσχάδας. ἀναλαμβάνει δὲ καὶ τὸν λίαν ἀδυνεῖς καὶ τὸ σῶμα ὑγρὸν, καὶ εὐχρουν κατὰ σπένδῃ. 25 ἔστι δὲ καὶ ὀξύτερές: καὶ πρὸς δυσκοίαν ἐνταλῶναι δυνατὸν, ἐὰν ἐγκυματίζηται, καὶ κατὰ πρὸς ἀπαιδίαν ἐν ῥ. πλὴν ἐλκώσεων τῶν ἐν τοῖς κεφαλαῖς καὶ νευρικῶν.

δίδου

δίδου δὲ καὶ ἡμέραν ῥοφεῖν νή-
σει, πλὴν μὴ ἀπ' αὐτῶν ὀλίγου, κατα-
βραχὺ δὲ περισσῶς ἄχρη κυά-
θου. πῆγες δὲ κυάθους β' διδόν-
ται ἢ καὶ πλεον.

5 Περὶ Σκιλλινικοῦ οἴνου.

Κεφ. κς'.

Ο δὲ ἀπὸ τῆς σκίλλης οἶνος γί-
νεται οὕτως· κατὰ τεμνῶν ὡς εἴρη-
κα τὴν σκίλλαν, ξήρανον ἐν ἡλίῳ,
ἔπειτα κόψας αὐτῆς μὲν μίαν

10 καὶ διασῆσας λεπτῷ κοσκίνῳ, ἐν δη-
σον ὀδονίῳ ἀραιῶ, καὶ χάδης εἰς
γαλεύκους χαλοῦ καὶ περισσώτου ξέ-
σαις κ'. τεῖμηνόν τε ἔασον βραχυ-
ναι, μετὰ δὲ ταῦτα μετεράσας τὸν

15 οἶνον εἰς ἕτερον ἀργεῖον, ἀπόδου
ῥοφισθηκώσας ἐπιμελῶς. ἔστι δὲ
καὶ ὑπερὰ τῇ σκίλλῃ χρῆσθαι· ἐπι-
τέμνοντα αὐτὴν ῥογγυλίδος πρὸς
πὸν, καὶ πλὴν ὀλίγην διπλασιάσαν-
τα· δεῖ δὲ ἡλιάζειν ἐπὶ ἡμέρας
μ'. καὶ παλαιοῦν ἄραν. Ἐπὶ δὲ καὶ

20 οὕτω σκευάζεται ὁ περιεξημευμένος
οἶνος· λαβὼν σκίλλης ἐν τετμημέ-
νης καὶ κεκαυαρμένης μίας γ'.
χάδης εἰς γαλεύκους χαλοῦ μετε-
πλὴν ἰταλικόν, καὶ μίλλας ἐξ ἔασον
πωμασας· εἴτα ὑλίσας καὶ με-

25 τεράσας ἀπόδου, ἐν δὲ τετὰ δὲ
πρὸς ἀπεψίας καὶ διαφθοράς
προφῆς, καὶ τὰς ἀπεμουῦντας ταύ-
την. ἐφ' ὧν τε πάχος κοιλία πα-
ράκειται ἢ σωμαχί, σπληνικοῖς
καὶ γαστέροις, καὶ ὑδρωπικοῖς,

ἰκτε-

Datur quotidie ieiunis forben-
dum, inter initia exiguum, pau-
latim adaugendo, ad cyathum
vsque. Nonnulli binos dāt cya-
thos, aut largius.

Scillinum vinum.

Cap. XXVI.

Scillinum vinum fit hoc mo-
do : Dissectam, vti dictum est,
scillam, & sole siccata contun-
dito, minam eius tenui cribro
incernito, & linteo raro illiga-
tam, in vicanos sextarios mu-
lfi recētis ac boni demergito :
vbi trimestri spatio maduerit,
elutriatum vinum, obstructo
diligenter vase, recondito. Li-
cet quoque sic humida scilla
viti : In orbiculos rapi modo,
dissectam duplicato pondere,
quadraginta diebus in solari o-
portet, & valde inueterascere.
Alia parandi ratio : Scillæ dis-
sectæ & repurgatæ tres minas,
in Italicam metretā mulfi de-
mittito, & fenos menses in va-
se obstructo macerari finito :
post id tempus defæcatum &
excolatum vinum recondito.
Vtile est cōtra cruditates, & ci-
borum corruptiones : itē iis qui
reuomūt cibum, et si pituita in
ventre, aut stomacho coierit.
Prodest lienosis, malè habitis
corporibus, aquæ inter cutem,

regio

DIOSCORIDIS

regio morbo, difficili vrine, tor-
minosis, inflationibus, resolu-
tioni neruorum, horroribus
longis, vertiginosis, & vulfis.
Menses pellit, miniméque ner-
uos infestat. Hoc vinum vetu-
state fit melius. Cauendus in
febre vſus, aut si interanea vl-
cus sentiant.

Marina vina:

Cap. XXVII.

Marina variè factitantur: A-
liqui enim statim quum decer-
ptæ sunt vxæ, aquam maris ad-
miscunt. Alij in area vuas sole
ficcant: quibus calcatis, mari-
nam adiiciunt. Alij passas prius
vuas in doliis marina aqua ma-
cerât, mox calcatas exprimūt:
id magis passi generibus ad-
scribitur. Quæ tamen austerio-
re gustu temperantur, contra
februm aduétantium indicia
valent, si modo meliora non
adsint: aluum subducunt: pro-
sunt purulenta extusſientibus,
aut si dura alu^o exerceat. Quæ
ex Aminæis vuis fiunt, caput
tentât, stomacho aduersantur,
flatus creant. Verùm quo ple-
nior habeatur historia, iis qui
huius studio tenentur, non in-
utile existimamus varias vino-
rum compositiones adferre,
non

ἰκτερικοῖς, δυσουρεῦσι, σφοδραῖ-
νοις, πνεύματου μύθοις, παραλυ-
πκοῖς, ῥίγασι χρονοῖς, σκοτωματι-
κοῖς. σπασμοῖσι, κατὰ μύθω τὴν
ἀγῶγῆς. ἥκιστα δὲ νεῦρα λυπεῖ,
ἀμείνων δὲ ὁ παλαιότερος. φυ-
λάσσεσθαι δὲ δεῖ αὐτὴν τὴν χεῖ-
ρὸν ἐν τε πυρετοῖς, καὶ ἐπὶ τῶν ἐν-
τὸς ἐχόντων ἔλκος.

Περὶ Θαλασσίων οἴνων.

Κεφ. κζ'.

Οἱ δὲ διὰ θαλάττης οἶνοι, πε- 19
κύλως σκευάζονται· οἱ μὲν γὰρ ἐν-
δέως αὐτῶν μετὰ τὸ πρυμνῶ-
ναι τὴν σαφυλὴν, μνηνοῖσι δά-
λασαν. ἔνιοι δὲ περιδείλοπτε-
οῖσι· καὶ οὕτω πατοῦσι μνηνώ-
τες δάλασαν. οἱ δὲ, σαφιδώσαν- 15
τες τὴν σαφυλὴν, βρέχουσιν ἐν
πίδοις μετὰ θαλάσσης, καὶ οὕτω
πατοῦντες ἐκθλίβονται· γίνεται ὅ
τοῖστος γλυκύς. οἱ μὲν τοι γε πρὸς
τὴν γῆσιν ἀνσηρότερον σκευα-
ζόμενοι, ποιοῦσι καὶ πρὸς πυ- 20
ρετῶν παρὰ σκευὴν εἰ μὴ παρὲν
ἀμείνοις, καὶ πρὸς κοιλίας ὑπα-
γῶγῃ, καὶ ἐμπύοις, σκληροκοι-
λίοις, καὶ ὅσοι ὑπὸ τῶν ἀμιναι-
ῶν λαύονται κεφαλῆς. κακοσό-
μαχοι μὲν τοι καὶ οὗτοι καὶ πνευ- 25
μάτων θνητικοί. Οὐκ ἀχρηστον
δὲ ὑπογράψαι νομίζομεν πρὸς
τὸ πλῆρη τὴν ἰσορείαν τοῖς φι-
λισοροῦσι γινέσθαι καὶ τὴν τῶν
πικυλοτέρων οἴνων σκευασίαν,
οὐχ

ἐν ἑκαστῇ πολλή τις ὄσιν ἢ ἀνα-
 γαία ἢ χεῖρας αὐτῶν, ἀλλ' ἵνα κα-
 τὰ μὲν αὐτῶν ἐλλείπῃ δοκῶ-
 ρη. εἰ δὲ αὐτῶν ἐνιοί, ἢ πον πε-
 εῖργοι καὶ ἀπὸ ποντες εἰς τὴν χεῖ-
 ριν ὡς ὁ διὰ τῶν κυδωνίων καὶ ἀ-
 πων καὶ κεραπίων· ἐπὶ δὲ καὶ ὁ διὰ
 μύρτων σκευάζομαι.

Περὶ Κυδωνίου οἴνου.

Κεφ. κθ.

Ο μὲν κυδωνίτης ὃν ἐνιοί μη-
 λίσιν καλοῦσι, σκευάζεται οὕτω·
 μύλων κυδωνίων ἐξελθὼν τὸ σπέρ-
 μα καὶ τεμὼν ὡς γογγυλίδι. εἰς
 μεβρίτην γλεύκος, χάλασον μὲν
 ἴσ'. πρὸς ἡμέρας λ', εἴτα διυλί-
 σαι ὑπόδου. σκευάζεται δὲ καὶ
 οὕτω· δεῖ μετὰ τὸ κόψαι καὶ ἐν-
 δελῆσαι τὰ κυδωνία, τοῦ χυλοῦ
 τούτων μύξα τοῖς ἴσ' ἕξασαι, ἕνα
 ἕξιν μάλιστα, καὶ οὕτω χεῖρ ἀ-
 ποδέδαι. ἐστὶ δὲ συπληκός, ἐν-
 σόμαχος, δυσεντερικός, ἐν-
 ζών, ἡπατικοίς, νεφρικοῖς τε,
 καὶ δυσουρῶσι.

Περὶ Μελόμελιτος. Κεφ. κθ'.

Καὶ μολόμελι δὲ ὁ καὶ κυ-
 δωνόμελι ὀνομάζεται, σκευάζε-
 ται οὕτω· μύλων κυδωνίων ἐξαι-
 ρῶν τὰ σπέρματα καὶ βλη-
 θέντων εἰς μέλι ὅππῃ πλείον, ὡς
 τε ἐν σφλωδῶσαι γίνεται πρὸς
 μετ' ἐνιαυτὸν, οἰνομέλιτι ἐοι-
 κός. ἀρμόζον πρὸς ἅ καὶ ἡ πρὸ αὐ-
 τῶ σκευασία.

Περὶ

non quod frequēs eorum aut
 necessarius existat vsus, sed ne
 quid omisisse videamur, quod
 ad eorum rationē attinet. Sunt
 autem quædam ex iis factitia,
 minoris curæ ac impēdij, quæ
 cadunt in vsus: vti quæ ex co-
 toneis, malis, pyris, filiquis, itē
 myrti baccis componuntur.

Cydonites. Cap. XXVIII.

Cydonites nomine alio me-
 lites appellat, & ita fieri cōsue-
 uit: Mala cotonea exēptis femi-
 nibus, frustatim rapi modo scin-
 duntur, & duodecim minarū
 πόδο, in multi metretā, trigin-
 ta diebus maceratur, postea de-
 fecatū vinū reponitur. Alia fa-
 ciendi ratio: Oportet ad singu-
 los mellis sextarios, denos succi
 cotoneorū tusorū pressorū-
 q; adicere, & ita recodere. Vi-
 nū hoc adstringit: pdest stoma-
 cho, dysenterix, hepaticis, renū
 vitis, & urinæ difficultati.

Melomeli. Cap. XXIX.

Melomeli, quod & cydo-
 nomeli nominant, sic fit: Co-
 tonea mala feminibus suis ca-
 strata, in quamplurimum mel-
 lis, quo penitus demersa con-
 tegantur, coniiciuntur: id post
 annum mitescit, multo nō dis-
 simile. Præstat eadem quæ su-
 perior compositio.

Hydro-

Hydromelum.

Cap. XXX.

Fit hydromelon duabus mē-
suris aquæ coctæ, & sub cani-
culæ sydus insolatæ, additis ad
vnam melomelitis facti ex co-
toneis. Vis huius eadem est.

Omphacomelites.

Cap. XXXI.

Omphacomelitis faciēdi ra-
tio hæc est: Acerbæ vix adhuc
immature, & tribus diebus in-
solatæ exprimuntur, & ad ter-
nas succi partes mellis optimi,
despumati singulæ partes adii-
ciūtur: & insolatur in vasa trāf-
fufum. Vim reprimendi ac re-
frigerandi habet: stomachicis
coeliacisq; conuenit. Vfus post
annum est.

Apiites. Cap. XXXII.

Fit & è pyris, perinde atque
cotoneis, vinū, apiites nomine,
sed ita vt pyra nō magnopere
maturefcant. Ex siliquis etiam,
mespilis, forbis, simili modo té-
peratur. Omnia hæc genera a-
cerba sunt, & adstringunt: sto-
macho vtilia sunt atque inte-
stinas fluxiones cohibent.

Oenanthinū. Cap. XXXIII.

Fit è feraci vite syluestri,
quod vocatur œnāthinū: Sicci
flores minis duab⁹ musti cado
macerati, post triginta dies mu-
tantur,

Πεὶ τὸ δρομήλου. Κεφ. λ'.

Τὸ δρομήλον ὃ σκευάζεται ἐκ
μύρου ἑκ τῶν κυδωνίων μυλομέλι-
τος μεβήτης ἐνὸς πρὸς β' μετρη-
ταὶ ἀφ' ἡμετέρου ὕδατος καὶ ἡλια-
ζομήλου ἐν τοῖς ὑπὲρ κύνα. Δύ-
ναμις δὲ καὶ τοῦτου ἡ αὐτή.

Πεὶ Ὀμφακομέλιτος.

Κεφ. λα'.

Ὀμφακομέλι δὲ σκευάζεται ἐκ
τον τῶν τρόπων λαβὼν ὀμφακας μύ-
πω παρκαζούσας, ἡλίαζε ἐπὶ ἡμέ-
ρας γ'. καὶ μετὰ ταῦτα ἐκδιήλας,
βδέκε πρὸς γ' μέρη τῶν χυλῶν μέλιτος
καλλίστου ἀπιφεισμένου μετρητῶ
μέρους ἓν καὶ ἡλίαζε καταγίσις
εἰς κεράμοις. Διῶαμιν δὲ ἔχει
σαλπιγγὴν, ψυκτικὴν ὅθεν ἀρμόζει
στομαχοῖς, κοιλιακοῖς. ἡ χεῖρος
δὲ αὐτῆς μετ' ἐνιαυτόν.

Πεὶ ἀπίτου οἴνου. Κεφ. λβ'.

Απίτης σκευάζεται ὁμοίως,
ὡς πρὶν καὶ ὁ κυδωνίτης, μὴ λίαν
δὲ ἔστωσαν οἱ ἀπίοι πέπειροι. καὶ
ὁ τῶν κερατίων δὲ καὶ ὁ τῶν με-
σπίλων καὶ οὔων, ὁμοίως σκευά-
ζεται. παῖτες δὲ εἰσὶ συππικαί,
σφυφνοί, ἐυστόμαχοι, ῥώματα ἔχ-
ον ἐπέχοντες.

Πεὶ οἶνον θίνου.

Κεφ. λγ'.

Ὁ ὃ οἶνάνθος σκευάζεται ἐκ
λαβὼν τῶν ἀρχαῖας ἀμπέλων τὸ αἶ-
θος βρυέσις ξηρὸν μὲν β'. εἰς με-
βήτιν γλεῦκοις πρὸς ἡμέρας λ'.
εἶτα

ἔτα διυλίσας ἀπόδου. ποιεῖ δὲ
πρὸς ἀλογίαν σωμαχῶ, ἀνορεξίαν,
κοιλιακοὺς, καὶ δυσεντερικοὺς.

Περὶ Ροῖτου οἴνου.

Κεφ. λδ'.

- 5 Ο ροῖτης δὲ οἶνος σκευάζεται
οὕτως· ῥόας ἀπυρλῦοις λαβὼν ὡ-
εῖμοις καὶ ἀποθλίψας τὸν χυ-
λὸν τῶν κόκκων ἀπόδου, ἢ ἀφε-
ψήσας εἰς τρίτον οὕτως ἀποτίθει-
το· ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ ἐν τῷ ρεύ-
10 ματι καὶ πυρετὸς ῥοδόδεις· ἔστι
δὲ εὐσώμαχος καὶ σερηωτικός κοι-
λίας, καὶ οὐρητικός.

Περὶ Ροδίτου οἴνου.

Κεφ. λε'.

- Ροδίτης δὲ ἔτω σκευάζεται ῥό-
15 δων ξηρῶν κεκομμένων μετὰ μίαν
ἐνδύσας εἰς ὀθόγιον, καθεὶς εἰς γλεύ-
κοις ξέσας ἢ μετὰ δὲ τρεῖς μῆ-
νας διυλίσας μεταγίγξει καὶ ἀποτί-
θει. χρήσιμος ὃ ἀπυρέτεις, πρὸς
σωμαχοῦ πέψεις καὶ πόνους ἐπιπ-
20 νόμους, πρὸς τε κατάρχεις κοι-
λίας καὶ δυσεντερίας· σκευάζεται
δὲ καὶ διὰ χυλοῦ ῥόδων, καὶ μέ-
λιτος μυρμηδῶου, ὃ καλεῖται ῥο-
δόμελι, ἀρμόζει πρὸς τὰς ἐν ἀρ-
τηρίᾳ τραχύτητας.

- 25 Πρὶ Μυρτίτου οἴνου. Κεφ. λς'.

Μυρτίτης δὲ σκευάζεται ἔτω·
δεῖ μύρτα μέλανα παρακμάζον-
τα λαβόντα, κόπην καὶ ἐκθλίβειν ἢ
χυλὸν δι' ὄραν καὶ κατὰ γίγειν.
ἔτιοι δὲ καὶ ἀφεψάσθην εἰς τρίτον,
οἱ δὲ,

tantur, mox colatum vinū re-
cōditur. Facit aduersus stoma-
chi imbecillitatē, cibi fastidia,
coeliacos, & dysentericos.

Rhoetes. Cap. XXXIII.

Fit è punicis malis maturis
quod rhoeten nomināt, succo
expresso ab acinis eorū, quib⁹
lignosus nucleus abest, apyre-
na vocant, ac decocto ad ter-
tias, & ita reposito. Efficax est
cōtra fluxiones internas, & fe-
brim cū alui profluvio exor-
tam: stomacho vtile: astringit
aluum, & vrinam mouet.

Rhodites. Cap. XXXV.

Rhodites sic fit: Rosarū sic-
carum tusarūque minā lin-
teolo deligatam in sextarios
octo musti demergito: & post
tres menses, defæcatum vinum
transfundens, recondito. Vtile
iis qui feбри carent, & ad sto-
machi coctiones, & dolores à
cibo potum, & cōtra humidas
aluos, & dysenterias. Fit quoq;
ex succo rosarū, addito melle,
quod rhodomeli vocant, quod
arteriæ scabritiis conuenit.

Myrtites. Cap. XXXVI.

MYRTITES fit, baccis
nigris, quæ maturitatem exce-
sserint, tufis, & organo expres-
sis. Aliqui ad tertias coquunt.

Alij

Alij baccas prius sole torrent,
& quaternis sextariis contusa-
rum, ternas aquæ heminas adii-
ciunt, & vini veteris paré mo-
dum postea exprimunt, & ser-
uiant. Magnopere adstringit:
stomacho vtile: fluxionibus vé-
tris ac stomachi prodest: & có-
tra intestinas vlcerationes, &
profluuia: denigrat capillos.

Myrsinites. Cap. XXXVII.

Myrsinites sic téperatur: Ra-
mi nigræ myrti cú suis baccis
& foliis tusi, decem minarum
pondo, in tribus musti congiis
feruescunt, donec duo super-
fint, aut certè dimidium: id vi-
num colatum ad vsus recondi-
tur. Contra furfures, vlcera in
capite manátia, eruptiones pa-
pularum, gingiuas, tonsillas, &
purulentas aureis efficax est:
sudores sistit.

Lentiscinum.

Cap. XXXVIII.

Lentiscinú similiter vt myr-
sinites temperatur.

Terebinthinum.

Cap. XXXIX.

Nec fecus terebinthinú para-
tur. Nanq; bacciferi eorú rami
fumi debét. Similes insunt vi-
res: adstringunt, stomacho ac-
cómodantur, & defluxionibus
inte-

οἱ δὲ, καὶ περιθειλοπτε δύνουσιν ἐν ἡ-
λίῳ, καὶ ξηραίναντες μίσχουσιν τῇ
χρίνῃ κοπίσῃ, τρεῖς κοτύλας ὕ-
δατος καὶ οἶνε παλαιῷ τὸ αὐτὸ, ἔ-
τω τε ἐκθλίβουσι καὶ ἀποτίθενται.
ἰκανῶς δὲ ὅτι συμπικρὸς καὶ εὐσώ-
μαχος, ρευματιζομένη τε σωμα-
χαὶ καὶ κοιλία. χρήσιμος πρὸς τε
ταῖς ἐν τοῖς ἐλκώσεσι καὶ ροῦν· με-
λαίνει δὲ καὶ τείχας ἐν κεφαλῇ.

Περὶ Μυρσινίτου οἴνου.

Κεφ. λζʹ.

10

Μυρσινίτης δὲ σκευάζεται οὕ-
τω· δει λαβόντα τῶν μελάνων
μυρσινῶν τὸν ἀκρέμονα καὶ τὰ
φύλλα συν τοῖς μύρτοις κόπῃν,
καὶ βάλλῃν εἰς τὸν τρεῖς τ' γκεύ-
κοις χράς, τῆς μυρσίνης κακομέ-
νης μιας ἑ. καὶ ἔλῃν ἄρχῃς αὐτὸ δύο
ὑπολειφθῶσιν ἢ τὸ ἥμισυ, καὶ δι-
λίσαντας ἀποτίθεσθαι. ποιεῖ δὲ
οὗτος πρὸς τε ἀχῶρας καὶ πῖ-
τυρα, ἐξαιδήματα, οὖλα, πα-
είδημα, ὅσα πυορροῦντα· σέλ-
λει καὶ ἰδρωτάς.

Πρὶ Σχινίνε οἶνε. Κεφ. ληʹ.

Καὶ ὁ σχίνος δὲ εὐκότως τῇ
μυρσινίτῃ σκευάζεται.

Περὶ Τερεμινθίνε οἴνου.

Κεφ. λθʹ.

25

Καὶ ὁ τερεμίνθινος ὁμοίως ἐγ-
χαρτοὶ γὰρ καὶ τούτων οἱ ἀκρέ-
μονες λαμβάνονται. καὶ παρὰ
πλησίως εἰσὶ δυνάμειος, συμπι-
κοὶ καὶ εὐσώμαχοι, ρευμασί τε
ἀμύ-

ἀφ' ὧν τινες σωμαχου, ἐντέρων, κύστεως, αἱμορροΐας· καὶ ἐλκῶσι δὲ καὶ τὰ ρευματικὰ πάντα ἔλκω· πατῆλου μύροι· τοὺς τε περὶ ὕδατος καὶ ἔδραν ρευματισμοὺς σέλωσι· ἐν γὰρ διζύμοις.

Περὶ Φοινικίου τοῦ οἴνου.

Κεφ. μ.

Φοινικίτης· λαβὼν φοίνικας τὰς χυδαίας πεπεύργας, βάλε εἰς πιδάκιον τετρακτύριον ἐν τῷ πυθμύρι, καὶ ἐσφλωμώριον καλὰ μω πεπίσσω μύριον· τὸ δὲ τῆμα λίαν βεβύδω, ἐπίχει δὲ τοῖς δέκα χροῖνιξιν ὕδατος χόας γ'. εἰ δὲ μὴ λίαν αὐτὸ γλυκύ θέλῃς εἶναι, πέντε χόας ἐπίχει· ἕα δὲ ἐπὶ ἡμέρας 15 ἰ. τῇ δὲ ἰα. ἀφαιρῶν τὸ ἀπὸ τοῦ χαλάμου ὁδόνιον, ἀπὸ δέχου οἶνον παχὺν καὶ γλυκύον καὶ ἀποτίθει· σο. Ἐστὶ δὲ ἡδὺς μύριον, κεφαλαιώδης δὲ· ποιεῖν περὶ ρεύματα διὰ τὸ σύμφαν' ὅθεν σωμαχικοῖς, καὶ κοιλιακοῖς, καὶ αἱμοπτοικοῖς, καὶ ἀφ' ὧν 20 ζει· ἐνιοὶ δὲ τὸ αὐτὸ πάλιν ἔ' ὕδατος μίσχοντες δέχονται, καὶ τὸ το πέριτον ποιοῦσι, καὶ τέταρτον, καὶ πέμπτον, ὅτε λοιπὸν ὀξίζει.

Περὶ Κατορχίου τοῦ οἴνου. Κεφ. μά.

Καὶ ὁ κατορχίτης δὲ, ὃν ἐνιοὶ σικήτην καλεῖσιν, ἐν κύπρῳ σκευάζεται· ὁμοίως τῷ φοινικίτῃ διαφέρει· ὅτι ἐπὶ τῆς ἐνιοὶ ἀντὶ ὕδατος, σερμφύλων ἀποβρεγμα γεοθλίπτων, τὸ ἴσον μέτρον βάλλουσιν. 194-

intestinorum, vesicæ, & stomachi, & sanguinis profluuium: vlcera omnia fluxionibus obnoxia, motu ad cicatricem perdunt: fluxiones vulvæ ac sedis, infessione cohibent.

Palmeum vinum.

Cap. XL.

Palmulas maturas, quas vocant chydæas, in vrcolum imo pertusum, & obstructum picata arundine, demittito: lino foramen fit obturatum, & quadragenis sextariis ternos aquæ congios infundito: quod si ipsum ita dulce esse non libeat, quinque congios infudisse satis est. post decem dies detracto ab arundine linteo, assumito vinum crassum & dulce, & reponito. Suaue illud quidem, sed capiti noxiū: contra fluxiones, propter adstrictoriā vim, efficax: stomachicis, coeliacis, sanguinem expuentibus conuenit. Aliqui idē addita aqua iterum capiunt, & tertio, quarto, quinto, sextoque faciunt, quod tandem a core vitiatur.

Catorchites. Cap. XLI.

Catorchites, aliquibus fycites vocatur, in Cypro fit, ita ut palmum: sed hoc interest, quoniam pro aqua tantum humoris adiiciunt, in quo recent pressa vinacea maduerint.

Cari-

Caricæ quæ chelidoniæ, aut phoeniceæ appellantur, præfertim nigraë macerantur, vti diximus, & post decem dies humor excipitur, atque iterum aut tertio, idem modus aquæ in qua vinacea maduerint infunditur: simili modo intercedete spatio, quarto aut quinto assumitur. Demaceratarum liquor non secus acoré contrahit, & aceti vsum præbet. Id tenue est: flatus gignit, stomacho aduersatur, fastidiū parit, aluo tamen prodest, urinā ciet, menses trahit, lactis vbertatem facit, vitiosum sanguinem creat, & elephantiasin adfert, vt portio quam zython appellamus. Aliqui sex amphoris: decem salis sextarios adiiciunt. Alij muriaë amphoram: quod non facile vitiat, & aluo idoneum fore censent. Alij thymum & foeniculum imo subiiciunt, & caricæ superponunt: & ita vicissim, donec vas expleuerint.

Vinū è fycomoris factū.

Cap. XLII.

Fit & è fycomoris eodē modo vinū, sed in acetū acre degenerat: quoniā non ita præualet vis eorum, vt fluentis liquoris dulcedinem retinere possit.

Refi-

ἰσχύες δὲ λαμβάνονται αἱ χελιδόνιοι καλούμεναι, ἢ φοινικαί, μέλαιναί δὲ εἰσὶ καὶ ἀποβρέχονται ὡς περιείρηται, μετὰ δὲ ἡμέρας δέκα ἐκλαμβάνεται τὸ ὑγρὸν, καὶ ἐν δευτέρῳ καὶ τρίτῳ ἐπιχέται, τοῦ ἐν τῶν σεμνύλων ἀποβρέγματος τὸ αὐτὸ μέτρον. ὁμοίως δὲ ἐν διασημάτων ἐκλαμβάνεται τὸ δ'. καὶ ἐκ ἀποβρέγματος ὁμοίως ὀξύζον, ὃ ἀντὶ ὀξέως χέωνται. Δεπτομέρης δὲ ὅστι καὶ φυσώδης καὶ κακός μαχρός, ἀποσρέφων ὀρέξιν, ἐνκοιλίῳ μὲν τοι καὶ οὐρητικὸς, κατασπῶν δὲ καὶ ἐμμύνα, καὶ γάλα δαψιλὲς ποιεῖ, αἷμα δὲ φαῦλον κατασκευάζει, καὶ ἐλεφαντιάσιως ὅστι ποιητικόν, ὡς καὶ τὸ ζῦθος, ἐνίοι δὲ καὶ ἄλλων τοῖς ἐξ κεράμιοις ξέστis ἐμβάλλουσι δέκα. οἱ δὲ, ἄλλης κεράμιον. δυσμετάβλητον καὶ ἐνκοιλίον ἔσθαι διανοήμενοι. οἱ δὲ, καὶ δύμον καὶ μάραθρον προστίθεται τῷ πυθμένι, εἶτα τὰς ἰσχύδας, καὶ ἐναλλάξ τοῦτο ποιοῦσιν ἄχρις αὖτε πληρώσωσι τὸ ἀγγεῖον.

Περὶ Συκομορείου οἴνου.

Κεφ. μβ.

Σκευάζεται δὲ καὶ ὁ ἐν τῶν συκομύρων ὡσάντως, ὅξος δὲ γίνεταί δριμύ, διὰ τὸ μὴ ἐξικχύειν τὴ δύσιν αὐτῶν φυλάσσειν πλὴν γλυκύτητα τῆ φύσεως.

Περὶ

Πεὶρ Ῥητινίου οἴνου.

Κεφ. μγ'.

Ο δὲ Ῥητινίτης καὶ κατὰ τὰ
 ἔστιν σκευάζεται· ὡλεονάζει δὲ
 ἐν γαλατῇ διὰ τὸ ἀποξηρῶσαι
 τὸν οἶνον ἀπεπαίτου μύρουσιν τῆς
 σαφυλῆς, διὰ τὸ ψύχειν, εἰ μὴ
 παρὰ πλῆκῃ περικύβη. κόπτεται
 δὲ σὺν τῷ φλοιῷ ἢ Ῥητίνῃ, καὶ
 τῷ κέρας μίω μίγνυται ἡ μικρό-
 λιον. καὶ οἱ μὲν, ἀπιδούσιν μετὰ
 10 τὸ ἀποξέσαι χερίζοντες τὴν Ῥη-
 τίνην. οἱ δὲ, ἔως. παλαιωθέν-
 τες δὲ γίνονται ἡδεῖς. Πάντες
 δὲ κεφαλαγχεῖς οἱ τοιοῦτοι καὶ
 σκοτωματικὴ, πεπτικοὶ μὲν τοι
 καὶ οὐρητικοὶ, κατὰ ῥοιζομύροις
 15 καὶ βήσσοισιν ἀρμόζοντες κοιλια-
 κοῖς, δυσεντερικοῖς, ὑδρωπικοῖς,
 καὶ ροϊκάς γυναιξί· τοῖς δὲ ἐν
 βιάδει εἰλωμένοις ἑλκυσμασυν-
 πικώτερος μὲν τοι τοῦ λευκοῦ ἔ-
 στιν ὁ μελανίζων.

20 Πεὶρ Στροβιλίου τοῦ οἴνου.

Κεφ. μδ'.

Στροβιλίτης δὲ σκευάζεται ἐνα-
 ποβρεχομύρων τῷ γλεῦκει στροβύ-
 λων προσάπων ἢ τεθλασμένων.
 ποιεῖ ὅ τὰ αὐτὰ τῷ Ῥητινίτη, ἐὰν
 25 δὲ γλεῦκει ἐναποβρέξας τῆς τοῦ
 στροβίλου ἐψήσῃ, ἀρμόζει ἢ φθι-
 νώδεσιν ἰκανῶς πινόμενος.

Πεὶρ Κεδρίνου. Κεφ. μέ.

Ο ὅ κέδρεος ἢ ἀρκύδινος, ἢ κυ-
 πέριστος, ἢ δάφνηος ἢ πιτύινος, ἢ
 ἑλκ.

Refinatum vinum.

Cap. XLIII.

Refinatum vinū populatim
 fa citari solet: copiosum in Ga-
 latia: quoniā vinum illic coa-
 cescat, vna non maturescente,
 ob coeli algoré, nisi picea re-
 fina temperetur. Refina autem
 cum cortice tonditur, & am-
 phoræ dimidiata hemina per-
 miscetur. Aliqui vbi efferbuit,
 excolant, separantes refinā: alij
 relinquūt. Hæc vina vetustate
 dulcescunt, Omnia capitis do-
 loré, & vertigines faciunt, con-
 coctionē tamen adiuuant, &
 vrinā cient: tussientibus, ac de-
 stillatione vexatis conueniunt:
 item coeliacis, dysentericis, &
 hydropicis, & foeminis fluxio-
 ne vuluæ laborātibus: altis ex-
 ulcerationibus. infunditur. In
 hoc autē genere nigricans ma-
 gis albo constringit.

Strobilites. Cap. XLIIII.

Strobilites fit maceratis in
 musto nucibus, pineis, recenti-
 bus fractisq;, præbetq; refinati
 effectus. Si quis madefactas nu-
 ces pini musto decoquat, po-
 tum affatim conuenit iis, qui
 tabitudine conficiuntur.

Cedrinum vinū. Cap. XLV.

Cedrinum, iuniperinum, cū-
 pressinū, laurinum, pineū, autē
 M abiegnū

abiegnum, simili ratione fiunt. Diuifos recenter ramos, cū fructum ædūt, aut foli, aut balneo, aut igni, admouere oportet, vti confudent, congioque vini minam vnā permiscere, & post duos menses transfundere, & antequā recondantur, in solare. Factitiorum vinorum vasa impleri debet: nanq; non plenis vasis, vina in acorē corrumpuntur. Medicata autē vina, rectē valentibus infalubria. Omnia excalfaciunt, vrinam cient, & substringūt. Laurinum tamen vehemētius excalfacit. Fit quoq; ē fructu cedri maioris vinum, congio muniti, adiecta tusarum baccarum selibra: diebus quadraginta in solari debet, & defæcatum in vasa transferri.

Vinum ē iuniperis.

Cap. XLVI.

Fit etiam vinum ē baccis iuniperi, non aliter quā cedrites, & ad eadem valens.

Cedrites. Cap. XLVII.

Cedrites hoc modo fit: Cedriā dulci aqua lauāt, & singulas amphoras singulis cyathis diluūt, & ita musto replēt. Hoc genus vini excalfacit, extenuat, tussi antiquæ vtile sine febre, pecto-

ἐλάπνος, σκευάζεται ὁμοίως. καὶ γὰρ τὰ ξύλα νεότευκτα χρίζονται, ὅτε τὸν καρπὸν ἐκδίδωσι, πρὶν αὖ πρὸς ἥλιον ἢ ἐν βαλανεῖω, ἢ ἐν πυρὶ ὥς τε σιωδρῶσαι, καὶ μύσγειν τῷ χορὶ τοῦ οἴνου μίαν κατὰ μίξανταί τε ἔαν μιλῶας β'. εἴτα μεταγγίζειν, καὶ ἡλιάσαντα ἀποτίθει. πλεονεξῶν δὲ τὰ ἀγνῆτα τῶν σκευῶν οἴνων ἀποξυώνει γὰρ τὰ ἀποκεῖνα. ἄδειτοι μὲν τοὶ οἱ φαρμακώδεις οἶνοι τοῖς ὑγείνοισι. Σερμαπτικοὶ δὲ πάντες, οὐρετικοὶ, ὑποσύφονοι. ὁ μὲν τοὶ δάφνηνος Σερμαπτικώτερος. γίνεται ὅ καὶ ἐκ τοῦ καρποῦ τῶν μεζόνων κέδρων οἶνος, δεῖ δὲ τῷ χορὶ τοῦ γλεύκους ἡμιμυαῶν κεκομμένων τῶν κεδρίδων μίξαι· ἡλιάσαι τε ἐφ' ἡμέρας μ'. καὶ δὲ ταῦτα διυλίσιν, καὶ μεταγγίζειν.

Περὶ Ἀρκυδοδίου οἴνου.

Κεφ. μς.

Γίνεται καὶ ἐκ τῶν ἀρκυδοδίων καρποῦ. ὁμοίως τῷ κεδρίτη τὰ αὐτὰ ποιῶν.

Περὶ Κεδρίτου. Κεφ. μζ.

Κεδρίτης δὲ γίνεται οὕτω· κεδρίαν πλυῶντες ὕδατι γλυκεῖ, διακλύζουσιν ἕκαστον κεράμιον κλάδῳ ἐνὶ, καὶ οὕτω πληρῶσι γλεύκοις. Σερμαπτικὸς δὲ, καὶ οὕτως γίνεται καὶ λεπταπτικὸς, βηχὶ παλαιῶ ἀμύζων διχα πυρετῶν, καὶ πό-

καὶ πόνοις θώρακος, πλευρῶν,
σπρόποις, ἔλκεσι τοῖς ἐν κοιλίᾳ,
καὶ ἐντέροις, ἐμπνίκοις, ὑδρω-
πικοῖς, ὑστερικῶς· ποιεῖ καὶ πρὸς
ἐλμυνδας, καὶ πρὸς ῥίγη· βοη-
5 δει θηριοδύκτοις καὶ ἐρπετὰ
κτείνει· ὠταλγίας τὲ ἐνσαζόμε-
τος ἰάται.

Περὶ Πισνίου οἴνου.

Κεφ. μί.

Οἶνος πισνίου σκευάζει· διὰ
10 πύσης ὑγρᾶς, καὶ γλεύκοις. δει δὲ
τὴν πύσιν πρὸς τὸν πλυμνὸν θα-
λάσῃ ἢ ἄλλῃ ἐφ' ἱκανὸν μέγρις
ἀν' λευκανθῇ, καὶ ἡ θαλάσσα χαλα-
ρὰ ὑπορρέῃ, ἐπειτα ὑδαπ γλυ-
κεῖ· καὶ τοῖς ἢ χροῦσι μύσγειν οὐγ-
15 γίας πύσης α· ἢ β'. καὶ ἑᾶν· καὶ δὲ
τὸ ἀναλίσσει καὶ καταστῆναι καταγ-
γίλει· ἐστὶ δὲ θερμαντικὸς, πεπτι-
κὸς, σπληνικὸς, ἀνακαταρπικὸς·
εὐδαιμονιστὸς τοῖς πρὸς θώρακα, κοι-
λίαν, ἥπαρ, σπλῆνα καὶ ὑστέρας πό-
20 νοις, δόχα πυρετοῦ, καὶ χροῖοις
ρεύμασι, καὶ ἐλκώσεσι τοῖς ἐν βά-
δει· ποιεῖ καὶ πρὸς βήχας, βράδυ-
πνέας, πνευματώσεις, ἁδμα-
τα, καὶ πρὸς σπέρματα δὲ μάλ-
λον μετ' οἷου πηρῶν ἐείων.

25 Περὶ Ἀψινθίου οἴνου. Κεφ. μθ'.

Ἀψινθίου ποικίλως σκευά-
ζεται. οἱ μὲν γὰρ τοῖς μί. καὶ ἡ ἐξέ-
στας τ' ἰταλικῶν κεραμίων, μίξαν
τες ἁψινθίου πνικτοῦ λίτραν μί-
αν ἐφοῖσι μέχρι τὸ γ' ἀπολιφθῇ.

ἐπειτα

pectoris laterumq; doloribus,
torminib⁹, vetricis & interaneo-
rū vlceribus, purulentis excrea-
tionibus, mulierib⁹ vuluæ cau-
sariis, hydropicisq; facit aduer-
sus ventris tineas & horrores:
cōtra venenatos ictus auxilia-
tur: serpentes necat: aurium do-
loribus instillatum medetur.

Picatū vinū. Cap. XLVIII.

Picatum ex liquida pice &
multo tēperatur. Picem autem
primum marina aut miria tā-
tis per eluere oportet, dū inal-
buerit, & syncera maris aqua
defluat, mox aqua dulci pro-
luēda: cōgiis octo musti, vncia
picis vna aut altera adjicitur:
vbi efferbuerit & cōstiterit, in
vasa diffunditur. Hoc genus vi-
ni excalfacit, cōcoquit, purgat,
abstergit: vtile doloribus pe-
ctoris, alui, iocineris, lienis &
vuluæ; si sine febre sint, veteri
rheumatismo, exulcerationib⁹
in altū recedētibus, tussi, fusti-
riis, cōcoctionibus tardis, infla-
tionibus, & luxatis, præsertim
in succida lana impositum.

Abfinthites. Cap. XLIX.

Abfinthitē faciūdi ratio eua-
riat. Aliqui enim duodequinq;
quaginta sextariis Italicarū ani-
phorarū, admistā abfinthij Pō-
tici librā decoquūt ad tertias:

M ij &c

DIOSCORIDIS

& vbi ifuderint sex aceti sextarios, & absinthij felibrā, ac diligēter pmiscuerint, diffundūt in vas: dūq; cōquieuerit, defæcāt. Alij absinthij minā ī amphorā demittūt, tufamq;, & raro līteo deligatā, ī cado musti macerāt, binis mēfib⁹. Alij absinthij quadratē, alij triētē, & nardi Syriacæ, cinnamomi, casia, floris iūci odorati, calami, elatæ, palmārū, singulos sextātes iniiciūt in metretā musti, et tūdētes pri⁹ pila, obstructo vasis spiraculo, binis ternisve mēfib⁹ dimittūt: postea defæcatū vinū trāsfundūt ad vsus. Alij addūt ī musti cadū, Celticæ nardi darchmas xiiij. & absinthij drachmas xl. līteo iuolutas: & post quadragesimū diē elutriāt. Alij in senos sextarios musti, absinthij librā, & ficæ pini resinē sextatē immittūt, & post decē dies excolāt, et recōdūt. Vtile est stomacho: urinā cit: tardā cōcoctionē accelerat: hepaticis, regio morbo, et renū vitiis auxiliā: fastidia discutit: iis pdest quib⁹ stomach⁹ negotiū exhibet: valet cōtra lōgā p̄cordiorū distētionē, & īflationes, teretēsq; vētris tineas, & remoratos mēses: cōtra hausta ixiē venena q̄ plurimū potū, & vomitionibus redditū, auxiliā.

Hyss-

ἔπειτα πρὸς επιχέαντες * γλε-
κοις ξέσας ε' καὶ ἁψινθίου ἡμί-
λητον ἐπιμελῶς μίξαντες. κα-
ταγγίζουσιν κατὰ σάδεντα δὲ δυ-
λίζουσιν. οἱ δὲ, μὲν ἁψινθίου εἰς
τὸ κεράμιον καθίστασι, * κόψαν-
τες καὶ ἐν δόσαντες εἰς ὀδόνιον ἁ-
ραλὸν ἑῶσιν ἐπὶ μύδας δύο. οἱ δὲ,
ἁψινθίου οὐγγίας γ'. ἐνιοὶ δὲ τέσ-
σαρες, καὶ νάρδου συεικῶς, κιννα-
μώμου, κασσίας, ῥήνου αἴθης, κα-
λάμου, ἐλάτης, φοινίκης ἀνὰ οὐγ-
γίας β'. καθίστασιν εἰς μετρητῶ
γλεύκοις, καὶ εἰς ὄλμον κόψαντες
καὶ σφικώσαντες, ἑῶσι δι' ἕλκυν ἢ
τείμνον· εἴτα δυλίσαντες καὶ με-
ταγγίσαντες ἀποτίθενται. Οἱ δὲ,
εἰς γλεύκος μετρητὴν νάρδου κε-
πικῆς < ιδ' καὶ ἁψινθίου < μί. κα-
θίστασιν ἐν ὀδονίῳ δόσαντες· καὶ μὲν
ἡμέρας μ' μεταγγίζουσιν. οἱ δ', εἰς
τὸν ξέσα ε' καὶ γλεῦκοις λίττας
α'. ἁψινθίου ἐμβάλλουσιν, καὶ πι-
πύνης ξηρᾶς ῥητίνης οὐγγίας β'. με-
τὰ δὲ ἡμέρας ι'. δυλίσαντες
ἀποτίθενται. ἔστι δὲ ἐν σόμαχος,
ἔρνηκος, χολήσιμος βραδυπεπτε-
σιν, ἥπατικοῖς τε καὶ νεφρικοῖς,
καὶ ἰκτερικοῖς, ἀνορέκτοις, κακου-
μύδοις σόμαχον· καὶ πρὸς ὑπὸ χον-
δρίων τάσιν χολόνιον, καὶ πρὸς ἐμ-
πνευματώσεις, ἐλμινθας στρογγύ-
λας ἐμμιλῶς ἐπεχόμενα πρὸς τὴν
ἐξίου πόσιν πλεῖστος ποτεῖς καὶ ἐξα-
μούμενος ἀρμόζει.

Περὶ Τῶν

Πρὶ Ὑσσωπίτε οἶνε. Κεφ. ν'.

Ὑσσωπίτης δὲ ὁ ἐκ τοῦ κιλί-
κίς ὑσώπου, κέλλιός ἐστι, σκευά-
ζεται δὲ ὁμοίως τῷ ἁψινθίτῃ,
δεῖ δὲ τῷ κεραιμῷ τῷ γλευκοῖς
5 λίτραν μίαν τῷ ὑσώπου κεκομ-
μῶν τῶν φύλλων περιδιδόναι.
ἐπειλουῦντας εἰς ὀδόνιον ἀραιὸν,
συγκραδίνονται δὲ λιθάαρια, ἵνα
τῷ πυθμυρί περισκαδίσῃ ὁ ἐν-
δεσμος· μετάγχιζε δὲ δι' ἡμέ-
10 ρας μ' διυλίζων. ἀρμόζι δὲ πρὸς
τὰ ἐν θώρακι καὶ πλευρῷ καὶ
πνεύμονι πάθῃ, βήχας τὲ παλαι-
αί, καὶ ἄσθμα· ἐστὶ δὲ καὶ οὐρητι-
κὸς, καὶ σποφουμύοις ἀρμόζι, πρὸς
τὴν ῥίγη τὰ ἐν πελώδιδι· κινεῖ δὲ
15 καὶ ἐμμένα.

Περὶ Χαμαδρύιτε οἶνε.

Κεφ. νά.

Καὶ ὁ Χαμαδρύιτης ὁμοίως
τῷ ὑσσωπίτῃ σκευάζεται. θερ-
μαστικός ὢν καὶ διαλυτικός· ἀρ-
20 μόζων σπασμοῖς καὶ ἰκτέρεσι,
ὑστερικαῖς πνευματώσεσι, βρα-
δυπνευσίαις, ὑδρωπὶ ἀρχομύω.
ἀμείνων δὲ παλαιούμηνος γί-
νεται.

Περὶ Σπυχαδίτου οἶνε.

Κεφ. νε'.

Σκευάζεται καὶ σπυχαδίτης ὁμοί-
ως. δεῖ ὅ τῷ τῷ χροῶσι μὲν μίαν
σπυχαδὸς δίδοναι. διαλύει ὅ τὰ
χρῆ, καὶ πνευματώσεις, καὶ πόνοις
πλευρᾶς καὶ νέρων, καὶ κατὰ φύξιν
δίδο-

Hyssopites. Cap. L.

Hyssopites è Cilicio hyssopo maximè laudatur, fitque similiter, foliorum hyssopi tusorum libra in amphoram mufsti coniecta, linteolo raro, cum quibusdam lapillis, folia inuoluntur, vt degrauatus pondusculo fasciculus fidat: vinū post quadraginta dies defæcatū elutriatur, Contra pectoris, laterum, & pulmonis vitia, veterem tussim, & suspiria prodest: vrinam cit: torminibus, & horroribus febrium circuitu repetentibus auxiliatur: mentes mouet.

Chamædryites.

Cap. LI.

Simili modo chamædryites fieri solet. Excalfacit, discutit: conuulsis, regio morbo, vuluæ inflationibus, tardæ concoctioni, incipiēti aquæ inter cutem, subuenit. Inueterascens melius redditur.

Stoechadites.

Cap. LII

Stoechadites nō secus téperatur. Cōgiis sex stoechadis minā addere oportet. Crassitiē, inflationes, laterū, neruorūq; cruciatus, & perfrictiones discutit:

M iij comi-

DIOSCORIDIS

comitialibus commodè datur,
cum pyrethro & sagapeno.

Acetū ex stoechade herba.

Cap. LIII.

Fit ad eadem acetum è stoe-
chade herba, vt paulò ante di-
ximus, aceto macerata, quod
eosdem implet effectus.

Vinum è betonica.

Cap. LIIII.

Fit vinum è betonica, quam
cestron psy chotrophon appel-
lant. Herbam semine maturo
prægnantem, cum suis ramulis
minæ pondo, congiis duobus
vini macerant, & post septimū
mensem transfundūt. Ad mul-
ta interaneorum vitia, vt fru-
tex ipse, póllet. Et vt in vni-
uersum dicatur, factitia vina,
sibi misturarū vires adsciscūt:
quare non difficile fuerit, iis
qui illarum naturas norint, vi-
norum vires coniectura qua-
dam consequi: veruntamen
vinorum vsus febricitantibus
abdicandus. Fit etiamnum è
betonica acetum, ad eadem
vitia vtile.

Tragoriganites. Cap. LV.

Tragoriganites fit quaternis
tragorigani drachmis linteolo
colligatis, in quaternos multi
sextarios cōiectis, et post tertiū
mése trāsfulis. Prodest tormini
bus, vulvis,

δ'δδ) ὃ καὶ ἐπληπτικοῖς ὠφελι-
μὸς μετὰ πυρέθρου καὶ σαγαπηνού.

Περὶ Ὄξους σιχαδικού.

Κεφ. νγ'.

Γίνεται καὶ ὄξος διὰ σιχαδὸς
πρὸς τὰ εἰρημνύα, ἐναποβερχομένης
ὄξει τῆς πύας ὡς περιείρηται,
ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ αὐτὰ.

Περὶ Κεσρίτου οἴνου.

Κεφ. νδ'.

Γίνεται καὶ ἐκ τοῦ κέσρου
τοῦ ψυχροτόφου οἶνος. δεῖ δὲ λαμβάνειν τὴν πύαν σπέρματος
πλήρη πεπεύρευ συνὰ τοῖς κλά-
δοις, καὶ μίαν μίαν βάλλειν εἰς
οἴνου χράς β'. εἴαν τε ἐπὶ μὴ-
νας, καὶ οὕτω μεταγίξειν. ποιεῖ
ὃ πρὸς πολλὰ τῶν ἐν τῷ κατὰ τὴν
καὶ ὁ δάμνος αὐτῆς. καὶ κα-
δούλου πάντες οἱ σκευαστοὶ οἶνοι ἀ-
ναλαμβάνουσι τὴν δυνάμιν τῶν
μυγμάτων. διὸ τοῖς ταῖς ἐμείνων
ἐπιγνώκοσι φύσει ἐν χερὲς καὶ ταῖς
τῶν οἴνων δυνάμεις συμβάλλειν.
ἀπυρέτοις μὲν τοῖς ὄξιν ἢ τῶν οἴ-
νων χρῆσις. καὶ ὄξος δὲ ἐξ αὐτῆς
γίνεται πρὸς τὰ εἰσκότα πάθη
χρησιμεύον.

Περὶ Τρααρειγανίτου οἴνου.

Κεφ. νε'.

Τρααρειγανίτης τρααρειγανίου
δ'. εἰς γλεύκοις ξέτας δ'.
ἐν ὁδονίῳ χάλει πρὸς μιλύας γ'.
καὶ μεταγίξει. ἀρμόζει σφόδρα
σπασμοῖς

σπασμασι, ῥήγμασι, πόνοις πλε-
ρεῦ, πνευμάτων διαδρομαῖς, δυ-
σπείλαις.

Πεὶ Βουνίου οἴνου.

Κεφ. νς.

5 Οἶνος διὰ βουνίου • βουνίου
 < β' κόψας, κἀδες εἰς κο-
 τύλας γλεύκοις τέσσαρας, καὶ
 τ' ἄλλα ὁμοίως ποιεῖ. ἀρμό-
 ζει δὲ σωμαχοῖς κακοπωμέ-
 νοις δι' ὀπλομαχίαν, ἢ ἰσπα-
 20 σίαν πολλῷ.

Πεὶ Δικταμνίου οἴνου.

Κεφ. νζ.

Δικταμνίτης • Δικταμνι < δ'
 * εἰς γλεύκοις κοτύλας ἢ ἀπό-
 βρεχε ὁμοίως ποιεῖ δὲ ἀσπυμένους
 25 σόμαχον, ἀγει καὶ λόχα καὶ ἔμ-
 μύα.

Πεὶ Περασίου οἴνου.

Κεφ. νη.

Ο διὰ περασίου • περασίου τοῦ
 ἀκμαίου φύλλα κόψας κρίνικας
 20 β', κἀδες εἰς μετρητὴν γλεύκοις,
 καὶ τ' ἄλλα ὁμοίως ποιεῖ • ἀρμό-
 ζει δὲ τοῖς περὶ θώρακα καὶ πρὸς
 ὅσα τὸ περάσιον.

Πεὶ Θυμίου οἴνου.

Κεφ. νθ.

25 Θυμίτης • θυμου κακομμένου
 καὶ σπυσιμένου οὐγγίας ε' ἐνδύσας
 εἰς ὀδόντιον, κἀδες εἰς γλεύκοις
 κεράμιον. ἀρμόζει πρὸς δυσπε-
 ψίας, ἀγορεξίας, δυσεντερίας,
 νύκτων πόνους, ὑποχονδρείων,
 φεί-

bus, vulvis, ruptis, laterū dolori-
 bus, spirituum discursationi,
 ægris concoctionibus.

Bunites vinum.

Cap. LVI.

E napis fit vinum, nomine
 bunites, drachmis duabus tu-
 fi napi in sextarios duos musti
 additis, & cæteris eodem mo-
 do factis, Prodest stomachicis,
 & dimicatione, aut longo e-
 quitatu fatigatis.

Dictamnites.

Cap. LVII.

Dictamni drachmas quatuor
 macerato quaternis musti sex-
 tariis. Facit aduersus stomachi
 fastidia: menses, & purgamen-
 tum à partu subducit.

Vinum ex marrubio.

Cap. LVIII.

Marrubij adulti folia tundi-
 to, & sextarios octo in musti
 metretam demittito, & reli-
 qua consimiliter facito. Con-
 uenit hoc vinū pectoris vitiis,
 & omnibus quibus marrubiū.

Vinum ex thymo.

Cap. LIX.

Thymi tufi & cribrati vn-
 cias centum linteo colligatas,
 in amphoram musti adiucito.
 Valet cōtra ægras cōctiones,
 fastidia, dysenteriam, neruo-
 rum & præcordiorū dolores,

M iij hyber

DIOSCORIDIS

hybernos algores, & venenata animalia, quorú morfum frig⁹ insequitur, aut putrescit locus.

Vinum è saturèia.

Cap. LX.

Simili modo è saturèia vinū fit, quod eadem quæ thymites præstat.

Origanites.

Cap. LXI.

Sic quoque origanites ex heracleotico origano conficitur similiter cum supradicto. Facit eadem quæ thymites.

Vinum è calamintha.

Cap. LXII.

E calamintha, pulegio, & abortono vina fiunt eodem quo thymites modo, profunt stoma- chicis, cibū fastidiētibus, & re- gio morbo: q⁹ vrinā moueant.

Vinum è conyza.

Cap. LXIII.

Fit item è conyza vinum, contra venenata ante alia ef- ficax.

Aromatites.

Cap. LXIII.

Aromatites ita fit: Palmæ, aspalathi, calami, nardi gallici, singulorum quatuor sextarios sumito: postquam contriueris, passo subigito, coactis ingen- tibus offis, & in sextarios duo- decim austeri musti deiectis,

oper-

φείκας χειμειναίς, καὶ πρὸς ἰα-
βόλα τὰ ψύχοντα καὶ σίπον-
τα.

Πρὶ Θυμρίτου οἴνου.

Κεφ. ξ'

Θυμρίτης ὁμοίως σκευάζεται, ὡς καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ, πρὸς ἃ καὶ ὁ θυμής.

Πρὶ Ορειγανίου οἴνου.

Κεφ. ξα'.

Ορειγανίτης δι' ὀρειγανίου ἡρα- κλεωπικῆς σκευάζεται ὁμοίως τῷ 10 θυμῇ ποιῶν πρὸς τὰ αὐτά.

Περὶ Καλαμίνθου γληχαι- νίτη καὶ ἀβροτονίτη οἴνου.

Κεφ. ξβ'.

Καλαμίνθιτης γληχονίτης, ἀ- βροτονίτης, ὁμοίως σκευάζεται τῷ 15 διὰ θυμῶν· ποιοῦσι δὲ σωμαχ- κοῖς καὶ ἀνоректоῦσι, καὶ πρὸς ἡκτε- ρον ὀυρητικοὶ γὰρ εἰσιν.

Πρὶ Κορυζίου οἴνου.

Κεφ. ξγ'.

Οἶνος κορυζίτης ὁμοίως σκευά- 20 ζεται ἔστι δὲ πάντων μᾶλλον θη- ριακός.

Περὶ Αρωματίτου οἴνου.

Κεφ. ξδ'.

Ὁ δὲ ἀρωματίτης οὕτω κα- 25 τασκευάζεται φοίνικος· ἀσπα- λάδου, καλὰμου, γάρδου κελ- πικῆς, ἐκάστου χοίνικα λειώσας, φύρασιν γλυκεῖ, καὶ ποιήσας ἐν μεγάροις μάζας, βάλε εἰς γλεύκους ἀψιθεῦ ξέσας 16. καὶ ἔα-

- καὶ ἔασον ἡμέρας μ'. σφικώσας
 ἀγγεῖται διὰ διυλίσας ἀποτίθει-
 σιν. σκευάζεται δὲ καὶ ἄλλως· χα-
 λάμου ὀλκῆς ἡ. φοῦ < ζ'. κό-
 σου < β'. νάρδου συριακῆς <
 5 ζ'. κασίνας < ἡ. κρόκου < δ'.
 ἀμύμου < ε'. ἀσάργου < δ'.
 ταῦτα ὁμοῦ λειώσας καὶ ἐν ὀδο-
 νίῳ δύνσας χάλασον εἰς μετρητῇ
 γλεύκοις, καὶ μετὰ τὸ ἀποζέσαι
 τὸν οἶνον μετάγγιζε. ποιεῖ ὃ πρὸς
 10 πίνουσι δόρακος, πλεονεύου, πνεύ-
 μογος, δυσουείας τὲ καὶ ῥίγισιν,
 ἐμυλνίοις ὀπηρεδεῖσι, καὶ τοῖς
 διὰ κρυμῶν, ὀδεύουσι καὶ ἀρμόζει
 σπυνομόρος· καὶ πρὸς τοῦ πάχος
 θυνώντας· περὶ ποιεῖ ὃ καὶ εὐχρη-
 15 σιν, ἐκνότηκος τε ὅτι καὶ ἀνώδυ-
 νος τοῖς πρὸς κῶσιν, καὶ νεφρῶς ἀρ-
 μόζων πίνουσι.

Πρὶ οἶνε τῷ ἐν σμύρνης,
 πεπέρεως, καὶ ἱρεως.

Κεφ. ξε.

- 20 Σκευάζεται δὲ οἶνος πρὸς χα-
 τάρρους, βῆχας, ὀμότητας, ἐμ-
 πνευμάτωσις καὶ πλάδον σομά-
 χου· σμύρνης < β'. πεπέρεως
 λευκοῦ < α'. ἱρεως < ε'. ἀνή-
 25 δου* < γ'. ταῦτα ὀλόκοπα* ἐν-
 δύνσας εἰς ὀδόνιον, κῆδες εἰς ἔξ-
 σας ε'. οἶνου μετὰ δὲ τείτλω
 διυλίσας ἀποτίθεισιν εἰς
 γάλῳον, καὶ πόπιζε μὲν
 πρὸς τὸν διδόνος ἄ-
 κρατον κύαδον ἄ.

operculato vase, quadraginta
 diebus quiescere finito: deinde
 vbi facie expurgatū fuerit, re-
 cōdito. Alia eius ratio: calami
 vncia, phu drachmę septem, co-
 fti drachmę duę, nardi syriaci
 drachmę sex, cassiæ vncia, cro-
 ci drachmę quatuor, amomi
 drachmę quiq;, asari drachmę
 quatuor: omnia simul trita &
 linteo colligata in cadū musti
 demerguntur, & postquā vinū
 deferbuerit, trāsfunditur. Facit
 ad pectoris, & laterum, & pul-
 monis dolores: difficili vrinę,
 horrorib⁹, retardatis mēsisbus,
 atq; iis qui per frigora iter fa-
 ciūt, potū cōuenit: pituita craf-
 tiē extenuat, colorē alit, somnū
 conciliat, dolorem finit, renum
 & vesicę vitiis auxiliatur.

Vinum ex myrrha, pipere
 & iride. Cap. LXV.

Fit & vinū ad destillatiōes, cru-
 ditates, tussim, inflationes, & si
 humor in stomacho coit: Myr-
 rhæ duę drachmę, piperis cādi
 di drachmavna, iridis drachmę
 sex, anisi drachmę tres: oīa ple-
 nius tusa & linteolo inuoluta ī
 4 fex vini sextarios cōiiciunt: vi-
 num post triduū colatur, & in
 lagena reconditur. Datur post
 deambulationem, meraculum,
 cyathi vnus mēsurā.

Πρὶ

Nectarites

DIOSCORIDIS

Nectarites. Cap. LXVI.

FIT quoque nectarites
ex helenio herba: Radice sic-
ca pondo quinque drachma-
rum linteolo colligata, & in
cōgios sex mustis addita,
& post tres mēses effu-
sa. Facit ad stomachi
& pectoris vitia:
vrinam pellit.

Vinum ex Syriaca nardo,
& Celtica, malabatróq;.

Cap. LXVII.

E Syriaca nardo, & Celtica,
malabathróq; vinū factitur,
hac ratione: Singulorū selibrā
in binos musti cōgios mittito,
post menses duos colato. Da-
tur cyathus vn° cū trib° aque.
Hoc vinum efficax est contra
vitia renum, hepaticos, regium
morbum, & vrinæ difficultatē:
prodest stomachicis, atque iis
quos pallor decolorat, Alij vn-
ciam, aut sextantem acori, &
Celticæ nardi quadrantem, in
musti amphoram adiiciunt.

Vinum asarites.

Cap. LXVIII.

Asari quadrantem in fenos
musti sextarios itidem demit-
tito. Id vini genus vrinam ciet:
hydropicis, & regio morbo la-
borantibus, hepaticis, ischiadi-
cisque conuenit.

Vinum

Πρὶ Νεκταρίτε οἶνον. Κεφ. ξς'.

Ο δὲ νεκταρίτης σκευάζεται ἐν
τῷ ἑλενίῳ· ὃ ἔγχοι μνηδίκην, οἱ δὲ σύμ-
φυτον, οἱ δὲ ἰδιῶον φλόμον, οἱ δὲ,
ὀρέστον, οἱ δὲ νεκταρίαν καλοῦσιν·
ἐλπίε ρίζης ξηρῆς ἑ. ἐ. ἐρδίας ἑ.
εἰς ὀδόνιον, κῆδες εἰς χράας ἑ.
γλεύκοις, καὶ μετ' γ'. μύσας ἀπό-
χει. ποιεῖ δὲ πρὸς σόμαχον, πώ-
ρα καὶ ἄγει δὲ καὶ οὐρα.

Πρὶ τῷ διὰ συριακῆς νάρδου
καὶ κελπικῆς καὶ μαλαβάδρου 10
οἶνον. Κεφ. ξζ'.

Ο δὲ διὰ συριακῆς νάρδου,
καὶ κελπικῆς, καὶ μαλαβάδρου,
σκευάζεται οὕτως· ἐκάστου ἡμί-
μνησιον λαβὼν, εἰς δίχου γλεύ-
κοις κῆδες καὶ μετὰ μύσας β'. 15
διύλιζε. δίδου δὲ καὶ κύαδον
ἀ. πρὸς τρεῖς ὕδατος. ποιεῖ νεφρι-
πκοῖς, ἰκτερικοῖς, ἡπατικοῖς, δυσ-
ουροῦσιν, ἀχρεοῖς, σωμαχι-
κοῖς. οἱ δὲ ἀκόρου οὐγγίας
ἀ ἢ β'. κελπικῆς νάρδου 20
οὐγγίας γ'. ἐν κρε-
μύω γλεύκους
σκευάζουσιν.

Πρὶ Ασάριτε οἶνον.
Κεφ. ξη'.

ΑΣΑΡΙΤΗΣ ἀσάρου 25
οὐγγίας γ'. κῆδες εἰς γλεύκους
κοτύλας β'. ὁμοίως· ἐστὶ δὲ δι-
ουρητικός, ὕδρωπικοῖς ἀρμύζων,
καὶ ἰκτεριώδης, ἡπατικοῖς, ἰ-
σχιαδικοῖς.

Πρὶ

Πρὶ τῆς διὰ τῆς ἀγρίας
ναρδοῦ οἶνε. Κεφ. ξβ'.

Ο ἢ διὰ τῆς ἀγρίας ναρδοῦ ναρ-
δοῦ ἀγρίας τῆς ῥίζης περσφότου
ληώσας σεσημένους κῆδες ἔγγιαι
5 ἢ. εἰς χρυῶν γλεύκας ὁμοίως. καὶ
ἕα μύνας β'. χηήσιμος ἡπατι-
κοῖς, δυσσερεστοῖς, πνευματεμύροισι,
στομαχοῖς.

Πρὶ δαυκίτης οἶνε. Κεφ. ο'.

Δαυκίτης δαυκού τῆς ῥίζης
10 ὁλοκόπου < εἰς γλεύκους κα-
ράμιον κῆδες ὁμοίως καὶ μετά-
μιζε. ποιεῖ δὲ πρὸς πόνους θώ-
ρακος, ὑποχονδρίων, ὑστέρας·
ἀγρί ἐμμύνα, ἐρυγὰς κινεῖ, καὶ
οὐρεθ. ἀρμόζει ἐκζηλ. ἀπάσματος,
15 ῥήγματι.

Πρὶ Ελεισφακίτης
οἶνε. Κεφ. οα'.

Ελεισφακίτης ὁμοίως· ἐλε-
σφακὺς οὐγγίας ἢ ὁμοίως εἰς γλεύ-
κας ἀμφορέα* οὗτο καράμιον, καὶ
20 δεσ. ποιεῖ δὲ πρὸς νεφρῶν πόνους,
καὶ κύστεως καὶ πλευρῶν, αἵματος
ἀναγωγὰς, βήχα, ῥήγματα, ἀπά-
σματα, θλάσματα, ἐμμύνα ἐτε-
ρωτέρω.

Πρὶ Πανακίτης οἶνε. Κεφ. οβ'.

25 Πανακίτης, πανάκος ἔγγιαν ἄ.
εἰς χρῶν γλεύκας καὶ δεῖς ὁμοίως
μετάμιζε. ποιεῖ ἀπάσματα, ῥήγ-
ματα, θλάσματα, ὀρεδοπνοίας· λε-
πτωπικὸς πᾶχος σπληνός· ποιεῖ
δὲ καὶ πρὸς σπύλους, ἰσχάδας,
βραδυπεψίας.

Vinum ex nardo sylue-
stri. Cap. LXIX.

Radicis sylvestris, nardi re-
centis & tritæ cribratæq; bes-
sem in congiū musti conii-
cito, duos menses quiescere fi-
nito. Utile est hepaticis, diffi-
cili vrinæ, inflationibus, sto-
machicis.

Vinum ex dauco herba.

Cap. LXX.

Radicis dauci contusæ dra-
chmas sex in musti amphoram
imponito, & similiter trāsfun-
dito. Facit ad dolores thoracis,
præcordiorum, & vuluæ: men-
ses pellit, ructus ciet, & vrinæ:
prodest tussi, ruptis, vullisq;

Vinum ex saluia.

Cap. LXXI.

SALVIÆ vnciam in mu-
sti amphorā, quod idem cum
ceramio est, mittito. Valet cō-
tra renum, vesicæ, & late-
rum dolores, reiectiones
sanguinis, tussim, ru-
pta, vulla, & sup-
pressos menses.

Vinū ex panace. Ca. LXXII.

Panacis vnciā in musti con-
giū mittito, & transfundito.
Prodest ruptis, vullis, contusis,
orthopnoeæ: lienis crassitiem
extenuat: contra tormina, co-
xendicum dolores, efficax est:
tardas

DIOSCORIDIS

tardas cōcoctiones accelerat: mēses & partus extrahit: aquæ inter cutem, & serpentiiū ictibus auxiliatur.

Vinū ex acoro. Ca. LXXIII.

Vinum ex acoro & dulci radice cōsimili modo fiūt. Oportet enī singulorū vncias octo in fēnos cōgios mittere, tribus mēsi- bus macerare, mox in vas transferre. Faciūt ad pectus, & latera, & vrinam mouent.

Vinū ex apio. Ca. LXXIII.

Seminis apij recentis, maturi & cribrati vnciæ nouē in linte- o colligatæ in musti ampho- rā demittant. Appetitū excitat: stomachicis, & difficili vrinæ auxiliatur faciles spiritus facit.

Vinum ex foeniculo & anetho. Cap. LXXV.

Ex foeniculo, anetho, & petroselin- o, vina eodem modo fiunt, & ad eadem efficacia.

Vinum ex falis flore.

Cap. LXXVI.

Fit & è flore falis vinū, multo ad purgandum efficacius, q̃ vinū aqua marina téperatum. Fauces, vesicæ, renes, & stomachum infestat: quare neque in secunda, neque aduersa valetu- dine prōdest.

Vinū phthoriō. Ca. LXXVII.

Fit etiā vinū qđ phthoriō vo- cant,

βραδυπεψίας • καταμύωια ἀγει
καὶ ἐμβρύα ὑδρωπικοῖς, καὶ θηριο-
δύκτοις ἀρμόζει.

Πρὶ Ακοεῖτε οἶνου.

Κεφ. ος'.

Ακοεῖτης δὲ καὶ ὁ ἀπὸ γλυ-
κυρίζης ὁμοίως σκευάζεται. Δεῖ
γὰρ ἐκείνου οὐγγίας * π'. εἰς χόας
ς'. πρὸς μύωια γ'. ἀποθρέ-
χοντας μεταγίzzειν. ποιοῦσι δὲ
πρὸς πλευρῶν, καὶ θώρακα, κι-
νοῦντες καὶ οὔρησιν. 10

Πρὶ Σεληνίτε οἶνον. Κεφ. οδ'.

Σελίνου σπέρματος ὠείμου
νέε σποσπόμενε οὐγγίας θ'. ἐν δόνας
εἰς ὀδόνιον, βάλε εἰς κεράμιον
γλεύκεος ὁμοίως. ποιεῖ δὲ ὀρεξίν
καὶ σωμαχικοῖς ἀρμόζει, καὶ δυσ- 51
εῦσιν. ἐστὶ δὲ καὶ εὐπνεύς.

Πρὶ Μαραδρίτε καὶ ἀνη-
δίνε οἶνον. Κεφ. οε'.

Καὶ μαραδρίτης καὶ ἀνήδνος, καὶ
περὶ σεληνίτης ὁμοίως σκευάζον-
ται πρὸς τὰ αὐτὰ ποιοῦντες. 20

Πρὶ Αλοσανθίνου.

Κεφ. ος'.

Σκευάζεται καὶ δι' ἁλὸς ἄν-
δρος κατὰ ρηκώτερος τ' διὰ θα-
λάσσης. κακοῖ δὲ φάρυγγα, καὶ νε-
φρῆς, κύστιν, σόμαχον ὅθεν οὔτε 25
πρὸς ὑγίαν ἔτε πρὸς πάθη χεῖ-
σιμος ὁ ποιεῖτος.

Πρὶ Φθορείου ἐμβρύων.

Κεφ. οζ'.

Γίνεται δὲ καὶ φθόριος ἐμβρύων
εἶνος,

οἶνος, φυτευόμενός τις τῆς ἀμ-
πέλου συμφύεται ἑλλέβορος ἢ σί-
κκος ἄγριος, ἢ σκαμμωνία, ὧν ἀ-
ναλαμβάνει ἢ σαφυλὴ τὴν δύ-
ναμιν, καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν οἶνος γίνε-
ται φθόειος. γίνεται δὲ περὶ μεμ-
μεκῆαις γήσσει κινάδων πλῆθος
ἢ κακρὰ μύρος.

Πρὶ θυμελαΐτης οἶνον.

Κεφ. οή.

- 10 Ο θυμελαΐτης τῶν κλώνων
σὺν τοῖς φύλλοις καὶ τῷ κερπῷ
α' λ'. βάλε εἰς γλεύκοις χράς
γ' καὶ σκευάζει ἕλκων κοῦφως, ἄ-
γχις ἂν β' ἀπολιθῶσι χράς, καὶ
διυλίσαις ἀποτίθης. καδάρει
15 ὑδατώδη καὶ σπλῦα τίθει.

Πρὶ χαμαιλαΐτης.

Κεφ. οθ'.

- Χαμαιλαΐτης ἐπειδὴ ἀνδρῶν
ὁ δάμνος, μετὰ τῶν φύλλων κό-
ψας καὶ σήσας βάλε α' β'. εἰς
20 γλεύκοις χροῦν, καὶ μετὰ μῆ-
νας β' μεταγριζε. ποιεῖ δὲ
ὑδρεῖωσιν, ἡπατικοῖς,
κεκοπυμένοις. καὶ
τῷ ἐκ τοκέτ' οὖο
καδάρτοις.

- 25 Πρὶ χαμαιπυτίνου.

Κεφ. π'.

Χαμαιπυτίνος ὁμοίως σκευά-
ζεται, καὶ πρὸς τὰ αὐτὰ ἀρμόζει
διουρητικὸς ὢν.

Πρὶ

cant, quoniam partus necat, &
abort⁹ facit, veratro aut scāmo-
nia, aut syluestri cucumere, iu-
xta radices vitiū fato: siquidem
vites sibi illorū vires adsciscūt.
Id vinū part⁹ enecat: datur ie-
iunis mulieribus, quæ antè vo-
muerunt, cyathorum octo mé-
sura, dilutum.

Vinum ex thymelæis.

Cap. LXXVIII.

Rhamorū thymelææ cū suis
foliis, & fructu triginta drach-
mas mittito in cōgios tres mu-
sti, & leui igne coquito, donec
congiij duo supersint, defæca-
tūq; recondito. Aquosa purgat
excremēta, & lienē absumit.

Vinum ex chamelæa.

Cap. LXXIX.

Chamelæa dum floret, cū fo-
liis tusa & cribrata decē drach-
marum pondere, in multi cō-
gium additur. Post duos men-
ses vinum in vas transfertur.
Aquæ inter cutem, hepaticis,
& lassitudine cōfractis, efficax
est: item mulieribus quæ à par-
tu ægrè purgantur.

Chamæpityinum.

Cap. LXXX.

Chamæpityinum simili mo-
do fit, & ad eadē conueniens:
vriam quoque ciet.

Vinum

DIOSCORIDIS

Vinum ex mandragora.

Cap. LXXXI.

Librum radicis mādragoræ cōcidito, segmēta lino traici-
to, quod selibrā equat in musti-
cadum demittito, ibiq; esse si-
nito ad mēses treis, deinde traf-
fundito. Media potio, heminae
dimidiū: bibit, passo in duplū
addito. Aiunt hemina vini cō-
gio mistā, potu soporem adfer-
re: cyathus vnus cū sextario vi-
ni pot⁹, enecat: mediocris vsus
ei⁹ doloris sensū aufert: fluxio-
nes inraffat: olfactu, potūq;
& cum inditur idē præstat.

Vinū ex verano. Ca. LXXXII.

In cōgiū musti aqua marina
diluti, drachmas xij. nigri vera-
tri triti ī linteo mūdo, mittito:
dūq; efferbuerit, in marinae a-
quæ cōgios xiiij. aut xv, vbi ple-
niuscule fregeris, iniicito: post
aliquot dies colato, & vitor.
Dato cyathum vnum ex aqua
balnei in potu, ad aluū soluē-
dā, iis qui euomuerūt à cœna.
Alia ratio: Veratri drachmas vi-
ginti, iūci odorati vncias duo-
decī, spicæ Syriacæ vncias tre-
decim, cribratas, & linteo colli-
gatas in septē vini Coi sextari-
os dieb⁹ quadraginta macerā-
das indito, postmodum calato:
dabis in potu sesquiheminam.

Aliter:

Πρὶ Μανδραγείτης.

Κεφ. πα.

Μανδραγείτης, τῶ φλοιῷ τῆς
ρίζης κατατεμὼν, ἐνεῖργει εἰς λί-
γὸν ἢ μυχθαῖον, καὶ καὶ εἰς με-
τηντὺν γλευκοῖς πρὸς μιλῶας
γ'. εἴτα μετὰ γγίζει. ἢ μέση πίσης
ἡμικοτύλιον· πίνεται δὲ γλυκέ-
ως πρὸς διδωμένου εἰς διπλά-
στον. φασὶ δὲ κοιμίζειν καὶ κα-
ρῶν κοτύλιον αὐτῆ καὶ ἐνὶ μι-
χθαῖον, καὶ ποδεῖσθαι· μετὰ ξέ-
σου δὲ οἴνου κύαδος εἰς ποδεῖς
ἀνοιρεῖ· ἐστὶ δὲ ἡ σύμμετρος χεῖ-
σις ἀνωδυνος· ῥεῦμά των παχυν-
τική· ὁσφρανόμενος δὲ καὶ ἐκλυ-
ζόμενος τὸ αὐτὸ πίνει.

Πρὶ Ελλεβορίτης.

Κεφ. παβ.

Ελλεβορίτης εἰς χρωῦ γλευ-
κοῖς τε θαλασσομήνου μέλανος
ἐλλεβορεῦ < β'· λείου βάλε ἐν
ὁδονίῳ καδάρῳ, μετὰ χειρὶ δὲ ὀ-
ταν ἀναζέσῃ* εἰς θαλάσσης χό-
ας ιε'. ἢ ιδ'. ὁλοχερῶς συνθλά-
σαι βάλε, καὶ μὲν ἡμέρας πέντε
δυλίσας χεῖρ. πότιζε δὲ κύαδον
ἀ, πρὸς κοιλίας λύσιν μετ' ὕδα-
τος ἐκ βαλανείν, ἐμμηκρόσθ, ἀ-
πὸ δείπνου. ἢ ἐλλεβορεῦ < κ'. γίνε
οὐγγίας β'. σάχχος σπειρακοῦ εἰ-
γίας γ'. σεσημμένα ἐν ὁδονίῳ δέ-
σαι. καὶ εἰς κοτύλας ιδ'. κύα-
δος οἴνου ἐπὶ ἡμέρας μ', εἴτα ἀπ-
θύσας πότιζε τεία ἡμικοτύλια.

ἢ εἰς

5 ἢ εἰς γλεύκους κεράμιον σα-
 λάτης πελαγίας ἐψηυόνης ἕξας
 ἰβ'. ἐλλεβόρου λευκοῦ λίτρας ε'.
 ἔμειρεν ἡμέρας μ'. καὶ ἀπιδή-
 σας χρῶ. ἢ ἐλλεβόρου < ἰβ'. ἀ-
 10 φρονίτρου < δ' γλεύκοις κοτύ-
 λας ἰβ'. ἔρέχε ἐπὶ ἡμέρας ιε'. καὶ
 ἀπιδήσας χρῶ μετὰ μιλῶας ἕξ.
 τὸ καὶ βρέφη ἐκτιπρώσκει, ἢ
 καὶ ἐκδειλοπεδευομένης σαφύ-
 λης· βάλε εἰς γλεύκους μετρη-
 10 τῶν (ἐστὶ δ' ὁ μετρητὴς χρόνος ι')
 καὶ βάλε γύψον εἰς τὸν ὄνον <
 κ'. καὶ ἕασον ἡμέρας β'. καὶ κά-
 δες ἐνδεσμον ἐλλεβόρου μέλα-
 νος* οὐγγίας λ'. γήρου οὐγγίας λ'.
 καλὰμου οὐγγίας λ'. ἀρκευδίδων
 15 ἡμυχρίνικον καὶ δ'. σμύρνης δέ
 καὶ κρόκου ἀνὰ οὐγγίαν α'. ἐνει-
 λίπας ὁδονίῳ κρέμασον ἡμέρας
 μ'. εἴτα διύλιζε καὶ δίδου
 κνίδους γ'. ἢ β'. κεράσις.
 20 καὶ δαίρει τὰς ἐκ τοκε-
 τῶν καὶ ἐκ βωστῶν
 κατὰσπᾶ, δὲ καὶ
 ἔμβρυα καὶ πρεῖς
 τὰς ὑστερικὰς
 πνίπας ποιεῖ.

Πρὶ Σκαμμωνίτης.

Κεφ. πγ'.

Σκαμμωνίτης σκαμμωνίας τ' ῥί-
 ζης < ιε'. ὀρυθλομένης ἐν πυραμη-
 τῶ ἔμβαλε εἰς γλεύκους χρῶν ἀνὰ λεί-
 25 ας, δήπας ἐν ὁδονίῳ ἐπὶ ἡμέρας λ'.
 καὶ δαίρει

Aliter: Decoctæ marinæ aquæ
 ex alto petitæ sextarios duode-
 cim, veratri candidi libras sex,
 in musti amphora quadragesimi-
 mo die, q̄ madefeceris, colato,
 & vtitor. Alia ratio: Veratri dra-
 chmas duodenas, et aphronitri
 quaternas, in senis, musti sexta-
 riis diebus quinisdenis mace-
 rato, mox colato: & semestri ex-
 acto, vtitor. Id vini genus abor-
 tus facit, & partus necat. Aut
 vuas in sole siccatas imposito
 in musti metretâ (implet autē
 metreta cōgios duodecim) &
 gypsum in vinū mittito pōdo
 drachmarum viginti, & biduo
 residere finito, coniicio veratri
 nigri drachmas triginta, iunci
 odorati, calami, singulorū dra-
 chmas triginta, baccarū iunipe-
 ri sextarios duos, & triētē, myr-
 rhæ & croci singulorū drach-
 mam, inuoluēs linteolo diebus
 quadraginta appēdito, postea
 colato. Dabis heminastreis aut
 duas dilutas. Purgat à partu, &
 abortu foeminas: foet^o extrahit,
 cōtra strāgulat^o vuluæ efficac.

Scāmonites. Cap. LXXXIII.

Scammonites sic fit: Radi-
 cis scammoniae per mēsses ef-
 fossæ, tritæ, & linteo colligatæ
 drachmas quinq; in musti cō-
 gium mittito, ad dies triginta.

Aluum

DI OSCORIDIS

Aluum purgat, bilem & pituitam extrahit.

METALLICA OM-
muia, & primū Cadmiā.

Cap. LXXXIII.

Ex cadmiā generibus optima est Cypria, botryitis nomine, densa, modicè grauis, & in leuitatem magis declinans, racemosa facie, colore spodij, q̄ fracta cinerulenta est, & eruginosa. Proxima habet foris cœrulea, intus candidior, internatis venarum discursibus, onychitæ lapidi similis, cuiusmodi sunt, quæ è veteribus metallis effodiuntur. Quædam etiā plucodes, id est, crustosa dicunt, segmentis quibusdā perinde quasi zonis cincta, ob quod eam zonitin appellauere. Alia ostracitis nominatur, gracilis, & magna ex parte nigra. Sed quæ testaceam faciem habet, terrā amplexa est. Improbatur candida. Oculorum medicamentis botryitis nomine, & onychitis, vtiles: reliquæ ad emplastra, & farinas quæ cicatricibus inducendis insparguntur. Ad eadem Cypria prodest. Ex Macedonia verò, Thracia, & Hispania delata improbatur. Cadmiæ effectus adstringere, caua explere, sordes expurgare, exiccare,

καθαίρει δὲ κοιλίαν, ἄγων χολήν καὶ φλέγμα.

ΠΕΡΙ ΠΑΝΤΟΣ

λιθοῦ μεταλλικοῦ.

Πρὶ Καδμείας. Κεφ. πδ΄.

Καδμείας ἀείσῃ μὲν ὅτιν ἡ κωφρία, καλεμένη δὲ βοτρυίτις, πυκνὴ, βαρεῖα μέσως, καὶ μᾶλλον ἐπὶ τὸ κουφότερον ῥέπουσα, ἔχουσα πλὴν ἐμφανείαν βορβώδη, χρώματι αποδεδιδως, θλασθεῖσα δὲ ἐντεφρος ἐνδοθεν καὶ 10 ἰώδης. ἐχόμενη δὲ ὅτιν ἡ ἑξώθεν μὲν κωανίζουσα, ἐνδοθεν δὲ λευκοτέρη, διαφύσεις ἔχουσα ἐμφερεῖς ὀνυχίτη λίθῳ, τοιαῦται γὰρ εἰσιν αἱ ἐν τῶν παλαιῶν μετὰ λῶν ὀρυκτάμεθα. Εἰς δὲ καὶ 15 πλακώδης τις λεγομένη ὥσπερ ζώνας ἔχουσα τὰς διαφύσεις, ὁθεν καὶ ζωνίτην αὐτὴν ἐκάλεζ. καλεῖται δὲ τις καὶ ὀσρακίτις ἰαχρὴ, καὶ ὥς ἐπιτοπολὺ μέλαινα. γινώδης δὲ ἡ ὀσρακώδης κεχρημένη 20 ἐμφανίᾳ. φανὴ δὲ ἡ λευκή. χρυσιμεύει δὲ πρὸς μὲν τὰ ὀφθαλμικὰ φάρμακα ἡ βορβυίτις καὶ ὀνυχίτις καλεμένη καὶ δὲ λοιπαὶ εἰς ἐμπλάσους καὶ ἐνθε κατουλουῶν δυνάμεθα. καὶ πρὸς ταῦτα χρυσί 25 μεύει ἡ κωφρία. ἡ γὰρ ἐν μακεδονίας καὶ θράκης καὶ ἰσπανίας κορυζομένη, ἄσπετος. Δυνάμειν δὲ ἔχει συπληκὴν, κοικωμάτων ἀνασπληρωματικὴν, καθαρίτικὴν ῥυπαριῶν παρεμώλῳσι

παρεμπλάσσει δὲ καὶ ξηραίνει καὶ
 ἔραρει, καὶ σέλλει τὰ ἐκσάρκω-
 ματα, καὶ τὰ χαλκήθη τῶν ἐλκῶν
 ἀπουλοῖ. Γεννᾶται ὅ ἡ καδμεία
 ἐκ τοῦ χαλκοῦ χαμινεομόρφου,
 5 πρὸς ἀνάσσει τῆς λιγνύος τοῖς
 τοίχοις καὶ τῇ κορυφῇ τῶν χαμί-
 νων. εἰσι δὲ αὐταὶ σιθῆσαι πάμ-
 μεγάλαις, ὑπὸ τῶν μεταλλου-
 ρῶν καλέσθαι ἀκεσίδαις, κατὰ
 κορυφῇ συνημιόρμαι πρὸς τὸ
 10 κατέχευται καὶ ἐφιστάνει τὰ ἀνα-
 φερέσθαι σώματα ἀπὸ τοῦ χαλ-
 κοῦ. ἅπαρ δὲ καὶ μάλλον ἐφιστά-
 νοντα ἐπισωματῶνται, καὶ ποτὲ
 μὲν ἐν εἶδος αὐτῶς, ποτὲ δὲ διό,
 ἢ ἅπαντα ἀποτελεῖται. μεταλ-
 15 λουργεῖται δὲ ἐκ τοῦ πρὸς πρὸς κει-
 μόρου σολέου ὅρου τοῦ λεγομένου
 πυρίτου λίθου χαμομόρου· ἐν δὲ
 τῷ αὐτῷ ὅρει εὐεῖσκειται οἶονεὶ
 διαζώματά πησι χαλκίτεως,
 μίσους, σῶρεως, μελανθειας
 20 κυανῶ, χρυσοκόλλης, χαλκαν-
 δου, διφρυγῶς. πῖνεις δὲ καὶ ἐν
 μετάλλοις φασι λίθῃσις εὐεί-
 σκεσθαι καδμείαν πλανώμορμους
 ὑπὸ λίθων πολλῶν ἐμφερεῖαν ἐ-
 χόντων· ὥσπερ καὶ ὁ ἐν τῇ κύ-
 25 μῃ λίθος εὐεῖσκόμορμος. Δύ-
 νάμην δὲ οὐδεμίαν ἐνδεικνύμε-
 νος. ἐπιγινώσκοντες αὐτῶν ἐκ
 τοῦ κορυφῶτερος αὐτῶν εἶναι
 τῆς καδμείας, καὶ διαμασσηέν-
 τας μὴ ἐπικεῖς ἐν τῇ γένεσι.
 ἀγακτεῖν

exiccare, corporis meatus in-
 farcire, excrescentia in carne
 coërcere, crustas creare, & vl-
 cera quæ cachoëte vocantur,
 ad cicatricem perducere. Gi-
 gnitur cadmia ex ære in fornā
 cibus candente, fuligine ege-
 sta flatu, & lateribus cameris-
 que fornacum inhærete. Præ-
 grandes autem ac ferreæ sunt
 rudes ab officiniis appellatæ a-
 cestides, per sūma fastigia cō-
 nexæ & concameratæ, vt quæ
 ab ære iactantur sursum cor-
 puscula cohæreāt, & inibi de-
 tineantur: quæ cum spissius in-
 fident, in corpus concrescunt,
 & modo gen⁹ vnū eius, modo
 duo, modo omnia perficiunt.
 Extrahitur & cadmia ī Cypro
 ἐ monte, qui Solis incumbit,
 cremato lapide cui pyritæ co-
 gnomen est: in quo etiā mon-
 te quædam quasi venæ chalcit-
 tis, misyos, foreos, melanteriæ,
 cærulæi, chrysocollæ, atramēti
 sutorij, diphrygisq; inueniunt.
 Nec desunt qui cadmiā in lapi-
 dum fodinis inueniri tradant,
 falsi quadā lapidum cognatio-
 ne: qualis inuenit, & apud Cu-
 mas lapis, nullam sui vim ostē-
 dens. In eo deprehenduntur, q̃
 sunt cadmia leuiiores, nullumq;
 alienū mādētibus sapore exhi-
 bent.

DIOSCORIDIS

bent: commanducatus item la-
pis, dentes offendit: cadmia, vt-
pote cum cedat, esum non re-
spuit. Alio autem discerni pos-
sunt argumento: Cadmia in fa-
rinā detrita, & aceto subacta,
atq; in sole siccata, coit: quod
in lapide nō accidit. Item trit^o
& igni appositus lapis, profilit,
& fumum igni similem eiacu-
latur: cadmia verò quieta ma-
net, fuliginēq; luteo colore aut
æreo splendentem expuit, va-
rio zonarum discursu. Insuper
lapis ignem expertus, atq; refri-
geratus, colorem mutabit, ac le-
uior multò fiet. sed cadmia ni-
hil euariat, nisi quis eam multis
diebus cremauerit. Fit & in ar-
genti fornacibus candidior, ac
minus ponderosa, sed viribus
nequaquam comparāda æra-
riæ. Vritur cadmia superior car-
bonibus obruta, donec trans-
lucida spectetur, & ferrei ster-
coris modo bullet: mox extin-
guitur vino Aminæo, q̄ ad em-
plastra præparatur: sed quæ ad
pforarum medicamenta præ-
paratur, aceto. Alij hoc modo
exustā conterunt in vino, rur-
sumq; fictili crudo torrēt, do-
nec pumicosa videatur: iterūq;
tritam ex vino, tertio vrūt, do-
nec prorsus in cinerē rediga-
tur,

ἀγανακτεῖν ὃ τὸν ὀδόντα ἐν τῇ
γνώσει εἰ λίδος εἶν ἐν τῇ δια-
μασῶσει. εἰ δὲ καὶ μέγαν εἶν, ἀνέ-
χεται τῆς διαβρώσεως σιωπικέ-
σης αὐτοῦ. ἐπὶ διακρίνει καὶ τῷ
μὲν καὶ μέγαν λειοτελεῖται, 5
αὐτὸν ὅξος, καὶ ξηραίνει ἐν ἡλίῳ ἐκ-
πέζειν. τὸν δὲ λίδον μὴ πάχειν
τέτοιο, καὶ ἐν τῇ ἐπιένει μὲν τὸν
λίδον τεταυμένον πρὸς ἀποπι-
δῆν, καὶ τὸν ἐξ αὐτοῦ χαπνὸν ὁμοί-
δῃ ὑποφέρει τῷ πρὸς τὴν δὲ 10
καὶ μέγαν, μένειν τε καὶ ἀναδιδό-
ναι αἰσθάνει μολίβδου καὶ χαλ-
κοφάνῃ, ὡς περὶ ζώνων πινὰ ποι-
κίλλω. ἐπὶ ὁ μὲν λίδος πυρρῶς
καὶ ψυχρῶς ἀμειβόμενος τῷ χρώ-
ματι, καὶ κρυότερος ἔσται, ἢ δὲ κα- 15
μέγαν κατ' ἐξὲν μεταβάλλει, εἰ-
μὴ πρὸς αὐτὴν ἐφ' ἡμέρας ἡμέρας
ἐκκαύσει. χυνοῦ δὲ καὶ ἐν τῶν ἀρ-
γυρίων λευκοτέρη καὶ κρυότερη
ἔσται, καὶ δὲ τὴν δαυαμιν ἡπλιών,
καυσέον δὲ τὴν περὶ ἡμῶν 20
καὶ μέγαν ἐκρύπτοντας εἰς ἀν-
δραχμὰς, ἕως ἢ διαφανὴς γίνηται,
καὶ πομφολυγῆσι ὡς αἰσθάνει σκα-
εἶα· εἴτα ἐν οἴνῳ σβεννύει ἀραι-
ναίῳ, τὴν δὲ εἰς τὰ ψαλίδας ὅξος.
πρὸς δὲ τὴν ἔτω κατέσταν ἀνα- 25
λεάναντες, οἴῳ κατὰ πῶσι πάλιν
ἐν ὁμῇ χύβρα μέγαν καὶ σπινθῆρα
ἢ ὅψιν γίνηται· πάλιν δὲ μετ' οἴ-
νου λεοβιθήσας βίτον, καί ποσι μέ-
γαν τελέως εἰς σποδὸν ἀναλυθῇ,
μὴ δὲ

μηδὲν ἔχειται τραχύ· καὶ ἀντὶ πο-
δὶς χεῶν τῇ τοιαύτῃ. παλιῶν
δὲ ἐν θυῖα τελεομένη σὺν ὑδα-
τι, ἀποχευόμενος τὸ ὑδατος ἄχρι
μηδὲν ἐφιστῆται ῥυπαρὸν, καὶ ἀνα-
στραθεῖται ἀποτίθεται.

Πρὶ Πομφόλυγος.

Κεφ. πῆ.

Πομφόλυξ σποδὶς εἰδικὸς δια-
φέρει, ἥτις καὶ γὰρ ἔχει παρὰ
λαβῶν. ἡ μὲν γὰρ ὑπομελανίζει
καὶ βαρυτέρα ὅτι καὶ τὸ πλείον,
ἐμπλεως καρφῶν, καὶ τει χῶν καὶ
ῥῆς ὡσὰν ἀπὸ ψηγμάτι καὶ σύρ-
ματι τὸ ἐν τοῖς χαλκεργείοις ἐδά-
φον καὶ χαλμῶν οὖσα. ἡ δὲ πομ-
φόλυξ λιπαρὰ ὑπόχρη καὶ λευ-
κή, ἥτις δὲ κορυφαία, ὡς δυνά-
μις ἐπιποτάμις τῷ αἵρι. καὶ
ταύτης δὲ δύο ὅστιν εἶδη. τὸ μὲν,
αἰερίζον καὶ ὑποπίμελον· τὸ δὲ,
λίαν λευκόν, καὶ ἀκραν ἔχον κε-
φότης. γίνεται δὲ ἡ λευκή πομ-
φόλυξ, ὅταν ἐν τῇ χατεργασίᾳ καὶ
τελειώσει τὸ χαλκοῦ, πυκνότε-
ρον οἷον τῶν χαλκεργείων συν-
εμπόσωσι λελεασμένην χαλμεί-
αν, βελπιῶν ἀντὶ βελόμβροι.
ἡ γὰρ ἀπὸ ταύτης ἀναφερμένη
αἰδιάλη λευκοτάτη οὖσα πομ-
φυλογοῦται οὐ μόνον δὲ ἐν τῇ
ῥῆ χαλκῇ χατεργασίας τε καὶ ὑ-
λης γίνεται πομφόλυξ, ἀλλὰ καὶ
ἐν χαλμείας παρηγορμένης ἐκ-
φυσωμένης εἰς ῥῆσιν αὐτῆς.

ποιεῖται

tur, nihil scabritiæ retinēs: hac
spodij vice vtuntur. Lauatur
autem in mortario trita, effusa
subinde aqua, dum sordidum
nihil emergat: dein coacta in
pastillos reponitur.

Pompholyx.

Cap. LXXXV.

Pompholyx specie sola, non
genere, à spodio distat. Siquidē
spodos nigricat, & plerunque
ponderosior est, pælearum pi-
lorumque plena, quasi purga-
mentum quoddam, quod ab
ærariarum officinarum pauis-
mētis & fornacibus eueritur,
pompholyx verò pinguis est,
& candida, vsque adeo levis, vt
in auras euolare possit. Cuius
duo fluxerūt genera: vnum ad
aëris colorem vergens, subpin-
gue: alterum magnopere can-
didum, summamque leuitatem
nactum. Candida fit pompho-
lyx, quoties in perficiūdo ære,
fabri præstantiorem facere vo-
lentes, detritam cadmiam cu-
mulatius insparserint. Nanque
tenuissima fauilla, quæ effe-
tur, in pompholygen coit. Cæ-
terum pompholyx non ex æ-
ris modo materia, & fabrilī in-
dustria facitatur, sed ex cad-
mia quoque, ad gignendam ip-
sam, eximiè follibus proflata.

N ij Cuius

DIOSCORIDIS

Cuius faciundæ ratio hæc est: In domo gemina cōtignatione operta, fornax extruitur, iuxta quā mediocris fenestra ad tabulatum à supernis partibus pateat: domicilij paries fornacis proximus, tenui foramine ad fornacē vsque perforetur, ad excipiendam follis narem: ostium mediocre habeat, pro exitu ingressūq; artificis fabricatum: domūcula altera huic coniuncta sit, in qua & folles, & flator suo munere fungantur: deinde carbonibus in camino succensis, assidens artifex cadmiam particulatim fractam inspargit, à locis supra infurnibulum extructis: idem negotium obit inferné artificis minister, simulq; carbones adiicit, vsque dum indita cadmiæ copia prorsus absumatur. Itaq; egesta suffitu tenuis pars, & levis materiæ in summā donū euolat, & parietibus, tectis, fornicisq; adherescit: cōflatum autem inde corpus, inter initia erumpentibus aquarum bullis simile prodit, postea maius incrementū capeffens, glomusculis vellerū simile redditur. Ponderosius autē in ima loca se recipit: sed hoc fornacib⁹ effūdit, illud dom⁹ pauimēto coheret.

Quod

ποιεῖται δὲ ὕτως· ἐν οἴκῳ δισέξῳ
κατασκευάζει ἡμίονος, καὶ κατὰ
ταύτην πρὸς τὸ ὑπὸ ὧν ἐκτομὴ
σύμμετρος ἔστι καὶ ἐκ τῆ ἀνωθεν με-
ρῶν ἀνωμύλον· ὁ δὲ τοῦτος τῶ οἴ-
κηματος ὅτι πλησιάζει ἡ ἡμίονος, 5
πρὸς τὴν λεπτὴν τήματα ἀχρὶς αὐ-
τῆς τῆ χώνης εἰς παρεσθλὴν φουσ-
σητῆρας· ἔχει δὲ καὶ δύοσαν σύμ-
μετρον πρὸς εἰσόδον καὶ ἐξόδον κα-
τασκευασμένῳ ὑπὸ τῆ τεχνίτης·
συνῆπται δὲ τέτω τῷ οἰκήματι 10
ἕτερος οἶκος, ὃς αἱ φύσαι καὶ ὁ φουσ-
σητῆς ἐργάζει· λοιπὸν ἀνδρακας
ἐν τῇδε τῇ καμίνῳ καὶ πυρρῇ,
ἔπειτα παρεσθλὴς ὁ τεχνίτης ἐμ-
πάσσει λελεπτοκοπιμύλον τῷ
καδμείῳ ἐκ τῆ ὑπὸ κεφαλῇ τῆ 15
χώνης τόπων· ὁ ὑπὸ χεῖρά τε τὸ
αὐτὸ ποιεῖ ἄμα καὶ ἀνδρακας
πρὸς μεβάλλει, ἀχρὶς ἂν ὁ πρὸς-
σέδει· πληθὺς ἀναλώσῃ· ἐνδυ-
μιωμύλον ἐν αὐτῇ, τὸ μὲν λεπτομε- 20
ρὲς καὶ κῆρον, εἰς τῆ ἀνω ἀναφέρει
οἶκον, καὶ πρὸς τῶν τοῖς τοῖχοις
αὐτῆς καὶ τῇ ὀρθῇ· τὸ δὲ σῶμα τὸ
ποιεῖ μύλον ὑπὸ τῆ ἐπιφρομύλων,
κατὰ ἀρχαῖς μὲν τῆ ἐπισταμύλων 25
τῆ ὑδάτων πομφόλυξιν εἰκότος γί-
νει, ὅτε δὲ πλεῖστος τῆ ἀντή-
σεως συμβαίνει σῆς ἐρίων ἰσχύπαις
ἀφρομοῖνται τὸ δὲ βαρύτερον εἰς
τὸν ὑπὸ πόδα χωρεῖ τόπος, καὶ
ὡς χεῖται τὸ το μὲν τῇ καμίν-
ῳ, τὸ δὲ τῷ ἐδίδει τὸ οἶκου·
ὁ καὶ

5 ὃ καὶ θαυλώτερον τῶ λεπτωμερὲς
 ἡγητέον, διὰ τὸ γεῶδες καὶ ἔμ-
 πλειων ἀκαθαρσίας εἶναι ἐν τῇ
 συγκομιδῇ. πῆνες δὲ μόνως ἔτως
 οἶονται γίνεσθαι τὴν περιεξη-
 10 μύλῳ ποδῶν. αἰείσῃν δὲ ἡγη-
 τέον τὴν κυρίαν ἐν τῷ ὄξει φυ-
 ρεθεῖσαν, ἀποφορᾶν μὲν ἔχου-
 σαν χαλκῷ, χροᾶν δὲ ποσίζου-
 σαν ποσῶς, ἐπὶ δὲ βορβορεύουσιν
 ἐν τῇ γούσει· καὶ ἐπ' ἀνδρακος
 20 διαπύρου ἐπιτεθῇ ἄδολος, ἐπι-
 ζεῖ ἀρόχους γινόμενῃ. ἐπιμελῶς
 δὲ περισεκτέον τοῖς περιεξημέ-
 νοις κριτηρίοις. δολεῖται γὰρ ὑπό-
 πινων ταυροκόλλη· ἢ πνεύμοσιν
 αἰρενοῖς ἢ θαλασσοῖς ἢ κακῶν μέ-
 25 νοῖς ὀλυώδοις καὶ πῖσιν ἄλλοις
 παρὰ πλοίοις, ἐν χερσὶ τὸ δια-
 γνῶναι· ἐδὲν γὰρ τῶν περιεξημέ-
 νων ἐν τῇ δοκιμασίᾳ ἐπὶ τέτων
 εὐρίσκεται. πλυτέον δὲ κοινῶς
 πομφόκονα ἢ βόπον τῆτον· ἐν δὲ
 30 σῆς αὐτῇ ἐν καθαρῷ ὀδονίῳ μέ-
 σως ἔχουσαν ἀραιότητος, ἢ ξηρὰν
 ἢ ὑδατι πεφυρεμύλῳ, καὶ δεῖς εἰς
 λεκανίῳ ὑδρὶ ἔχουσαν ὁμβρίον. καὶ
 ἔκλυζε ὧδε καὶ κείσθαι διαφύρων
 πὺν ἐνδεσμον· οὕτω γὰρ τὸ μὲν ἰ-
 35 λυῶδες καὶ νόστιμον αὐτῆς ἀπορ-
 ρύησεται, τὸ δὲ σκύβαλον πάντῃ ἐν
 τῷ ὀδονίῳ μῆνει. εἴτα ἐάσας κα-
 ταστῆναι, ἀπόδησον τὸ ὑδρὶ σὺν
 τῇ ποδῇ, καὶ πάλιν ἄλλο ἐπι-
 χέας ἀνατάραξε καὶ ἀπόχει·
 καὶ

Quod tenuiore deterius existi-
 mandum est, ideo quod mul-
 tum terræ collegerit, & spurci-
 tia in acervatione referciatur.
 Sunt qui hoc modo tantū fie-
 ri spodium arbitrantur, de qua
 antedictum est. Optima credi-
 tur Cypria, quæ accepto aceto
 halitum æris præstat, colore a-
 liquantum piceo, sapore coeni
 horrido: & si fraudem nō ex-
 perta flagranti carbone infer-
 uescit, æreum colorem con-
 trahit. Antedictis autem notis
 diligenter attendendum est. Si-
 quidem à nonnullis adultera-
 tur à taurino glutine, ouillo
 pulmone aut marino, aut cre-
 matis grossis, & quibuscūq; cō-
 similibus, quod facile cognitu
 fuerit: quippe nihil in iis pro-
 bandis inuenietur eorum quæ
 antè dicta sunt. Pompholygē
 in cōmune ita lauari oportet:
 Ligatā linteo mūdo modiceq;
 raro, aut siccā, aut aqua resper-
 sam, in labellū demittito, quod
 imbrē contineat, & huc atque
 illuc fasciculū deferēs, immer-
 gito: ita enim limosa pars eius
 ac vtilis effluet, & omne sedi-
 mentū in linteolo remanebit.
 Postea residere finēs, aquā cū
 cinere colis incernito, & nouā
 infundēs, agitato, & effundito:

DIOSCORIDIS

mutata tantisper aqua, & colata, dum arenosi nihil fidat. Demum aquam exprimito, & siccatum cinerem recon-
diro. Alij, quantum maximè fieri potest, siccant, & manibus in aqua conterunt, dum mellis crassamentum imitur. deinde linteo faucibus excepturi vasis obtento, aut laxius illigato, colāt, & quò facilius transeat, infusa per linteum largiore aqua, cinerem conturbant: mox spumofum, quod traiectum est. & supernatat vasi, concha excipiunt, & fictili nouo ad vsus recondunt. Quod vero refedit, sensim cribratum in aliud vas transfundunt, relicto arenoso quod pessum ierat: rursus lapidosa fidere patiuntur, & in vas aliud excolant: hoc identidem faciūt, donec cinis merus & arenæ expers inueniatur. Alij paulatim integram in aqua respergunt, arbitrati arenas lapillosque suo pòdusculo degrauiatos, pessum ire: pilos autem & paleas leuitate sua in sublime attolli. Cæterum cinerem medium separant, & in pilā coniectum, vt cadmiam, eluunt.

Quinetiā

καὶ τὰ πάντα ποιεῖ ἀπιδῶν τε καὶ ἀπο-
χέων, μέχρις αὖ μηδὲν ἀμμιῶδες
ὑφίσταται· λοιπὸν τὸ μὲν ὕδωρ ἐξέπι-
σον, τὸ δὲ σποδὸν ξηράνας ἀποπί-
σα. πηγὲς δὲ ξηραίναντες ἐφ' ὅσον ἐ-
δέχεται, τὸ χερσὶ λεαίνουσι μὲν ὕδατος, καὶ
μελιτώδην τὸ σύστασιν ποιήσαντες,
διηδοῦσι δὲ ὀδονίῳ περιπετάσαντες
αὐτὸ τὸ ὑποδέχεται μέλλοντι ἀ-
γείῳ, καὶ ἀποδίδεται εἰς λίαν ἀπο-
ταμένον, πρὸς δὲ τὸ ῥαδίως διεξε-
λεῖν διαμύλεις ὕδωρ ὀπιχέαντες τῷ
ὀδονίῳ, ἀναταράσσουσι τὸ σποδόν· ἐ-
τα τὸ διηλυθέν καὶ ὀπνηχρόμῳ αὐ-
τῆς τῷ ἀγείῳ ἀφρώδες ὄν, αὐτό-
θεν μύλας ἀναλαμβάνοντες, ἀπο-
πίδουσι εἰς ὀσφάκτιον χαλκὸν ἀγείον.
τὸ δὲ ἐγναθὴμόν πρὸς διασπ-
σαντες μεταχέουσιν εἰς ἕτερον ἀγεί-
ον, ἀπολεπομένους τὸ ἐν τῷ πυθμῆ-
νι ἀμμιῶδες· πάλιν δὲ ἐάσει ὑπο-
στῆναι τὰ λιτώδη εἰς ἄλλο ἀγείον.
καθάρσιν, ἀπιδῶσι καὶ τὸ πολλὰ κ-
ερῶσιν ἕως ἂν καθάρῃ καὶ ἀμέτο-
χος αὐμὴ γῆνῃ ἢ σποδὸς· ἄλλοι δὲ
ὥς ἐστὶν ὁλομερὲς εἰς ὕδωρ κατ' ὀλ-
γον ἐμπάσσουσι πλὴν περιεξημένῳ,
οἰόμενοι ἄμμιον μὲν καὶ τὰ λιτώδη
τῷ ἰδίῳ βάσει εἰς τὸν πυθμῆνα τὸ
ἀγείου καταρρύνεσθαι· τείχας
δὲ καὶ κέρφη καὶ τὰ ὅμοια ἐπαιωρη-
θήσεσθαι διὰ πλὴν κορυφότητα· λοι-
πὸν χωρεῖσαντες αὐτῶν πλὴν σπο-
δὸν ἐν μέσῳ οὔσαν καὶ εἰς δύσιν βα-
λόντες, πλύνουσιν ὥς καθαρῆσαν·
πλύνει

πλωέται δὲ καὶ οἶνω χίω τε θα-
 λασσωμένῳ κατὰ τοὺς περσειημέ-
 νους τρόποις καὶ γίνεται συπλίκωτέ-
 ρα τῆς ὕδατι πλωομένης. Δύ-
 ραιων δὲ ἔχει ἡ πομφόλυξ συπι-
 κήν, ψυκτικήν, ἀναπληρωτικήν,
 χαθαρτικήν, παροπλαστικήν, καὶ
 ποσῶς ξηραντικήν*. ἔαν δὲ ὀπι-
 σσαι δέη τὴν σποδὸν, λεάνας ἐπι-
 μελῶς αὐτῇ καὶ ἀγαθεύσας ὕδα-
 τι, ποιήσας βροχίοις, διὲς ἐπὶ ὁ-
 σρακον κενόν, ἐπιτίθει δὲ τὸ πο-
 δὸν ἐπὶ λεπτὴν καὶ κέφλω ἀνδρακιδαν,
 καὶ σπέρει τὰς κυκλίους συνεχῶς,
 ἀρχὴς ἂν πυρρῶν καὶ ξηρῶν ἡνίων.
 ζωστέον δὲ ὅτι ἐν τῷ χυρσῷ καὶ
 ἀργύρῳ ἐπὶ δὲ καὶ μολύβδου γί-
 νεται σποδὴ καὶ ἐστὶ μὲν τὴν κυ-
 ροῖαν ἡ ἐν τῷ μολύβδου ἀείση.

Πρὶ Ἀντισπόδων. Κεφ. ας.
 Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ ἀντίσποδα ἰχα-
 νῶς ἐν χρῆσει, ὑπερέσθης πολλὰς
 σποδῶν, τὰ ἰσοδιωαμουῦντα ἀναγ-
 γλῶν ὅσιν ὑποδείξαι, τίνα τὲ ὑ-
 πάρχει καὶ ὅν τρόπον παραληφ-
 δεῖν. λαβὼν τοίνυν μυρσίνης τὰ
 φύλλα σὺν τοῖς ἄνθεσι καὶ τοῖς
 μύρτοις ἀώροις ἐπὶ οὖσιν, ἐμβάλει
 εἰς ὠμὴν χύτραν, καὶ παρὰ λαπί-
 δος τὸ πῶμα κατὰ τὸ βραχέως συνεχέ-
 σθαι ὅπως, διὲς εἰς κέλιον κεραμι-
 κήν, ὅταν ᾖ ὀπιηθῇ ὁ κέραμος, εἰς
 ἄλλην χύτραν ὠμὴν μετὰ ραβδον.
 αὐτὸ, καὶ πάλιν κατὰ τὴν θέσιν καὶ
 ἡ δευτέρη, ἐξελὼν πλωέ καὶ χυρ-
 σῶ.

ὁ σπύγος

Quinetiā lauāt vino Chio ma-
 rina aqua diluto, modis quos
 suprà diximus: & ita reddit ad-
 stringentior, quàm aquis elo-
 ta. Vis pōpholygis adstringere,
 refrigerare, explere, purgare,
 obstruere, & aliquātum exic-
 care. Inter medicaméta nume-
 ratur, quę leniter crustas obdu-
 cunt. Quod si spodó torrere li-
 bet, diligenter tritam, & irriga-
 tam aqua, colliges in pastillos,
 fictiliq; nouo, sibiectis leuibus
 prunis, orbiculo cōtinuò ver-
 sabis, dum assicati fuluescant
 Neq; ignorādum, ex auro, ar-
 gēto, plumbóq; fieri spodion:
 verūm post Cypriū, plūbeum
 maximè commendatur.

Antispoda. Cap. LXXXVI.

Quoniam spodos sapenu-
 mero desideratur, necesse est
 ostēdere, quę simili virtute pol-
 leant, vt in spodij locum suffi-
 ci possint, antispoda vocant,
 quóque modo sumi debeant.
 Folia itaque myrti, cum flori-
 bus & baccis immaturis, in fi-
 ctile crudum coniecta, indito
 operculo continua foramina
 habente, vruntur fornacib⁹ do-
 nec figlinum percoquatur: ite-
 rum in fictile aliud crudū trá-
 feruntur, quod vbi perassatum
 fuerit, exēpta lauātur ad vsus,

N iij Idem

DIOSCORIDIS

Idem quoq; fit è termite sylue-
stris oliuæ, si habeatur: si secus,
fatiuæ cū suis florib⁹, aut malis
cotoneis dissectis, & detractis
ossibus, aut gallis, aut laceratis
lintheolis: item ex moris imma-
turi, id est cādidis, in sole pri⁹
arefactis, aut terebintho, aut lé-
tisco, cœnāthe, aut mollibus ru-
bi foliis, vel è buxi coma, vel
pseudocypereo cum flore. Alij
ficulneas frondes in sole antea
siccatas, eodem modo parant:
alij taurinurū gluten: alij succi-
das lanas asperas, pice aut mel-
le irrigatas: quæ omnia in spo-
dij vicem vsurpantur.

Æs vstum. Cap. LXXXVII.

ÆS vstum probatur ru-
brum, & quod contritu co-
lore cinnabarim imitetur: ni-
grum verò plusquam deceat,
exustum est. Fit autem è cla-
uis solutarum nauīū, fictili cru-
do compositis: subsperso sul-
phure cum sale pari, omnibus
vicissim insparsis, fictile, circū-
lito figulari creta spiramento,
fornacibus inditur, donec fi-
gilinum percoquatur. Quidā
pro sulphure & sale alumē in-
spargunt. Alij sine sulphure ac
sale, fictili multos dies vrunt.

Alij sulphure solo vtuntur,
fuliginem tamen excutiunt.

Alij

ὁ αὐτὸς δὲ καὶ θαλάσσιον σκευά-
σας παραλάμβανε. ἔσω ὃ τῆς ἀ-
γρίας ἐλαίας· εἰ δὲ μὴ, τῆς ἡμέρου
συν τοῖς ἀνδρεσσιν, ἢ δὲ μὴ μύλα
κυνδύρια κατατείμηναι, καὶ ἐξο-
σεισμένα, ἢ κικίδα, ἢ ρακηνιῶν, ἢ
ἢ ἄωρα συκόμενα λευκά, πορσεύη
ραμύα ἐν ἡλίῳ, ἢ ἡρίνον, ἢ τέρμιν-
θον, ἢ οἰνάνθη, ἢ βάλε τὰ ἀπαλὰ
φύλλα, ἢ πύρε κόμας, ἢ τ' ἀερο-
μένην ψευδοκύπρεον συν τῷ ἀν-
δρει. πινὲς δὲ κράδας συκῆς πορ-
εξηραμένους ἐν ἡλίῳ, ὁ αὐτὸς
σκευάζουσιν· ἄλλοι δὲ ταυρείαν
κόλλαν· οἱ δὲ, ἔειρα οἰσυνπρεβὰ
χέα πόση ἢ μέλιτι δεύσαντες,
ὁμοίως σκευάζουσι*.

Πρὶ κεκαυμένῃ χαλκῇ. Κεφ. πζ' 15

Ο δὲ κεκαυμένος χαλκὸς ἔσται
χαλκὸς ὁ ἐρυθρὸς καὶ ἐν τῇ τεύχει
κινναβαρίζων· ὁ δὲ μέλας πλέον
ἢ δεῖ κεκαυθῇ. σκευάζει ὃ ἐν τῇ
ἡλῶν τ' ἀεκυμύων πλοίων, συν-
πτεμύων ἐν ὥμῃ χύτρα, ὑπο-
πασπομύου δείου μτ' ἀλῶν ἴσων,
καὶ ἐπ' πασπομύων ἐνδηλᾶς, πῶ-
μαδεῖσαι δὲ ἢ χύτρα καὶ ὑποχρη-
δεῖσαι πηλῷ κεραμικῷ, διδοται
εἰς ἡμίονον, ἄρχης ἔτελείως ὁ-
πληθῆ. οἱ δὲ, ἀντὶ τῆς δεινῆς καὶ πῶν
ἀλῶν συπληθείαν παρέμπεπασσιν.
ἐνιοὶ δὲ δίχα τῆς δεινῆς καὶ τῆς ἀλῶν
συνδένει ἐν χύτρᾳ, καί εσθ' ἐφ' ἡ-
κανὰς ἡμέρας. οἱ δὲ, τῷ δεινῷ μόνῳ
χρῶν, ἀπασβολοῦνται μὲν τοι-

ἀλλ' οἱ

ἄλλοι δὲ χρίοντες τὰς ἡλούς αἰ-
 σῇ συπληρία μετὰ δείου καὶ ὀ-
 ξούς, καίουσιν ἐν ὥμῃ χύτρα. ἄλ-
 λοι δὲ ἐν χαλκῇ χύτρᾳ ὅξει κα-
 ταρράνοντες αὐτοὺς ἔτως ὁπῶ-
 5 σι μὲν δὲ τὸ καίειν πάλιν τὸ αὐ-
 τὸ ποιοῦσιν ἐπὶ τοῖς, ἔπειτα ἀ-
 ποτίθενται. περὶ τοῦ δὲ ὃ ἐν
 μέμφιδι καὶ ὀμβρός· ἔπειτα ὃ ἐν
 κύπρῳ. δυνάται δὲ εὖ φειν, ξηραί-
 νειν, λεπτύνειν, κατατέλλειν, ἐπι-
 10 ποᾶσθαι, ἀνακαταίρειν ὅτι ἀπου-
 λουῖ· σμύχειν τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς,
 τῇ κιν τὰ ὑπερσαρκοῦντα, νομάς
 ἐσθλὴν κινεῖ ὅτι καὶ ἐμέτοις μὲν ὕδρο-
 μέλιτος ποθεῖς ἢ ἐκλειχθεῖς σὺν
 μέλιτι, ἢ διαχρυσόμβρος. πίνεται
 15 δὲ ὡς ἡ χαρμεία τε βράχης τῆς ἡ-
 μέρας ἀνίστασθαι τὸ ὕδατος, ἀ-
 χρυσόμβρος ἐφίστη ἡ λάμπη, καὶ
 ἡ σικεῖα ὅτι αὐτὴ ὡσαύτως πλυ-
 νομένη, τίω αὐτὴν ἔχει δυνάμειν,
 ἀδινεστέραν μὲν τοῖς.

20 Περὶ Ἀνδρῶν χαλκοῦ.

Κεφ. αἴ.

Χαλκοῦ δὲ αἴθος ὃ πινεσ τῶν
 παλαιῶν ἡλῶν ψῆγμα ἐχάλε-
 σαν, αἰετόν· ὅτι τὸ εὐδρυπῆλον
 καὶ κατὰ πυρρὸν ἐν τῷ λεαίνεσθαι,
 25 κεχρυσάμενος τε τῷ ῥυθμῷ καὶ
 βραχύ καὶ βαρὺ καὶ μέσως σίλ-
 βον, ἐπὶ δὲ ῥησιμμάτων χαλκοῦ
 ἐμέτοχον οἷς δολοῦται. ἐλέγ-
 χεται δὲ πλατυομένην αὐ-
 τῶν τῶν ὅσοντων ἐπερείσεις.
 γίνεται

Alij oblitos scissili alumine cla-
 uos, cum sulphure & aceto, fi-
 ctili crudo cremant. Alij in æ-
 nea olla aceto resperfos, vrūt.
 & iterum ac tertio idem effi-
 ciunt, postea recondunt. Prin-
 cipem locum tenet, in Mem-
 phide combustum: proximum
 in Cypro. Adstringit, exiccat,
 reprimit, extenuat, attrahit: vl-
 cera purgat, & ad cicatricem
 perducit: vitia oculorum emē-
 dat, excrecētia in carne consu-
 mit, nomas cohibet, vomitus
 ciet, cum hydromelite potum,
 aut cum melle delinctum, illi-
 tūmve. Lauatur vt cadmia, mu-
 tata quater die aqua, donec
 nulla prorsus fordes emergat.
 Aeris recrementum, stercoſive
 quam scoriam vocant, eodem
 modo lauatur: & eādē vim,
 sed imbecilliolem habet.

Flos æris. Cap. LXXXVIII.

Flos æris, quē nōnulli clauo-
 rum veterū pſegma quāsi re-
 segmē aut segmentū, nomina-
 rūt, optimus est friabilis, in at-
 tritu fulueſcens, milij effigie, &
 numero, brevis, pōderoſus, mo-
 dicē splēdens, atq; cōstringēs,
 q̄ delimatā æris ſcobē nō rece-
 pit, qua sæpe adulteratur. Sed
 id facile deprehēditur, cū den-
 tium illitu dilatantur ramenta.

Fit

DIOSCORIDIS

Fit autem, cum es fornacibus
fufum, in receptacula delabi-
tur, per cola fistularum ad ea
pertinentium: tum huic nego-
tio addicti ministri, sordes ex-
purgantes, aquam clarissimam
infundunt, refrigerandi pro-
posito: itaque repentino con-
cretu, ac addensatione, velut
expuitur, & erumpit antedi-
ctus flos. Astringit, & excre-
scētia coërcet: offusam oculis
caliginē emendat, sed magno-
pere mordet. Quaternū o-
bolorum pondere datus, cras-
sum humorem extrahit: car-
nosa narium & sedis vitia ab-
sumit: eruptiones papularum
cum vino cohibet. Candidus
contra diuturnas aurium gra-
uitates tritus, in eas per fistu-
lam flatu impellitur: vnam, ton-
sillāsque reprimat, farina eius
cum melle admota.

Squāma eris. Cap. LXXXIX.

Squāma eris excussa ex Cy-
priis officinarum clavis, crassa
quidē ipsa præstātor quæ heli-
tis, id est clauaris, nominatur.
sed ex vili promiscuōq; ere, aut
cādido vitiosa intelligitur: quā,
vtpote tenuē, & inualidā, dam-
namus, maximē approbantes
crassam, rufam, præsertim si a-
ceti resperfu eruginē cōtrahat.

Vim

γίνεται δὲ οὕτως, ὅταν ἐν με-
ταλλικαῖς χύταις τακεῖς ὁ χαλ-
κὸς εἰς τὰς δεξαμενὰς καταρ-
ρῇ διὰ τῶν ἡθμῶν τῶν δικόν-
των σωλῶν, διακαθαίροντες
τὴν ἀκαθαρσίαν οἱ πρὸς τοῦτοις
ὄντες, ὕδωρ ἐπιχέουσιν ἀκρα-
φέςατον αὐτῷ, ἵνα παρὰ
ἐξυμῶν· ὑπὸ οὗ τῆς αἰφνι-
δίου συνκνώσεως καὶ συναγω-
γῆς, ὥσπερ ἐκπύεται καὶ ἐ-
κπῶνται τὰ περιεργαζόμενα. εὐφρα-
δὲ καὶ τοῦτο καὶ κατασέλλει τὰς
ὑποροχὰς· καὶ σμύχει τὰ τὰς
κόραις ἐπισκοπούμενα δάκρυα ἰ-
κανῶς· ἐστὶ δὲ καὶ πάχους ἀγω-
γὸν τετραπλόου πλεονος διδύ-
μου· ἐκτῆκε δὲ καὶ τὰ ἐν μυ-
κτῆροι σαρκώματα· καὶ δακτυ-
λίων ἐξανθήματα σὺν οἴνῳ σέλ-
λει, καὶ πρὸς δυσήφοις χρο-
νίοις τὸ λευκὸν ἐμφυσᾶται διὰ σί-
φονος λείον· σέλλει δὲ καὶ κινί-
δας ἢ παρίδματα, λείον σὺν μέ-
λιτι παρὰ πτόμενον.

Περί Λεπίδος.

Κεφ. πθ'.

Λεπίς δὲ ἢ μὲν ἐκ τῶν κυπεί-
ων· χαλκουρμικῶν ἢ κων, παχέια
καλουμένη δὲ ἡλίτις, καλή. φά-
λη δὲ ἢ ἐκ τοῦ χαλκοῦ λευκοῦ
λεπτή καὶ ἀδενής ἐσφάχουσα, καὶ
ἀποδοκιμάζουσα, ἐγκείμεντος
τῷ παχέϊαν καὶ ἐγκιβρόν, καὶ ὀ-
ξους ἐπὶ ῥαινομένου ιουμένω.

Διόσκριτος

Δυνάμιν δὲ ἔχει σάλπικν, λε-
 πτωπικν· τομῶν ἐφεκτικν, σπ-
 πικν, ἀπουλωπικν· πινωμένη δὲ
 μὲν μελικράτου, ὕδωρ ἄγει. πινὲς
 δὲ φουρῶντες αὐτῷ μὲν ἀλεύρου,
 5 ἐν καταποτίῳ διδῶσι· μύνηται
 δὲ καὶ ταῖς ὀφθαλμικαῖς δυνάμε-
 σι, ξηραίνει γὰρ τὰ βλεφάρων. τὰ
 τραχέα ἀποθήκουσα, καὶ τὰ ρεύ-
 ματα. πλυνέται δὲ οὕτως· κα-
 τάρως τῆς ξηρῆς λεπίδος ἡμι-
 10 μναῖον, βάλε εἰς θυίαν μετ' ὕ-
 δατος διαγροῦ, καὶ σινταράξας
 τῇ χειρὶ ἐπιμελῶς, ἄρχῃ οὐ ὑ-
 ποστῇ ἢ λεπὴς ἀφαιρεῖ τὰ ὑπερῶ-
 τα, ἀποχέας τὲ τὸ ὕδωρ, ἐπὶ χειρὶ
 15 ὀμβρεῖα ὕδατος κύανον ἅ. πλά-
 τεία τὲ τῇ χειρὶ τείβει εὐτόνως ἐν
 τῇ θυίᾳ, οἷον εἰ ἀποψήχων· ἐπὶ αὐ-
 τῇ ἀφῆται ἀνιέναι πινὰ γλισχρό-
 τητα, καὶ μικρὸν ὕδωρ προσπι-
 χεῖ ἄρχῃ κύανον 5'. τείβων εὐ-
 τόνως ἀναλαβὼν τὴν λεπίδα τῇ
 20 χειρὶ, ὥς πρὸς τὸ πλεονεῖν τῆς
 θυίας, τείβει εὐτόνως· καὶ ἐξιπώσας
 αὐτῇ τὸ ἀπορρύνειν εἰς πυξίδα ἐ-
 ρυθροῦ χαλκοῦ. τὸτο γὰρ ὅτι τὸ
 ὡς πορ αὐτὸς τὴν λεπίδος καὶ εὐτο-
 νον τῇ δυνάμει, καὶ εὐτονοῦν εἰς
 25 τὰ ὀφθαλμικὰ. τὸ δὲ λοιπὸν, ἄ-
 τονον καὶ τὸ καλῶς ὁρῶν ὁμοίως,
 πλυνὼν, ἀναεῖν μέχρις αὐτῇ
 δέξιαν γλισχρότητα ἀπακρίνῃ, τὸ
 δὲ λοιπὸν σκεπάσαντα δεῖ ὁδονίῳ
 ἑῶσαι ἀκίνητον ἐπὶ δύο ἡμέρας,
 εἶτα

Vim habet adstrictoriam, ex-
 tenuantem, reprimentem, &
 erodentem: nomas coërcet,
 vlcera ad cicatricem perducit:
 pota ex aqua mulsa, aquam
 trahit. Aliqui farina subactam,
 dant in catapotio. Additur ad
 oculorum medicamēta. quòd
 genarum scabritiam absumit,
 & fluxiones exiccat. Lauatur
 hoc modo: Siccæ æris squam-
 mæ expurgatæ selibra, cum ni-
 tida aqua in mortario manu
 diligenter conturbatur, quo-
 usque pessum ierit: abiicitur
 quod subfidit, & effusa aqua,
 hemina coelestis imbris adji-
 citur, & distenta manu, squam-
 ma, quasi destringenda sit, ve-
 hementer confricatur: dūm-
 que lentorem emittere coepe-
 rit, aqua sensim ad sex hemi-
 nas vsque superinfunditur, te-
 rendo validè: squamma ad la-
 tus mortarij colligitur, ibique
 apprimitur: quo facto, expres-
 sus humor pyxide ex ære ru-
 bro facta, excipitur. Hoc est e-
 nim velut flos squammæ, valēs
 viribus, & ad ocularia medica-
 mēta cū primis efficax. Inutile
 imbecillumque quod superest,
 lauatur donec nullam prorsus
 lētitiā excernat, & linteo aper-
 tū biduo cōquiescere finitur,
 effu

DIOSCORIDIS

effusaque extate aqua, vbi sic-
catum erit, reconditur pyxidi-
cula. Alii vt cadmiam lauant,
& reponunt.

Stomoma. Cap. XC.

Squammæ ex acie aut mu-
cronibus decussæ, quam vo-
cant stomoma, eadem vis. La-
uatur modo simili, & recondi-
tur: sed ad moliendam alui de-
iectionem, inefficacior est.

Ærugo rasilis. Cap. XCI.

Ærugo rafa fit his modis: In
cadum, aut aliud confimile vas
acetū quàm acerrimū infundi-
tur: superponitur inde inuer-
sum æneum vas, præsertim cō-
cameratum: sin minus, planū:
fitq; obstructum, nullumq; ha-
beat spiramentum, exempto,
quo doliū obturaueris opercu-
lo: decimum post diem infidēs
ærugo deraditur. Aut æris la-
mina in cadis super acetum ita
suspenditur, ne ipsum attingat,
& totidē post dies raditur. Aut
massula æris, aut lamina vna
plurēsvē, vinaceis nō recētib⁹,
sed iā acescētibus cōduntur, &
simili modo versantur. Quin-
etiam ex delimata æris scobe
æruginem facere licet, necnon
ē laminis, quibus bractæ au-
ri conclusæ malleo ducuntur:

si quis

εἴτα ἀποχέανται τὸ ἑφεσηκὸς ὕ-
δωρ καὶ ξηρῶντες ἀποτίθενται
εἰς πυξίδα. ἔνιοι δὲ καὶ ταύτην
παλῶντες, ὡς τὴν καδμείαν
ἀποτίθενται.

Περὶ Λεπίδος σωματίου. 5
Κεφ. 5.

Λεπίδος δὲ σωματίου δύ-
ναμις ὅτιν ἢ αὐτὴ τῇ τῆ χαλκοῦ
λεπίδι. καὶ πλῆσις καὶ ἀπόθε-
σις ὁμοία ἐν μὲν τοῖς τῶ τὴν κοι-
λίαν καθεύδουσιν λέιπεται τῆς τοῦ 10
χαλκοῦ.

Περὶ τοῦ ξυστοῦ. Κεφ. 5α.

Τὸν δὲ ξυστὸν οὕτω σκευάζον·
εἰς πίδακην ἢ ἄλλο ὁμοιον ἀγ-
γεῖον ἐγχέας δριμύτατον ὄξος· ἐ-
πιχετάσας τὸν χαλκοῦ ἀγγεῖον, 5
καλὸν μὲν εἰ καμαρείδες· εἰ δὲ
μὴ γέ, ἰσόπεδον· ἔσω δ' ἐσμυ-
γμρόν καὶ διαπτολὴν μὴδεμί-
αν ἔχον, διὰ δὲ ἡμερῶν δέκα
ἀναεσύνμενος τὸ πῶμα, ἀπό-
ξυσεν τὸν ἐπιτρέχοντα τὸν· ἢ λε- 20
πίδα ἀπὸ τῆ αὐτῆ ποιήσεως χαλ-
κοῦ, ἐγκρέμασον εἰς τὸ ἀγγεῖον,
ἵνα μὴ λείψῃ τοῦ ὄξους, καὶ
διὰ τῶν ἰσῶν ἡμερῶν ἀπόξυσεν. ἢ
εἰς τὰ σέμφυλα* μὴ πρόσφα- 25
τα ὄντα ὀξίζοντα ἐγκρύψας· μά-
ζαν ἢ λεπίδα μίαν ἢ καὶ πλείο-
νας, ὡς αὐτὸς ἀνάστροφος· ἐνε-
στ δὲ καὶ ἐν ῥητισμάτων ποιή-
σαι ἢ λεπίδων, αἷς περιεχόμενα
τὰ χρυσὰ πέταλα ἐλαυνέται,
ἐφ' ἧς

εἰάν τις αὐτὰ ἐπιρραίνων ὄξει, ἀ-
 νακνῇ τοὺς ἢ τετρακίς, ἄρχῃς αὖ
 παντελῶς ἰωδῇ. ἤνῃ αὖ δὲ φα-
 σι τὸτον τὸν ἰὸν καὶ ἐν τοῖς κυφια-
 κοῖς μετάλλοις, τὸν μὲν, λίθοις
 5 ποῖν ἐπανδρῶντα ἔχουσι τὸν χαλ-
 κόν· τὸν δ' ἐκ τινος σπηλαίου ἐκζόν-
 τα ἐν τοῖς ὑπὸ κίονα καὶ μασί· καὶ
 τὸν μὲν ὀλίγον τέ καὶ κάλλιστον εἴ-
 ναι· τὸν δὲ ἐκ τοῦ σπηλαίου, δια-
 ψιλῇ μὲν ἐπιρρεῖν καὶ εὐχρῆεν, φαῦ-
 10 λον δὲ ὑπάρχειν διὰ τὸ πολλοῖς
 ἀναμεμίχθαι λιθώδεσι. δολεῖται
 δ' καὶ ἄλλοις πολλοῖς μισγόμενος,
 μάλλον δ' τούτοις· τινὲς μὲν γὰρ κισ-
 σήρει· οἱ δὲ, μαρμαρώ, ἄλλοι δὲ
 χαλκαῖον κυκῶσιν αὐτόν. κατα-
 15 ληφόμεθα δὲ πῶς μὲν κίωσκειν καὶ
 τὸ μάρμαρον, διὰ τοῦ νοτίσαι καὶ
 τὸν ἀντίχειρα τῆς ἐκωνύμου χει-
 ρὸς καὶ τῶ ἐτέρῳ περὶ στείβειν πῆ-
 μέρεσιν ἰοῦ· συμβαίνει γὰρ τὸ μὲν,
 αὐτῇ διαχειῖσθαι, τὰ δ' ἀπὸ τῆς
 20 κισσῆρεως καὶ μαρμαροῦ μέρη ἀ-
 διάχυτα μὲν, καὶ τέλος ἀπολευ-
 καίνεαδ' τῇ ἐπιπλέον παρὰ βίβει
 καὶ τῇ τῷ ὕδατος παρὰ πλοκῇ. οὐ-
 μὲν, ἀλλὰ διὰ τῆς καὶ τῶν ὁδόν-
 των ἐσφρίσεως· λεῖον γὰρ ὑποπίπτει
 25 καὶ οὐ τραχύ τὸ ἀμυγῆς. τὸ δ' χαλ-
 καῖον ἀπελέγχεται τῷ πυρὶ· εἰ
 γὰρ τις ἐμπλάσας τὸν οὕτω δε-
 δολωμένον ἰὸν ἐπὶ λεπίδα ἢ ὄσρα
 κόν, καὶ τὸ ἔτερον τούτων ἐπιθή-
 σαι ἐν θρῦμῇ τέφρα ἢ ἐπὶ ἀνθράξῃ,
 μετα-

si quis eas aceto respargat, &
 ter aut quater verset, donec
 æruginem contrahant. Tra-
 dunt æruginem in Cypriis me-
 tallis gigni, lapidibus quibus-
 dam nonnihil æris habetibus,
 quibus ærugo efflorescit: ad-
 duntque per caniculæ æstus è
 quodam specu manare: sed il-
 lam paucam & optimam esse:
 hanc speluncis effluentem, co-
 piosam quidem, & boni colo-
 ris, sed vitiosam, quod lapides
 multos collegerit. Pluribus au-
 tem modis adulterant: aliqui
 pumice admisto, alij marmo-
 re, alij atramento futorio. Sed
 deprehendemus pumicem aut
 marmor, dum pollice fini-
 stræ manus madefacto, æru-
 ginis portiunculam altero at-
 terimus: siquidem eam diffun-
 di constat, marmoris autem
 pumicisque partes coeunt nō
 dissipata, demumque tracta-
 tione crebra & humoris com-
 plexu dealbescunt. Quin &
 dentium appressu: si quidem
 sincera cedit, lævis, & sine
 asperitate. Atramentum ve-
 rò futorium igne coarguitur:
 nanque si fictile, aut lamina,
 adulterata ærugine illinatur,
 & feruenti cinere aut carbo-
 nibus incalescat alterutrum,
 muta-

DIOSCORIDIS

mutabitur, rubescetq; id quod atramentum futorium acceperit: quod id vltum suapte natura talem sortitur colorem.

Scolecia. Cap. XCII.

Æruginis quam vocant scoleciam, duo sunt genera quædam fossilis est, altera factitia ad hunc modum: In mortario Cyprij æris dimidiam heminam aceti albi acrisque, pistillo cupreo conterito, donec strigmeti crassitudine imitetur: deinde aluminis rotundi drachmā vnam, cū salis fossitij, trāslucentis, aut marini quāmalbissimi, solidique, aut certè cū nitri pari pondere terito in sole, æstuosissimis dieb⁹, sub sydus caniculæ, donec colorē æruginis cōtrahat, & cōcretu strigmentosum fiat: vbi autē se in vermiculorū Rhodiæ similium specie coegerit, recōdito. Efficax & valde boni coloris redditur, si duas parteis vrinæ veteris cū vna aceti adieceris, & alia, quæ dicta sunt, peregeris. Sūt q. æruginē rasile, quæ in apparatu nō respōdit, gūmi misto digerāt in formas, & ita vèdant: quod genus, vt vitiosum, improbat. Fit & quædā ærugo ab aurifici b⁹, mortario & pistillo Cyprij æris, cum vrina pueri impubis, qua

μεταβάλλεται, καὶ ἐρυθραίνεται τὸ χαλκανθῶδες· διὰ τὸ φύσει χαλμόφυρον αὐτὸ τοιαύτῳ ἔχει χροιάν.

Περὶ τοῦ σκώληκος.

Κεφ. 56.

Τοῦ δὲ λεγόμενου σκώληκος τοῦ διῶν ἐίδος ὑπάρχει· ὁ μὲν γὰρ ὀρυκτός ἐστιν, ὁ δὲ, σκευάζεται οὕτως· εἰς θυίαν κυπρίου χαλκοῦ ἔχουσιν δὲ καὶ * δίδυκα ἀπὸ τῆς αὐτῆς πεπτειμύρου ὕλης, ἐγχείας ὅξους λευκοῦ, καὶ δειμέως κοπίλης ἡμισυ, τείβει ἕως οὗ γλοιώδῃ· εἴτα ἐμβαλλε συπνείας στρογγύλης * < α. καὶ ἀλὸς ὀρυκτοῦ διαφανοῦς, ἢ θαλασσίης ὡς ὅτι λευκοτάτου καὶ σερεοῦ, εἰ δὲ μή γε νίτρου τὸ ἴσον, εἴτα λέανει ἐν ἡλίῳ ἐν τοῖς ὑπὸ κίνα καύμασι, ἕως τῇ μὲν χροιά ἰώδης, τῇ δὲ συστάσει γλοιώδης γήνηται· καὶ οὕτως ἀναπλάσας σκώληκος τοῖς ῥοδιακοῖς ὁμοίοις, ἀποτίθεται. ἐνεργὴς δὲ καὶ εὐχρὸς γίνεται ἄγαν, ἐὰν ὅξους μὲν λάβῃ μέγας ἔν. οὐρεοῦ δὲ παλαουῦ μέρη δύο, τὰ δὲ ἄλλα ὡς περὶ εἴρηται. πνὺς δὲ τὴν ἀποστετυγμύρον ἐν τῷ ξυστῷ κόμμει μύξαντες ἀναπλάσσοις, * ὃν παραιτητέον ὡς φαῦλον. ἐστὶ δὲ πρὸς καὶ ὑπὸ τῶν χρυσόχων γινόμενος ἴδος διὰ θυίας καὶ δίδυκος κυπρίου χαλκοῦ, ἐπὶ δὲ ἔχει παιδίνας ὥς τὸ

ὅ τὸ χρυσὸν κολλῶσιν. ἀνὰ λο-
 γοῦσι δὲ κοινῶς οἱ περιεργιστοὶ
 εἰς καὶ χρυσὸν χαλκῶ, μᾶλλον
 δὲ ἐργασίᾳ οἱ περὶ τὴν ἐργασίαν.
 ἰστέον δὲ ὅτι περὶ χειρὶ αὐτῶν
 5 ὁ ὀρυκτὸς σκώληξ· ἐργασίᾳ δὲ ἐ-
 στί ὁ ἐξυδός· εἴτα ὁ σκευαστός. δι-
 κπικώτερος μὲν τοι καὶ μᾶλ-
 λον σύμφων οὗτος ἰστέον. ὁ δὲ
 τῶν χρυσόχρῳ ἀνάλογος τῷ ἐξυ-
 δῶ. Διῶνται δὲ πᾶς ἴσος σβ-
 10 φην, θερμαίνεν, ἀποσπᾷ τὰς
 ἐν ὀφθαλμοῖς οὐλὰς καὶ λεπτύ-
 νειν, δάκρυον ἄγειν, νομὰς ἴχειν,
 τραύματα ἀφλέγματα τηρεῖν.
 ἀπουλοῦν ἔλκεθ συνὲ ἐλαίῳ καὶ
 κηρῶ· (ὡς μέλιτι δὲ ἐψηθέντες,
 15 τύλοις καὶ τὰ ῥυπαρὰ τῶν ἐλκῶν
 ἀνακαθαίρουσιν· ἀμμωνιακῶ δὲ
 ἀνακαθαίνοντες εἰς κολλύειαν, σύ-
 ειγνας καὶ τύλοις ἐκτῆκοισι. χρύ-
 σιμοι δὲ καὶ περὶ ἐπουλίδας καὶ
 τὰς τῶν οὐλῶν ἐξοχὰς. ἰστέον δὲ
 20 καὶ βλέφαρα λεπτύνουσι συνὲ μέ-
 λιτι ἐργασίᾳ· δει δὲ πυρεῖαν
 μετὰ τῷ ἐργασίᾳ σπῆγγω ἐξ ὕ-
 δατος θερμοῦ. ἀνακαθαίνοντες δὲ
 ῥητίνη τερεβινθίνη (ὡς χαλκῶ ἢ
 νίτρω, λέπρας ἐξάγουσι. χρυσέον
 25 δὲ ὅν αὖ ἐδέλκῃ ἰὸν οὕτω, θλάπτει
 αὐτὸν εἰς ὀλοκαφρέσιν μέρη, καὶ
 τηγνὼ κεραμεῖον ἐπιθεῖς, ἀπε-
 ρείσας ἐφ' ἀνθράκων διαπύρων,
 κίνει ἕως ἂν μεταβάλλῃ καὶ ὑπο-
 σπῶσθαι τῇ χρυσῇ λοιπὴν ὅτι ἰστέον.
 ἀπτο-

qua aurū ferrumināt. Antedi-
 cta æruginum genera, vltro æri
 omnino respondent, sed magis
 effectu valent. Sciendum fossi-
 lem scoleciam præstantissimā
 esse: derafam sequi: postremo
 loco factitiā. Mordacissima ta-
 men est hæc, & magis adstrin-
 gens. Aurificum autem ærugo-
 rasæ respondet. Æruginες om-
 nes adstringunt, extenuant, ex-
 calfaciunt: oculorum cicatri-
 ces emendant, lachrymas ciēt,
 nomas sistunt, vulnera ab in-
 flammatione tuētur. Vlcera ex
 oleo cerāque ad cicatricē per-
 ducunt: callos & fordida vlce-
 ra purgant, cum melle coctæ:
 callum fistularū erodunt, cum
 ammoniaco, collyrij modo in
 eas adactæ. Ad gingivarū autē
 excrementias, & extuberatio-
 nem vtilēs. Magnopere exte-
 nuant genarū crassitiem, cum
 melle illitæ: verū post illitio-
 nē sponsia ex aqua calida lo-
 cus fouendus est. Resina tere-
 binthina exceptæ, cum ære &
 nitro lepras abigūt. Vritur æru-
 go, quancunq; velis, minutissi-
 mē fracta cōminutāq; in ficti-
 li patina, flagratibus prunis su-
 perposita: versaturque donec
 se mutet, & colorem cinereū
 concipiat: postea refrigerata
 repo-

DI OSCORIDIS

reponitur ad vsum, Sunt qui cruda olla eā vrant, vti dictum est: sed non prorsus eundē colorem cremata reddit.

Rubigo ferri. Cap. XCIII.

Rubigo ferri restringit: sistit foeminarū profluvia, admota, potūq; præstat ne concipiant. Illita ex aceto, ignibus sacris, & papularū eruptionibus medetur. Perquā utilis ad scabritias genarū, reduuias, & pterygia, condylomatis prodest, gingivas firmat, podagras illita lenit, alopecias replet. Vinum aquāve in qua candens ferrum fit restinctum, potu coeliacis, dysentericis, lienosis, cholera laborantibus, & dissolutis stomacho auxiliatur.

Scoria ferri.

Cap. XCIIII.

Stercus ferri, quam scoriā vocant, eadē potest quæ rubigo, sed inefficacius. Aconito, ex aceto mulso potum, opitulatur.

Plumbum elotum.

Cap. XCV.

Lotura plumbi sic fit: In mortarium plumbeum aquam iniiciens, pistillo plumbeo terito, donec nigrescat aqua, & limi modo crassescat, aut lutulenta reddatur: linteolo deinde colato, aquam superinfundens, quo

ἀποτίθεισο καὶ χρῶ. πίνεις δὲ ἐν ὁ-
μῇ χύτρα καὶ οἶσιν αὐτὸν ὡς προ-
είρη. ἔκ εἰς τὸ αὐτὸ δὲ πᾶν τὸ
καὶ ὁ μύρος μεταβάλλει χρῶμα.

Περὶ Ἰοῦ σιδήρου. Κεφ. εἴς.

Ἰὺς δὲ σιδήρου σύφει' ῥωμῷ τε
γυναικείον παρσεδεῖς ἵχει, πνὸ-
μυρός τε ἀσυνήθην ποιεῖ. ἐπι-
χρῖόμενος δὲ (ὡς ὅξει' ἐρσιπέλα-
τα καὶ ἐξανθήματα ἴσται. παρς ἑ
παρωνυχίας καὶ περὺμα καὶ τρα-
χέα βλέφαρα ἐν χησος, καὶ κονδυ-
λώματα καὶ οὖλα κρατύνει, πο-
δαγχοῖς τε ὠφελεῖ ἐπιχρῖόμε-
νος, καὶ ἀλωπεκίας διασώζει. σιδή-
ρος δὲ πεπυρωμύρος ἐνσβεδεῖς
ὑδατι ἢ οἶνῳ καὶ πνόμενος, ἀρ-
μόζει κοιλιακοῖς, δυσεντερικοῖς, ἰσ-
σπληνικοῖς, χολειώσι, καὶ σωμα-
χῶ ἀναλευμυρῶ.

Περὶ Σκωείας σιδήρου.

Κεφ. εἴς.

Ἡ δὲ σκωεία τῆς σιδήρου δύ-
ναται ὅσα καὶ ὁ ἰὺς τῆς σιδήρου. ἐπ'
ἐλαττον δὲ. βοηθεῖ δὲ ἀκονίτῳ
μετ' ὅξυ μέλιτος ποδεῖσαι.

Περὶ Μολιβδου πεπλυ-
μύου. Κεφ. εἴς.

Σκευάζεται καὶ ὁ πεπλυμέ-
νος μόλιβδος πύτον τὸν τρέπον· ἐξ
βαλὼν εἰς μόλιβδίνῳ * θυία
ὑδωρ, τίλει μόλιβδίνῳ δολιχῇ,
ἕως αὖ μελανθῇ τὸ ὑδωρ καὶ χύνη-
ται ἰλυῶδες· εἴτα διήθῃ αὐτὸ δι'
ὀστροῦ, παρσεπύχων τε ὑδωρ.
ἐν αὖ

ἵνα παῖ τὸ διαλυθὲν ὑλιδῇ· καὶ
 πείρει τὸ αὐτὸ πάλιν ἄρχις αὐτοῖς
 αὐτὰρ ὡς ἔχει δόξῃ· εἴτα εἰσάσας
 καταστῆναι τὸ πεπλυμένον, ἀπο-
 χέας τὸ ὕδωρ καὶ ἄλλο ἐπι-
 5 χέας, πλυνεῖ ὡς τὴν καθ' ἑαυτὴν,
 ἄρχις αὐτὸν μηκέτι ἐφίστηται πρὸς
 μελανίαν· ἀναπλάσας δὲ πρὸς
 χύσκειν ἀπὸ τίθειο. οἱ δὲ, καθά-
 ρυν μίλιθρον ῥιγίσαντες, τείβου-
 σι ἐν λιθίνῃ θύρᾳ δοιδυκοὶ λιδοί-
 10 ης, ἢ ταῖς χερσὶ μεθ' ὕδατος ὑπο-
 χεῖρα κατ' ἐλκτρον ἐπιχέοντες τὸ
 μελανόμυρον· ὅπερ εἰσάσαντες ὑ-
 ποστῆναι καὶ ἀποχέαντες, ἀνα-
 πλάσσειν ἐνδέως. τὸ γὰρ ἐφ' ἰ-
 κατὸν τειβόμενον, γίνεται ψιμμι-
 15 θῖον ὁμοιον· ἐνιοὶ δὲ περὶ σκευάλα-
 λουσι τοῖς ῥιγίσμασιν ἐλκτρον μο-
 λίβδαιαν, φάσκοντες βελτίονα εἶ-
 ναι τὸν οὕτω πλυόμενον μό-
 λιθρον· Διόταται δὲ ψυχρὴν, σύ-
 φειν, παρεμπιπτόμενην, μαλάττειν,
 20 πλυνεῖν τὰ κοιλώματα, σέλ-
 λειν τὰ ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ῥεύ-
 ματα, καὶ τὰ ὑποσφαινοῦντα
 τὰ ἐλκῶν· ἐστὶ δὲ καὶ ἰχθυόσας καὶ
 πρὸς τὰ ἐν τῷ στατύλῳ ἔλκεον,
 δολώματα, αἰμαρροΐδας μετὰ ῥο-
 25 δίνου· καὶ τὰ δυσκατούλωτα· καὶ
 καθόλου ποιεῖ ὅσα καὶ ὑποσφαι-
 χα τοῦ ἐχθροῦ· ὁ δὲ ἀκέραιος
 μόλιθρος παρὰ τειβόμενος βου-
 δεῖ τῇ τῷ θαλασσίῳ σκορπίου καὶ
 δράκοντος πλυνεῖν.

Πειρ

quo facilius quicquid est reso-
 lutum incerni possit. Hoc ite-
 rum facito, usque dum satis ti-
 bi habuisse videatur. Vbi con-
 federit, priore aqua effusa, no-
 uam adiiciens, ut cadmiam la-
 uato, donec nulla extet nigri-
 tia: postea in pastillos cogens
 reponito. Quidā scobem mun-
 di plumbi lima quæsitam, mor-
 tario pistillōque lapideis te-
 runt, aut manibus cum aqua
 paulatim adiecta fricant, do-
 nec nigrescat: mox ubi id pes-
 sum ierit, effusa aqua colligunt
 in pastillos. Nam tritum ve-
 hementer, cerusæ simile red-
 ditur. Alij elimatæ scobi mo-
 dicam plumbaginem adiiciūt,
 affirmantes ita elotum plum-
 bum præstantius esse. Potest
 refrigerare, adstringere, indu-
 cere, mollire, explere caua, si-
 stere oculorum fluxiones, &
 vlcera excrementia. Sangui-
 nem supprimit: prodest con-
 tra sedis vlcera, condyloma-
 ta, & hæmorrhoidas, ex ro-
 faceo: item ad ea quæ agrè ci-
 catricē ducunt: & in totū spo-
 dij effectus præbet, nisi quod
 non obducit crustas. Synce-
 rum plumbum affricu, ma-
 rini scorpionis draconisq; pla-
 gis auxiliatur.

○ Plumb-

DIOSCORIDIS

Plumbum vſtum.

Cap. XCVI.

Vritur plumbum ſic : Super quamtenuiſſimas plumbi lami-
nas, fictili nouo inditas, ſul-
phur inſpargito, additiſque a-
liis rurfus laminis, interiecto
ſemper ſulphure, vſquedū vas
expleueris, ſuccédito: flagran-
te autem plumbo, ferrea rude
verſato, donec perfectè redi-
gatur in cineré, nihilq; è plum-
bo vſtū hæſerit: tū demū, ob-
ſtructis naribus, eximito: alio-
quin halitus plūbi noxiuſ ſen-
titur. Aut elimatam plumbi ſco-
bem in olla ſulphure vrito. Alij
laminas in fictili crudo, vt di-
ctum eſt, imponūt fornaci, aut
foco, & circumlinentes oper-
culum, dato exili ſpiramento,
vrunt. Alij pro ſulphure ceru-
ſam aut hordeum inſpargunt.
Alii integras laminas imponē-
tes, acri igne vtuntur, & rudi-
cula ferrea continuè mouent,
dum in cinerem ſoluātur. Sed
difficilis huiuſmodi vſtio, & ſi
vehementius vratur, contrahit
ſpumę argenti coloré. Magis ta-
men nobis placet prima vrédi
ratio. Plumbum vſtum lauatur
vt cadmia, & recóditur. Eoſdē
effectus habet, quos plumbum
elotum, ſed multò acriores.

Scoria

Πρὶ Μολύβδου κηρωμύρα.

Κεφ. 55.

Καίεται δὲ ὁ μόλυβδος οὕτω
λαβὼν μολύβδου ἐλάσματα ὡς ὀ-
πι λεπτότατα, ἐπιθεὶς εἰς κηρὶν
λοπάδα, καὶ ἐπιπιάσας δεῖον, πάλιν
ἑτέρα ἐπιθεὶς πέταλα, καὶ δεῖον
ἐπιπασσε, καὶ πάλιν ἑτέρα, καὶ τὸ-
το ποιεῖ ἄχρις αὐτῶν πληρώσῃς τὴν
λοπάδα, εἴτα ὑποκίμε· ἀναφθύν-
τος δὲ τῷ μολύβδου, κίνει σιδῆρον
ἄχρις αὐτῷ ἀποτεφρωθῇ τελείως καὶ
μυδὲν ἔχη μολύβδωδες· καὶ ἀνα-
εσθὺ σκεπάσας τὸν ῥάδιον· βλα-
βερά γὰρ ἡ ἀποφορά· ἡ ῥιγίσματα
μολύβδου βάλων μετὰ δεῖου εἰς
λοπάδα οὕτω καί· οἱ δὲ, εἰ, χύ-
σαν ὠμὴν βάλοντες τὰ πέτα-
λα ὡς εἴρηται, κερμίνω ἐπιπιά-
σιν, ἢ ἐπ' ἐσχάρας πεπλάσαντες
τὸ πῶμα καὶ ὀλίγῳ δόντες ἀνα-
πνοήν, χάψιν· οἱ δὲ, ψιμμίδιον πα-
ρεμπάσσουσιν αὐτῷ τῷ δεῖν ἢ κρι-
δάς· οἱ δὲ, ἀκαταίους τὰς λεπίδας
ἐπιδέντες ὅξει, πνεὶ χεῶνται, καὶ
κινουσί· ἐπιτεταμύως σιδηίῳ,
ἄχρις αὐτῷ ἐκτεφρωθῇ· ἐστὶ δὲ δυ-
χερὴς ἡ τοιαύτη κηρῶσις, καὶ ἐπι-
πλέον δὲ κηεῖς, οὕτω λιδαργύρου
λαμβάνει τὸ χεῶμα· ἡμῖν μὲν
τοὶ ἀρέσκει ἡ περὶ τὴν κηρῶσις· δεῖ
δὲ πλύνειν αὐτὸν ὡς ἔχει καὶ μέλαν
καὶ ἀποτίθεσθαι. Διῶαμιν δὲ
ἔχει λῶ καὶ ὁ πεπλυμμένος μόλυ-
βδος, ἐν τῷ ὡτέρῳ δὲ μάλλον.

Πεὶ Σκω-

Πρὶ Σκωείας μολίδου.

Κεφ. 57.

Σκωεία μολίδου, αείσῃ ὅσιν
ἢ ψιμμιδοφανῆς, πυκνὴ καὶ δύσ-
δραυστος, μηδὲν ἔχουσα μολίδω-
5 δες, μηλοειδῆς δὲ τῷ χρώματι
καὶ υἰελίζουσα. δυνάται δὲ τὰ
αὐτὰ τῷ κεχαυμνῶ μολίδω
σύστα μαλλον. πλυνέται δὲ ἐν
δυνία ἐπιχευμνῶ ὕδατος* καὶ ἀ-
ποχευμνῶ ὅτ' ἐφισταμῶν μου μηλ-
10 νου χρώματος· πολλάκις τὲ τῶ-
το γίνεται ἄρχις αὐτὴ ἀναλωθῇ ἢ
σκωεία· τὸ δὲ λοιπὸν ἐάσαντες

ὑποσηῖναι αὐτὴν, ἀπο-

χέουσι τὸ ὕδωρ, καὶ

ἔτιως ἀναπλάσ-

15 σσμῶν.

Περὶ τοῦ μολίδουειδούς

λίθου. Κεφ. 58.

Καὶ ὁ μολίδουειδῆς δὲ λίθος,
ἀνάλογον ἔχει τῷ δυνάμειν τῇ
σκληρίᾳ, πλυνέται δὲ ὁμοίως.

20 Περὶ Σπίμμιος.

Κεφ. 59.

Σπίμμι ὃ κράτιστον ὅσιν τὸ σκλη-
ρότατον, καὶ λαμπυρίζει, ἐν
τῇ δυνάσει πλεονάζει, μηδὲν ἔ-
χον γεῶδες ἢ ῥυπαρὸν, ἐνυχερῶς
25 τὲ δλωμῶν, τοῦτο οἱ μὲν σίβι,
οἱ δὲ, πλεονάζοντες, οἱ δὲ,
λάρβασον ἐκάλεισαν. δυνάμειν
δὲ ἔχει ἐμπλαστικὴν, συπτικὴν,
ψυκτικὴν, θερμικὴν τῶν ὑπερ-
σφοδρῶν, ἀποσυλῶτικὴν ἐλκῶν
καὶ κα-

Scoria plumbi.

Cap. XC VII.

Recrementū plumbi, quod
scoriā vocant, optimū est den-
sum, fractu cōtūmax, cerusam
planè repræsentans, nihil plum-
bosi habens, quod ad luteū co-
lorem accedit, & vitri splendo-
rem imitatur. Eadē quæ plum-
bum exustū potest, sed magis
adstringit. Lauatur in morta-
riis infusa aqua, & refusa sum-
ma aquæ parte, quæ luteum co-
lorem duxit: idque sæpius, dum
recrementum absumatur. Deinde
vbi confederit crassamentum,
aqua effusa, digeritur in pa-
stillos.

Lapis molybdoides.

Cap. XC VIII.

Molybdoides lapis à plumbi
similitudine dictus, responden-
tem excremento vim habet, &
eodem modo lauatur.

Stibium. Cap. XC IX.

Stimmi optimū, quod splen-
didissimum est, modòque ni-
tedularum emicat, confractu
crustosum, nihil terræ aut sor-
didi habes, friabile, quod stibi
appellarunt, alii platyophthal-
mon. Vis ei⁹ adstringere, mea-
tus obstruere, refrigerare, ex-
crescentia in carne cohibere,
ulcera ad cicatricē perducere,

○ ii sordes

fordes & vlcera oculorum expurgare. Siftit & sanguinem e cerebri membrana profluentem : & vt in vniuersum dicatur, vis vsto plumbo similis est. Priuatim, ambusta igni, in pustulas erumpere non patitur, cum adipe recenti illitum: crustosas vlcerationes ad cicatricem perducit, cum cera & exiguua cerusa. Torretur pinsita farina circumlitum, & carbonibus obrutum, donec carbunculetur crusta, exemptumque restringitur mulieris lacte, quæ maré peperit, aut vetere vino. Vritur etiâ carbonib⁹ succellis efflatû, quo ad igni deflagret: si enim paulò magis cōcremetur, plumbum fit. Lauatur, vt cadmia & æs. Sunt qui vt plûbi recrementum eluant.

Molybdæna, seu plumbago. Cap. C.

Molybdæna optima est flaua, argenteæ spumæ æmula, modicè splendēs, cū teritur rufa, cocta cū oleo iocineris coloré trahit. Vitiosa est, quæ aëre aut coloré plûbeû refert. Gignitur ex auro & argéto. Est etiâ quedā fossilis, ad Sebastiam & Corycû inuenta. Quo in genere probatur, quæ lapidosa nō fit, aut cremétosa, sed nitens & flaua.

Vim

καθαριτικὴν ῥυπαριῶν καὶ τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς ἐλκῶν. ἐπέχει δὲ καὶ τὰς ἐν κλύστρος αἱμορροίας· καὶ καθόλου δὲ ἐμφερέστιν ἡ δύναμις αὐτοῦ τῷ κεκρωμῶ μολίβδῳ. ἰδίως δὲ τὰ κατὰ καύματα οὐκ ἔα ἐξαρεῖσθαι σὺν σέσπι καταχρίδεν νεαρό· καὶ ἀπουλοῖ τὰ ἐξαρεῖντα κηρύ· καὶ ὀλίγου ψικμιδίου μολύπτων. ἰπῆται δὲ σέσπι σπειλάδεν καὶ ἐγκρυβέν εἰς ἀνδραγας, 10 ἄχεις αὐτὸν ἀνδρακωδῆ τὸ σέσπ, ἐξαρεῖδεν δὲ σβένγνυται γάλακτι ἀρρένοτόκου γυναικὸς ἢ οἶνω παλαιῷ. καὶ ἐπ' αὐθράκων ἐπιτεδέν καὶ ἐμψοσθιδέν ἄχει πύρρως· ἐὰν γὰρ ἐπιπλέων καὶ 15 μολίβδουται. πωλύεται δὲ ὡς ἡ καθάρια καὶ ὁ χαλκός. ἐγγοι δὲ ὁμοίως τῇ τοῦ μολίβδου πωλύεσι σκωεία.

Πεὶ Μολίβδαγης.

Κεφ. ρ.

20

Μολίβδαγα ἡ αἰεὶς ὅτιν ἡ λυγαργεφανής, ξανθὴ, ἰσχυρὴ καὶ κερρὰ ἐν τῷ λειοτερεῖσθαι, ἐψηθεῖσα τὸ ξαίω, ἡ παλαιοῦς τῶν χρώματι γίνεται. ἡ δὲ αἰερίζουσα ἡ μολίβδου χυρὸς φαύλη. γινώσκειται δὲ 25 ἐξ ἀργύρου καὶ χρυσοῦ. ἐστὶ δὲ πύρρως καὶ ὀρυκτὴ κατὰ σιβάσειαν καὶ κώρυκον εὐεισκομένη. καὶ ταύτης ἐστὶ βελπίων ἢ μὴ σκωρεῖδης μὴ δὲ λιθώδης, ξανθὴ ἢ καὶ σίλβουσα.

Δυνά-

Δυνάμει δὲ ἔχει ὁμοίαν λιπαρ-
γύρεα καὶ σκωεία μολύβδου. πλύ-
σιν δὲ καὶ καθῶσιν τὴν αὐτὴν.
μύζονται δὲ ἐπιπιδειότερον αὐ-
τῇ, καὶ ταῖς λιπαράς καὶ ἀνε-
5 πιδέκτοις ἐμπλάστοις χρυσοῖς.
οὕσα σαρκωτικὴ καὶ ἀπουλωπι-
κὴ· ταῖς μύρτοι κολλητικαῖς καὶ
σημητικαῖς οὐχ ἀρμόζει δυνά-
μεισιν.

Πεὶ Σκωείας ἀργύρεα.

Κεφ. ρα.

10 Η δὲ τοῦ ἀργύρου σκωεία
καλεῖται ἑλκυσμα, ἢ ἔγκυσμα,
τὴν αὐτὴν δὲ ἔχει δυνάμει τῇ
μολύβδαίνῃ· ὅθεν ἐμπλάστοις
φαιαῖς μύζονται καὶ ἀπουλω-
15 πικαῖς, συνωπικὴ οὕσα καὶ ἐπι-
σπαστικὴ.

Πεὶ Λιπαργύρεα.

Κεφ. ρβ.

Λιπαργύρεα, ἢ μύρτις ἐκ
τῆς μολύβδινος καλεσμένης ἁμ-
20 μου θυνᾶται χανευομένης ἁ-
χει τελείας ἐκ πυρώσεως. ἢ δὲ
ἐξ ἀργύρου ἢ δὲ ἐκ μολύβδου. δια-
φέρει δὲ ἢ ἀττική· δευτερεύει
δὲ ἢ ἰσπανί· μετ' αὐτὴν δὲ δι-
καρχία, καὶ ἐκ χαμπαία, καὶ
25 σικελία· πλείστη γὰρ ἐν τοῖς δε-
τοῖς τόποις θυνᾶται· μολύβδι-
νων ἐλασμάτων ἐκφυλομένων.
καλεῖται δὲ ἢ μύρτις ξανθὴ καὶ σίλ-
βουσα χρυσοῖς, ἢ πρὸς κρείτ-
των· ἢ δὲ ἐκ σικελίας ἀργυροῖς.
ἢ δὲ

Vim habet spumæ argenti, aut
recremêto plûbi similé. Vritur
lauaturq; eodé modo. Miscetur
côuenientissimè medicamêtis,
quæ liparas vocât, atq; empla-
stris minimè mordétibus. Car-
nem recreat, & vlcera ad cica-
tricé perducit; glutinantibus ta-
men medicamentis, aut abster-
gentibus non conuenit.

Argenti recrementum.

Cap. CI.

Recremêtu argéti quod sco-
riâ vocât, aut helcysma, aut en-
cauma, molybdene vim habet:
quare emplastris quas phæas
appellât, additur, ac medicamê-
tis quæ cicatricé obducût, vtpo-
tè cû adstringat, extrahatq;.

Spuma argenti.

Cap. CII.

Spuma argéti quædâ gigni-
tur ex arena, quâ molybditin
vocât, in fornacib; cōflata, do-
nec pfectè igni incâdescat. Al-
tera ex argêto: tertia ex plûbo.
Probatissima est Attica: secûda,
Hispaniensis: has sequitur quæ
fit Dicæarchiæ, id est Puteolis,
Baiis, in Cāpania, & Sicilia: plu-
rima enim hisce locis è flagrà-
tibus laminis plumbeis gigni-
tur. Quæ flauo colore splêdet,
chrystitis appellatur, omniû o-
ptima: quæ in Sicilia, argyritis:

O iij quæ

quæ ex argento, calabritis. Vis aut adstringere, mollire, exple-
re caua, excrescētia in carne re
primere, ad cicatricē ducere, re
frigerare, & occludere. Vritur
argēti spuma, cōfractis partib⁹
ad magnitudinē iuglandiū, pru-
næ superpositis: ita accēsa folli-
bus, vt conflagret, abstergitur
insidens spurcitia, & recōditur.
Aliqui ter aceto aut vino re-
stinguētes, rursus vrunt, & ea-
dem prosequuti, reponunt. La-
uatur vt cadmia. Vt argyritidi
nominatæ, aut, si desideretur,
alteri candor detur, ea in par-
teis magnitudinē fabarum cō-
fracta, choenicis atticæ mensu-
ra, fictili nouo superfusa aqua,
addito candidi tritici pari pon-
dere, priuatimq; pugillo hor-
dei, linteolo puro, raro, ansulis
vasis alligato, coquitur, donec
hordeum fractum dissiliat: de-
inde omnia in nouum craterē
oris ampli transfunduntur: tri-
ticum abiicitur, spuma argenti
vehemēter manibus affrican-
do infusa aqua lauatur, assica-
tæque in Thebaico mortario
teritur, affusa feruēte aqua, do-
nec soluta fatiscat: excolata a-
qua, iterum tota die teritur, &
vesperi infusa calida aqua fi-
nitur: mane colis excernitur,
alia

ἢ δι' ἐν τῷ ἀργύρῳ χαλαυρίτης.
Δύναμιν ὅ ἔχει συπτικὴν, μαλα-
κτικὴν, κοιλωμάτων πληρωτικὴν,
σαλτικὴν, τ' ἐκσπικουώτων καὶ ἀ-
πλωτικὴν, ψυχτικὴν, παρεμπλα-
στικὴν. καὶ σὺς ὅ αὐτὴν ἔτω· κατὰ-
κόψας εἰς χαρύων μεγέθει, καὶ ἐπι-
θεῖς ἐπ' ἀνδραγας, κλειπῆσας τε
ἄχει πυρῶστας, καὶ σελιμάξας τ'
σσεικημύλῳ ἀκαθαρσίαν, ἀπ-
τίθισσ. ἐγγοῖ ὅ ὄξυ ἢ οἶνω σβέσαν-
τις αὐτ' ἐπιθεῖς, πάλιν κάυσσι, καὶ 10
ταῦτα ποιήσαντες ἀποτίθενται.
πλύνει) ὅ ὥς ἡ καδμεία λευκαί-
νεται ὅ ἔτω· λαβὼν τ' ἀργυρίτι-
δος λερομύκης, εἰ ὅ μὴ γε τ' ἀμῆς
κατάθραυσον εἰς μεγέθει κυάμων,
ὅσον χρίνικα ἀπικὴν, βαλὼν τ' εἰς 15
καυὴν χύβαν, ἐπίχει ὕδωρ, πρὸς-
εμβαλλὼν πυρῶν λευκῶν χρίνικα,
καὶ ἰδίᾳ ἐκ ὀθονίῳ καθαρῷ ἀσπίῳ
κριθῶν δράκα δήσας ἀπὸ τ' ὠτὸς
τ' χύβας κρέμασον, ἔψε ὅ ἕως αἰ-
ραγῶσιν αἱ κριθαί· εἴτα χαλεράσας 20
πάντα εἰς κρατῆρα πλατύστομον
καυόν. τὸν μὲ πυρὸς ῥίπον χαεί-
σας, τ' ὅ λιδάργυρον πάλιν ἐπι-
χέας ὕδωρ, βιαίως τ' χερσὶ πρὸς-
τείβων ἅμα, εἴτα ἀνελόμενός τε
αὐτ' καὶ ξηραῖας, τεῖβε ἐν θυίᾳ 25
βαίῃ, ἐπιχέων θερμὸν ὕδωρ, ἕως
αὐτ' διαλυθῇ, καὶ ἀπηθήσας τὸ ὕδωρ
πάλιν τεῖβε δι' ὅλης τῆς ἡμέρας,
εἰς ἐσπέραν δὲ ἐπιχέας ὕδωρ θερ-
μὸν ἕασον· καὶ πρὸς ἀπηθήσας
ἄλλῃ

ἄλλο ἐπίχει καὶ ἀπίθει τῆς ἡμέ-
 ρας τρίς. τὸ τοιοῦτον ἐπὶ ἡμέρας
 ζ'. εἴτα μίξας τῇ κωᾷ τῆς λιθα-
 ρύρου ἁλῶν ὀρυκτῶν < εἰ. θερμὸν
 τε παραχέων, λέανει τρίς τῆς ἡμέ-
 ρας ἀπιδῶν καὶ μίγναι ὕδωρ. ὅταν
 ὅ λευκὴ γλῆσαι θερμὸν ἐπιχέων,
 τὸ αὐτὸ ποιεῖ ἄχρεις αὐτὸ μὴδεμι-
 αῖς ἐμφασιν ἀλυκοῦτος ἔχει. καὶ
 ξηράνας ὀξύτατῳ ἡλίῳ, περικ-
 βάλλων τὴν ἱκεμάδα ἀποπίδε-
 10 σο. εἰ δὲ μὴ, μισθὴν μίαν λαβὼν
 τῆς ἀργείπιδος, λέανον ἐπιμε-
 λῶς. καὶ τείψας μίξον ἁλῶν τει-
 πλάστον, λείων, ὀρυκτῶν, καὶ βάλλ-
 λε εἰς κανὺν χύτραν ἐπιχέας τὸ
 ὕδωρ, ὥς τε ὑπὲρ χεῖν αὐτὸ, κί-
 15 νει ἐκείνης ἡμέρας περὶ καὶ δει-
 λης περσεπιχέων ὕδωρ, μὴδὲν
 τοῦ περὶ τοῦ ἀποχέων. καὶ ποιεῖ
 τοῦτο ἐπὶ ἡμέρας λ'. μὴ κινου-
 μένου γὰρ ἀποσρακοῦται. μετὰ ὅ
 ταῦτα ἀποχέας περὶ τὴν δὴ-
 20 μίαν ἐν θεβαϊκῇ θυῖα, τὴν λιθα-
 ρύρον λέανει, καὶ βαλὼν αὐτὴν εἰς
 κεραμεῦν ἀγγεῖον, ἐπιχέας τὸ ὕ-
 δωρ, κίνει ταῖς χερσὶν ἐπιμελῶς,
 ἀποχέων τὸ περὶ τὸν καὶ ἐπιχέων
 τὸ ἔτερον, ἄχρεις αὐτὸ μὴδεμίαν ἐμ-
 25 φασιν ἀλυκοῦτος ἔχει. εἴτα ἀπο-
 χέας τὸ λευκὸν τῆς λιθαργύρου εἰς
 ἄλλο ἀγγεῖον, ἀνὰ πλάστι τροχί-
 κοις καὶ ἀπὸ θύρας εἰς μολεῖ δίνην πυ-
 ξίδα. οἱ δὲ καταδραύσαντες εἰς
 μεγέθη κωάμων τὴν λιθαργύρον,

alia infunditur, atq; ter die ex-
 colatur. Id septem diebus fieri
 solet: postea additis ad singulas
 minas spumæ argenti, quinis sa-
 lis fossilis drachmis, infusaque
 calida aqua, ter die teritur, &
 addita aqua excolatur: cumq;
 inalbuerit, calida infusa, idem
 facito, dum nullam prorsus sal-
 sedinē respiciat. Demum arden-
 tissimo sole siccata, eiecto pri-
 us humore, reconditur. Sin mi-
 nus, mina spumæ argyritidis di-
 ligenter teritur, addito sale fos-
 fili trito, triplicato pondere, in
 fictile nouum coniiicitur, aqua
 infunditur, ita vt superemineat:
 mouetur quotidie mane & ve-
 speri, aquaque superinfundit-
 ur, priore nequaquam effusa.
 Hoc fit triginta diebus: nanq;
 nisi moueatur, crassescit, vsque
 in duritiem testæ. Post hæc ef-
 fusa leniter muria, in Thebai-
 co mortario spuma argenti te-
 ritur, coniectaq; in fictile aqua
 continens, manibus diligenter
 agitur, mutata subinde aqua
 donec nullū falsuginis indicium
 præbeat. Deinde quod ex argē-
 ti spuma candidum apparet, in
 vas aliud trāsferitur, & redactū
 in pastillos, plūbea pyxide cō-
 datur. Alij spumā argenti in fa-
 barū magnitudines confractā,

DIOSCORIDIS

in ventre fuillo crudo ex aqua coquunt, dú viscus eliquescent contabescat, exemptámq; cum sale pari terunt, & vt suprà dictum est lauánt. Sunt qui salis libram vnam, & spumæ argenti tantundem, in sole terant, aqua continuè mutata, dú candor ei detur. Alia ratio: Sumito quantam vis argenti spumam: vbi lana candida inuolueris, fictili nouo inditá aqua, cum pugillo fabarum recentiu repurgatarúm; decoquito. Cumq; fabæ disruptæ dehiscant, lanáq; non denigretur, exemptam argenti spumá, & altera lana inuolutam, iterum coquito, cyathum aquæ & parem fabarum modum adiiciens: eadé tertio, quæ suprà, facito: in summa, tantisper, dú lana iam non inficitur. Insuper trāsfundes in mortarium, ad singulas salis folsitij libras, aduicito octogenas spumæ argenti drachmas Atticas, & terito: intermittensque, nistri quamalbissimi cū aqua diluti drachmas quadraginta septem indito: iterum terito, donec satis candoris cōtraxisse videatur. Ita auté fundens eā ex alto in fictile oris ampli, adiecta largiore aqua, vbi confidere defierit, colato: tum nouam super

καὶ βαλόντες εἰς χοίρειον κοιλίαν ὁ μὲν ἔφοισιν ἐν ὕδατι, ἄχρῃς ἀπακρωθῆναι τὸ πλάγχθον, εἴτα ἐξελόντες καὶ μετ' ἰσῶν ἁλῶν τείψαντες, πλυνοῦσιν ὡς περ εἴρηται. ἔνιοι δὲ ἁλῶν λίτταν μίαν καὶ λίαν σαργύρου ποσούτου, τείβουσιν ἐν ἡλίῳ μετ' ὕδατος συνεχῶς ὁπποτέρων ἄχρῃς αὐτὴ λευκὴ γίνηται. ἢ καὶ ἔτω· λαβὼν τῆς λιδαργύρου ὅσον θάλας, καὶ εἰλήτας ἐρείοις λευκοῖς, καὶ θεῖς εἰς κεραμέαν χύβαν ἰοκαμνὴν, ὁπποδὶς τε ὕδωρ καὶ κυάμων καὶ θαλάσῳ καὶ νέων δράκων μίαν ἔψα. ὅταν δὲ οἱ κύαμοι διαρραγῶσι, τότε ἔριον λεανθῆναι ἐξελὼν πλὴν λιδαργύρου καὶ ἐτέρω εἰλήτας ἐρείῳ, ἐν δευτέρῳ ἔψα, κύαμους ὁπποδὶς ὕδατος, κυάμων τε τὸ ἴσον πλῆθος, καὶ τὰ αὐτὰ ποιεῖ τοῖς περὶ τῶν ὁπποδῶν ἐν τείψανῳ καὶ κατόλκας ἕως τὸ ἔριον μηκέτι βάπτηται. καὶ τὸ λοιπὸν κατεβράσας εἰς θυίαν περὶ π. 20 ἀπὸ πλάσας λιδαργύρου, μίξον ἁλὸς ὀρεκτοῦ λίτταν α. καὶ λέανει διαλειπὼν τε ὁπίδης νήστρου πάνυ λευκώτατον διηληκμένον μετ' ὕδατος ὀλκὰς μετ' αὐτὴν πάλιν τείβει ἄχρῃς αὐτὴ καὶ λιδαργύρος ἰκανῶς λευκὴ γίνηται. οὕτω δὲ καταντλήσας αὐτὴν εἰς κεραμοῦν πλατύσομον ἀγγεῖον, καὶ περὶ σπῆλαις δαψιλὲς ὕδωρ, ἑάσας τε καταστῆναι, τὸ μὲν ἀπὸ τῆς ἑτέρας δὲ ἐπι-

ἐπιδοὺς ὕδωρ καὶ ταῖς χερσὶν ἀνα-
 τράξας, πάλιν ἑάσας καταστῆναι
 ἀπὸ θύσου. ἐναλλὰξ δὲ τοῖς περ-
 ρεινύοις ποιεῖ, ἕως ἂν καθαρὸν
 ᾖ γὰρ τὸ ἀπορρέον ὕδωρ, καὶ γλυ-
 κὺ καὶ ἀλυκότητος ἀμέτοχον γέ-
 νηται. ἐπὶ πᾶσι δὲ κατεργάσας
 αὐτὴν εἰς λοπάδι κερσμέαν κα-
 νύω, ἀπὸ θύσου παντὸς πρὸς
 τῆς ὕδατος, δις ἐν ἡλίῳ ἡμέρας
 μί. ὑπὸ κρύα, καὶ ξηρὰς χερσὶ.
 10 δοκεῖ δὲ ἡ περρυνία ἀρμόζειν
 εἰς τὰ ὀφθαλμικά, καὶ οὐλὰς ἀ-
 πορεθεῖς, καὶ ἑρρακινύα πρὸς το-
 πὰ καὶ σπλῶν ἐμπλεα.

Πρὶ Ψιμμίδιον. Κεφ. ργʹ.

Ψιμμίδιον δὲ γίνεῃ ἔτσις εἰς
 15 πιδάκνυον πλατύστομον ἢ εἰς κε-
 ραμέαν γάσσαν, ἐξ ἧς δριμύτα-
 τον ὄξος, ἀπέρεισον μοιβάδιον
 πωλύδον ἐπὶ τὸ σόμα* τῆς κε-
 ραμέας, πρὸς τοὺς κινύους καλαμί-
 νυ ψαδίν· ἀνωθεν τε αὐτὴν ἐπὶ
 20 ῥιζὸν σκεπύσματα πρὸς τὸ μὴ
 διαπνεῖσθαι τὸ ὄξος, ὥσθ' ἀνα-
 λῆναι, καὶ συγκαταρρεῖσθαι διαπνεῖν, καὶ
 τὸ μὴ ἐπιμαρμεύειν καὶ καθα-
 ρὸν ὕδατος ἀπὸ θύσου, τὸ δὲ γλοιώ-
 δες εἰς ἀργεῖον ἐγχυτέον καὶ ξη-
 ραντέον ἐν ἡλίῳ, εἴτα ἀλεῖσθαι ἐν
 25 χειρὶ μύλωνι, ἢ λεαντέον ἄλλως
 καὶ σπένειν καὶ μετὰ ταῦτα λοι-
 πὸν τῆς σερμυλίου λεπτοποιητέον,
 καὶ σπένειν ἐναλλὰξ τε τὰ αὐτὰ
 καὶ τρίτον καὶ τέταρτον ποιητέον.

ἄμεινον

superadiiciēs aquam, manibus
 probè versatam, finito vt con-
 fidat, ac rursus per collum tra-
 iicito. Alternis eadē prosequere,
 dum pura aqua dulcisq; ef-
 fluat, & nullā falsedinē præ se
 ferat. Postremò in fictile nouū
 trāslatam, colato sensim omni
 humore, soli quadraginta die-
 bus sub caniculæ sydus expo-
 nito, & siccata vitior. Elotā au-
 tem constat ad oculorū colly-
 ria pdesse, & ad cicatricū foe-
 ditates tollédas, ad rugosas fa-
 cies, & cicatricosas, laceratās-
 que, & macularum plenas.

Cerusa. Cap. CIII.

Cerusa fit hoc modo: Infuso
 in vrceum oris lati, aut fictile
 labellum quamacerrimo ace-
 to, laminam plumbeam supra
 fictilis spiraculū, subiecta prius
 arundinea tegete, firmato: su-
 periectisque velaminibus, ne
 halitum expiret acetū, ubi re-
 soluta fuerit, defluensque deci-
 derit, humorem purū ad sum-
 ma delatum colato, crassamē-
 tūmq; trāsfundito: debet quo-
 que siccari in sole, mox trusa-
 tili mola teri, aut aliās tritū cri-
 brari. Postea quod superest du-
 ri, in tenues partes redigendū,
 cribrandūque: vicissim ea-
 dem tertio quartoq; facienda.

Melior,

DIOSCORIDIS

Melior, quæ primò cribrata est, & medicamētis oculorum as-
sumenda. Secūdum locum te-
net sequens, & reliquæ suo or-
dine. Nec defunt qui ligneas
rudes, in medio vase appen-
dant, & derafo ceu situ impo-
sito, ita vt acetum non con-
tingat, inditòque operculo cir-
cumlinentes dimittunt. Post
dies decem, laxato obturamē-
to visunt: cūmque resoluta ma-
teria fuerit, reliqua, vt suprà di-
ximus, exequuntur. Si autem
quis in pastillos velit digerere,
aceto acri subacta, diuiditur
in pastillos, qui in sole siccan-
tur. Aestate tamen supradictū
opus obeundum est: ita enim
candida atque efficax reddi-
tur. Quinetiam hyeme para-
tur, vrceis supra furnos, bal-
nea, aut fornaces impositis:
ascendens enim calor, idem
quod sol præstat. Laudatissi-
mam fieri putat Rhodi, & Co-
rinthi, aut Lacedæmone, pro-
ximam Puteolis. Torretur hoc
modo: Flagrantibus igni car-
bonibus, fictili nouo, maximè
Attico, tritam cerusam impo-
nito, & afsiduè versato, cūm-
que cinereum colorem tra-
xit, eximens refrigerato, & vti-
or. Est & aliud vrēdi genus:

Trita

ἀμεινον δέ ἐστι τὸ πρῶτον ἀπο-
σπέν, ὃ καὶ εἰς τὰς ὀφθαλμικὰς
παρεληπτὴν διδάμεις. δευτε-
ρεύει δὲ τὸ ἐχρόμνον, καὶ καὶ τὰ
ξιν τὰ λοιπά. * πνὲς δὲ καὶ μέσον
τὸ ἀγγεῖον κατ' ῥείσαντες ἢ ῥίπον
ἐπιπιδέασιν ὡς μικρὸν λαμῖν ἢ
ὄξους, τὸ δὲ σῶμα αὐτὲ πωμά-
σαντες καὶ περικλείσαντες ἑωσι. καὶ
δι' ἡμερῶν ἀφαιρέμενοι τὸ πώ-
μα ἐπισκοποῦνται· ὃ τε δὲ δια-
λυθῇ, τὰ δὲ πρὸς ποιῶσιν ὁμοίως 10
τοῖς περιεργημένοις. εἰ δὲ ἀνα-
παύσαι τις αὐτὸ ἐθέλει, ἢ ἔξ ὀρι-
μεί θυρατέον, καὶ ἕτως ἀναπλε-
σέον, καὶ ξηρατέον ἐν ἡλίῳ θέ-
ρους μὲν τοὶ ἐργασέον τὰ περι-
ργημένα. ἕτω γὰρ λευκὸν καὶ ἐρυθρὸν 15
γίνεται. σκευάζεται δὲ καὶ χει-
μῶνος τῶν πιστακῶν ὑπεράνω ἱ-
ππων ἢ βαλανείων ἢ χαλμῶν. π-
τεμερῶν· ἢ γὰρ αἰῶθεν φερεμῶν
δερμασία τὰ αὐτὰ δρᾶ τῷ ἡλίῳ.
καλλισον δὲ ἡγητέον τὸ ἐν ῥόδῳ 20
σκευαθέν, ἢ ἐν κορίνθῳ, ἢ ἐν λα-
κεδαίμονι, δευτερεύει δὲ τὸ ἐν
δικμαρχίᾳ. ὁπλητέον δὲ αὐτὸ
τὸν βόπον τῶτον· ἕω* ἀνδράκων
πεπυρωμένων θεῖς ὄσρακον κα-
νὸν καὶ μάλιστα ἀπικόν, ἐμπλασ- 25
σον λεῖον τὸ ἡμμίδιον, καὶ κίτρι-
σινεχῶς, ὅταν δὲ τῇ χροῇ ἐν-
σπονδον γίνηται, ἀνελόμενος ψύ-
χε καὶ χεῖρ. * καῶσαι δὲ θέλων εἰς
καίαν λοπάδα λεῖον ἀπόδος,
ἐπιθεῖς

ἔμπειρος τε ὅτι τὸν ἀνδραγας,
 γάρδηκε κίνει ἕως ἂν τὴν χροάα
 ἑοικὸς σαρδαράχῃ, γήνηται, καὶ ἀ-
 νερόμυρος χροῶ. τὸ δὲ ἔτι πῶ σκευα-
 δέν, σαύδουξ ὑπό πινων λέγεται.
 5 πλωέται δὲ τὸ ψιμμίδιον ὁμοί-
 ως τῇ χαδμεία. Διώαμιν δὲ ἔ-
 χει ψυκτικὴν, ἐμπλαστικὴν, μα-
 λακτικὴν, πληρωτικὴν, λεπτιω-
 τικὴν ἔπι τὴν πρῶτος κατασταλτι-
 κὴν ὑποφωχῶν, καὶ καταλωπικῶν.
 10 μινυμένον κηρωταῖς καὶ λιπα-
 ραῖς ἐμπλάσσει, καὶ τροχόκοις
 ἔστι δὲ καὶ τῶν ἀναρεπικῶν.

Πρὶ Χρυσόκολλης. Κεφ. ρδ'.

Χρυσόκολλα δὲ διαφέρει ἡ ἀρ-
 μενιανή, τῇ χροά κατακόρως
 15 πρῶσιζουσα. δευτερεύς δὲ ἡ μα-
 κεδονικὴ, εἴτα ἡ κυπρία, καὶ ταύ-
 τῃς τὴν καταρῶν περικριτέον· ἔ-
 δὲ γὰρ καὶ λίδων ἐμπλεῶν ἀπο-
 δοκιμασέον. πλυτέον δὲ τὴν πρῶ-
 ρημένῃν ἔτι κόψας αὐτὴν ἐμ-
 20 βαλεῖ εἰς θυάαν, καὶ ὀπιχέας ὑδωρ
 τεῖβε πλάττει τῇ χειρὶ πρὸς
 τὴν ἰγδύμιν εὐπύκτως, εἴτα ἐάσας
 ἀποκαταστῆναι, ἀπὸ θησον, καὶ ἔτε-
 ρον ὀπιχέας ὑδωρ πάλιν τεῖβε·
 ταῦτα δὲ ποιεῖ ἐναλλάξ, ἕως κα-
 25 θερὰ καὶ εἰλικρινὴς γήνηται. λοι-
 πὸν ξηράνας ἐν ἡλίῳ, ἀποπύδε-
 σσ, καὶ χροῶ. ἐὰν δὲ καῦσαι θέ-
 λῃς καὶ τὸν πρῶτον τὸτον, λεάνας
 αὐτὸ τὸ πῦρταρες, ὀπίθεις εἰς πῆ-
 ραμον, καὶ ἀπὸ τοῦ ἔσ' ἀνδράκων,

Trita patinis nouis supra pru-
 nas imponit, & ferulacea ru-
 de mouet, donec colore simi-
 lis sandarachæ fiat : extractaq;
 ad vsus ministratur. Quæ verò
 ita parata est, sandyx à quibus-
 dā dicit. Lauat cerusa cadmiæ
 modo. Vis ei refrigerare, occlu-
 dere, emollire, explere, extenua-
 réq; insup excrementia leniter
 reprimere, & ad cicatricé pdu-
 cere. Misceat ceratis, & empla-
 stris, q̄ liparæ vocant, pastillif-
 que: est autē letalis eius potus.

Chrysocolla. Cap. CIIII.

Chrysocolla laudatissima
 Armeniaca, colorem porri
 quāsimillimè reddens. Secun-
 dum locum sibi vendicat Ma-
 cedonica, & proximnm Cy-
 pria, quo in genere præfertur
 pura: damnatur, quæ terram
 aut calculos collegerit. Ratio
 lauandi hæc est: Tusam infu-
 sa aqua, mortario expassa ma-
 nu ad pilam veheméter frica-
 to, & statim quàm confederit,
 colato. Alterā infundens aquā,
 rursus terito: hæc vicissim p-
 sequere: donec pura syncerā-
 que spectetur. Dein siccato in
 sole, et ad vsus recódit. Quòd
 si vrere volueris, ex ea terens
 quod satis esse videbitur, pati-
 nis supra carbones adponito,
 & alia

DIOSCORIDIS

& alia facito quæ suprà diximus. Dos chryfocollæ ad purgandas cicatrices: excrescentem carnem coercet: adstringit, purgat, excalfacit, & modicè corpus mordendo exest. Inter medicaméta intelligitur, quæ vomitiones concitant, & necem inferre possunt.

Lapis armeni⁹. Cap. CV.

Armenius lapis præfertur levis, colore coeruleo, perquam æquabilis, calculo carés, & friabilis. Eadem quæ chryfocollæ præstat, sed inefficius. Quinetiam vsum habet ad pilos in palpebris alendos.

Coeruleus. Cap. CVI.

COERVLEI origo ex ærariis metallis in Cypro: copiosior ex arena littorali: secundum quosdam sub cavatos specus maris inuenitur, qui magis probatur. Eligi debet inebriatus. Vritur vt calcitis, lauat ut cadmia. Vim habet reprimentem, & modicè erodentem: crustas gignit, & exulcerat.

Indicum. Cap. CVII.

Indici duo genera, vnum sua spòte nascit, tanquá spuma, germinatione Indicis arúdinibus exiés. Alterú infectoriæ dát officinæ: & est spuma purpurea innatans

ἢ τὰ ἄλλα ποιεῖ ὡς περιέχεται ὅτι τῶν περὶ αὐτῆς. Δυνάμιν δὲ ἔχει ἢ χυσοκόλλη σπληνικῶν οὐλῶν, κατὰ σπληνὴν σαρκώσεων, ἢ ἀνακαταρπικὴν, σπληνικὴν τε καὶ δερμαντικῶν, σπληνικῶν ὡς ὅτι μὲν τῶν ποσὸν δάκνην. ἔστι δὲ καὶ τῶν ἐμετὸν κινουμένων ἢ ἀναρεῖν διωκτῶν.

Πρὶ Αἰνιδίου λίθου. Κεφ. ρβ.

Αἰνιδίον δὲ περιχρίτιον τὸ λεῖον ἢ τὸ χρώμα κυάνειον, ὁμαλὸν τε ἄγαν ἢ ἁλίστον, ἐνδρυσίς. τὰ αὐτὰ ποιεῖ τῇ χυσοκόλλῃ, ὡς τὴν ἐν τῇ σπληνὶ μόνον λειπόμενον αὐτῆς. ἔστι δὲ ἢ τῶν ἐν βλεφαροῖς τειχῶν ἀνελκτικόν.

Πρὶ Κυανῆς. Κεφ. ρς. 31

Κυανὸς δὲ χυνοῦται μὲν ἐν κύματι ἐν τῇ χαλκουργῶν μεταλλῶν ὁ δὲ πλείων ἐν τῇ αἰγαιλίπιδος ἁμμῇ εὐεισκόμος κατὰ πινὰς σπηλαιώδεις ὑποσκαφὰς τῆς θαλάσσης, ἢ τις ἢ διαφέρει. παραληπτέον δὲ τὴν σφόδρα κατακορῆν. χυσοῦν δὲ ὡς χαλκῆν, καὶ πλυτέον ὡς καδμείαν. Δυνάμιν δὲ ἔχει κατὰ σπληνὴν καὶ μετεῖως σπληνικὴν, ἐκκαρπικὴν τε ἢ ἐλκωματικὴν.

Πρὶ Ἰνδικῆς λίθου. Κεφ. ρζ.

Τῆ δὲ λεγομένη Ἰνδικῇ, τὸ μὲν αὐτομάτως γίνεσθαι, οἷον ἢ ἐκ βρασμῶν ὅν τῇ Ἰνδικῇ καλὰ μὲν, τὸ ὅ βαφικόν ὅταν ἐπαίσιος πορφυρεὺς ἐπαυρήματος

ἑπαυροῦντος τοῖς χαλκείοις, ὃν ἀποσύραντες ξηραίνουσιν οἱ τεχνῖται. ἀείρον δὲ ἡγνέον εἶναι τὸ κυανοειδές τε καὶ ἔγχυλον, λεῖον ἔστι δὲ τῶν συμφόντων ἐλαφρῶς καὶ ρησέντων φλεγμονὰς καὶ οἰδήματα· ἀνακαθαίρει δὲ καὶ κατατέλλει ἔλκη.

Πρὶ Ὀχραε, Κεφ. ρή.

Ὀχραν δὲ λεπτόν τ' κροτάτῳ καὶ μηλίην διόλκῃ κατακορῇ
 10 δὲ καὶ ἄλιδον καὶ εὐδρυεῖν, ἀπικὴν δὲ τῷ ῥύζῳ, κρυστόν δὲ, καὶ πλυτόν καὶ ταύτῳ ὡς τ' καθμείαν. Διῶκται δὲ ἔχει σή* πικρὴν, σκεδασηκὴν φλεγμονῶν καὶ φυμάτων· κατατέλλει τὰ τῶν σαρκοῦν
 15 τὰ καὶ τὰ κοῖλα πληρεῖ* σὺν κηρωτῇ, καὶ πύρεος δρυπί.

Πρὶ Κινναβάρως, Κεφ. ρθ'.

Κιννάβαρι οἷόν ται πηγες ταυτὸν ὑπάρχειν Ἰῶ καλεσθῆναι* ἀμμίω, πλανώμενοι. τὸ μὲν γὰρ ἀμμιον
 20 σκευάζεται ἐν ἰσπανίᾳ, ἐν λίθου πινὸς μεμιγμένῃ τῇ ἀργυρίπιδι φάμιφ, ἄλλως δ' ἐκ γινώσκε. ἐν δὲ τῇ χώνῃ μεταβάλλει εἰς ὕσπιν δέσπον καὶ φλογωδέσπον χρωμα· ἔχει δὲ τῷ ἀποφορῶν ἐν
 25 τοῖς μετάλλοις πηγῶν. περὶ δένονται ραῦ οἱ ἐπιχώριοι τοῖς περὶ τοῖς φύσιν. πρὸς τὸ βλέπον μὴ μὴ σπῆν τ' ἀέρα. χρώνται δὲ αὐτῷ οἱ ζωγράφοι εἰς τὰς πολυτελεῖς τ' τοῖς χών* ἐκκοσμήσεις. Τὸ

innatās cortinis, quā detractā artifices siccant. Optimū existimatur quod coerulei speciem præbet, succū suum sorbet, & læue. Inter medicamenta est q̄ læuiter adstringunt, & inflammationes, tumoresq; rumpūt: purgat, & reprimīt vlcera.

Ochra. Cap. CVIII.

Ochrā læuissimā, & omnino luteā eligere oportet, saturatā, nō lapidosam, friabilē, natione Atticā. Vritur hæc, & lauatur cadmiæ modo. Vis eius adstringere, erodere, collectiōnes & tubercula dissipare: excrescētia in carne reprimīt: caua cum cerato explet, & articularum tofos comminuit.

Cinnabaris. Cap. CIX.

Hallucinantur qui cinnabarin minio eandem esse existimant. Minium enim in Hispaniis ex lapide quodam argenteæ arenæ permisto, temperari solet, alioqui non dignoscitur. Fornacibus autē in florētissimum flagratissimūq; colorem permutatur: in metallis verò strangulanti halitum eruat: itaq; facies incolæ vesicis obuelant, vt per illas spectent, nec respirando noxiū aërē attrahant. Eo pictores ad sūptuosa parietum ornāmēta vtūtur.

Cinnabaris

DIOSCORIDIS

Cinnabaris verò ex Aphrica defertur, & magno cōstat: ha-
cten^o inuenitur, vt vix versico-
loribus pictorū lineis satisfaci-
at: intēto colore nec diluto p-
ditū: quare quidā sanguinē esse
draconis existimauerunt. Vim
habet cinnabaris hamatitæ la-
pillo eandē: cōuenit ad oculo-
rū medicamēta, verūm effica-
cius: magis enim adstringit, &
sanguinem cohibet. Ambustis
igni, & papularū eruptionibus
cerato excepta medetur.

Argentū viuū. Cap. CX.

ARGENTVM viuum
fit ex minio, quod abusiue cin-
nabaris dicitur, patinis fictili-
bus, imposita ferrea cōcha cin-
nabarin continente, & calice
cooperta, argilla superlita, car-
bonibus succendunt: siqui-
dem deterfa fuligo, quæ ca-
lici infidet, refrigerata in ar-
gentum viuum coit. Quineri-
am inuenitur in argenti fodi-
narum tectis, stillatim concre-
tum. Alij per sese in metallis
inueniri tradunt. Seruatur in
vitreis, aut plumbeis, aut sta-
gneis, aut argenteis vasis: siqui-
dem aliam materiam omnem
exedit, & defluere facit. Po-
tum vim pernicialē habet: suo
enim pondere interna exest.

Remedio

σεις. Τὸ δὲ κιννάβαρι τὸ το κοῖμα-
ζεται μὲ ἀπὸ κλύνης, πωρῶσαι.
ταὶ τὸ πολλὸν καὶ ποσὺτον ὅστιν ὡς
μόλις ἐξαρκέει τοῖς ζωγράφοις εἰς
τὴν ἐν ταῖς γραμμαῖς ποικιλίαν
εἶσι τὸ καὶ βαρύνεσθαι, ἢ βαρύνεσθαι
ὅστιν ἐν ὁμῳ πηγὴς αὐτὸ εἶναι αἰ-
μα δράκοντος, Διωάμιν τὸ ἔχει
τὴ κιννάβαρι τὴν αὐτὴν τῷ αἰ-
ματὶ τῆ ἀρμόζον εἰς ὀφθαλμικῶν
πάλιν ἐπιτεταμένως μάλλον γὰρ
εὐφρον ὅστι καὶ ἰχθυμὸν, καὶ πνεύ- 10
ματα καὶ ἐξαιδήματα ἀναληφ-
θὲν κυρωτῇ διεραπύει.

Πρὶ Τδράργυρου. Κεφ. ρβ.

Τδράργυρος τὸ σκευά(ζε) ἀπὸ
τῆ ἀμμίου κερωμένου, κατὰ χρί-
σινος δὲ καὶ τέττι κινναβαρέως κε- 15
ρωμένου, δένετς γὰρ ἐπὶ λοπάδος κα-
ραμέας κόλπον σιδηρεῶν ἔχοντα
κιννάβαρι, περικατάπληκτον ἀμει-
κτα, περὶ αλείψαντες πηλῷ, εἴτα
ὑποκάμπῃ ἀνδράξιν ἢ γὰρ πρὸς
ἰζουσα τῷ ἀμεικτῷ αἰθάλη ἀπο- 20
ζωοῦται καὶ ἀποψυχθεῖσα, ὑ-
δράργυρος γίνεται. εὐείσκει δὲ
καὶ ἐν τῷ μεταλλεύεσθαι τὸν ἀργυ-
ρον ἐν τῷ σέχει καὶ σαλαγμῶνς
συνεστῶσα. ἐνιοὶ δὲ ἰσορροποῖ καὶ
κατ' αὐτὴν ἐν τοῖς μετάλλοις 25
εὐείσκει δὲ τὸ ὑδράργυρον φυλά-
ττεται δὲ ἐν βελίνοις ἢ μορβιδί-
νοις ἢ καυστικένοις ἢ ἀργυρεῖς
ἀγχείοις τὴν γὰρ ἀπὸ ὑλῆς πα-
σαν διεσπεί, καὶ ποιεῖ ἀπορρέειν.

Διωάμιν

Δυνάμει δὲ ἔχει φαρμακικὴν πο-
 δεῖται· τῷ βάρει διαβιερύσκου-
 σα τὰ ἐντός· βοηθεῖται δὲ γά-
 λακι πολλῷ πνομύῳ καὶ ἐξ-
 εμουμύῳ, ἢ οἶνω συὲ ἀλιν-
 5 δῶ, ἢ ἀφελήματι σελίνου, ἢ
 ὀρμίνου σπέρματι ἢ δειγάνῳ, ἢ
 ὑδρώπῳ συὲ οἶνω.*

Πρὶ Μίλτου σινωπικῆς.

Κεφ. ριά.

Μίλτος σινωπικὴ κρατίζει ἢ
 10 πυκνὴ, καὶ βαρεῖα, ἡπατίζου-
 σι, δΐιδος, ὁμόχροισι, πλύνου-
 σι ἐν τῇ ἀνέσει· συλλέγεται δὲ
 ἐν τῇ χαρπαδοκίᾳ ἐν σπηλαί-
 οισι ποῖ, διυλίζεται δὲ καὶ φέρεται
 εἰς σινώπην καὶ πωρεσέσκειται·
 15 ὅθεν καὶ πλὴν ἐπωνυμίαν ἔχη-
 κε. Δυνάμει δὲ ἔχει ξηραντι-
 κὴν, ἐμψλαστικὴν· διὸ καὶ ἐμ-
 ψλάστοις τραυματικαῖς μύγνυ-
 ται, καὶ τροχόκοις ξηραντι-
 κοῖς καὶ σερποτικοῖς· ἴσησι δὲ καὶ
 20 κοιλίαν ἐν ᾧ λαμβανόμενῃ καὶ
 ἔγκλυζομένη· δίδεται καὶ ἡπα-
 τικοῖς.

Πρὶ Τεκτονικῆς.

Κεφ. ριβ.

Ἡ δὲ τεκτονικὴ ἡττων ὅτι κα-
 25 τὰ πάντα τῆς σινωπικῆς· αἰεὶσι
 δὲ ἢ αἰγυπιακὴ καὶ ἢ καρχαδονι-
 κὴ, δΐιδος, εὐδρυκής· γηναῖται
 καὶ ἐν τῇ πρὸς ἐσπέραν ἰβηρίᾳ,
 τῆς ὥχρας καυομένης καὶ μετα-
 βαλλούσης εἰς μίλτον.

Πρὶ

Remedio est lac multum sub-
 inde potum, & vomitionibus
 reiectum, aut vinū cum absin-
 thio, aut apij decoctū, aut fe-
 men hormini, aut origanū, vel
 hyssopū cū vino: auri limata,
 scobs, id est, ramétū q̄tenuissi-
 mū epotū mirabili est auxilio.

Rubrica Sinopica.

Cap. CXI.

Rubrica Sinopis maximè p-
 batur granis, désa, ad iocineris
 imaginē vergēs, calculorū ex-
 pers, cōcolor, cū diluit īpēdio
 fusilis. Effoditur ī Cappadocia,
 speluncis q̄busdā, expurgataq;
 defert ī Sinopē urbē, ī qua vē-
 dit: vnde cognométū accepit.
 Vim habet exiccatoriā, quasi
 inducendo obstruentē, & ad-
 strictoriā: quapropter vulnera
 riis emplastris, & pastillis exic-
 cātibus, & adstrictoriis cōmi-
 fceri solet. Aluum sistit, in quo
 sumpta aut clystere infusa: da-
 tur iocineris vitio laborātib⁹.

Rubrica fabrilis.

Cap. CXII.

Rubrica fabrilis, ad omnia Si-
 nopide inferior est. Optima Æ-
 gyptia, & Carthaginensis, lapi-
 dum expers, friabilis. Gignitur
 etiam ī Iberia, quæ ad occi-
 détem spectat, ochra exusta, &
 degenerante in rubricam.

Lemnīa

DIOSCORIDIS

Lemnia terra.

Cap. CXIII.

Lemnia terra, cuniculoso in specu nata è Lemno insula, palustri loco defertur, inibi electa, & caprino sanguini permixta: quam incolæ cogunt in pastillos, et imagine capræ signant: unde & sphragida ægos, hoc est, sigillum capræ, appellauere. Vim antidoti habet contra pernicioſa venena ſingularem, pota cum vino, & præſumpta, euomi venena cogit. Contra iactus morſusque animalium, quæ exitiale virus eiaculantur, prodeſt. Antidotis familiaris. Sunt qui hac ad ſacrificia utantur: eſt & dysentericæ utilis.

Atramentum ſutorium.

Cap. CXIIII.

Atramentum ſutorium genere quidem vnum & idem eſt, molle & concretum: ſed in ſpecie differentias treis habet. Vnum nanque humoribus ſtillatim in cuniculos quosdã colatis, concreſcit: quare ab iis qui Cypria metalla perficiunt, ſtillatitium appellatur. Peteeſius ipſum pinarion vocat: alij ſtalaſticon, id eſt, ſtillatitium. Alterum ſimplici ratione fit in ſpeluncis: poſtea tranſuſum in excauatos ſcrobis, concrementum

Πρὶ Λημνίας γῆς.

Κεφ. ργʹ.

Ἡ δὲ λημνία φημιωμένη γῆ, ἐστὶν ἐκ πινος ὑπονόμου ἀνθρώπου, ἀναφερομένη ἀπὸ λήμνης τῆς νήσου, ἐχούσης ἐλῶδη τόπον, καλεῖται ἐκλέγεθ' ἢ μύρτυ ἀματι αἰγείω· ὡς οἱ καὶ ἄνθρωποι ἀναπαύοντες ἢ σφραγίζοντες ἐκόνι αἰγός, σφραγίδα καλεῖσιν αἰγός. Διὶ αἰμιν ὃ ἔχει ἀντιδότου θανάσιμων φαρμάκων ἕξοχον, πινόμενὸν σὺν οἴνῳ, καὶ περιληφθεῖσα ἐξεμείδεται ἀναγκάζει τὰ δηλητήρια, ἀρμόζει δὲ καὶ πρὸς τὰς τῶν θανάσιμων ἰοδόλων πωλητὰς καὶ δόξεις, μύρνυται δὲ καὶ ἀντιδότοις. ἤρων' δὲ πινεὶ καὶ εἰς τελειοτάτῃ αὐτῇ· ἐστὶ δὲ καὶ διουσηντερίας χρησίμος.

Πρὶ Χαλκαῖα. Κεφ. ριδʹ.

Χάλκατον τῶν μὲν γῆς ἐν καὶ ταυτὸν ὑπάρχει, ὕδρον γάρ ἐστι, πεπηγὸς· εἰδικὸς δὲ ἔχει διαφορὰς τρεῖς. τὸ μὲν, ὃ καὶ τὰ σαλαγμὸν διηδουμένων ὕρων εἰς πινὰς ὑπονόμους συλλέγεται, ὃθεν καὶ σαλακτὶς καλεῖται ὑπὸ τῶν τῶν κυρτακῶν μέταλλα ἐργαζομένων. Πετρεῖος δὲ αὐτὸ καλεῖ πινάειον· οἱ δὲ, σαλακτικόν, πικτόν, ἐφθόν, ἀεγκτόν, λογχωτόν. τὸ δὲ ἀπὸ τῶν ἐργαζομένων ἐν σπηλαίοις· ἐπειτα μεταχρόμενον εἰς βόδρους, τὴν

τὸ πῆξιν λαμβάνει· ὁ δὲ καὶ πη-
 κτὸν ἰδίως ὀνομάζει. τὸ δὲ τεί-
 τον χαλεπὸν ἢ ἐφθόν, σκευάζεται
 δὲ ἐν ἰσπανίᾳ· σκευὴ δὲ ἔχει
 τοιαύτην* ἄρχησόν τε καὶ ἀδε-
 5 νέσαστον ὑπαρχόν· ὕδατι δὲν-
 τες αὐτὸ ἐφύουσιν, εἴτα εἰς τὰς
 δεξιὰς μένους κατερράδωντες, ἐὼς
 τοῦτο δὴ πῆγνυται τεταγμέ-
 ναις ἡμέραις, εἰς πολλὰ διαμε-
 10 μνον κύβοι δὲ ῥήματα, βορ-
 εῖον δὲ αὐτῆς ἡγρεόν τὸ κυά-
 νεον καὶ βαρὺ, πικτόν τε καὶ
 διαυγές· οἷόν ἐστι τὸ σαλακτόν,
 ὡς δῆλον δὲ λογχωτὸν χαλού-
 μιον. ἐχρόμιον δὲ τὸ * πικτόν.
 15 τὸ δὲ ἐφθόν πρὸς μὲν βαφὰς καὶ
 μελάσματα ἐπιτηδαιότερον τῶν
 δῆλων δοκεῖ εἶναι· πρὸς δὲ ἰατρ-
 κὴν, ἀδυνέστερον ἢ πέρας δείκνυσι.
 Διύαται δὲ σύφειν, διερμάνην,
 ἐραρωῦ· ἑλμυνδας πλατείας
 20 ἀναιρεῖν ἢ ἀ. βάρες καταπνό-
 μιον, ἢ μετὰ μέλιτος ἐκλείχ-
 μιον· ἐμέτοις τε κινεῖ καὶ μύκ-
 τας λαβῶσι βοηθεῖ σὺν ὕδατι πο-
 δέν· κεφαλῇ τε καὶ αἰσθεῖ ἐνδὲν
 ὕδατι καὶ δὲ εἰοῦ ρινεγχυτέμε-
 25 νον· καίεται δὲ ὡς ὑποδείξομαι
 αὐτίκα ἐπὶ τῆς χαλκίτιδος.

Πρὶ Χαλκίτιδος. Κεφ. ριθ.

Χαλκίτιν περικρετέον τὴν χαλ-
 κρεὶδὴν καὶ σφύρητον, δῆλον δὲ
 καὶ οὐ παλαιόν, ἐπὶ δὲ τὰς ἵνας
 ἐπιμήκει

cōcrementū capessit, quod pē-
 ction, id est cōcretitiū, propriē
 nominat. Tertiū dicitur cōcti-
 le, & in Hispania fieri solet: sed
 inutile ac īvalidissimū esse cō-
 stat. Ratio parādi hęc est: Aqua
 madefactū decoquūt, mox in
 piscinas trāsfundūt, & residere
 patiūtur. Hoc certis dieb⁹ co-
 alescit, in complureis formulas
 digestū, tesserarū speciē reddē-
 tes, quæ racematim inter se cō-
 hærescunt. Optimū esse credi-
 tur, cōeruleū, graue, cōcretum,
 trāsflucēs: cuiusmodi stillatitiū
 est, ab aliis ἰόχoton nomina-
 tum. Proximū, cōcretitiū. Co-
 ctile verò ad infectus & deni-
 grationes, apti⁹ cæteris esse cō-
 pertū est: sed ad medicinæ vřfū
 īvalidius esse, experimēta do-
 cēt. Valet adstringere, calfacē-
 re, & crustas inducere: latas vē-
 tris tineas necat, drachmæ pō-
 dere deuoratū, aut cum melle
 linctū: vomit⁹ ciet: aduēř⁹ hau-
 sta fungorum veneniā, ex aquā
 potū auxiliatur: purgat caput,
 aqua dilutū, & in vellere nari-
 bus instillatū. Vritur, vt paulō
 post in mētiōe chalcitis ostēde-
 mus. Chalcitis. Cap. CXV.

Chalcitis præfertur similis
 æri, friabilis, nec lapidosa, nec
 inueterata, intercurfantib⁹
 P obliōis

DIO SCORIDIS

oblongis venis, spléndentibúsq; Huic absterforia vis est, excal-
faciēs, & cruſtas vlcerib⁹ obdu-
cens: purgat q̄ oculis & eorū-
dem angulis hæret. In genere
leuiter exedétium est. Ad ignē
ſacrū, & vlcera quæ ſerpūt, effi-
cax est. Ságuiné è vulua, & na-
rib⁹ erúpentē, cum ſucco porri
fiſtit: gingiuarū vitia, depaſcē-
tia vlcera, tōſillásq; , eius farina
cōpeſcit. Vſta, & cum melle tri-
ta, oculorū medicamentis lógē
vtlior redditur. Callum gena-
rum, & ſcabritiē abſumit, abſ-
tergétque. Fiſtulas tollit, colly-
rij modo in eas adacta.

Pſoricum. Cap. CXVI.

Fit ex calcite medicamētum
quod pſoricon vocāt, duabus
eius partibus, cū vna Cadmiæ
additis, et ex aceto tritis. Opor-
tet autem in fictili obruere ſi-
mo, dieb⁹ quadraginta, p canic-
ulæ ardores: ſic enim fit acri⁹.
Idē quod chalcitis poteſt. Alij
pares vtriuſq; portiones in vi-
no terūt, & eadē pſequuntur.
Vritur chalcitis fictili nouo, vi-
uis carbonib⁹ ſuperpoſito. Mo-
dus aut vſtionis in humidiori-
bus eſt, dum ipſa chalcitis bul-
las excitare deſierit, & pfectē
inaruerit: in reliquis verò, dum
mutata í floridū colorē fuerit,
&

ἐπιμήκεις καὶ ἀποσπλινδύουσας ἐ-
χουσαν. Διῶαμιν δὲ ἔχει * συ-
πτικὴν τε καὶ θερμαντικὴν, καὶ
ἐξαρρωπικὴν ἀποκαθαρτικὴν τῶν
ὡτῶν κερδοῦς καὶ ὀφθαλμοὺς. ἔστι δὲ
καὶ τῶν μετεώρων * συφόντων. ποιεῖ
δὲ καὶ περὶ ἐρυσιπέλατα, ἔρπη-
τας. αἰμορροαγίας τὰς ἐξ ὑστέρας
καὶ μυκτικῶν. συνὸν περὶ τοῦ χυλῶ-
ς ἐκέρει δὲ περὶ τῆς ἐπουλίδας καὶ
νομάς καὶ παρίδματος. κακῶς μέ-
νη δὲ περὶ τὰ ὀφθαλμικὰ μάλ-
λον χρῆσιμὴν εἶναι συνὸν μέλητι.
τετυκωμένα μὲν βλέφαρα καὶ
τραχέα ἀποτρίχει καὶ σμικρὰ σφύ-
ειν γὰρ δὲ αἶρει ἐν κολλυβίου χή-
ματι ἐπιθεμένη.

Πρὶ Ψωεικῷ. Κεφ. ρις. 15

Σκευά(ζε) δὲ ἐξ αὐτῆς τὸ χαλκί-
μενον ψωρικόν. διπλασίονος χαλ-
κίτιος περὶ ἀπλῶς καθάρσεως
μυροῦ μὲν, καὶ συνὸν ὅξος λεανοῦ μὲν.
δεῖ δὲ ἐν καθάρσει ἀλγείῳ κατ-
εύασιν ἐν κοφείῳ ἐν τοῖς ὑποκύ-
να καὶ μαστῶν ἡμέρας μί. γίνε(τ)αι
δριμύτερον. διωάμενον ὅσα καὶ ἡ
χαλκίτις. ἐνιοὶ δὲ ἴσα μίξαντες οἶ-
νω λεάνουσι. καὶ τὰ αὐτὰ πείθουσι.
καυσεὶον δὲ αὐτῆς ἐν ὀφθαλμῷ κακῶ
ἐπιθέντας, καὶ διαπύροις ἀνδρα-
ξιν ἀποφραγεῖν. μέλλον δὲ ἔστω
τῆς καυσεως, ἐπὶ μὲν τῆς πολύχρω-
ν τοῦ ἀπομοφολύχου καὶ καλῶς
ἐκέρει γινώσκου. ἐπὶ δὲ τῶν λοιπῶν
ἢ ἐπὶ τὸ ὑπερπυρρὸν μεταβολή-
σεται.

ἔταιν γδ* μὴ τῶνδε γίνηται τὴν
 χρῶαν κτ' βάθος, ἀναρετέον αὐ-
 τῷ. τὴν δ' ἑρεσθαι μὲν αὐ-
 τοῦ παρσίαν ἀποφουσιόειον, καὶ ἀ-
 ποθετέον. ὁπλ' αὖ) δ' ἐπ' ἀνδρά-
 5 κων ἐμφουσιόειον, μέγχι τῶ ὑ-
 παρχον αὐτῷ γινέσθαι: ἢ ἔσθ'
 ὁσράκε καὶ διαπύρων ἀνδράκων
 σφραγισμὴν πυκνῶς, ἕως ἂν πυρῶ
 δῇ καὶ μεταβάλλῃ τὴν χρῶαν.

Πρὶ Μίσους. Κεφ. ριζ'.

10 Μίσου δὲ παρθληπτεον τὸ κύ-
 ωριον, χρυσοφανές, σκληρὸν, καὶ ἐν
 τῷ θραυστῷ αὐτοῦ χρυσίζον, καὶ ἀπο-
 σίλινον ἀσπερσθῶς. Δυνάμειν δὲ
 ἔχει καὶ χαῖσιν τ' αὐτῷ τῇ χαλ-
 κίπιδι, δι' ἧς τῶ σφραγισμῶ κα-
 15 τασκευῆς, ἐν τῷ μᾶλλον τε καὶ
 ἡπὶον διαφέρειν. τὸ δὲ αἰγυπτιον,
 πρὸς μὲν τ' ἡμέα διαφέρει ἐμ-
 πορτικῶτερον ὄν, πρὸς δὲ τοῖς
 ὀφθαλμικοῖς δυνάμειν, πολλῶ
 λείπεται τῶ σφραγισμῶ.

20 Πρὶ Μελανθείας. Κεφ. ριη'.

Τῆς δὲ μελανθείας, ἢ μὲν πρὸς
 τοῖς τ' ὀρύσμασιν των σφοδρῶς ἀφ' ὧν
 ἂν μεταλλῶσιν ὁ χαλκὸς ἐπι-
 πύσσει ἄλμυρῶς ῥόπον. ἢ δὲ,
 ἐν τ' αὐτῶν ἐπιφανείας τ' σφρα-
 25 γισμῶν τόπων, ἢ πρὸς καὶ γὰρ
 ἐστίν. εὐείσκειται δὲ πρὸς καὶ ὀρυκτῇ
 ἐν κηλίκῃ καὶ ἐν ἄλλοις ποτ' τό-
 ποις. Διαφέρει δ' αὐτῆς ἢ πρὸς χαλ-
 κεία, ὁμαλῇ, καθαρά, καὶ ἐν τῷ δι-
 γλῶν ὕδατος μελανομένη ταχέως.

Δυνάμειν

& sanguineū aut miniatū co-
 lorem cōtraxerit, tum demum
 eximenda est. Insidens autem
 spurcitia flatu expellenda, mox
 reponenda. Torretur etiānum
 perflatis carbonib⁹, vsquedum
 luteo colore palle scat: aut ficti
 li subditis candentibus prunis.
 subinde versata, donec igni cō
 flagret, & colorem mutet.

Misy. Cap. CXVII.

Misy asumendū natiōe Cy-
 prium, auri simile, durū quod
 friādo auri coloré imitatur, &
 stellæ modo splendet. Vim ha-
 bet, & vitionē cum chalcitide
 eandē, præterquā qd p̄soricū ex
 eo non cōficitur, excessus de-
 fectusq; ratiōe tantū differēs.
 Ægyptium autem cæteris præ-
 stat, utpote qd efficac⁹ habea-
 tur, sed ad ocularia medicamē
 ta multo supradictō inferius.

Melateria. Cap. CXVIII.

Melateria geminæ est originis:
 quædā in faucibus cuniculorū
 qb⁹ æs eruit, salis modo cōcre-
 scit. Alia verò in sūma facie su-
 pradiCTORū locorū coit, q̄ ter-
 rena est. Quinetiā inuenitur in
 Cicilia, & aliis quibusdā regio-
 nibus, fossilis quædam. Præstat,
 quæ sulphuris coloré trahit, le-
 uis, pura, æquabilis, & quæ cō-
 tactu aquæ cōfestim nigrescit.

P ij Vim

DIOSCORIDIS

Vim causticam eam obtinet,
quam & misy.

Sory. Cap. CXIX.

Sory existimarūt aliqui melanteriā esse, aberrātes, siquidē sui generis est sory, ei nō ab simile: verū forēi virus inest graue, & nauseā mouēs. Inuenitur etiā in Ægypto, & aliis quibusdā regionibus, vt in Libya, Hispania, & Cypro. Præfert Ægyptiū, quodq; friātī nigrius apparet, i multa foramina dehiscēs, suppingūe, insuper adstringēs, & olfactu deuorationeq; magnū virus olēs, ita vt stomach⁹ in vomitiones effundat. Quod autem friatū. scintillas misyos modo nō emittit, & alteri⁹ generis esse, & inualidū cēsendū est. Vim & vitionē supradictis similē habet: dolori dentiū, cauernis inditū medetur, eoque labātes firmat: ischiadicis ex vino infusum auxiliatur: illitū cū aqua, varos extinguit. Medicamētis admiscetur, quæ capillos denigrāt. Hæc aut ferē omnia, & alia quæ vitionē experta nō sunt, perustis validiora esse existimantur: præter salem, & vini facem, nitrum, calcem, & con similia, quæ cruda remissiora sunt. Combusta enim, viribus efficaciora redduntur.

Diphryges.

Διώαμιν δὲ ἔχει καυστικὴν ὥς
αὐτὴ τῷ μίσυ.

Πρὶ Σώρεως. Κεφ. ριθ'.

Τὸ δὲ σῶρυ ἐνίοι ὑπέλαβον μελανήριαν πλανώμενοι, ἰδίον γὰρ ὅτι χλός, ἐκ ἀφόμοιον· βρωμῶδες ὅτερον δὲ τὸ σῶρυ καὶ ναυτίας ποιηπκόν. εὐείσκει δὲ ἐν αἰγύπτῳ, καὶ ἐν ἡῷσι δὲ τόποις, ὡς ἐν λιγύῃ καὶ ἰσπανίᾳ καὶ κύπερ. περὶ τὸν δὲ τὸ αἰγύπτιον, καὶ ἐν τῷ θραυσθῆναι μελανότερον φανό- 10 μιον. κατὰ τήσεις τὲ πολλὰς ἔχον, καὶ ὑπολίπασεν, ἐπὶ ᾧ σύφον, καὶ πρὸς τὴν κατάποσιν ἢ ὀσφρησιν βρωμῶδες καὶ ἀναβρεπτικὸν σομάχε. τὸ δὲ μὴ λαμπυρίζον ἐν τῷ θραυσθῆναι ἐμφερὲς μίσυ, ἕτερον 15 χλός τε καὶ ἀδενές οἰντέον εἶναι. Διώαμιν δὲ ἔχει καὶ καῶσιν τὴν αὐτὴ τοῖς περὶ φημένοις· ἰατὴ δὲ καὶ ὀδονταλγίας ἐν πτέρμον ἐπὶ τὰ βρώματα, καὶ τὸν ὑποσάλυς ὁ δόντας κρατῶν καὶ ἰσχυρὰ 20 βοηθεῖ μετ' οἴνου ἐκλυζόμενον· ἰόντους τὲ σθένισι μὴ ὕδατος κατὰ χεῖρας· μύτην δὲ καὶ εἰς τειχῶν μελάσματα. κοινῶ δὲ πρὸς πῶ ἐπὶ τέτων χερδὸν καὶ τῶ ἡῶν πάντων δυναμικώτερα τὰ ἄλλα 25 σα τὴν κακὰ μένων ἡγνέον· πάλιν ἁλὼν καὶ πρυγός, καὶ νίβρε καὶ πταῖς καὶ τὸ ὁμοίον, ὅσα ὁμοῦ ὄντα ἀνέται. καὶ ὁμοῦ γὰρ τὴν διώαμιν ἐμπερικτότερα γίνεται.

Πρὶ

Πρὶ Διφρυγῆς. Κεφ. ρκ'.

Τῆ δὲ διφρυγῆς τρία ἡντιότα ἐ-
 δη. τὸ μὲν γὰρ μετὰ ἀγκύρας ἐστίν, ὃ δὲ ἐν
 κύκλῳ μόνῃ γίνεται· πολλὰ δὲ γὰρ ὄν
 ἀναφέρεται ἐκ βυθῶν τινὲς τῶν ἐκεί-
 νου τόπων· εἴτα ἀνερχομένη ξηραίνεῖ ἐν
 ἡλίῳ καὶ μετὰ ταῦτα φρυγάνοις κύ-
 κλῳ περὶ τοὺς ὁδοὺς καίεται· ὁ δὲ
 καὶ διφρυγῆς ἐκλήθη, διὰ τὸ ὑπὸ ἡ-
 λίου καὶ τῶν φρυγάνων καίεσθαι, καὶ ξηρο-
 ποιῆσθαι, καὶ οἷον εἶ φρυγάνου. τὸ δὲ εἶτε
 10 ἐν τῇ περὶ τῶν ἀνελόμων χαλκῶν ὡς ὁ
 ὑποτάθηναι καὶ τῷ ὑδατος περὶ
 γὰρ τῷ τῷ ψυχρῷ ὑδατος περὶ
 σιν, ὡς ἀνωτέρω ἐφάρμοξε περὶ ἀνθους
 χαλκῶν διαλερόμενοι, μετὰ τῷ ἀ-
 νείρεσθαι τῶν χαλκῶν εὐείσκει· ἐν τῇ
 15 γὰρ ἐκείνων τῶν πυρρῶν ἀν-
 τῆς τὸ τοιοῦτον εἶδος, τῷ τε σύμφιν
 καὶ τῷ γινώσκον χαλκοῦ ἔχον. τὸ δὲ
 τῶν σκευάζεται ἔτι· λίθον τὸν
 λεγόμενον πυρρῶν συνέντες εἰς
 κάμινον οἱ περὶ τοῦτο ὄντες, καί-
 20 οῖσιν ὅτι ἡμέρας ἰκατάς τίτατον,
 ὅταν δὲ ἡ χροία μεταβάλλῃ
 ταί, ἀνελόμοι ἀποτίθενται· π-
 νες δὲ φασιν ἐκ μόνης τῆς τὸν χαλ-
 κοῦ λίθον ἀποτελούσης ὕλης γιν-
 νᾶσθαι τὸ περὶ τῶν ὁδοῦν· ὅταν ὁππῶ-
 25 δεῖσιν ἐν ταῖς λεγόμενα ἄλλωσιν*,
 ἀνερχομένη εἰς τοὺς βόθρους καὶ ἐν-
 ταῦθα καίεται· τὸν τε γὰρ κύκλῳ
 τόπον τῶν βόθρων ἐπιλαμβάνει,
 καὶ μετὰ τῷ ἀνείρεσθαι τῶν λί-
 θων οὐδὲν ἡττον εὐείσκειται. περ-
 κριτέον

Diphryges. Cap. CXX.

Diphrygis tria genera esse.
 creduntur. Quoddam enim
 metallicum est, quod in Cy-
 pro sola gignitur: lutosum
 nanque extrahitur, ex luto
 cuiusdam inibi specus: ex-
 tractum, sole ficitur, mox
 circumpositis sarmentis vritur.
 diphryges ideo vocatū
 est, quod & à sole, & à sar-
 mentis vratur, arescat, & fer-
 mè torreatur. Alterum per-
 fecti æris, quasi subsidens
 fax est: siquidem post frigi-
 dæ aquæ offusionem, vt su-
 præ retulimus, cum de flore
 æris differeremus, sublato
 ære, fornacum ima parte co-
 hærens id genus inuenitur,
 & adstrictionem & gustum
 æris habens. Tertium sic fit:
 Lapidem pyriten, vt cal-
 cem multos dies cremant in
 camino: cūque colorem
 rubricæ contraxerit, exi-
 mentes recondunt. Qui-
 dam tradunt hoc ex sola ma-
 teria, quæ lapidem æris gi-
 gnit fieri: quādo in dictis a-
 rēis affata, & in scrobes trāf-
 lata peruritur. Tūc enim am-
 bientē scrobis locum com-
 prendit, & exemptis lapi-
 dib⁹ nihilominus inuenitur.

P iij Prefertur

DIO SCORIDIS

Preferit quod sapore æris red-
dit, æruginisq; adstringens, &
vehementè exiccans lingua: qđ
sibi exusta ochra nō vendicat:
quę cremata diphrygis vice ve-
nit. Vis ei⁹ adstringere perpur-
gare, extergere, siccare, excre-
scentia consumere, vlcera ser-
pentia, & quę cacoëthe vocāt,
ad cicatricem perducere. Sup-
puratiōes terebinthina aut ce-
rato exceptum discutit.

Auripigmentū. Cap. CXXI.

Auripigmentū in eisdē me-
tallis, quib⁹ sandaracha gigni-
tur. Optimū existimat crusto-
sum, aureo colore micās, nulli
materiæ permistū, in squāmas
fissile: quale in Myſia Helleſpō-
ti nascitur. Huius duo genera
fluxerunt: Vnum supradictum
est. Alterū glandis effigie, palli-
dū, & colore sandarachā imi-
tans, gleboſum, ex Ponto &
Cappadocia defertur: qđ etiā
secūdum locū tenet. Torretur
in testa noua viuīs carbonibus
subiectis, afsiduoq; verſat, do-
nec igne flagret, & mutet co-
lorem: deinde refrigeratū, tri-
tūmque recōditur. Vim habet
adstrictoriā, & erodentē, cru-
stas cum vehemēti vredine, &
violēto morſu excitat: reprimi-
t q̄ excrescūt, & capillos euellit.

Sanda-

κριτέον δ' αὐτὴ τὸ τῇ χεύσει ἔγ-
χαλλον. * ἰίζον σύφον τὲ καὶ ἀνα-
ξηραίνον ἱκανῶς τ' γλῶσσαν. ὁ δὲ
ἢ κεκαυμένη ὥχρα ἢ κέκτηται ἢ
διηγαίοντες ἀντὶ διφρυγῶν π-
περίσκει. Διῶαμιν δὲ ἔχει συ-
πιλικὴν ἢ ἀνακαθαρτικὴν ἐπὶ τὰ
μυῖως, σμηκτικὴν ἢ καὶ ξηραντικὴν
καὶ καλαστικὴν ἐπὶ σαρκώσεως,
ἀπουλωτικὴν κακοήθων καὶ ἐρυσσι-
κῶν. Διαφορεῖ καὶ ἀποσήματα ἀ-
γαλμῶν τερειδίνῃ ἢ κυρωτῇ. 10

Περὶ Ἀρσενικῆς. Κεφ. ρκά.

Ἀρσενικὸν καὶ τὰ αὐτὰ φυνά-
μεταλλα τῇ σανδαράχῃ. ἄριστον
δὲ ἡγνέον τὸ πλακώδες καὶ χυ-
σίζον τῇ χροῇ, καὶ τε πλάκας
λεπτομυῖας ἔχον ὡς αἰεὶ ἐπικει-
μυῖας ἀλλήλαις. ἔστι δὲ ἀμιγρὲς
ἐτέρας φύσεως. τοῖόν τινος δὲ ἔστι τὸ
φρονώμενον ἐν μυσίᾳ τῇ ἐν ἑλλη-
σπονίῳ. ἔστι δ' αὐτὸ δύο εἶδη. τὸ μ-
ἐν οἶον περιείρη. * τὸ δὲ δῆλο βα-
κανοειδὲς καὶ ὠχροειδὲς καὶ σανδα-
ραχίζον ἢ χροῇ. ἐκ πέντε καὶ κατ-
παδοκίας φρόμενον. δευτέρου δ' ἔ-
στὶ τοῖόν τινος. ὁππῶς δὲ ἔπος. ἐπὶ
ὁσράκῃ καμνῇ ἐπρεσάμενος αὐτὸ
δύς ἐπὶ διαπύρεϊ ἀνθρακος καὶ σφέ-
φε συνεχῶς, ὡς δ' ἂν πυρῶν καὶ 25
μεταβάλλῃ, λύξας καὶ λεάνας ἀπο-
πίθεσθαι. Διῶαμιν δ' ἔχει σιπιλικὴν
καὶ συπιλικὴν καὶ ἐξαρωπικὴν καὶ
πυρώσεως καὶ βίαιης δυνάμεως ἔστι δ'
καὶ τ' τελλόντων, ψιλοὶ δ' τείχας.

Περὶ

Πρὶ Σανδαράχης. Κεφ. ρηβ'.

Σανδαράχην ὃ πρὸς κρῖτον ἔχει
χαλκορῖν, πυρρῶν, εὐδραυστον, ἐυ-
λίαντόν τε καὶ καταράν, κινναβα-
εῖς ἔχουσιν πλὴν χροῶν, ἐπὶ ὃ δειώ-
σθαι ἀποφορᾶν ἔχουσιν. Διούαμιν
δὲ ἔχει καὶ ὁπλίσιν ἃ αὐτῇ τῷ ἀρ-
σενικῷ θεραπεύει ὃ καὶ δὴ ὁ πεκίας
ἀναλφθεῖσα ῥητίνη, καὶ λεωρὲς ὁ-
νυχας σὺν πύσῃ ἀφίσησι καὶ τορὸς
φθειριάσεις σὺν ἐλαίῳ ποιεῖ φύ-
ματά τε σὺν σέσπιδι διαφορεῖ. ἀρ-
μόζει δὲ καὶ πρὸς τὰ ἐν ῥίσι καὶ
σώμασιν ἔλκη, καὶ πρὸς τὰ λοιπὰ
ἐξανθήματα σὺν ῥοδίνῳ καὶ πρὸς
κονδυλώματα. διδύται καὶ ἐμπυ-
κοῖς, σὺν οἶνο μέλιτι. καὶ ὑποδυ-
μᾶται σὺν ῥητίνῃ καὶ πρὸς πα-
λαιὰ βήχα, διὰ σίφωνος ἐλκω-
μὸς τῷ ἀτμοῦ τῷ σώματι. φω-
νὴν τε ἀποκαθαίρει ἐκλειχρόμεν
σὺν μέλιτι, καὶ ἀσθματικοῖς σὺν
ῥητίνῃ καταπόσιον δίδύται.

20 Πρὶ Στυπηνείας. Κεφ. ρηγ'.

Στυπηνείας δὲ χερδὸν παῖν εἶ-
δος, ἐπὶ τῶν αὐτῶν ἐν τῇ αἰγύ-
πτῳ μετὰ λίαν ἐνείσκειται. ἐστὶ
γὰρ χερσὶ οἶον ἐκ τῆς βωλίτιδος ἀν-
δρος. ῥυγᾶται δὲ καὶ ἐν ἄλλοις
25 πᾶσι τόποις, ἐν μύλῳ, ἐν μακε-
δονίᾳ, ἐν λιπάραϊς, καὶ σαρδο-
νίᾳ, καὶ ἱερὰ πόλει τῆς φρυγίας,
λίβυη, ἀρμενία, καὶ ἐν ἄλλοις
δὲ τόποις παλαιοῖς ὡς περὶ ἡ μύλ-
τος. ἐστὶ δὲ αὐτῆς εἶδη πλεῖστα.

πρὸς

Sandaracha. Cap. CXXII.

Sandaracha probatur rufa,
& saturation, & aliena materia
vacans, friabilis, cinnabaris co-
lore, sulphuris virus redolens,
Dos eadem & vntio, quæ auri-
pigmento: explet alopecias, re-
fina excepta, & scabros vn-
gues cum pice eximit: contra
phthiriasin ex oleo efficax est.
Tubercula cum adipe discu-
tit. Prodest ad narium orísque
vlcera, & cæteras pabularum
eruptiones cum rosaceo: item
condylomata. Datur ex mul-
so, purulêta extulsiêtib. Suf-
fitur quoq; cum resina, aduer-
sus veterem tussim, raptō per
fistulam nidore: vocem ex-
pedit, cū melle delincta
fuspīriosis cum resi-
na in catapotio o-
ptimè datur.

Alumen. Cap. CXXIII.

OMNE aluminis genus fe-
rè in Ægypto, & in eisdè me-
tallis inuenitur: etenim scissile
quoddam, quasi flos glebofi in-
telligitur. Gignitur & in aliis
quibusdam locis, in melo, in
Macedonia, in Liparis, Sar-
dinia, Hierapoli Phrygiæ. A-
phrica, Armenia, & plerif-
que aliis regionibus, sicut & ru-
brica. Plurimæ eius species:

P iij verum

DIOSCORIDIS

verū ad medēdi vsum, scissille,
rotundū, et liquidū expetūtur.
Optimū est scissile, præsertim
recens, cādidissimū, gustu per-
quā adstringēs, graue olens,
calcolorū expers, nec glebulo-
se aut affulose cōpactū, sed fi-
gillatim in capillamēta quædā
canescētia dehiscens, quale est
quod trichites, quasi capillare
nominat, in Ægypto natū. Re-
peritur quoq; lapis huic alumi-
ni persimilis, qui gustus iudicio
dignoscit, quod nō adstringat.
Danaī in rotūdi genere, quod
manu confictū est: sed ex figu-
ra deprehenditur. Asumendū
autem suapte natura rotundū,
bullis turgēs, albo propius, at-
que validius adstringens, præ-
terea nō nihil palloris cū qua-
dā pinguitudine præ se ferens,
sine arenis, friabile, natiōe Æ-
gyptiū, aut ex insula Melo. Li-
quidi probatio, vt sit lymphidū,
lacteum, æquale, & semper fuc-
co madēs, sine lapidibus, atque
quendā coloris igniculū expi-
rās. Vim habent excalfaciendi
stringēdi, & expurgādi, q̄ cali-
ginē pupillis oculorū offūdūt:
genarū carnē, cæterāsque excre-
scētias extenuāt. Scissile rotun-
do efficacius intelligitur. Vri et
torreri chalcitidis mō debent.

Putrescētia

πρὸς δὲ ἰατρικὴν χρῆσιν λαμβά-
νεται ἢ χρίθῃ τε καὶ ἢ στρογγύλῃ καὶ
ἢ ὑγρᾷ. αἰεὶς δὲ ὑπόφχει ἢ χρί-
σθῃ, καὶ ταύτης ἢ πρὸς σφραγος καὶ
λευκὴ ἄγαν, καὶ ἀλιδος* καὶ βαρύ-
ζος σύφρατα τε ἐν τὴν ὥς, ἐπὶ τῇ δὲ
πεπιεσμένη βωληδόν, ἢ χρίδακη-
δόν, ἀλλ' ἐξασμένη κατὰ μόνου-
δας πολλαῖς δριξίν ἐμπερὼς, οἷα
ἔστιν ἡ λερωμένη τειχίτις, γλυνομέ-
νη δὲ ἐν αἰγύπτῳ. εὐερίσκειται δὲ
καὶ λίδος ἐμπερὼς αὐτῇ ἄγαν, ὅν ἰσ
διακριτέον τῷ τῆς γένεως κρι-
τικῶ μὴ σύφρατα. τῆς δὲ στρογ-
γύλης ἢ χειροποίητος ἀδόκιμος
ὑπόφχει* γινώσκειται δὲ ἐν τοῦ
χρήματος. παρακλητῆα δ' ἂν εἴη
ἢ φυσικῶς στρογγύλη καὶ πεμπολυ-
τῇ γῶδης, ὑπόλευκός τε καὶ σύφου-
σαι ἐρρωμένως, ἐπὶ δὲ ποσὸν ὠ-
χρότητος ἅμα καὶ λιπαρίας ἔχου-
σα, πρὸς δ' τούτοις ἀλιδός τε καὶ
ἐνδρυδής, καὶ γλῆει μυρία ἢ αἰ-
γυπία. τῇ δὲ ὑγρᾷ τὴν μάλα 20
διαφανῇ πρὸς κριτέον καὶ γαλακίῳ
δὴ, ὁμαλῶ τῇ καὶ διόλου χυλῶδῃ,
ἐπὶ τῇ ἀλιδόν καὶ πυρῶδες ἀποπνέ-
ουσαν. Διῶαμιν δὲ ἔχουσι θερμὰ
πικρὰ, συπικρὰ,* ἀποκαθαρτικὰ
τῇ ἐπισκοποῦντων τῇ κόραις τῇ- 25
κουσαν τῇ καὶ ταῖς ἐπὶ τῇ βλεφάρεων
σάρκασι καὶ τὰ ἄλλα ὑπόσφρα-
ματα. ἐνεργεστέραν δὲ τῆς στρογ-
γύλης τὴν χρίθην ἡμῶν. καίον-
ται δὲ καὶ ὁπλῶν ὥς χαλκίτις.
ἰσχυροί

ἴασι δὲ καὶ σπινθόνας· αἱ μὲν
 ῥαγίας οὐλα πλάσθωντα σέλλουσι·
 καὶ ὀδόντας σπειρομήροις κρατυύκ-
 σι συν ὅξει ἢ μέλιτι· ἄφθας δὲ
 ὠφελεῖ συν μέλιτι, καὶ ἐξανθί-
 5 ματα καὶ ῥεύματα ἐν ὧσι συν
 πολυρόνου χυλῷ· λέπταις δὲ ἀρ-
 μύζοισι συν κράμβης φύλλοις,
 ἢ συν μέλιτι ἐψηθεῖσαι· καὶ κησ-
 μοῖς, ὄνυξί τε λεπτεῖς καὶ πίε-
 ρυγίοις καὶ χυμέτλοις συν ἕδα-
 10 τι καταιονοῦνθαι· συν πτυγί δὲ
 ὅξοις κατὰ χειρόν μετὰ κη-
 κίδος ἴσθης κακχυμῶντος πρὸς φα-
 γεδαμνικά, πρὸς δὲ νομάς συν
 ἅλοι διπλοῖς· σπιτυριάσεις δὲ
 συν ὀρέβω καὶ πύσῃ σμήχουσι
 15 κατὰ χειρόν· κονίδων τὲ καὶ
 φθειρῶν καὶ πυρκαυτῶν συν ὕ-
 δατι κατὰ χειρόν, βοήθημα.
 * οἰδήμασι τε καὶ μαρολήων καὶ
 βουβώνων δυσωδίαις κατὰ χει-
 ροι· ἢ δὲ μολία καὶ πρὸς ἀσπλ-
 20 ληΐαν σπινθέρει πρὸς τῆς σινώ-
 δου παρατεθείσα τῷ σώματι τῆς
 ὑσέρας· καὶ ἐμβρυα ἐκπνέσσει·
 ἐπουκίσι τε καὶ σαφυλαῖς καὶ πα-
 ρειδύμοις ἐπιτίθειται· καὶ σώμασι
 καὶ πρὸς ὅτα καὶ αἰδοῖα (συν μέ-
 25 λιτι ἐπιχέουσι.

Πρὶ Θείου. Κεφ. ρκδʹ.

Θεῖον δὲ ἄριστον ἡγνέον, τὸ ἄ-
 πυρον καὶ λαμπυρεῖζον τῇ χροῇ,
 διαφανές ἔστι καὶ ἄγνιστον. τὸ δὲ πεπυ-
 ρωμένον, τὸ χαλρόν ἔστι καὶ ἐυλιπέε.
 ἡγνέον

Putrescētia vlcera compescūt:
 sanguinis fluxiones inhihent:
 gingivas humore pręgnantes
 cōprimūt: motus detiū cū ace-
 to & melle firmāt. Profunt cū
 melle vlcerib⁹ oris, eruptioni-
 bus papularū, & fluxionibus
 auriū, cum sanguinalis herbæ
 succo: lepris cōueniūt cū bras-
 ficæ foliis aut melle cocta: itē
 pruritui, & vnguim scabritiis,
 pterygiis, & pernionib⁹, asper-
 sa cū aqua. Valent cū aceti fæ-
 ce, & galla, pari pōdere crema-
 ta, ad phagedænas vlcerum, &
 cū salis duab⁹ partib⁹, ad vitia
 quę pascūt: furfures cū eruo et
 pice illita abstergūt: ad lendes,
 pediculos, ambusta, cum aqua
 illita auxilio sunt. Cōtra tumo-
 res, & graue alarū inguinūque
 vir⁹, illinunt. Ex Melo aut adue-
 ctū, mulieribus pręstat ne cōci-
 piāt, ante coitū ori vuluæ indi-
 tū: partus quoq; extrahit: gingi-
 uis, si caro excreuit, vuæ ac tō-
 fillis accōmodātur: ori, auribus
 & verēdis cū melle illinuntur.

Sulphur. Cap. CXXIII.

Sulphur optimū existimatur
 viuū, quod apyron vocāt, nite-
 dulæ modo splēdidū, perlucēs,
 minimē lapidosum. Probat in
 genere sulphuris ignē expti, qđ
 viret, ac prępingue spectatur.

Pluri-

DIOSCORIDIS

Plurimum in Melo & Lipara
gignitur. Supradictum sulphur
calfacit, discutit, & celeriter cō
coquit: prodest tussib⁹, suspirio
fis, purulenta extusisientibus in
ouo sumptū, aut suffitum: præ-
terea partus, vsti nidore extra-
hit: lepras, lichenas, scabros vn-
gues, cum resina terebinthina
mistum, aufert: cum aceto autē
illitum, ad lepras efficax est: vi-
tiligines tollit: scorpionis icti-
bus, addita resina, medetur cū
aceto verò, draconis marini
scorpionisq; plagas sanat. Pru-
ritus toto corpore erumpētes,
cum nitro deterfum, sedat: re-
gium morbum emendat, in-
sparsum fronti cochlearis men-
fura, aut in forbili ouo sumptū.
Facit ad grauedinē, & destilla-
tiones: sudores quoq; consper-
fum inhibet: podagricis, cū a-
qua & nitro illitum, conducit:
grauitatem auditus, suffiti ni-
dore raptim per fistulam hau-
sto, sanat: lethargicos suffitu
excitat: erumpētem vndecun-
que sanguinem sistit: contusis
auribus, cum vino & melle il-
litum medetur.

Pumex. Cap. CXXV.

Pumicis probatio, vt magno-
pere leuis, spongiosus, scissilis,
nec arenosus, item teri facilis,
&

ἄνται δὲ πλεῖστον ἐν μέλι καὶ
λίπαρ. θερμαίνει δὲ τὸ περὶ ῥη-
μὸν καὶ διαφορεῖ καὶ πεπαί-
νει τὰ χεῖρας· βῆχας τὲ καὶ ἐμ-
πύους καὶ ἀσθματικούς ὠφελεῖ
ἐν ὧν λαμβανόμενον καὶ ὑπο- 5
συμώμενον· πρὸς δὲ τοῖσι
ἐμβρυα κατασπᾶ, ὑποσυμμαδέν·
καὶ λέπρας, ἐπὶ δὲ λειχῶνας καὶ
ὄνυχας λεπτεῖς αἶρει τερβινθίνῃ
μιχθέν ῥητίνῃ· συν ὅξει δὲ κα-
ταχειόμενον, ποιεῖ μὲν καὶ πρὸς 10
λέπρας· αἶρει δὲ καὶ ἀλφούς· ἰά-
ται καὶ σκορπίων πικρὰς μὲν
ῥητίνῃ· συν ὅξει δὲ καὶ δρακοντίου
θαλασσίῃ καὶ σκορπίων πικρῇ
ἰάται. πάλιν καὶ τὸν κατ' ὄλον τὸ
σῶμα κνημὶς (ὡν νίτρω σμηρό- 15
μενον· ἀποκαθαίρει τὸ καὶ ἰκτεριν,
κοχλιαεῖς πικρὰς ἐπιπασσόμε-
νον τῷ μετώπῳ, ἢ μὲν ὡς ῥοφητὴ
λαμβανόμενον· καὶ πρὸς κόρυζαν
τὸ καὶ κατὰ ῥῖον ποιεῖ· καὶ ἰδρωτὶς
σέλλῃ καταπασσόμενον· καὶ ποδα- 20
ρικοῖς (ὡν νίτρω καὶ ὕδατι κατα-
χειδέν συμβάλλεται· καὶ δυσ-
κοίαν ὑποσυμώμενον διὰ σίφω-
νος διεραπύει· καὶ ἀνταρτικὸς ὑπο-
θυμώμενον· αἰμορραγίαν τ' ἴχει·
θλάσεις τὲ ὧτων συν ὀίνῳ * καὶ 25
μύλιτι καταχειόμενον ἰάται.

Πεὶ Κισσίου. Κεφ. κλέ.

Κισσιν δὲ περὶ κριτεῖον τ' ἄ-
γαν κούφῳ, καὶ πολύκωνον, ὁρῶ
τε καὶ ἄλλῳ, ἐπὶ δὲ ψαδυσά τε
καὶ

καὶ λευκὸν. κρησέον δὲ ἔτι ὡς λαβὼν
 αὐτῆς ὅποσον αὐτὴ θέλῃς, διαπύροις
 ἔγκρυψον ἀνθράξιν, ὡς δ' αὖ ἐκ-
 πυρώσῃ, ἀνελόρμος σβέσον οἶνω
 εὐώδει· καὶ πάλιν πυρώσας σβέσον·
 5 τὸ δ' ἵ τρίτον ἀνθρόμοσος αὐτὴ καθ'
 ἑαυτῷ, ἢ αὖ ψυχρῶν, καὶ ἀποθέ-
 μος χρεῖ. Δυνάμει δὲ ἔχει
 εὐπικνὴν τε καὶ σπικτικὴν οὖλον,
 ἀποκαθαρτικὴν τῶν ὀπισκοτου-
 τῶν ταῖς κέρασι μετὰ τ' ὕδατος·
 10 νειν· ἐλκῶν τε πληρωτικὴν καὶ κα-
 τουλωτικὴν· ἔτι δὲ καὶ κατασταλ-
 τικὴν ὑπερῶν, καὶ σπικτικὴν ὀδόν-
 των λεία, καὶ ἐφαρμωτικὴν σώμα-
 τος· καὶ εἰς ψίλωσιν τειχῶν ὀπιθή-
 δειον. Θεόφραστος δ' ἰσχυρεῖ, ἐὰν εἰς
 15 ζέοντά τις οἶνου πίδακα καθῇ κί-
 σσειν, παύει δὲ παραχρῆμα πλὴν
 ζέοντι τῷ οἶνω.

Περὶ Ἀλῶν. Κεφ. ρκς'.

Τῶν δὲ ἁλῶν ἐνδρέστερον μὲν
 ὅστις τὸ ὀρυκτόν· τοῦτου δὲ κοι-
 20 νῶς μὲν τὸ ἁλίδον καὶ λευκὸν καὶ
 διαφανές, πυκνόν τε καὶ ὁμα-
 λὸν τῇ συγκρίσει. ἰδίως δ' τὸ ἁμ-
 μονιακὸν τῷ γῆρι, ὡς ἁλίδον τε
 καὶ εὐδείας τὰς διαφύσεις ἔχον.
 τοῦ δὲ θαλασπίου τὸ πυκνὸν πα-
 25 ραληπτερόν καὶ λευκὸν καὶ ὁμαλόν.
 ἁλλισον δὲ ἐν κύμασι καὶ κύματου
 τῇ σαλαμῖνι γίνεται καὶ μεγά-
 ρις, καὶ ἐν σικελίᾳ καὶ λιβύῃ.
 ἐν τοῖς λεγομένοις δὲ καὶ τὰ λι-
 βυῖα περιηγεῖται. ἐν τοῖς ὅλοις

& candidus. Crematur flagra-
 tissimis carbonibus obrutus,
 & vbi canduerit, extractus, vi-
 no restinguitur odorato: ite-
 rumque incensus extinguitur:
 & tertia vltione exemptus, &
 per se refrigeratus, ad vsus
 conditur. Vis eius adstringe-
 re, gingiuas abstergere: pur-
 gat cum calfactione, quæ ca-
 liginem pupillis offundunt: ex-
 plet vlcera, & ad cicatricem
 perducit: excrementia cohi-
 bet. Fit ex farina eius dentifri-
 cium. Corpori crustam obdu-
 cit: auellendis capillis aptus.
 Theophrastus author est, si quis-
 quam in bullientem vrceum
 vini pumicem iniecerit, feruo-
 rem statim fedari.

Sal. Cap. CXXVI.

Sal fossilis efficacior est: co-
 muniter, si est candidus, calcu-
 lis vacans, & perspicuus, den-
 sus, æquali compage. Peculia-
 riter ammoniacus natione lau-
 datur, si modo findi facillè pos-
 sit, & in recta segmenta didu-
 ci. In marino sale eligendus est
 candidus, æqualis, defusus. Proba-
 tissimus in Cypro fit, & Sala-
 mine Cypri, & Megaris, in Si-
 cilia & Aphrica. Sed inter di-
 cta salis genera lacustris præ-
 fertur: sed multò validissimus
 est

DIOSCORIDIS

est Phrygius nomine tapeus, δὲ αὐτῇ ὄρεϊ τὸ φρύγιον, καλούμε-
aut tritæus, aut gātæus. Salis na-
tura in commune perquā uti-
lis est: adstringit, absterget, ex-
purgat, dissipat, reprimat, ex-
tenuat, & crustas inducit. Sed
hoc interest, quod alius alio sit
præstantior. Quin & à putre-
dine vindicat. Admiscetur me-
dicamentis psoras abstergen-
tibus. Excreſcentia in oculis
reprimat, & pterygia cōsumit,
cæterâsq; carnis extuberatio-
nes tollit: clysteribus infundi-
tur: discutit lassitudines ex o-
leo illitus. Contra hydropico-
rum tumores auxiliatur, dolo-
résq; in faccis fotu mitigat, &
pruritus sedat, ex oleo & ace-
to infriſtus ad ignem, donec
fudent. Item lichenas, lepras,
psorâsque. Anginam ex melle,
aceto, & oleo illitus leuat: ton-
fillis vuëque, cum melle toſtus.
Vlceribus in ore manantibus,
gingivis quas humor vexat, &
phagedænis vlcerum, cum po-
lenta crematus illinitur. aduer-
sus scorpionum ictus, cum li-
ni femine: contra serpentium
morsus, cum origanō, melle,
hyssopo: aduersus cerasten, cū
pice, aut cedria, aut melle au-
xiliatur. Contra scolopendræ
morsus, cum melle & aceto:
aduer-

νον δὲ ταπήσιον. Δυνάμει δὲ ἐ-
χοισιν οἱ περιερημῆροι ἄλλες κοι-
νῶς πολὺ χρῆσιν, συπλήν τε καὶ
σμηκτικὴν, καὶ ἀποκαθαρτικὴν καὶ
διαχυτικὴν, ἐπὶ δὲ κατασαλπι- 5
κὴν καὶ ἰσχυρικὴν, καὶ ἐχαρωτικὴν.
τῷ μᾶλλον καὶ ἥπλον διαφέροντες.
εἰσὶ δὲ καὶ σιτηδόνων ἐφεκτικοί.
καὶ σμῆξοσι ψωρεῖαις μύκηται.
σέλλοισι καὶ τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς
ὑπεροχαῖς, καὶ πτερύγια τήκου- 10
σι, καὶ τὰς ἄλλας δὲ ὑπερσαρκώ-
σεις αἱρεῖσι καὶ κλυσμοῖς εὐθε-
ται· καὶ κόπου λυθήειοι, σὺν ἐ-
λαίῳ χριόμενοι. καὶ πρὸς τὰ οἰδή-
ματα τῶν ὑδρωπικῶν, πνεῖα τε
ἢ δι' αὐτὴν ἐν σακκίοις περυντικῇ 15
δύσματων, καὶ κνησμοῖς ὅ παύει-
σι μετ' ὕδατος καὶ ὄξους συγχριόμε-
νοι παρὰ πνεῖ αἰχρῆς αὐτῶν ἰδρώσω-
σιν, ὁμοίως καὶ λεχάνας καὶ ψώρας καὶ
λέπρας. συναγχρικοῖς τ' κουφίζουσι
σὺν μέλιτι καὶ ὄξει καὶ ἐλαίῳ δια- 20
χριόμενοι. πρὸς δὲ παρείδημα καὶ
κονιδας (σὺν μέλιτι ὁπποῖοι καὶ ἁ-
φδας καὶ ἔλκον πλάσθον καὶ πρὸς φα-
γεδάνας (σὺν δὴφίτῳ κεκαυμένοι
καταπλάσσοντες). πρὸς δὲ σκορπί-
ων πληγὰς σὺν λιγδωτέρμῳ· πρὸς 25
δὲ ἔχων δῆγματα σὺν οὐρεανῶ
καὶ μέλιτι καὶ ὑσώπῳ· πρὸς δὲ
κεράσου μετὰ πίσεως ἢ κεδείας
ἢ μέλιτος· πρὸς δὲ σκολοπέν-
δρας δῆγμα σὺν μέλιτι καὶ ὄξει·
πρὸς

πρὸς ὃ σσηκῶν πληγὰς καὶ τεριδο-
 ρας καὶ πρὸς ψυδράκια τὰ ἐν κε-
 φάῃ, θύμος τε καὶ φύμαλα σὺν σέα-
 πι μοχρεῖω ἀδνηφθέντες· σὺν σα-
 φίδι δὲ ἢ σέαπι υἱέω ἢ μέλιτι, δο-
 5 δῆντες διαφορεῖσι. καὶ ὀρχεων οἰδή-
 ματα, σὺν ὀρηγαῖω καὶ ζύμη θάπτον
 * πεπαίνουσι. καὶ κροκοδείλοδῆκτοισ
 βοηθοῦσιν, ἐνδεθέντες εἰς ὀδόνιον
 λείροι, καὶ βαπτόμενοι εἰς ὄξος συφο-
 μύων ἢ μερῶν τοῖς ἐνδεσμοῖς. θη-
 10 ριοδῆκτοισ τε βοηθεῖσι, καὶ πρὸς ὑπώ-
 πια παροσώπας σὺν μέλιτι. καὶ παρὰ
 ὁπῶ μήλωνος πόσιν, καὶ πρὸς μύκη-
 τας σὺν ὀξύμῃτι πινόμενοι, πρὸς
 ὃ σρέμμαλα σὺν ἀγέυρω καὶ μέλιτι.
 πρὸς πυρίκαυτα ὃ σὺν ῥαίω ἐπι-
 15 τεθέντες ἐκ ἑῶσι φλυκταινῶδες πο-
 δαχεικοῖς τε ὁμοίως ἐπιτίθενται,
 πρὸς ὠληγίαν τε σὺν ὀξεί· ἐρσιπέ-
 λατά ἢ καὶ ἐρπητας ἰσχυροῖς μετ' ὀ-
 ξος καὶ αἰσιδέντες ἢ καὶ ἀπλαθέν-
 20 τες σὺν ὑπώπω. καυσέον ὃ αἰλῆς
 εἰς ὀσράκινον ἀργεῖον ἐμέδοντας
 καὶ ἐπιμελῶς πωμάσας, ἵνα μὴ
 ἐξήλθῃ, ἀνδρακίᾳ ἢ ἐγκρύψαν-
 τας ἀχρῖς ἐκ πυρώσεως. πίνες δὲ
 τὲς ὀρυκτοῖς σαιτὶ πεπλάσας
 εἰς ἀνθρακας ὑποτίθεντες, ἑῶσιν ἄ-
 25 χρῖς αὖ τὸ σῆς κατὰ καὶ ἔνεσι δὲ
 καὶ τοὺς κοινὰς δῆας τῶτον ἢ βόπον
 καίην. ἀποκλύσας αὐτοὺς ἀπαξ ὑ-
 δαπ, καὶ εἰ πάς ἐξηρανθῆναι, ἐμέδμε
 εἰς χύβαν, καὶ πωμάσας ὑπὸ καυ-
 κινῶν ἕως ἀμικέτι ἐξήλθῃ.

Περί

aduersus vesp̄arum ictus, & te-
 redines, albidasque capitis pu-
 stulas, thymos & tubercula,
 cum seuo vitulino: furunculos
 cum vua passa, aut fuillo adi-
 pe, aut melle discutit. Testium
 tumores cum origano, & fer-
 mento maturius concoquit.
 Crocodilorum morsibus auxi-
 liatur, tritus, in linteolo & in-
 tinctus aceto, ita vt vinculis lo-
 ca constriuantur. Prodest ad
 bestiarum morsus, sugillationes
 in facie, ex melle. Contra
 haustu opium & fungos, cū a-
 ceto multo bibitur. Luxatis im-
 ponitur cū farina, & melle: am-
 bustis igni cū oleo impositus,
 pustulas erumpere nō patitur.
 Podagricis itidem imponitur,
 & aurium doloribus cum ace-
 to: ignes sacros, & vlcera quæ
 serpunt cum aceto aut hyssopo
 illitus sistit. Vritur fictili, di-
 ligenter opertus ne exiliat, con-
 ditusque prunis, vsquedum ef-
 feruescat. Aliqui fossilem suba-
 cto polline obliniunt, & car-
 bonibus subiiciunt, vsquedum
 eius crusta exuratur. Solet &
 sal communis hoc modo vri:
 Aqua semel abluitur, & sicca-
 tus in ollam coopertam mitti-
 tur, subito igne, moueturque,
 donec iam non exiliat.

Salis

DIOSCORIDIS

Salis spuma.

Cap. CXXVII.

Spuma salis, spumosi maris lanugo siue ramentum est, in exilibus petris inuentum, cui vis eadem quæ sali.

Muria. Cap. CXXVIII.

Muria effectus salis præbet, abstergitq; dysentericis infunditur, etiam si nome intestina corripit: & ischiadicis veteribus. Ad fots, aquæ marinæ vsum præstat.

Flos salis. Cap. CXXIX.

Flos salis flumine Nilo defluit: lacubus tamen quibuscumque innatat. Assumendus qui crocei coloris est, odore ingrato, ceu gari. Interdum longè magis virus olet, gustuque mordaciter, & pinguius lentus. Fucatus autem rubrica, aut scrupulosus, improbat. Præterea syncerus non nisi oleo resoluitur: adulteratus nonnulla ex parte, etiâ aqua diluete factitiū colorē. Ad vlcera quæ cacoëthe vocatur, & phagedenas, genitaliū nomas, & purulētas aureis, effica est: oculorū hebetudines, cicatrices, albuginēsq; tollit. Emplastris vnguentisq; coloris causa, vt rosaceo, miscet: sudorē citi: aliū turbat, in vino aut aqua sūptus: stomachū malè habet. Additur

Περί Ἀγνὸς ἁλός.

Κεφ. ρκζʹ.

Ἀλὸς ἄγνη ἐπιψηγμά ἐστιν ἁλὸς ἀφρώδους, συριστόμερον ἐπὶ τῶν πετειδίων. Διώκεται ὅτι χειτὶν αὐτῶν τοῖς ἁλοῖν.

Περί Ἀλμυρῶν. Κεφ. ρκηʹ.

Ἀλμυρὶ τῶν αὐτῶν τοῖς δὲ σὺν ἔχει ἐνέργειαν, σμηκτικὴν· δυσεντερικοῖς τέ ἐστι τοῖς καὶ νομῶν ἐγκυσμα, καὶ ἰσχυρὰ τοῖς χρονοῖς. Πρὸς τε κατὰ τὴν κλίσιν ἀμύζει τοῖς ὅν θάλαττάν ἐστι χρονοῖς.

Περί Ἀνθὺς ἁλός. Κεφ. ρκθʹ.

Ἀλὸς δὲ αὐτὸς κατὰ ῥεῖ μὲν τῶν νείων πεταμῶν· ἐφίσταται δὲ λίμναις ποταμῶν. παραληπτέον δὲ τὸ χροκίζον τῇ χροῖα ὑποδυσατέον, ὡς ὁ γὰρ ἐστὶν ἐπὶ τοῖς καὶ τῇ δυσωδέσει μᾶλλον καὶ τῇ γούσει δηκτικώτερον καὶ ὑπολίπτεον. τὸ δὲ ἐμμιλτόν ἢ θρόμβοις ἔχον, φαῦλον ἡγήτεον· ἐπὶ τὸ ἀκέραιον ἐλαίῳ σίωαντίεται μόνον· τὸ δεδωμενόν δὲ ἐν μέροις καὶ ὕδατος ποιεῖ δὲ πρὸς τὰ κακοήθη καὶ φαρμακικὰ ἔλκεα, καὶ νομὰς τὰς ἐν αἰδοῖς, καὶ ὅσα ἀπορροῦντα, καὶ ἀμεινωπίας καὶ τὰς οὐλὰς αἶρει καὶ λευκώματα. μύρνεται καὶ ἐμπλάστοις καὶ μύροις εἰς χροῖν ὡς καὶ ῥοδίνῳ· ἐστὶ δὲ καὶ ἰδρώτων κινητικόν· κοιλίας παρακτικόν, σὺν οἶνω καὶ ὕδατι ληφθέν· κακοστόμαχον· μύρνεται.

μίγνυται ἡ ἀκόποις ἡ σμήγμα-
τι πρὸς τειχῶν * λευκισμὸν· καὶ
κατόλου ὅστι δριμύ, πυρωτικὸν
ὥσπερ οἱ ἄλλοι.

Περὶ Νίτρου. Κεφ. ρλ'.

Νίτρον περικριτέον τὸ κοῦφον,
καὶ ῥοδωπὸν ἢ λευκὸν τινὲ ἡρόαν,
κατατετρηνύον, οἷονεῖ σπογγώ-
δες τι, τοιοῦτον δὲ ὅστι τὸ ἐν τῶν
βουβῶν. Διῶαμιν δὲ ἔχει με-
τασυγκριτικῇ.

Περὶ Αφροῦ νίτρου.

Κεφ. ρλβ'.

Αφρὸς ὅστι νίτρον, ἄριστος μὲν εἶναι
δοκεῖ ὁ κορυφαῖος ἡ πλακώδης,
εὐθρυπτός τ' ἡ ἐμπέφυρος ἢ ἀ-
φρώδης, ἐπὶ ὅστι δηκτικός οἷος ὅστιν
15 ὁ ἐν φιλάδελφίᾳ κομιζόμενος τ'
ἐν λυδία. διυλερῆς ὅστι αἰγύπτιος.
γινώσκει δὲ ἡ ἐν μαγνησίᾳ τ' κα-
είας. Διῶαμιν δὲ ἔχει ἡ χαῦ-
στη οὗτος τε καὶ τὸ νίτρον ἄλλοι
ἐμφερῆ. ἐν πελοπόννησος δὲ τὸ νίτρον ἡ
20 σρόφες παύρ λεανθὲν μὲν κυμίνου
ἡ ποδὲν μὲν ὑδρομέλιτος ἢ μετὰ
ἐλῆμαλος ἢ πινός τ' διαφορεῖν δυ-
ναμῶν πνεύματα, οἷον πηγαῖς ἢ
ἀνῆθου. ἔστι δὲ ἡ πελοδικῶν σύγ-
χρησιμα πρὸς τῆς ὑπόπτης πρεσ-
25 βολῆς. μίγνυται καὶ διαφορητι-
κῆς ἡ ἐπισπαστικῆς καὶ λεπτρι-
κῆς ἐμπλάσους ἡ λεπτιντικῆς.
σὺν ὑδατι δὲ θέρμῳ ἢ οἶνῳ ἐγχεό-
μενον ἐμπνευματώσεις τε καὶ ἡ-
χρῶς ὧτων ἰᾶται καὶ πυορροίας.
καταμ-

bet. Additur acopis, & smegma-
tis, quæ albādi capilli gratia cō-
ponūtur: & in vniuersum acris
est, & feruētis naturæ, vt sal.

Nitrum. Cap. CXXX.

Præfertur nitrum leue, roseo
colore, aut cādido, in forami-
na dehiscēs, perinde quasi spō-
giosum quiddam, quale ex Bu-
nis affertur. Humores euocat,
qui in alto concreuerunt.

Spuma nitri.

Cap. CXXXI.

Spuma nitri optima esse puta-
tur, leuissima, glebosa, friabilis,
colore penè purpureo, aut spu-
mosa, & mordēs: qualis ex Phi-
ladelphīa Lydiæ defertur. Se-
cunda est Ægyptia. Quin & in
Magnesia Cariæ gignitur. Vim
& vitionē salis habet, tā nitru,
quām spuma eius. Præterea ni-
tru tormina sedat, si tritum cū
cūmino bibatur, in hydrome-
lite, aut sapa, aut aliquibus quæ
inflationes discutere possunt,
vti ruta, vel anetho. Febribus
circuitu redeuntibus illinitur,
ante suspectam accessionem.
Miscetur emplastris, quæ extra-
hunt, & discutiunt, extenuant,
& lepras abstergunt. Cum a-
qua autē calida aut vino infu-
sum, inflationes, purulētas au-
reis, & sonitus earūdem sanat,
fordes

DIOSCORIDIS

fordes expurgat, cum aceto instillatum. Canum morfibus ex asinino adipe aut fuillo medetur: resinæ terebinthinæ admistum furunculos aperit: aquæ inter cutem cum fico illinitur: oculis ad claritatem visus cum melle succurrit: & venenis fungorú, ex posca potú: aut si buprestis momorderit, ex aqua: iis verò qui taurinum sanguiné biberint, ex laserpitio: iisque qui cibum non sentiunt, vtiliter obducitur: opisthotonisque iam remissioribus, & luxatis, cum cerato: in resolutione linguæ, pani commodè permiscetur. Aliqui supradicta carbonibus vrút, subiecta prius testa noua, donec incandescant.

Fæx. Cap. CXXXII.

ELIGENDA fæx maximè à vino vetere, Italico: fin minus, ab alio confimili. Fæx aceti viribus longè acrior est. Crematur vt alcyonium, antè diligenter ficcata. Sunt qui noua testa igni largo vrát, vsque dum penitus incendatur. Alij viuís carbonibus fæcis glebam obruunt, & idem opus prosequuntur. Experimentum est legitimæ vitiōnis, vt aërio nitore inalbescat. linguámq;

καθαίρει δὲ καὶ ῥῦπον συν ὄξει ἐγχαρόμενον. κυνοδόντικοις τε ἰατρὴ συν σέλι ὀγκείῃ ἢ υἱέῳ ἀνὰ σωματὶ ὃ καὶ δοδιῶας ἀναλκφθέν τερεμινθίνῃ ῥητίνῃ. μὲν σύκων δὲ ὑδρωπικῶν ὅστι κατὰ πλάσμα· συν μέλιτι δὲ ἐγχαρόμενον ὄξυδερκές· καὶ πρὸς μύκητας συν ὄξυκράτῳ ποδὲν ἀρμόζει· πρὸς δὲ βουπρήσεις (ὡς ὑδαπ· πρὸς ταύρην ὃ αἷμα συν σιλήῳ ἀποφθεῖσι τε χηρήσιμον κατὰ πλάσμα· παρακμάζουσι τε ὁ- 10 πιδουτονοικοῖς πάθεισι συν κηρωτῇ, καὶ σρέμμασι· μέγνυται καὶ ἀπὸ ὠφελίμως ἐπὶ τῶν ἡ γλῶτταν παραλελυμένων. ἐγνοιοὶ δὲ καίνοισι τὰ πρὸς εἰρημύα ἐπ' ἀνδράκας πεπυρωμένους ἀπερειαμέ- 15 νοιοι, πρὸς ὑποκειμένου κανοῦ ὁσράκου, ἕως αὖ ἐμπυρωθῇ.

Περὶ Τρυγός. Κεφ. ρλβ'.

Τρύγα δὲ παρὰ κληπτόν μαλιστα μὲν τὴν ἀπὸ οἴνου παλαιῦ ἰταλικοῦ· εἰ δὲ μὴ ἀπὸ ἄλλου ὁ- 20 μοίου. ἢ γὰρ ἀπὸ ὄξους ἐπιτέταται τῇ δυνάμει. κωστέον δὲ ὡς ἀλκυνόνιον πρὸς ἐξηραμένῳ ἐπιμελῶς, πνὲς δὲ ἐπ' ὁσράκων κανῶν δέντες καίνοισι πρὸς δαψιλεί, ἕως αὖ ἐμπυρωθῇ κατὰ 25 βιάδος. ἄλλοι δὲ εἰς ἀνδράκας πεπυρωμένους ἐγκρύψαντες βῶλον, τὸ ὁμοιον ποιοῦσι. σημεῖον δὲ τῆς δέσεως καύσεως ἡγνέον, τὸ λευκὸν ἢ ἀερόχρουν τὸ χρώματος· καὶ τὸ

καὶ τὸ προσεγεχθείσαν τῇ γλώσῃ
 οἷον· φλέγειν αὐτὴν ὡς αὐτὴν
 καὶ ἡ ἀπὸ ὀξέος κείνεται. Διὸ αὖτις
 ὅτι ἔχει καυστικὴν σφόδρα, καὶ σπι-
 κτικὴν, κατουλωτικὴν, συπτικὴν,
 καὶ σπτικὴν ἄγαν καὶ ξηραντικὴν.
 5 χρῆσθαι δὲ τῇ τετραγ. πρὸς σφόδρα
 ἐστὶν, ταχὺ γὰρ διαπνέεται· ὅθεν οὐ-
 δὲ ἀσκήπασον, οὐδὲ χωρεῖς ἄγαν
 αὐτὴν ἀποδετέον. πλωύεται δὲ
 αὐτὴ ὡς πομφόλυξ. ἡ δὲ ἀκαυστος
 10 σέλλει οἰδήματα καὶ καθ' ἑαυτὴν
 καὶ μὲν μυρσίνης· κοιλίαν τε καὶ σ-
 μαχον· ρευματιζόμενον καὶ ταπλα-
 θεῖσα σέλλει· καὶ ῥοῦν μυρσινέον
 κατὰ ἡβῆς καὶ αἰδέας καταπλατ-
 τυνήν, περύνει· καὶ φύγεθλα ἁ-
 15 νέλκωτα διαφορεῖ καὶ φύματα·
 μασοῖς τε σπαραγμάτων· ῥέοντας γὰρ
 λα σθένισι συνὸς ὅξει καταχρί-
 θεῖσα. ἡ δὲ κεκαυμένη λεπερὴς
 ἀφίστησιν ὄνυχας συνὸς ῥητίνῃ· καὶ
 20 μὲν γανίου ἐλαίου συγχριθεῖσα.
 νύκτα ὅλην, ξανθὰς ποιεῖ τὰς τε-
 χας. πλωθεῖσα δὲ μύγνεται εἰς
 τὰ ὀφθαλμικά, ὡς σποδός· σπικ-
 χεῖ τε οὐλὰς καὶ ἀχλὺς τὰς ἐν ὀ-
 φθαλμοῖς ἢ τοιαύτη.

Περὶ Ασθένου. Κεφ. ρλγ'.

25 Ασθενος γίνεται οὕτω· τῶν θα-
 λαπίων κινύκων τὰ ὄσρα καλα-
 βῶν, πνεῖ ἐγκυρῶν, ἢ εἰς κλί-
 βανον διάπυρον καθεῖς ἄφες ἐν-
 νυκτερεῖσαι· τῇ δὲ ἐχομένη ἐάν
 μὴ λευκοτάτῃ γῆνται ἀνελού·
 εἰ δὲ

linguamq; tactu vrere videa-
 tur. Eadem vrendæ facis aceti
 ratio. Vis ei supra modū vrens,
 & abstergens : vlcera ad cica-
 tricem perducit, adstringit, ve-
 hementer exest, siccátque. Sed
 recenti vtendum est, quoniam
 celeriter exanimatur: proinde
 non nisi in reconditorio, &
 vase aliquo reponi debet. La-
 uatur, vt pompholyx. Quæ v-
 sionem experta non est, tu-
 mores & per sese, & cum myr-
 to cohibet: ventris stomachi-
 que fluxiones illita sistit: mu-
 liebre profluuium, imo ven-
 tri aut genitalibus imposita,
 mitigat: panos discutit, non-
 dum exulceratos, & tubercu-
 la: rigentes mammas, suique
 lactis impatientes, cum aceto
 peruncta extinguit. Cremata
 verò, vngues scabros cum re-
 fina aufert: addito lentiscino
 oleo, illita nocte tota, rufat ca-
 pillum. Elota oculorum medi-
 camentis, vt spodos, adijcitur:
 cicatrices eorum & caligines
 eadem abstergit.

Calx viua. Cap. CXXXIII.

Calx viua hoc modo fit: Ma-
 rinorū buccinorum testas igni
 condito, aut feruenti clibano,
 nocte dimittito: postera die, si
 cādidissimæ fuerint, extrahito:

Q fin

DIOSCORIDIS

fin aliter, iterum vrito, vsquedū
vehementer inalbuerint. Dein
vbi in aquam frigidam immer
sæ fuerint, in fictile nouū cōii-
cito, & exactè pannis operiēs,
noctē vnam cōquiescere fini-
to: mane eā extrahēs, vbi per-
fecto omni opere elaborata
fuerit calx, recondito. Fit & è
littoralibus calculis igne cre-
matis, nec non è vili & fufaneo
marmore, quæ cæteris præfer-
tur. Vis omni calci in cōmune
igneæ, mordens, adurēs, & cru-
stas inducens: quibusdam aliis
immista, vt adipi, oleo, conco-
quendi vim assumit, mollit &
dissipat: vlcera ad cicatricem
perducit. Efficacior existima-
tur recens, nec aspersa aquis.

Gypsum. Cap. CXXXIII.

Gypsum vim habet adstrin-
gendi, obstruendi: sanguinis
eruptiones sudoresque cohi-
bet: sed potum, strangulatio-
nis modo iugulat.

Sarmentitius cinis.

Cap. CXXXV.

Sarmentorum cinis vrendi
vim habet: cum axungia au-
tem vel oleo illitus, fractis ner-
uis, articulorum collisionibus,
& neruorum nodis prodest:
cum nitro & aceto, excrescen-
tias carnis in scroto reprimi-
serpen

εί δὲ μὴ, πάλιν καὶ ἄρχῃς αὐτὴν κα-
νὼς λευκανθῆναι. εἴτα ἀποβάλλας
αὐτὰ εἰς ψυχρὸν ὕδωρ, ἔμβαλε
εἰς χύτραν κεκλυῖν, καὶ σκεπά-
σας αὐτὰ ῥάκεσιν ἐπιμελῶς, ἔα-
σον ἐν ταύτῃ νύκτα μίαν. πρῶτον
ἢ ἀνελόμενος ἀπὸ ληψῆς τὸ παρ-
τελὲς τῆς κατεργασίας ἀποτίθε-
σο. σκευάζεται δὲ καὶ ἐν λίθων
κοχλάκων κεκομμένων, καὶ ἐν τῆς
χυδαίας μαρμαρίου, ἢ πῆς καὶ περ-
κείνεται τῶν ἄλλων. Δυνάμει 10
δὲ ἔχει πᾶσα κοινῶς ἀσθεὺς πυ-
ρωπικὴν, θηκπικὴν, χυσιτικὴν, ἐ-
χθροπικὴν· μυχυμὴν δὲ πῶς ἐ-
τέροις ὥς σέασι ἢ ἐλαίῳ, γίνεται
πεπικὴ, μαλακτικὴ, διασκεδα-
στικὴ, κατουλωτικὴ. ἐνεργεσίαν 15
δὲ αὐτῆς ἡγετόν τι καὶ πρὸς φα-
τον καὶ ἄβροχον.

Περὶ Γύψου. Κεφ. ρλδ'.

Γύψος δυνάμει ἔχει συπι-
κὴν, ἐμπλαστικὴν· αἰμορραγί-
ας τὲ καὶ ἰδρώτων ἐφεκτικὴν. 20
ποδείσα δὲ πνίγει τῷ κατὰ πνιγ-
μὸν τρόπῳ.

Περὶ Τέφρας κληματίνης.

Κεφ. ρλέ.

Τέφρα κληματίνη δύναμει ἔχει 25
χυσιτικὴν· σὺν ὀξυγνήῳ ἢ ἢ ἐλαίῳ
καταπλαθεῖσα, θλάσματα νεύ-
ρων καὶ ἄρθρων λυγίσματα καὶ συσ-
φας νεύρων ὠφελεῖ· σὺν νίτρω δὲ
καὶ ὄξει σαρκώσεις ὀχέου σέλλει.
κατα...

κατὰ πλάθειναι δὲ συν ὄξει, ἐρ-
πετόδνηκτα καὶ κυνόδνηκτα ἰᾶται·
ἐξαρωπικαῖς τε μίγνυσι. καὶ γίνε-
ται ἢ ἐξ αὐτῆς κοιλία πρὸς πλώ-
ματα, καὶ μύκητας συν ὄξει καὶ
5 αἰσὶ καὶ μέντι.

Περὶ Ἀλκυονίου. Κεφ. ρλς'.

Τοῦ δὲ Ἀλκυονίου πέντε γνω-
στοί εἰσι παρὰ ῥχει· τὸ μὲν γὰρ πυ-
κνόν ἐστι καὶ σφυρὸν, καὶ τῷ ἰδεῖν
απογῶδες, ἐπὶ δὲ βρωμώδες * καὶ
10 βαρὺ, καὶ ἰχθύος ὄζον, ὃ δὴ πλείστον
ἐπὶ τῶν ἰσθίων εὐρίσκεται. τὸ δὲ
ἐξῆς κατὰ μὲν τὸ χῆμα πτερυγίῳ
ὀφθαλμικῷ ἢ ἀπόγῳ ἔοικε κοῦ-
φόν τε ἐστὶ καὶ πολύκενον, καὶ φυκώδη
ἀποφορεὰν ἔχον. τὸ δὲ τρίτον σκω-
15 ληκοειδὲς παρὰ ῥχει τῷ τύπῳ, καὶ
τῇ χροῇ πορφυρώτερον, ὃ πινες μι-
λήστον καλοῦσι. τὸ τέταρτον δὲ ἐ-
ρείοις οἰσυπυρῶϊς ὁμοίον, πολύκε-
νον, κοῦφον. τὸ δὲ πέμπτον ἔοι-
κε μὲν κατὰ χῆμα μύκητι ἀνοσ-
20 μόν τε ἐστὶ καὶ τραχὺ, ἐνδοθεν μὲν
κισήρει κατὰ πᾶν εἰκότος, ἐξωθεν
δὲ λεῖον, δριμύ, ὃ πλείστον ἐν τῇ
πυρρονίᾳ κατὰ τὸν καλουμέν-
ῳ βέσβικον νῆσον θηγᾶται, ὃ ἐ-
πιχωρείως αἰλὸς ἀγλῶ καλοῦσι·
25 τοῦτων τὸ μὲν πρῶτον καὶ τὸ δεύ-
τερον, εἰς σμήγματα παραλαμ-
βάνει γυναικῶν, καὶ πρὸς φακὰς,
λειχῆνας τε καὶ λέπρας ἀλφοῖς τε
καὶ μελανίας καὶ στίλοις τὰς ἐπὶ
πρὸς πᾶν καὶ τῷ λοιποῦ σώματος.

τὸ

serpentiū canūmq; morfibus il-
litus ex aceto medetur: crustas
obducētibus medicamētis ad-
miscetur. Fit ex eo lixiuiū cōtra
precipitationes, & fungorū ve-
nena, cū aceto sale & melle.

Alcyoniū. Cap. CXXXVI.

Alcyonij quinque esse ge-
nera compertum est: vnum
enim spissum, acerbī saporis,
spongiosa facie, item tetri o-
doris, ponderosum, & piscem
olens, quod plurimum in lit-
toribus inuenitur. Alterū pin-
nulæ oculorum aut spongiæ
simile, fistulosum, & leue, o-
dorem algæ referens. Tertium
vermiculi forma, & colore
magis purpureum, quod Mi-
lesium quidam vocant. Quar-
tum succidis velleribus non
dissimile, multis inanitatibus,
hians, leue. Quintum figura
fungi, sine odore, asperum,
parte interna quodam mo-
do pumicosum, foris læue, a-
cre, quod plurimum in Pro-
pontide iuxta insulam Besbi-
con appellatum gignitur, pa-
trio nomine halos achnen vo-
cant. Duo priora in foemina-
rū smegmata assumuntur con-
tra lentigines, lichenas, lepras,
vitiligines, nigritias, & maculas
in facie reliquoque corpore.

Q ij Tertiū

DIOSCORIDIS

Tertium iis qui difficili vrina vexantur, aut arenulas in vesica colligunt, idoneum est: item renibus affectis, aquæ inter cutem, lieni. Vstum autem, & ex vino illitum, alopecias replet. Postremum dealbandis dentibus aptum est: in alia smegmata, psilothráque assumitur, cum sale mistum. Si quisquá alcyonium cremare velit, cum sale in crudú fictile mittat, & obliniēs vasis spiraculum luto, ita fornaci mandet, & cum figlinum percoctum fuerit, extrahens ad vsus recondat. Lauatur vt cadmia.

Adarces. Cap. CXXXVII.

Fit in Cappadocia quod adarces appellatur: est autem tanquam concreta falsilago, humidis & palustribus locis siccitate emergens, & arundinibus ac herbis agglutinata, colore flori lapidis Afij similis, & omni forma molli alcyonio, & aliquantum cauo proxima, vt videri possit lacustre alcyonium. Ad euellendas lepras, lentigines, lichenas, & vitia cutis in facie, & similia, accommodatur: & in summa, vis ei acris. Humorem euocat qui in alto concreuit, & ischia-
dicis prodest.

τὸ δὲ τέτον ἐνδετέϊ πρὸς δυσουρῶντας καὶ ἀμμιώδῃ συλλέγοντας ἐν τῇ κύττει· καὶ πρὸς νεφρικοὺς, πρὸς ὑδρωπά, σπληνὰ καὶ ἐν καὶ καταπλασθέν σινὺ οἴνω, ἀλωπεκίας διασώζει. τὸ δὲ ὕστατον ὁδόντας λευκαίνειν διατάσσεται. παραλαμβάνεται δὲ καὶ πρὸς ἄλλα σμήγματα καὶ ψιλοθρά μιγνύμενον σινὺ ἁλσι. χαῖσαι δὲ πούτων βουλόμενος, μεθ' ἁλῶν εἰς ὠμὸν χύψαν ἐμβαλεῖ, καὶ πε-
10 ριαλείψας τὸ σῶμα αὐτῆς πηλῶ, δὸς εἰς κήμονον, ὅταν δὲ ὀπίσθῃ ὁ κέρμας αὐτῆς, ἀνελόμενος ἀπὸ τοῦ καὶ χεῖρ. πλυνέται δὲ ὡς ἡ καδμεία.

Περὶ Ἀδάρκου. Κεφ. ρλζ'. 15

Ὁ δὲ πρὸς σαρορευόμενος ἀδάρκης, γίνεται μὲν ἐν γαλαπία· ἐστὶ δὲ, ὡς περ ἐπίπαρος ὑφαλμυρίζων, καὶ ὑγρῶν καὶ τελεματωδῶν τέπων ἐν ξηρασίᾳ ἐπιγινόμενος, καὶ περὶ πηγνύμενος καλάρμοις καὶ χορταείοις, ἔοικε δὲ τινὶ χεῖραν αὐτῇ ἀσίας λί-
20 δου, τῷ δὲ ὅλῳ τύπῳ ἀλκυωνίῳ τῷ μαλακῷ, καὶ πολυκήρῳ, καὶ ἔστιν οἰογεῖ μινγαῖον ἀλκυόνιον. ἐνδετέϊ δὲ πρὸς ἐκδροθὲν λεπρωθὲν καὶ ἐφελίδων καὶ λειχῶν, καὶ φακῶν, καὶ τῶν ὁμοίων καδμάς δὲ ὅτι δριμύ. καὶ μετα-
30 συγκριτικόν, ὠφελεῖ καὶ ἰσχυρὸν.

Spongia.

Περὶ

Περὶ Σπόγγων. Κεφ. ρλθ.

Τῶν ὅτι ἀπορῶν τὸν μὲν ἄρρενας
ἐκάλεισαν τις λεπιοτρήτους καὶ
πυκροὺς ὄντας· ὧν τὸν σκληρωτέ-
ρος τράχους ὠνόμασαν. τὸν δὲ,
5 θήλεις οἱ ὡς ἀντίως τοῖς περσειη-
μυχοῖς διάκειν. χαῦσιν ὅτι ἔχουσι
τὴν αὐτὴν ἀγκυρῶν. ὁ κενὸς δὲ καὶ
ἀγυρῶν, τραυματικός τέ ἐστι καὶ οἱ
δήματα σέλλει· καὶ τὰ νεότρωτα
κολλᾷ σὺν ὕδατι ἢ ὀξυκράτῳ·
10 σὺν μέλιτι δὲ ἐφθῶ παλαιοὺς κόλ-
ποις παρκολλᾷ. ὁ δὲ παλαιὸς ἁ-
ρξος. διασέλλοισι δὲ καὶ μεμυ-
κότα ἔλκει, καὶ τύλοις ἀποδεσμού-
μυχοὶ λίνῳ καὶ αὐτοὶ ξηροὶ παρενπι-
δέμυχοι ὡς περ μότα, τὰ δὲ ρευμα-
15 τικά ὑπόνομα καὶ χροῖα ἔλκει,
ἐξικμάζουσιν ἐπιδέμυχοι αἰνικοί
νεοὶ καὶ κENOΙ· ἐπέχουσι δὲ καὶ αἰμορ-
ραγίαν. σὺν ὀξεί δὲ κεκαυμένοι,
πρὸς ξηροφθαλμίας, καὶ ὅπου δεῖ
σμηδαίνεσθαι, ἢ σὺν λαμβανόντων ὅτι ποιε-
20 σι πλυθέντες εἰς τὰ ὀφθαλμικά.
σὺν δὲ πύσιν καίνεσθαι πρὸς αἰμορ-
ραγίαν ἀρμόζουσι. λευκαίνονται δὲ
αὐτοὶ οἱ ἀπαλώτατοι ἐν τοῖς* χαμ-
μασι, βρεχόμενοι τῇ ἐπὶ τῷ περὶ τῶν
συνισταμένων ἄλλος ἄλλῃ, καὶ ἡλια-
25 ζόμενοι, ἐπιβλεπέτω ὅτι τὸ μὲν κοῖ-
λον αὐτῶν αἶμα, καὶ τὸ δὲ ἢ ἀπο-
τομῇ. εἰ δὲ εἴη αἰθρία θερία καὶ
ὑπὸ τῷ σελήνῳ πίνονται βρεχό-
μενοι ἄλλος ἄλλῃ θαλάσῃ, γίνον-
ται δὲ λευκώτατοι οἱ τοιοῦτοι.

Περὶ Κο-

Spongiæ. Cap. CXXXVIII.

E spongiis alias mares appet-
lauere, tenui fistula, spissas: qua-
rū duriores tragos nominarūt,
Fœminas autē, quæ contrarias
dotes habēt. Vruntur eæ vt al-
cyoniū. Recentes sine pingue-
tudine, vulnerariæ sunt, & tu-
mores reprimunt: recētia vul-
nera ex aqua poscāve cōgluti-
nant: veteres sinus ex decocto
melle iungūt. Vetustæ autē in-
utiles. Aridæ ligatæ lino, si pe-
nicilli modo adigātur, occlusa
vlcera, callósq; laxant, siccæ re-
centes & vacuæ senilia vlcera,
& quæ fluxione laborant, aut
cuniculatim excedūt, impositu
siccant: sanguinis profluuiū si-
stūt. Crematarū cinis ex aceto,
aridæ lippitudini auxiliatur: &
vbi qd abstergere, aut adstrin-
gere op^o est. Vtilius, in oculorū
medicamētis lauare cinerem.
Omniū cinis cū pice cremata-
rū, profluētē sanguinē sistit.
Cādide cura fiūt, è mollissimis
recētes, per est^o tinctæ falis spu-
ma, quæ petris cohæret: insolā-
tur inuersæ, hoc est, parte caua
fursum spectāte, & qua abscis-
sæ fuerūt, deorsum. Si verò æsti-
ua serenitate ad lunā sternantē,
perfusæ falis spuma, aut maris
aqua, maximū cādorē referēt.

Q iij Coral-

DIOSCORIDIS

Coralliū. Cap. CXXXIX.

Coralliū, quod aliqui lithodendron appellarunt, marinū esse fruticem constat, qui alto extractus, duratur statim atq; emergit, tanquam offuso aëre protinus cōcrescat. Plurimum inuenitur ad Syracusas, in promontorio cui Pachyno nomē est. Laudatissimum, rubens, colore antherici aut sandycis saturatæ, nec secus terenti facile cedens, æquabili vsquequaque concremento, rursus algæ aut fuci marini odore, quā ramosissimū, forma fruticis, cinnamomi æmulum. Quod autē in lapidis duritiā coit, scrupulosum, inane, & lacunosum, vitiosum existimatur. Adstringit, & refrigerat mediocriter: ex crescentia coërcet: oculorū cicatrices abstergit: vlcerū caua, & cicatrices explet: contra sanguinis reiectiones magnopere efficax est, urinæ difficultati auxiliatur. Quin & potum ex aqua lienem absumit.

Antipathes. Cap. CXL.

Quod antipathes vocāt, corallium esse arbitrantur, specie tantum distans. Est autem colore nigro, arboris figura, ramosum magis. Vires supradicti habet.

Phry-

Περὶ Κοράλλιου. Κεφ. ρλθ'.

Τὸ ὅ κοράλλιον ὁ ὧς ἐνιοι λιθόδενδρον ἐκάλεσαν, δοκεῖ μὲν εἶναι φυτὸν ἐνθάλειον, σερρόποτι εἶναι δὲ ὁπταρ ἐκ τῆς βυθῆς ἤκυδι, ἐξ ἧς γινώσκον, καὶ βαπτίζοντες ἡτοὶ πηλύνον ὡς ὅτε ὑπὸ τῆς πίεσεως ἐκέρχεται ἡμῖν αἶρος ἐνέρισκε. ὃ πλείστον ἐν τῷ καὶ συρακίαις ἀκρωτηρίῳ τῷ καλεσμένῳ παχύνῳ. ἄριστον δὲ ὅτε τὸ πυρρὸν τῇ χροῇ καὶ ἐμφερές ἀνθρηκῶ χρώματι, ἢ σάδου κα- 10 τακορεῖ, ἐντελεῖς τε ὡς αὐτὸς, καὶ ὁμαλὸν δι' ὅλης τῆς συγκρίσεως, ἔπ δὲ ἐσμὴν βρυόη καὶ φυκίαις ἐμφερῆ ἔχον. πρὸς δὲ τέττοις πολύροζον καὶ κινναμωμίζον τῷ τύπῳ τῆς θαμνίσκων. τὸ δὲ λιθώδες τῇ συκρίσει καὶ τῇ χροῇ φαρὸν, σπρηγνόμενον τε καὶ χαλνόν, φαν- 20 λον οἰντέον εἶναι. εὐφρὶ τῇ δυνάμει καὶ ἰσχύϊ ἐπιφθῶς. κατὰ σέλλαι δὲ τὰ ὑπὸ φέροντα καὶ ἐλαῖς σιμῆλαι ἐν ὀφθαλμοῖς πληροῖ ὃ καὶ κο- 20 λώματα καὶ ἐλαῖς πρὸς τὰ αἵματος ἀναγωγὰς ἰκανῶς ἐνδρῆ, καὶ δυσουρυσίαν ἀρμόζει. καὶ σπληνῶα τῆκεσι σὺν ὕδατι πινόμενον.

Περὶ Αντιπαδοῦς. Κεφ. ρμ'.

Καὶ τὸ καλεσμένον δὲ ἀντιπα- 25 θῆς, κορδῆιον οἰντέον ὑπάρχειν, εἰδικὸν ἔχον διαφορὰν. ἔστι δὲ τῇ μὲν χροῇ μέλαν, δένδριζον ὃ καὶ αὐτὸ καὶ ὁζώδες μάλλον. Δυνάμει δὲ ἔχει πρὸς αὐτὴν τῷ πρὸς φρυγνόμενον.

Πρὶ φρυ-

Περὶ Φρυγίᾳ λίθου. Κεφ. ρμᾴ.

Λίδος φρύγιος, ἧ οἱ βαφεῖς ἐν
φρυγία χρών, ὅθεν καὶ ὠνόμασαι,
γίνεσθαι ἐν καππαδοκίᾳ. ἀριστος
δὲ ὅστις ὁ ὠχρὸς καὶ μέγας βαφεὺς,
5 οὐκ εὖ τὸνος τῇ συγκρίσει τῆ σώ-
ματος, ἔχων δὲ διαφύσεις λευκὰς
ὡς καὶ μέγας. καίεται δὲ ὁ λίδος
οὐ τῷ βρέξει, ἀλλ' αὐτὸν χαλκῷ οἶ-
νω, διαπύροις ἐγκυρῶν ἀνδρα-
ξι, καὶ ρίπτει συνεχρῶς, ἐὰν δὲ με-
ταβάλλῃ πλὴν χροῶν κηρότερος
10 γλυκύμενος, ἐξελθὼν αὐτὸν τῷ αὐτῷ
* σέβει οἶνω. καὶ πάλιν εἰς τὸν
ἀνδραχρῶς ἀποδέμενος τὰ αὐτὰ
ποίει. καίε δὲ αὐτὸν ἐν τείτου,
προσέχων μὴ θρυεῖν καὶ ἀπασθο-
15 λωθῆναι. Διώαμιν δὲ ἔχει ὁμός τ'
καὶ κακωμῶρος συπληκὴν ἐνεργῶς,
ἐπὶ δὲ ἀνακαθαρτικὴν καὶ ἐξαρω-
πικὴν ποσῶς, κατὰ πλασματῶν τῶν
ἰατρικῶν συνὲ κηρωτῇ. σλυέεται
δὲ ὡς ἡ καδμεία.

20 Περὶ Ἀσίᾳ λίδου. Κεφ. ρμῖ.

Ἀσιον δὲ λίδον παρακληπτόν τὸν
κωσσηρώδη πλὴν χροῶν, χαυρόν τε
καὶ κωφόν, ἐπὶ δὲ εὐθρυεῖν, καὶ διαφύ-
σεις μικτὰς ἔχοντα διὰ βλάβος.
τὸ δὲ ἀνδρῶν αὐτῶν ὅστις ἡ ἐπιζάνυ-
25 σα ἐπίξαντος ἀμυρεῖς τῇ ἐπιφα-
νείᾳ τῶν λίδων, τῇ μὲν συστάσει λε-
πτή, τῇ δὲ χροῇ τὸ μὲν τοι λευκόν
ἔσθαι, τὸ δὲ περὶ εἰκοσιεὶς, ἐπὶ τὸ
μύλινον τετραμμένον προσαρμόμε-
νόν τε τῇ γλώττῃ δάμνει ποσῶς.

Διώα-

Phrygius lapis. Cap. CXLI.

Phrygius lapis, quo infecto-
res in Phrygia vtuntur, à qua
nomé accepit, nascitur in Cap-
padocia. Optimus habetur pal-
lidus, modicè grauis, non soli-
da corporis compage, interce-
dentibus albis segmentis, vt in
cadmia. Vritur autem vino o-
ptimo perfusus, viuifque car-
bonibus obrutus, perflatur as-
fiduè follibus, donec mutato
colore rufescat: rursus extra-
ctus eodem vino restinguitur.
Hoc iterum & trinis vicibus fa-
ciendum: attendendum tamé,
ne minutim cōfringatur, & in
fuliginem euanescat. Vis cru-
do vltóque adstrictoria, ex-
purgans: vlceribus crustas qua-
damtenus inducit, ambustis
cum cerato medetur. Lauatur
vt cadmia.

Asius lapis. Cap. CXLII.

Asius lapis affumi debet pu-
micis colore, leuis, fungosus,
item friabilis, scissiles venas lu-
tei coloris ad imum actas ha-
bens. Eius flos, falsugo subfla-
ua est, summo lapide insidens,
compage tenui, colore in ali-
quibus albo, in aliis pumici si-
mili, ad luteū vergente: admo-
tus linguæ aliquatū mordet.

Q iii) Vim

DIOSCORIDIS

Vim habet vterque adstrictoriam, & modicè erodentem: admistus liquidæ pici, aut terbinthinæ, tubercula discutit. Longe validior flos existimatur. De cetero ficcatus flos, vetera vlcera & cicatrici repugnantia fanat: excrescentia cohibet, tetrâque vlcera & fungis similia, cum melle expurgat: vlcerum caua explet, & expurgat cum melle: depascentiaque cum cerato fistit. Fit cataplasma ex eo podagris, misto fabæ lomêto: & lienosis, ex aceto & viua calce. Prodest flos ex melle phthificis linctu. Podagrici iuuantur, pedibus in folio ex eo lapide excauato inditis. Fiunt quoque pulueres, qui corpora erodunt, & luxuriantem carnem, & corporum crassitiem absumunt, cum vice nitri in balneo sparguntur. Si laua-
re libet, cadmiæ modo lauatur.

Pyrites. Cap. CXLIII.
PYRITES lapidis genus est, à quo æs conflatur. Eligi debet æris similitudinè, facile scintillas ædens. Vritur sic: Melle irrigatus molli pruna continuò flatur follibus, donec

Διούαμιν δὲ ἔχει ἐκάτερον συ-
πλικὴν, σιπλικὴν ἡσυχῇ, καὶ διαφο-
ρητικῶς φυμάτων τερεβινθίνῃ ἀ-
γαλαμβανόμῃον ῥητίνῃ ἢ ὑγρᾷ
πίσσει. Ὑπονωτέρον δὲ τὸ αἰθρὸς
ἡγνέον. ἐν φειοσπύ δὲ τὸτο ξη-
ραίνόμενον, τὰ παλαιὰ καὶ δυσκα-
τούλωτα ἔλκεα ἰᾶται· κατὰ σέλην
δὲ τὰ ὑπερσαρκοῦντα καὶ ἀνακα-
θαίρει πύλιν, τὰ μύκησιν ὁ-
μοία καὶ θηριώδη· πληροὶ δὲ καὶ
τὰ κοῖλα τῶν ἐλκῶν καὶ ἀνακαθαί-
ρει (ὡς) μέλιτι· καὶ τὰ νεμόμενα ὅ-
τις ἴσῃσι μυχῷ κηρωτῇ, καὶ ποδαγρι-
κοῖς ἐν καταπλάσμασι μὲν ἐρέγ-
μον· καὶ σπληνικοῖς μετ' ὄξους καὶ
ἀσβέσου. ἐκλειχόμενον τε τὸ αἰ-
θρὸς μετὰ μέλιτος φθιστικοῖς ὡφε-
λεῖ· κατὰ σκευάζονται ὅ καὶ πύε-
λοι ἐν τοῦ λίθου, εἰς αἷς οἱ ποδα-
γρικοὶ τοῦ πόδους ἐνπιδέντες ὡ-
φελουῦνται· καὶ σθερὴ σαρκοφάγοι
γίνονται. ἰσχυραίνεσθαι τὰ πολὺ σαρ-
κα καὶ παχέα σώματα, κατὰ
πλασόμενοι ἀντὶ νήψεως ἐν βα-
λανείῳ· ἐὰν δὲ τις πλυνῶν θέλῃ
τὰ περιγεγραμμένα, πλυνέτω ὡς
πύλιν καδμείαν.

Περί Πυρίτεος λίθου. Κεφ. ρμγ'.
Πυρίτης εἶδος ὅστις λίθου, ἀφ' οὗ
χαλκὸς μεταλλεῖται· ἀπὸ τῶν
μυχῶν τοῦ χαλκοειδῆ, ὑγρῶς ὅ-
τις σπινθήρας ἀφίεντα· καυσέον ὅτις
πῶ τοῖς τοῖς, μέλιτι δούσας αὐτὸν,
ἐνδεδεῖς εἰς ἀνδρακίαν μαλακίαν,
καὶ ῥί-

καὶ ῥίπιζε συνεχῶς, ὥς ἂν τίνω
 χροῖαν κίρρος γήνηται. ἔνιοι δὲ εἰς
 πολλὰς καὶ πεπυρωμένους αἰθρα-
 ρας ἀποτίθεν· ἱκανῶς βεβρεῖμέ-
 νον τῷ μέλιτι τὸν λίθον. ὅταν δὲ
 5 μέλλῃ βέβρωται ἐπὶ τὸ κίρρον ἀ-
 ναεσθῇ· καὶ ἀποθυσήσαντες τὸ
 σποδὸν, πάλιν κλίβωσι διάβροχον,
 ἕως ἂν ψαθυρώτερος γήνη· ὁμα-
 λῶς· πολλὰκις γὰρ μόνον ἐπιχει-
 εται τίνω ἐπιφάνειαν. ἔτω δὲ ἀπο-
 10 καύσαντες καὶ ξηράναντες ἀποτί-
 θενται. ἐὰν δὲ πεπλυμένον χεῖρα
 ὑπάρχη, πλυτέον ὥς καθάρειαν.
 Διώαμιν δὲ ἔχει κεκαυμένους καὶ
 ὁμῶς θερμαντικὴν, σμηκτικὴν,
 ἀποκαθαρικὴν τῶν ἐπισκοιέν-
 15 τῶν ταῦς ὄψεσι, διαφορικὴν τε
 καὶ πεπικνὴν σκληρωμάτων. ἀνα-
 ληφθεὶς δὲ ῥητίνη κατασέληται
 ὑπὸ σαρκώδη μετὰ ποσὶς θερ-
 μασίας καὶ σύψιδος. χαλοῦσι δὲ
 ἔνιοι τὸν ἔτω κέντα διφρυγές.

20 Πρὶ Αἱματίτις λίθου.

Κεφ. ρμδ'.

Αἱματίτις ἡ λίθος ἄειστός· ὅστις
 ὁ ἐνδρυθὲς μὲν καὶ κατακορὴς, ἦ-
 τοι μέλας, ἐν αὐτῷ δὲ σκληρὸς,
 καὶ ὁμαλὸς, ἀνεπίμικτος ῥυπα-
 25 ρείας πνός ἢ διαζωμάτων. Δύ-
 ναμιν δὲ ἔχει συμπικνὴν, θερμαν-
 τικὴν ποσῶς, καὶ λεπτιωτικὴν καὶ
 σμηκτικὴν ἔλων τῶν ἐν ὀφθαλ-
 μοῖς καὶ τραχωμάτων συνὲ μέ-
 λιτι· συνὲ δὲ γάλακτι γυναικείῳ
 πρὸς

donec rufescat. Alij in multos
 carbones igni candentes, la-
 pidem copioso melle perfu-
 sum deiiciūt, & vbi ad fuluum
 colorem vergere coeperit, ex-
 trahunt: efflatoque cinere, rur-
 sus madefactum cremant, do-
 nec æqualiter assicatus, friabi-
 lis reddatur: siquidem sæpe fa-
 cies summa solum vritur. Ita
 crematus, siccatusque, recon-
 ditur. Si eloto opus sit, lauari
 debet vt cadmia. Tam crudi
 quàm vsti vis est, excalfacere,
 abstergere, offusam oculis ca-
 liginem expurgare, duritias co-
 coquere, & concoctas discute-
 5 re. Resina exceptus excre-
 scentia in carne cohibet,
 sed calorem quẽdam &
 adstrictionẽ parit. Ita
 vstum nonnulli di-
 phryges appellāt.

Hæmatites. Cap. CXLIII.

Hæmatites optimus habe-
 tur friabilis, saturato colore
 niger, durus & suo pte ingenio
 æqualis, nulla forde admista,
 nulloque zonarum discursu.
 Vim habet adstringentẽ, & ex-
 calfactoriam aliquatũ exte-
 nuantẽque: oculorũ cicatri-
 ces, & scabritiã cum melle pur-
 gat, cum lacte autẽ muliebri,
 lippitudini,

DIOSCORIDIS

lippitudini, fractis, & oculis
 cruore suffusis conuenit: bibi-
 tur cōtra difficultatem vrinæ,
 & fluxiones mulierum in vi-
 no: & ab iis qui sanguinem
 reiecerunt, cum succo punici
 mali. Fiunt ex eo corticæ &
 collyria oculorum vitiis apta.
 Vritur vt Phrygius, sine vino
 duntaxat. Modus vſtionis eſt,
 vt modicè leuis fiat, & bullis
 quibusdam intumefcat. Sūt qui
 hæmatiten ita adulterāt. Den-
 ſam glebam rotundāmq; ſchi-
 ſti lapidis, cuiusmodi ſunt quæ
 eius radices vocantur, in vr-
 ceum figlini operis, qui feruē-
 tem cinerem contineat, con-
 dunt, paucāque interiecta mo-
 ta eximunt, experiuntūrque ſi
 trita ad cotem hæmatitæ co-
 lorem reddat: quòd ſi ita res
 ſe habet, reponunt: ſin minus,
 iterum obruunt, & ſubinde cō-
 ſpicientes, periculum faciunt:
 ſiquidem in cinere diu dimiſ-
 ſus, colore mutato diffundi-
 tur. Coarguitur malè confi-
 ctus, primum ſciſſilibus venis:
 quippe in rectos venarum diſ-
 curſus refringitur. At hæmati-
 tes. lōge ſecus ſe in colore ha-
 bet: nanque hic floridum red-
 dit: hæmatites verò ſaturatio-
 rem, atq; cinnabarin imitantē.

Inuenitur

πρὸς ὀφθαλμίας καὶ ῥίξεις, καὶ ὑ-
 φαίμοις ὀφθαλμούς. πίνεται δὲ
 συν ὀίνῳ πρὸς δυσουρίαν καὶ
 ῥοιχάς, καὶ πρὸς αἵματος πύσεις
 συν χυλῶ ῥοιᾶς. γίνεται δὲ καὶ
 κολλύρια ἐξ αὐτῆς καὶ ἀκόνια πρὸς 5
 τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς πάθη ἐπιτή-
 δεα. καίεται δ' ἐμφερῶς τῷ φρυ-
 γίῳ λίθῳ τῷ οἴνου θεωρηκτέῳ.
 μέτρον δὲ ἔστω τῆς καύσεως τὸ
 γινέσθαι αὐτὸν μέσως κεῖνον καὶ
 πεπομφολυγμύρον. δοκῶσι δὲ 10
 πινεσ θ' θεωρηκτέον ἔτι ἁλόν
 τις βῶλον χροῦ λίθου πυκνὸν τε
 καὶ στρογγύλον, τοιαῦται δὲ εἰ-
 σιν αἱ λεγόμεναι ῥίξαι αὐτῆς, εἰς
 κερκμίαν γάσραν ἔχουσιν θερ-
 μοποδὶαν θερμὴν ἐγκρύπτου- 15
 σιν, εἴτα διαλιπόντες, μικρὸν ἀ-
 ναιρουῦνται, καὶ ἐπ' ἀκόνις τεί-
 λοισι δοκιμάζοντες, εἰ τιμὴ τῆς
 αἱματίτου χροῦ ἀπείληφε καὶ
 μὴ οὕτως ἔχει, ἀποτίθενται. εἰ
 δὲ μὴ, πάλιν ἐγκρύπτοις, συν- 20
 χῶς ἐσθρῶντες καὶ δοκιμάζον-
 τες. ἀφελθεὶς γὰρ ἐπιπολὺ ἐν τῇ
 σποδῇ. μεταβάλλῃ τῷ χρώμα-
 τι, ἔπειτα διαχεῖται. ἀπελέγ-
 χεται δὲ ὁ κακοτεχνημένος πρὸς
 τὸν μὴ ταῖς διαφύσεσι ὁ μὴ γὰρ 25
 εἰς κτήδυνας ἐπ' ἐνδείας ἀπο-
 κλάται. ὃ δ' αἱματίτης ἔχει ἔτι
 ἔχει ἐν τῇ χροῖ. ὁ μὴ γὰρ ἐναν-
 θὴ ἀνίστην. ὃ δὲ αἱματίτης βαθυ-
 τέραν καὶ τῷ κινναβαρί ἐοικῶσαν
 εὐείσκει

οδεύσκειται δὲ καὶ ἐν τῇ σινωπι-
κῇ μάλτῳ, καὶ ἐν τῆς μαγνήτιδος
πέρας χαμομένης ἐφ' ἰκμαδὸν, καὶ τα-
σσεύζεσσι αἵματίτης. ὁ δὲ αὐτο-
φύης ἐν αἰγύπτῳ μεταλλεύει.

5 Πρὶ Σχιστολίθου. Κεφ. ρμ'.
Σχιστός δὲ λίθος Ἰβηρῶν μὲν

ἐν τῇ κτ' ἐσπέραν ἰβηρίαν ἀφίστος
δὲ εἶναι δοκεῖ ὁ παρακροκίζων
τῇ χροῶς ἐν θρυβῆς τ' καὶ εὐχριστός
ὡς ἐν αὐτῷ. ἔοικε δὲ τ' σιμυδέ-

10 σεως ἔνεκεν καὶ τ' ἀλληλεχρίας τ'
κτιδόντων αὐτῶ ἀμμονιακῶ ἀλί.
Διῶαμιν δὲ τ' αὐτ' τῷ αἵματί-
τῃ εἰσφέρει, τῇ ἐντονίᾳ μόνον λή-
ποιώρος αὐτῶ. πληρεῖς δὲ καὶ κοιλώ-
ματα γυναικείῳ διεδεῖς γάλα-

15 κτι, καὶ πρὸς ῥήξιν καὶ πρὸς πώσιν,
ἐπὶ δὲ παχύτητας βλεφαρῶν καὶ
σαφυλώματα λίαν ἐνεργεῖ.

Πρὶ Γαγάτης λίθου. Κεφ. ρμς'.

Τοῦ δὲ γαγάτου θεωριτέον
τὴν ταχέως ἐξαπτόμενον, καὶ ἀ-
20 σφαλτίζοντα τῇ ὀσμῇ. μέλας
δὲ κοινῶς ὑσάρχει καὶ αὐχμη-
ρὸς, ἐπὶ δὲ πλακώδης καὶ κοῦ-
φος ἄγαν. Διῶαμιν δὲ ἔχει μα-
λακτικῶ καὶ διαφορικτικῶ. ἔστι δὲ
καὶ ἐπιληπτικῶν ἐλεγχορ ὑποδου-

25 μιαιδεῖς, καὶ ὑπερικτὸς ἀνακαλεῖ-
ται. δῶκε δὲ καὶ ἐρπετὰ θυμια-
δεῖς καὶ ποδαγρικῶς καὶ ἀκόποις
μύγρῳ διῶαμιν. Ἰβηρῶν δὲ ἐν
κυλικίᾳ κατὰ πύνα ποταμοῦ εἰς
εἰσιν εἰς θάλασσαν ἐκ χειμῶνος,
ἔσ

Inuenitur in Sinopica rubri-
ca. Fit & è magnete lapide, ve-
hementer ambusto. In Aegy-
pto sponte naturæ cum me-
tallis enascitur.

Schistus lapis. Cap. CXLV.

Schistus lapis in Iberia Hi-
spaniæ gignitur. Probatum ma-
ximè qui croci colorem emu-
latur, friabilis, suapte natura
fissilis, concremento & alter-
no cohæretium venarum dis-
cursu pectinum modo, ammo-
niaco sali similis. Vim exhibet
hæmatitæ, sed ad omnia infir-
miorem. Quin & caua replet
muliebri lacte perfusus: ad p-
cidentia, rupta, item genarum
crassitiem, & vuas oculorum,
magnopere efficax est.

Gagates. Cap. CXLVI.

IN Gagatarum lapidum
genere, præferendus qui ce-
leriter accenditur, & odorem
bituminis reddit: niger est ple-
runque, & squallidus, crusto-
sus, perquam levis. Vis ei mol-
liendi, & discutiendi: depre-
hendit fonticum morbum suf-
fusus, recreatque vuluæ stran-
gulationes: fugat serpentes ni-
dore: podagricis medicami-
nibus, & acopis additur. In
Cilicia nasci solet, qua influ-
ens amnis in mare effunditur,
proximè

DIOSCORIDIS

proximè oppidum quod Plagiopolis dicitur. Vocatur autem & locus & amnis Gagas, in cuius faucibus ij lapides inveniuntur.

Lapis thracias. Ca. CXLVII.

LAPIS thracias dictus, nascitur in flumine quodam Scytia, cui Ponto nomen est. Vis ei gagata. Traditur aqua accedi, & oleo restingui: quod in bitumine accidit.

Magnes. Cap. CXLVIII.

Magnes lapis optimus est, qui ferrum faciliè trahit, colore ad coeruleum vergente, densus, nec admodum grauis. Datur cum aqua mulla, triū obolorum pondere, vt crassos humores eliciat. Sūt qui magnetē crematū pro hematite vendāt.

Arabicus. Cap. CXLIX.

Arabicus lapis maculoso coloris similis. Is tritus illitu hæmorrhoidas exiccat: eius cinis dentifricio optimus.

Galactites. Cap. CL.

Galactites appellatur, quòd lacteum succum resudet: cinerei tamen est coloris, ac gustu dulcis. Ad oculorū fluxiones & vlcera cōueniēter illinitur. Oportet autem in aqua tritū, pyxide

ἔστι δὲ ἀληθινόν τῆς λεγόμενης πλαγιόπολεως. καλεῖται δὲ ὁ τόπος ἢ ὁ ποταμὸς γάγας, παρ' οὗ τῷ στόματι εὐερίσκονται οὗτοι οἱ λίθοι.

Πρὶ Θρακίᾳ λίθος. Κεφ. ρμζ'. 5

Ο δὲ λεγόμενος θρακίας, λεγόμεναι μὲν ἐν σκυθίᾳ ἐν ποταμῷ τῷ λεγόμενῳ πόντῳ. Διὸ αὐταὶ τῷ γράτῃ. ἰσορεῖται δὲ ἐκκαίεσθαι μὲν αὐτὸ ὕδατι, σβέννυσθαι δὲ ὑποὶ ἐλαίᾳ· ὁ δὲ καὶ ἐπὶ τῆς ἀσφάλτε γίνεται.

Πρὶ Μαγνίτῃ λίθος. Κεφ. ρμδ'.

Τὸ δὲ μαγνίτε λίθου ἀειστός ἐστιν ὁ τὸ σίδηρον ἐνχερῶς ἔλκων καὶ τὴν χροάν κινανίζων, πυκνός τε καὶ ἐκ ἀγαν βαρύνς. Διὸ ἀμυνεῖ δὲ ἔχει πάχους ἀγῶν, διδόμενος μὲν μελικράτε περιβάλλε. βάρους ἔνιοι δὲ τέτον καίοντες ἀγὰν αἱματίτε περιέσποιαν.

Πρὶ Ἀραβίᾳ λίθος. Κεφ. ρμθ'.

Ο δὲ ἀραβικὸς λεγόμενος λίθος οἰκεῖ ἐλέφαντος στήλας. ἔστος λεῖος κατὰ πλάθεις αἱμορροΐδας ἀποξηραίνει· ὁ δὲ ὄντων δὲ σπιγμά γίνεται χαυδεῖς.

Πρὶ γαλακτίτῃ λίθος. Κεφ. ρν'.

Ο ὃ γαλακτίτης ὀνόμασται, ἀπὸ τῆς γαλακτὸς ἀνιέναι. ἔστι μὲν τοῦ ὁμοῦ ἐν τῷ φρενὶ τῷ χροάν, γλυκύς πορὸς τῷ γαστρί· ἀρμόζει δὲ πορὸς ὁφθαλμῶν ρεύματι καὶ ἔλκεϊ· ἔχει ὁμοῦ· δεῖ δὲ βέλαντης αὐτὸ ὕδατι ἀποτί-

ἢ ἀποπείθεσθαι ἐν πυξίδι μολι-
δίην διὰ τὸ παρ' αὐτὴν κολλῶδες.

Πρὶ Μελίτιτε λίθος. Κεφ. ρνᾶ.

Ο δὲ μελίτις καὶ πάντα ἔοι-
κε ἴσ' γαλακτίτῃ· διαφέρειν ἐν ἴσ'
5 γλυκύτρον ἀνέναι ἢ χυλόν. ποιεῖ
δὲ παρὰ αὐτὸν ὁ γαλακτίτης.

Πρὶ Μορόχθος λίθος. Κεφ. ρνβ'.

Λίθος μόροχθος, ὃν ἐννοιοι γα-
λαξίαν ἢ λευκογραφίδα ἐκάλε-
σαν, ἐν αἰγύπτῳ γινώσκονται καὶ
10 οἱ ὀδοποιοὶ παρὰ λεύκωσιν ἢ
ἱματίων χρώσται μαλακῶ καὶ
ἐυανέτω ὄντι. δοκεῖ δὲ παρεμ-
πλάσσειν, ἀρμόζων ἐπὶ αἰμο-
ποιικῶν, καὶ κοιλιακῶν, καὶ κύ-
σεων ἀλγήματα συν' ὕδατι πιό-
15 μιν καὶ ροϊκῶς ὁμοίως, καὶ ἐν
παρὰ δέματι. εἰς τε τὰ μαλακὰ
ὀφθαλμικὰ μύνηται παρηγεῖ γὰρ
κοιλώματα, καὶ ῥεύματα ἰσχυ-
σὺν δὲ κηρωτῇ ἀναληφθεὶς τὰ
στυφερὰ τῶν ἐλκῶν ἀπουλοῖ.

20 Πρὶ Αλαβασρίτε λίθος.

Κεφ. ρνγ'.

Λίθος αλαβασρίτης ὁ χαλκῶ-
μινος ὄνυξ, ἀναληφθεὶς κεχωμέ-
νος ῥητίνῃ ἢ πίσσῃ, διαφορεῖ σκλη-
εἰας· σμάχου ἢ ἀλγήματα με-
25 τὰ κηρωτῇ παρηγορεῖ, σέλλει δὲ
καὶ οὖλα.

Πρὶ Θυίτε λίθος. Κεφ. ρνδ'.

Λίθος ὁ χαλκῶμινος θυίτης, γινώ-
σκται μὲν ἐν τῇ αἰθιοπίᾳ, ἐστὶ δὲ ὑπό
χλωρος, ἰσχυρῶν ἐν δὲ τῷ ἀνί-
στῇ,

pyxide plúbea recondere, pro-
pter vim glutini: qđ ei obheret.

Melitites. Cap. CLI.

Melitites omnia galactite si-
milis hoc tantū interest, qđ dul-
ciorem succum remittit. Eius-
dem vt galactites effectus.

Morochthus. Cap. CLII.

Morochthus lapis, quē aliqui
galaxiā, aut leucographida vo-
cauerunt, in Ægypto nascitur:
quo, vtpote molli, & facilē li-
quescente, linteones dealbandis
vestibus vtūtur. Spiracula cor-
poris obstruere videtur, cōue-
niēs iis qđ sanguinē expuūt, cōe-
liacis, & vesicæ dolorib⁹, cū a-
qua potus: itidē fluxionib⁹ vul-
uæ, & imposit⁹ velleri. Molli-
oculorū collyriis miscet: explet
enī caua, atq; delachrymatiōes
sistit. Idē cerato exceptus, vlce-
ra qđ sūt in teneris partib⁹ cor-
poris, ad cicatricem perducit.

Alabastrites. Cap. CLIII.

Alabastrites vocatus onyx,
crematus, resina aut pice assū-
pta duritias discutit: stomachi
dolores cum cerato leuat, &
ginguias comprimit.

Thyites. Cap. CLIII.

Lapis nomine thyites, in Æ-
thiopia gignit, subuiridi colore
iaspidē imitatus: cum diluitur
tamen

DIOSCORIDIS

tamen lacteum succum reddit. Vehemēter mordet: tenebras, quę pupillis obuersantur, expurgat.

Lapis iudaicus. Cap. CLV.

Iudaicus lapis in Iudæa nascitur, glādis effigie, cādidus, scita admodū cōfiguratione, lineis æqualiter inter se distantibus quasi industria detornatis: solutus nullā qualitātē manifestam gustui repræsentat. Potest ciceris magnitudine tritus ad cotē, vt collyriū, cum calidæ aquæ cyathis tribus, potu difficultati vrinæ auxiliari, & calculos in vesicā comminuere.

Amiantus. Cap. CLVI.

AM I A N T V S lapis in Cypro nascitur, scisso aluminis similis: quo, vtpote flexili, telas & vela tantum spectaculi gratia texunt, quæ ignibus iniecta ardēt quidem, sed flammis inuicta splendidiora exiunt.

Sapphirus. Cap. CLVII

S A P P H I R V S lapis, percussis à scorpione, potu prodesse existimatur. Contra intestinas exulcerationes bibitur. Excreſcentia in oculis, vūasque & pustulas inhihet, & ruptas membranas cogit.

Méphites

δρυ, γαλακτώδης φαινόμενος, ἀναδύκτων σφοδρώς. Δυνάμει δὲ ἔχει ἀποκαθαρτικὴν τῇ ταῖς κόραις ἐπισκοτουύτων.

Πρὶ ἰουδαϊκῆ λίθου. Κεφ. ρνέ.

Ο δὲ ἰουδαϊκὸς λίθος ἡγνῆται μὲν ἐν τῇ ἰουδαίᾳ, τῷ χήματι βαλανοειδὲς, λευκὸς, εὐρυθμός, ἰκανῶς, ἔχων καὶ γραμμάς παραλλήλους, ὡς ἀπὸ τὸρνου ἀνιέμενος δ' ὅστιν ἄπειος ἐν τῇ γούσει. Δυνάται δὲ ἐρεβινθιάδιον μέγας δόξεν ὡς κολλύειον ἐπ' ἀκόνης σὺν ὕδατος δερμοῦ κυάδοις τριπλὴ καὶ περὶ δυσοσμίας βοηθεῖν, καὶ τὸν ἐν κίσει λίθου δρῦπτεν.

Πρὶ Ἀμιάντης λίθου. Κεφ. ρνς'. 13

Λίθος ἀμιάντος ἡγνῆται μὲν ἐν κύπρῳ, συπληεῖα γαστρί τοιόσῳ ὅν ἐργαζόμενοι ὑφάσματα πειθεσὶν ἐξ αὐτῶ ὄντος ἱμαντῶδους πρὸς θέαν, ἀβληθέντα εἰς πύρ φλογοῦνται μὲν, λαμπερότερα δὲ ἐξέρχονται μὴ κατακαύμενα.

Πρὶ Σαπφείρου λίθου.

Κεφ. ρνζ'.

Λίθος σάπφειρος δοκεῖ ὠφέλειν σκορπιόπληκτους πινόμενος: πίνεται δὲ καὶ πρὸς ταῖς ἐν τοῖς ἐλκώσεσι, καὶ πρὸς ταῖς ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς δὲ ὑπορχαῖς, καὶ σαφυλώμασι, καὶ φλυκταῖνας σέληει, καὶ ταῖς ῥήξεσι τῶν ὑμνῶν συνάγει.

Πρὶ

Πρὶ Μεμφίτου λίθου.

Κεφ. ρνή.

Λίθος μεμφίτης εὐερίσκεται ἐν αἰγύπτῳ κατὰ μέμφιν, ἔχων ἡ φίδιον μέγιστος, λιπαρὸς καὶ ποικίλος. ἕτος ἱσθρεῖ) κατὰ χρισθεὶς
 5 κείσιν ἐπὶ τῶν μελλόντων τέμνεσθαι ἢ χρίεσθαι τόπων, ἀναμνησίαν ἀκίνδυνον ἐπιφέρειν.

Πρὶ Σελινίτης λίθου. Κεφ. ρνθ'.

Λίθος σελινίτης, ὃν πινες ἀφροσέλωνον ἐκάλεσαν διὰ τὸ εὐερίσκεσθαι αὐτὸν νυκτὸς μεσὸν ἐν τῇ τῆς σελήνης πυρροφύξει. γινώσκειται δὲ ἐν ἀραβίᾳ λευκός, διαυγής, κίφος. τῶτον ὑποξέχουσιν
 10 τες, διδόναι πόμα ἐπιληπτικοῖς. καὶ ἀντὶ φυλακτικίου δὲ δειλάμματι αὐτῶ αἱ γυναικες χρωῖν). ἰδοκεῖ δὲ καὶ δένδρεσι περὶ δευδαίς, καρποφόρος εἶναι.

Πρὶ ἰάσπιδος λίθου. Κεφ. ρξ'.

Λίθος ἰάσπιδος, ὃ μὲν τις ὄζει σμαραγδίζων ὃ δὲ χρυσάλλωδης, ἰοικός φλέγματι ὃ δὲ ἀερίζων ὃ δὲ χαρνίαις, ὡς φρεῖ κακωπιισμένος ὃ δὲ τις καὶ διαφύσει
 20 ἔχων διαλεύκους, καὶ ἀποσιλβέσας ἀσύνεως καλέμενος ὃ δὲ τις τερβινθίζων λέγεται καὶ χαλαινὴ χρώματι περὶ σμοιῶς κέρονται δὲ πάντες εἶναι φυλακτικία δειλάτια καὶ ὠκυώκια μετὰ πελαπτόμενα.

Lapis Memphites.

Cap. CLVIII.

Memphites in Aegypto iuxta Memphin inuenitur, calculorū magnitudine, pinguis, versicolor. Tradunt trito & illito, quæ vrenda aut secanda sunt, sine periculo obstupescere, ita vt non sentiant cruciatum.

Lapis Selenites. Ca. CLIX.

Selenites lapis, quem aliqui aphroselenon appellarūt, quoniā noctu inuenitur lunæ imaginē reddere, quæ cum ea quidem augetur & decrescit. Nascitur in Arabia, candidus, translucens, leuis, Huius remota comitialibus in potu dari iubet. Eo ceu gestamine ad amuleta mulieres vtunt. Arbores adalligato eodē frugiferæ redduntur.

Lapis Iaspidis. Ca. CLXXX.

Iaspidū quædā smaragdū imitatur, alia crystallū, colore similis pituitæ: alia nō dissimilis ærri, ob id vocat ærizufa: alia veluti fumo infecta, quæ capnias ex argumēto vocat: quædā lineis albis & resplendētibus præcingitur. Afsyrios appellata: alia terebinthinæ similis, quæ terebinthizufa dicitur: alia colore calalida gēma æmulatur. Omnes amuleta esse traduntur, & accelerare partū femorib⁹ appēsa. Aëtites.

Πρὶ

DIOSCORIDIS

Aëtites. Cap. CLXI.

Aëtites lapis est veluti prægnans, cum quatitur, alio in vtero sonante. Grauidis continet partus, cum lubricæ sunt vuluæ & parum tenaces, sinistro brachio adalligatus: sed parturiētibus è brachio amoueatur, & feminibus alligetur, vt sine doloribus pariant. Furrem apprehendit, si quis in pane conditum offerat: fur enim mansum deuorare non poterit. Quinetiam concoctus, furrem coarguit: quippe decocta cum eo, deuorare non poterit. Tritus, & cerato exceptus,

cyprino, aut gleucino, aut alio excalfaciente, comitiales magnificè iuuat.

Lapis ophites. Cap. CLXII.

Ophitæ genera multa: quidā pōderofus & niger: alter cinereo colore spectatur, pūctis distinctus: tertius lineis quibusdā cādidiis intercinctus est. Omnes alligati contra capitis dolores, & serpentū ictus p̄sunt. Feruntur q̄ lineas habent, lethargo, & capitis dolorib⁹ auxiliari.

Lapides qui in spongiis inueniuntur. Ca. CLXIII.

Lapides in spongiis inueniuntur, qui vesicæ calculos rumpunt,

Πρὶ Αεπίτης λίθος. Κεφ. ρξά.

Αεπίτης λίθος ὁ ἐν τῷ κινεῖσθαι ἤχον ἀποτελῶν, ὡς ἐτέρου ἐγκύμων λίθος ἐπ' ἀπ' ἡλίου. καὶ τὸν ἐμβρύων ἐστίν, ὅταν ὀλιγοῖται ὡς ἐν αἰμῇ τεταί, πλεονάζοντος. αἰετὶς ἐν βραχίονι ἐν δὲ τῷ χειρὶ τ' ἀπυτέξεως, ἄρας ἐκ τ' βραχίονος, περιάπτει τῷ κερῶ, καὶ ἐκ τῶν ὠδίνων τέξεϊ. ἐστὶ δὲ κλεπτελέχρος, εἰ ἐπιδείη τις εἰς τ' πορροφόρον ἀφ' ὃν ὁ γὰρ κλέψας ἐκ τῶν δυνάμεων καὶ ἀπείν τὰ μασηθέντα. φασὶ δὲ ὅτι καὶ συνεφόρος ὁ αεπίτης τοῖς ἐδέσμασι, κλεπτελέχρος γίνεϊ. οὐ γὰρ δυνήσεϊ ὁ κλέψας καὶ ἀπείν τὰ συνεφόρα αὐτῶ. λησθεὶς δὲ καὶ ἀναλαμβάνόμενος κερῶν σκευαδεήσει διὰ κυτρίνης ἢ γλευκίνου ἢ πινὸς ἐτέρου τῶν δερματόνων, οἰνίγησι μέγας ἐπιληπτικός.

Πρὶ Οφίτης λίθος. Κεφ. ρξβ.

Λίθος ὀφίτης ὁ μύς, τις ὅστις βαρύς, καὶ μέλας. ὁ δὲ, ἀποδοξὸς τ' ὡς χροῖαν καὶ κατεστῆμνος ὁ δὲ τις γραμμὰς ἔχων λευκὰς. πάντες δ' ἐν χροῖαν πλεονάζοντες ἐπὶ ὀφιοδύκτων καὶ κεφαλαιούτων. ὁ δὲ τὰς γραμμὰς ἔχων, ἰδίως ἰσορεῖται λησάρῳ, καὶ κεφαλαιούχῳ γαίᾳ βοηθεῖν.

Πρὶ τῶν ἐν τοῖς σπόγγοις

λίθων. Κεφ. ρξγ.

Λίθοι οἱ ἐν τοῖς σπόγγοις εὐεισρόμοι, συνὸν οἶνον πιδέντες

τοῦ ἐκλύσει λίθους ἀνὸς τισιν.

Πρὶ Λιθοκόλλης. Κεφ. ρξδ'.

Ἡ δὲ λιθοκόλλα μύγμα οὖ-
σα μαρμαρίου ἢ λίθου παείου
καὶ ταυροκόλλης. διύεται διὰ
ῥ' ὑψηλότητος πεπυρωμένης, τεί-
χας ἀνακολλᾷ τὰς ἐν ὀφθαλ-
μοῖς.

Πρὶ ὄσρακίτε λίθου. Κεφ. ρξε'.

Λίθος ὄσρακίτης ὁμοίος ὅστιν
ὄσρακω παλακόδης καὶ οὐχός,
10 ὃ ἔχονται ἀπὸ κισσέρεως πρὸς
τειχῶν ἄρσιν αἰ γυναικες. ἔχει
δὲ καὶ καταμύωια πινούμενος συν-
οῖνω < α. παλῆδος, δυοῖν δὲ <
βάρους ἐὰν πίνῃ τις ἐφ' ἡμέρας
δ'. μετὰ τὴν ἀφύδρυν, ἀσυλλη-
15 ψιὰν ποιεῖ. συν μύλιτι δὲ ἐπι-
πιδέμενος, φλεγμῶνοντας ματῶς
παρηγορεῖ καὶ νομας ἱσῆσι.

Πρὶ Σμύριδος.

Κεφ. ρξς'.

Σμύρις λίθος ὅστιν, ἢ τὰς ἰν-
20 φας οἱ δακτυλογλύφοι σιγήχρσι,
χρησιμὴ εἰς * σήπας καὶ καυσ-
κα. καὶ πρὸς οὐλῶν πλάσθον καὶ ὀ-
δόντων σιγήξιν.

Πρὶ Ἀμμου.

Κεφ. ρξζ'.

Ἀμμος ἢ παρὰ τοῖς αἰμαλοῖς
πυρωθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἡλίου, ἐξικμά-
ζει τὰ ὑδρώδη σώματα περ-
χυννύμενα δι' ἅ καθεαυτῆς. φώ-
γνυται δὲ καὶ εἰς τὰς ξηρὰς πυ-
εῖας ἀπὸ κέρχου ἢ ἄλων.

Πρὶ

rumpunt, in vino poti.

Lithocolla. Ca. CLXIII.

Lithocolla glutinum, quo la-
pides coniunguntur: conflatur
autem ex marmore, lapide Pa-
rio, & taurino glutine. Potest
candēte specillo admotū, in cō-
modos oculis pilos replicare.

Ostracites. Cap. CLXV.

Ostracites testæ similitudinē
habet, crustosus, & in laminas
fissilis, quo mulieres ad detra-
hēdos pilos, pro punice vtun-
tur. Menfes drachmæ pondere
potus ex vino, sistit. Si quatuor
dieb' à purgatione bibatur fi-
cilici pōdere, foeminis præstat
nē concipiant. Cum melle au-
tem imposit', mammarum in-
flammationes lenit, & nomas
cohibet.

Smyris. Cap. CLXVI.

Smyris lapis est, quo annula-
rij sculptores lapides expurgāt
ad erodendū & vrendū utilis:
gingivis, quas humor vexat, p-
dest: dentifricio cōmendatur.

Areña ex littoribus.

Cap. CLXVII.

A R E N A è littoribus so-
le feruefacta, hydropicorum
tumores exugit, si capitete-
nus, in ea obruantur. Torrerī
solet ad aridos fōtus, pro milio
aut sale.

R

Naxia

DIOSCORIDIS

Naxia è cote. Cap. CLXVIII.

E cote Naxia, quod ex acue-
do ferro deterit, illitū alopeci-
as ad pilū reducit: virginū mā-
mas cohibet, nec īcrescere pa-
titur. potū ex aceto, lienē absum-
mit, & comitialibus prodest.

Geodes. Cap. CLXIX.

Geodes lapis, adstringit, sic-
cat, caligines oculorum discus-
tit. Illitus autem ex aqua, te-
stium mammarūque inflam-
mationes sedat.

Terra. Cap. CLXX.

Omnis terra ad medēdi vsum
recepta, summā & primā vim
habet refrigerandi, meatūsque
obducēdi, occludēdiq; sed spe-
cie distat, cū alia adiūctis qui-
busdam ad alia fit vtilis.

Eretriades. Cap. CLXXI.

Eretriades duæ sunt, vna ve-
hementer alba est, altera ci-
nericia. Optima habetur ad ci-
nereum colorem vergēs, per-
quā mollis, quæ si per æra-
menta tractum ducatur, line-
am violaceam refert. Lauatur
vt cerusa, aut hunc in modum.
Teritur seorsum, & cum aqua,
& vbi pessum ierit, humor le-
uiter excolatur: ficcata solib⁹,
iterum teritur interdium, adie-
cta aqua, vt vespere confidat:
antelucanis colo excernitur,

&

Πρὶ Ακόνης. Κεφ. ρξή.

Ακόνης ναξίας τὸ ἀπὸ τεύχεος
πρὸς αὐτὴν ἀκονιδέντος σιδήρε-
ῆ χειρὸς, ἀλωπεκίας τριχῶν καὶ
μαστούς παρθένων κωλύει σιζέ-
σαι ποδὲν δὲ μετ' ὄξους, σπληνῶς
τῆς καὶ ἐμπληπτικοῦς ὠφέλει.

Πρὶ Λίδος γέωδου. Κεφ. ρξθ.

Λίδος γέωδος εἴφει, ξηραίνει,
ἀποκαθαίρει τὰ ἐμποκοτυῶτα
τοῖς ὀφθαλμοῖς. κατὰ χροιάεισα
δὲ μὲθ' ὕδατος, μαστῶν καὶ ὀρχέων ἰο-
παύει φλεγμονάς.

Πρὶ γῆς. Κεφ. ρό.

Ἡ πᾶσα ἢ πίπῃσα εἰς ἰατρει-
κὴν χρῆσιν, τὴν μὲν ἀνωτάτω
διώαμιν ἔχει ψύχουσαν καὶ πα-
ρεμπλάπτουσαν. κατ' εἶδος δὲ ἰς
διαφέρει, ἅλλης εἰς ἄλλα μετὰ
πρὸς σκευασίας χρησιμεύουσας.

Πρὶ Ερεβιάδος γῆς. Κεφ. ροα.

Ἡ γῆς ἐρεβιάδος γῆς, ἢ μὲν ὅση
λευκὴ ἐπιτίτα μένως, ἢ δὲ, σπινθὴρ
δῆς. αἰεὶς ἢ ὑπάρχει ἢ τῇ χροίᾳ
ἀποδίξουσα καὶ μαλακὴ ἄσπερος
καὶ χαλκώμαλα ἐκλυθεῖσα γραμ-
μῶν ἰώδη ἀποφερεμένη. πλωέ-
ται δὲ ὡς ψιμμίδιον ἢ ἔτω λεά-
νας αὐτῇ ὅσον αὐτῇ δέλης κατ' ἰδί-
αν τὴν καὶ συνὸν ὕδατι ἔασον κατὰ
ἐλῶναι, εἴτα τὸ μὲν ὑγρὸν ἐλαφρῶς
ἀπὸ θησον· τὴν δὲ γῆν ἐν ἡλίῳ
ξηράνας, πάλιν βίβει ἐπὶ ἡμέρας
ἐπιδὺς ὕδατος, ἐσπέρει ἢ ἐάσας ὑ-
ποσῆναι, φεῖ δὲ ὁρμηδὸν ἀπὸ θησον,
καὶ

ἢ λεῖανός ἐν ἡλίῳ ῥοχίσκεις ἀγά-
 πλαστὲ ὡς δυνάτον. ἐὰν δὲ καὶ
 ὠπλισμένης χρεῖα ὑπάρχῃ, λα-
 βὼν ἐρεθιν διαίᾳ μεχέθῃ τῇ γῆς δὸς
 εἰς ἀργεῖον κραιμεῖον κατατρίβημι
 5 μόνον, πωμάσας τὲ τὸ σῶμα ὅπ-
 μιλῶς. ἐνδὲς εἰς διάπυρρος ἀνθρα-
 κας, ἢ ῥίπτει σινεχῶς. *ὅτε δὲ ἡ
 σποδὸς αἰθαλωδῇ ἥτοι ἀρώδης
 μακλὸν γλῆνῃ τῇ χροῶν, ἀνελάμε-
 νος ἀπύδου, Διῶαμιν δὲ ἔχει συ-
 10 πικρὴν ἢ συκπικρὴν, κούφως μα-
 λακπικρὴν ἢ κοίλωμάτων πικρὴν
 πικρὴν, ἢ ἐσάμων κολληπικρὴν.

Πρὶ Σαμίας γῆς. Κεφ. ρεβ'.

Τῆς δὲ σαμίας γῆς τῇ ἄγαν λευ-
 κὴν περικριτέον, ἢ ἐλαφράν. ἢ ἐν
 15 τῷ δῖγειν πλὴν γλῶσσαι, κρατού-
 μένην ἔχει κόλως, ἐπὶ τὲ εὐχολὸν
 ἢ μαλακὴν ἢ εὐδρυεῖν, οἷα ἐστὶν
 ἡ πηγὴ κολλυεῖον καλεῖσθαι. ἐστὶ
 γὰρ αὐτῆς δύο εἶδη, τὸ τε περὶ φε-
 μάγον, ἢ ὁ καλέμενος ἀστὴρ, πλά-
 20 κῶδης ὢν καὶ πυκνός, ὡς ἀκόνη.
 Διῶαμιν δὲ ἔχει ἢ χαῦσιν καὶ
 πλύσιν ἐμφερῇ ἐρεπείαδι. ἴσησι δὲ
 αἱ ματος ἀναγωγῇ, καὶ ῥοικῶς
 δίδεται γυναιξὶ σὺν βαλαυσίῳ.
 ἢ ὀρεχῶν ἢ μαστῶν φλεγμονὰς
 25 καταχειρομένη σὺν ὕδατι ἢ ῥο-
 δίνῳ παύσει. κλει ἢ ἰδρωτὰς ἢ
 θνητοδύκτοις ἢ θαλασίμοις ἀρή-
 ρει σὺν ὕδατι πνομῶν.

Πρὶ τῇ σαμῶν λίθου. Κεφ. ρογ'.

Εὐρίσκεται δὲ τις ἐν τῇ σαμῶν.

& demum in sole trita, si fieri
 potest, digeritur in pastillos.
 Quod si tosta desideretur, pa-
 stili magnitudine ciceris in fi-
 ctile perforatū cōiiciunt, oreq;
 vasis diligēter obturato, supra
 carbones candētes cōtinenter
 follibus perfliatur: vbi verò ci-
 nis in fauillas se conuertit, aut
 aëreum colorē cōtrahit, exēpti
 recondūtur. Vim habet adstrin-
 gentē, & refrigeratoriā, leuiter
 mollientē: caua explet, & sani-
 guinolenta conglutinat.

Terra Samia. Cap. CLXXII.

Samia præfertur cādida, le-
 uis, tangēti linguæ glutinis mo-
 do adhærescēs, mollis, succosa,
 friabilis: cuiusmodi est quā ali-
 qui collyrion vocāt. Duę enim
 species eius: vnā, antè diximus:
 altera alter appellatur, crusta-
 cea, & cotis modo prædensa.
 Vritur ac lauatur vt eretria, vim-
 que consimilē habet: sanguinis
 reiectiōes sistit, & foeminis flu-
 xione vuluæ laborātibus, cum
 flore syuestris punice dat. Te-
 stium & māmārū inflāmatio-
 nes, illita ex rosaceo & aqua,
 refrigerat: sudores arcet: cōtrā
 serpentium morsus & venenā,
 pota ex aqua auxiliatur.

Lapis Samius. Ca. CLXXIII.

Samius lapis, in Samia terra

R ij inue-

DIOSCORIDIS

inuenitur, quo artifices vtuntur poliendo auro, vt resplendeat. Probaturn candore, & duritia. Vis ei adstrictoria, & refrigerans: prodest stomachicis potus: sensus hebetat: verum ad fluxiones oculorum & vlcera, cum lacte efficax est: parit, vt tradunt, adligatus accelerat, & conceptus foeminarum custodit.

Terra chia. Cap. CLXXIII.

Chia eligi debet candida, vergens ad cinereum, Samiæ similis: est autem crustosa, albâque, sed fictitiis formis differens. Vis eadem quæ & Samiæ, extēdit faciem, & erugat, atq; splendidâ reddit: colorē in facie & corpore toto cōmedat: in balneis pro nitro deterget.

Terra Selinusia.

Cap. CLXXV.

E A D E M præstat Selinusia: maximè laudatur, quæ vehementer resplendet, candida, friabilis, & humore dilui cellerrima.

Cimolia. Cap. CLXXVI.

Cimoliæ duo genera, candida, & ad purpureum inclinās. Optima existimatur, quæ innatam habet pinguitudinem, tactûque frigida sentitur. Vtraque aceto diluta, parotidas,

&c

γῆ λίθος, ὃ οἱ χρυσοῦχοι χρῶνται πρὸς τὸ λεύκνειν καὶ σιλευῶν. διαφέρει δὲ ὁ λευκὸς καὶ σιβαρός.

Διῶαμιν δὲ ἔχει συμπικνῶ, ψυκτικῶ. ὠφελῶν σωματικούς ἐν ποτῶ· ἀμελῶτικῶ τοῖς αἰσθηθεῖσι· ποιεῖ πρὸς τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς ρεύματα καὶ ἔλκη συνὲ γάλακτι· δοκεῖ δὲ καὶ ὠκυτόκος εἶναι καὶ φυλακτικὸς τῶν συνελήφτων πελαπολόμῃος.

Πρὶ Χίας γῆς. Κεφ. ροδ'. το

Καὶ ἡ χίος ὅτι λευκὴν καὶ ὑπόπεφρον παρὰ ληπτόν, καὶ ἴη σάμια ἐμφερῆ· παλαιότης δὲ ὅστι καὶ λευκὴ, τοῖς ὅτι χήμασι ὅτι ἀναπλάσεως διαφέρειται. Διῶαμιν ὅτι ἔχει ὡς ἴη σάμια· τεταρτὸν ὅτι καὶ σίλιν· τὸν ἔτι δὲ εὐχρὲν τὸ πρὸς σποπὸν καὶ ὅλον τὸ σῶμα ἀποτρίβει· σμικρὴ δὲ ἀντὶ νίβει ἐν βαλανείῳ.

Πρὶ Σελινοῦσίας.

Κεφ. ροδ'.

Τὰ αὐτὰ δὲ ποιεῖ καὶ ἡ σελινοῦσία γῆ· αἰεὶς δὲ ὅστιν ἡ ἄγαν σίλβουσα καὶ λευκὴ, εὐδρυεὶς δὲ καὶ ταχέως ἄγαν χυλεμένη ἐπειδὴ ὑγρὸν λάβη.

Πρὶ Κιμωλίας γῆς. Κεφ. ροδ'.

Τῆς δὲ κιμωλίας ἡ μὲν ὅστι λευκὴ ἡ ὅτι ἐμπέρφυρος· καὶ λιπαρὴ· πινὰ ἐμφύλον κεκλημένη, πρὸς τὴν ὁφλὴν κατὰ ψυχρὸς, ἢν αἰετὴν ἡγνέον. ἑκάτεραι δὲ διαφορῶσιν ὅστι διειμύροι, παρωτίδας καὶ

καὶ τὰ ἄλλα φύματα πρὸς τὰ πυρίκαυτα ποιῶσιν ἐπιχειρῆσαι παραχρῆμα, ὥς τ' ἀφυγκιάνοντα διατρεῖν τὰ πεπονθότα μέρ' αὐτὰς ἐλλοισι δὲ καὶ διδύμων σκληρίας καὶ φλεγμονὰς τὰς περὶ ὅλον τὸ σῶμα· ἐπὶ δὲ ἐρυσιπέλασιν ἐνίστανται. καὶ δόλου δὲ πολυχρησοὶ εἰσιν αἱ γνώσεις ἐὰν μὴ νόδοι παραλαμβάνονται.

Πρὶ Πιγίπιδος γῆς. Κεφ. ροζ'.

10 Η δὲ λεγομένη πιγίπιδος γῆ, τῇ χροῖᾳ ἔοικε πως τῇ ἐρετειάδι, ἐστὶ δὲ ἀδρόσωλος. Ἐφυγκιάνοντα τῶν χειρῶν ἐπιβολαί· τῇ τε γλώσῃ μάστιγα κολλᾷ ὥς ἐκκρεμᾶνται. Διῶαμιν δὲ τὴν αὐτὴν ἔχει τῇ κίμωλιδι, βραχὺ τῆς ἐντονίας ὑπερῶσα ταύτῃ ἀντὶ ἐρετειάδος πινὲς πωρόσχοισι.

Πρὶ Οσράκων. Κεφ. ροή.

20 Οσράκα δὲ τὰ ἐξ ἱπνῶν τὰ λίαν καύτωτα, ἐξαρωπικᾶ· ὁθεν ἐπιχειρόμενα συν ὅξει, κηκημῖς καὶ ἐξανθήματα ἱᾶται, καὶ ποδαγρικοὺς ὠφελεί· ἀνακινῶντα τὲ κινῶν τῇ χοιρέας διαφορεῖ.

Πρὶ τῆς ἐν τῶν χαμίνων

γῆς. Κεφ. ροθ'.

25 Καὶ ἡ ἐν τῶν χαμίνων δὲ καύτωτος γῆ πυρρὰ, τ' αὐτὴν ἔχει διῶαμιν τοῖς οσράκοις.

Πρὶ Μελίας γῆς. Κεφ. ρπ'.

Η δὲ μελία τ' ἔχ' χροῖαν καὶ αὐτὴ ὅστιν ἐμφερὲς ἐρεβιάδι τῇ αποδο-

& alia tubercula discutit: ambusta igni, si statim cimolia oblinantur, pustulas non sentient: testium durities, & totius corporis collectiones cohibet: igni sacro imponitur. In summa, utraque multum in medicina commendatur, si in corruptæ originis nec spuria assumatur.

Pnigitis. Cap. CLXXVII.

QV Æ pnigitis dicitur, colore ferè eretriæ similis est, grandioribus tantum glebis: manum si quis admoueat, refrigerabit: tactu linguæ, usque aded glutinosa, ut pensilis hæreat. Cui effectus idem qui cimoliæ, paulò tamen infirmior. Hæc aliqui pro eretriade vendunt.

Testa fornacea. Cap. clxxviii.

Fornacæ testæ vehementer tostæ, crustas ulceribus obducunt: quare prurigini & papularum eruptionibus medetur. Podagricis psunt: strumas discutiant, cerato exceptæ.

Terra fornacum.

Cap. CLXXIX.

Fornacum terræ, quæ retorrida fuluescit, eiusdem cum testæ effectus.

Melia. Cap. CLXXX.

MELIA COLORE

cineream eretrium imitatur,

R iij aspera

DIOSCORIDIS

aspera tactu : ea digitis friata, derasi pumicis modo crepitat. Vim habet aluminosā, sed remissiusculā, id quod gustu deprehēditur : nā modicē linguā ficcāt: purum corpus reddit, & colorem cōmendat: pilos extenuat, vitiligines, & lepras abs-tergit. Pictorib' vsum præbet, vt colores diutius perennent: emplastris viridibus, quæ chloræ dicuntur, efficaciter inseritur. Ex omni Melia terra, & omni alia in vniuersū, eligi debet recens, mollis, non lapidosa, friabilis, quæ cum humorem attigerit, facilē resoluatur.

Terra ampelitis.

Cap. CLXXXI.

Ex ampelide terra, quæ phar-
macitis nomine, in Seleucia Sy-
riæ nascitur, laudatur in pri-
mis nigra, piceæ longos car-
bones referens, modicē affu-
losa, æquabili splendore, quæ
detrita, accepto oleo, statim
eliquescit. Vitiosa censetur cā-
dida, & cinerea, quæ in liquore
non resoluitur. Vim dissipandi
& refrigerandi habet: ad calli-
blephara additur, tingendis ca-
pillis idonea. Vfus eius ad illi-
nēdas vites sub germinationis
tempus, vtpote cum innascen-
tes vermiculos enecet.

Fuligo

δὲ ἐν βαρὺς δὲ καὶ παρὰ τριβομένη
τοῖς δακτύλοις, ὡς ψευδισμὸν
ἵνα ἀποτρίβῃ ὁμοῖον ψευδισμὸν
κινῶν. τῇ δὲ δυνάμει συπληρῶ
δὲ ὅτιν, ἀνελκῶς δὲ μᾶλλον ὁ
δὲ καὶ διὰ τὴν γένεσιν ἐμφανὲς ἁ-
ναξαρῶν δὲ καὶ τὴν γλῶσσαν πα-
ρῶς δυνάμει δὲ καὶ δυνάμει καὶ εὐ-
χρῶν ἀποτελεῖν τὸ σῶμα λε-
πτῶν ὅ καὶ τὰς τεύχας καὶ δυνάμεις
καὶ λείπας ἀμείνει. χρῆσιμὴ δὲ
καὶ ζωοφάτοις πρὸς πλείονα πα-
ραμνήνῃ χρῶματων· καὶ χλω-
ραῖς δυνάμει συνδρῶν. καὶ ταύ-
της δὲ κοινῶς ἀπάσης γῆς τὴν δυνά-
μει ἐν λεκτέον καὶ πρὸς σφατον
μαλακίαν τε καὶ εὐδρυεῖν, καὶ εὐ-
λυτον ὅταν ὑγρῶς ᾖ.

Πρὶ ἀμπελίπιδος γῆς. Κεφ. ρα.

Τῆς ὅ ἀμπελίπιδος γῆς, λευ-
κὴς φαρμακίαν χαλῶσι χυνομένη
ἐν σιελικῇ τῇ καὶ σιελικῇ, τὴν
μέλαιναν πρὸς κριτέον, καὶ πενκί-
νοις ἀνδραξί μικροῖς ἐμφερῆς ἐ-
στίν, ὑποχρῶδα καὶ δὲ καὶ σιελικῇ
σα ἴσως, ἐπὶ ὅ ἐδὲ βραδείως τηκο-
μένη, ὅταν λεανθεῖ σὴ ἐπὶ χυρῇ πο-
τῶς ἔλαιον. τὴν δὲ λευκὴν καὶ πεφρῶ-
σιν καὶ ἀττικόν, φαύλῃ ἡγήτεον.
Δυνάμει δὲ ἔχει διαχυτικὴν καὶ
ψυκτικὴν· παρὰ λαμβάνει δὲ καὶ
πρὸς χαλλιβλέφαρα καὶ βαφὰς ῥε-
χῶν. καὶ τὰς τὴν ἀμπελίαν χρίσεις
πρὸς τὴν ἐμβλαστήσεως ὥραν,
κλίνουσι τὸς ἐπιγινόμενους σφάλῃ

καὶ.

Πρὶ

Πρὶ Ἀσβόλης.

Κεφ. ρεβ'.

Ἀσβόλη ἢ οἱ ζωγράφοι χρῶν-
ται, λαμβάνεται μὲν ἐκ τῶν ὑ-
ελουρῶν, διαφέρει γὰρ αὕτη. Δύ-
ς ναμιν ὅτι ἔχει σπηλικήν, συπλικήν.
ἀπουλοῖ δὲ καὶ κατὰ γμάτα σὺν
ῥοδίνῃ κηρωτῇ.

Πρὶ Μέλανος.

Κεφ. ρπγ'.

Μέλαν ὃ χρᾶφορμον, συνάγε-
ται ἐκ λιγνύος συναρομῆνης ἐκ
δαδίων. μίγνυται δὲ πρὸς τιῶ
λίτσαν τῆς κόμμεως οὐγγίας βεῖς
λιγνύος, σκευάζεται δὲ καὶ ἀπὸ τῆς
ῥητίνης λιγνύος καὶ τῆς πωρεση-
μῆνης ζωγραφικῆς ἀσβόλης. δεῖ
15 δὲ τῆς μὲν ἀσβόλης μίαν μίαν
λαμβάνειν, κόμμεως δὲ λίτσαν
μίαν ἥμισυ, ταυροκόλλης οὐγ-
γίαν μίαν ἥμισυ, χαλκαίδου ἑξ-
γίαν μίαν ἥμισυ, ἀρμόζει δὲ εἰς
τε σῆπτας, καὶ πυρίχυστα κατὰ
20 χρυσοῦμον μὲν ὕδατος παχὺ, καὶ
ἰώωμον ἄχρις ἀπουλώσεως.
ἀποπίπτει γὰρ αὐτόματον ὑμα-
δέων τῶν ἑλκῶν. Καὶ δὴ χρ-
σθὲν ἐφ' ὅσον ἱκανὸν ἐδόξαμεν ὅ
φίλτατε ἄρειε αἶμα εἶναι καὶ μὴ
25 κοῖς συντάξεως, καὶ πλῆθους ὕ-
λης τε καὶ βοηθημάτων ταμιεύ-
σασθαι, ἅλως ἔχει.

Fuligo pictoria.

Cap. CLXXXII.

Fuligo qua pictores vitūtur, ex
vitrariis officinis colligi solet:
siquidē ei palma tribuitur. Vis
ei ad astringēdum & erodēdū
efficax: fracta cū rosaceo ce-
rato ad cicatricem perducit.

Atramentum librarium.

Cap. CLXXXIII.

Atramentum quo scribimus,
fuligine è tedis coacta colligi-
tur. In singulas libras gummis,
ternæ fuliginis vnciæ adiciun-
tur. Fit etiā è resinarū & picto-
ria fuligine, de qua paulò ante
diximus. Assumitur autem fuli-
ginis mina, gūmis fescquilibra,
glutinis taurini, atramēti futo-
rij, singulorum fescuncia. Addi-
tur conuenienter erodentibus
medicamentis: Ambustis, ex a-
qua commodè crassius illini-
tur, sed nō antè soluatur, quàm
cicatricem induxerit: sanatis
siquidem vlceribus, sua spon-
te decidit. Cæterum habes, a-
micissimè Areë, ferè qua tra-
denda duximus pro operis mo-
do, quem destinaueramus, &
materiæ auxiliiorumque medi-
cinalium copia.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙ-
ΒΛΙΟΥ ΠΕΜΠΤΟΥ.
ΠΕΔΑ-

QVINTI LIBRI
FINIS.
R iiii PEDA-

PEDANII ΠΕΔΑ-

DIOSCORIDIS

Anazarbei de venenis, quó-
que modo arceantur, viten-
turque, Liber Sextus.

ΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙ-

δου Ανασαρβέως πρὸς Δηλητη-
ρίων φαρμάκων καὶ τῆς αὐτῶν
περὶ φύλακας βιβλίον ἔκτον.



VPERIO-
ribus amicif-
sime Arée li-
bris, tradidim⁹
de aromatib⁹
oleis, ynguen-

tis, arboribus, & earūdem fru-
ctibus, lachrymisque : item a-
nimalibus, melle, lacte, seuo,
frumentis, oleribus, herbis, ra-
dicibus, liquamentis, vinis, me-
tallisque. In hoc verò totius
operis vltimo, facultates me-
dicamentorum recensēbimus,
quæ prodesse nobis, aut offi-
cere possiat. Vitata igitur ora-
tionis prolixitate, opus institu-
tum prosequamur. Huiuscemo-
di autem tractatus, cum bifa-
riam distributus sit : in partem
venena præcauentem, ita vt ne
fallant sumētes, aut si quan-
do per imprudentiam den-
tur, vt tum quoque innoxia
fiant, irritaque : & in ratio-
nem iis succurrendi, qui iam
noxiam sentiunt : primum dis-
feram de præcauendi modo,
quem



ΠΟΔΟΝ-

τες ἐν τοῖς περὶ
γραφείοις βιβλί-
οις φίλτατ' Α-
ρειε, τ' πρὸς ἀ-
ρωμάτων καὶ ἐ-

λαίων καὶ κύρων καὶ δένδρων καὶ
τῶν ἐξ αὐτῶν καρπῶν καὶ σακρύ-
ων· ἐπὶ τῇ ζώων καὶ μέλιτος, καὶ γά-
λακτος καὶ σέαςτος, καὶ τῶν λε-
γομένων σιτηρῶν καὶ λαχαίων, ἐπὶ τῇ
τῇ τὸν σύμπαντα πρὸς ῥιζῶν καὶ
βοτανῶν καὶ χυλισμάτων, καὶ οἴ-
νων καὶ μεταλλικῶν λόγον. ἐν τῇ
τῇ τελευταίῳ ἀρχόντι τῆς ὀ-
λης περὶ γαματείας καταλεξόμε-
θα, πρὸς τῆς τῶν ὠφελῆν ἡμῶς καὶ
ἢ βλάπην δυναμῶν φαρμά-
κων ἐνεργείας. Παρρησιάζομαι
οὐδ' ὅτι πολυλογία, ἐπαί-
μιον ἐπὶ τῷ περὶ κείνων. μετὰ
κείνου δὲ τῷ τοῦτο διχῇ· εἰς τῇ
περὶ φύλακην τῇ μὴ δὲ τῷ ἀρ-
χῷ· λαμβάνειν, ἢ εἰ καὶ ποτ' λά-
δοι διδόμενα, ἀνεργήματα ἡμέ-
ας καὶ εἰς τὸ βοηθηματικὸν τῶν
πεπρωκότων. Πρῶτον δὲ διει-
πῇ τῇ περὶ φύλακην τοῦ τῶν
ἀρχόντων

διχρῆτες οὗτος ὥς οἱ ἀρχαῖοι ὑπέ-
 λαβον, διὰ τὸ τὰς λάθρα διδόν-
 τας οὕτω μηχανῆσαι, ὥς καὶ τὸν
 ἐμπειρωτάτους ἐξαπατῶν. τὰς
 μὲν γὰρ πικρίας ἐξαερωῦνται τῶν
 5 φαρμακῶν φαρμάκων ταῖς μι-
 γνυμύαις γλυκύτησι, ταῖς δὲ δι-
 σωδίας ταῖς τῶν ἀρωμάτων κα-
 ταμύξουσιν ἢ ταῖς τῶν ὑλῶν ἐπ'
 ὠφελείᾳ δοκούντων προσσφύρεινται.
 μάλιστα δ' ἐν ταῖς ἀδενείαις
 10 ὥς ἀψινθίῳ ἢ τραχειαγῶν ἢ
 ὑσώπῳ, ἢ θυμάρῳ, θυμῷ τε
 καὶ δειγῶν ἢ ἀβροτόνῳ, ἢ ἱε-
 ρῇ ἢ καρδίῳ, καὶ εἴ τι δοκεῖ
 κατὰλληλον τοῖς καταρρομέ-
 νοις φαρμάκοις ἔχειν ποιότητα.
 15 ἐπὶ δὲ τῶν πινυμύων ἐν οἴ-
 νοις σκληροῖς ἢ ζωμοῖς, ἢ ἐν
 γλυκεῖ, ἢ ἐν μελικρέτῳ, ἢ ἐν
 γλυκύει, ἢ ἐν χυλοῖς, ἢ φακῶ,
 ἢ ἐν ἀλφίτοις ἢ ἐν φαρμάκοις ἢ
 ἐν ἄλλοις πρὸς τῶν προσσφύρειν-
 20 ῶν συσπτοποιουῦντες. ὅθεν τὸν
 ὑποπιέοντα δεῖ παραμετρεῖν
 τὰ κατηρπισμένα τῶν ἐδεσμά-
 των, καὶ πᾶσαν ἐπιτεταμέ-
 νην ποιότητα γλύκειν, ὅσαι εἰ-
 σὶ διὰ τῶν γλυκέων ἢ ἀλυκῶν
 ἢ ὀξέων διαφυλάττεσθαι καὶ τὸν
 25 δεδιψηκότα ἢ πεινῶντα δὲ ἐ-
 πιτάσσειν, μὴ ἀδρόως πίνειν
 ἢ ἐδίειν προσέχοντας τῇ ποιό-
 τητι τούτων, μάλιστα δὲ ψυχρὸν
 ὕδωρ προσλαμβάνειν πίνοντας.
 ἀπα-

quem esse difficillimum pleri-
 que maiorū arbitrantur, quod
 dantes clam venena, ita infi-
 dias temperant, ut peritissi-
 mum quenque decipiant. Si-
 quidem venena sua amaritu-
 dine, permittis dulcibus, spo-
 liant, & graue odoris virus mi-
 stura odorum eximunt:
 aut medicamenta immiscunt,
 quæ tuendæ sanitatis gratia da-
 ri putantur: & præsertim in
 valetudine, ut absinthium, tra-
 goriganum, fatureiam, aut hyf-
 sopum, quinetiam thymum,
 irim, origanum, abrotonum,
 castorium, aut si quid medica-
 mentis purgatoriis cognatam
 habere qualitatem videatur.
 Aut potionibus inserunt: ut vi-
 nis asperis, iuribus, passo, mul-
 læ aquæ, musto, succis, ut in
 cremore lentis, polentis: aut
 medicaminibus, aut aliis quæ
 assumuntur edulij speciem re-
 ferentibus. Quare qui in ea
 suspitione sunt, cõditos cibos
 vitare debent, omniq; intenso
 sapore dulcium, aut salforum,
 aut acidorum, abstinere: nec
 sitibūdī affatim bibere, aut esu-
 rientes voraciter comesse, sem-
 pérq; ad sapore horum dilige-
 ter attendere, præsertimq; po-
 tu frigidam aquam præsumere.

Satiare

DIOSCORIDIS

Satiato enim appetitu, qualitates ægerrimè postea concoquuntur. In ægris quidem facile cauemus potiones auxiliij prætextu dari solitas, quas offerunt improbi veneficorum: artifices: itaque ob id laborantes morbo non perinde audentium iniuriis patent. Et hæc quidem ne facile incauti seductique homines capiantur dolis veneficorum, ratio est, & facultas. Sed alia superest expeditior, vt suspiciosi aliqua præsumant, quæ venenorum vires hebetent, & inefficaces irritasque reddant: cuiusmodi caricæ sunt cum iuglandium nucibus manducatæ, & quæ cedromela vocant, id est citria, feminisque napi drachma cum vino. Item folia calaminthæ, aut creta quæ Lemnia sphragis appellatur, pondere pari cum vino: aut rutæ folia & nucis iuglâdis nucleum: aut caricæ duas, & salis callû ieiuni fumant, & nullo veneni genere lædentur. Antidota ex vino sumpta eûdem effectum præbent: inter quæ intelligitur magnû Mithridatium, & quod scinco, & quod sanguine temperatur. Quin & sæpe venenis obfistunt peculiares quidâ

ἀποπληρωθείσης γὰρ τῆς ὀρέξεως, ἀπεπτότατοι γίνονται τὸ λοιπὸν αἱ ποιοῦντες· καὶ ἐπὶ μὲν τῶν ἀδενούων, καλῶς παραιτούμεθα τὰς * παρὰ τῶν ἐν ἑσὶ ὠφεία διδούσας φαρμάκων πίσεις, ὡς εἰσφέρεισιν οἱ κακουργόντες τὰ δηλητήρια· ὥς τε διὰ τοῦτο δυσεπιχειρήτοις γίνεσθαι τοὺς νοσοῦντας. καὶ ἡ μὲν πρὸς τὸ μὴ ἐνχερῶς ἀλίπεισθαι πλανωμένων ἐφοδος, αὕτη. ἑτέρα, δὲ ἢ τις ὅστιν ἀνυτικώτερα, δεῖ τοὺς ὑποπτεύοντάς τι πικρὸν, περιλαμβάνειν τι, καὶ ἀδιώατα κατασκευάζειν τὰ φάρμακα· ὥς τὰς τε ἰχθῆδας μασσωμένων μετὰ βασιλικῶν καρῶν, καὶ τὰ κα-
 λούμηναι δὲ κεδρόμηναι, βουνιά-
 δος τε σπέρματος ὀλκὴν μετ' οἶνου, ἢ χαλαμίνθης πῶν φύλλων ὁμοίως, ἢ μίλτου τῆς καλουμένης λιμνίας σφραγίδος, τὸ αὐτὸ πλῆθος αὐτῷ οἴνῳ· ἢ πηγᾶ-
 νοῦ φύλλα καὶ καρῶν βασιλικῶν τὸ ἐντὸς, ἢ ἄλλων χόνδρον καὶ ἰχθῆδας δύο νήσεις περισπερέδωσαν, καὶ ἑσ' οὐδενὸς ὑποῦν βλαβήσονται φαρμάκου. καὶ ἀντίδοτοι δὲ περιλαμβανόμεναι μετ' οἴνου τὸ αὐτὸ ποιοῦσιν· ὧν ὅστις ἢ διὰ τοῦ σίγκου, καὶ ἢ διὰ τῶν αἱμάτων, καὶ ἡ καλουμένη μεγάλη μινδριάδος ἀντιπάχισι δὲ πολλὰς καὶ ἰδίους γκρίσεις
 σωμα-

σωμάτων αἱ πρὸς διαθείσεις. διὰ πινυς βρωμάτων ἢ πομάτων ποιότητος, ἢ ἀλλήδους οἴνου· ἐκλύουσι γὰρ τὰς ἐνεργείας τῶν ὀπσαρμύων φαρμάκων, καὶ τὴν ἀγάρδου αὐτῶν καλύουσι πρὸς πεπληρωμῶν τῶν πέρων ὑπὸ τῆς περιηφείσης τροφῆς. Ἐπειδὴ δὲ καὶ περσάσεις πινὲς ἐν ἀποδημίᾳ δέχα ὀπβουλῆς πλάκας ὀπφύρουσι ὁμοίοις κινδύνοις, ἀναλκῆσον ὑπολαμβάνω καὶ περὶ τούτου διαλαβεῖν. Δείξει γὰρ περὶ τὸν μὲν ἐν ὑπαίθροις τόποις, ὡς θυμὰ τὸν ἔχειν. καὶ ἐτοιμάζειν τὰ πρὸς βρώσιν καὶ πόσιν. Δεύτερον δὲ ἐν ὑποσέχω* ἐπιμελῶς καταμαρτάζειν τὰς ὀρεφάς. πλάκας γὰρ ἐκ τῶν ὑπερκειμένων ἀπὸ τῆς ζωῆς φθοροποιὰ, ὡς περὶ φαλάγγια. καὶ ἄλλα πινὰ ἐρπετά. καὶ ὁ καλούμενος ἀσκαλεωτής. καὶ τοῖς παρὰ χέουσι δὲ τὸν οἶνον ἀργείοις ἐναρζῶς καὶ ἐπιμελῶς προσέχειν δεῖ. ἔλκεται γὰρ ὑπὸ τῆς ὀσμῆς τοῦ οἴνου τὰ ἐρπετά, ἃ πινὰ πλάκας πίνοντα μὲν τὸν ἰὸν ἀπώμεσαν, ἐμπιπύοντα δὲ ἀπώμεσαν, καὶ ἀπωλείας ἐχθρόντο αἷτια τοῖς προσενεγκέμενοις. Πρὸς μὲν τὸ ἀντιβούλευτον εἶναι, καὶ προσφύλασσεσθαι, ταῦτα εἰρήδω. εἰ δὲ πινες ἐκοιτάζοντες προσετέχοντο, ἢ καὶ ἐξ ὀπβουλῆς πιν

corporū affectus certo quodā modo cōstitutorū cū quādā cibī potūsque qualitate, tū vini copia ita tēperatorū, vt cū venenis dissentiāt: siquidē ingesti veneni vires frangūt, atque iā priore alimento farctis praelusisq; meatibus, obstat ne membratim per digestionem insinuetur. Verumenimuerò, quoniā fortunæ necessitas interdū similia discrimina peregrè agentibus affert, absque vllis insidiis hominū, nō nihil differendum mihi de hac re necessariū duco. Iam primū igitur culinā apparare loco subdiali cōuenit, cibósque & potus in huiusmodi loco struere. Si id fieri cōmodè nequit, secunda erit cōditio hæc, apparādi apponēdiq; sub tecto. Sed tū diligēter laquearia animaduertēda: frequenter enim à superioribus cōtabulamentis animalia decidūt, exigua quidē, sed quæ nō modicā perniciem moliantur, vt phalāgia, stelliones, & alia quādā reptilia. Porro vinaria vasa diligēter intuerit oportet: inaque reptilia odore vini illiciuntur, quæ interdū sorbendo, noxiū virus eructarūt, interdū verò delapsa immersaq; expirarūt, & exitij causas hauriētibus attulerunt.

DIOSCORIDIS

Sed hæc hæctenus dicta sint, ne
cauti & puidi ifidiis pateât. q
fi q sua spôte, aut ex quorundā
ifidiis supserūt, auxiliari primo
quoq; tpe oportebit: siq; dē dū
comites singulorū venenorū
notē expectāt, imedicabile fit
venenū, & paulisper neglectū,
medicamētis egrē cedit. Quare
fi q, p cōperto se virus sup fisse
intelligāt, & fateāt, aut corū q
aderāt testimonio cōstet, proti-
nus ad idonea remedia trāseū-
tes, facilē peculiari natiueq; cō-
stitutiōi restituem⁹. Neq; enim
iis assentimur, q proifus auxilia
ī huiuscemodi frustra adhiberi
cōtēdūt. Quo. n. modo morbi,
quorū causē cecē latētēsq; cor-
porib⁹ insidēt, medicinā admit-
tūt, & q forinsec⁹ incurrūt ve-
nena, medēdi rationē aspernā-
tur? Equē verò oēs morbi pro
causarū igruētiū magnitudine,
prōq; antecēdētib⁹ affectiōib⁹
qualitib⁹sq; qb⁹ sit opportunū
corp⁹, vel medicabiles sunt, vel
nullis cedūt medicamētis. q si
q forsan obmutescētes, aut te-
mulēti, aut nolētes alioq vene-
nū à se egeri, nullā nobis ei⁹ co-
gnitionē prēbeāt, tū ptn⁹ acce-
dēdū ad ea q cūmuniter epō-
tis qbuscūq; venenis opitulari
cōsueuerūt. Atqui nullū magis
īn omnia

των λάβοιεν, δέλοιται μὴδὲν ἀνα-
εσθουμένους βοηθεῖν· εἰς γὰρ τὸ πε-
ριμῶν τὰ παρακολυθούσα ση-
μεῖα ἐκάστου τῶν φαρμάκων ἀνία-
τὸν ἔστι. δυσθενητῶν αὐτῶν διὰ
τὸν χρόνον γινόμενων· ἐὰν μὲν ἔν
οἱ προσωθεν γὰρ αὐτοὶ νοήσαντες ὁ-
μολογήσωσι τὸ ποδὲν φάρμακον,
ἢ τινες τῶν συμπαρόντων, παρα-
χρῆμα ἐλθόντες ἐπὶ τὰ κατὰ λ-
ληλα βοηθήματα, ῥαδίως εἰς τὸ
κτ' φύσιν καὶ οἰκείον ἄξιωμα αὐτοῦ 10
κατάστημα. οὐ συγκατατιθέμε-
θα τοῖς λέγουσιν ἐπ' αὐτῶν κατὰ
παῖ ἀδεράπειτα γίνεσθαι. πῶς
γὰρ τὰ μὲν ἐπὶ τῶν ἐν τῷ σώ-
ματι γινόμενων αἰτίων πᾶσι, θε-
ραπείαν ἐπιδέχεται, τὰ δ' ἑσθ' 11
τῶν ἐξωθεν συμπίπτοντα φαρμά-
κων ἀδεράπειτα τύγχανε; ὁμοί-
ως γὰρ πάντα τὰ περὶ τὰ σώματα
γινόμενα νοσήματα, θεραπεύτα-
τα καὶ ἀδεράπειτα, κτ' τὰ μεγέ-
θῃ τῶν προσπιπτόντων αἰτίων, καὶ 20
ταῖς περιδιαδέσεσι καὶ ἐπιτηδεό-
τητας τῶν σωμάτων. εἰ δέ τινες
αὐτῶν κατὰ ληφθέντες ἀφωνίαις
ἢ παρόνιαις, ἢ ἄλλω διὰ τὸ μὴ
βέλεσθ' ἐξάγειν αὐτὰ ἀσυμφανές
ἡμῖν ποιοῦσι τὸ φάρμακον, τότε 25
δεῖ ταχέως ἔρχεσθαι ἐπὶ τὰ κοι-
νῶς ἀρμόζοντα τοῖς οἰονδύπτει
φάρμακον πεπωκόσιν. οὐδὲν δὲ
δυνατὶ κοινότερον βοηθήμα δέ-
δοται, τοῦ τὸ δοδὲν φάρμακον
πρὸς

πρὸ τοῦ ἐπιχύσται, διὰ τοῦ ἔγ-
 ρισαι τοῦτον καὶ οὖν εἰς τὸ ἐκτός.
 ὅθεν μηδὲν ἀναβέβηκεν ὡς περὶ
 φέρειν δεῖ ἔλαον θερμὸν, ἢ καὶ
 ἰδίαν ἢ μετ' ὕδατος ἐμείναι
 5 ναυγάζοντας. εἰ δὲ μὴ παρείη
 λαὸν τῶν τόπων μὴ φερέντων,
 βούτυρον ἀντὶ ἑλαίου μετ' ὕ-
 δατος θερμοῦ ἢ μαλάχης, ἢ λι-
 νοσπέρμου ἢ τράχου, ἢ τήλεως,
 ἢ κνίδος σπέρματος, ἢ χόνδρου
 10 ἀφελήματος. οὐ μόνον γὰρ κε-
 νώσκει ταῦτα διὰ τῶν ἐμέτων ἐν-
 χειρὸς χαλασμοῦ καὶ ναυτίας ἐμ-
 ποιοῦντα, ἀλλὰ καὶ ὑπάζει τὴν
 κοιλίαν, καὶ ἐναντιώσεται τῇ
 κενώσει τῶν σωματίων, ἀμβλυ-
 15 πικρὰ τῶν δειμυτήτων καὶ δεσ-
 τα. ἔστι δὲ ἐναργῶς καταλαβέ-
 σθαι τοῦτο· εἰ γὰρ τις ἐλκώσεται
 περὶ αὐτὸν ὡς δι' ἀσβέσου, ἢ
 τρυγῶς ἢ καρδαμίδος ἢ πηγὸς ἄλ-
 λου δειμύως τὸ σῶμα, ὑποχρί-
 20 σαι ἑλαίῳ, οὐχὶ ἐλκωθήσεται ὑπὸ
 τούτου. καὶ μὲν οὐδ' εἰ τις συνί-
 θελήσει ἰσχυρῶς ἢ ψύξει, διώσεται
 περὶ τοὺς παύων. ἔστι μὲν ἐμετος οὐ
 μόνον καὶ ὁ κενὸς καὶ ἀποκρίνει
 τὸ βλάπτον ὠφελεῖ, ἀλλ' ὅτι καὶ
 25 δέικνυσιν τὸ λιθοῦν ἐπίοτε, ἐκ τε
 ὀσμῆς ἢ θρόμβων ἢ χρώματος
 πηγῶς· ἐκ μὲν γὰρ τῆς ὀσμῆς, καὶ
 πικρίας, μυκώγειον· ἐκ δὲ χρώ-
 μιμίδιον ἢ γύλον ἀπὸ τοῦ θρόμ-
 βου, γάλα ἢ τὸ νεοσπαγὲς αἷμα
 ἀπὸ

in omnia valēs auxiliū dari po-
 test, q̄ vt proximo loco vir⁹ fo-
 ras exhauriatur, priusq̄ inuale-
 scat. Quare sine mora, calidū
 oleū ex aqua, aut seorsū, vt vo-
 mitare cogātur, dari conuenit.
 Aut si oleū natura loci negat,
 butyrum cum aqua calida, aut
 malua, aut lini semine, aut tra-
 go, vrtica, foenogreco, aut hali-
 ce decocto, vicē ei⁹ exhibebit.
 Hęc.n. nō modò vomitionib⁹
 exigent vi illa sua laxatrice, aut
 nausēā ciēte, sed aluum quoq;
 subducēt, & corporū inanitione
 ita aduersabūtur, vt acrimo-
 nias venenorū hebetent. Id qđ
 euidenter huiuscemodi argumē-
 to deprehendere licet: Est, vt
 quisq; viua calce vel fæce, aut
 cātharidib⁹, aut alio quouis a-
 cri, corp⁹ exulcerare statuerit,
 is si ipsū oleo leniter illinat, ex-
 ulcerationē nō accipiet. Atqui
 neq; vehemēter adstrīgi corp⁹,
 neq; refrigerari poterit, si an-
 tea perungat. Quinetiā vomit⁹
 non ob id modò qđ vacuet, &
 noxiū humore excernet, iuuamē-
 tū adfert, sed qđ affūptū vir⁹
 nōnunq; odore, coagulatis gru-
 mis aut colore, pdat: q̄ppe cū
 odore & amaritudine, meco-
 niū: colore, cerusā, gypsum ve:
 grumis lac aut sanguinem ani-
 malis

DIOSCORIDIS

malis recens iugulati ostēdat. Nam grauis odor regestorum, leporis marini, aut rubetæ veneficia deprehendit, ita vt nō nulla ab iis remedia peti possint, ad idonea singulorum auxilia trāseuntibus. Oleo etiā maluæ decoctum admiscetur, aut glauciū, aut adeps anserinus, aut pinguiū carniū iura, aut lixiuium lignorū cinere factum. Vbi verò vomitus diligēter citatus fuerit, ne quid in ventre coierit, quæ hæserunt intestinis reliquæ, clystere acri deuocentur. Facit & nitrum tritum cum hydromelite sumptum & vina vetera liberalius epota, gallinacea iura, præpingnes pisces, vetustæ carnes pinguésque, & quæ adipe aut recenti butyro parantur. Aluum nanque subducūt, vti diximus: & stomachum resoluētia, prouocantem ipsum ad vomitionem reddunt: & venenorum acrimonias hebetant, atque meatus obstruentia, celerem virium penetrationē inhibent. Quibetia medicamenta dantur, quæ communi dote profunt: vt Lemnia terra, agaricum, abrotonum, irio, radix eryngij, semen pastinacæ, & calaminthæ, nardum gallicum, casto-

ἀπὸ δὲ βρώμου καὶ ποιότητος τῆς ἐμουμένου καὶ ὀσμῆς, λαχρὼν θαλάττιον καὶ φρυγῶν, ὡς διὰ τοῦτο ἢ δι' ἕτερον ἕνα δυνάσθαι βοηθεῖν, ἐρχομένων ἐπὶ τὰ ἐκείνῳ ἀρμόζοντα βοηθήματα. παρὰ μύνηται δὲ τῷ ἐλαίῳ μαλάχης ἀφέψημα, ἢ γλαυκίον, ἢ σέαρ χλωεῖον, ἢ ζωμὸς ἐκ λιπαρῶν κρεῶν ζεχνῶς, ἢ κοιλία ἢ διὰ τῶν ξύλων. κομισσάμενους δὲ διὰ τῶν ἐμέτων ἐπιμελῶς, διὰ τὸ μηδὲν ὑπολείπεσθαι ἐν τῇ κοιλίᾳ, τὸ ἐμμεῖναι ἐν τοῖς ἐντέροις κλύσματα δειμὶ κομιούμεθα. πιεῖ δὲ καὶ τὸ νίτρον λεῖον συνὺδρῶ μέλιτι παρὰ γλαυκάνομενον, καὶ οἶνοι πολλοὶ καὶ παλαιοὶ πινόμενοι, καὶ ζωμοὶ ὀρνίθων, ἰχθύων λιπαρῶν, καὶ κρέα παλαιὰ καὶ λιπαρὰ, καὶ τὰ διὰ σέαιτος ἢ βουτύρου προσφάτου. ἐπὶ πάντων γὰρ πρὶν κοιλίαν ὡς πρὲρ εἶπεν καὶ τὸν σῶμαχον ἀναλύοντα, ἐπιμὸς τε ἐν κατασκευάζει τὸν σῶμαχον πρὸς τὸν ἐμέτον. ἀμβλυαί τε πρὶν δειμύτητα αὐτῶν, καὶ παρεμπλαστέμενα τοῖς πόρεσι κολύει πρὶν δξύτητα τῆς τῶν φαρμάκων δυνάμεως. δίδονται δὲ καὶ ἀρμόζοντα φάρμακα κοινῶς. ὧν ὅτι ἡ κλημνία μέλιτος, ἀγρικόν, ἀλρότονον, ἐρύσιμον, ἡρυγίου ρίζα, σαφυλίνου σπέρμα καὶ χαλαμίνθης, γάρδος κελτικῆς,

πασόειον, γάρηκος χλωροῦ ἐν-
 τρειώνη, νηρίου τοῦ καλουμένου
 ῥοδόδένδρου ἄνθος, περασίου γυ-
 λῆς. σίλφιον, ἢ ὁ ὅπως αὐτοῦ, σα-
 γάπηνον, ὁ ποταμός, πευκεδάου
 5 ὅπτες, καὶ ἡ ῥίζα * ὡ καὶ μαγύ-
 δαειν ἐκάλεισαν, ἀειστολογία μα-
 κροῦ, πιγάνου ἀγρίου σπέρμα, κέ-
 σρου τῆς βετλονίκης καλουμένης
 τὰ φύλλα. διδεται δὲ ἕκαστον
 σιὼ οἶνω < ἁ πλῆθος. ποιεῖ καὶ
 10 πολλοῦ ἀφέψημα * καὶ σέσσει
 καὶ πῶσα ὑγρὰ λεία ἐκλειχο-
 μῆν. ἡναιότατα δὲ βοηδοῦσι
 καὶ ἀντίδοτοι, ὅτι τὰς σκευασίας
 ἐπὶ τέλει ἀναγράφουσι. κοινῶς
 15 ὅ βοηθητέον τοῖς τὸν τρέπον
 τοῦτον· διωγτὸν δὲ καὶ ἐν τῶν
 παρεκκοιδοῦντων συμπτώμα-
 των, κοινὰ καὶ τὰ βοηθήματα
 συμπαραλαμβάνεσθαι. σχεδὸν
 γὰρ αἱ τῶν πλείων φαρμάκων
 διώξεις, εἰς ὁμοιοτρόποις πε-
 20 ριάγοισι τὸ σῶμα διαδέσεις. δι-
 ὡ αἰτίαν ἐπὶ τῶν πλείων τὰ
 κοινὰ βοηθήματα ἀνύει· ποικίλα
 μὲν γὰρ τὰ δηλητήρια φάρμακα,
 κοινὰ δὲ καὶ οὐ πολλὰ αἱ ἐξ αὐτῶν
 γινόμεναι διαδέσεις. ἀδιώατον
 25 γὰρ πάντα τὰ συμπτώματα ἐν
 παρεκκοιδοῦνται. εἰ γὰρ ὡ τοῦ-
 το, παρεῖλκεν αὐτὴ καὶ ἕκαστον
 φάρμακον διὰ τῶν βοηθημάτων
 περὶδοσις. τό τε γὰρ ἀγγεῖν σῶμα-
 χόν τε λῆαν καὶ ἔντερά. ἢ πᾶρ τε
 καὶ

castoriū, ferulę virentis medul-
 la, flos rhododēdri, succus mar-
 rubij, laser aut laserpitium, fa-
 gapenū, peucedani succus, aut
 panacis, & radix quam magu-
 darim appellarūt, aristolochia
 longa, sylvestris rutę semē, &
 betonica, quā cestron nomi-
 nāt, folia: singula cū vino dra-
 chmę pondo sumi debēt. Effe-
 ctum prębet polij decoctū, &
 feseli, & liquida pix linctā. Ma-
 gnificę ferūt opę antidota, quę
 in calce operis scripta reliqui-
 mus. Cōmunis ratio pręstandi
 auxilij ita se habet. Cęterū ab
 iis quę consueuerunt euenire,
 cōmunia remedia sumptuari
 possunt. Ferē enim vires vene-
 norū quamplurimorū, in affe-
 ctus cōsimiles corpus tandē
 redigūt. Quam ob causam ple-
 risq; cōmunia conducūt auxi-
 lia: varia etenim sunt veneno-
 rū genera, cōmunes tamē nec
 multi iidē affecti oriūtur. Neq;
 fieri potest, vt oēs cōcurrētēq;
 casus quę symptomata vocāt,
 vnū venenum sequātur. Alio-
 quin superuacanea fuisset ve-
 nenorū singulorū traditio cū
 suis remediis ab authorib; de-
 scripta, Neq; verò in vno eo-
 dēq; promptū est inuenire, vt
 quis stomachi, alui, intestinorū,
 iecoris

DIOSCORIDIS

iecoris, renū, & vesicæ dolore
vehemēter crucietur, vt singul-
tiat, erodatur, contremiscat, re-
frigeretur, obmutescat, cōuella-
tur, pulsus elanguescat, spiritus
difficilis fiat, veterno prema-
tur, vertigo obuersetur, caligēt
sensus, strāguletur, sitiāt, sāguis
erūpat, febre cōfliktetur, ægrē
Iotium reddat, torminibus ve-
xetur, crebrò vomitet, nausea
prematur, rubescat, liuore su-
gilletur, palleſcat, desipiat, ster-
tat, virib⁹ deficiatur, & pleraq;
alia faciat, patiatūrque: singula
enim in generales affect⁹ dedu-
cta, pauca numero, & commu-
nia ea demōstrāt, quæ euenire
cōsueuerūt. Quare in singulis
quæ suprā dixim⁹ nō facile fue-
rit deuoratū virus cognoscere.
Nam oris & linguæ erosio, sto-
machi, vētris, vesicæ ac renum
inflāmatio, vehemēs vrinæ dif-
ficultas, & interdū cruoris cū
eo exitus lācīnatio, & in pluri-
mis partibus quidā adustionis
sensus, nō in cātharidibus mo-
dō potis reperiūtur, sed in eru-
cis quoq; pinorum, & bupre-
ste, & salamandra. Porrò non
modo eos qui meconium hau-
serūt, veterno aut sopore pre-
mi, stertere, liuore sugillari, tor-
pere, refrigerari, stupeſcere,
toto

καὶ νεφροὺς καὶ κύστιν, ἐπὶ δὲ λυ-
ζειν καὶ δάκνυντα καὶ τρέμειν,
ἀφρόνους τὲ εἶναι καὶ περιψύχε-
σθαι, ἀπᾶντα τε καὶ ἀσφυκτεῖν
καὶ δυσπνοεῖν, καὶ καταφέρεσθαι
καὶ σκοποῦνθαι καὶ πνίγεσθαι καὶ
διψᾶν καὶ αἰμορρᾶσαι, πυρέσ-
σειν τὲ καὶ δυσουρεῖν, καὶ σπο-
φοῦνθαι, καὶ ἐμῖν πυκνὰ ἢ ναυ-
πᾶν, ἐρυθραίνεσθαι τε καὶ πε-
λιδνοῦνθαι καὶ ὠχρεῖσθαι, παρὰ
φρονεῖν τε καὶ ῥέγχειν καὶ πα-
εἶδαι, καὶ ἄλλα πολλὰ ποιεῖν καὶ
διάφορα πάσχειν ἐνὶ μόνῳ δύσκολον
εὐρεῖν παρὰ τὸ μῦθον, ἕκαστον
μειδιὲν εἰς καθολικὰς διατά-
σεις ὀλίγων ἀειδήμων καὶ κοινῶν
ὑποδείξας συμπληρώματων. διὸ
καὶ ἐφ' ἑνὸς ἕκαστου τῶν περιηρη-
μένων οὐκ εὐκόλον τὸ εἰλημμέ-
νον φάρμακον γινώσκειν. τὸ γὰρ
δάκνυντα τὸ σῶμα καὶ γλῶτταν,
καὶ φλεγμαίνειν σῶμα καὶ κοι-
λίαν τὲ καὶ νεφροὺς καὶ κύστιν, δυσ-
ουρεῖν τε ἰσχυρῶς, ἐνίοτε δὲ καὶ
αἷμα δι' οὐρῶν πορεύεσθαι, καὶ λα-
κιδνοῦνθαι, διαπεπρωμέναι τε πολ-
λὰ μέρη τοῦ σώματος, οὐ μόνον
ἐπὶ χανδαείδων εὐεῖσκειται πα-
ρακολουδοῦντα, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ π-
τυοχόμης καὶ βουπρήσεως καὶ
σαλαμανδράς. τὸ τε καταφέρεσθαι
ἢ καεῖνθαι ἢ ῥέγχειν, περιψύ-
σθαι τε καὶ ἐρυθραίνεσθαι καὶ καταψύ-
χεσθαι καὶ ναυγᾶν, ἀνεδιπτεῖν τε
καὶ ὀδύ-

καὶ ὁ δαξέειναι τὸ ὅλον σῶμα, οὐ
μόνον τοῖς τὸ μυκάνειον περι-
κίσει παρέπιπται, ἀλλὰ καὶ τοῖς
μασδαγόραν ἢ κόνειον περὶ
ἐνεγκυρίοις. τό, τε παρὰ φε-
5 νείν, οὐ μόνον ὑοσκύαμος ἐπιφέ-
ρει, ἀλλὰ καὶ τὰ τοξικά καλού-
μενα τῶν φαρμάκων. καὶ ἀκόνι-
τον δὲ, καὶ τὸ μέλι τὸ χυνώμε-
νον ἐν ἡρακλείᾳ τῇ ποντικῇ. καὶ τὸ
πνίγεσθαι δὲ οὐ μόνον ἐπὶ μυκί-
10 των ὁρᾶται, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ αἰ-
ματος ταυρείου, καὶ γάλακτος καὶ
ἀκονίτου καὶ γύψου καὶ ψιμμι-
δίου. καὶ καθόλου δύσκολον ἐὰν
δέλῃς εὐρεῖν σημεῖον διωάμερόν
τι τῶν πινόμενων καὶ χυμώων
15 φαρμάκων δηλώσαι. καὶ μάλιστα
ὅτι κοινὰ καὶ τοῖς ἄλλοις. ἐπι-
γνομήοις πάρεσι παρὰ κολου-
δεῖ ταῦτα. πλὴν ἐπὶ μὲν τῶν
ὀξέως ἀναέρουντων, ἔστι περὶ καὶ
σημειώσασθαι τὰ βλεπόμερόν ὡς
20 παρὰ δώσω μιν. ἐπὶ δὲ τῶν χρο-
νίας διαδέσφας παρὰ σκευάζοντων,
δύσκολον οὐδὲν πρὸς τὴν διεξ-
πίαν τοῦ περὶ τὴν σημείωσιν
δυσχερεῖς βλάπτοντος, ἐκφυγόν-
τα γὰρ τὴν ὀξύτητα τῆς αἵερ-
25 γείας τὰ φάρμακα, καὶ μετα-
ληφθέντα εἰς χρονίους, κοινῶς
καμβαίνει τοῖς λοιποῖς πάρεσι
τάς κατὰ σκευὰς, καὶ τὰς βο-
δείας, τῆς ἰδιότητος τῶν πινόμε-
νων φαρμάκων μικρὸν ἐνούσης.

δια

toto corpore pruritus senti-
re, sensu priuari constat, sed eos
etiam qui mandragorā aut ci-
cutam deuorarūt. Deliriū non
hyosciamus tantum infert, ve-
rum etiā quæ toxica appellan-
tur: itidem aconitum, & mel
quod in Heraclea Pontica gi-
gnitur. Stangulatio non minus
in fungis, quàm in sanguine
taurino, lacte, aconito, cerusa,
gypso conspicitur. In summa,
difficile vnū vni veneno pro-
prium inuenire signum, quod
haustum, gustatumque virus
prodere possit: maximè quod
hæc cæterorum etiam vitio-
rum, quæ in corpore exori-
untur, communia sequi so-
lent. Cæterum in his quæ ce-
leriter enecant, noxam signis
forsitan indicare possis, si ad
ea respexeris quæ sumus dictu-
ri. Sed in iis qui ad longas æ-
gritudines spectant, nihil ad
medendi rationem difficile,
dūtaxat quod pertineat ad in-
dicia noxæ, vtpote cum ve-
nena statim atque præsentia-
neam vim illam perdiderunt,
transmutata in longos affe-
ctus, cōmunia reliquorum vi-
tiorum remedia, compositio-
nēque flagitent, cum venefica
proprietas non amplius insit.

S Si verò

DIOSCORIDIS

Si verò longa sit affectio, in aliquod diuturnorū morborum genus recidet, à quibus facile fuerit medédi rationé assumere. Sed de iis quæ generaliter auxiliantur, hætenus. Consequenter quæ priuatim singulis profunt, scriptis mādabimus, si prius sigillatim exposuerimus, quæ ex singulis ordinibus exitialem aut maleficam vim fortiūtur, vt medicinæ studiosi ea cautè obseruēt, quæ ad rationé salutis scripta inueniuntur: quoniam nonnulla eorū quibus vtūtur, venenis sint commista. Incuria enim magnas adfert noxas, & sæpe cōtinuo vsu eorū, homo in pernicié agitur. Proinde animalia quæ exitiosā vim habēt, hæc sūt: cátharides, buprestis, samādra, pinorū erucæ, lep^o marinus, rubeta, & rana palustris muta, deuorata hirudines. Semina sūt: hyoscyam^o, coriadrū cicutā, gith, psylliō. liquamēta: meconiū, opocarpasō, thapsiæ succus, elateriū, mandragoras. Radices, quas mittit chamæleo, aconitū, thapsia, veratrū, ixia, agaricū nigrum, ephemerum, quod aliqui Colchicum vocant, quod in Colchide nascitur. Herbae oleraque: similax, quā aliqui tithymalū appellāt,

διαδέσεως δὲ χειρὶν κατεσκε-
υασμένης ἐπ' αὐτῶν ἢ διὰ δεξι-
παιτῶν εἰς ἐν πηλὸς τῶν χει-
νῶν ἐμπέπει παθόν, ἐφ' ὧν ἐν-
χέρεις ὅτι καὶ τὴν δεξιπείαν ἀνα-
λαμβάνειν. καὶ τὰ μὲν κοινῶς βο-
θουῦντα ταῦτ' ὅστιν. οἷς ἀκολου-
θῶς ἀναγράφωμεν καὶ τὰ διὰ ἐκ-
σοῖς ἀρμόζοντα προσεκδέμενοι ἐφ'
ἐν ὅσα φθαρτικὴν ἢ κακοπικὴν ἔχει
δύναμιν ἐκείνης τάξεως, καὶ ἵνα πε-
φυλαχθῶς εἴ τινα τῶν πρὸς ὑ- 10
γείαν ἀναγεγραμμένων φαρμά-
κων ἔχῃ τινα τούτων μεμιγμέ-
να φάρμακα οἱ φιλαστροῦντες οἷς
χρῶνται. τὸ γὰρ ἀπειρίσκητον με-
γάλας ἐπιφέρει βλάβας, καὶ πολ-
λάκις διὰ τὴν συνεχῆ χρῆσιν αὐ- 15
τῶν, ἀπωλείας αἰτια γίνεται.
ζῶα μὲν οὖν ὅτι φθαρτικὰ τὰ
δε· καυθαρίδες, βούρκοις, σα-
λαμάνδρα, πειτυοχάμη, λα-
γῶς θαλάσσιος, φρυγὸς ὁ λεῖος,
βάτραχος ἑλεῖος ἄφωνος, βδέλλ- 20
και καταποδεῖσαι. σπερμάτων,
ὕοκύαμος, κόρειον, κώνειον, με-
λαύδιον, ψύλλιον. ὁπσημάτω-
δὲ μνηκώτειον, ὁποκέρκασον, θα-
ψίας χυλὸς, ἐλατήριον, μαλδρα-
γῶρας, ριζὼν δὲ χαμαιλέων, ἀκό-
νιτον, θαψία, ἑλλέβορος, ἱξίας, ἀ-
γαικόν τὸ μέλαν, ἐφήμερον ὃ ἐ-
νιοὶ κολχικὸν καλοῦσι διὰ τὸ ἐ-
κολχίδι γινεσθαι. ποτὶν δ' καὶ καχά-
νων, σμίλαξ, ἢ ἔναι* πιδύμακον,
Roma-
ῖο μαῖο

ῥομαῖοι ὃ νάξιον ἢ τάξον καλῶσι, ἐρύχρον μαρικόν ὃ καὶ δορύκνιον καλοῦσιν, ἢ τε σαρκώδους πᾶσα οὖσα βατραχίου εἶδος, μήκων, κερκίτις, φθαεικόν, τοξικόν, πήγανον ἄγριον, μύκητις. ἀπὸ ζώων δὲ αἷμα ταύρειον νεαρόν, καὶ τὸ ἐμπυτιάδην γάλα, μέλι τε τὸ ἐν ἡερικλείᾳ τῇ ποντικῇ ἡυνώμβρον. μεταλλικὰ δὲ, γύψος, ψιμίδιον, πίτανος, ἀρσενικόν, 10 σανδαράχαι δύο, λιθάργυρος, ἀδάρκι, μόλιβδος, καὶ ἡ καλουμένη ὑδράργυρος. πῶν δὲ συμφύλων, οἶνος ἀπρώως ποδῆς πλεῖς ἀπὸ βαλανείου ἢ γλυκὺ, ἢ ψυχρὸν ὑδὼρ ὁμοίως.

15 Περὶ Κανθαρίδων. Κεφ. α'. Τοῖς ἐν κανθαρίδας περσενεχαμύοις, παρέπε) χαλεπώτατα σημεῖα. χρεὼν γὰρ ἀπὸ τῆς σώματος μέλει κώσεως πᾶντα δάκνεται δὲ καὶ αὐτοῖς, καὶ κατὰ τὴν γαστρὴν, πῶς 20 ἢ κατὰ τὰ ὁμοίον τι ἐγγίνεσθαι φέρεται. καὶ τὸ δέξιν ὑποχόνδριον καὶ δυσχερῆσαι· πολλάκις δὲ αἷμα περιέχεται δι' οὐρῶν φέρεται) δι' αὐτοῖς κατὰ κοιλίαν* ὁμοίᾳ τοῖς ἐπὶ δυσεντερικῶν καποδυμίαις τε καὶ αἵταις καὶ σκοτοδιγίαις περιέχονται. 25 ἐπὶ τέλει δὲ παραφέρουσι πλὴν διάνειαν. δεῖ ἐν περὶ τῆς παρακορουθῆται τι τοιοῦτον, ἀναγκαζέειν ἐμῆν, διδόντας αὐτοῖς τὸ ἐλαϊον, ἢ ἄλλο τι τῷ περσενεχαμύον.

καὶ μετὰ

Romani taxum, solanū mani-
cū, quod & dorycniū dicitur:
sardinia herba, quæ ranunculi
genus est, corniculatum papa-
uer, pharicū, toxicum, ruta syl-
uestris, fungi. Ab animalib⁹, tau-
rinus sanguis recēs, coagulatu
lac, mel Heracleæ in Ponto ge-
nitum. Metalla: gypsum, cerusa,
calx, auripigmentum, duo san-
darachæ genera, spuma argen-
ti, adarce, plumbum, & quod
argentum viuum dicitur. E li-
quoribus domesticis: vinum
abunde post balneas potum,
aut passum, & frigida aqua si-
militer.

Cantharides. Cap. I.
Quibus datae sunt cantha-
rides, signa eueniunt gravissi-
ma. Ab ore enim ad vesicam
vsque cuncta erodi sentiuntur,
picē aut similem quiddam ce-
driæ respiciunt, dextra præcor-
dia inflammantur: urinam ægrē
reddunt, & subinde cum loto
sanguineā emittunt: strigimē-
ta non secus atque dysente-
ricis, aluo deferuntur: fasti-
dia urgent: animo linquuntur,
obortaq; vertigine concidunt:
postremò mēte abalienantur.
Ergo antea quàm tale nō nihil
accidat, dato oleo, aut supradi-
ctorū aliquo, vomere cogatur:

Si mox

mox vbi vomitiōe plurima re-
iecerūt, halicæ aut orizæ, tragi
aut ptisanæ cremor, aut deco-
ctū maluæ, aut seminis lini, aut
foenigræ ci, aut radicū althææ,
quam Latinus sermo ibiscum
appellat, clystere infundatur.
Præterea nitrū eisdem dandū,
ex hydromelite, vt quæ stoma-
cho adhuc aut intestinis adhe-
rēt, eluēdo excernantur, ac de-
scēdant. Quæ nisi sic discutian-
tur, ingesta in aluū ex nitro a-
qua mulsa, vacuari debēt. De-
tūr deinde vinū aut passum, in
quo pineoli nuclei, aut cucu-
meris semina contrita sint, aut
ex lacte, aut mulsa, aut anseri-
nus adeps in passo liquefactus.
Inflāmata autē partes hordei
farina cū mulsa decocta perū-
gantur. Ab initio admota ca-
taplasmata nocent, quod cita-
tus ab eis calor, illapsum virus
ita remoratur, vt in principes
se parteis insinuet: ipsa tamen,
interiecto tempore, molestissi-
mis inflāmationibus opitulan-
tur, vtpote quæ dolores & per-
mulceant & leniant. Tum vbi
corpus calfaciente oleo inun-
ctum fuerit, in soliu descēdere
oportet, ac lauare, vt per cutē
summam quæ corpori poxia
inhæserūt, etiam excernantur.

ἢ μετὰ τὸ κομίσει διὰ τὰ πλεῖστα
διὰ τῶν ἐμέτων ἐνέειν διὰ κλυ-
σῆρος χυλὸν χόνδρου, ἢ ὀρύζης, ἢ
πράγου, ἢ πτισάνης, ἢ μαλάχης
ἀφέψιμα, ἢ λινοσπέρμιου, ἢ τή-
λεως, ἢ τῶν ῥίζων τῆς ἀλθαίας, ἢ
ὡς εἰσὶν ὀνομάσονται ῥομαῖοι.
ἐπιδιδόναι τε αὐτοῖς νίτρου σι-
νδρὸς μέλιτι πρὸς τὸ καταβιβά-
σαι ἢ ἐκνέειν τὰ ἐπὶ παρακί-
νῳα τῷ σωματι καὶ ἐντέροις.
καὶ εἰὰ μὴ διακοπῇ, κεκοῦν δὲ
μελικράτον ἐνέειν μετὰ νίτρου.
ἢ ἐπιδιδόναι οἶνον ἢ γλυκὺ, σι-
νδρὸν αὐτῷ σφοδρίων ἢ σι-
κύνων σπέρματος, ἢ γάλακτος ἢ
μελικράτου, ἢ σῆαρ χυμῶν σι-
νδρὸς ἐν γλυκεῖ. τὰ δὲ φλε-
γμαίνοντα μέρη καταπλάσσειν
κρίθων ἀλεύρω ἐφ' ἡμέρῳ μὲν με-
λικράτου. κατασχᾶς μὲν οὖν
παραλαμβάνοντα τὰ κατα-
πλάσματα, βλάπτει διὰ τὸ ὑπὸ
τῆς χρομδύνης θερμασίας κατέ-
χεσθαι τὸ δοδὲν, σκείζον ἐπὶ τοῖς
τόποις ὄντας κρείους χροιδέν-
των ὃ ὠφείλει τὰς χαλεπώτατας
φλεγμονάς, παρηγορεῖν καὶ
παραμυθεύοντα τὰς ἀλγηδόνας.
ἐν ᾧ τέτω τῷ καιρῷ ἀμύρῳ προ-
λιπαῖανται, ἐλαίῳ δεξμαρτικῷ
τὸ σῶμα λῆναι, καθιέντας εἰς ἐμ-
βασιν, ἐκείνῳ ὃ ἡ ἰατρεία, διὰ τῆς
ἐπιφανείας τὰ ἐπιβλάβη παρα-
τιθέντα τῷ σώματι ἐκκρίνειν.

καὶ κατόλου πατοίως δέϊ κινεῖν
 τὰς ἐγκρίσεις, πρὸς τὸ μὴ ἔμμο-
 νοι κατασκευῶν λαμβάνειν τίω
 διάδεσθαι. διδόναι δὲ καὶ κράα ὀρ-
 νίθια καὶ ἀρνία δελφάκια καὶ ἐεί-
 5 σφια, λιπαρὰ δὲ ταῦτα καὶ ἀπαλώ-
 τατα καὶ καθε-ψημένα σὺν λινο-
 σπέρμω· συκοίλια γὰρ ὅτι καὶ ἀμ-
 βλυπηρὰ τῶν δεινέων. καὶ οἴ-
 νον γλυκὺν καὶ πολὺν. ἀρμόζει δὲ
 ἐπ' αὐτῶν καὶ λιβαίου φλοιός, καὶ
 10 γῆς τῆς χαλκιδέας ἀστέρος, ἐκείνου
 < δ'. μετὰ γλυκέος < ἁ λαμ-
 βανομένη. γλήχανον τὸ μὲν ὕδατος
 περὶ φθεῖς καὶ ἱερίον ἢ ῥόδιον μύρον
 μετὰ πηγαίου ἀφελόμενον, καὶ
 ἀμπέλου ἀκρέμονες ἀπαλοὶ λείοι
 15 μετὰ γλυκέος. δινατώτατα δὲ
 πάντων βοηθοῦσιν αἱ ἀντίδοτοι
 πηρόμεναι σὺν μελικράτῳ πηλ-
 λος < δ'.

Πρὶ Πιτυοκέμης. Κεφ β'.

Τοῖς ὃ πιτυοκέμην λαβοῦσιν
 20 ἐνδέας πόνος παρὰ τὸ σῶμα καὶ τὸν
 ἐρσνίσκον παρεκκόλουθε· φλεγ-
 μονή τε ἱερὰ γλώσσης καὶ σωμα-
 χου καὶ κοιλίας καὶ ἐντέραν πόνος
 ἱερὸς μὲν τὸ δοκεῖν ὀδύξειν τὰ
 ἐντός· πύρωσις τε καὶ ὅλον τὸ σῶ-
 25 μα. τούτοις βοηθητέον ὁμοίως τοῖς
 τὰς καρδαμίδας πεπωκόσιν. ἰδί-
 ως δὲ ἐπ' αὐτῶν παρεκκρίματα
 ἀντὶ ἐλαίου ὅτε λιτοῦ καὶ ἱερίου τὸ
 μέλιον, κατασκευαζόμενον ἐκ
 μέλων κωδωνίων καὶ ἐλαίου.

Πίει

Et deiectiones multifariā mo-
 liri oportet, ne affectus infla-
 tur, & stabilitatē capeffat. Gal-
 linaceis carnibus & hoedinis,
 aut suillis catulis, maximè pin-
 guibus & tenerrimis, ac cū lini
 semine coctis, vesci debent: si-
 quidē aluū cient, atq; veneno-
 rū acrimonias hebetant. Vinū
 dulce liberalius ebibatur. Pro-
 dest thuris cortex, & samia ter-
 ra, quæ alter appellatur, si qua-
 ternæ singulorū drachmæ cū
 passo fumantur. Item pulegiū
 ex aqua tritum, irinum aut ro-
 faceum, cum rutæ decocto, re-
 centes vitis ramuli, cum pas-
 so detriti. Longè omnium po-
 tentissimè, antidota auxilian-
 tur, cum aqua mulsa, drachmis
 quatuor pota.

Pinorum erucæ. Cap. II.

Iis qui erucas pinorū haufe-
 rūt, illico dolor in ore & pala-
 to exoritur: vehemēs alui, linguæ
 ac stomachi inflammatio torquet:
 intestina dolor excruciat, ita ut
 pruriginē sentire videātur: cor-
 pus totū exæstuat: fastidiū vr-
 get. Quibus est succurrédū re-
 mediis, quæ deuoratis cantha-
 ridibus dantur. Peculiariter ta-
 mē pro simplici oleo & irino
 melinū quod ē cotoneispomis
 & oleo téperatur, accipiemus.

S iij Bupre-

DIOSCORIDIS

Buprestis. Cap. III.

Qui buprestin biberunt, nō dissimile nitro virus sapiūt: stomachi ventrisq; vehemens dolor insequitur: tam véter quàm stomachus mirum in modum, vt in aqua inter cutem, diffilatus, inturgescit. Vniuersa corporis facies contenditur: vrina supprimitur. Quibus eadē quæ potis cantharidibus auxiliatur. Priuatim post vomitus & vacuationes quas clysterib⁹ molimur, aridæ ficus profunt: item earum decoctum, ex vino. Vbi verò iam ferè pericula inclinantur, Thebaicarum palmarum cibo, aut earundem tritarum in mulso aut lactis potu, iuuantur. Pyrorum etiamnum omne genus esse, & lac humanum bibere, conuenit.

Salamandra.

Cap. IIIL

Si salamandram hauserunt, linguæ inflammatiō cōsequitur, mēs & sermo præpeditur, tremor cum torpore aut horrore quodā ac exolutione accedit: partes nōnullę corporis liuoribus circunquaq; sugillantur: sæpèque, diutius immorante veneno putrescētes defluūt. Quibus præstabimus cūcta quæ potis cantharidibus.

Pecu-

Περὶ Βουπρήσεως. Κεφ. γ'.

Τοῖς δὲ βουπρήσιν πεπωκόσι, δοκεῖ κατὰ τὴν γύσιν ὁμοίον πιβρωμῶδει νίτρω· παρεκκολούθει δὲ ἄλγυμα σωμαχοῦ καὶ κοιλίας σφοδρόν· ὄγκος τὲ σωμαχοῦ καὶ κοιλίας σφοδρὸς ὁμοίως ὑδρωπικοῖς. καὶ περιτείνεται αὐτοῖς ἡ σπιθαμναία ὅλου τοῦ σώματος· τὰ τε οὖρα ἐπέχεται. βοῶνται δὲ αὐτοῖς ὅσα καὶ τοῖς κανθαρίδας πεπωκόσιν· ἰδίως δὲ ὠφελουῦνται μετὰ τὸ τῶν ἐμέτων καὶ τοῦ κλυσθήσεως κενώθῃναι σύκα ξηρὰ λαμβάνοντες· καὶ τὸ ἀφύημα δὲ αὐτῶν σὺν οἴνῳ παρεκμάζοντος δὲ τοῦ κατ' ὀξύτητα κινδυνού, ὠφελουῦνται θυεαίχας βαλαύους ἐδίοντες, ἢ λελεασμένους (ὡς οἰνομένιτι, ἢ γάλακτι πίνοντες. ἢ καὶ ἀπίων ἀπαι τὸ γῆρας ἐδίοντες καὶ γάλα γυναικείον πίνοντες.

Περὶ Σαλαμανδράς.

Κεφ. δ'.

Τοῖς δὲ σαλαμανδραν λαβούσι, παρέπεται γλώσσης φλεγμονή, καὶ διανοίας ἐμπεδιτισμός καὶ τρόμος μετὰ νάρκης ἢ φέικης πνός καὶ ἐκλύσεως· πελιούται δὲ πῖνα μέρη κυκλοτερέως αὐτοῖς τοῦ σώματος· ὡς πολλάκις ἐμμέναντος τ' φαρμάκου, σιπόμενα ἀπορρεῖν, ἐφ' ὃν πάντα τοὶ σάμφοροι ὅσα καὶ σπὶ κανθαρίδων.

ἰδιαιτε-

ἰδιαίτερον αὐτοῖς προσφέρουσι
 φάρμακον ῥητίνην τὴν πτυνίνην, ἢ
 χαλκῶν σὺν μέλιτι ἀντὶ ἐκ-
 ληκῆς, καὶ χαμαίπτως ἀφέψημα.
 συνεκλεαυθέντων αὐτῶ σφελίων.
 5 ἢ κνήδης φύλλα σινεψιδέντα κρί-
 νω μετ' ὕαις. ποιεῖ δὲ ἐπ' αὐτῶν
 καὶ θαλασσίας χελώνης ἢ χερσαίας
 ὡς δὲ ποῖα αὐτῇ ἐψημύα· καὶ βα-
 τράχιον ζωμὸς, συγκαθεψιδεί-
 σης αὐτοῖς ἡρυγίου ῥίζης.

10

Πεὶ Εφημέρου. Κεφ. εἰ.

Τοῖς δὲ ἐφήμερον λαβούσιν, ὅ-
 ἔνιοι καλοῦσι κολχικὸν ἢ βολεδὸν
 ἄγειον, παρεχολουθεῖ κνημιὸς
 καθ' ὅλον τὸ σῶμα, ὡς ὑπὸ σκί-
 λης ἢ κνήδης ἐρεδιζομένοισι· τὰ

15 ὅ ἐν τῷ ἀνὰ δάκνοντα· καυσου-
 ται δὲ τὸν σῶμαχον μετὰ βάρους
 ἱκανοῦ. ἐπιχύνοντος δὲ τοῦ πά-
 ρους. κατὰ κοιλίαν φέρεται αἵμα-
 τῶδη, ξύσμασι μεμυγμύα. οἷς
 βοηθητέον καὶ δάφνι καὶ τοῖς σιλα-

20

μαῖδραν πεπωκόσι, διὰ τε ἐμέ-
 των καὶ κλυσμάτων· πρὸ δὲ τῶ ἐ-
 νιχῶσαι τὸ φάρμακον, μεταδο-
 τέον αὐτοῖς δρυὸς πῶν φύλλων ἢ
 βαλαύων ἢ σιδίων ἀφέψημα· ἢ ἐρ-
 πύλλε σὺν γάλακτι πίνειν· ἢ πο-

25

λυρὸνε χυλὸν ἢ ἀμπέλκε ἀκρεμό-
 των, ἢ βάρου ἢ νάρθηκος ἀπαλοῦ
 τῆς ὡς τριώνης, ἢ μύρτε μετ' οἶνου.
 αὐτὰ δὲ τὰ μύρτα λεῖα κοπέντα
 καὶ ἀποβραχύντα ἐν ὕδατι, βοηθεῖ
 σθ' ἐξ αὐτῶν ὕδατος λαμβανομένη.

ποιεῖ

Peculiariora verò remedia, re-
 sina pinus, aut galbanum ex
 melle linctum, & aiugæ deco-
 ctū, in quo nuclei pinei conte-
 rantur: vrticæ quoq; folia, cū
 liliis & oleo decocta. Profunt
 etiam oua testudinis marinæ
 aut terrestris, cocta: item ra-
 narum ius, cum quibus eryn-
 gij radix incocta sit.

Ephemerum. Cap. V.

Sumpto ephemero, quod a-
 liqui Colchicon, aut sylvestre
 bulbū appellant, pruritus in
 toto corpore excitatur, nō se-
 cus atq; iis qui vrtica aut scilla
 lacessuntur: interna rosionem
 sentiunt: stomachus cū ingenti
 grauitate exæstuat. Cæterū in-
 ualescente morbo, cruor strig-
 mētis admistus, per aluū exigi-
 tur. Quibus, vt iis qui salaman-
 dram hauserūt, vomitione aut
 clysteribus auxiliari cōueniet:
 sed antea q̄ venenū inualescat,
 dandū est decoctū frondium
 quercus, aut gladiū, aut malico-
 rij: lac bibere prodest, in quo
 serpillū sit decoctū: itē succum
 sanguinalis herbæ, aut ramorū
 vitis, aut rubi, aut medullæ recē-
 tis ferulæ, aut myrti cum vino.
 Baccæ autem myrti tusæ tri-
 tāque, & aqua macerata, vt li-
 quor inde sumatur, opē ferūt.

§ iij Media

DIOSCORIDIS

Media castanearū tunicula, si-
milem effectum præbet, si cru-
da in aliquo supradictorum
succo sumptitetur: origanum
quoque cum lixiuo epotum:
eximiè iuuantur asinini lactis
aut bubuli calidi potu, etiam si
in ore contineant: ita vt qui-
bus copia lactis huius adsit, nõ
aliud desideretur.

Dorycnium.

Cap. V I.

Dorycnion, quod aliqui ma-
nicon folanum appellarunt, e-
potum, lactis saporem in gu-
stu refert: continentes singul-
tus ciet, humor linguam ve-
xat, sanguis confertim reiicitur:
mucosa quædam perinde
quasi dysentericis, aluo ege-
runtur. Itaque antequam ali-
quid ex iis eueniat, auxilio sunt
antedicta, vomitus, clyster, &
quæcunque potum venenum
expellere possunt. Priuatim iis
opitulatur, aqua mulsa, lac ca-
prillum, aut asininum, dulce vi-
num, quod tepidum cum ani-
so bibatur, amygdalæ amaræ,
gallinacea pectora decocta.
Quinetiam conchyliia omnia,
tam cruda quàm tosta esse sa-
lutare est. Conueniunt & lo-
custa marinæ, & gammari, &
pota eorundem iuscula.

Aconi-

ποιεῖ δὲ ὡς οὐτως καὶ ὁ τῶν σα-
δονίων βαλανίων ὑμῶν μέσος, ὁ-
μῶς λαμβανόμενος μετὰ πινος τῆ
περσεινῶν χυλῶν ὀειρανός τε
συνὸν κοίτην ποδεῖται. ἀκριβῶς δὲ
βοηθοῦνται οἱ τὸ ὄνυχον ἢ βόειον γὰρ
λαθρομένον πίνοντες καὶ κατέχον-
τες ἐν τῷ σώματι ὥς τε τὰς ἐν-
πορήσαντας τούτου, ἄλλου μηδε-
νὸς χεῖρ ἐν βοηθήματος.

Περὶ Δορυκνίου.

Κεφ. 5.

10

Δορυκνίου δὲ ποδέντος ὁ ἐνιοι
ἐρύχον μακρὸν ἐπάλεσαν, πα-
ρακολεθεῖ ὥς ὅτι γάλακτος ποιό-
της ἐν τῇ γαστρὶ, καὶ λυγμοὶ συν-
εχεῖς, γλώττης τε ὑγρότης, καὶ
αἵματος ἀναγωγὴ ἀδρόα κατὰ τὴν
κοιλίαν δὲ αὐτοῖς μυξώδη φέρε-
ται ὥς ἐπὶ δυσεντερικῶν. οἷς βοη-
θεῖ περὶ τοῦ τούτων τι παρα-
κολουθεῖν αἰ καὶ τοῖς περσειν-
ομένοις ὅ, τε ἐμετος καὶ τὸ κλύσ-
μα, καὶ ὅσα δυνάται τὸ ποδέν 20
ἐμφέρειν φάρμακον. ἰδίως δ' ἐπ'
αὐτῶν βοηθεῖ τὸ μελίχρετον ἢ
ὄνειον ἢ αἰγείον γάλα, καὶ γλυκὺς
οἶνος χλιαρὸς μετ' ἀνίσου πινό-
μενος, καὶ αἰνυδάλα πικρά, σή-
δη τε ὀρνίθια καθεψημένα. καὶ 25
πάντα τὰ κορχύλια ὡμαὶ καὶ
ὀπλὰ ἐσθιόμενα, καὶ κάρ-
βοι, καὶ ἀσπὸς καὶ ὁ ἐξ
αὐτῶν ζωμὸς
πρόμενος.

Περὶ

Πρὶ Ἀκονίτη. Κεφ. ζ΄.

Τὸ δὲ ἀκόνιτον ἐν δυνάμει αἰσ-
τῶ πνεύματι γλυκαίνει τὴν γλῶσ-
σαν μετὰ πινος εὐφροσύνης καὶ ἀπὸ
τῆς γλυκασμῆς σκοτοδινίαν, καὶ μά-
λιστα ἐν τῷ ἐξάνιστασαι, καὶ ὑγρό-
τητις ὁφθαλμῶν ἐπιφέρει βάρους
τῆς θέσεως, καὶ ὑποχονδρίου καὶ
τῆς πολλὰ πνεύματα ἀποδίδο-
σαι. ἐφ' ὧν δὲ δι' ἐμέτων ἐκκο-
μιδῶναι δεῖ τὸ φάρμακον, ἢ καὶ
10 διὰ κλυσθήσεως καθαριδῶναι τὴν
κοιλίαν. χρυσόμεδα παρρησι-
σμιῶν δειγνῶν, ἢ πιγνῶν, ἢ παρρη-
σίῳ. ἢ ἀψινθίς ζέματι μετ' οἶ-
νον ἀψινθίτην, ἢ αἰζώον, ἢ ἀβρο-
τόνον, ἢ χαμελαίαν, ἢ χαμαιπί-
15 πτος. ἀρμόζει δὲ αὐτοῖς καὶ ἀπο-
βαλτάμου ὀλκῆς < α. σὺν μέ-
λιτι ἢ καὶ καστορίου καὶ πεπέρειως
καὶ πιγνῶν ἴσως ὀλκῆς σὺν οἶνῳ.
καὶ πτύα ἐρίφου, ἢ λαγωῦ ἢ νέ-
βρου σὺν ὄξει, καὶ σιδήρου σιω-
20 εῖα, ἢ αὐτὸς ὁ σιδηρεὺς, ἢ χρυ-
σοῦς, ἢ ἄργυρος διάπυρος ἐν οἶ-
νον σκεδέντα, ἢ ὑγρὸν λαμβά-
νομενόν· κοινά τε σὺν οἶνῳ, καὶ ὀρ-
νιδοῖς καθαῖς ἡμετέροις, ἢ κρεῶν λιπα-
ρῶν βοείων ζωμὸς λαμβανόμενος
σὺν οἶνῳ, λέγει δὲ καὶ ἢ χαμαιπί-
25 πτος ἰδίως ἐπ' αὐτῶν ἀρμόζειν.

Πρὶ τῆς ἐν Ἡρακλείᾳ

μέλιτος. Κεφ. η΄.

Μέλι τὸ ἐν Ἡρακλείᾳ τῇ πομπικῇ
ἐστὶ καὶ τὸ ἀκόνιτον ἡμετέροις, ἀδή-
γνωστο

Aconitum. Cap. VII.

Aconitum statim in lingua
inter bibendum, cum adstri-
ctione quadam dulcescit: &
subinde potissimum cum ex-
urgere conatur, vertigines of-
fundit: lachrymas ciet: gra-
uitatem pectori, & præcor-
diis adfert, simulque crebri spi-
ritus deflantur. Quare vene-
num vomitione abigi, aut cly-
stere per aluum egeri opus est.
Vtimur inter propinandum, o-
rigano, ruta, marrubio, vel ab-
finthij decocto, cum vino ab-
finthite, vel semperuiuo, vel
abrotono, vel chamelæa, aut
aiuga. Prodest etiamnum opo-
balsami drachma, cum melle
aut lacte, cum castorio, pipe-
re & ruta, æquis pōderibus ex
vino. Coagulū hoedi, leporis,
aut hinnuli cū aceto, ferri quo-
que stercus, itē vinum in quo
aurum, ferrū, argentūmve can-
dens restinguatur, potum: lixi-
uiaq; cum gallina & vino de-
cocta, aut carniū bubularū
præpinguium iura, cum vino
sumpta. Fertur & aiuga priua-
tim ipsis subuenire.

Mel Heraclia.

Cap. VIII.

MEL in Heraclia Pon-
ti, vbi aconitum gigni solet,
inuenitur:

DIOSCORIDIS

inuenitur: quod qui edunt bibuntve, non secus affligantur, quàm qui aconitum ebiberunt. Iis eadem quæ poto aconito conueniunt: adiuuantur in primis cōtinuò vini mulsi potu, cui rutæ folia sint adiecta.

Coriandrum. Cap. IX.

Coriandrum ob odorē latere non potest: epotum autē vocem exasperat, infantiā adfert, à temulētijis non abhorrétem. Qui sumptum, pudenda dictu blaterant, totiūsq; corporis odore venenū fatétur. Quibus post vomitionē irino oleo concitatam, vti retulimus, merū & per sese, & ex absinthio potum auxiliatur. Item oleum, nec secus oua in eodem exinanita, si liquefacta in muria forbeantur: & epota muria, & ius falsum ex gallina & anseris passum quoq; cū lixiuia sumptū.

Psyllium. Cap. X.

Psyllion epotū, corpori toti frigus & torporem cum exolutione & moerore quodam affert: ita vt animum despondeant. Cui omnia quæ exhausto coriano auxiliantur.

Cicuta. Cap. XI.

Cicuta pota vertiginē excitat, oculisq; caliginē offundit, ita vt

ἡσυχία καλεῖται, ἐν εὐβοίᾳ σιθελῆτις. ὁμοίως δὲ πάσχει καὶ οἱ ἐν ἡρακλείᾳ τῇ ποντικῇ τὸ μέλι θυνώμενον φαρμόντες, ἢ πόνοντες. ἐφ' ὧν ἀρμόζει τὰ αὐτὰ τῷ ἀκονίτιω· εἰσὶ δὲ εὐβοήηται μάλιστα ὡφελέμενοι ὑπὸ οἶνο μέλιτος συνεχῶς αὐτὸ πίνοντες, μίστυμένων δ' αὐτῶν πωγὰς φύλλων. Πρὶ κορίν. κε. θ'.

Τὸ δὲ κόρειον λαθεῖν μὲν ἐδύναται διὰ τὴν ὁσμὴν, πρὸν δὲ τίς φωνὴν διασώζει, καὶ μακρὰν ὁπφέρει ὁμοίαν τοῖς διὰ μέλιτος βλαβεῖσι μετ' αἰχρολογίας, καθ' ὅλε δὲ τὸ σώματος αὐτῶν, ἢ ὁσμὴν διαφαίνει τὸ κορίν. βρονθεῖ δ' αὐτοῖς μὲν τὸ ἐξαίρεθῆναι διὰ τὸ εἶναι ἐλαίον ὡς περ εἴρηται, ἐλαίον σὺν ἀψινθίῳ πινόμενον ἢ καθ' ἑαυτό. ἢ ἐλαίον ὡς τε κεραθέντα ἐπὶ αὐτὸ καὶ χλιαθέντα σὺν ἄλμυ καὶ ῥοφέμενα· καὶ δὴ καὶ δὲ πινόμενα καὶ ζωμὸς δὴ μωρὸς ἐκ τῆς ὀρνίδος καὶ χλωὸς γλυκύς τε σὺν κορίν. παραλαβανόμενος.

Πρὶ ψυλλί. κε. ι'.

Καὶ τὸ ψύλλιον δὲ καλοῦμενον πρὸν, ὁπφέρει ψύξιν ὁλοῦ τὸ σώματος, καὶ νάρκην μετ' ἐκλύσεως καὶ ἀσημονίας. βρονθεῖ πάντα ὅσα τοῖς κόρειον πεπωκόσι.

Πρὶ κώνειου. κε. ια'.

Κώνειον δὲ πρὸν ὁπφέρει σκοτώματα καὶ ἀχλὺν, ὡς τε μὴ δ'

μὴ δ' ἐπ' ὀλίγον βλέπειν· λυ-
 μὸν τε καὶ διανοίας παραφορᾶν,
 καὶ ἰούξιν ἄκρων· ἐπὶ τέλει δὲ
 σπώδῳ πιύρονται, εἰσὶν λαμ-
 βάνοντος αὖ κατὰ τὴν ἀρτηρίαν
 5 πνέματος. κατὰρχας μὲν οὐδ'
 ὥς καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων διὰ τῶν
 ἐμέτων αὐτὸ κομίζεται· ἔπει-
 τα κενώματα χρηστὰ μὲν, τὸ εἰς
 τὰ ἔντερα παρ' ἡλιαδικὸς ἐκκρι-
 νοῦ μὲν· καὶ τό τε ὥς ἐπὶ μέγ-
 10 ζον βοήθημα ἐπὶ τῷ ἀκρατο-
 ποσίᾳ παραγιγόμεθα· διδόντες
 μετὰ ξύδι· διάσημα, ἐν οἷς πλεονε-
 δὴ μὲν βοηθεῖ γάλα ὄνειον ἢ ἀ-
 λίνδιον μετὰ πεπέρως καὶ οἶνου,
 καὶ καστορείου καὶ πιγανῆος καὶ ἡ-
 15 δυόσμου σὺν οἶνῳ, ἢ καρδαμώ-
 μου ἢ σίρακος, ἢ πεπέρως με-
 λίδης σπέρματος σὺν οἶνῳ, ἢ
 δάφνης τὰ φύλλα, ὁμοίως τ' ὅσα
 φέει ὁπὸς σὺν ἐλαίῳ καὶ γλυκεῖ, καὶ
 ὁ γλυκὺς οἶνος δὲ καθ' ἑαυτὸ πο-
 20 λὺς πνέματος, ἱκανῶς ἀρμόζει.

Πρὶ Σμίλακος. Κεφ. ιβ'.

Ἡ δὲ χαλκιδόνη σμίλαξ, ὅπως ἐνίων
 δὲ θυμὸν καὶ παρὰ ῥωμαίαις τά-
 ξον ποθεῖται ἐπιφέρει ἰούξιν κα-
 25 τὰ σῶματος, καὶ πνιγμὸν, ὁξύν-
 τε τὸν θάνατον, οἷς βοηθεῖ πάντα
 καὶ κατὰ τὸ κώνιον πεπωκόσι.

Πρὶ Οποῦ καρπάσου.

Κεφ. ιγ'.

Καὶ ὁ καρπάσος ὁπὸς ποθεῖται,
 χάρον ἐπιφέρει καὶ πνιγμὸν ὁξύν-
 βοηθεῖν)

ita vt minimum cernatur: sin-
 gultus ciet, mentē turbat, extre-
 mi artus gelantur: deniq; con-
 uulsi, suppresso arteriæ spiritu,
 strangulantur. Quare inter ini-
 tia, vti in reliquis, cicutam vo-
 mitu excutiemus: postmodum
 deiectionē molimur, vt quod
 ad intestina prolapsum sit, ex-
 cernamus: tum demum in me-
 racam potionem, quæ maxi-
 10 mo est auxilio, deueniemus:
 repetendum, per interualla, in
 quibus proderit lac asininum,
 aut bubulum potui datum, aut
 absinthium cum pipere & vi-
 no, castorio, ruta, mentha cum
 vino, aut amomi, cardamomi,
 aut styracis vncia, aut piperis
 cum semine vrticæ & vino,
 aut lauri folia. Item laser
 ex oleo & passio, &
 passum per sese lar-
 15 gius potu proficit.

Taxus. Cap. XII.

Smilax, à quibusdam tithy-
 malum, à Latinis taxus appel-
 latur: frigus vniuerso corpori
 strangulatus, & celerem inte-
 20 ritum infert. Cui eadem quæ
 cicutæ conueniunt.

Carpasi succus.

Cap. XIII.

Epotus carpasi succus soporē,
 citamq; strangulationē adducit.
 Adiuuantur

DIOSCORIDIS

Adiuuantur autem qui hauserunt, epotæ cicutæ remediis.

Sardonias herba.

Cap. XIII.

Sardonias ranunculi herbæ generi assignatur, quæ vespertibus mentem adimit, & quadam neruorum distentione labia in rictum cōtrahit, vt risus speciem præbeant: à qua quidē affectione, de Sardonio risu adagiū in vulgus infausto omne manauit. Post vomitum peculiariter conuenit aqua mulsa & lac, liberalius epota: irrigatio, perūctioq; à pinguibus medicamentis, totū corpus ex-calfaciētibus: in calidā aquam oleumq; descendāt, sed tū multum perfricare, & inūgere expedit: & in summa, curā omnē, quæ cōuulsioni neruorum adhibetur, exequi oportet.

Hyosciamus. Cap. XV.

Hyoscyamū potū aut comestum, similē ebriis ab alienationē mouet: sed facilē medicamentis cedit. Auxiliat aqua mulsa copiose data, lacq; præsertim asininū, si id desiderat, caprillū, vel bubulū, vel aridarū ficuum decoctū. Faciūt ad id etiā nuclei pinei, aut cucumis semen ex passio sumptum, & vinum falsum cum adipe suilla recēti, passioq;

βοηθουται δὲ καὶ ἔτσι υφ' ὧν καὶ οἱ τὸ κώνειον πεπωκότες.

Πρὶ Σαρδονίας πίας.

Κεφ. ιδ'.

Ἡ δὲ σαρδόνιος λεγόμενη πία, βασιλέα χου εἶδος οὔσα, πιδεῖται ἢ βρωδεῖται, παραφρόσαν διανοίας ὀπφέρει καὶ ἀπάσματα μετὰ στυλοκῆς χειλέων, ὥς τε γελωτός φαντασίαν παρέχειν· υφ' ἧς διαδέσεως καὶ ὁ σαρδόνιος γελως οὐκ ἐμφήμως ἐν τῷ βίῳ καταμύληται. ἐφ' ὧν ἰδίως καὶ μετὰ τὸν ἑμετον, ἀρμόζει μελικρατον πολὺ διδόμενον καὶ γάλα· ἐμβροχή τε καὶ λιπασιμὸς ὁλοῦ τοῦ σώματος διὰ θερμαντικῶν φαρμάκων, καὶ ἐμβάσεις δ' ὑδρὸς λαίου θερμοῦ. ὥσπερ αἰθερὶ μὲν τοι ἰκανῶς δεῖ καὶ ἀνατεῖν μετὰ τινὶ ἐμβασιν αὐτοῦ. χαλδίου δὲ ὥς περὶ ἀσπασμόν, ὅλῳ δ' ἰσχυρίαν δεῖ ποιεῖσθαι.

Πρὶ Ψοκύνάμου. Κεφ. ιε'.

Ψοκύνάμος δὲ ποδεῖται ἢ βρωδεῖται παρακοπῇ τοῖς μεθύουσιν ὁμοίαν ὀπφέρει· ἐστὶ δὲ ἐύϊατος. βοηθούμενος μελικράτῳ πολλῷ ποτιζομένῳ, καὶ γάλακι μάλιστα ὀνείῳ, * εἰ δὲ μή γε βοείῳ, ἢ σὺκων ξηρῶν ἀφελήματι ποτιῦσι δ' ἐπ' αὐτῶν καὶ σρόβιλοι, καὶ τὸ σικύων σπέρμα συνγλυκεῖ λαμβανόμενον καὶ ἀλμυρὸς οἶνος συνστάσι ὑπὲρ νεφρῶν, καὶ

ἢ γλυκεῖ σὺν ὕδατι, καὶ κνίδος
σπέρμα ὁμοίως· ἢ νίτρον σὺν ὕ-
δατι. ἀρμόζι· ἢ καὶ χόρειον, ἢ νά-
πυ, ἢ καρδαμὸς ἢ ῥάφανον καὶ
κρόμμυα, ἢ σκόροδα ἔχασον τέ-
3 των σὺν οἶνῳ λαμβανόμενον· ἵσου
χάριν ὃ αὐτὸς ἀναγκάζειν δεῖ,
ὥσπερ οἱ τὸν οἶνον πίνοντες·.

Πρὶ Μανδραγόρου. Κεφ. 15.

Μανδραγόρου δὲ ποδέντος ἐν-
δύως, χάρις ἐπακολουθεῖ ἢ ἐκλυ-
10 σις κατὰφορὰ τέ ἰχθυρὰ κτ'· μν-
δὲν διαφέρεισαι πάσι τοις τῷ λεγο-
μῆνι λιθάρου, ὃ περὶ τῆς πί τῆ
πρωτὶ συμβῶσαι, ἀρμόζι ὃ, τε ἔμε-
τος ἢ μελίκρατον, ἢ μτ' τῶτο ἢ
νίτρον ἢ ἀψίνθιον σὺν γλυκεῖ ἢ
15 οἶνῳ γλυκάζοντι λαμβανόμενα.
ἢ ἢ τὸ κεφαλῆς ἐμβροχὴ διὰ ῥο-
δίνης ἢ ὄξους ἢ διέγερσις δὲ καὶ
κίνησις τῶ σώματος. ἢ ἢ δι' ὁσ-
φραντικῶν ἢ ἐνπατορίης ἢ πεπτε-
ρεως ἢ νάπυος, ἢ κασιένης ἢ πη-
20 γάνης ὅξει τετριμμένων ἢ πύσσης
ἢ ἡδῆς ἢ τῶν κακαμύων, ἢ ἐσ-
βεσμένων ἐλλυρίων· δυσανακλή-
τως δὲ αὐτ' ἐχόντων, ἢ πᾶριμι-
χὰς ἐπάγειν. ἢ τοῖς ἀγχοῖς καινοῖς
βοηθήμασι χρῆσθαι ἢ ἐπὶ τέτων.

25 Πρὶ Μήκωνος. Κεφ. 16.

Μήκωνος δὲ ὁπῦ ποδέντος,
παρσκολουθεῖν κατὰφορὰ με-
τὰ χαλκῶδους ἢ κνησμῶ ἐπιτ-
ταμῆς. ὡς πολλάκις ἐπιγύοντος
ἢ φαρμάκων, ἐπιγίνεσθαι τοσούτον
κνησμὸν,

passoque: itidem vrticæ semē,
aut nitrum ex aqua, & intub-
erraticus, & sinapis, & nastur-
tium, radix, cepa, & allium: &
hæc singula cum vino suman-
tur. Postea finendi quiescere,
quemadmodum qui vinum bi-
berunt, vt excoquant.

Μάδραγορα. Cap. XVI.

Mandragora si bibatur, cō-
festum sopor insequitur, exolu-
tio, ac vehemens veternus, ni-
hil temerè distans à lethargo.
Cui, antequàm aliquid ex iis
accidat, vomitus & aqua mul-
sa proderit: postea nitrum &
absinthium, ex vino dulci aut
passo sumantur. Caput rosa-
ceo & aceto perfundatur. Pro-
ficit excitatio, & motus cor-
poris, & olfactus eupatorij, &
piperis, sinapis, castorij, & ru-
tæ, tritorum in aceto: & liqui-
dæ picis, & odor è lucerna-
rum exustione & extinctu.
Quodd si ægrè ij reuocentur,
sternutamenta mouere, aliis-
que communibus auxiliis vti
conueniet.

Μεκόνιον. Cap. XVII.

Epoto papaueris succo, quē
meconio vocāt, cōsequit veter-
nus cū perfrictione & pruritu
vehementi, ita vt sæpe inuale-
scēte veneno, tanta erumpat
prurigo,

DIOSCORIDIS

prurigo, vt hominem excitet. Corpus id medicamentū olet. Post citatam oleo vomitionē, acres clysteres auxiliātur, acetūque mulsū cum fale potum, aut mel cum rosaceo calido: merū cum absinthio aut cinnamomo, copiosum, aut calidum per sese acetum, nitrum ex aqua, & organum cum lixiuia aut passo, & rutæ syluestris semen cum pipere, vino, & panace: pipérq; cum castorio & aceto mulso, vel cum fatureiæ aut organi decocto, cū vino. Hi olfactilibus excitandi, & ob enatam pruriginem in balneas descendant, & foueantur. Post lauacrum prodest iurium pingium vsus, cum vino aut passo: medulla etiam ex oleo pota.

Corniculatum papauer.

Cap. XVIII.

QVOD corniculatum papauer appellant, & potu & cibo eadem inferre consuevit, quæ papaueris succus: nec aliis expugnatur auxiliis.

Pharicum. Cap. XIX.

Quod pharicon vocāt, sapor syluestre nardum imitatur. Resolutionē neruorum potū affert, cū cōuulsioe & delirio. Oportet autē post vacuatiōes

vinum

κησμον, ὡς τε διεγείρειν τὸ αὐτὸ ὅσην τε τῆ φαρμάκου δι' ὅλην τῆ σώματος ἐκδίδοι. οἷς βοήθει μὲν τὸν τῆ ἐλαίου ἔμετον, καὶ κλυδιῶναι δριμεὶ κλύσματι, ὃδὺ μελὶ σὺν αἰσὶ πινόμηνον ἢ μελὶ σὺν ῥοδίῳ θερμῷ, καὶ ἀκρατος πολὺς σὺν ἀψινθίῳ ἢ κινναμώμῳ, ἢ ὄξος θερμὸν κατ' ἑαυτὸ νίβον τε σὺν ὕδατι καὶ δεύραρον σὺν κοινίᾳ* πηλῶν καὶ ἀγρίῳ σπέρματι σὺν πεπέρῃ καὶ οἶνῳ καὶ παύακι, πένθεϊ τε μὲν καστορίῳ καὶ ὀξύμελιτος, ἢ μὲν δύμωρος ἢ δεύραρον σὺν οἶνῳ. δεῖ δὲ καὶ τὰς διεγείρειν τοῖς ὀσφρακτικοῖς καλυμμένοις καὶ ἐμβύβαζιν εἰς θερμὸν καὶ πυρετὸν διὰ τὸν ἐπιγνόμηνον κησμόν. ὁρῶσι αὐτὸς καὶ μὲν τὸ λουβρὸν χεῖρ' ἀλίσσιναι, ζωμοῖς λιπαροῖς, μετὰ οἶνου ἢ γλυκέως καὶ μυελὸς δὲ μετ' ἐλαίου πινόμηνος.

Πρὶ Μήκωνος κερατίνου. Κεφ. ιη.

Ἡ δὲ λεγόμενη κερατίνος μήκων, ἐν τῷ βρωδιῶναι ἢ ποδιῶναι τὰ αὐτὰ ἐπιφέρειν τῷ ὅπῳ τῆ μήκωνος συμπιῶματα. τοῖς αὐτοῖς βοήθειάμασιν ὡς ὀπίπῃ.

Πρὶ Φαεικοῦ. Κεφ. ιθ.

Τὸ δὲ καλεῖσθαι φαρικόν, τὴν μεγύσιν πᾶσαν νάρδω ἀγρίᾳ ἐοικέν. ἐπιφέρει δὲ παρὰ κλινὴν ποδὲν μετὰ παρακοπῆς καὶ ἀσπασμοῦ. δεῖ δὲ μετὰ τὸ ἐξερεῖσθαι αὐτὸς, ποτίσκειν

ποτίζην οἶνον ἀψινθίτην, σὺν κιν-
ναμώμῳ ἢ σμύρνῃ ἢ νάρδω καλ-
πικῇ, ὡς ἐνιοι στείνιν ἐκάλεσαν
ἢ ναρδοσάχρους ὀλκῆς β'. καὶ σμύρ-
νης β'. ὁλοοὺς μεμυγμένους σὺν
3 γλυκεῖ ἢ ἱερῇ μῆτρί, χρόνῳ σὺν οἶνω
δεῖ τὸ καταπλάσσειν δὲ τὴν κα-
φαλίαν αὐτῇ ξυρήσαντας, κριθίνῳ
ἀλεύρῳ σὺν πηγάνῳ λείῳ καὶ ὄξει.

Πρὶ τοξικῇ. Κεφ. κ'.

Τὸ τὸ τοξικόν, δοκεῖ μὲν ὀνομάζεσθαι,
10 ἐκ τῆς τῆς τοξῆς τῆς βαρβάρων ὡς
αὐτῇ χρίεσθαι, παρακολυθεῖ τὸ τοῖς
πεπωκόσι χειλέων καὶ γλώττης
φλεγμονή· μαρὰ τε ἀκατάχρηστος
ποικίλαις ἐπιβάλλουσα φαντασί-
αις ὥς καὶ διὰ τῶ οὐσιώδους εἶναι
15 ἐν τῇ θρασείᾳ· σπασίως τὸ καὶ σῶ-
ζεσθαι πῶς τῶν πεπωκότων, δεῖ
μὲν τοῖς συνέχειν αὐτοῖς δεσμοῖς
ἀναγκάζοντας καὶ βιαζομένους γλυ-
κὺν οἶνον σὺν ροδίνῳ πίνεσθαι, καὶ ἐξέ-
μειν τότ' ἡ γογγύλης σπέρμα σὺν
20 οἶνω, ἰδίως δ' ἐπ' αὐτῇ ἀρμόζει καὶ
ἢ τῆς πενταφύλλου ρίζας, αἵμα τε
βράχην, ἢ αἶρος ὁμοίως λαμβανό-
μενα, δρυὸς τε φλοιὸς ἢ φηγῶ, ἢ
σπίνης γάλακτι συνεκλεανθεῖς καὶ
μύηλα κυδώνια ἐπιόμβρα ἢ λεία
25 σὺν γάλακτι καὶ ὕδατι πινόμενα,
ἀμώμον τε καὶ βαλσάμῳ καρπὸς
σὺν οἶνω, καὶ εἴλητες αὐτῇ φύγοιεν τὸ
κίνδυνον, πολλὴν χρόνον κλινόμε-
ταις διαμύουσιν, καὶ ἀνασταῖτες ἐ-
πισημνοὶ τὸ λοιπὸν χρόνον διάβ-
ηται.

Πρὶ

vinum absinthiten potui dare,
cum cinnamomo, aut myrrha,
aut nardo gallico, quod serinē
aliqui vocauerunt: aut spicæ
nardi duas drachmas, & myr-
ræ totidē obolos, cū passo, aut
irim cum croco ex vino: dera-
fūq; caput illinire hordeacea
farina cum aceto, & trita ruta.

Toxicum. Cap. XX.

Toxicum ex eo nominari
videtur, quod barbarorum sa-
gittæ eo illinebantur. Qui bi-
berint, labiorum & linguæ in-
flammatione torquētur: inco-
ercitus furor varias iis imagi-
nes obuersat: quare vix medi-
cinæ locus est: raroq; qui hau-
serunt, euadent. Vinculis ergo
cohibendi, vt vinum dulce cū
rosaceo bibere, & reuomere
cogantur: rapi semen biben-
dum cum vino. Priuatim iis cō-
uenit, quinque folii radix, &
hircinus sanguis, aut caprillus,
eodem modo sumptus: robo-
ris, fagi, aut ilicis cortex cum
lacte tritus: malaque cotonea
trita esse, aut cum pulegio &
aqua bibere, conueniet, amo-
mum & balsami semen ex vi-
no. Sed qui periculis defuncti
sunt, diu lecticis decumbunt,
& vbi surrexere, stupidi reli-
quum vitæ tempus degunt.

Ixia.

DIOSCORIDIS

Ixia. Cap. XXI.

Ixia quæ vlophonon appellatur, inter potadû aliquid ocymo simile gustu & odore redolet; vehementē linguæ inflammationē excitat, mētē mouet: omnes excremētōrū exit⁹ supprimit: strepitū cum animi deliquio ciet, iisq; intestina latrāt, nec egeritur quicquā. Post vomitionē aluumq; resolutā, auxilium præstat aqua: in qua absinthiū maduerit, ex vino largiore, aut aceto mulso potaru: tæq; syluestris semen, aut laseris radix: item tragorigani decoctū, cum aliqua supradictorum, aut lacte, aut resina terebinthina, aut nardo, aut castorio, aut laserpitio, quorū singuli oboli cōueniūt. Quin & nuces iuglandes ex vino, cū resina, castorio, & ruta trite, ita vt singula drachmæ pōd⁹ æquēt. Itidē chamelex aut tapſiæ, aut absinthij succi sicilic⁹ cū aqua mulsa, & acetū calidū potum.

Cerusa. Cap. XXII.

Cerusa suo colore proditur: sumpta enim, mox palatum, gingiuæ, lingua, & commissuræ dētium, candore quodam inficiuntur: singultus, tussim, ac linguæ ariditatem excitat: iis extrema frigescunt,

mens

Πρὶ Ἰξίε. Κεφ. κα.

Ἰξίας δὲ ὅς καὶ οὐλόφονον καλεῖται ἐν τῷ πίνεσθαι, οἷον πὺκνὸν κατὰ τὴν ὀσμὴν καὶ κατὰ τὴν γεῦσιν ἐμφαίνει, ὁπότερει δὲ γλώσσης φλεγμονὴν ἰσχυρὰν, καὶ παρεμπολὴν καὶ τὰς ἐκκρίσεις ἐπὶ χειρὸς πάσας. βορβορυμούς τε καὶ ψόφοις μετὰ λειποδυμίας ἐπιφέρει δὶ χατὰ πρὸς χαρτεῖν π. βουδεῖ δὲ αὐτοῖς μετὰ τὸ ἐξελίξαι τὸ πλεῖον ἢ μετὰ τὸ τὴν κοιλίαν λυθῆναι πνόμενον ἄφινδίου ἀπόβρεγμα σὺν οἶνῳ πολλῷ, ἢ ὀξύμηνι π. πηγαίου τε ἀργείου σπέρμα ἢ σιλφίου ρίζα, ὁμοίως τε τραχειαίου ἀφέλημα σὺν πινι τῶν περὶ φημύων ἢ γάλακτι, ἢ τερεβινθίνῃ, ρητίνῃ ἢ γάρδου, ἢ κασσιέου, ἢ σιλφίου, ἐκείνου ὁβολός, σὺν οἶνῳ. ἀρμόζουσι δὲ καὶ ἡ τῆς βασιλικῆς καρύας καρπὸς λείος σὺν ρητίνῃ καὶ κασσιέῳ καὶ πηγαίῳ, ἐκείνους ἂν ὁμοίως χαμελαίας < β. ἢ ἄφινδίου χαλαροῦ < β. σὺν μελκράτῳ καὶ ὅξει πολλῷ πνόμενον.

Πρὶ Ψιμμίθις. Κεφ. κβ.

Τὸ δὲ ψιμμίθιον λαθεῖν ἐδύναται διὰ τὸ χεῶμα ἐκουσίως ὃ ληφθέν, λευκαίνει τὸ ἐρανίσκον καὶ τὰ ἔλλα τὴν καὶ γλώτταν καὶ τὸ μεταξὺ τῶν ὀδόντων ὁπότερει δὲ λυγμοῖς καὶ βήχα καὶ γλώττης ἐκρήτητα, καὶ ψόξιν ἀκρωτηρίων

μετ

μετ' οἶνον, ἢ κορίαν κληματίνην,
 5 ἢ ἀμαράκινον ἔλαιον ἢ ἱερινόν,
 ἢ περσικῶν τὰ ὀτῶνα. * ὡς εἰσεργῶν
 δὲ ὡδὴ σὺν λιβάδι ἢ κριθῶν ἁ-
 φελήματι, ἢ κοκκυμύλοις, ἢ κόμ-
 μεν πηλέας, ἢ τὸ ἐν τοῖς φύλλοις
 τῆς πηλέας ὑγρὴν μετὰ χλια-
 10 ροῦ ὑδατος. * ἀρμόζει δ' ἐπ' αὐ-
 τῶν καὶ θαψίας χυλὸς, ἢ σκαμ-
 μονίας ὅπως σὺν μελικράτῳ πι-
 νόμεται.

Πρὶ Μυκήτων. Κεφ. κγ'.

Μυκήτων δὲ, οἱ μὲν τῷ γλῶσσει
 15 βλάπτουσιν, οἱ δ' ἐπὶ τῷ πλῆθει ἐπι-
 φέρεσι δὲ πάντες * πνίμους ἐ-
 οικότας ἀλχόνας. οἷς ἐυθιώς βου-
 θεῖν δεῖ κοινῶς, ἀναγκάζοντας ἐ-
 μείναι δι' ἐλαίον. θαυμαστὸς δ' ὁ φε-
 λουῶται πίνοντες κορίαν κλημα-
 20 τίνην, ἢ ἐξ ἀρχαδίνης ξύλης, μετὰ
 ὀξυκράτῳ καὶ ἁλῶν ἢ νίβου. καὶ συν-
 ἐφόμεται δὲ αἱ ἀρχαδίδες ἢ τὰ
 φύλλα τοῖς μήκιστον ἀφαιρουμένῳ
 τὸ πνιγῶδες αὐτῶν, ἐπιδόμεται δ'
 ὡφελούσι. βουθεῖ δὲ αὐτοῖς ἀλε-
 25 κτοείδων ὡδὴ σὺν ὀξυκράτῳ πι-
 νόμεται μετὰ ἀεισοκοχίας ὀλ-
 κῆς ἁ. ἢ ἀλγιδίον σὺν οἶνῳ καὶ
 μέλιτι ἐπιδόμετον καὶ πινόμε-
 νον σὺν ὑδατι, μελιποφύλλον
 τε σὺν οἶνῳ πωστός τε ρίζα,

mens labat, mēbra torpescunt.
 Quib' dare cōuenit aquā mul-
 sam, aut ficuū aut maluæ deco-
 ctū, aut lac calidū, aut sesamā
 ex vino tritā, vel lixiuiā ex sar-
 mentis factā, amaricinū oleum
 aut irinū, persicorū ossa cum
 hordei decocto: colūbina oua
 cū thure, aut hordei decocto,
 aut prunis, aut gūmi qđ vlmus
 plorauit, aut humor quē vimeā
 folia reddiderunt, cū tepida a-
 qua: sed tū quoq; vomāt. Cōue-
 nit etiā thiapxiæ succus, aut scā-
 moniæ, cū aqua mulsa potus.

Fungi. Cap. XXIII.

Fungorum alij genere, alij
 copia lædunt: omnes tamen
 strangulatus suspendio similes
 concitant. Quibus confestim
 succurrendum: cōmuniter ex
 oleo vomere cogendi: mirifi-
 cè iuuat lixiuia ex sarmentis,
 aut pyrastrī surculis, epota cū
 sale, posca & nitro. Fructus,
 aut folia pyrastrī cum fungis
 decocta, strangulantem illam
 vim auferunt, esitātāque eis-
 dem auxiliatur. Aduersus fun-
 gos gallinacea oua cum po-
 sca proficiunt, adiecta aristo-
 lochiæ drachma: item absin-
 thiū cum vino melléque sum-
 ptum, & ex aqua potum apia-
 strum ex nitro panacis radix,

DIOSCORIDIS

& semen in vino, fæx vini cremata cum aqua, atramentum futorium ex aceto: radix, vel sinapis, aut nasturtiū esu p̄sunt.

Gypsum. Cap. XXIII.

Lapidescens gypsum stragulationem creat: quare eadem proferenda sunt, quæ mansis fungis, auxilia, & ad hæc malug decoctum, quod etiam olei vicem p̄sat: utpote cum pingue fit, cuomendo lubricas vias & faciles reddit, deradiq; corpora non finit. Quod ubi duratur in lapidé, gypsum efficit. Quin etiam prodest oleum ex aqua mulsa, aut ficorū decocto: & lixiuia è ficulneo cinere, aut sarmentis facta, cum vino copiofiore pota: & origanum aut thymum cum lixiuia, aut aceto, aut passo: hiq; decocto malug proluendi.

Sanguis taurinus.

Cap. XXV.

Tauri recēs iugulati sanguis epotus, spirandi difficultatem strangulatūq; cōcitāt: faucium tonsillarūq; meatus cū neruorū distētionē præcludit: lingua rubescit: dentes inficiūtur, & quædam cōcreti sanguinis vestigia, inter eorum commissuras restāt. Quare vomitū vitabimus: sanguinis enim globi, attractu

ἢ καρπὸς σὺν βίῳ, τρυγὲς τε οἴνου κακαμυδὴν μὲν ὕδατος, ἢ ἡλ-
κανθος σὺν ἔξει. ῥάφανός τε ἡ τὰ
πυ ἢ καρδία μωμον ἐδοτόμην.

Πρὶ Γύψου. Κεφ. κδ.

Καὶ ἡ γύψος πνιγμὸν ἐπιφέρει λιδομυδὴν· ἔθεν καὶ τοῦτοις ἀρμόζει διδόναι τὰ πρὸς τοῖς μύκηταις βονδήματα ἢ ἐπὶ τέτων τὸ τῆς μαλάχης ἀφελήμα, ὃ παραληπτέον ἀντὶ τοῦ ἐλαίου· λιπαρὸν γὰρ ὃν καὶ ἐν τῷ ὕδατι ἐξεμείδαι ὀλισθόν ἐμποιοῦν, οὐκ ἔα καταξύνεσθαι τὰ σώματα. λιδομυδὴν γὰρ ἡ γύψος ἐργάζεται τοῦτο. ἀρμόζει δὲ καὶ τὸ ἔλαιον σὺν μελικράτῳ ἢ σύκων ἀφελήματι· καὶ κοινὰ σπικίνη ἢ κληϊσματίνη σὺν οἴνῳ πολλῷ πνιγμένη· καὶ οὐρίανος ἢ θυμός σὺν κοινίᾳ, ἢ ὄξει, ἢ γλυκεῖ· δεῖ δὲ τούτους ὑποκλύζειν τῷ τῆς μαλάχης ἀφελήματι.

Πρὶ Αἵματος ταυρίνου.

20

Κεφ. κε.

Αἷμα δὲ ταύρειον νεοσφάγος πρὸς τὸν δύσπνοιαν ἐπιφέρει καὶ πνιγμὸν· ἐμφερίπτον τοῖς πρὸς τὰ παρὰ ὅρια καὶ τῶν κατὰ πύλας πρὸς μετὰ σπασμοῦ ἐξ ἰχυροῦ· οὐρείσεται τε ἐν αὐτῶν ἢ γλῶττι ἐρυδρά· ἢ ὁδόντες βεβαμυδῆσι, ἢ θρομβία μεταξὺ αὐτῶν, ἐφ' ὧν τὸν ἐμετον παραγινώσκουσι, τῶν θρόμβων μᾶλλον.

μάλλον ἐν τῷ σωμαὶ χαρσπλυου-
 μένων διὰ τὸ μετεωρίζεσθαι αὐ-
 τὸς καὶ τὴν ὀκλίαν. διδόνται δὲ
 ὅσα δύναται τὴν πῆξιν διαλύ-
 σαι τῷ αἵματος, καὶ τὴν κοιλίαν
 5 ὑπάρχειν. τοὺς τε ὀκλίαν τοὺς πῆ-
 ρας ὄντας τὸ ὅπου συν ὀκλίαν τῷ,
 καὶ ἴσον δὲ καὶ ἐαυτὸ ὠφελεῖ. καὶ
 πύα ἀπατα συν ὀκλίαν καὶ σιφίον
 ῥίζην ἢ τῷ ὅπου ὁμοίως καὶ κρά-
 ρας σπέρμα, κοιλία τε σικίνη καὶ
 10 κοιλίαν σπέρμα συν πεπέρει, καὶ
 βάτε χυλὸς συν ὀκλίαν. δεῖ δὲ τὴν
 κοιλίαν ὑπάρχειν. εἴωθε δὲ τοῖς
 σωζομένοις ἀποδιδόναι διὰ τῆς
 ἰδίας καὶ ῥοῶν. καὶ ταπλάσσειν
 τὸ καὶ σωμαὶ καὶ τὴν κοιλίαν, ἀλευ-
 15 ρὸν κριθίνω καὶ μελικράτε.

Πρὶ Γάλακτος ἐμπυ-
 παδέντος. Κεφ. κς'.

Καὶ τοῖς λαβύσιν ἐμπυπαδέν
 γάλα, ἀδρόως πολὺς πνιγμὸς γί-
 νεται διὰ τὸ θρομβώσθαι. οἷς βοη-
 5 θήντας προσφέρειν δεῖ ὥσπερ ἀν-
 τίδοτον πυτίαν συν ὀκλίαν, πολλὰ-
 κας ἀνακρίνοντας πίνειν. καὶ καλα-
 μίνθης τὰ φύλλα ξηρὰ ἢ τὴν χυ-
 λὸν ὁμοίως ἢ σιφίον ῥίζαν ἢ τὸν
 ὅπου συν ὀκλίαν τῷ. σύμῳν τε
 25 συν ὀκλίαν, καὶ τὴν πύα τοῖς πνιγ-
 αν. ἀντων δὲ μηδὲν προσφέρει-
 ναι, μάλλον γὰρ πῆξιν καὶ ἴσον
 τὸ γάλα. ἀλλ' οὐδὲ τέττες ἐμείν
 δεῖ ἐπιστάμενον γὰρ ἐπὶ τὰ τῷ σ-
 μαὶ καὶ τῇ τε θρομβώσθαι πνι-
 γει.

Πρὶ

attractu illo in sublimē relati,
 magis gulæ inculcantur. Dari
 ergo opus est quæ concretum
 sanguinem discutiūt, & aluum
 subducūt. Grossi lacteo succo
 turgentes ex posca, & nitrum
 per sese auxiliantur: nec secus
 coagulum omne cum aceto et
 laserpitij radice, aut lasere: iti-
 dem & brassicæ semen, & ἐ ci-
 nere ficulneo lixiuia: conyxæ
 folia cū pipere, & rubi succus
 ex aceto. Alius resoluēda. his q̃
 servantur, stercoreosa & fluida
 per sedem egeri consueverūt.
 Stomachū aluūque hordea-
 cea farina ex aqua mulsa per-
 ungere oportet.

Lac coagulātū. Cap. XXVI.

Eos qui coagulātū lac hau-
 serūt, frequēs illico stragulatio
 inuadit, quod ī globulos quos-
 dā lac coalescat. Quib⁹ iuuā-
 dis p̃ antidoto, coagulū ex ace-
 to dam⁹, & bibere sapi⁹ cogi-
 mus. Dam⁹ & calaminthæ fo-
 lia arida, itē succū: aut laserpitij
 radicē, au laser cum posca: thy-
 mūq; ex vino, & cum luto suo
 lixiuiā. Sed nulla falsilago ob-
 iiciatur, quoniā magis lac coi-
 ret, & in caseū densaretur. Ne-
 que illos vomere conuenit: si-
 quidē cōcretū lac sese in gulæ
 angustias insinuans, stragulat.

T ij

Atē-

DIOSCORIDIS

Argēti spuma. Cap. XXVII.

Spuma argenti pota, stomacho, vētri, & interaneis gravitatem cum magnis torminib⁹ adfert, & nonnunquā pondere suo intestina vulnerat, urināmq; supprimit: corpus intumet, plūbeamq; deformitatem cōcipit. Quib⁹ subuenit secūdū vomitionē, potū sylvestris homini semen, myrrhæ drachmę octo, absinthiū, hyssopū, apij semen, aut piper, aut ligustri flos ex vino: aridū palūbis fimum, cum nardo & vino.

Argentum viuum.

Cap. XXVIII.

Argentum viuum potum eadem quæ, spuma argenti infert, eisdēque vtendum auxiliis. Lac copiosæ potum auxiliari constat: sed postea euomant, qui hauserunt.

Calx, sandaracha, auripigmentum. Cap. XXIX.

Calx, sandaracha, & auripigmentum, pota aluum, & intestina cum vehementi erosione excruciant. Præbenda cuncta quæ suo admistu illorum acrimoniam hebetant, ac solvunt, & facilem lubricamque aluum reddūt, cuiusmodi ibisci & maluæ succus est: natura enim vtrique perlubrica.

Dandum

Πρὶ Λιθαργύρου. Κεφ. κζ'.

Λιθαργύρος δὲ ποδεῖσαι βάρους ἐπιφέρει σωματικῇ καὶ κοιλίᾳ, καὶ ἐντέροις μετὰ σφοδρῶν ἐπιτεταμένων, ἐλίσσει δὲ καὶ πηρώσκει τὰ ἐντέρα. διὰ τὸ βάρους, *καὶ ἐπέχει τὰ οὖρα. παρσιδεῖ δὲ αὐτῶν τὸ σῶμα, καὶ μολεδῶν ἀπορέων λαμβάνει. ἐφ' ὧν ἀρμόζει μετὰ τὸν ἑμετον πινόμενα σὺν οἶνῳ ὀρίμου ἀγρίου σπέρμα, *ἢ πέπαι, 19 ἢ κύθρου ἀνθος σὺν οἶνῳ πεπτεῶν τε ἀγρίων ἀφοδος ξηρὰ μετὰ νάρδου καὶ οἶνου.

Πρὶ Τδραργύρου.

Κεφ. κη'.

Τδραργύρος δὲ ποδεῖσαι, τὰ αὐτὰ ἐπιφέρει τῇ λιθαργύρῳ, καὶ ἐπὶ τέτων δὲ τοῖς αὐτοῖς βοηθήμασι χρῆσθαι. δοκεῖ δὲ αὐτὸς ἀφελεῖν γάλα πινόμενον ἑμείψαν δὲ καὶ ἔτοι.

Πρὶ Τίτανος.

20

Κεφ. κθ'.

Τίτανος, συνδαράζῃ καὶ ἀρσενικόν ποδεῖσαι. τὰ αὐτὰ ἀλγύματα κοιλίας καὶ ἐντέρων ἐπιφέρει μετὰ θυμῶν σφοδρῶν. ὁδὸν προσφέρειν δεῖ ἅπαντα ὅσα μετὰ τῷ κινεῖσθαι, δύναται τὸ συμεῖν, καὶ πρὸς πλὴν κοιλίαν ὀλισθηρὸν παρέχειν, οἷος ἐστὶν ὁ τῷ ἐλίσκου καὶ τῇσ μαλάχῃσ κυλῶς, λίαν ὀλισθηρὸς ἀπ' αὐτῶν παρέχειν

παρέχειν δὲ δεῖ καὶ ἀφέψημα λι-
νοπέριμου, καὶ ὁ τῆς τράγου κελυ-
φῆς βοτάνης καρπὸς, ἢ ὀρύζης,
καὶ γάλα πολὺ σὺν μελικράτῳ, καὶ
ξωμοὶ λιπαροὶ καὶ εὐχρημοί.

5 Πρὶ Λαγῶν θαλασσίης
Κεφ. λ'.

Λαγῶν δὲ θαλασσίον πο-
θέντος παρακολουθεῖ γυνὴς ὁ-
μοία ἰχθύσι βρωμώδεσιν· ἐν δὲ
τῷ χρονίῳ, κοιλία τὲ ἀλγεῖ, καὶ
10 οὐρα ἐπέχεται· εἴποτε δὲ ἐμ-
κριθεῖν, περφυεῖζοντα τῇ χροῖ
ὁρᾶται. ἀποσποφί τε καὶ μύσος
πρὸς πάντα ἰχθύω· καὶ ἰδρυ-
σι διωσώδη. παρέπιεται δὲ αὐτοῖς
καὶ ἔμετος χολώδης, ἐνίοτε αἵ-
ματι μεμιγμένος. οἷς δροτέον
15 γάλα ὄνειον ἢ γλυκὺ συνεχρῶς,
καὶ μαλάχης ῥίζης καὶ τῶν φύλ-
λων τὸ ἀφέψημα, ἢ κυκλαμῖ-
νου ῥίζαν λείαν σιτὸν οἶνον, ἢ ἑλλε-
βόρου μέλανος ἢ σκαμμωνίας ὁ
20 ποῦ μὲν μελικράτε, ῥοδῶν τε πυ-
εῖνων· ἢ κεδρίας λείας μετ' οἶ-
νου· ποιεῖ καὶ χυμὸς αἷμα ποθέν
θερμόν. μὴ διωσάμενοι δὲ οὗτοι
ἰχθύας πρὸς τὴν γαστέρα, μόνους
τῶν ποταμίων καὶ καρκίνους ἐφθῶς
25 ἐωπίοισι, * καὶ πίνουσιν οἶνον με-
μιγμένον ἐπ' αὐτῶν. τεκμή-
ριον δ' ὅτιν ἐπ' αὐτῶν
σωθῆναι ὅταν ἀρ-
ξῶνται ἰχθύας
πρὸς τὴν γαστέρα.

Dādum decoctum seminis li-
ni, vel semen tragi herbæ, vel
oryzæ, lacq; cum aqua mulsa
copiosum, iura pinguia, & bo-
ni succi.

Leptus marinus.

Cap. XXX.

QVI leporem marinum
biberunt, piscium virus olent:
procedete tempore, alius do-
lore afficitur, & vrina sistitur:
etsi quando eam reddere con-
tingat, purpureum coloré re-
feret. Omne piscis genus auer-
santur, & odio habent: foetido
ac graui sudore manant: bilio-
sus vomitus, interdum sangui-
ni promiscuus, subsequitur. His
dandum lac asininum, vel pas-
sum cōtinuè, aut radicis maluæ
foliorumque decoctū, aut tri-
ta cyclamini radix cum vino,
aut veratri nigri, aut scammo-
nij succi drachma, cum aqua
mulsa, puniceque mali acinis.
Cedria contrita, cum vino effi-
cax est: anserinus sanguis, vt te-
pebit, potus. Sed cum pisces o-
mnes respuant, asperneturque,
solis fluuiatilibus cancris vesci
possint, bibuntque eos admi-
sto vino, adiutique ab his per-
coquunt. Cūque appetere et
comesse pisces cœperint, suæ
salutis indicium habent.

Πρὶ

T iij Rubeta

DIOSCORIDIS

Rubeta & palustris rana.

Cap. XXXI.

Rubeta, aut rana palustris assumpta tumores ciet, pallor corpus vehemēter decolorat, vt planè buxum spectetur: spi-
rādi difficultas torquet, & gra-
uis halitus oris, singultusque
& inuita interdum genituræ
profusio cōsequitur. Adiuuan-
tur secundum vomitionē mul-
to meri potu & arundinis ra-
dicis binis drachmis, aut cy-
peri totidem. Breuiter, cogēdi
sunt vt vehemēti ambulationi
& cursu se credant, ob
torporem quo corripi-
untur. Quinetiā quo-
tidie lauādi sunt.

Hirudo. Cap. XXXII

Deuorata cum aqua hiru-
dines, si ori ventriculi, adhæ-
rent, tractione partium, non-
nullam suctionis imaginē pre-
bent: eo enim argumento hau-
sta hirudo deprehenditur. Has
muria sorbitione excutit, &
cyrenaicus succus, aut laserpi-
tij folia, aut betæ, cum aceto,
aut pota niuis glebula, cum po-
sca. Nitrum ex aqua gargariza-
tur, aut atramentum futorium
aceto dilutum Si faucibus he-
reant, iniectæ lupinorū farina,
aqua

Πρὶ Φρυγῶν.

Κεφ. λα.

ΦΡΥΝΟΣ ἢ βάτραχος
ἐλεῖος προσγενεχθεὶς, ἐπιφέρει
οἰδήματα σώματος μετὰ ὀχρό-
τητος ἐπιτεταμένης, ὡς δοκεῖ
πύξω εἰκέναι· δυσπνοεῖν τε καὶ
δυσωδία ὀδωδέναι τὸ σῶμα, καὶ
λυγμὸς αὐτοῖς ἐπιταί, ἐπίστε δὲ
καὶ σπέρματος ἀποσείρετος ἐκ-
κρίσις. ἐνδοκῶντοί τε πυγχαί-
σι μετὰ τὸν ἔμετον λαμβάνον-
τες ἄκρατον πολὺν, καὶ καλὰ-
μον εἴζης < β'. ἢ κωπείρου τὰ
αὐτό. δεῖ δὲ αὐτὰς καὶ ἀναγκά-
ζειν συντόμως σπειρατῆν καὶ
τρέχειν διὰ τὸ ἐν αὐτοῖς ναρκώ-
δες. λέγειν τε καὶ ἐκείνῳ ἡμέ-
ραν.

Πρὶ Βδέλλας. Κεφ. λβ'.

Βδέλλας τὰς καταπνομῶας
σὺν τῷ ὕδατι καὶ προσφυομῶας
ἐν τῇ καταπόσει τῷ σῶματι τῆς
κοιλίας, ἐλκούσας τὰ μέρη, καὶ φαν-
τασίαν ἐκμυζήσεως παρεχούσας·
ὁ σὺρ καὶ σημεῖόν ἐστι τῆς βδέλλας
καταπεπόδαυ. ἀποβάλλει ἄλλην
καταρροφικὴν, καὶ ὅπες κυρηναι-
κὸς ἢ φυλλασπείου, ἢ τεύτλου
σὺν ὅξει πινόμενα. ἀναγκασθεῖ-
σαι τε νίπτον σὺν ὕδατι, καὶ χαλ-
κανδον σὺν ὅξει ἀνεθέντι. τὰς δὲ
ἐν τῷ βρόγχῳ προσφυείσας ἐμ-
βιδάσας εἰς ἐμβάσιν δερμὶν,
δίδει

διδου ψυχρὸν ὕδωρ ἐν τῷ στό-
 ματι διακρατῆν καὶ ἐξελύσσει-
 ται. περιονκτέον δὲ καὶ τῶν ἐσ-
 τὸ φελεία διδιδόμενων, ὅτι φερόντων
 δὲ πολλάκις κίνδυνον οὐχ ἥτ-
 5 τοια τῶν ἄλλων φαρμάκων, ὡς
 ἐλλεβορέου λευκοῦ, καὶ θαψίας
 καὶ ἐλαφθείου, καὶ ἀγαικοῦ τοῦ
 μέλανος· πινυμὸν γὰρ ὁπφέρει
 ταῦτα ἢ ὑπερχαίδαρσιν. δευ-
 10 πύραρχον δὲ ὡς περιέριηται ἐπὶ
 μυκήτων καὶ τῶν ὁμοίων. ταῖς δὲ
 ὑπερχαίδαρσεις τοῖς διωκαμένοις
 ἐπέχειν ταῖς ἐκκρίσεις στεῖναι.
 καὶ τῶν μὲν δοκαυμάτων ἐπὶ ὅλῳ
 γον βλάπτειν, ἐνίοτε δὲ κινδύ-
 νους ὁπφερόντων, οὐκ ἀμε-
 15 λητέον. ὣν ὅτι τὸ ἀγριον
 πήραν καὶ τὸ μέλαν διαγ-
 καὶ οἱ νεαροὶ παρὰ τοῖς.

Πρὶ Αἵους. Κεφ. λγ'.

Αἷος, ἄνδρος ὅστις ἀκαθάρτης τῆς κα-
 20 λουμύνης αἵου. ἐφ' ὧν ἑμῶς μό-
 νος παραληφθεὶς ἀποκαθίσταται
 τὰς λαμβάνοντας.

Πρὶ ὕδατος ψυχροῦ.

Κεφ. λδ'.

Καὶ τὸ ψυχρὸν ὕδωρ ἀδρόον
 25 ποδὲν ἢ ἀκρατος πολλὰ καὶ γλυ-
 κὺς οἶνος ποδεῖς, μάλιστα ἀπὸ
 βαλανείης ἢ δρόμου καὶ τῶν ἐν τῷ
 τῶν γυμνασίων, πινυμοὺς καὶ ἀλ-
 γήματα ὁπφέρει. ἐφ' ὧν φλεβο-
 τομία παρὰ τοῖς παραληφθεῖσιν,

aqua frigida ore contineatur,
 & ad eā hirudines exiliēt. Pro-
 uidendū etiam iis, quæ etfi fe-
 rēdi auxiliij gratia tradātur, nō
 minora tamē cæteris venenis
 pericula sæpi⁹ adferūt. Qualia
 sunt albū veratrū, tapfia, elate-
 riū, agaricū nigrum: si quidē ea
 strāgulatus concitat, aut immo-
 dicas deiectiones mouēt. Qui-
 b⁹ ea medētur, quæ in fungorū
 mētione & similibus retulim⁹.
 Nimios autē deiectionū im-
 pet⁹ medicamētis q̄ excremēta
 supprimūt coercebimus. Neq;
 negligēda quæ parū quidē no-
 cere vidētur: interim verò vitā
 in discrimina agunt. Quo ī nu-
 mero sunt syluestris ruta, gith,
 nouæ glacies, pappi recentes.

Flos spinæ cactos dictæ.

Cap. XXXIII.

FLORES autem sunt e-
 ius spinæ, quæ cactos dicitur.
 Eos qui sumpserint, sola vomitio
 recreat.

Aqua frigida.

Cap. XXXIII.

Aqua frigida abundè pota,
 aut meracum, vinum liberalius
 epotum, aut passum, præfer-
 tim à balneo, aut cursu, aut
 vehemēti exercitatione, stran-
 latus & dolores infert. In qui-
 bus sanguinis missio protinus,

T iij &c

DIOSCORIDIS

& vacuatio, imminetia sol-
uunt pericula. Sed de notis ve-
nificiorum, ac remediis, & ca-
uendi modo, hætenus dicta
sint, Subiungeremus etiam an-
tidota necessaria quæ præcla-
rè auxiliantur, quibus vtimur,
quale Mithridatium est præfer-
tim, & quod sanguine, &
quod scinco temperatur.

Verùm quoniã aliis in
locis diligentissimè
scripta sunt, hîc ab
eorû descriptio-
ne superfe-
demus.

LIBRI SEXTI
FINIS.

PEDA-

καὶ κενώματα λύει τὸν ἐπιρρι-
μὸν κίνδυνον. Καὶ περὶ μὲν
τῶν σημείων τοῖς λαβοῦσι τὰ θα-
νάσιμα τῶν φαρμάκων, καὶ τῆς
ἀφ' αὐτοῦ ἀντιόσης διὰ τοῦ πείρας,
ἐπὶ δὲ προφυλακτικῆς ἀγωγῆς, ὅ-
τι ποσὺτον ἡμῶν εἰρήδω. ὁ-
ποῖα δὲ καὶ τὰς ἀντιδο-
τας ἀναγκασιότατα καὶ ἡγετιό-
τατα βοηθούσας αἷς ἐχέουσιν το-
τῇ τε μὲνιδάτειω, καὶ τῇ δι'
αἱμάτων καὶ τῇ διὰ σκίγκων. 10.
αἷς διὰ τὸ ἐν ταῖς ἀντιδοταῖς
ἀκριβέστατα ἀναγεγράφαι,
παρητησάμενος ἀναγέ-
φειν ἐν ταῖς.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙ- 15
ΒΑΙΟΥ ΕΚΤΟΥ
ΠΕΔΑ-

Π Ε Δ Α - P E D A N I I

ΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟ-
ΡΙΔΟΥ ΑΝΑΖΑ-
ΒΕΩΣ ΒΙΒΛΙΟΝ
ΕΒΔΟΜΟΝ.

DIOSCORIDIS A-
NAZARBEI, LIBER
SEPTIMVS.

Περὶ Ἰοβόλων, ἐν ᾧ καὶ
περὶ λυσσῶντος κυνός.

Κεφ. α.

De venenatis, in quo
& de cane rabioso.

Cap. I.

10



ΟΝ μὲν πε-
ρὶ τῶν ἰοβόλων
ζώων καὶ θα-
νασίμων φαρ-
μάκων λόγον
προτιθέμεθα



E bestiis quæ vi-
rus eiaculantur,
& exitiis ve-
nenis, idè scri-
bere aggredi-
mur, ut tota cu-

rationis remediorumq; ratio ad
umbilicū perducatur: siquidem
pars hæc non minus quam cæ-
teræ aliæ, necessaria est iis qui ar-
tem medicam exercent, utpote
cum adminiculo eorū quæ ini-
bi tradūtur, doloribus, periculis,
& cruciatibus, plurimisque aliis
malis homines liberari conue-
niat. Hæc autem in summa fasti-
dia duo, sicuti ab initio relatum
est, distribuitur. Nam qui de fe-
ris virus inspuētibus sermo diffe-
rit, Theriacus dici solet: qui ve-
rò de amoliendis veneficiis, A-
lexipharmacus: quo prius tra-
dito, simul quæ sequi signa con-
fueuerunt, præmonstrabimus:
tum quæ nonnihil auxiliij ferūt.

Omnia

δεῖ

διελθεῖν, εἰς συμπλήρωσιν τοῦ
15 περιουδευτικοῦ τόπου· καὶ γὰρ
οὐδεὶς τῶν ἄλλων ἦσαν ἀ-
ναγκαῖόν ἔστι τοῖς ἰατρούουσιν,
ἐπειδὴ περ, καὶ κινδυνῶν καὶ
περιουδυνῶν, καὶ ἀληθινῶν,
καὶ πλείων ἄλλων κακῶν ἀ-
20 παλλάσσειται τοῖς ἀνθρώποις
συμβαίνει διὰ τῶν ἐν αὐτῷ πα-
ραδιδομένων. κατὰ δὲ τῶν
ἀνωτάτω μερίζεται διχῶς κα-
τάπερ ἐν ἀρχῇ παραναπεφώ-
νεται. καὶ ὁ μὲν περὶ τῶν ἰο-
25 βόλων, παραγορεύεται θηρια-
κός· ὃ δὲ περὶ τῶν θανασίμων ἀ-
λεξιφάρμακος· ὃν τάξαιτες δὴ
παραδείξομεν τὰ εἰσδόντα πα-
ρακολουθεῖν· τὰ τε διωάμε-
να βαλεῖν πρὸς ἕκαστον αὐτῶν.

DIOSCORIDIS

Omnia autē in promptu, & ad manū habere artificē oportet, ppter vrgētē sepe numero necessitatē: siquidē pauca ē venenis & virulentis animantibus, tarda & grassantia sensim pericula cient, ita vt dilationē admittāt: pleraq; verò præsentaneā perniciē afferunt. Hominū autē partim malē aliis cogitātes, ingenita prauitate maleficiū ita temperāt, vt spatium curanti liberum nō relinquāt: partim sceleris admissi cōscientia, aut tristi aliquo euentu oppressi, hausto sponte veneno, mortē sibi consciscere conātur. Qui postea deprehensi, aut resipiētes, & vitæ cupidi, præsentaneā opē poscūt. Non desunt qui hostiles sagittas illinētes, aut fontes aquasque puteanas hac labe polluētes, certā & ieuitabilē aduersariis pnciē molliūtur. In quibus ipsis etsi maleficiū nō subito, sed aliquāto post grassari natura sua cōparatum est, tñ nisi primo quoq; tpe coërceat, & remediis subinde excipiat, frustra tādē succurritur, occupatis iā corporib⁹ exitiali vi veneni. Proinde nō vulgari industria diligētiaq; in ea re vtēdū est, vt qđ in aliis incōmodis ars cōsuevit, i his quoq; salutē mortalibus prebeat. Quin & apud priscos gen⁹ hoc vnū estimā-

δεῖ δὲ πάντα πρόχειρα τὸν τεχνίτῳ ἔχειν, διὰ τὸ κατεπείγειν πολλάκις τὴν χεῖρα· ὀλίγα μὲν γὰρ καὶ τῶν ἰοεσίων καὶ τῶν θανασίμων χολαίους καὶ ἐξ ἀναβολῆς φέρει πᾶς κινῶσι· τὰ πολλὰ δὲ ἐνδεώς· καὶ οἱ δὲ ἐμψυτεῖν πονηεῖαν ἐπιβολέοντες ἑτέροις, ἀνυπέβητον τὸ κακὸν ἀσφράζειν βούλονται· καὶ οἱ διὰ μοχθηρὰν σωείδην ἢ χαλεπὴν πλὴν πείσαν ἐκκοιτίως περσινεγχαῖμοι θανάσιμα· εἴτα φάρεσεντες ἢ μετανοήσαντες ὀξύτης δέονται βοηθείας· καὶ πολλοὶ δὲ τύχῳ χεῖροντες βέλῃ καὶ φέατα καὶ πηγὰς δηλητηρίοις διαφθείροντες φαρμάκοις, ἀνυπέβητον μηχανῶνται τοῖς ἐναντίοις τὸν θάνατον, ἐφ' ὃν οὐχ ἐνδεὴς ἀλλ' ἐσύσειν ἀπαντᾶν τὸ κακὸν πέφυκεν, εἰ μὴ παραχρῆμα παρηλθῇ τοῖς βοηθήμασιν, ἀνόγητος ἢ εἰ ταῦδ' ἐπιχειρῇ, φθοροποιῶσι διωάμεως καταδράξα μὲν τῶν σωματίων. διὰ τῶς οὐχ ὅπως ἔτυχε καὶ τὴν ἐν τούτοις ποιητέον ἐντρέχειαν, ἵνα ὁσὲν ἐν τοῖς ἄλλοις, τοῦτο καὶ ἐν ταῦτα ὅλη ἡ τέχνη παρέχῃ τοῖς ἀνθρώποις τὴν σωτείαν. παρὰ μὲν οὖν τοῖς ἀρχαίοις τὸ διεραπυπτικὸν μέγιστον ὑπλάμα-
εἰναιτο

ζαίετο ἔπος ὁ τρώες· οἱ ὅ γε νεώ-
 τεροι αὐτὸν ἐχώρισαν, προσυλα-
 κήν καὶ προσυλακτικὸν ὀνομά-
 ζοντες, τὰ δὲ ὑμενῆς καὶ τὰ δερα-
 πευτικαὺ μέσον τάξαι τις, μικρὰ
 5 καὶ παρὰ πᾶσιν ὀπιπολαῖω πλα-
 νηθέντες πειθαρότητι. φασὶ γὰρ γί-
 νεσθαι τρεῖς καταστάσεις τοῖς ἀν-
 δρωπίοις σώμασι· μίαν μὲν καθ'
 ἡμῶν ὑγαίνοισι· ἑτέραν δὲ καθ'
 ἡμῶν νοσοῦσι· τρίτην δὲ μέσσην ἐ-
 10 κατέρων. καθ' ἡμῶν νοσοῦσι μὲν
 ὑγαίνειν, * εὐεμπιῶτως δὲ εἰς
 τὰ πάθη καὶ τὰς κινδύνους ἐ-
 χοῖσι, διὰ πῖνα φθροειδὸν ἐγ-
 κλημύλω τοῖς σώμασι διώαμιν·
 ὡς ἐπὶ τῶν ὑπὸ κινὸς λυσσῶν-
 15 τος διδνημύων διαρρεῖται καὶ
 μῆπω* πεπιώκων ὑδροφόρων.
 καὶ τῶν κακιδείδων εἰληφότων
 μῆπω δὲ περιεδιωκμύων ἢ
 δυσουρεμύων. ἀναλόγως οὖν
 ταύταις ταῖς τρισὶ καταστάσε-
 20 σιν, εἰς τεία διηρῶς ἢ τέχνην.
 εἰς τε τὸ ὑμενὸν ὃ δὴ τηρητικὸν
 ἔστι τῆς ὑγείας· καὶ εἰς τὸ προσυ-
 λακτικόν, ὅφρ' κωλυτικὸν ἔσθ' ἢ
 εἰς τὰ νόσους ἐμπιῶσεως· καὶ εἰς
 δεραπευτικόν, δι' οὗ λύεται τὰ
 25 πάθη. ῥητέον δὲ πρὸς αὐτοὺς ὅ
 τι πρῶτον μὲν κατὰ τὴν ἐπι-
 βουλὴν ταύτην, οὐχὶ τρεῖς κα-
 ταστάσεις πρὸ τοῦ σώματος, ἀλλὰ
 τέσσαρες εἶναι λέγονται, ὡς γὰρ
 εἰσὶ πηγὲς οἱ μῆπω μὲν νοσοῦν-

τες,

stimabatur esse ei⁹ partis, q̄ me-
 dicamētis pugnat: sed recēiores
 id ipsum discreuerūt, nominātes
 præcautionē, & modū præcauē-
 tē, salubris sanantīsq; mediū sta-
 tuētes, parua & leui supra modū
 persuasione decepti. Siq; de treis
 in humanis corporibus cōstitu-
 tiones esse cōtendūt, vnā, qua sa-
 ni degim⁹: alterā, qua sinistra va-
 letudine corpora laborāt: tertiā,
 quæ mediū inter vtrasq; locū si-
 bi vēdicat. In qua positi, sanitatē
 specie mētiūtur, facilēq; in mor-
 bos & pericula cōcidūt, ob vim
 corruptricē quæ corporibus no-
 stris incūbit; quæadmodū in iis
 videre licet, quos ex candescēs ra-
 bie canis momorderit, necdum
 tamē aquā horrēt. In iis quoq; q
 cātharidas hauserūt, sed nondū
 vrinē tormēto cruciātur. Tripar-
 titō igitur artē digeri, triplicique
 corporis cōstitutioni meritō re-
 spondere tradunt. Salubrē partē
 esse volunt, quæ sanitatē tuetur:
 præcauentē, eandēq; prohibētē,
 quæ obstat quomin⁹ in morbos
 incidāt: & sanantē, qua vitia dis-
 cutiūtur. Quib⁹ ita respōderi po-
 test, q̄ primū ex ista ratiocina-
 tione nō treis corporis tantūm,
 sed quatuor haberi constitutio-
 nes fatēdū esset: quippe vt aliqui
 sunt, qui necdum morbo labo-
 rant,

rāt, morbo tamē maximē ob im-
pendentē causam sunt obnoxij,
ita sunt, qui iā priore morbo de-
functi, nondū tamē secūdæ va-
letudini restitui sunt: id quod in
iis qui à morbo proximē sese re-
colligūt, cernere licet, qui viriū
recreationē & robur desiderāt.
Sed quēadmodū curādī ratio ad
partē medicamentariā pertinet,
ita præcautionē eidē subiici par
est. Ad arcendas enim valetudi-
nes vehemētib⁹ vtimur auxiliis,
altiore scarificatu, vstionib⁹, am-
putatione, derodētibus epithe-
matis, potionib⁹ pernicipiei occur-
rētibus, & plerisq; aliis. Verum-
enimvero sunt usque eò rudes
nōnulli vt ne remedia quidē ap-
pellēt quæ morbos arceāt. Cui⁹
sentētiæ inire rationē haud prō-
ptū est: etenim cū verbū ipsū,
præcauere, tū agēdi modus, om-
nino auxiliare remediariāq; vim
præ se ferūt. Mirū verò nisi etiā
sua illa distributione partiū eos
cōplectūtur q. in pestilētis coeli
statu morbo nōdū correpti sūt:
pesti tñ, ppter obuerfantis aëris
occasionē, opportuni, & in mor-
bū proni reddūtur. Dicere for-
sitā quis posset, salubris īstitutio-
nis præcepta nō aliud esse, q̃ ar-
cēdorū morborū rationē: quip-
pe cū firma reddere corpora, &
minus

τες, ἐπιτηδείως δὲ πρὸς τοῦτο
διακείμενοι διὰ τὴν ἐπιμέ-
νην αἰτίαν, οὕτως εἰσὶ πηγὴ οἱ
μικροὶ νοσοῦντες, μήπω ὅτι τὴν
ὑγίαν εἰληφότες· ὅπως ἰδεῖν ὅτι
ἐπὶ τῶν ὑπογύως ἀπὸ πλάσμε-
νων τῆς γόσου, ἀναλήψεως δὲ καὶ
ρώσεως θεομενῶν. ἀλλ' ὃν περ
τρόπον ἢ ἐπιμέλεια τῆς θεραπευ-
τικῆς μέρους τῆς τέχνης ὅτι, τὸν
αὐτὸν τρόπον καὶ προφυλακτικὸν
ὑπὸ τῷ τετάρτῳ καὶ περὶ σήκῃ. 10
βοηθήμασι χρῶμεθα καὶ τοῖς σφο-
δρωτάτοις ἐν τῇ προφυλακῇ, κα-
ταχρήματα βαθυτέρω, καὶ καύ-
σεις καὶ φεικτοὶ καὶ δηκτικοῖς ἐ-
πιθέματα καὶ ποτισμοῖς, καὶ
ἄλλοις τελείουσιν. ἀλλὰ γὰρ οὕτως 15
εἰσὶ πηγὴ ἀγνώμονες, ὥς καὶ δὲ
βοηθήματα καλεῖν τὰ προφυ-
λακτικὰ. οὐ γάρ τιον εἰπεῖν καὶ
ὃν πῖνα λόγον· καὶ τὸ ὄνομα μὴ
τὸ προφυλακῇ, καὶ ὁ τῆς ἐνε-
ργείας ὁ τρόπος τὸ τοῦ αὐτοῦ πᾶν. 20
τὴν βοήθημα ἀποδείξει, πῶς
δὲ οὐκ ὑποτάσσουσιν τῇ διαι-
ρέσει καὶ τὰς ἐν ταῖς λοιμικαῖς
φειδύσεσιν, οὕτω μὴ ἐαλωκό-
τας πάθει, διακείμενοις ὅτι πρὸς
τοῦτο ἐπιτηδείως πῶς διὰ τὴν 25
ἐν τῇ φειδύοντος ἀφορμῇ. εἰ-
πεῖ δ' αὖ τις, καὶ τὴν τῶν ὑγι-
νῶν παραγγελιῶν ἀγωγῇ, ἡ δὲ
ἐτερον ἢ προφυλακτικὸν ὑπάρ-
χον· δύσασθαι γὰρ τὰ σώματα καὶ
τερεῖν

τερεὰ παρασκευάζειν περιόμει-
 να χάειν τὸ δυσάλωτα ἡμέτε-
 ραῖς νόσοις. τὸ δὲ κυριώτατον ῥη-
 τέον ἐστὶ, τὰ μέρη τῆς ἰατρικῆς,
 οὐχὶ ταῖς καταστάσεσι τῶ σώμα-
 5 τος ἀναλόγως δεῖν εἰρηῇ δαί-
 λα φιλολογεῖν διὰ τὸ σημειω-
 πκὸν ἰδίαι ἐκαστον τῶν ὁμῶν, ὥς
 ἐν τοῖς οἰκείοις τόποις ὑποδεί-
 κνυμην. πρὸς τοῦτοις μὲ οὐδ' οὐ
 * πλείονα ῥητέον. ἐκείνο δ' μάλ-
 10 λον παρασημαστέον ὅτι καλεῖ-
 μὲν ἀναιπολόγητα τὰ ἀπὸ τῆ ἰο-
 βόλων ζώων, καὶ τὰ ἀπὸ τῆ θανα-
 σίμων συμβαίνοντα φαρμάκων,
 καὶ πρὸς ταῦτα βοηθεῖ. διὰ τῆ-
 τό γε καὶ παρατηρητικῆς τυλχανός
 15 ἀνδρογνητικῆς ἔτεχνος προσπε-
 σοῦσης ἀπόρημα, ὡς δὴ ὁ λόγος
 πεπίστευται. ἔσθ' ἐν τῷ κατὰ
 παξ τὸ τοῦ ὁμῶν. ἀλλ' αἰεὶ
 τὸ παρέλκον καὶ μηδεμίαν χρεῖ-
 αν ἐπὶ τινα τῶν ἔργων παρεχόμε-
 20 τον δυσόχαστον· εἰ καὶ τελείως ἀναι-
 πολόγητον ὑπάρχει καὶ ταῖς ἰδιό-
 τηται, τὸ τοῦ δὲ ἐπὶ τῶν θανασί-
 μων φαρμάκων καὶ τῶν ἰοβόλων
 ζώων εἰωθὸς ἀποβαίνον. τὸ μὲν
 25 τοῖς * ἄρχουσιν εἰς τὰ ἔργα, καὶ τὸ
 παρέλκον ταῖς τῶν δευραπύειν ἀ-
 φρομαῖς, ἔτ' ἀκατάληπτόν ὄσιν,
 οὗτ' ἀναιπολόγητον καὶ μάλ-
 λόν τις ὁρμώμενος ἀπ' αὐτῆς, πί-
 στω καὶ παρρησίαν ἔχειν διεβε-
 βαιώσατο πρὸς τῆς καταλήψεως
 τῶν

min⁹ vitiis obnoxia nitamur, vt
 inoffensa valetudine degāt, nec
 morbis cōflictētur. Neq; id silē-
 tio prætereundū, quod maximè
 præcipuū, & tanq̃ caput rei est,
 nō oportere medicine partiū di-
 stributionē, totidē corporis cō-
 stitutionib⁹ respōdere: sed natu-
 ras singulorū suis notis seorsum
 scrutari ac explorare, vt suis lo-
 cis ostēdimus. Cum iis igitur nō
 pluribus agēdū. Illud magis ad-
 notare conuenit, affectus qui à
 virulētis animalibus venenisque
 cōtrahūtur, vocari cæcos, id est,
 quorum ratio minimè iniri po-
 test. Quin & ea quæ eisdē auxi-
 liātur, nulli pariter sunt addicta
 causæ: quapropter quæstionibus
 obseruatoriæ artis, & ei⁹ quæ ra-
 tiōe fulciatur, annumerari solēt.
 Neq; prorsus verū deprehendi-
 tur, affect⁹ huiusmodi cæcos es-
 se. Nā quod semper septrahit, &
 nullū in quibusdā necessariis v-
 sum exhibet, haud facili cōiectu
 ra colligi potest: etsi nature pro-
 prietate, prorsus cæcos, eos affect⁹
 cōcedim⁹, qui ab exitialib⁹ vene-
 nis, & animātibus quæ virulēto
 morfu sequiūt, cōtrahūtur. Nā qđ
 ad op⁹ nōnullū vsū præbet, datq;
 medēdi occasionē, neq; imper-
 ceptibile, neq; cecū, nullive cau-
 se obnoxiiū reputatur: sed magis
 ab ipso

DIOSCORIDIS

ab ipso quis impulsus, demonstratōne se habere, & opinionē de abditorū cognitione cōfirmare poterit. Nā et si sepe minora sūt, q̄ vt sensib^o percipiātur, euidēter tamē ex ipsis inter se collatis deprehēdūtur. Diocles autē in eo cōmētario quē Pistarcho dicauit, satis modos p̄strinxit, ad verbū ita scribēs: Nosse q̄s hoc potest cū in aliis nō paucis, tū in viperis, & scorpionibus & reliquis id genus, secū animo reputās, vt quis exiguo sint corpore, vixq; cōspectui subiiciātur, magnorū tamē discriminū ac dolorū causas inferūt: quorū nihil præter quādā corporis exiguitatē, vimq; præ cæteris animātib^o datā illis, facile fuerit spectare. Quāta enim ea moles corporis est, quæ à scorpj ictu, & aliorū id genus venenatorū quæ nos mortu cōficiūt, attingitur? quorū aliqua vehemētes cruciat^o excitāt, alia erodūt & putredines cient, nec desunt q̄ presentaneā p̄niciē moliant. Aut quātulū est qd̄ à phalāgij mortu ingerit, & vniuersum corp^o excruciat? neq; enī q̄s magnitudinē ipsorū dephēdere possit, cū prorsus exigua mole constet. Ergo q̄ hęc ad affect^o referātur cōstitit inter oēs. Verū quod exactē deprehēsum sit, vim quādā ipsis

τῶν ἀδύλων διαφέρουσιν μὲν γὰρ ταῖς αἰδήσεσιν ἀπὸ τῶν ἰδίων διὰ σμικρότητα καὶ ταλὴν φως ἢ ἐναργεῦς ἐξ ἀλλήλων τυγχάνουσιν ἰκανῶς δὲ ἐφώδευσε τὰς τρεῖς ποικίλεις ἐν τῷ πρῶτῳ πλείσταρχον ὑπομνήματα, γράφων ταῦτα κατὰ λέξιν ἡγοίη δι' αὐτὸς τὸ τοιοῦτον καὶ ἐπ' ἄλλων ἐκ ἀλλήλων, καὶ ἐπὶ τῶν ἐχιδνῶν ἢ σκορπίων καὶ ἐτέρων τοιούτων ἀπειρίας δὲ ὡς ἀδύλα καὶ μικρὰ ἰσχυρὰ ὄντα, μεγάλων αἰτίας κινδύνων καὶ πόνων γίνεται ὅν οὐδὲ ἰδεῖν ἐνία ῥάδιον παράπαν αὖ σμικρότητα καὶ ἰσχυρὰ ἀπολεπομένην αὐτοῖς ἀπὸ τῶν ἄλλων θηρίων. ὀφθαλμικὸν γάρ τι νομίζειν τὸ μέγεθος, ὅσον ἀπὸ τῆς πλεονείας, τοῦ σκορπίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων τῇ σαρκὶ καὶ μαυρομέδων; ὅν τὰ μὲν ὅτι τοιοῦτα πόνον ἰσχυρὸν, τὰ δὲ, σήποντα, τὰ δὲ, κτείνοντα σώματα. ἢ τὸ διὰ τοῦ φαλαγγίου δῆγματος ἐνέμενον, καὶ ὅλον τὸ σῶμα διαπονούμενον; οὐδὲ γὰρ αὐτὸ διαγινώσκειν τὸ μέγεθος αὐτῶν δύναται τις, διὰ τὸ παντάπασιν εἶναι μικρὸν. ὅτι μὲν οὐκ ὥς ταῖς διαδέσεσιν ταῦτά ὅστις, ὡς μολόγηται παρὰ πάντων. ὅτι δὲ καὶ ἀκρεῖως κατελήληται τῷ τινὶ δυνάμει αὐτῶν χυεῖσθαι τινὰ φθοροποιόν, ἢ τις

ἢ τις κατὰ μνηστύρεον τοῖς σώμα-
 σιν αἰτία τῶν συμβαινόντων κα-
 κῶν γίνεσθαι συγκεχώρηται, καὶ
 τοῦτο πεπίστευται. καὶ οὐδεὶς αὖ
 οὕτως εὐρεθεῖν Φιλόνεκος, ὥς ἄλ-
 5 λουθεν φῆσαι τὰς ὀχλήσεις καὶ οὐ-
 χεῖ δὲ ὕλης φθορῶπιου καθαρτι-
 μένης τῶν σωμάτων μύλων ἀπὸ
 μέρους συμπίπλιν. τοῦτο δὲ λῶ
 τὸ πρὸς τὰ εἶδη τῆς τέχνης χρε-
 σιμεύοντα, κατὰ πᾶν ἔργον, τὸ
 10 ἔργον τοῦτο ποιούμενον ὑπαρ-
 ρεῖν ὥς τε ἡμᾶς μηδὲ βλάβη-
 θῶναι τι κατὰ πᾶν τὸ ὑπὸ τῆς κα-
 τὰ τὴν ἰδιότητα ἀκαταληψίας
 τῆς κοινῆς αἰτίας· ὅτι τὸ εἰδε-
 κνυθαι δυναμένης βεβαίως κα-
 15 τελεωμένης. διὸ καὶ ὁ Εὐρασί-
 στρατος ἐπισκώπιον τὴν ἀνιδά-
 ρειαν τῶν ἐμπειρῶν, αἰτίαν
 τοῖς ἀνατιτολῶσι τοῖς ἀνέσχηκιν, οὐ
 συχωρῶν αὐτοῖς τὴν αἰτίαν τῇ
 20 ἐπαγαγεσθῆκαί τινος καὶ κατὰ τὴν, ἄ-
 ληθειαν ἐπὶ τῇ νόσῳ ὑπάρχειν· τῇ
 τῇ αἰτίᾳ τῶν ἡσυχῆ ταύτην δια-
 λευκαίνων, τῷ τε μὴ λέγειν ἐπὶ τῇ
 νόσῳ ἀρκούμεθα τῇ τετελεμένη
 δεξαμενῇ οἷον ἐπὶ τῶν θηριο-
 δόκτων καὶ θηλασίων καὶ ἐπὶ
 25 τῶν λοιπῶν, ἀρκουμένην τῇ
 παρατηρήσει τῆς τῶν αἰτίων
 παρατήσεως χωρεῖσθαι τε-
 λείως. πρὸς τὸν μὲν γὰρ κατὰ γέ-
 νος οὐ ἀκατάληπτά εἰσι. ὅτι μὲν
 γὰρ διωκόμενος ὑπάρχει φθαρτικὸς,
 καὶ τῇ

dā ipsis inesse mortiferā, quæ
 insinuata corporib⁹ molestia-
 rū, quæ exoriūtur nobis causa
 fit, in cōfessio est, & omniū cō-
 sensu persuasum. Nec quisq^{ue} in-
 uenietur vsque adeo cōtētionis
 studio flagrās, qui aliūde exo-
 riri molestias asseueret, q^{uā} à ma-
 teria mortifera partē corporis
 attingēte. Porro id erat qd̄ in-
 ter vtilia artis opera ī oī opere
 dicere oportuit, quānā res op^{us}
 hoc efficiat, vt nihil pr̄sus nos
 lædat, icōprehēsa cōmunis cau-
 sæ q^{uæ} ppriis inest ratio: qñquidē
 tū euidenter indicari possit cū
 deprehēsa est. Ideo Erasistrat^{us}
 empiricorū ptinaciā graui ca-
 uillatione incessens, cæcis affe-
 ctib⁹ causas assignauit, inficiat^{ur}
 his cōmunē, & supremā mor-
 borū causam incōprehēsibilē
 esse: & hāc in eo quē de causis
 scripsit cōmētario aptissimē
 pdidit: cādido signatā lapillo.
 Nec ferēdos eos esse cēsuit, qui
 se dicant in quibuscūq^{ue}, vt in ve-
 nenis, serpentū ictibus, & cæ-
 teris id genus trita medēdi ra-
 tione cōtētos esse. Neq^{ue} satisf-
 facturā sibi obseruationē, eā
 quæ à causarū cōprehensione
 separata est. Primum enim ge-
 nere comprehendi facile pos-
 sunt. Quod autē sit letifera vis,
 corpo

DIOSCORIDIS

corporaq; permutās, ita vt per-
 rimat, ex iis quæ per genus, nō
 per speciē vagantur, curatio-
 nem indicat, qua hæc hebeta-
 re, & prorsus expugnare liceat.
 Cū verò subiungit: Ad aquam
 dulcē, & potui idoneam venit
 quis, & ante obseruationē ad
 vomitū, ad vulneris dilatatio-
 nē, ad demorfæ partis fuctū, cu-
 curbitula adfixit, partē incīdit,
 vrētia medicamēta, aut ea quæ
 vim eandē adipiscuntur admo-
 uit, postremò partem amputa-
 uit: secū reputauit medicami-
 na, quæ per summā cutim fer-
 re, & applicari solita, immiffæ
 ad intima pernicipiei repugna-
 rent. Hæc itaque quæ differuit
 Erasistrat⁹, veritati cōsentanea
 sunt, nec arti refragantur. Sed
 methodicos demirari licet, qui
 mortiferā vim corporibus il-
 lapfam negotiorū, quæ ipsa fa-
 celsit, esse causam diffiteantur,
 verū rudiūsculè nomini atten-
 dūt. Nā apud ipsos palām im-
 missa vis φθοροποιός, id est mor-
 tifera, nominatur: φθοροποιόν au-
 tē nullius officij alius esse po-
 test, quàm causæ. Aiunt hæc no-
 mina, μάρσιππος, & ἀνακαλύ-
 πλειν, esse reliquis omnibus si-
 milia, in quibus partes quæ-
 dam dictiōnū nō pro virtute,
 sed

καὶ τῶν ὑποκειμένων ἀλλοιωτικῶν,
 ὥς τε ἀναεῖν ἐν τῶν κατὰ γέ-
 νος οὐ μὲν κατ' εἶδος, ὑπογράφει
 θεραπείαν, διὸ ταῦτα ἀμελεω-
 τέον καὶ κατεργαστέον. ὅτι δὲ φη-
 σὶν ἥλθε τις ἐφ' ὕδωρ γλυκὺ καὶ
 πόσιμον, καὶ πρὸς τῆς παρὰ τῆς
 ρήσεως ἐπ' ἑμετον* διὰ τὰς τῶν
 πεπληγότος, ἢ δεδιγμένου μέ-
 ρους ἀποθλαστέον, συκῆς πρὸς
 βολῶν, ἐν τομῇ καυθείων, φαρ-
 μάκων τὸ αὐτὸ δυνάμειον ἐπι- 10
 δεσθῆναι, τὸ τελευταῖον ἀποκοπὴν
 μέρος· ἀνελογίστατο τῶν πεφυ-
 κότων φαρμάκων εἰς τὴν ἐπιφά-
 νηαν φέρεσθαι πῖνα, τῇ ἐνιεμένη εἰς
 τὰ κατὰ βλάβος ἐναντιοῦν φθο-
 ρῇ. ταῦτα μὲν οὖν δι' ὧν εἴρη- 15
 καν. Εἰς σίγρatos πάντα εἴρηκα
 καλῶς καὶ τοῖς ἔργοις ἀκολου-
 θῶς. δυνάμει δὲ ὅστις ἐπὶ τῶν
 μεθοδικῶν, οἱ πῖνες οὐ συγχροῦ-
 σιν αἰτίαν εἶναι τὴν φθοροποιόν
 ἐνιεμένην δυνάμιν ἐν τ' ἀπ' αὐ- 20
 τῆς γινομένην ὀχληρῶν, ἀλλὰ βλά-
 πον μὲν ἀνοήτως ἔστω τῷ ὀνόμα-
 τι φθοροποιός. φθοροποιός γὰρ καὶ
 παρ' αὐτοῖς ἀντικρυς ἡ ἐνιεμένη
 δυνάμεις φθοροποιεύεται. τὸ δὲ
 φθοροποιόν εἶναι τι αἰτίας ἐκ δὴ καὶ 25
 πινός ἔργου ὅστις. φασὶ δὲ τὸ μὲν ὀνο-
 μα τὸ μάρσιππος καὶ τὸ ἀνακαλύ-
 πλειν, τοῖς λοιποῖς πᾶσι παρὰ πλά-
 στον ὑπάρχειν, ἐφ' ὧν μέρη πῖνα
 τῶν λέξεων οὐχ ὅτι καὶ δυνάμιν,
 ἀλλὰ

ἂν ἂν καὶ ψιλὴν ἀνείληπται τὴν
 ἐκφορὰν. ἐν τῇ γὰρ τῷ μάρσιππος
 καὶ τῷ ἀνακαλύπτειν, ὥς τὰς χα-
 εῖας καὶ φέρονται μὲν ἐκ ἑξέως σι-
 μασίας ἔτι καὶ ἐν τῷ φθοροποιεῖν
 5 παρελκόντως καὶ οὐ καὶ δύναμιν
 ἐντέτακται. μεταβαίνονσι δὲ ἐν-
 τὸν δὲ ἐπὶ τὰς τῶν αἰτίων δια-
 φορὰς, καὶ λέγουσιν ὅτι τῶν αἰτίων,
 τινὰ μὲν ὅτι τὰ φερετάρεξαν-
 τα, ἃ ποιήσαντα πάθος χωρίζε-
 10 ται· οἷον, κόπος καὶ ψύξις, ἐγκου-
 σις, καὶ τὰ παραπλήσια. τὰ δὲ, σιω-
 πετικὰ διὰ τὸ ποιεῖν τὸ πάθος καὶ
 παραμύθην, τοῦτέστιν ὅν μὲν πα-
 ρόντων τὰ ἀποτελεσμάτα πάρε-
 σιν· ἀνέκδοτον δὲ αὐξεται· καὶ
 15 μειομένην μειοῦται· καὶ πᾶν-
 σαμύθων παύεται· καὶ αὐτοτελὴ
 δύναται εἶναι καὶ ἑαυτὰ παρα-
 γνόμενα τῶν ἀποτελεσμάτων.
 καὶ τοιαῦτα μὲν τῶν αἰτίων αἰ δὲ
 κινώταται διαφοραὶ, τὸ δὲ φθο-
 20 ροποιὸν οὐδεμίᾳ τούτων ὑποτάσσ-
 σεται πέφυκε. φερεταρεπτικὸν
 μὲν γὰρ οὐκ ἔστιν, ἐπειδὴ ὅτι τὸ πά-
 θος αὐτὸ παραμύθει καὶ τῷ σώμα-
 τος οὐ χωρίζεται. σιωπετικὸν δὲ
 ἐκ αὐτῶν λέγειτο, πλείστον μὲν γὰρ τῶν
 25 τοῦ πάρεσι καὶ καὶ δὲ ὅτι ὑποκινώ-
 σοντος κινὸς δεδηγμένον γίγεται.
 εἰ δὲ μὴ φερεταρεπτικὸν γίγεται
 μὴ δὲ σιωπετικόν, οὐδὲ αὐτοτε-
 λές, οὐδὲ πᾶσι πᾶσι αὐτῶν εἶναι. εἰ δὲ
 ἐκ μηδεμιᾶς διαφορᾶς τῶν αἰτίων
 ἄγειν

sed nuda enūtiatiōe cōprehē-
 dūtur. Enimvero quēadmodū
 in his vocib⁹ μάρσιππος & ἀνα-
 καλύπτειν, partes neq; certos ne-
 que principes retinēt significā-
 tus: sic in hoc verbo φθοροποιεῖν
 partes pductionis gratia, nō p
 virtute coaluerūt. Hinc ad cau-
 sarū differentias trāseūt, affir-
 mātq; causerū aliquas euidētes
 esse quę dū aduersā valetudinē
 crearūt, separantur: cuiusmodi
 sunt frigus, labor, estus, & simi-
 lia. Quas dā cōtinētes, quę per-
 manēt postquā morbū excita-
 rūt, hoc est, quib⁹ præsētib⁹,
 & effect⁹ eorū adfunt: increscē-
 tib⁹, effect⁹ augētūr, decrescēti-
 bus, minuūtur: & cū desinunt,
 iidē finiūtur: qb⁹ solis ac per se
 manētibus, effectus quoq; ipsi
 manēt. Talia quidē receptissi-
 ma sunt causerū discrimina, quo-
 rū nulli phthoropœon subiici
 potest. Euidēs enim causa non
 est, quoniā morb⁹ ipse perma-
 net, nec ipsa à corpore separāt.
 Nec cōtinēs causa dici potest,
 cū magna ex parte hic adfuit
 quēadmodū accidit iis, q̄ à ra-
 biofo cane sūt demorfi. Quod
 si neq; euidēs causa neq; cōti-
 nēs fuerit, neq; per se, neq; al-
 teri⁹ cōsortio causa erit. Quod
 si à nulla causerum differentia
 V phthoro-

phthoropœō deducere possum⁹ cōsequitur, vt neq; causam esse fateamur. q̄ aut asserūt, vocabula quædā in se nō habere parteis rerū significatrices, sed nuda, & simplici p̄nūtiatiōe ficta esse fateri necesse est. Verū nō oīa, sed ppauca talē nācisci cōditionē existimādū est: neq; enī ποιεῖν in hoc noīe φθοροποιὸν perinde atq; assumptitia p̄fertur, sed longē principē obtinet significationē. Quēadmodū enim φθορᾶς, id est corruptiōis, nomē mutationē in pei⁹ significat, sic hoc verbū ποιεῖν, sumi debet, vt nihil ampli⁹ ex eo qđ hāc dictionē φθορᾶς secū habeat declarat: neq; p̄rius id significat, quod oēs palā audiūt, & huic similiter reddi^t, παιδὶ ἔχειν δΐψος. Si dāt corruptione sanis fieri morbū, cōcedūt utiq; vim ī huiusmodi verbo ποιεῖν subesse, siqđē aliqđ est qđ corruptio nē efficiat. Oē aut qđ aliqđ efficit, ostēdi^t per singulas causas q̄ corporib⁹ subiiciūt, idq; tā in letalib⁹ venenis, q̄ ī iis q̄ corpori b⁹ ingerūt. Verū nō nihil subiacere causarū differētiis p̄dunt. Quinetiā aberrarūt, nō exactā diuisionē assumētes. Qui verō se dogmaticos profitētur, causā esse partim p̄parātē, partim cōtinentē

ἄγειν διωρησόμεθα τὸ φθοροποιόν, συγχωρεῖμεν αὐτὸ μὴ δὲ αἰτιὸν ὑπάρχειν. τοιούτων δὲ λεγομένων καὶ ὄντων, τὸ μὲν πινὰ τῶν ὀνομάτων ἐν αὐτοῖς μὴ ἔχειν μέρος σημαίνεται τῶν παρὰ τῶν ὀνομάτων, ἀλλὰ καὶ ἡλικίαν τῶν ἐκφορᾶν πεποιημένων, συγχωρετέον. ὅτι δὲ μὴ πάντα ὑποληπτόν τιναυτὰ ὑπάρχειν, ἀλλὰ παιτελῶς ὁλίγα· οὐδὲ τὸ πινεῖν ἐν τῷ φθοροποιῷ παρὰ πλησίως τοῖς ὑποληφθεῖσιν ἐξηγήνεγκται, κυρίως τὴν ἡλικίαν τῶν σημείων. ὡς γὰρ τὸ τῶν φθορᾶς ὄνομα τῆς ἐπὶ τὸ χεῖρον μεταβολῆς σημαίνει ἐστὶν, ὅτι καὶ τὸ ποιεῖν παραληπτόν, μηδὲν ἐν τῷ φθορᾶν ἔχειν δηλοῦν. τέττε δὲ οὐκ ἔξακούσιν πάντες, καὶ τελέως ἀσημὸν γίνεσθαι τὸ ὄνομα, καὶ παρὰ πλησίον τῷ παιδὶ ἔχειν δΐψος. εἰ δὲ διδασκὼν ἀπὸ τῶν φθορᾶς ἡμῶν γίνεσθαι τὴν νόσον, συγχωρεῖται δηλονότι καὶ ἐπὶ τῶν πινεῖν, εἰ μὴ τῶν φθορᾶς ἀσθενεστικόν ὅτι. πᾶν ὅτι τὸ πινεῖν, καὶ ἀπεργάζομεν ὅτι, καὶ ἔκαστον αἰτιὸν δείκνυσι τῶν ὑποκειμένων ἐν τοῖς σώμασιν, ἐπὶ τε τῶν ἐντεμελῶν καὶ θανάσιμων φαρμάκων. ἀλλὰ ὑποπίνεσθαι τὸ φασι τῶν αἰτίων διαφορᾶς. πεπλάνην δὲ καὶ ταῦτα διαίρεσιν ἀκριβῆς οὐκ εἰληφότες. λέγεται δὲ καὶ παρὰ τοῖς δογματικοῖς αἰτιὸν ὑπάρχειν καὶ αὐτὸ, καὶ τὰ μὲν τι παρὰ σκευαστικόν, καὶ δὲ τι σωεπτικόν. ὡς βο-

ὡς βελώνων ἕκτος καὶ βελώνων πυ-
 ρετός, καὶ τὸ συνεφιστάμενον τῷ ἀπὸ
 τελευταπικῷ, χωρίζομεν τε ὡς
 πῶμα καὶ τῷ σώματος. καὶ καθόλου δὲ
 ὅταν τι καὶ τὸ ἐαυτὲ φύσιν αἰτίον
 5 ὑπάρχη μὴ πείρηται ὅ ἐν τῇ δι-
 αφέσει μὴ χωρὶς ὅ μὴ οὐ καὶ δὲ καὶ αἰ-
 τιον τὸ τὸ ὁμογενῶν πειράζεσθαι
 φύσεως, ὅτι δὲ τὸ φθοροποιόν ὅστιν
 αἰτίον, ἔχει καὶ μὴ καὶ ἀπὸ τὸ ὀνόμα-
 τος, δείκνυται δὲ ἐναργέστερον ἐπὶ
 10 τὸ συμβαίνοντων. τὸ γὰρ αἰτίον ὑπέ-
 λαβον εἶναι καὶ τὸ ἐκ τῆς δακτύλου
 πλεονάζει, καὶ τὸ ἐπιγινόμενον ὑπὸ τοῦ
 ζώου δύναμιν, καὶ τὸ εἰς τὰ σώματα
 βελώνων ἰόν, καὶ τὸ ψύξιν, καὶ τὸ
 ἐξαυτὸν, καὶ τὸ ἐκκοπὴν, καὶ τὸ ἀ-
 15 πεψίαν, καὶ τὸ ἄλλό τι παρὰ πλε-
 σιον ἔχοντες αἰτίαν. ἐπεὶ δὲ καὶ τὸ
 διαφοραῖς χείρεσι τῶν αἰτίων, τὰ
 μὴ καλῶντες συνεκτικὰ, τὰ δὲ, περὶ
 καταρτικὰ, λεπτόν αὐτοῖς ὅτι
 καὶ ἕτερον δὴ τούτων αἰτίον ὅτι
 20 τὸ προκαταρτικόν, ῥηθῆσεται δὲ
 ἀπὸ τὸ προάγειν τὸ ἀπολειψίματος
 καὶ τὸ πρὸς τὴν λαμβάνον τὸ
 σώματος. συνεκτικόν δὲ ἐπειδὴ τὸ
 παθὼν παρόντων καὶ αὐτὸ πάρεστι,
 καὶ χωρὶς δέντες αὐτῶν, χωρίζεται καὶ
 25 τὰ συμβαίνοντα πρὸς αὐτό. πρὸς
 τούτων μὴ ἐν τῷ πλείω ῥητέον. δε-
 γνόν δὲ ἔσθω ἐναργεστάτην φθορο-
 ποιόν δύναμιν αἰτίαν εἶναι, καὶ τὸ
 προηέμενον σκοπὸν τὸτον ποιητέ-
 ον. καὶ πρὸς μὴ τὸ κατασκήψεως τῶν
 παθόντων,

tinētē asserūt: vt īguinū vlc^o, &
 inguinariā febrim, & q̄ effectui
 tū asistat, tū etiā separetur, vt à
 fractis præcipitatio. In summa,
 quoties quidpiā suapte natura
 causa fuerit, nec vlla diuisione
 cōprehēditur, vitiosum est, ne-
 que causæ adscribit, eorū quæ
 idē genus sortiuntur. Sed quod
 phthoropœon, causa sit, nomē
 ipsum argumento est, & in iis
 quæ cōtingūt apertius ostēdi-
 tur. Quid aliud causæ arbitran-
 tur esse post impressum à fer-
 pētib^o ictū, q̄ ex animatē vim,
 & illapsū in corpora virus?
 Neq; enim frigus, neq; æstus,
 neq; sectionē corporis, neque
 cruditatē, neq; aliud quicq̄ si-
 mile causari possūt. Verū quo-
 niā causarū differētiis gaudēt,
 & aliquas cōtinētes, alias eui-
 dentes appellāt, ipsīs dicēdum,
 vtroq; istorū modorū euidētē
 quidē causā esse, quod affectū
 p̄cedit, & quod corporis sub-
 stātiā præoccupat: cōtinētē
 verò, quod morbis præsentib^o
 adest, qua separata recedunt,
 quæ cū ipsa euenerant. Sed de
 iis hæten^o. Statuēdū itaq; mor-
 tiferā vim intrinsecus manife-
 stissimā esse causam, ipsamque
 principē facere scopū oportet,
 & anteq̄ ad ima decubāt mor-

DIOSCORIDIS

bi, variis modis est certádum, donec vis tota corporibus executiatur. Modò enim reuocari decet ea parte, qua pestis intrauerit: modò alia, præsertim principatú non obtinéte, antè coërceatur, q̃ altius irrepès viscera tangat: aut eius pernicies eluatur, retúdaturq̃, cū iā mébratim peruagatura est. Itaque venena si hausta sunt, crebris vomitionib⁹: si morfu impressa, scarificatione, affixis cucurbitulis, exuctu, carnis circúscriptiōe, nōnunq̃ amputatione extreme partis, euocantur. Retinéetur verò infusione, & imposito medicamétorú acrium cohibétur. Hæc simul utiq; arceré vir⁹, & eluere possunt. Restinguútur, & euincuntur meracioré potu, aut passo nulla aqua diluto, vel cōtrariorú esu, quæ acrimonia sint prædita. Postremo deiectio alui, euocatur sudor, & alia quedá in cōmune, q̃ mébratim demóstrabim⁹, auxiliát. Verúenimvero nō leti ferá modo materiá, sed & magnitudiné, & tép⁹, p̃ scopo cōsiderare oportet. Etenim ab iis remedia q̃ plurimú discrimen capeffút. A magnitudine qdè, cū nō nulla ex venenis, et virosis animalib⁹ pericula minátur: alia

παθῶν, ποιήτως διαγωνισέον μέ-
χρ' ἢ πάλῃ ὥς αὐτ' ἀποσκευασθῇ
ναί τ' σωμάτων. τὸτο μὲν ὑπέξει-
ρμένῃν δι' ὅν εἰσὶναι μερῶν τὸτο
ἢ κρατερόν τι ἐνὶ καὶ μάλα
οὐ κυρίῳ τόπῳ, πρὶν εἰς τὸ βάθος
ἀπελθεῖν καὶ πολλὰ γὰρ ἄλλα δὲ
τὸτο ἢ ἀποπλυομένην ἢ ἐπικυ-
νωμένῃ, ἐπειδὴν φάσκει χωρεῖν
διὰ τ' σωμάτων. ὁ τὲ μὲν ἐν ὑδρὶ-
ζέσις αὐτοῖς κομίδι ἐπὶ τ' θαλάσ-
σιων φαρμάκων δι' ἐμέτων γίνετ'· 10
ἐπὶ δὲ τ' ἰοβόλων διὰ τ' καταρ-
μῆς, καὶ σικκῶν προσβολῆς, ἐκμυζή-
σεως καὶ ψεισαρκισμοῦ, ὁ τὲ δὲ δι'
ἀκρωτηριασμοῦ. ἢ δὲ κατὰ καὶ
διακράτησις, διὰ κλύσεως καὶ διὰ
δριμύτιος ὀπιθέσεως φαρμάκων. 15
ταῦτα δὲ κρατεῖν ὁμοῦ καὶ ἀποπλύ-
νῃν δύνατ' ὅτι ἰόν. ἢ σέβεις δὲ καὶ ἢ
κράτησις δι' ἀκραλοποσίας ἀκρά-
τε τὲ καὶ γλυκείως, ἢ καὶ ἐκ τ' ἐλα-
τίων δριμυφάρμακας. ἐπὶ τέλει δὲ
συνεργεῖ τέτεις καὶ καθαρσις κοιλί- 20
ας, καὶ ἰδρωτοποιία, καὶ πῖνα ἄλ-
λα κοινῶς, καὶ δὲ κατὰ μέρος ἐ-
πιδείξιμον. δεῖ δὲ οὐ μόνον τὴν
φθοροποιὸν ὕλιν ποιεῖσθαι σκε-
πὴν, ἀλλὰ καὶ τὸ μέρος αὐτῆς καὶ
τὸν χρόνον. καὶ γὰρ παρὰ ταῦτα 25
πλείστην ὅσῃν διαφορὰν τὰ βο-
θήματα λαμβάνει. παρὰ μὲν
τὸ μέγεθος, ἐπειδὴ ὡς τῶν δη-
ληθειῶν καὶ τῶν ἰοβόλων, τὰ μὲν,
διεγερτικὰ κινητικὰ γίνεται.
τὰ δὲ,

τὰ δ', σπιπιδόνων βαθυτέρων ἢ ἐπι-
 πολαιότερων· τὰ δ' ἐπεωδυμένων
 σποδροτέρων· ἢ ἀμυδροτέρων· τὰ
 δ' ἐδῆων δυσεργιμάτων, ἥσπον ἢ
 μαλλον ὀχλήκτων. δεῖ δ' πρὸς τὰ
 5 κίνδυνον ἔχοντα, διὰ τ' ἀγωνισ-
 τικώτερον ἀγωνίζεσθαι βοηθημάτων·
 πρὸς δ' τὰ ἥσπονα χαλεπὰ διὰ τ'
 ἐπεικετέρων. ἀποπον γὰρ ἐπὶ μὲν τ'
 μισθόνων μακροτέροις ἀν' ἑτὼ τύ-
 χη χρώμενοι τοῖς βοηθήμασι, κιν-
 10 δύνω δ' θραπυρόμενον περὶ δῆλιν·
 ἐπὶ δ' τ' μικροτέρων δι' ἀπολόμα
 δ' βοηθείας μάτην αἰκίσαι· τὸ σῶ-
 μα· πρόχρεος δ' καὶ ὁ ἀπὸ τ' χρέων
 ἐστὶν ὀρισμός· ὁ μὲν γὰρ ὀξέως καὶ πα-
 ραχρήμα, καὶ τὰς ὀχλήσεις καὶ τὸν
 15 κίνδυνον ἐπιφέρει, ὁ δ' ἐξ ἀναβο-
 λῆς καὶ χρέονος παλείονος ἢ ὑπ' ἀπο-
 νος. περὶ σῆκει τόνυν τοῖς μὲν ὀξέσι,
 χατεπευρόμενος βοηθεῖν καὶ διὰ
 πολλῶν ὁμῶς τοῖς δ', χρονιότερος.
 ταυτὶ μὲν οὕτως ἐν τεχνολογίᾳ.
 20 μετέως ὤεισαι. περὶ ἀγωνίᾳ δ' ἐ-
 ξῆς ὡς ἐπὶ καταμέρος.

Σημεῖα κύωνος λυσσῶντος καὶ τ'
 ὡς αὐτῇ δεδιγμένων. Κεφ. β'.

Τὸν περὶ τ' λυσσώδων λόγον
 προετάξαμεν τ' δῆλον, ἐπεὶ καὶ τὸ
 25 ζῶον πολὺ τ' καὶ σύνθηές ἐστι, καὶ συν-
 εχρῶς δῆλιν· τὴν λύσιν ὁ κύων καὶ
 ἀπόλλυσι, καὶ δυσφύλακτον κατέ-
 σκηκε· καὶ ὁ ἀπ' αὐτῆς κίνδυνος ἀπα-
 ραίτητός ἐστιν εἰ μὴ πολλοῖς χε-
 σκετο τοῖς βοηθήμασι. λυσσῶν δ' ὁ
 κύων ὡς

alia putredines altas aut exte-
 riores excitāt: alia vehemētissi-
 mos dolores aut cœcos ciēt: a-
 lia vix medicamētis cedunt, &
 magis minūsvē molestias exci-
 tāt. Oportet autē ea q̄ pericula
 ferūt, peruicacioribus auxiliis
 expugnari: & min⁹ infesta, mi-
 tiorib⁹. Quippe absurdū fuerit
 in grauiorib⁹, segnioribus me-
 dicamentis hoīes in discrimen
 adducere: in minorib⁹ verò, ve-
 hemētīū auxiliōrū iniuria cor-
 pus lacerare. Finitio à tēporib⁹
 in prōptu est: hoc enim subitò
 in pericula, & prēsentes mole-
 stias adducit, illud verò sensim,
 & dilatas in diē longā aut bre-
 uiorē producit. Itaq; in acutis
 quidē cōfestim multa simul au-
 xilia representari oportet: reli-
 quis, paulatim. Hęc quadā artis
 formula breuiter definita sint.
 Iā mēbratim rē prosequamur.

Signa rabiosi canis, &
 demorforū ab eo.

Cap. II.

De rabiosi canis morſu ser-
 monē aliis praposuimus, quod
 id animal domesticum ac fre-
 quēs esse cōsuevit, & in rabie
 sæpius agitur, ac perit, ab eōq;
 cauēri difficile: inde periculum
 ineuitabile hominē manet, nisi
 multis vtatur auxiliis. Canis ple-

DIOSCORIDIS

rŭq; flagratissimis æstib⁹ in ra-
 biē efferať. interdū quoties fri-
 gora incesſerŭt. Rabiosus autē
 potŭ, & escā auerſať. largā spu-
 mātēmq; pituitā narib⁹, & ore
 proiicit: toruē & solito tristius
 intuerur: in oēs paſſim ſine la-
 tratu irruiť, & equē feras homi-
 nēſque, tā familiares, q̃ ignotos
 mordet: nec p̃tin⁹ infeſtū quic-
 q̃ infligit, niſi, vt vulnus, dolorē:
 exinde morb⁹ ille, qui ab aque
 metu hydrophobicus graia eſť
 voce appellat⁹, cōtrahitur. Eue-
 nit aut cū diſtētiōe neruorŭ,
 totiŭſq; corporis rubore, p̃ſer-
 tim faciei, cū ſudore, & lāguo-
 re quodā. Aliq; aurē ſplēdorē fu-
 giŭť: alij ſine vlla doloris íterca-
 pedine vexant⁹. Sŭť etiā q, canŭ
 more latrat⁹ qđāt, & obuiā fa-
 ctos morſu adoriŭť, ac mordē-
 do ſimili vitio labefactāt. Proi-
 de ex iis q, hoc vitiŭ ſēſerít ne-
 minē ſeruatŭ vidim⁹, niſi forſi-
 tā ex hiſtoria vnū aut alterū e-
 uaſiſſe audiam⁹. ſiq; dē Eudem⁹
 ſuperaiſſe quēdā affirmat. The-
 miſonē aliq; demorſū í hūc fu-
 rorē ícidíſſe, & euaiſſe fatētur.
 Alij ipſŭ cū amico aquā expa-
 ueſcēti morē gereret, & officiŭ
 exhiberet, quadā naturarŭ cō-
 cordia ſimilé contraxiſſe affe-
 ctū: ſed poſť multoſtādē crucia-
 tus ſerua-

κύων ὡς ἐπιτοπολὺ μὲν ἐν τοῖς σπῆ-
 δροτάτοις καὶ μάστιγι. ἐνίοτε δὲ καὶ
 ἐν τοῖς ἐφισταμένοις κρύσει. λυοτή-
 σις δὲ ἀποβέπει καὶ βρώσῃ καὶ πό-
 σιν καὶ φλέγμα πολὺ ἀφωδῆς ἐκ
 τοῦ σώματος καὶ τῶν ῥινῶν περιδῆμι. καὶ
 πονηρὸν βλέπει καὶ συζητότερον τῶν
 σωήδων ἐφορμαί. ὅς χάρις ὑλα-
 κῆς πᾶσιν ὁμοίως καὶ θηείοις καὶ
 ἀνθρώποις πᾶσι τε σωήδεσι καὶ
 ἀγνώστοις δάκνων καὶ παραχρῆ-
 μα μὲν οὐδὲν ὀχληρὸν ἐπιφέρει, ἰσ-
 τῶν ὅσον ὁδυῦναι τὴν ἐκ τοῦ
 τραύματος ὕστερον δὲ ἐμποιεῖ πά-
 θος τὸ καλούμενον ὕδροφοβικόν.
 συμπλήρ δὲ μετὰ σπασμῶν καὶ
 ἐκδημάτων ὅλου τοῦ σώμα-
 τος, μάλιστα δὲ ὅλου τοῦ προσώ-
 που, καὶ μάλιστα ἀπὸ ἰδρώσεως
 καὶ ἀπορίας. καὶ πινὲς μὲν φεύ-
 γουσι τὴν ἀνγλίαν. πινὲς δὲ τρέχον-
 ται συνεχῶς. ἐνίοι δὲ ὑλακτοῦ-
 σιν ὡς περὶ κύνεις, καὶ δάκνουσιν ἐ-
 πίωντες, καὶ δάκνοντες, αἵτιοι τοῦ
 αὐτῶν πάθους κατέστησαν, εἰ μὴ
 καὶ ἰσορίαν παρειλήφαμεν πε-
 ριγλυέδαί. ἔνα δὲ δεύτερον. καὶ γὰρ
 εὐδημὸς περιεγλυῆται πνὸς φη-
 σί. καὶ θεμίσωνα οἱ μὲν, λέγουσι
 τῷ πᾶδει διηχθέντα περιπεσῆναι
 καὶ σωθῆναι. οἱ δὲ, φίλῳ ὕδρο-
 φοβίωντι περιεπλήρησαντα προ-
 σῶμας καὶ συμπαθῶς, εἰς τὴν
 ὁμοίαν ἐμπεσῆναι διάθεσιν. καὶ
 πολλὰ κακοπαθήσαντα σωθῆναι.
 πρὸ μὲν

τὸ μὲν οὖν πάθος ὅστιν ἀρχαλέον,
παρὰ δὲ τῆς πείρας αὐτῆς, πολλοῖς καὶ αὐτοὶ περιεσώσασιν. καὶ ὑπὸ ἄλλων ἰατρῶν σωθέντας ἐ-
γνων.

5 Ὁραπεύει τοπικῇ τ' ὑπὸ
λυαστῶνος κυνὸς δηλημά-
των. Κεφ. γ'.

Τῆς δευτερείας ἡ μὲν ὅστις κοι-
νή καὶ χρησιμὴ αὐτῇ ἐπὶ πάντων
τῶν ὑπὸ πρὸς ἰοβώλου ζώου δε-
10 δηλημύων ἡ δὲ τις ἰδίᾳ τῶν λυσ-
σοδῆκτων τοῖς μὲν γὰρ ἀκρως ἀ-
φαιεῖν εἰθισμένη τοῖς δὲ ἀπὸ πολ-
λῶν δηληθῆσιν ἐναρμόσιος, καὶ παρὰ
τόν τε αὐτὴν ἐκδέμενοι, μετὰ
τῆς τοῦ καὶ τῶν κοινῶν ἐντροχάσο-
15 μιν. δεῖ τοίνυν καρκίνους ποτα-
μίους ἐπὶ κληματίδος λευκῆς ἀμ-
πέλου καῶνται, καὶ τὴν τέφραν αὐ-
τῶν λειοτελεῖσθαι ταῖς ἔχειν ἀπο-
κειμύριον ὁμοίως δὲ καὶ εἰζαν ἡμ-
πανθῆς ἀποδέδωκε κοκομμένῳ καὶ
20 σεσησμένῳ. ὅποτε δὲ τις δηληθῆν
ὑπὸ λυσσῶντος κυνὸς, εἰς οἷον ἀ-
κράτου κυάδοις δ'. ἐμβάψῃν δύο
μὲν κοχλιάρια τῆς τ' καρκίνων τέ-
φρας, ἐν δ' κοχλιάριον τῆς ἡμπα-
νθῆς καὶ ἐγκυκλήσαντας ὡς ἐν ἀφί-
25 τῳ δεδευμύρῳ, πίνῃν ἀπὸ τῆς α'.
ἡμέρας, μέχρι τεσσάρων ἡμερῶν.
ἀπαρχῆς μὲν οὖν διδόμενον τὸ φάρ-
μακον, τοῦτον προσφέρειν τὸν
τρίτον. εἰ δὲ ἡμέραι παρεληλύ-
θαισι δύο ἢ τρεῖς ἀπὸ τῆς δ' ἡμέρας,
ἐγχει-

tus seruatiū extitisse. Molestissi-
mū itaque genus morbi, à quo
multos, anteq̃ ipsā experirent,
vindicauimus: & complures ab
aliis medicis seruatos nouim⁹.

Remedia demorforum
à cane rabioso.

Cap. III.

Ratio medēdi duplex: vna cō-
munis, qua vtēdū in oēs mor-
fus, quos virulētē animātes im-
presserūt: alia peculiaris priua-
tāq; eorū dūtaxat quos rabiosi
canes momorderint: q̃ nō nul-
lis q̃dē summā opē ferre cōsue-
uit: aliis verò iūtilis maximē q̃
ex multo iā tempore ictū acce-
perūt. Quæ ad hāc pertinet, pri-
mū exponem⁹, deinde cursim
pstringem⁹, q̃ ad cōmunē me-
dēdi rationē pertinet. Cācros
itaq; fluuiatiles in sarmētis albe
vitis cremare oportet, & cine-
ré eorū q̃ minutissimē tritū ha-
bere recōditū: itidē gētiana ra-
dicē tufā cribratāq; reponere.
Quoties autem canis rabiosus
morsum intulerit, in quaternos
cyathos meraci vini, bina cine-
ris cancrorū cochlearia, vnūq;
gētianę cōiiciātur: hæc ἰ πολέτῃ
dilutioris modū subacta, qua-
triduo bibātur. Inter principia
medicamētū hoc modo detur.
Atq; si ab illato morsu bini ter-
V iiii, nīve dies

DIOSCORIDIS

nive dies fluxerint, curatione auspicabimur à triplicato pon-
dere, supra id quod ab initio
retulimus. Optimū hoc aduer-
sus rabioforū morsus auxiliū,
quod & plerisq; vnum satisfe-
cit, eóq; cū fiducia vti licet. Sed
vt aliis etiamnum auxiliis con-
tra inevitabile periculum mu-
niamur, nihil cæteris vti prohi-
bet. Satius autem multò fuerit
etiam si in vanū recidat, medi-
cametorū inhumanos tolerare
cruciatus, q̃ per inertia ac defi-
diam in discrimen adduci. Nec
ita in demorsis à rabioso ani-
mali maiora vulnera vereri o-
portet, vti minora, & vlcuscu-
lis cutis similia: quippe maiori
vulnere cōfertim copiosus san-
guis emanās, potest nō nihil vi-
ruléti liquoris exhaustire: quod
in minoribus non accidit: quin
à maioribus abscedentes car-
nes hinc auferre, & labia acie
scalpelli circūscribere, & præ-
hensam hamulo aut vulsella car-
nē amputare oportet. In vtrisq;
e circūstātia loca altioribus vl-
sculis scarificāda, vt copiosior
sanguinis vacuatio arceat, ne
venenū mébratim insinuetur.
Cucurbitulæ cū multa flamma
agglutinatæ id iuamēti præ-
stant, vt veneni vis extrahatur.

Contra

ἐγχειρωῦνται τῇ θεραπείᾳ, τει-
πλάσιον δὲ διδόναι ὅσον ἐξαρχῆς
εἰρήκην. τὸ μὲν αἴρισον ἐπὶ τῶν
λυσοδύκτων βοήθημα, ὃ δὴ καὶ
μόνον ἐνίοις ἤρκεσε τὸ τόξον, καὶ
χρηστὸν αὐτῷ μὲν πεποιθήσεως. ὅ-
τι ἐνεκα δὲ τῆ καὶ δι' ἄλλων ἡσφα-
λίδος πρὸς ἄφουκτον δοκῆντα κί-
δνον, οὐδὲν τὸ καλὸν ὅτι καὶ τοῖς
λοιποῖς χρήσιδος, αἰρετώτερον δ'
διακενῆς αὐτῷ ἢ τῷ τύχῃ, τῷ βοήθημα-
των τὸ ἀπαύδρωπον ὑπομείναι, ἢ
διὰ τὴν ὀλιγωρίαν κινδύνῳ πε-
ριπεσεῖν. οὐχ ἔτι δὲ ἐνλαβητέον
τὰ μεγάλα τραύματα ἐπὶ τῶν
λυσοδύκτων, ὡς τὰ μικρὰ καὶ
ταῖς ἀμυχαῖς ἐμπερῆ. διὰ ὃ καὶ τῶν
μειζόνων ἀφροον καὶ πλὴν αἵματος
προχέοντον, διώκται τι καὶ τοῦ
ιοῦ συναποκλύζειν. διὰ δὲ τῶν
μειζόνων οὐδαμῶς καὶ ἐν μὲν τῶν
μειζόνων ταῖς ἀφαιρέμασι σίχνας
αὐτόθεν ἀφαιρετέον, καὶ τὰ χεῖρα
περὶ γλυπτεῖον διὰ τῆς ἀκμῆς, ἀ-
νατεθείσης δὲ τῆς σαρκὸς ἀγκί-
σθω ἢ μύδρω, ἢ ἐκτομῇ ἀπο-
τελεσέον. ἐπὶ ἀμφοτέρων δὲ τὰ
ἐν κύκλῳ βαδυτέrais ἀμυχαῖς
καταρσέον * ὅπως ἢ τῶ αἵμα-
τος παραπλησιωτέρα γυρομένης
κένωσις, ἐναντιωθήσεται τὰ σώμα-
τα τῇ τῶ ἰοῦ διαδόσει. πολλὰ δ'
καὶ ἡ συκία κολληθεῖσα μετὰ πολ-
λῆς φλογὸς παρὰ τοῖς ὤφελαις,
ὡς καὶ λύσαι τῶ ἰοῦ τὴν διώκιν.

Ἡ δὲ

Η δὲ χεῖρσι ἀνυσιμώτατον
 ἐπὶ τῶν ἰοδόλων ὅτι βοήθημά-
 των, τὸ γὰρ πῦρ πάσης δυνάμε-
 ως ὑπονώτερον ὑπάρχον, ὁμοῦ
 μὲν κρατεῖ καὶ κωλύει φέρεσθαι
 τὸν ἰὸν ἐσωτέρω, ὁμοῦ δὲ τὸ
 κρατῆδὲν αὐτῇ μέρσι τῆς ἐφεξῆς
 διεσπείας, καταβολῇ οὐ τὴν
 τυχοῦσαν ἐργάζεται, παραμυθού-
 σης τῆς ἐλκώσεως ἐπιπλέον. τὴν
 μὲν γὰρ ἐκπύωσιν τῆς ἐσχάρας μά-
 10 λιστα ἐκ τούτου φροντισέον, ὅπως
 μὴ τὰ χρόν τὰ μέρη συγκληθεῖν.
 ἀλλ' εἰ δυνατὸν ὅτι πικρὴ τῆς
 περὶ δεσμίας τὰς ἐλκώσεις τηρη-
 τείον, καὶ ἐπὶ φλεγμανούσας καὶ ἐπὶ
 ῥυπαυομένης. παρέχει δὲ αὐ-
 15 τὰς τὸ τοιοῦτον τάειχος ἐπιπι-
 νέμενος, καὶ σκόρδον ἀγρίον λεο-
 σσειβόμενον· κρόμμυά τε ὡσαύ-
 πως, ὅπως μὲν οὐδ' ἑκάστης ὁ κυ-
 ρηναϊκὸς ἢ ὁ χυλούμενος μηδι-
 κὸς ἢ παρδικὸς. κόκκοι δὲ πυ-
 20 ρῶν ἐπιπινέδωσαν καὶ μεμασση-
 μένοι καὶ ἀμάσσητοι διαφυρώμε-
 νοι μὲν γὰρ ἀπὸ τῆς ἐμβροχῆς ἀ-
 νευρώοισι τὰ τραύματα. πινὲς
 δὲ οἶονται τὸς μεμασσημένους
 ἀντιπαδῆς τι ἔχειν ἀπὸ τῆς τῶν
 μεμασσηκότων νηστείας· οὐ μὲν
 2 τὸ το βέβαιόν ἐστιν. ἀλλὰ εὐχαί-
 ρως αὐτοῖς χρῆσθαι. εἰ δὲ ὁ ὥρ
 γίνεται πολλάκις, καὶ ἐλαὶ σιμ-
 γῶνται φθάνουσιν περὶ τ' ἡμέρων,
 διὰ χειρὸς ἀναξάνην περὶ σῆκει·

Contra virulentos ictus, vltio
 expeditissimū est auxilium, vt
 pote cum ignis cætera viribus
 præstet, simul quod virus do-
 met, & ferri penitus nō patia-
 tur, simul quod pars ignem ex-
 perta, postea non vulgare fun-
 damētū curationi futuræ præ-
 beat, manente diutius exulce-
 ratione. Animaduertendum ex
 eo tēpore cum crustæ decidēt,
 ne vlceris ore coalescant, & ci-
 catrice induātur, sed si fieri po-
 test ad multū, idq; præstitutum
 tempus, vlcerationes & sordi-
 das adhuc & inflammationem
 minantes, prorogari conuenit.
 Quod inditū iis falsamentum
 optimē præstabit, & syluestre
 allium detritū: item cepæ, fuc-
 cūsque præsertim Cyrenaicus,
 aut qui Medicus, aut Parthicus
 appellatur. Tritici grana tam
 mansa, q̄ non mansa imponan-
 tur: si quidē subacta pistāue à
 perfusione vulnera dilatāt. Sūt
 qui à mandētium ieiunio, sibi
 aliquid asciscere arbitrentur,
 quod suapte natura resistat: ve-
 rū id certum nō est. Cæterū
 tempestiuus eorū vsus minimē
 est contēnendus. Si verò quod
 persæpe accidit, ante dies præ-
 finitos cicatrices coirēt, cōmit-
 terenturq; manū postulabunt:
 nanq;

DIOSCORIDIS

nanque eas diducere carnem-
que scalpello circinare, aut ite-
rum inurere, expedit. Vbi ve-
rò propositum tēpus præteriit,
vicus ad cicatricem ducendū,
& emplastro quod è salibus
conficitur locus comprehen-
dendus: nec multò post sina-
pismo vtendum.

Ratio victus in morfu ra-
biofi canis. Cap. IIII.

QVÆ ad partem istā per-
tinent præsidia, ita se habent.
Cæterum victus rationem ex
iis quæ veneno aduersantur,
coniectura quadam colligere
oportet, simul vt veneni vires
hebetet, restinguâtque, simul
vt arceat, quo min⁹ ad intima
perniciēs illabatur. Etenim af-
sumpta perniciosarum virium
penetrationi resistūt. Quorum
vtrunque præstare potest vini
meracioris, paksi, & lactis po-
tus: quippe qui hæc omnia ca-
piunt ad curam, nonnihil ve-
neno obliiciunt, quod omnem
eius acrimoniam obtūdat. Si-
mili modo aliorum, porrorū,
coeparūque cibos: quod ea
difficulter cōficiantur, vixque
aboleantur. Nam multos dies
huius cibi qualitates remanēt,
quo tempore nec euincūtur,
nec permutant à mortifera vi,
sed

συνεπικρίζοντας ἢ τέμνοντας, ἢ
καὶ ἐπιχρίοντες πάλιν ἐὰν οὕτω
τύχη. παρελθούσης δὲ τῆς περὶ-
κειμένης περιθεσμίας, ἀφετέον
μὲν ἀπὸ συλῶθῶσαι τοῖς ἑλκυσιν,
ἐμπλάσσει δὲ τῇ διὰ τῶν ἀ-
λῶν ὅλον τὸν τόπον καταλη-
πτόν· μετὰ ὀλίγας δὲ ἡμέρας
καὶ συναπτεόν.

Πρὶ Διαιτίης τῇ ὑπὸ κυνὸς
λυοσάντος διηχθέντων. Κεφ. δλ'.

Ἡ μὲρ οὖν τοπικὴ θεραπεία τῶν
λυοσάντων, τοιαύτη τις
ἔστι. δεῖ δὲ καὶ τὴν διαίτην αὐ-
τῶν ἐσοχάσαι τῆς πρὸς τὸν ἰδὸν
ἐναντιώσεως, ἵνα ὁμοῦ μὲν ἀμ-
βλυῇ καὶ σθενύσῃ τῇ δυνάμει,
ὁμοῦ δὲ καλύῃ τὴν εἰς βάθος
φορὰν. κατὰ λαμβανόμενα γὰρ ἀν-
τιπίπτει τῇ παρεισδύσει τῇ φθο-
ροποιῇ δυνάμεως. δυνάται δὲ
τέτων ἐκότερον παρέχειν τὸ το-
οῖνε ἀκράτε ζωοτέρῃ πίστι καὶ
γλυκέος ἢ γαλακτος· οἱ γὰρ ταῦ-
τα πάντα λαμβάνοντες πρὸς
τὴν ἐπιμέλειαν, ἐτίσανται π-
ῖον, ἢ πᾶσαν αὐτὴ τὴν δεινύ-
τητα ἐκκρίνει. ὥσπερ δὲ καὶ
σχορόδων καὶ περὶ σὸν καὶ κρομ-
μύων ἐδωδὴ· καὶ ταῦτα γὰρ τὸ
ἐλον δισμετέβλητα καὶ δισσεξί-
τητα. παρεμύροισι γὰρ αὐτὴ αἰ-
ποιότητες ἐπὶ πλείους ἡμέρας,
ὅπότε οὐ νικᾶται οὐδὲ πέπει-
σὶ ὑπὸ τῆς φθοροποιῇ δυνάμεως,
ἐν

ἐν δὲ τῶν ἐναντιῶν κρατεῖν αὐ-
 τῆς πέφυκεν. εἰς τὸτο δὲ καὶ
 τῶν ἀντιδότων ὅσι χρεῖα, καὶ
 τῆς θηριακῆς, καὶ τῆς εὐπατο-
 εῖου λεγόμενης. καὶ τῆς μυθρι-
 5 στατείου καὶ πάσης ἄλλης ἢ πε-
 ς ἐν πλειόνων ἀρωμάτων εἴληψε
 τὴν σύστασιν. συσμετάβλητα γὰρ
 τῇ συστάσει πάντα τὰ ἀρώματα
 ἢ διωάμεσι καὶ ταῖς οὐσίαις διὸ
 πεικρατεῖται τοῖς σώμασι. τοι-
 10 οὔτος μὲν οὖν καὶ ὁ τῆς διαίτης
 τρόπος· δεῖ δὲ γνώσκειν ὅτι ἡ τῆς
 ὑδροφοβικοῦ πάθους ἐκστάσις
 ψις, οὐδὲ ὡρσιμὴν ἔχει περ-
 15 δεσμίαν. ὥς ἐπιτοπλῆσον γὰρ
 ἕως τεσσαρικοστῆς ἡμέρας εἰς
 20 δὸς, τοῖς ἀμεληθεῖσι καὶ δι' ἐξα-
 μῖνον ἐπίοις ἀπώληται. καὶ δι' ἐ-
 νιαυτῆς, καὶ ταῦτα ἡμῖν ἐώραται.
 ἰσορροῦσι δὲ πινε μετὰ ἐπὶ αε-
 πῶν ἐπίοις ἐνδιδόναι τῷ πᾶδει.
 καὶ κατὰ μὲν ταῖς ἀρχαῖς τ' ἡυσ-
 25 σοδύκτων ἢ διεραπεία, τοιαύτη
 ὅσιν. ἐὰν δὲ ὅπως διηποτοῦν ἐν
 ταῖς περὶ ταῖς ἡμέραις μὴ περ-
 ληφθῇ τὰ περὶ ζηνιθῶρα βοηθήμα-
 τα, τὸ μὲν περὶ παρὺξεν καὶ χαίειν,
 παραλειπῶν. καὶ γὰρ ἰκανῶς εἰς
 30 τὸ παρελθὼν δὸς μεταγῆν διωά-
 ται. οὐδεμία γὰρ ὄνησις τῆς ἐπι-
 βολῆς, ἀλλὰ διακνήσις τὰ σώ-
 ματα ταῖς ὀδυμαῖς βλαβηθήσε-
 ται, ὅπως δὲ τῆς διεραπείας ἔτε-
 ρος ἀγέτω. καὶ παρσις ἢ καὶ μέγα
 ὄφελος

sed contrariis illa vis expugna-
 tur. Cui rei antidotorum vsus
 accommodatur, & theriaces,
 Mithridatij, & eius quod eupa-
 torio temperatur. Deniq; om-
 nium que magnam aromatum
 partem sibi vendicant: quippe
 aromata omnia viribus & sub-
 stantiis ægrè permutatur: qua-
 re in corporibus euincunt. Vi-
 ctus ratio hoc modo se habet.
 Nosse conuenit, pauorē aquæ
 non statò definitoque tempo-
 re exoriri: plurimum tamen ad
 quadragesimum vsque diē ne-
 glectis differri consuevit. Post
 semestre etiam nōnullos inua-
 dit: quēdam post annum aquā
 horruisse constat. Quæ nobis
 visu cōperta fuere. Narrant &
 aliquos post septennium aqua
 metu fuisse tentatos. Inter prin-
 cipia demorforū à cane rabio-
 sa curandi ratio talis est. Verū-
 enimvero si ea quæ retulimus
 auxilia, primis diebus præter-
 missa fuerint, nec scalp pro car-
 nem circinare, nec vitionē ex-
 periri operæpretiū est. Nō enī
 quod iā pertrāsīt, satis euoca-
 re possent. Nulla utiq; istius rei
 occasio aut vtilitas, sed incas-
 sum corpora dolorib; sternen-
 tur. Alter verò curationis mo-
 dus accedat. Deiectio magnū
 præbet

DIOSCORIDIS

præbet iuamētum, vtpote cū mouendo, corporis habitum trāsmutet, & quæ colocynthidem recipit hiera. Itē lac schistum, quod simul deiectionem moueat, & venenum domare possit. Cibi acres, & meraculi potus, quibus vis veneni vehementer retunditur, quotidie sumi debent. Cæterum sudores ante cibos, & post etiā ciendi. Dropacismi sinapismiq; alternatim per corpus totum adiaciendi. Sed longè omnium efficacissimum auxilium helleborismus cognoscitur, quo cum fiducia nō semel atque iterum, sed frequentius ante quadragesimum diem, vel post hoc tempus vti licet. Tantam enim vehementiam hoc auxiliū habere fertur, vt quidā qui iam aquæ metum sentirent, sumpto helleboro, simul ac primum morbi impetū experirētur, fuerint feruati. Nam & iam vitio tentatos nemo vnquā seruare potest. Itaque primū curā contra rabiosi canis morsus breui sermone exposuim⁹: iam ad alia, quæ venenatis morib⁹ scuire consueuerūt, trāseundū. Notas vno cōtextu, deinde cōmunē medendi modū, qui omnibus cōuenire possit, explicabimus.

Cursim

ὁφελος ἐμπαρῆχειν διωκόμενῃ, συμμεταποιεῖ γὰρ τὴν ἐξίν κινου-
σα· ἢ τε διὰ τὴν κολοκυνθίδος ἰδρᾶ
δύσιν. καὶ διὰ καὶ τὸ γάλα τὸ χυλόν,
ἐμὲ καὶ θάρασιν καὶ ἐπιπράσεις πα-
ρῆχειν διωκόμενῃ. αἱ τε δριμυ-
φαγία καὶ ἡ τῶ ἀκράτε πόσις, πα-
ραλαμβάνειν δύνανται τὸν ἴον, καὶ
πρὸς τέτοις ἰδρωτοποιίαι, καὶ πρὸς
τροφῆς καὶ μὲν τροφῶν. δρωπακι-
σμός τε καὶ σιναπισμός καὶ μέρες 10
ἐφ' ὅλῃ τῷ σώματι. πάντων δὲ
ἀνισιμώτατον ἀπὸ τέτων ὁ ἐλ-
λειβερισμός ἐγχεῖται, καὶ χρητέον
τεταρτηκότῳ τῷ βοήθηματι, ὅχι
ἀπαξ, ἐδὲ δὲς, ἀλλὰ καὶ πλεονα-
κὶς πρὸς τῆς πενταεξήκοντος ἢ καὶ 15
μὲν ταῦτα ποσὺν τὴν γὰρ τὴν ἰσχυρῶς
προσφέρεται τὸ βοήθημα, ὥς τε
τὸ ἥδη συννηθὲν τῶ ὑδροφό-
βῳ, πεισθῆναι πινὰς λαβόντας
ἐλλείβερον εὐδὺς ἐν τῷ πρῶτῳ
καταπειρασμῷ τῷ συμπτώμα- 20
τι. τὸν γὰρ ἥδη κατανηθὲν οὐδὲ αὐτὸς πᾶσι ποιῆσαι δύ-
ναται. τὴν μὲν οὖν πῶν λυστο-
δήκτων ἐπιμέλειαν πρῶτον ἐξε-
τέμεθα, δι' ὃν ἐμπεσεν εἰρήκη
μὲν ἐπιλογισμὸν. μεταλείνοντες 25
δ' ἐπὶ τοῖς λοιπὰ πᾶσι ἰοδόλων.
πρῶτων μὲν ταῖς σημειώσεσιν αὐτῶν,
ὑπὸ μίαν ἐμνησθήσθαι πρῶτα-
σιν. μὲν δὲ τὸ κοινὸν τὴν δευ-
τέραν πᾶσιν ἀρμόσαι δυνάμεναι
ἴσμεν.

ὑποδραμόντις δὲ ἐξῆς ὑποδεί-
ξιμον, εἴ πῃ κατ' ἰδιότητα ἐ-
νίαις θεωρητέον πέφυκεν. ὁ-
μοίως καὶ τὰ τελείως ἀβούνητα
παρὰσημειώσονται.

5 Πρὶ Φαλαγγίων. Κεφ. ε.

Τοῖς μὲν ὑπὸ φαλαγγίων δεδη-
γμένοις, αὐτὸς μὲν ὁ τόπος ἐννευ-
δής ἐστι καὶ ὁμοίως κεντήματα οὗ-
τε διωδνηκὸς ἢ τ' ἀείθερμος, ἀλ-
λὰ μεβρίως μὲν ὑποψυδρὸς· ἐν δ' ὅτ

10 ἐναντίων κατεψυγμένος, παρὰκο-
λεθεῖ δὲ πρῶτος δι' ὅλε τῶ σώ-
ματος, καὶ ἐντάσεις ἀπὸ τοῦ βου-
βωνος, καὶ τὰς ἐν γούνασι περὶ τοῖς
καὶ ἀσπασίῳ. ἀπὸ τῶν ὀστέων
σύλληψις καὶ πωλεῖς πρὸς ἑ-
15 ρησιν ἐρεθισμός. Δυσκολία πολλὴ
ἀπὸ τ' ἐκκρίσιν τ' ἀπὸ τῶν ὀστέων
ὁμοίως δὲ τέτοις καὶ ἰδρὸς ψυ-
χρὸς καὶ ὅλῳ τῶν ὀστέων
ἐκκρίνει· τὰ τε ὅσμητα δακρύει
καὶ ποσὶς ἀμάνεσθαι.

20 Πρὶ Σκολοπένδρας. Κεφ. ς'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ τῆς καλεμένης
σκολοπένδρας ἢ ὀφιοκτένης δεδη-
γμένοις, ὁ μὲν ἐν κύκλῳ τόπος τ'
δύνατος, πλεῖον, καὶ ἀπὸ τῆς
ταῖς καὶ ποτὲ πρυγνῶδης καὶ τὸ
25 πᾶν καὶ ἐννευδής φαίνεται. ἐλ-
κοῦν δὲ ἀπ' αὐτῆς τῆς δύνατος
λαμβάνων τ' ἀρχὴν, ἐκκρίσιν π-
να ἐπίπονον καὶ δυσάλητον πρὸς τ'
τέτοις ἀπὸ ὅλον τὸ σῶμα πωλε-
ῖται· γίνεται κνησμός.

Cursum deinceps subiungemus
ea, quæ sua pprietate nonnullis
auxilium præstare possunt. Po-
stremo subnectetur etiâ vene-
nata, q̄ nullis cedūt remediis.

De phalangiis. Cap. V.

De morbis à phalangiis lo-
cus quidem ipse, quasi ab impa-
cto aculeo rubet, non intume-
scens, nec per ambitum cali-
dus est, sed mediocriter hu-
mescit: vbi verò contrario-
rum occurſu refrigit, conse-
quitur corpore toto tremor,
distentiones poplitum & in-
guinum, convulsionibus non
dissimiles. In lumbis collectio
exoritur, & perpetua vrinæ li-
bido lacessit, multaque reddē-
dis excremētis colluctatio. Vni-
uersa cute frigidus sudor ema-
nat: collachrymant oculi, offu-
sisq; nebulis caligant.

Scolopendra. Cap. VI.

Si scolopendra aut dicta o-
phioctene morſum intulit, lo-
cus per ambitum liuore sugil-
latur, & computrescit: inter-
dumque, licet rarò, sæculen-
tus atq; ruber cernitur. A mor-
ſu ipso exulcerari locus inci-
pit, vlcusque id negotium ex-
hibet, ferè remediis inuictum:
præterea toto corpore pruri-
go sentitur.

Πρὶ

Scorpio

DIOSCORIDIS

Scorpio. Cap. VII.

Scorpionis morſu inflam-
mari ſtatim incipit locus, &
indureſcit, ac intentus rubet.
viciffimque dolore premitur.
Modò ſiquidem exęſtuat, mo-
dò frigore occupatur. Labor
repentè fatigat, & aliquando
meliuscule habet, aliquando
verò recrudescit. Conſequitur
ſudor, horroꝝ ſenſus, & tre-
mor. Extremæ corporis partes
refrigeſcunt, inguina extollun-
tur, per ſedem flatus exeunt, ca-
pilli eriguntur, palor membra
decolorat & dolor, tâquam ex
pungente acu, per vniuerſam
cutem ſentitur.

Pastinaca marina.

Cap. VIII.

Si marinā pastinacā percuf-
fit, protinus accidunt moleſti
dolores, aſiduæ conuulſiones,
laſitudo, & imbecillitas. Mens
percuffis labat, poſtea obmute-
ſcunt: oculi caligant. Percuſſus
autem locus in ambitu cum vi-
cinis partib⁹ denigratur, &
ita obſtupescit, vt tāgen-
tem non ſentiat. Hunc
ſi quis premat, atra
ſanies, craſſa & ma-
lè olēs excernitur.

Mus araneus. Cap. IX.

A mure araneo percussis,
circa

Πρὶ Σκορπιε. Κεφ. 8.

Τοῖς δὲ ὑπὸ σκόρπιου δι-
χθεῖσιν, ὁ μὲν τόπος ἐνδεώς ἀφ-
ηται φλεγμαίνειν, σκληρὸς καὶ
ἐνερευθὴς καὶ πεπαιθὴς, σὺ δ' οὐ
νη γρόμβος ἐνδηάξῃ. ὁ τὲ μὲν γὰρ 5
πύρωσις, αὐτὸς δ' ἡ ψύξις ἐπλάμ-
βαίεται. καὶ πόνος ἐξαπίνης, καὶ
ποτὲ μὲν ῥαίξῃ, ποτὲ δ' ἐπιτείνε-
ται. παρέπεται δ' αὐτοῖς ἰδρώς
καὶ φεικώδης αἰδήσις, καὶ τρέ-
μος. καὶ ψείφυξις ἀκρωθειῶν, 10
καὶ βουβώνων ἑπαροῖς, φύματα
διὰ τῆς ἰδέας, ὀρθοτεχνία τε,
καὶ δύσχροα, ἐπαλγὴς περὶ πλὴν
ἐπιφανείαν τῆς αἰδήσεως, κα-
δάτωρ ἀπὸ βελόνης κεντημῶτων
ὀδυνώμενος.

Πρὶ Τρυφῶνος θαλασσίας.

Κεφ. . . ή.

Τοῖς δὲ ὑπὸ πρυγόνος θαλασ-
σίας διηχθεῖσι, παρὸν τίς αὖτε πε-
λειωδωτοῖς συμβάνοισι δισκατέ-
ρατοι, ἀπασμοὶ τ' συναχθεῖς καὶ πύ- 20
ρος, καὶ ἀτονία, καὶ διανοίας παρ-
φορεσθ., μετὰ δὲ τοῦτο ἀφωνία καὶ
σκοτασμοὺς ὀφθαλμῶν. αὐτὸς δὲ
ὁ ὡληθεὶς τόπος, * μέλας γίνεσθ' καὶ
κλω, καὶ τὰ πλῆστον αὐτῆς μέρη, καὶ
ὡθρὸς τῆς ἀφ' αὐτῆς ἀναδιηγεῖ. ἔ- 25
πει δὲ τις αὐτὴ ἀποψήσῃ, ἰχθὺς
ἐξ αὐτῆς μέλας, παχὺς, διωσθῆναι
ἐκκρίνεται.

Πρὶ Μιχαήλ. Κεφ. Θ'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ μυραλῆς διχθεῖσι,
κίχλω

κύκλῳ μὲν περὶ τὸν τόπον τῆς δὴ μίας
 τος γίνεται φλεγμαίνουσα, φλυκτὶς δὲ
 ἐκταίσα ὅ μάλιστα, μεσὴ ἰχθύνος
 ὑδατώδους, καὶ τὰ πλησίον πάντα
 περικύβηται. ῥαγίσης τὲ δὲ φλυκταί
 νης, νομὴ παραλαμβάνει παρα-
 πλησία ἢ ἀπὸ τῆς ἐρπυστικῶν. συν-
 τήτοις δὲ παρέπεται καὶ σφόδρος
 πῶς τὰ ἐντερά, καὶ δυσουρία, καὶ
 ψυχρὰς νοτίδος δείχουσιν.

Πρὶ Εὐχιδνῆς. Κεφ. ι.

10 Τοῖς δὲ ὑπὸ εὐχιδνῆς δηχθεῖ-
 σιν, οἱ δὲ καὶ ἐφ' ἱκανὸν τὸ σῶμα
 ξηραίνεται, πλὴν χροιά δὲ ὑπό-
 λευκὸν ἔχει. ἰχθὺν δὲ ἀπὸ τῆς βού-
 ματος περικύβηται, τὸ μὲν περὶ τὸν
 ὑπολίπαρος, μὲν ταῦτα δὲ αἷμα
 15 τῶδης φλυκταίνων τε ἐκταίσα-
 σιν, καὶ δὲ πρὸς τῶν πυελικῶ-
 των ἔπεται· καὶ νομὴ περικύβηται
 λαμβάνει περικύβηται ὅτι τὰ
 παρακείμενα πάντα πλησίον, οὐ
 μόνον ἐπιπόλαιος. ἀλλὰ καὶ διὰ
 20 βάθους αἰμάσσει ὅτι αὐτοῖς καὶ τὰ
 ἔλα· καὶ πῶς τὸ ἵππερ συνίσταται
 φλεγμαίνουσα· σφόδρος τὲ καὶ χολώδεις
 ἐπισυμβαίνουσιν ἑμεῖοι, προσγί-
 νεται δὲ αὐτοῖς ἑμετός καὶ κέρως, καὶ
 δυσουρία, καὶ ψυχρὰ πῶς δὲ πῶς.

25 Πρὶ Αμφισβείνης. Κεφ. ια.

Παραπλησία δὲ συμβαίνει
 καὶ τοῖς ὑπὸ τῆς περικύβηται νομῆς
 σκυτάλης ἢ ἀμφισβείνης δη-
 χθεῖσι, λοιπὴ δὲ χροιά ἥδη τὰ
 αὐτά· διὸ περὶ ἰδίᾳς ἀναγραφῆς

ἔτι

circa morsum in orbem in-
 flammatio exoritur, nigræque
 pustula, diluta sanie turgens,
 exurgit: proximæ partes liuēt.
 Rupta pustula, depascēs vlcus,
 nō ei dissimile quod serpit, oc-
 cupat. Intestinorum quoq; tor-
 mina, difficultas vrinæ & frigi-
 dæ asperginis offusio conse-
 quuntur.

Vipera. Cap. X.

Si vipera momordit, cor-
 pus intumet, vehementer are-
 scit, subalbidumque colorem
 cōcipit. Sanies à vulnere pro-
 funditur, primum suppinguis,
 mox cruenta: pustulæ adustis
 similes erumpunt: & antea de-
 pascens vlcus, quod in proxi-
 ma repens, non summa modo
 corporis, sed intima quoque
 corripit: gingivæ iis cruore
 suffunduntur: inflāmatio cir-
 ca iecur erumpit: tormina &
 biliosi vomitus sequuntur.

Sopor, tremor, & vri-
 næ difficultas acce-
 dit, & frigidus su-
 dor offunditur.

Cæcilia. Cap. XI.

Consimilia eueniūt iis qui à
 cæcilia nomine, aut amphisbe-
 na demorsi sunt, eadēmq; ferè
 auxiliantur: quare hoc venenū
 priuatā descriptionē sortitum

non

DIOSCORIDIS

nō est, neq; vīsum est dignum,
quod alio genere cōprehēdat.

Dryinos. Cap. XII.

A DRYINO morbis pu-
stulæ molestique dolores inci-
dunt, præsertim quæ dilutæ fan-
nici emissarium subest: quin-
etiam erosio, torminæque cō-
sequuntur.

Hæmorrhœos. Cap. XIII.

Ab hæmorrhœo ictis vehe-
mentes cruciatus accidūt, qui
angusta contractaque corpo-
ra ex continuo dolore red-
dunt. Ex plaga copiosus cruor
effluit, & quacunq; parte cor-
poris cicatrix vlla fuerit: ea san-
guine manat. Excrementa per
aluum cruenta eiiciuntur, pro-
fluēsq; sanguis in globos coit.
A pulmone sanguinē extussi-
unt, & in vomitiones effusi si-
ne remedio commoriuntur.

Diphas. Cap. XIII.

Quos diphas percussit, solut⁹
ac nō cōstrict⁹ tumor premit,
fitisq; vsq; eo p̄tinax, vt satiari
nō possit, ac sine vlla interca-
pedine excruciet: etsi potū ple-
no ore affatim trahāt, illico in
eandē sitim relabunt. pinde to-
to habitu similes sunt iis q. an-
tea pot⁹ nihil hauserint. Quare
p̄pter cōtinuā sitim, & prester,
& caufon, aut diphas appellat.

Natrix

οὔτε τε τύχηκαν, οὔτε ἡξιώσῃ τὸ
εἶδος τῆς το.

Πρὶ Δρυίνε. Κεφ. ιβ΄.

Τοῖς δὲ ὑπὸ δρυίνε δηχθεῖ-
σιν, ἰχυρεαὶ ἀπεισδυώσιν ἐμπίπτει
σι, καὶ φλυκταινώδεις ἐν τῷ οἶ-
κῳ μέρει, ὅπου δὲ καὶ ὑδατὸς ἐκ
ἰχθύος ἐκχυσις ἐπακολουθεῖ δὲ
καὶ δηγμὸς καὶ σφόδρος.

Πρὶ Αἰμόρρῃς. Κεφ. ιγ΄.

Τοῖς δὲ ὑπὸ αἰμόρρῃς δηχθεῖ-
σιν, ἰχυρεαὶ ἀπεισδυώσιν ἐμπίπτει
σι, βραχέα δὲ καὶ στενὰ παντελῶς
παρέχουσι τὰ σώματα ὑπὸ συντυ-
χίας τῆς ἀγγειομάτου. ἐν δὲ τῇ ἀγγ-
ματος ἐκκρισις γίνεῃ πολλή, καὶ
ἐλὴ καὶ ἕτερον μέρος τῆς σώμα-
τος ὑπαρῇ, παρέχῃ αἰμὸρροεῖν
τὰ δὲ διαχωρήματα αἷμα τὸ δὲ
ἐκκρίνεῃ, καὶ τὸ ἀπορρέον ἀπὸ
αὐτῆς αἷμα τεθρομβωμένον ὅσῃ.
βήσσοντες τὸ ἀπὸ πνεύμονος, αἷ-
μα ἀνάγουσι, καὶ ἐξεμύσιν ἀποσπῇ
τως. Πρὶ Διψίδος. Κεφ. ιδ΄. 10

Τοῖς δὲ δηχθεῖσιν ὑπὸ διψί-
δος, ἀσθενὸς ὄσκος ἐκκρίνεῃ, καὶ διψος
ἐπιτεταμένον ἰχυρῶς ὥς τε ἀ-
σπλήρωτον καὶ ἀδιάλειπτον εἶναι
καὶ τὸ ποτὸν χανθὸν ἔλκεν, καὶ τῷ
αὐτῷ καὶ σίτα δαί. τῷ δὲ μὴ τῷ
ἀρχῶν εἰσφύει τὸ ποτὸν, παρὰ
σπλήσιον τι ὅλα τῆς συγκρίματος
ἀκολουθεῖ. διὰ τὴν συνειρήνην τῆς πό-
ματος εἰσφορᾶν, ὅθεν ἀρνησθῇ καὶ
χρῶσιν ἀσπληνῶν ἢ διψας.

Πρὶ

Πρὶ ὕδρου. Κεφ. ιε.

Τοῖς δὲ ὑπὸ ὕδρου διχθεῖσι,
τὸ ἕλκος πλατυέη) καὶ μέγα γίνε-
ται περὶ μένον. ἰχώρ τε ἐξ αὐτῆ
μέλας καὶ πολὺς καὶ δυσώδης οἶον
5 ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ ἐκκρίνεται.

Πρὶ Κένχρου. Κεφ. ις.

Τοῖς δὲ ὑπὸ κένχρου διχθεῖσι,
τὸ μὲν δῆγμα ὁμοιον τοῖς ἀπὸ τῆ
χίδνης, σπινθῶν ὅτι παρακολληθεῖ.
καὶ διεσπένεται σὰρκες ἐξοιδήσασθαι
10 πρὸς τὸν ὡς ἐπὶ ὕδρωπος. ληθα-
ρῶδεις τε γίνονται) καὶ καταφροῦ-
αῖτοι. Εὐρασίστρατος δὲ φησὶν αὐ-
τὸν πεπονημένον τὸ ἥπαρ καὶ τὴν
νῆσιν καὶ τὸ κῶλον. ἀναλινθέντων
γὰρ αὐτῶν διεφθαρμένα πως εὐ-
15 εἴσκεται πᾶσι ταῖς μέρεσιν.

Πρὶ Κεράσου. Κεφ. ιζ.

Τοῖς δὲ ὑπὸ κέρασου διχθεῖσιν,
ὁ μὲν τόπος ἐπαίρει) μὲν σκληρίας
καὶ οὐκ ἁλινώσεως. ῥεῖ δὲ ἀπὸ τοῦ
δῆγματος ἰχώρ ποτὲ μὲν μέλας,
20 ποτὲ δὲ ὑπόχρους· κίρροφθης δὲ
γίνεται πρὸς τὸ σύγκριμα ὅλον) καὶ
τὸ μὲν αἷδιον τέγεται. ἡ δὲ διά-
νοια ἐξίσταται, ὁφθαλμῶν τε ἀ-
μαύρωσις ἐπιγίνεται· τέλος δὲ
ἀπόλλυται πῶς μῦθος τεταῖρος.

Πρὶ Ἀσπίδος. Κεφ. ιη.

Τοῖς δὲ ὑπὸ ἀσπίδος διχθεῖ-
σι, τὸ μὲν δῆγμα ὁμοιον τοῖς
ὑπὸ βελόνης κατηήμασι μικρὸν
παιτελὲς φαίνεται χωρὶς τῆ
πύρεως) καὶ αἱμάτιον ὅτι ἐ-
25 πλύνεται
ἀλλὰ

Natrix. Cap. XV.

Ab natrice demorsus vlcus di-
latatur, & liuidū ac ingēs eu-
dit. Sanies ex eo multa, & atra,
& malē olens, nō secus atq; iis
quæ serpunt vlcereb⁹, expuitur.

De cenchro. Cap. XVI.

Cenchri morsum, qui vipe-
rino ictui similis est, putridum
vlcus sequitur. Carnes antea,
vt in aqua inter cutem, pratu-
midæ, defluūt. Lethargo corri-
piūtur, & veterino pressi som-
nos captāt. Erasistrat⁹ eos ioci-
nere, intestino ieiuno, coloque
conflictari autor est. Quippe
dissectis ipsis, omnes fere par-
tes corruptæ reperiuntur.

Cerastes. Cap. XVII.

A cerasste percussis locus
attollitur, cum duritia pustulo-
sus. E plaga sanies profluit, mo-
do atra, modo pallidior: sed
toto concretu varicosus intu-
mescit: genitale intenditur:
menis labat, & oculorum
caligo exoritur: denique
rigore neruorū distē-
ti commoriuntur.

Aspis. Cap. XVIII.

Ab aspide ictis, vulnus exi-
guum prorsus, quasi ab adacta
acu citra tumorem conspici-
tur: sanguis exiguus ille quidē,
sed

DIOSCORIDIS

sed ater distillat : caligo velox
oculos obnubit : labor in to-
tum corpus multiplex , omni-
no levis & non sine voluptate
consequitur . Ideo Nicander
perpulchrè cecinit : At vir pe-
rit, absque labore, virens atque
discolor : mediocris stomachi
dolor afficit : frons perpetuò
reuellitur : genæ contremiscūt,
quasi sine sensu in somno vacil-
lent . Hos mors tollit , ad diei
trientem non dilata.

Basiliscus. Cap. XIX.

Erasistratus in libro quem
de medicaminibus & venenis
condidit, de vocato basilisco
scitè ita refert : Cum basiliscus
momorderit, vuln⁹ ad auri co-
lorem efflauescit. Itaque in plu-
rimis quæ virus eiaculantur,
comites notæ ita se ha-
bent. Transeuutes vtiq;
ad medendi rationem,
primum, vt fieri po-
terit, de cōmuni-
bus differem⁹.

ἀλλὰ βραχὺ καὶ μέλαν ἀποσείζει·
ταχεῖα δὲ ἀμαύρωσις ὁμιάτων
καταλαμβάνει· πόνος τὲ ὅλου τ⁹
σώματος πολυειδής. πάντα πασι
ἐλαφρὸς καὶ ἐκ ἀπὲρ ἡδονῆς παρ-
κολεθεῖ. διὸ καλῶς ὁ Νίκανδρος
πεφώνηκε· καμάτου δ' ἄλγος ὅλγυ·
ἀνὴρ, χροὴν ἀπρόπος καὶ χλοαν-
θής· καρδιῶμός ἐστι γὰρ· μέτωπον
ᾧ συνεχρὼς ἀνασπᾷ· βλέφαρα
κινῶνται μὲν ἀναδιησίαις ὁμοίως
ὑπὸ καὶ τέτοις θανάτου συναι¹⁰
εἶ μὴ ᾧ βίτον ἡμέρας διαλιπών,

Πρὶ Βασιλίσκου. Κεφ. ιθ.

Ερᾶσις γὰρ ἐν τῷ καλυμ-
νῷ καὶ δυνάμεων καὶ θανάσιμων
καὶ τῶ καλουμένου βασιλίσκου
ρητὴς οὕτω φησὶν· ὅταν δὲ ὁ βα-
σιλίσκος δάμῃ, πληγὴ ὑπὸ χυ-
σος γίνεται . Τὰ μὲν οὖν ἐν
τοῖς πλείοσι τῶν ἰοδόλων παρὰ
κολουδοῦντα σημεῖα, τοιαῦτά
εἴσι. μεταβαίνοντες δ' ἐπὶ τ⁹
θεραπεῖαν, πρῶτον τὰ
κοινὰ τῆς θεραπείας
ὡς δυνάτον παρὰ
δύσσοις .

LIBRĪ SEPTIMI
FINIS.

PEDA-

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙ-
ΒΛΙΟΥ ΕΒΔΟΜΟΥ.

ΠΕΔΑ-

Π Ε Δ Α - PEDANII

ΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙ-

δε ἀναζωεύει πρὸ θεραπείας
τῶν ὑπὸ ἰοβόλων δεδιμμένων

5 Βίβλιον ὁ γράφον.

Τίς κοινὴ τῶν ἰοβόλων θε-
ραπεία. Κεφ. α'.ΡΟΣ πᾶσι πη-
λὴν ἰοβόλων ἀρμόζει
ἢ διὰ τὸ σῶμα τὸ
ἐκμύζησις. δεῖ δὲ

10

μη ἀσπτον εἶναι τὸν ἐκμύζωντα,
ἀλλὰ καὶ εἰληφέναι βροχίον, καὶ δια-
κλύζειν οἶνον ἑπτά καὶ βραχύ-
πιν τῷ σώματι ἑλαίᾳ κατέχων,
15 ἔπειτα τὸ ἐκμύζοντι ἐπιτελείτω. καὶ
αὐτὸς δὲ ὁ τόπος ἀπόγῳ πυρι-
άδω, ἔπειτα δὲ ἐγκαταρραζέδω
βαθυτέρας δὲ ἐμβάλλειν τὰς ἀ-
μυχὰς περὶ στήθεος, ὅπως τὸ ὑλὶον
ἐκ βάθους ἀναλαμβάνη. καὶ περὶ

20

σάρκισμός δὲ καὶ ἐκτομή, πλου-
σιώτερον καταρρασμὸν βροχίου σιν-
ῖδι καὶ ἔπειτα αὐτὰ τὰ χησιμύον-
τα γίνονται. ἐν μὲν ὅτι αἵρεται ὁ
ἰός ἐκ τῆς τόπου. δεύτερον δὲ ὅτι
τῷ αἵματι συνεκκρίνεται πολ-
λὴ καὶ ἀδρόν το φθάσαν ἔσω
25 παρελθεῖν. εἰ δὲ ὁ τόπος τὸ περὶ
σάρκισμόν οὐ περὶ δέχοιτο, συ-
κίας καὶ περὶ στήθεος μὲν φλο-
γὸς πλείονος. περὶ δὲ χερσίν ἑ-
στὶ τὸ λυσοδῆκων περὶ στήθεος.

εἰδ'

DIOSCORIDIS A-
nazarbei De curatione ab
animalib⁹ venenatis morfo-
rum, LIBER VIII.Cōmunis cūratio in omnes
ictus virulētos. Cap. IDuersus quidem
omnem animalis
ictū, quod vene-
nū vibrat, oris su-

ctio conuenit. Sugentem verò
oportet ieiunum non esse, sed
& cibum sumplisse, & vino os
abluisse: postea exiguum olei in
ōre continens plagam exugat.
Locus ipse spongia fouendus,
deinde scarificandus: sed vlcu-
scula altius imprimere expedit,
quò virosa materies profundo
euocetur. Circinatio autē car-
nis, & sectio, scarificatione lō-
gè potentius opitulantur: nāq;
ab iis duo peculiaria præsidia
fiunt. Vnum, quod virus è loco
tollitur. Alterum, quod eius vene-
ni pars quæ ad interiora grassat,
cū multo copiosoq; sanguine
excernit. Quod si locus sectio-
nem non admittat, cucurbitu-
læ cum largiori flāma adfigēde
sunt. Sed iam de vltione suprà in
rabiosorū morfu differimus.

X ij Si vero

DIOSCORIDIS

Si verò iſta pars, vtpote extre-
ma, eam ſectionem commodè
non reſpuat, præſertim in om-
nibus ſerpentiũ iſtibus, vt aſpi-
dis, ceraſtæ, ſimiliumq; procul-
dubio amputanda eſt. Conue-
nientiora ſuprà dictis auxilia
ſunt, quæ epithemata vocant.
Imponatur fermentitiuſ cinis,
aut ficulnuſ, cum lixiuiſ ſtilla-
titio ſubactuſ, garo, & acri ſal-
ſamêto: porri, cepæ, & allia mo-
do minutiffimè cõtrita illinũ-
tur, modo cremata vulneribus
iniiciuntur. Quinetiam diſſecti
gallinarum pulli, cum maximè
tepent, percuffo loco applicẽ-
tur. Nec deſunt qui hiſce tan-
quam diſcordia quadã natura-
li pugnãtibuſ vtãtur: verũ hu-
iuſ rationẽ inire facillimũ fue-
rit. Gallinæ enim calida natu-
ra præditæ ſunt, argumento, qđ
deuoratum inſigne virus cõfi-
ciunt, & aridiſſima quęq; ſemi-
na conſumãt: item nõnunquã
arenas lapilloſq; ingluuie ſua
deuoratos diſſoluunt. Itaq; ani-
mantis admoti calore adiutuſ
ſpirituſ, ab iſtã parte impetum
capeſſens exiliẽſq; ſecum vene-
re im exigat. Nec me fugit quid
in Ægypto fieri ſoleat. Cũ ſpi-
cas Ægyptij metũt, ollam picis
paratã habẽt, & appẽſã faciã:

tunc

εἰδ' ὑφ' ὧν ἔχει πρὸς ἀποκο-
πὴν τὸ μέρος τὸ διδηγμύριον, μά-
λιστα ἐπὶ πάντων θηρίων ἀνενδοι-
άτως τ' ἀκρωτηριασμὸν ποιητέ-
ον, ὡς ἀπὸ ἰδός, καὶ καρέου καὶ τ'
ὁμοίων. ὡς ἐπιτηδεύετε, διὰ τ'
περὶ θηρίων βοήθημάτων, ὅξια
ἐπιδέματα ὄντι. ἐπιπιδέτω δὲ
τέφρα κλημιστὴν ἢ συκίνη, μετὰ
κονίας σακτῆς πεφυεγμύρινης. γάρ-
ρου, δριμύος ταείχου, πρὸς αὐτὴν
καὶ κρόμμυα, καὶ σκόροδα ποτὲ μὲν
ὡς ἐκλεροτελευθέντα καταπλασ-
τέτω, ποτὲ δὲ καὶ ἄντα πρὸς βάλλ-
εται τοῖς δῆγμασι καὶ οἱ τῶν ὀφ-
θάλμων γενοσὶ διαχρόντες καὶ θέρ-
μύτατοι πεπληγμένοι τοῦ πε-
πληγμένου τόπου. πρὸς μὲν ὡς ἀντι-
παδείσιν αὐτοῖς ἐχρήσαντο. πρὸς
χειρὶν δὲ ἔχει τὸν λόγον. φύσει
γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ εἰσὶ θέρμαι, διὸ καὶ
ἐπίσημον τὸν ἰὸν καταπιεῖν, καὶ
πρὸς αὐτοῖς καὶ τὰ ξηρότατα δια-
παύσει τῶν σπασμάτων. ἐνίοτε, καὶ
καὶ ἰάμοις καὶ λίδοις διαλύου-
σιν ἐμφανυγμάμυροι. τοιγαροῦν
πρὸς τὴν τῆς ζώου θέρμην, καὶ
τὸ πνεῦμα τὸ ἐν τῇ διδηγμύρι
μέρῳ ὁρμῶν λαμβάνον, συ-
ελάχει τὸν ἰόν. ἐγὼ μὲν δὲ ἐπὶ τ'
αἰγύπτιου τοιοῦτον τι γλυκύμυρον.
ὅποτε οἱ αἰγύπτιοι θείωσι τὸν
σάχμιν, χύτταν ἔχουσι κατεσκε-
υασμένῳ πόσῃ, καὶ σφηνω-
μα πρὸς πηλὸν τῇ χύττει.

τότε

τό τ' ἤ μάλιστ' ἀεὶ δίδασκ' τὰ θη-
 εία, καὶ διὰ τὴν ὥραν, καὶ τῶ λαοῦ
 θαυρῶν αὐτὰ κείμενα καὶ τῶν ὀ-
 πῶν τῶν ἐν ταῖς ἀράραις ὀπισθο-
 τήματα ὁμοῦ καὶ ὑπὸ τῆς δαού-
 5 τητος τῶν χωρῶν. πολλὰ δὲ καὶ
 τὰ πεδία χαλεπώτερον. τ' ἰοβό-
 λων ζώων ἢ αἰγυπλῶν φέρει. ἐπει-
 δὲ οὐκ ἔστιν ἡ πύδα ἢ ἄλλο
 π' μέρος ταχέως οἱ παρατυχόν-
 τες τὸ σφίγμα βάλλουσιν εἰς τ'
 10 ἥρβαν τῆς πίστεως, καὶ περικλυθῶσιν
 ἅπασι ἢ δις πάλιν τ' πῶλον ἢ τὴν
 κνήμην, μικρὸν ἐπαίω τ' δὴ ἡμα-
 τος, καὶ περὶ φέγγος δύο παρεστώ-
 ντες ἰσχυρῶς, καὶ ἐντέμνοντες τ' τὸ
 πον διὰ τ' περὶ δόσεως τῶ βρόχου,
 15 ἐπιχέουσι καὶ πίπτει. ὅταν δ' αὐτὰς
 κῶς ἔχῃν δοκῇ, τ' βρόχον ἐφαρῶσι
 καὶ καταπλάσσωσι προμύμοις, καὶ
 δι' ἄλλων τ' προσεχθέντων καὶ ἑλίων
 δ' ἐχέουσι ὑγρὰ πίπτει μὲν ἄλλων
 λείων θύμοις καὶ καταπλάσσω-
 20 μέν, ἀποδαίως βοῶντι, αὐτὴ καμνο
 ποιηθεῖσα συνεχέσθω. ὡς αὐτῶς
 ἀρμόζει καὶ κέδρος, τὰ τ' ἀσπερίδια
 τῶν αἰγῶν ἐν οἴῳ καταπλάσσω.
 ἀρήγει δὲ αὐτοῖς καὶ καταπλάσσωσι
 δι' ὅξος δερμῶν, καὶ χαλαμίνῃ ἐ-
 25 ψοκίῳ δι' ἔρε καὶ θαλάσσης ἢ ὀ-
 ξάλης. εἰσὶ δ' καὶ ἐμπλάσσωσι δρι-
 μύτα. δυνάμεναι τ' ἰὸν ἐπιπλά-
 σσαι, καὶ διακρατεῖν καὶ διαφορεῖν.
 ὡς δὲ ἄλλων ἢ νίπτου καὶ σπάπ-
 ῶς καὶ κέγχρους προσεφερόμενα.
 ὅσῳ

tunc enim maximè serpētium
 iniurias expauescunt, tum pro-
 pter spicilegij tēpus, tum quòd
 opacis simul abditæ speluncis
 & cauernis, densoq; aruorum
 cespite delitescunt. Molestissi-
 ma enim animalia & virus eru-
 ctantia, Ægyptus in cāpis fer-
 re cōsuevit. Vbi ergo aut in pe-
 dem, aut partē aliam, morsum
 intulerunt, qui adsunt, fasciam
 in ollam picis coniiciūt, & se-
 mel aut iterum brachium aut
 crus paulum supra vulnus ob-
 ligant, et arctissimè duo è pre-
 sentibus distringūt, locumque
 secantes qua circūactus est la-
 queus, picem instillant. Cumq;
 satis vulnus excepisse videtur,
 laqueum resoluūt, & cæpis a-
 liisq; suprà memoratis illiniūt.
 Præterea pix liquida cum sale
 trito & feruēte illita p̄staneo
 est auxilio, si iugiter inouetur.
 Cōuenit & cedria, & simū ca-
 prarum ex vino decoctū. Lo-
 cum aceto calido, calamintha
 in lotio, maris aqua, aut acida
 muria decocta, foueri salutare
 est. Quinetiā nō desunt empla-
 stra vehemētissima, & calidissi-
 ma, q̄ venenū elicere, expugna-
 re, & discutere possunt. Cuius-
 modi sunt q̄ ex sale, aut nitro,
 sinapi, & cachrye cōponūtur:

DIOSCORIDIS

de quibus cōsequēter erit tractandū. Erasistratus autem nō iniusta reprehēsiōne eos incēssit, q̄ incognitas ad hunc vsum facultates cōscripserūt, vt elaphāti fel, crocodilivē sanguinē ouaq̄, testudinis, & cōsimilia. Nam cū iuuantia quēdā literis tradidisse vidētur, planē in hęc sola incidētibus imposuerunt. Quare talia deuitanda sunt, cū difficilē, nisi regia facultate, p̄uestigari possint: neq̄, quod nōstra fides iis obstringatur, frequēti obseruatione, sufficiens experimentū præstiterint. Quę autē ad cōmunē omniū vsum pertinēt, quæq̄ facile suppedi-
tari, & omnibus à serpēte percussis auxiliū ferre queūt, subiungēdi vidētur. Intubus itaq̄, & erica, & astragalus, cū aceto pota, cōtra omnes serpentium morsus auxiliātur. Itē bitumē, & virentes platani pilulę in vino diluto coctæ, & paliuri decoctum: radix aristolochiæ, & eryngij: decoctę etiā lauri bac-
cæ & deuorata, piper largius esitatū, ruta, anethū, & cyclamin⁹: coma porrorū priuatim ex pane, aut alliū, aut cepæ, falsamētq̄; quamacerrima: origani decoctum cum vino potū, foeniculi, pulegij, calaminthæ, porrorūq̄;

ὡς ὁ ἐξ ἡς ῥητέον. οὐκ ἀλόγως δὲ ὁ ἐρασίστρατος ἐπιμέμφεται τοῖς ἀγνώστοις διωάμεσι πρὸς τὴν χρείαν ἀναγκραφόντων, ὡς χολικῶν ἐλέφαντος καὶ αἵμα χελώνης καὶ ὡὰ καὶ τὰ παρὰ πλῆσι. 5
δοκοῦσι μὲν γὰρ τινα πεποιῆσθαι παρὰ δόσιν ὠφελουμένων ἐξήπα-
τήεσσι δὲ αὐτὰ μόνον τὰς ἐν-
τυγχάνοντας. ὅθεν τὰ μὲν τεινύ-
τα παρὰ τὴν τέον μὴ τε ραδίως εὐρεῖσθαι διωάμενα εἰ μὴ ὅς 10
ἐξουσίας βασιλικῆς· μή τε διὰ
τῆς πλείστης τηρήσεως οἶον εἰς τὸ
πιστευθῆναι τὴν πείραν παρ-
εχόμενα. τὰ δὲ κοινωφελῆ, καὶ ἐν-
πείεστα, ὑποδεικτέον, τὰ καὶ εἰς
πάντα ἐν πᾶσι τοῖς θηριοδύκτοις 15
διωάμενα τὴν χρῆσιν παρέχον-
τες· τοίνυν καὶ ἐρεῖκη καὶ ἀσρά-
χαλος πινόμενα μετ' ὄξους, πᾶσι
τοῖς θηριοδύκτοις βοηθεῖ. ὡσαύ-
τως καὶ ἀσφαλτος καὶ πλαταίνου
χλωρὰ σφαμεῖα κατεψυγμένα 20
ἐν κράματι. καὶ παλίκρου ἀφέψη-
μα· καὶ ῥίζα αἰσολοχίας καὶ ἡρύ-
κνης· καὶ σαφνίδες ἐφθαῖ κατεδιό-
μεναι καὶ πέπειδα ψιλλέσθαι ῥα-
γόμενον καὶ πύρανον καὶ ἀνηδὸν καὶ
κυκλάμενον· πρὸς τὸν τε ἡ κόμη 25
ἰδίᾳ σὺν ἀρ' τῷ ἡ σόβειδα, ἡ
κρόμμυα, καὶ τῷ εἰχος δριμύτα-
τος· καὶ δειγαίου ἀφέψημα σὺν
οἴνῳ πινόμενον. καὶ μαράθρου
καὶ γλήχωνος καὶ χαλαμίνης,

5 ἡ περὶ τὴν χυλὴν συνὴν μέλιτι κα-
 ταρροφόμενος, ταῦτα μὲν ἐκ τῶν
 φουφάρων. ἀπὸ ζώων δὲ λαμβά-
 νεται πῖνα ὠφελίμως, ἐκ κεφαλῶν
 μὲν ἀλεξυρόνων ἐσθάρμοι, πτύα
 10 δὲ λαγῶν συνὴν οἶνω πινομένη καὶ
 καστορίᾳ ἐγγίαι β'. τὸ αὐτὸ βόπον.
 λέγει δὲ καὶ ὅτι χελώνης θαλασ-
 σίας οἱ ὄρχεις λαμβανόμενοι βοη-
 θοῦσιν. ἔστι δὲ καὶ ἡ γαλὴ ἡ σκελε-
 τευθεῖσα τῶν βελονημένων, εὐρί-
 15 σκε δὲ τὸ περὶ τὴν ἡπατὶν καὶ τὴν
 σπλῆνῴσιν ἐκκριθέντων, σκελε-
 τευθεῖ δὲ τὸ ἐκ κερνέου, καὶ αὐτὸ αὐ-
 τὸ δὲ δρασχέον συνὴν οἶνω πινομέ-
 νον. ποσά τα δὲ καὶ τὰ ἀπὸ τῶν
 περὶ τὴν σπλῆνῴσιν ἀρμόζοντα δὲ τοῖς
 20 θηρίοις καὶ τοῖς ἀνθρώποις διὰ
 κοιλίας, καὶ ἰδρωτοποιίας, καὶ ἔρ-
 ρων πολλῶν ἐκκρίσις. σκευασὰ δὲ ποτὶ
 μέλιτι παρὰ δέδοται καμνότερος ὑ-
 πὸ χυλὸν βοηθεῖν, ὡς ὅτι καὶ
 σμύρνης ἀνὰ ὀφθαλμῶν, καὶ πεπύρεως
 25 < β'. ταῦτα δὲ δεῖ μέλιτι ἀνα-
 λαμβάνειν, καὶ διδόναι κυάμῳ μέ-
 γετος, αἰγυπλίῳ μὲν οἶνω. ὁμοίως
 πηλὸν ἀγρίῳ σπέρματος, μελαν-
 δίνῃ, κυμίνῃ αἰθιοπικῇ, χαλδαῖνῃ,
 ἀριστολογίᾳ, ταῦτα πάντα λεαν-
 30 θέντα καὶ φουφάρωντα χυλῶν συνὴν
 με, ἀναπλάσσειν τὸ βόλον δρασ-
 χέον διδόναι δὲ ἐξ αὐτῶν μὲν οἶ-
 νῳ ἡ μικροτυλίῳ, ταῦτα μὲν περὶ τὴν
 κοινὴν βοηθέντων. τὰ δὲ ἰδία περὶ
 ἑκάστην τὴν ὁφθαλμῶν ἐξ ἑστῆς εἰποιμεν.

Πρὶ

porrorūq; succus cū melle de-
 sorptus. Hæc quidē à plātis cō-
 quirūtur. Ab animātibus verò
 quædā vtiliter peti solēt, galli-
 naceorū cerebella in cibo, le-
 porinū coagulū cū vino, itidē
 castorij sextās: testes marinę te-
 studinis sumpti multū pdesse
 tradūtur: mustela sale iuetera-
 ta iter auxiliaria medicamēta
 est. Cōmendat in primis exen-
 terata, q̄ sale siccescēs inuete-
 ratur, ex qua binas drachmas
 cū vino bibisse satis est. Sed de
 simplicibus quæ dari solēt ha-
 ctenus. Percussis à serpēte pro-
 dest alui deiectio, diffuens su-
 dor, vrina copiose reddita. Sūt
 & cōpositæ quædā potiones,
 q̄ mira remedia polliceri tra-
 dūtur, vt & opij & myrrhę sin-
 guli oboli, piperis sicilicum: ea
 melle excipiūtur, & istar Ægy-
 ptia fabæ dātur cū vino. Itidē
 fyluestris rutę seminis, gith, cu-
 mini Æthiopici, aristolochiæ,
 galbani, singulorū pares portio-
 nes tritæ, et cū erucę succo sub-
 actæ, digerunt in pastillos, qui
 drachmæ pōd⁹ æquēt: dant ex
 iis terni cyathi cū vino. Hęc ha-
 bui de cōib⁹ auxiliis q̄ dicere.
 De peculiarib⁹ remediis con-
 tra bestias quæ venena vibrāt,
 consequenter est dicendum.

X iij Cura-

Curatio ab apibus & vespis morforum,

Cap. II.

INTER ferientium venenatorum notas nihil de vespis & apibus articulatim digessimus, quòd conspicuæ omnibus forent, & nihil excellens aut notatu dignum in his obseruaretur: inter remedia tamen, earū meminisse non fuit alienum. Igitur aduersus vtrunque ictus prodest illita malua, & hordeacea farina cum aceto, ficulneum lac in vulnus instillatum, à muria, aut maris aqua fotus.

Curatio à phalangis morforum.

Cap. III.

Phalangiorum ictibus ficulneum cinerem, adiecto sale trito & vino, imponere oportet, aut radicem syluestris punice quam tenuissimè tritam, aut aristolochiam cum hordei farina & aceto subactam. Vlcera aqua maris proluenda, aut apiastri decocto, foliaque eiusdem illinenda. Lauacris perpetim vtendum, & propinandum abrotoni semen, anisum, aristolochiam, cicer sylvestre, cuminum Æthiopicum, cedrides tritas, platani corticem,

&c

Πρὶ Οἰσθαπείας τῶν ὑπὸ σφηκῶν καὶ μελισσῶν δεδιγμένων. Κεφ. βʹ.

Εν τῇ σημειώσει περὶ σφηκῶν καὶ μελισσῶν οὐδὲν διηγεῖται, εὐδαιμον γὰρ πάντων ὧν καὶ παρασχημον ἔχει ἐξαίρετον οὐδ' ὅποιον φυλασσόμενον. ἐν δὲ τῇ οἰσθαπείᾳ, καὶ τέτων οὐκ ἀπομνημονεύσαι. περὶ οὗν τὰς πληγὰς τῶν σφηκῶν καὶ μελισσῶν, ἀρμόζει μαλάχῃ καταπλασσομένη, καὶ κρίδινον ἀλευρον συνθεῖν, καὶ συκῆς ὅπως ἐνταζόμενος τοῖς δήγμασι, καὶ πυρεῖα δι' ἀλμυρῆς ἢ θαλάσσης.

Πρὶ τῆς ὑπὸ φάλαγγίων δεδιγμένων.

15

Κεφ. γʹ.

Τοῖς δὲ ὑπὸ φάλαγγίων δεδιγμένοις, ταῦτα ἐπιπιδέναι δεῖ, τέτταν συκίνην συν ἀλσὶ λεῖοις μετ' οἴνου πιφουραμένην, ἢ ῥίζαν ἀγρίας ῥόας λειοτετημένην, ἢ αἰσολοχίαν συν κρίδινον ἀλευρον καὶ ὕδατος δευμένον, καταπλεῖν ὃ θαλάσση τὰ ἔλκη, ἢ μελισσοφύλλῃ ἀφελήματι, ταῦτες δὲ τὰ φύλλα ἐπιπλάσσειν. λοιπὸν ὃ κίαν συνεχέστερον, καὶ περὶ ποτισμοῖς χρησέον διὰ τέτων τῶν φαρμάκων ἀβροτόνη τὸ σπέρμα, ἀνισον, αἰσολοχία. ἐρέβινθος ἀγριος, κύμινον αἰθιοπικόν, καδρίδες λεῖαι, πλατανοῦ φλοιός,

καὶ

καὶ τὸ σπέρμα τῆς τριφύλλου πώ-
 ας τέττων δὲ ἐκέρσου διδόναι καὶ
 ἰδίαν < β' μετ' οἶνον* κοτύλης α'.
 δίδεται δὲ καὶ μυρίκης ὁ καρπὸς
 ὡσαύτως καὶ χαμαίπυτος, καὶ τῶν
 5 χαλωῶν τῆς κυπαρίσου σφαιρί-
 ων τὸ ἀφέψημα κενάμυρον μετ'
 οἶνου. φασὶ δὲ πνευ καὶ καρκίνον
 ποτάμιον χυλιδέντα μετὰ γά-
 λακτος, καὶ περσλαβόντα σελί-
 νη σπέρμα* τῶν ὀχληρῶν ἀπαλ-
 10 λίσσεται.

Περὶ τῶν ὑπὸ σκολοπέν-
 δρας διδνημύων.

Κεφ. δ'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ σκολοπένδρας
 διδνημύοις, κατὰ μὲν πλὴν πλιν-
 15 γῶν ὀπιθέσθαι δεῖ λειοτελεόμε-
 νον μετ' ὄξους ἄλλας, ἢ πήγανον
 * ἄριον. καταντλεῖν δὲ ὀξά-
 λμη τὸν τόπον, τόπημα δὲ περσφέ-
 ρειν ἀεισολοχίαν μετ' οἶνου, ἢ ἔρ-
 πυλλον ἢ καλαμίνδην, ἢ ἄριον
 20 πήγανον.

Περὶ τῶν ὑπὸ σκορπίου
 διδνημύων.

Κεφ. ε'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ σκορπίου πληθεῖ-
 σι παραχρῆμα μὲν ἀκριβῶς βοη-
 2, δεῖ συκῆς ὅπως εἰς τὰ τραύμα-
 τα ἐσαχθεῖς. αὐτὸς τε ὁ πλη-
 ξας σκορπίος λειοτελεθεὶς καὶ ἐ-
 πιτεθεὶς τῷ πληχθέντι τόπῳ,
 τῆς ἰδίας πληγῆς γίνεται βοη-
 θὸς κατὰ πῖνα ἀντιπάθειαν ὡς
 εἰρη.

& trifoliæ herbæ semen : pri-
 uatim autem, singulorum ex
 iis binas drachmas dare cum
 vini hemina conuenit. Item
 myricæ fructus, & chamapi-
 tyos, & viridium cupressi pi-
 lularum decoctum, admisto
 vino. Sunt qui fluuiatilis cæcri
 expressi succum, cum lacte,
 assumpto apij semine, cō-
 festim molestiis libe-
 rare prodant.

A scolopendra morfi.

Cap. IIII.

Si schopendra morsum in-
 fixit, sal quàm leuissimè tritus.
 ex aceto vulneri inspargendus,
 aut ruta syluestris superponen-
 da. Locus acida muria fouen-
 dus, & danda in potu aristo-
 lochia cum vino, aut serpil-
 lum, aut calamintha, aut ruta
 syluestris.

A scorpione percussi,

Cap. V.

Percussis à scorpione, præ-
 senti est auxilio ficulneū lac in
 vulnus instillatū. Scorpius ipse
 qui ictū vibrauit, tritus & per-
 cussio loco impositus, suæ pla-
 gæ remedium est, ob cæcam
 quandam naturarum (vt con-
 stat) discordiā, quæ antipathia
 appellatur.

DIOSCORIDIS

appellatur. Præterea tritus & impositus cum sale, lini femine, & althæa, scorpius conuenit. Sulphur ignem non expertū, resina terebinthina exceptū, & emplastri modo adiectum auxiliatur. Itidem galbanum ad splenij formam ductum, & calamintha, quæ trita illinatur, & farina hordei in vino parata, in decocto rutæ. Semen trifoliæ herbæ tritum, & vulneri iniectum opitulatur. Hæc ad affectum locum pertinent. Post hæc quàm efficacissimis potionibus vtendum, cuiusmodi sunt aristolochiæ, præsertim corticis binæ drachmæ cum vino, tusa gentiana, & pulegium decoctum, & bacca lauri pauco numero tritæ, & calamintha cum posca, in qua magnopere discoqui debet: cupressus cum vino & ruta, nec secus ficulneum lac, laserpitium, si adsit: sin desideretur, peucedani succo vtendum. Efficax est potus trifolij, & ocymi semen. Horum autem omnium vicem pensat iugis Ianacri v-
sus, euocatus fu-
dor, & dilutæ
vini poti-
ones.

A pasti-

εοικε. μετὰ δὲ τοῦτο ἀρμόζει
λεῖος ἐπιπυρέμνος ὁ σκορπίος σὺν
ἀλατι καὶ λινοσπέρμῳ καὶ τῇ
ἀλθαίᾳ βοτάνῃ. βοηθεῖ δὲ καὶ
δεῖον ἄπυρον ἀναληφθὲν ῥητίνῃ
τερμινθίνῃ καὶ ὡς ἐμπλάσπον ἐ-
πὶ ῥήφειν. ὁμοίως δὲ καὶ χαλβά-
νῃ πλάτυνθεῖσα σπληνίου τυ-
πῶν, καὶ χαλαμίνῃ λεῖα κα-
τάπλαστομύνη, καὶ ὠκύμυσις ἐν
οἴνῳ σκευαθεῖσα, ἐν ἀφελήμα-
τι πηγαίου. βοηθεῖ δὲ τὸ σπέρ-
μα τῆς τειφύλλου πῶας λεαινό-
μνον καὶ ἐπὶ ῥήπιούμνον. το-
πικὰ μὲν οὖν ταῦτα. μετὰ δὲ
τούτων καὶ ποτήμασι χρῆσθαι ὡς
ἀνυσμωτάτοις, ἔστι δὲ αἰετο-
λοχίας δίδραχμον μάλιστα τῷ
φλοιῷ σὺν οἴνῳ, ἡρυπασὴ κε-
κομμένη, καὶ γλήχων ἐπιχαθι-
μύνη, καὶ θαφνίδες ἀειθμῶ βρα-
χεῖ λειοτελεύουμναι, καὶ χαλα-
μίνῃ μετὰ ὀξύκεστου. δεῖ δὲ
αὐτῷ ἐπιπολὺν ἐψησται ἐν τῷ ὀ-
ξύκεστῳ· καὶ ὑπέρειστος μετ'
οἴνου ἢ πηγαίου, ὡσαύτως καὶ
συκῆς ὁπός, καὶ σίλφιον εἰ παρεῖν·
μὴ παρόντος δὲ, τῷ πεύκεδανῷ
χρῆσθαι ὁπῶ. ποιεῖ δὲ καὶ ὁ τοῦ
τειφύλλου καρπὸς πινόμνος, τὸ
καὶ τοῦ ὠκύμου σπέρμα. τούτοις
δὲ πᾶσιν ἀντιπαρετάσσεται
λουτροῦ συνεχῶς χρῆσις μετὰ
πολλῆς ἰδρώσεως, καὶ οἶνοποσία
μετὰ κράματος.

Περὶ τῶν

Περὶ τ' ὑπὸ βυζόνος θαλασ-
σίας δεδηγμένων.

Κεφ. Ε΄.

Τοῖς δὲ ὑπὸ βυζόνος θαλασ-
σίας πληγείοις, ἀρμόζει πάντα τὸν
5 αὐτὸν τρόπον ὅσον μικρὸν ὕστερον
ἐπὶ τῶν ἰχθυόδηκτων ἐρεῦμαι.
* ἀρμόζει δὲ πρὸς τὰς πληγὰς
αὐτῶν ποτισμὸς ἀψινθίου, ἢ ἐ-
λαισφακού, ἢ δαίου συν ὀξεί
τετειμμένου. καὶ αὐτὴ δὲ ἀνα-
10 πυχθεῖσα καὶ ἐπιτεθειῖσα τοῖς
τραύμασι, τῆς ἰδίας ἰάμα πλη-
γῆς.

Περὶ τῶν ὑπὸ μυγα-
λῆς δεδηγμένων.

Κεφ. Ζ΄.

15 Τοῖς δὲ ὑπὸ μυγαλῆς δεδηγ-
μοῖς, βοηθεῖ χαλβάνη σπληνίων ἐπι-
τεθέν. καὶ τῷ δῆγματος ὡς φάρ-
μακον μετ' ὀξὺς λήστερημένον,
καὶ κρίθινον ἄλευρον μετ' ὀξυμέ-
λιτος ἐπιπλαθέν. καὶ ἡ αὐτὴ δὲ ἡ
20 δακοῦσα μυγαλὴ, ἀναπύουσα μένη
καὶ ἐπιτεμένη, τῆς ἰδίας πληγῆς
ἀπ' φάρμακόν ὅστι καὶ γλυκείας
ῥοὰς ἐφ' ἃ κατὰπλαθέντα κοκ-
κία καὶ πρῶσα ἐφ' ἃ κατὰπλα-
θέντα καὶ σκόροδα συντετριμ-
25 μένα, καὶ ἡ διὰ τῆς δέρμης κα-
ταίτλασι τοπικῇ μὲν ταῦτα πο-
τιζόμενον δὲ ἀρήγει ἀβρότον καὶ
δεψιδέν. εἴτα δὲ οἷου προσφε-
ρέμενον, ἐρπυλλος δὲ καὶ χαλ-
βάνη καὶ συζῶμεν διεθέντα οἶνον,
καὶ κυ-

A pastinaca ma-
rina morfu.

Cap. VI.

Ei qui marina pastinaca ictur, omnia quæ de viperarum morfu paulò post referem⁹, simili modo conueniunt. Peculiariter aut ictus à marino scorpione, & dracone inferuntur, qui molestos cruciatus ciēt: interdum auté, sed rarò, nomas excitant. Quibus absinthij, saluiæ, aut sulfuris ex aceto tritopotio subuenit. Pastinaca diuulsa & vulneri imposita, sui ictus medela est.

A mure araneo morfu.

Cap. VII.

Si mus araneus momorderit, auxiliatur ex galbano spleniū, per se vulneri exterius impositum, vt medicamēti modo aceto tritum, & hordeacea farina cum aceto mulso illita. Quin etiā mus ipse qui morsum intulit, si dissectus apponatur, ictus sui veneficia luit: resistūt quoque acini dulcis punici decocti, & illiti. Item porri, & allia contrita, necnon aquæ calidæ fatus: sed hæc ad locum pertinent. Prodest potum abrotoni decoctum, maximè si in vino detur. Præterea serpillū, & galbanum, & eruca vino madefa-
cta, recētes

Etta recentes cupressi pilulę cū
aceto, & cyclaminus ex aceto
mulso, & pyrethrū cū vino, &
& chamæleonis herbæ radix.
Nec defunt qui literarū monu-
mentis tradiderunt, tritū murē
araneum contra suos ictus cō-
modè bibi. Quā historią apud
alios inuētam, dignam dunta-
xat censuimus, quæ annotare-
tur. Alij asseuerant demorsum
non aliās exulcerari, nisi præ-
gnans mus araneus fuerit: tum
fanè auxiliari ferunt.

Percussi à vipera.

Cap. VIII.

Si vepera morsum impres-
sit, fimum caprinū cum vino,
studiosè impositū opitulatur.
Item laurus, & abrotonum, &
galbanum splenij loco superie-
ctum, & organū viride indi-
tū. Pulli gallinarū discerpti, &
confestim admoti: erui farina
vino subacta: radice cortex vf-
que eo tufus, vt in puluerem so-
lutus abeat, & scilla tosta: detri-
tū chamæmelū hordeaceæ fa-
rinæ cataplasma in aceto mul-
so præparatum: sed locus antè
eo calido foueatur. Hæc loco
imponuntur. Contra viperi-
nos ictus rubus cum vino pro-
dest. Aliqui anchusam tenui fo-
lio constantem auxiliari pro-
dunt.

ὅτι κυπαρίσσω τὰ ἀπαλὰ σφα-
εῖα μὲν ὄξυς, καὶ κυκλάμινον μὲν
ὄξυμέλιτος, καὶ πύρεθρον σὺν οἶ-
νω, καὶ χαμαιλέοντος τῆς βοταίνης
ἢ ρίζα. πῆες δὲ ἀναγράφουσιν ὅ-
τι καὶ αὐτὴ ληοτελεῖται ἡ μυ-
γαλὴ, πρὸς τὸ ἴδιον πλῆγμα πο-
τίεται. τὴν δὲ ἰσοεῖαν ταύτην
καὶ ἄλλοις κειμένις ἐν ῥόντις, πα-
ρασημειώσεως μόνον ἡξιώσαμεν.
ἔγιοι δὲ φασὶ μὴ ἄλλως ἐλκεῖ-
σθαι τὸν δηχθέντα, εἰ μὴ ἐκτός 10
ἢ μυγαλὴ τυγχάνει· τὸ τε οὖν
φασὶ βοηθεῖν.

Πρὶ τ' ὑπὸ ἐχίδνης δεδω-
μένων. Κεφ. η'.

Τοῖς δ' ὑπὸ ἐχίδνης δηχθεῖσι
βοηθεῖσι τ' αἰγῶν αἱ σπύραιθοι μὲν 15
οἶνον ἀνατεθεῖσαι σπουδαίως. καὶ
δάφνη ὡς πῶτος καὶ ἀβρότονον καὶ
χαλβάην ἀντὶ σπληνὸς ἐπιρρίπτει-
ν, καὶ οἰκονομίας χλωρὰ αἰεθεῖ-
σαι. καὶ τῶν ὀρνίθων οἱ νεοσσὶ ἀνα-
πτύχοντες καὶ παρὰ χεῖμα πρὸς 20
στεινὰ ὁρμήσαντες τ' ἀγέρον μὲν
οἶνον πεφυεμένον καὶ ῥαφάνης φλοι-
ος ἰσχυρὸς κοπεῖς, ὡς τε λειότατος
χρῆσθαι, καὶ σκίλλα ὀπλή καὶ χα-
μαίμηλον λελεωμένα, καὶ ὡμη-
λύσις δὲ ὄξυμέλιτος ἐσκευασμέ- 25
νη· πρὸς τὴν τῆς ἀμύνης θερμότητος.
ταῦτα μὲν τοπικῶς ἐπιτίθειμε-
να. ὠφελεῖ δὲ τὸν ἐκ τοῦ δηκτοῦ
καὶ βάτος μετ' οἶνου. ἔγιοι δὲ ἄγ-
χουσαν τὴν λεπιδόφυλλον βοηθεῖν
ἀφ-

ἀφηρεῖται. πίνεται δὲ καὶ λαγῶν
ἢ πτύας ὅσον τριώβολον καὶ περὶ-
στον χύλισμα ὅσον κοτύλιον ἐν ἀ-
κράτῳ, καὶ μελιστεφύλλα τῶν φύλ-
λων ὁ χυλὸς, καὶ πύρανον ἄχρνον.

- 5 ταῦτα δὲ ἐν οἴνῳ δεῖ ποτίζειν. καὶ
αὐτὴ ἡ οἶνοποσία σιμωχῶς παρφα-
λαμδανομένη, σκόροδα τε ἐξαιό-
μυα καὶ κρόμμυα, καὶ περὶσσα
ἀπαλὰ καὶ τείχεος δεινύτα-
τος καὶ πολυτελέστατος. καὶ τὰ μὲν
10 ἀπλὰ ταῦτα καὶ αὐτὸ δὲ τὸ φάρ-
μακον ἐνδοκιμεῖται ἐπὶ τῶν * ὀ-
φιοδήκτων, ὅπως ὅτι σμύρνης, κα-
στορείου, πεπέρως, ἀνδράχνης ἀν-
δοῖς καὶ σπέρματος ὀξύδαφου τὸ
ἥμισυ· ταῦτα πάντα λέανει ἐν
15 γλυκεῖ κρητικῇ, ἢ ἐτέρῳ τινὶ τῶν
σπουδαίων. Εξασίγρατος δὲ ἐν
τῷ περὶ διωάμεων ἀνεγράφατο
καὶ ἄλλα τινὰ πλείονα βοηθεῖν δι-
νάμυα τοῖς ἐχθροῖς.

- Περὶ τῶν ὑπὸ ἀμφισβάν-
20 νης δεδιγμένων.
Κεφ. θ'.

- Περὶ ἀμφισβάνης τοπικῶς
ἐπεμνήσθημεν ὅτι πως ταῖς περὶ
ταῖς ἐχθρῶν ἀναγεγραμμέναις
βοηθείαις, πέφυκα βοηθεῖν οὐ
25 ἐξ αὐτῆς παληαίς.

Περὶ τῶν ὑπὸ δρυϊ-
νου δεδιγμένων.
Κεφ. ι'.

Τοῖς ἢ ὑπὸ δρυϊνῶν παληαῖσιν,
ἐν μὲν αἰσολογία σὺν οἴνῳ πι-
νομένη,

dunt. Leporini coaguli in vino
terni oboli bibuntur, & por-
racei fucci hemina in mero,
& foliorum apiastri succus, &
sylvestris ruta: hæc in vino po-
tari debent. Vinum frequenter
bibendum, alia mandenda, &
cepæ, & porri recentes, falsa-
menta acerrima, & opipara.
Simplicia hæc sunt. Percussis à
vipera præclare auxiliatur me-
dicamentum, quod myrrhæ,
piperis, castorij, floris portu-
lacæ feminisque, dimidio a-
cctabulo constat: hæc omnia
in Cretico passo teruntur, aut
in alio probato. Erasistratus in
eo libro qui περὶ διωάμεων, id
est de viribus, inscribitur, ple-
raque alia tradidit, quæ ictis
ab vipera auxilium ferre pos-
sunt.

Ab amphibæna icti.
Cap. IX.

De amphibæna mentio-
nem hoc loco fecimus, quo-
niam ferè remedijs ad vipe-
ras scriptis, percussi ab ea ad-
iuvantur soleant.

Percussi à dryino.
Cap. X.

A dryino ictis convenit a-
ristolochia cum vino pota, tri-
folium

DIOSCORIDIS

folium herba, radix hastulæ regiae similiter assumpta, & fructus ex omni quercus genere, & tulsæ ilicis radices, & illitæ parti ictæ auxiliantur.

Ab hæmorrhoo dipsadéque percussi.

Cap. XI.

Hæmorrhoi dipsadísq; mortui velut immedicabiles à ple-
risque maiorum deplorati relinquebátur : quare si peculiaribus contra dipsadem remediis egeamus, communia experiri operæpretium erit. Pro-
tinus autem scarificatione uti, vitionem facere, & si locus patiat, extremorum amputatione opus erit : consequenter quamacerrima cataplasmata admovere, de quibus sæpe numero diximus. Nec me fugit, acres cibos, maximè à falsamentis, vtilis esse. Meracæ potiones & lauacra profunt, quæ subinde interiecto brevi spatio assumēda sunt, priusquàm morbi genus emerferit, quo semel erumpente, opem ferre nō potest vlla medici opera. In ictu hæmorrhoi eadē profunt. Insuper quæ in cōmune opitulantur, ne scarificationes, vitiones, acres cibi, meraci potus, & quæ

νομένη, καὶ τείφυλλος πιάριζα ἡ
ἀσφοδέλε παραπλησίως λαμβά-
νομένη, καὶ δρυὸς πάσης ὁ καρπὸς
πινόμυρος καὶ τῆς τωρίνου αἰ ρίζα
κοπήθῃναι καὶ καταπλαστέμε-
ναι, τοπικῶς παρηγορεῦσιν.

Περί τ' ὑφ' αἰμόρρου καὶ δι-
ψάδος δεδιγμένων.

Κεφ. ια.

Αἰμόρρου δὲ καὶ διψάδος τοῖς
ἀλείστοις τ' ὑπερφυομένων ἀπηγο-
ρεύσῃς, ὡς ἀβούνηται αἰ δήξεις·
διὸ καὶ τ' κατ' ἰδιότητα πρὸς τὸ
θιεῖον τὴν διψάδα ὠφελούτων
ἀπορεῖς, δεῖ μὲν ἀποπνεῖσθαι τ'
κοινῶν βοηθημάτων. παραχρῆμα
ἢ τῶν καταχρασμῶν παραλαμβά-
νειν, τῶν τε καὶ σὺν ποιεῖν καὶ εἰ ὁ
τόπος ἐν γαστρὶ τὸν ἀκρωτηριασ-
μὸν· ἐφεξῆς δὲ ταῖς τ' δριμύτων κα-
ταπλασμάτων ἐπιθέσεις, ὥστε ὦν
εἰρηκαμένῃ πολλάκις. χρῆσιμὲν
οἶδα καὶ δριμυφαγίας μάστιγα. ταῖς
ἀπὸ τῶν ταχυκρῶν· ἀκρατοπο-
σία τε καὶ λουτρὸν ὠφελεῖ, ταῦτα
συνεχῶς ἐκ μικρῶν διασημάτων,
πλεονάκις καταληπτόν, τῶν κα-
τασκήνη τὸ τ' νοσημάτων εἶδος,
ἐκείνων ἢ ἀπ' ἐπιφανέντων, ὥδ'
ὅπου παρὰ τ' τῶν ἰατρῶν ἐπικε-
εἰας ὀφθῆς γίνεσθαι· ἐπὶ ἢ τῷ αἰμόρ-
ρῳ τὰ αὐτά, καὶ πρὸς τέτοις τὰ ἐν
τῷ κοινῷ τ' βοηθημάτων οἷον τὰς
κατασκαρμοὺς καὶ ταῖς καυσθεῖς καὶ
δριμυφαγίας καὶ ἀκρατοποσίας.
καὶ ὅσα

ἢ ὅσα ὠεῖζαυμ ἐπὶ διψάδου.
ἐπὶ δὲ καὶ ἀμπέλου φύλλα ἐφθα
σιὼ μέλιτι λελεωμένον.

Πεεὶ τῶν ὑφ' ὕδρου δη-
χθέντων. Κεφ. ιβ'.

Τοῖς ὑφ' ὕδρου δηχθεῖσιν ἀρ-
μόζει οἰζανὸς λεία θυραδεῖσα
ὑδατι, κορία τε ἐνεδεῖσα ἐλαίῳ
ἢ ἀεισολοχίας ὁ φλοιὸς, ἢ ῥίζα
δρυὸς λειοτελεῖσθαι καὶ κρίθινον
ἀψευρον σὺν ὕδατι μετὰ μέλι-
τος συντετακίς. ποτίζεται δὲ καὶ
ἀεισολοχίας δίδραχμον ἐν κρά-
ματι ὄξυκράτου κυάδων ἕξ. ἢ
περασίου χυλὸς, ἢ ἀφέψημα ὑπο-
τέρη σὺν οἴνῳ. περσφρατὸν τε κη-
εῖον περσφερόμενον μετ' ὄξους.

Πεεὶ τῶν ὑπὸ κενχρι-
δίου δηχθέντων.

Κεφ. ιγ'.

Τοῖς ὑπὸ κενχριδίου δηχθεῖ-
σι, θριδακίνης ὁ καρπὸς μετὰ λι-
νοσπέρμου κατὰ πλάτος ἑκα-
20 δεῖ καὶ δύμβερα, καὶ ἄρειον πύ-
ρανον, καὶ ἔρφυλλος σιὼ ἀσφο-
δέλου * < β'. καὶ σιὼ οἴνου κυά-
δου γ' ἢ ἀριστολοχίας ῥίζα. ὡσὺ-
τως καὶ καρδάμωνον, καὶ γλυτα-
νὴ παρὰ πλυσίως.

Πρὶ τῶν ὑπὸ κεράσου δη-
χθέντων. Κεφ. ιδ'.

Τοῖς δὲ ὑπὸ κεράσου δηχθεῖσι
καὶ ἀπιδός, σιωτόμως ὁ ἀκρωπ-
ριασμός ἐπαμυλὸς διότ' ἀνυτ-
θεῖτως ἀποκόπῃν δεῖ, ὅσων τὸ
δηχθεῖ

& quæ nunc in dipsade defini-
uimus. Quinetiam decocta vi-
tis folia, & cum melle trita.

Morsu à natrice.

Cap. XII.

Si morsum natrix adegit, pro-
dest origanum tritum & aqua
subactum, lixiuia cū oleo indi-
ta, aut aristolochiæ cortex, aut
querna radix minutim contri-
ta, & hordei farina cum aqua
& melle colliquata. Bibuntur
etiā binæ aristolochiæ drach-
mæ in potione poscæ cyathis
duobus, deinceps marrubij suc-
cus, vel decoctum alterius cū
vino. Fauus recens datur cum
aceto.

A cenchridio percussu.

Cap. XIII.

Morsu à cenchridio auxi-
liatur lactuca fructus cum li-
ni semine illitus, & satureia
trita, & sylvestris ruta, & fer-
pillum cum duabus hastulæ re-
giæ drachmis, & tribus vini
cyathis aut aristolochiæ radix,
Item cardamomum & gen-
tiana.

A cerasste percussu.

Cap. XIII.

Si cerasstes percusserit, cita
partis amputatio suffragatur:
quare sine mora ictā partē am-
putare, aut scalpro cōfestim cir-
cūcidere

DIOSCORIDIS

cuncidere, & iis similia profe-
qui oportet. Vrentia insuper
reliquiis admouenda : siqui-
dem virus hoc veneno basili-
sci simile est.

Mors ab aspide.

Cap. XV

Iis qui ab aspide feriuntur,
quæ de ceraste scripta sunt au-
xilia dari debent. Nam vene-
num hoc, quemadmodum ba-
sifisci, aut sanguinis bubulus,
celerrimè in arteriis sangui-
nem cogit.

A basifisco mors.

Cap. XVI.

Ad basifisci morsum, vt Era-
fistratus author est, auxiliatur
castorij drachma in vino po-
ta : item papaueris succus.

Ictuum remedia ita
se habent.

δηχθέν μέρος, ἢ ἀσπίδα κίττει τὰ
μέρη παραχρῆμα καὶ τὰ τούτοις
παραπλήσια. εἴτα δὲ τὰ ὑπολῆ-
πτόμματα τοῖς καυσθεῖσις ἐπακτέ-
ον· καὶ γὰρ καὶ τούτοις ὁ ἰὸς οἷος ὁ τῷ
βασιλίσκου.

Περὶ τῶν ὑπὸ ἀσπίδος

δηχθέντων. Κεφ. ιε.

Τοῖς δ' ὑπὸ ἀσπίδος δηχθεῖσιν,
ὅσα καὶ τοῖς ὑπὸ κεράσου ὡς περὶ-
γέγραπται προσενεχθῆναι βοηθήμα-
τα. ὃν τρόπον γὰρ βοὸς αἷμα δύν-
τατα πήγνυται τὸ ἐν τῇ ἀρτηρίᾳ
αἷμα καὶ πήγνυται περὶ τούτων ὁ
ἰὸς, ὡς περὶ καὶ ὁ τῷ βασιλίσκου.

Περὶ τῶν ὑπὸ βασιλίσκου

δηχθέντων. Κεφ. ις.

Τοῖς δ' ὑπὸ βασιλίσκου δηχθεῖ-
σιν, ὡς Εὐρασίερατος φησὶ βοηθεῖ
καστορίου ἄ. πνομήν σιν οἴ-
νω· ὡσαύτως δὲ καὶ ὁ τῷ μήκωνος
ὁπός· τοιοῦτος μὲν καὶ ὁ θηρια-
κὸς τρόπος.

LIBRI OCTA-
VI FI-
NIS.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙ-
ΒΛΙΟΥ ΟΓ-
ΔΟΥ.

INTER DIOSCORIDIS VERBA
hæc falso adscripta in quibusdam
codicibus erant.

Folio 4.a. Versu 2. με-

τὰ τὸ, Iris.

οἱ δὲ ἱρίς ἰλλυρικὴ, οἱ δὲ θελπί-
δη, οἱ δὲ οὐρανία, οἱ δὲ θαυμάριον, οἱ
δὲ θαύμασος, ῥωμαῖοι ῥάδιξ μά-
ριον, οἱ δὲ γλαδιόλα, οἱ δὲ ὀφρ-
τρέιτος, οἱ δὲ κοινακράτειξ, αἰγύ-
πτιοι γάρ.

4.b. 28. Ακορον,

οἱ δὲ χορός ἀφροδίσιας, ῥωμαῖοι
βενέρεα, οἱ δὲ ναυπηγὰ ῥάδιξ, γάλ-
λοι πεπερίκιον.

6.b. 6. χαλοῦσι,

ῥωμαῖοι ἰουίκι ῥάδιξ, οἱ δὲ
ἰουῖκον.

8.a. 11. χαλοῦσι,

μαγιστήριον αἷμα ἀρεως, ὀδύ-
νης θέσαν, αἰγύπτιοι καρέερα, ῥω-
μαῖοι πειτερεσάμ, οἱ δὲ βάκ-
χαρ, δοῦσκοι σύγκινον, οἱ δὲ,
νάρεδον ῥούσικον, γάλλοι βάκ-
χαρ.

8.a. 18. ῥίζαι.

ῥοικῆαι τῇ ὀσμῇ κινναμόμω·
φιλεῖ τραχέα χαιρία καὶ ἄνικ-
μα. τὰ τῆς ἡ ῥίζα, βοηδεῖ ῥήγ-
μασι, σπασμασι, βηχὶ χρονίῳ,
δυσσπορίᾳ, δυσσυνείᾳ· ἀγχι καὶ
ἔμμελιν· καὶ θηριοθήκτοισι χη-
σιμος σὺν οἴνῳ πινομένη. Τὰ δὲ

φύλλα

post verbum, Iris,

ab aliquibus iris Illirica, ab al-
liis thelpide, ab aliis vrania, à
nonnullis cathæro, aut thauma-
stos, à Romanis marica radix, à
quibusdam gladiola, ab aliis o-
pertritos, ab aliis consecratrix,
ab Ægyptiis nar appellatur.

Acorum.

aliqui choró aphrodisias, Ro-
mani veneréa, aut radicé nau-
ticá, Galli piperacium vocant.
appellant.

Romani iunci radicem, aut
iuncum.

appellant,

Magi sanguinem Martis, O-
sthenes thesan, Ægyptij cere-
ra, Latini perpensam, alij cac-
char, thethrusci succinum, alij
nardum rusticum, Galli bac-
car.

radices,

quibus odor inest cinnamo-
mo proximus: asperú ficcúm-
que solum amat. Eius radix, ru-
ptis, cōuulsis, in tussi vetere, &
spirandi difficultate, & si vrina
ægrè redditur, opifera est: men-
ses ciet: contra serpentiū ictus,
eā in vino bibere salutare est.

Y Folia

DIOSCORIDIS

Folia, vt quæ adstringant, illita capitis doloribus, oculorum inflammationibus, incipientibus ægylopiis, mammis tumētibus à partu, ignibus sacris auxilian-
tur. Odor somnum gignit. Cra-
teus herbarius de eo ita scri-
ptum reliquit. Afarum,

Aspalathus.

Alij sphagnon, alij phasganō,
Syri diaxylon.

Crocum,

ab aliquibus castor, ab aliis
cynomorphos à magis sanguis
Herculis appellatur.

Helenium,

Symphyton aliqui vocant,
alij persicam, alij medicam, alij
orestiū, alij nectarion, alij cleo-
niam, alij Idæā baton, aut phlo-
mum Idæā, Latini terminaliū,
aut enulam campanam, Ægy-
ptij lenen.

minor.

Iuniperum paruum Græci
arceuthida, aliqui mnesitheū,
alij acalidem, Aphri zuorinfi-
pet, Ægyptij libium Romani
iuniperum, Galli iupicellum
vocant.

subueniunt.

Folia habēt vtraq; iuniperus
acria, ideóq; illita potaq; & ea,
& earum succus cum vino vi-
perarum morfibz succurrūt.

Cor-

φύλλα συπλήκτ' ὄντα, κατὰ πλεον-
σώμῳ, ὠφελεῖ κεφαλᾷ, ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς, καὶ αἰγίλα-
πας ἀρχομένοισι, καὶ μαστοῖς ἐκ τέ-
κων φλεγμαίνοντα, καὶ ἐρσιπέλα-
τα. ἔστι δὲ καὶ ὑπονοποῖς ἡ κόμη.
καὶ Κρατέως ὁ ῥιζοτομικὸς εἰς
τὸ αὐτό. Ασπερον.

14.b. 9. ἀσπλάθος,

οἱ δὲ σφάγγον, οἱ δὲ σάσγαγον,
σύρι δὲ διαξύλον καλοῦσι,

16.a. 16. Κροκός,

οἱ δὲ κάστωρ, οἱ δὲ κυνόμορφος,
περὶ αἵμα ἡρακλέους,

17.a. 17. Ελένιον.

οἱ δὲ σύμφυτον, οἱ δὲ περ-
σικῶν, οἱ δὲ μηδικῶν, οἱ δὲ ὀ-
ρέσειον, οἱ δὲ νεκτάρειον, οἱ δὲ
κλεωνίαν, οἱ δὲ βατόν ἰδαίαν,
οἱ δὲ φλόμον ἰδαῶν καλοῦσι, οἱ
δὲ ὑβούλα κατὰ πᾶσα, αἰγύπτιοι
λένιν.

43.a 35. μεγάλην.

ἀρκευθίδος μικρά, οἱ δὲ ἀρ-
κευθίδας, οἱ δὲ μνησίθεος, οἱ δὲ
ἀκαταλίδας, ἀφροῖ ζουοεινσί-
πετ, αἰγύπτιοι λιβίουμ. ῥωμαῖοι
ἰουπικέλλουμ, γάλλοι ἰουπικέλλ-
ουσον.

43.b. 15. ἀρμόζει.

φύλλα δὲ ἔχει δειμένα. διὸ
καὶ κατὰ πλεονσώμῳ καὶ πινόμε-
να καὶ αὐτὰ καὶ ὁ χυλὸς αὐτῶν
μέτ' αἵνου, ποιεῖ πρὸς ἐχιδνικήν.
οἱ δὲ

ὁ δὲ φλοιὸς καυθεὶς καὶ μετὰ ὕ-
δατος κατὰ χεῖδας, λέπρας ἀ-
φίσησι. τὸ δὲ ῥίνημα τῷ ξύλου κα-
ταπύδεν, ἀναιρεῖ.

Περὶ Ἀρκευθίδος με-
γάλης. Κεφ.

ἀρκευθὶς μεγάλη, οἱ δὲ, κυ-
πάειστος ἀγρία, οἱ δὲ, μνησίδεος,
οἱ δὲ ἀκατέρα, ῥωμαῖοι ἰουλίπε-
ρυν, ἔσι ἢ αὐτὴ γνάμμος τοῖς
πλείστοις, ἐμφερὲς κυπαρίσσω,
γλυτωμένη ἐν τραχέσι ἢ παραδα-
λαστόις τόποις ὡς ἐπιτοπλεῖσιν.
Δυνάμει δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τῇ
περιερμηδῇ.

43.b. 17. βαρῶντον.

οἱ δὲ βάρυτον, οἱ δὲ βάρων, ῥω-
μαῖοι ἔρβα σαβίνα.

48.a. 4. Ράμνος,

οἱ δὲ περσεφόνιον, οἱ δὲ λευ-
κάκανθα, ῥωμαῖοι σπῖνα ἑλβα,
οἱ δὲ σπῖνα κεράλις, ἀφροὶ ἀ-
ταδίγ.

48.a. 25. Ἀλίμος.

οἱ δὲ δαμασώνιον, οἱ δὲ ἔρυ-
μον, οἱ δὲ βρεττανικὴ, οἱ δὲ ῥα-
βδῖον, οἱ δὲ βασίλειον, περιφῆται
ἔρμου βάσις, ὁμοίως σαφίς, οἱ
δὲ ὀσίειδος διάδημα, οἱ δὲ ἡ-
λυστέφανος, οἱ δὲ ἱερὸς καυλός,
Πυθαγόρας ἀνθώρορος, αἰγύ-
πτιοι ἀσσηπτεῖ, οἱ δὲ ἀσφη, οἱ
δὲ ἀσταλουεῖ, οἱ δὲ ἀσαισὴν,
ῥωμαῖοι ἀλβούκιον, οἱ δὲ ἀμ-
πελούκιον.

Cortex præterea crematus, &
ex aqua inunctus, lepras pel-
lit. cauenda tamen ligni ramé-
ta. hausta enim letalia sunt.

Iuniperus ma-
gna. Cap.

Iuniperus magna, quam a-
liqui sylvestrem cupressum ap-
pellant, alij mnesitheim, alij a-
cateram, Romani iuniperum,
vulgò cognita est, cupresso
afsimilis: asperis maritimis-
que locis plerunque nascitur,
easdem quas supradicta vires
habens.

Sabina

aliis baryton, aliis baron, La-
tinis herba Sabina appellatur.

Rhamnus,

Sunt qui persephonion, qui
leucacantham. Latini spinam
albam, alij spinam cerualem,
Aphri atadim.

Halimus.

alij damasonium vocant, a-
lii erymon, alii britanicam, a-
lii rhabdion, alii basilion, ma-
gi Mercurii basin aut osiridis
diadema, alii elystephanon,
aut sacrum caulem, Pythago-
ras anthenoros, Egyptii ason-
tiri, alii asphen, alii ascaluri,
alii asariphen. Latini
albucium aut am-
peluciam.

Rosa

Latini rosa.

Lygos.

aliqui agynon, alii lygon vocant, alii amictomiænon, alii tridactylon, magi semnon, alii hæmaideos. Ægyptii fum, Romani salicem marinam, alii piper agreste, alii lecrificum.

stomachi.

Eorum venter sale conditus, & in vmbra siccatus, cōtra eximias vacuationes medicamentorū, trium drachmarū pōdere, præsentī est auxilio: quādoquidē protinus deiectiones cohibet. Teri autem debet in farinam, & aqua subactus dari.

Milium.

Latinis milium.

panicum

Latinis panicum.

Lolium

Latinis lolium.

Foenigræci

alii carpon, alii buceron, alii ægoceron, alii ceraitidē, Latini foenumgræcum appellant, Ægyptii itafin.

Linum.

Aliqui linocalamum vocant, alii annon, alii linon agrion, Romani linum, Poeni zera-phoës.

lens

51. a. 22. Ρόσος,

ῥωμαῖοι ῥόσα.

54. a. 17. λύγος,

οἱ δὲ ἄγμων, οἱ δὲ λύγον, οἱ δὲ ἀμικτομίανον, οἱ δὲ τειδύκτυλον, περὶ φηται σερμὸν, οἱ δὲ αἶμα ἰδεως. αἰγύπτιοι σούν, ῥωμαῖοι σελίξ μαεῖνα, οἱ δὲ πῖψ ἀγρέσει, οἱ δὲ λεκρίσικουμ.

78. b. 17. σωμαχοῖς.

οἱ δὲ κοιλία τούτων τειχεύ. δεῖται καὶ ξηραν δεῖται ἐν σιγῇ, ἐπὶ ταῖς ὑπερκαθάρσεσι ταῖς ἀπὸ φαρμάκων κενωτικῶν, ὅσων γ' λαμβανόμεν, βοήθημά ἐστιν αἰετον. ἴσῃσι γὰρ παρεχῆμα τὴν κένωσιν. δεῖ δὲ τείμμα ποιεῖν καὶ ἐνοῦμετὰ ὕδατος καὶ διδόναι.

101. a. 7. Κέγχρος,

ῥωμαῖοι μυλίκμ.

101. a. 15. ἔλυμος

ῥωμαῖοι πανικούμ.

101. b. 4. Αἶσα,

ῥωμαῖοι λόλιουμ.

102. a. 21. Τήλις.

οἱ δὲ τήλεως καρπός, οἱ δὲ βούκαρος, οἱ δὲ αἰγόκαρος, οἱ δὲ κερατίς, οἱ δὲ λωτὸν, ῥωμαῖοι φαίνουμ, ραΐκουμ, αἰγύπτιοι ἰτασιν.

102. b. 10. Λίνον.

οἱ δὲ λενοκαλαμὸς, οἱ δὲ ἀννον, οἱ δὲ λίνον ἀγρίον, ῥωμαῖοι λινουμμερύμ, οἱ δὲ λίνυμ ἀγρέσειμ, ἀφροῖ ζεραφοῖς.

104. b.

104.b. II. φαῖος,
ῥωμαῖοι λέντεμ, οἱ δὲ λεντί-
κουλαμ.

105.b. 2. Ορεβος,
ῥωμαῖοι ὄρεβουμ.

108.a. 8. ἡμερος,
ῥωμαῖοι λούπνουμ, αἰγύπτιοι
βερχού.

106.b. 9. ἀγριος,
ὃν ῥωμαῖοι λούπνουμ ἀγρίεσμε
αελοῦσθ.

106.b. 13. Γογγύλης.
οἱ δὲ γογγυλίδα, οἱ δὲ γολγ-
στον, ῥωμαῖοι ράπα.

107.b. 23. Ραφανίς,
οἱ δὲ πολυειδὲς ἡρυγίου, ῥω-
μαῖοι ράδιξ νοστράς, ἀφροῖ δόρ-
παθ.

ἐν τῷ ἄλλῳ.

οἱ δὲ ράφανον ὀρενίλῳ, οἱ δὲ
ἀπιον, οἱ δὲ ἰσχάδα, οἱ δὲ χαμα-
βάλανον ἀγρίαν, οἱ δὲ λινόζω-
σθιν, ῥωμαῖοι ράδιξ σπυέσθρις, ἀ-
φροῖ δόρφαδοσάδι, κλωνία δύο
ἢ πεία χρονώδη ἔχει, λεπτά, ἐρυ-
θρά • φύλλα πηγνύω ἀγρίῳ εἰ-
κότα, ὀπισηκέστερα μὲν τοι καὶ
σενώτερα • καρπὸς μικρὸς • ῥί-
ζα σπονδύλω παρὰ πηλυσία, σπογ-
γυλοτέρα, καὶ πρὸς τὸ τῆ ἀπίου
ῥήμα μεσθὸν ποῦ, φλοιδὸν ἔχουσα
λευκόν • ταύτης τὸ μὲν αἰώθεν
μέγας τῆς ῥίζης ληφθέν, δι' ἐ-
μέπων ἀγρί χολιδ καὶ φλέγ-
μα • τὰ δὲ πρὸς τῇ ῥίζῃ χέ-

τῷ

lens

Latini lentem, aut lenticulā
vocat.

Eruum

Latini eruum vocant

lupinus,

Romani lupinum, Ægyptii
brechon vocant.

lupini,

quem Latini lupinum agre-
stem appellant,

Rapum

alii gongylida, alii golgosiū.

Romani rapum vocant.

Radix,

quidam polyides eryngium,
Latini radicem nostratem, A-
phri thorphath appellant.

In alio codice.

Quidam raphanon monta-
nam, alii apion, alii ischadem,
nonnulli chamæbalanon agre-
stem, quidam linozostin, La-
tini radicem syluestrem, Aphri
torphathfadi, ramulos tennes,
iunceos, duos siue tres spar-
git, rubentes: foliis rutæ syl-
uestris, oblongioribus, & an-
gustioribus: semine paruo: ra-
dice albuci, rotundiore, tur-
binatiore, pyri figura, can-
dido cortice. Ea lacteo suc-
co madet. Pars radicis supe-
rior vomitione bilis pituitam-
que extrahit, inferior per aliu

Y iii tota

DIOSCORIDIS

tota fusq; deque purgationes mouet. Quod si tibi in animo est succum extrahere, radix tufa in fictili mergitur, & qui supernatat succus prima eximitur. Is sesquiobolo potus, vtraque parte purgat.

rhapani

quam Latini armoracium vocant.

Lampfana.

Latini napiū, Ægyptii euthma vocant.

Blitum

Ægyptii echlotoripam appellant, alii riplam, Romani blitum, Daci bles.

M A L V A,

hortensis, Latini maluā hortensem, Pythagoras anthemata vocauit, Zorastres diadema, Ægyptii chocortē, magi lienem caprae, aut muris vrinam.

vocat

Latini atriplicem, Ægyptii ochi vocant.

Satiua,

alii cramben cepeam, Latini brassica.

brassica,

Latini brassicam rusticam vocant.

Beta,

magna, Latini betam filuaticam

τω καθαίρει, ὅλη δὲ ληφθεῖσα, ἀμφοτέρως τὰς καθαύσεις κινεῖ· ὁπίσσω δὲ βουλιδεῖς, κόψας τὰς ῥίζας καὶ λαβὼν εἰς κρητῆρα ὕδατος, τάρατῃ καὶ τὸν ἐφισάμηνον ὅπην, περὶ ἀνελὼν ἔξανε. τοῦτε τεῖα ἡμῶ βόλια πιδέντα αἴω καὶ καθαίρει.

107.b. 22. ἀγρία,

ῥωμαῖοι ἀρμωράκιον καλοῦσι,

108.b. 18. Λαμψαίη,

ῥωμαῖοι νάπουμ, αἰγύπτιοι εὐθμοί.

108.b. 23. βελήτιον,

αἰγύπτιοι ἐχλωτοειπὼν, οἱ δὲ ῥιπλάμ, ῥωμαῖοι βελίτουμ, δακοὶ βλήης.

108.b 27. Μαλάχη,

κηπευτὴ, ῥωμαῖοι μάλα ὀρένσις, Πυθαγόρας αἰθέμα, ζωροάσης διάδεσμα, αἰγύπτιοι χωκορτύλ, περὶ ἡται αἰρὸς σπλῶ, οἱ δὲ οὐρα μῶς.

109.α. 24. νογ.

ῥωμαῖοι ἀτείπλικα, αἰγύπτιοι ὦχεῖ.

109.α. 34. ἡμέρες,

οἱ δὲ κράμβη κηπέα, ῥωμαῖοι βράσιχα.

110.α. ἀγρία,

ῥωμαῖοι βράσιχα ῥούσιχα.

110.b. 7. Τεύτλον,

μέγα, ῥωμαῖοι βέτα σιλβανική.

πικρ.

III. a. 23. ἀγρία,

κερωδὴν αἰίζων ἀγριον, οἱ δὲ
πλήθειον, ῥωμαῖοι ἐλλέκεραμ,
οἱ δὲ πορτουλάναμ, ἀφρὶ μωί-
μοιμ, δακοὶ λάξ, αἰγύπτιοι μο-
χυσήμ.

III. b. 3. χαλιδά;

οἱ δὲ μύον χαλοῦσι.

III. a. 2. Ἀρνόγλωσσον,

οἱ δὲ ἄρνειον, οἱ δὲ περβά-
τηον, οἱ δὲ κυνόγλωσσον, οἱ δὲ
ἐπτάπλευρον, οἱ δὲ πολυγύ-
ρον, περὶ ᾧ τιμα εὐρεχνύμονος,
αἰγύπτιοι ἀσόνθ, ῥωμαῖοι πλαν-
τάγω μίνωρ, παρθηλοδάδον,
ἰσπανοὶ θήσαιρεκμ, ἀφρὶ α-
πειρεχόν.

III. b. 35. Διαφο-

ρεῦσον.

Οἱ δὲ σύροι τὸν τούτου ζώ-
μων καὶ τῆς χαλαμίνης σὺν μέ-
λιτι. φασὶ τὸν πυρέτου διερα-
πύειν διδόμενον δευτέρῃ τε-
τάρτῃ καὶ παρὰ σκευῇ. τούτο ὡς
μυστήριον τι δέχου. ἔστι γὰρ ἀληθέ-
στατον καὶ διὰ πέρας.

III. a. 2. ὕδασιν.

οἱ δὲ ἀναγαλλίς ἐνυδριος, οἱ δὲ
ἄνθος ἀρωματικῇ, οἱ δὲ δάρλυ-
ιον, οἱ δὲ λαουβέρδε.

III. a. 18. ἀγριον,

οἱ δὲ ἀφροδίτης σέφανον,
ῥωμαῖοι εὐσεράλις, οἱ δὲ ἔρβα
βειρέρα.

III. b.

ticam vocant.

fyluestris

quam aliqui aizoön fylue-
stre vocant, alij telephium, La-
tini illecebram, aliqui portula-
cam, Aphri moëmœem, Daci
Iax, Ægyptij mochmutim.

ragus,

nonnulli myon vocant.

plantago.

alij arnion vocant, alii pro-
bation, alii cynoglosson, alii
heptapleuron, alii polyneu-
ron, Magi eurechnemona, Æ-
gyptii asonth, Romani plant-
taginem Hispani thesaricam.
Poeni atircon.

vtantur.

Syrius plantaginis, & cala-
minthe, cum melle produnt iis
mederi, quos vires defecerunt,
datum die secunda, & quarta,
& parascœue, id est, Veneris
die. Hoc autem velut arcanum
accipito, quod veraci experiē-
tia compertum est.

aquis.

aliqui aquatilem anagallida,
alii schinon aromaticā, alii da-
ren ion, alii lauerde.

fylæstre

alii Veneris coronam, Latini
eusteralem aut herbam ve-
neream.

Y iiiii Core-

DIOSCORIDIS

coronocopus

Aliquibus ammonos, aliis astrion, poenis atirsite, Romanis catiatrix, aliis stilago, aliis sanguinaria dicitur.

Sonchus

Sonchon asperum aliqui cichoriū vocant. Romani cicerbitam asperam, Aphri gathuonem. Eius autem

Seris

Alii pierida appellāt, Ægyptii agon, Romani intubū agrestē.

fatiax

Latini lactucam, Ægyptii embrosi vocant.

Lactuca

Magi sanguinem Titani, Zoroastres pherumbrū, Romani lactucam syluestrem appellāt.

lepidion

Romani bifacutum, Ægyptii dorisatrum, Syri adorium, Aphri tirieta appellant.

Scandyx,

Romani herbam scanariam, aut aculam nominant.

daucum

Alii caucum, Alii myitin, Democritus brion, Romani pedem gallinaceum, aut pedē pulli, Ægyptii feselin vocant.

Eruca.

Romani Erucam vocant, Ægyptii ethrerice, Poeni asuric.

Oro-

115. b. 35. κορωνόπις,

οἱ δὲ ἄμμογος, οἱ δὲ ἄστριον, ἀφροὶ ἀπρσίπην, ῥωμαῖοι κακίαι-
πεικεῖν, οἱ δὲ σιλάζω, οἱ δὲ σαγ-
γνάειαν.

114. a. 8. Σύνχκου.

Τραχὺς, οἱ δὲ κικώειον, ῥω-
μαῖοι κουκούρετα ἄσπερα, ἀφροὶ
γαθούνην. τούτου δὲ

114. a. 32. Σίεις.

οἱ δὲ πικρίδα, αἰγύπτιοι ἄγον,
ῥωμαῖοι ἰνπέρην ἀγρέτεν.

116. a. 5. ἡμερος,

ῥωμαῖοι λακτούχα, αἰγύπτιοι
ἐμβροσί.

116. a. 23. Δρίδαξ

ὡς περὶ φῆται αἷμα πταίνε, ὡς
εὐάστρις φέρμεβρος, ῥωμαῖοι λα-
κτούχα, σιλβέρσις χαλούση,

116. b. 14. κερπίδιον

ῥωμαῖοι βισακούτουμ, αἰγύ-
πτιοι δορυσατρού, σῦροι ἀδουεῖον,
ἀφροὶ πεικτά.

116. b. 26. Σκαίνδυξ.

ῥωμαῖοι ἐρβα σκανάειαν, οἱ δὲ
ἀκουκλάμ.

116. b. 32. ἄστριον,

οἱ δὲ καῦκον, οἱ δὲ κωῖπς, δη-
μόκριτος βεῖον, ῥωμαῖοι πέδεμ
γαλινάκειον, οἱ δὲ πέδεμ πούλ-
λι, αἰγύπτιοι σέστελις,

117. a. 7. Εὐζώμον,

ῥωμαῖοι δὲ ἐρυνχαμ, αἰγύπτιοι
ἐθρεκινῶ, ἀφροὶ ἀσυνείκ.

117. b.

117.b.16. Ορεβάκη.

οἱ δὲ κυνομόριον, οἱ δὲ λέον-
τα, κύωνιοι δὲ θυρσίλω καλού-
σιν, ὃ κοινῶς λύκος ὀνομάζε-
ται.

118.b.33. κεφάλωτὸν,
ῥωμαῖοι πόρρου.

119.b.9. Κρόμυον,
οἱ ὃ πολυειδὸς, ποροφῆη καλα-
βωτῆς, ῥωμαῖοι κέπαμ.

121.a.15. Σκόροδον,
οἱ δὲ γίβοσκον, οἱ δὲ ἐλαφόβο-
σκον, ῥωμαῖοι ἀλλιον.

120.b.31.νάπυ.
ῥωμαῖοι σινάπε.

121.b.4. Καρδάμον.
οἱ δὲ κυνοκάρδαμον, οἱ δὲ Ἴβη-
ρις, οἱ δὲ καρδαμινάκη, αἰγύ-
πτιοι σέμει, ῥωμαῖοι γαστέριον.

121.b.29. Θλάσπι,
οἱ δὲ θλασπίδιον, οἱ δὲ σίνηπι
πέρσικον, οἱ δὲ σίνηπι ἄγιον, οἱ ὃ
μυτίτω, οἱ δὲ μυόπτερον, οἱ δὲ
δασμοφῶν, οἱ δὲ βίβρον, αἰγύπτιοι
συνιτέμψον, ῥωμαῖοι σκανδελά-
κην, οἱ δὲ κάψελλα, οἱ δὲ πέδεμ
γαλλινάκειον.

122.a.31. EPTΣIMON,
οἱ δὲ χαμαίπλιον, ποροφῆται
ἡρακλῆς ἀλφίτα, αἰγύπτιοι ἐρυ-
θμοῦ, ῥωμαῖοι ἐρίονεμ.

124.b.4. Σβέδιον,
οἱ δὲ κέρδον, οἱ δὲ κάρδαρος, οἱ ὃ
ερυθοκάμηκος, οἱ ὃ χαμαίρρυτον
ποροφῆται

Orobanche.

Alij cynomorion appellant,
à similitudine canini genitalis,
alij leonem, Cyprij thyrsinen,
communiiter lycon.

Porrum,
Latinis porrum.

Cepa
Crómyō aliq polyidos vocāt,
magi calabotim, Romani cepā
Allium.

Alij goboseon, alij elaphof-
boscon, Latini allium vocant:
Vocant.

Latini sinapi.

Nasturtium.
Aliis cynocardamō, aliis ibe-
ris, aliis cardaminaca, ægyptiis
semeth, Romanis nasturtiū di-
cūt. Thlaspi,

Aliqui thlaspidion, alij sinapi
persicū, alij myiten, alij sylue-
stre sinapi, alij dasmophon, alij
myopterō, alij bitrō, Ægyptij
fuitempsum, Romani scādula-
tium, alij capsellam, aut pedem
gallinaceum vocant.

Erysimon,
Aliqui chameplió, Magi Her-
culis alphita, Ægyptij erythi-
mon, Latini irionem vocant.

Struthium,
Ab aliquibus cordō ab aliis
cathiaris, ab aliis struthocame-
lus, à quibusdam chamerriton,
à magis

DIOSCORIDIS

à magis callirrhyton, ab Ægyptiis œno, à Poenis syris, à Latinis lanaria herba aut radícula appellatur.

Ciclaminus.

A quibusdā cissanthemō, ab aliis cisso phylō, ab aliis chelonion, ab aliis ichthyotherō, ab aliis silene, à Zoroastre triūphalites, ab Osthane aspho, à magis miaspho, Ægyptiis thesce, à Romanis rapū terræ, aut terræ vmbilicus, ab aliis arcar vocat.

Purgat.

Dracunculus.

Draguntium magnum aliqui aron, alii ifaron, alii iaron, alii hieracium, alii hiaron, alii armiagrion, alii ciperida vocant: in vmbrosis sepibus gignitur. Caulem habet rectum, læuem, duūm cubitorum, baculi crassitudine, versicoloribus draconum maculis, purpurei tamen euincentibus: folia rumicis, inflexa: fructum summo caule facit, racemosum coloris primum cineracei, mox per maturitatem in crocum, & purpuram vergentis: radicem prægrandem, rotundam, candidam, cortice tenui vestitam. Colligitur, & dum maturefcit, succus exprimitur, siccatúrque in vmbra.

Radix

περὶ τῆς χαλίρυτον, ῥωμαῖοι ῥαδιξ ἀνάειρα, οἱ δὲ ἐρβαλάειρα, αἰγύπτιοι οἰνώ. ἀφοῖ σινεῖς.

124. b. 27. κυκλάμινος.

οἱ δὲ κυκλάνθημον, οἱ δὲ κυκλόνιον, οἱ δὲ χελώνιον, οἱ δὲ ἰχθυόθηρον, οἱ δὲ χυλῖνη, οἱ δὲ ζωράστρις ἢ τεμφαλίτης, ὁδοῦνης ἀσφὼ, περὶ τῆς μασφῶ, αἰγύπτιοι θέσκε, ῥωμαῖοι ῥάπουμ τέρραι, οἱ δὲ οὐμβιλίκουμ τέρραι, οἱ δὲ ἀρχάρι.

126. a. 5. ποδείσα.

Πρὶ δρακοντίας μεγάλης.

Δρακοντία μεγάλη, οἱ δὲ ἄρον, οἱ δὲ ἰσάρον, οἱ δὲ ἰάρων, οἱ δὲ ἱράκιος, οἱ δὲ βίαρων, οἱ δὲ ἀρμάριον, οἱ δὲ κύπεις, ῥωμαῖοι λευκίμ, οἱ δὲ μαυριαριάμ, οἱ δὲ σιγγιάλιος φύνη ἐν συσκίοις παειφραμίς. χαυλὸν δὲ ἔχει λεῖον, ὅρδον ὡς διπρυχάον καὶ παχυὸν ὡς βακτηρίαν, ποικίλον καὶ χροῖον ὡς εἰκέναι δράκοντι, καὶ πλεονάζει μὲν ἐν τοῖς διαπορφύροις σπύλοις φύλλα δὲ ὡς καπαδοκίαν ἀντιμετακόμενα καρπὸν δὲ ποιεῖ ἐπ' ἄκρῃ τῇ χαυλῇ βόρυθος, ἀποδοῖ δὲ τῷ χρώματι τὸ πρῶτον, ἐν δὲ τῷ πεπαισθῆναι χροίζοντα καὶ φοινικῆν. ῥίξαν ἐν μεγέθει σποδύλην, λευκὴν, φλοῖον ἔχει λεπτὸν. συκλέγει δὲ καὶ χυλίζει ὁπταν πρῶτον, καὶ ξηραίνετο ἐν σκιάῃ ἢ δὲ

ἡ δὲ ρίζα ὀρύσσεται πυραμειτῶ,
 καὶ παλυθεῖσα κατατέμνεται, καὶ
 ἐνείρεται μὴ μόνον, ξηραίνεται ὅ
 ἐν σκιά. Σερμαντικὴ δὲ ὅτι μὲν
 συλκράματος· ποιεῖ δὲ ὅπῃ τε καὶ
 ἐφ' ἣν μὲν μέλιτος ἐκλειχρύνῃ,
 πρὸς ὀρθοποϊκὰς, ῥήματα, πα-
 ρματα, βήχας, κατὰ ῥέου· πεθεῖ
 σα δὲ μετὰ οἴνω, ταῖς ὅπῃ συνε-
 σίαν ὁρμὰς κινεῖ· καὶ αἰρεῖ δὲ σὺν
 μέλιτι λεανθεῖσα ἢ ὀππλωθεῖ-
 σα τὰ κεκοῖνη τῶν ἐλκῶν, καὶ φα-
 γδαυγίᾳ· καὶ μετὰ λευκῆς ἀμ-
 πέλου μάστιχα· καὶ κολλύρια δὲ
 ἐξ αὐτῆς σὺν μέλιτι, πρὸς σύ-
 ριγγας ἀναπλάπτεται καὶ ἐμ-
 βρύων κομιδῶν· ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς
 ἀλγὺς σὺν μέλιτι καταχρυσθεῖ-
 σα. πολὺ ποδὰς δὲ, καὶ καρκινώ-
 ματα διαπαντὶ. ποιεῖ δὲ ὁ χυλὸς
 αὐτῆς καὶ εἰς ὀφθαλμικά, πρὸς
 νεφελία, λευκώματα, ἀχλὺν ἢ
 δ' ὁσμὴν τῆς ρίζης καὶ τῆς πύας ὅ
 ἅπ' ὅσων συμφλημμένων, φθόειόν ἐστ.
 καὶ τὸ καρπὸν ἢ κόκκοι ποδέν-
 τες μετ' ὀξύκρατου. ἐνίοι δὲ τῷ
 χυλῷ τῷ τούτου, καὶ τὸν ὠταλ-
 γουῦντας ἐνεχυμάτισαν μετὰ ἐ-
 λαίᾳ. τὰ φύλλα δὲ ὡς σύφοντα
 τοῖς νεοτέρωις. ὑπόθεσαν ἐν ἡ-
 μίᾳ δὲ ἐν οἴνῳ καὶ τοῖς χύμα-
 τλα ἐχρυσ. φασὶ δὲ καὶ τὸν δια-
 τρέψαντας αὐτὰ ταῖς χερσὶν ἢ ὅ
 ρίζαν ἀναερῶντας, ὑπὸ ἔχρας
 μὴ δύνανται.

Radix quoque mēsisibus effo-
 ditur, elotāque particulatim
 conciditur, & funiculo trans-
 fixa siccatur in vmbra. Cum
 diluta potione, crudam, co-
 ctāve, cum melle delingi pro-
 dest, contra orthopnoceas, ru-
 pta, conuulsa, tussim, & destil-
 lationes: poto cum vino ve-
 nerem stimulat: vlcera quæ ca-
 coëthe vocantur atque pha-
 gedanica, expurgat, præser-
 tim cum vitæ alba: ex ea &
 melle collyria ad fistulas, &
 partus euocādos componun-
 tur: ad vitilignes cum melle,
 efficaciter illinitur: polypos
 & carcinomata absumit. Suc-
 cus ad oculorum medicamen-
 ta, item contra nubeculas, ca-
 liginem, albuginésque effe-
 ctum præbet: herbæ radicis-
 que odor, teneros conceptus
 abortu vitiat: item si triginta
 grana eius in posca bibantur.
 Sunt qui eius succum cum o-
 leo aurium doloribus infude-
 re: quinetiam folia, vtpote,
 quæ adstringāt vulneribus re-
 centibus imposuere, & cocta
 in vino pernionibus. Qui
 folia manibus affricuerit,
 aut radicem exemerit,
 posse à vipera feri-
 ri inficiantur.

DIOSCORIDIS

Vocitatum,

Aliqui alimon, alij thymon, alij dracontiam, Cyprij colocation dicunt.

Regia,

Alij narthecion, Romani albucum vocant.

Purgant,

Floret mēsisibus albucum. Quare æquinoctio verno, antequā semen adoleuerit, demetendum. Radicem aiunt potam, Veneris cupiditatem inhibere, quod herbarius Crateuas asseuerat: addiditque sanare podagræ dolores, si drachmæ pondere bibatur.

Neruos tentant.

Cōcti cū polenta, & ex suillo adipe impositi, tumores ac tubercula velocissimè ad supurationē perducūt ac rūpūt.

Capparis,

Aliq. cynosbaton, alij capria, alij corui malū, alii ophioscorodon, alii phylostrophylō, quidam thalliam, aut petream, alij olophytō, alii ioniten, nonnulli oligochloron, aut aconitō, aut hippomanes, alii trichomanes, magi potera, alii petheron, aut cor lupi, alii alofchorodū, alii crinon, alii thlaspin, Romani persicon sinapi, aut inturim, Aphri herbixathon.

Anemone.

127. a. 3. λεφα,

οἱ μὲν ἄλιμον οἱ δὲ θυμόν, οἱ δὲ δρακοντίαν, ὃ οἱ κύριοι καὶ κολοχάστον λέγουσι.

127. a. 31. Ασφόδελος,

οἱ δὲ γαρδήκιον, ῥωμαῖοι ἀλβούκιον.

128. a. 6. κοιλίαν.

Ἀνθεῖ δὲ ἐν πυράμεινῳ. καὶ ἡ ῥίζα λευκὸν ἀσφόδελον τέμεναι καὶ τὴν ἰσημερίαν ἐν ἑαίῃ, πρὸς τὴν καρπὸν ἀυξηθῶσαι. τὴν δὲ ῥίζαν πινομένην, ἀνορέκτους φησὶ ποιεῖν πρὸς ἀφροδίσεια, καὶ κρατῦναι τὸ ῥιζοτομικὸς τὰ αὐτὰ εἶπε. καὶ ὅτι θράπυς ἡ ῥίζα πινομένη μετ' οἴνου δραχμὴ μία πεδάσκει δὴ γήματα.

128. b. 11. νευρώδης.

ἐφ' ὧς δὲ σὺν ἀλφίτοις καὶ σέπτερον χοιρίῳ πρὸς σέπτερας, οἱ δὲ ῥιζοτομικὰ καὶ φύματα σὺν τῷ μῶς ἐκπύουσι καὶ διαρρύουσι.

129. b. 16. Καππαρίς,

Οἱ δὲ κυνόςκατος, οἱ δὲ καρφία, οἱ δὲ κόρακος μῆλον, οἱ δὲ ὀφιόσκορδον, οἱ δὲ φυλοσφυλον, οἱ δὲ θαλλίαν, οἱ δὲ πεβρίαν, οἱ δὲ ἐλόφυτον, οἱ δὲ ἰωνίτιον, οἱ δὲ ὀλιγόχλωρον, οἱ δὲ ἀκόνιτον, οἱ δὲ ἰππομανές, οἱ δὲ τερχομανές, πρὸς φῆται ποτέραι, οἱ δὲ πύτερον, οἱ δὲ καρδία λύκου, οἱ δὲ ἀλοσκόρδον, οἱ δὲ κρίνον, οἱ δὲ θλάσπιν, ῥωμαῖοι σίναπι πέροσκημι, οἱ δὲ ἰγλήκη, ἀφροὶ ἐρβίαία θυμία.

131. α. 18. *Ανεμώνη,*

οἱ δὲ ἀγρίαν, οἱ δὲ μέλαιναν
 καλεῖσι καὶ ἀνεμώνη ἢ φοινίκη, οἱ
 δὲ ἡγέμιον, οἱ δὲ μηκώνειον, οἱ δὲ
 τραγόκερος, οἱ δὲ γῆς παρίνη, οἱ
 δὲ βαρβύλη, ὁ δὲ ἀνὴρ βιρύλιος. ὁ-
 μοίως ὄρνις κεράνιος, πυθαγό-
 ρος ἀδρακτυλὶς, περιφῆται κνί-
 κος ἀγρία, ῥωμαῖοι ὄρεα τουμί-
 καμ, ἀφροὶ χεύφοις.

132. α. 5. *Αργεμώνη,*

οἱ δὲ οἰνώνη, οἱ δὲ ἀνθεμὶς,
 οἱ δὲ ὁμόνια, οἱ δὲ ἄνθος πι-
 δινόν, ῥωμαῖοι λοβορνία, οἱ δὲ κοί-
 κορδιάλις, οἱ δὲ περγαλία. γάλ-
 λοι κόρνα.

133. α. 15. *καταπλαστόμυα.*

Κρατεύας ὁρίζοτομικὸς εἰς τὸ
 αὐτὸ, ἀργεμώνη, αὐτὴ ἢ βοτάνη
 κοπτεῖται μὲν ὀξύγηκε, χοιράδας
 διαλύει. ποιεῖ καὶ πρὸς ἀλφες, μὲν
 νίβει καὶ θεῖα ἀπύρε ξηρὰ κοπτε-
 σαι καὶ σπειρεῖται ἐν βαλανείῳ δὲ
 τὸν χρωμένον θραπέυει πρὸς ξηρο-
 βίβηθέντας. ποιεῖ καὶ πρὸς ψώραν.

Πρὶ ἐτέρως ἀργεμόνης.

Αργεμώνη ἐτέρα οἱ ἀρτεμώνη, οἱ
 δὲ, ἀρσελάν, οἱ δὲ, σαρκόκολλα,
 ῥωμαῖοι ἀρτεμόνιαμ, καὶ αὐτὴ πα-
 ρέοικε μὲν ἀγρία μύκωνι τοῖς φύλ-
 λοις. Διώμην δὲ ἔχει αὐτὴ χλω-
 ρὰ βίβορμό λείαν καὶ ἐπιθεμένη
 διακοπὰς θεραπεύειν. καὶ ὀφθαλ-
 μῶν φλεγμονὰς παύειν, ἀρμόζει καὶ
 δυσεντερικοῖς σὺν ὕδατι ποιο-
 μένη.

Anemone.

Alii agriam, aut nigrā vocāt,
 alii anemonem phœnicā, alii
 enemion, nōnulli meconion,
 alii tragoceros, alii terræ pari-
 nem aut barbylam, Osthanes
 beriliō, item ornios ceranion,
 Pythagoras atractilida, magi
 cnicum agriam, Aphri chuffit,
 Romani orci tunicam.

Argemone.

Aliquib? œenone vocatur, aliis
 anthemis, aliis homonœa, ali-
 quibus flos cāpesttris, Romanis
 concordialis, aut pergalia, aliis
 liburnia, Gallis corona.

compescunt.

Ea, vt herbari? Crateuas au-
 thor est, contusa cum axungia,
 strumas discutit, Cribrata eius
 farina cum nitro, & sulphure
 ignē non experto contra vitili-
 gines efficax est: eaq; sicco lin-
 teo antea cōstrictas, in balneis
 sanat: facit & ad scabiem.

Altera Argemone.

Altera est Argemone, quam
 artemonen aliqui, alii arselam,
 aut sarcocollam vocant, Ro-
 mani Argemoniam. Ea foliis
 sylvestri papaveri similis est.
 Recens trita intercisiones im-
 positu sanat: oculorum inflā-
 mationes mitigat: pota cum
 aqua dysentericis auxiliatur:
 vulnera

DIOSCORIDIS

vulnera conglutinat : conuulsis, & vellicatib⁹ imposita medetur, inflammationibus vtilis, contra serpētium morsus cum vino bibitur.

Anagallis.

Anagallis purpurea, quibusdam aëritis aut agitis vocatur, aliis sauritis, magis oculi sāguis aut chelidonium, Romanis macia, Heruscis masytipos, Gallis sapana, Dacis cerceraphrō. Anagallis cōmunis, quibusdam corchoron, aliis halicacabon, aliis zeliaur⁹, magis nycteritis, Ægyptiis mecii, Romanis aneciaton, Aphris asirrifæ.

Hedera.

Aliquib⁹ citharō, aliis cifsarō, aliis chryfocarpos, aliis poëtica, aliis corymbethra, aliis cyfion, aliis dionysia, aliis ithytheriō, aliis persis, aliis cemos, aliis asplenos, Romanis sylua mater, aliis hedera; Gallis suibites.

maius.

Nōnulli pæoniam vocāt, alii cratæā, alii aubiū, alii glauciā, alii pādios radix, quidā philomedion, alii othonion, Romani fabiū, Galli thonan, Ægyptii mothoth, Daci crustana.

extrahit.

Quinetiā radicib⁹ eius decoctum, mox cū melle gargarissatum,

μύνη, κολλητική δὲ βλαμμάτων καὶ φλεγμονῶν ἐστὶν εὖδετος· ὡσαύτως ἐπιπλεμύνη, ἀσπασμάτων καὶ πημάτων ἐστὶ θραρυτική, ἀρμόζει καὶ δηριόδηκτοις σὺν οἴνῳ πινομένη. 132. a. ἀναγαλλίδες.

Ἀνάγαλλις ἡ φοινική, οἱ δὲ ἀεῖπτις, οἱ δὲ αἰγίπτις, οἱ δὲ ἀσπείπτις, πλεροῦται αἵμα ὀφθαλμοῦ, οἱ δὲ χελιδόνιοι, ῥωμαῖοι μακία, δοῦσκοὶ μαστίπτις, γάλλοι σαπαῖα, δακοὶ καρκαροφρόν, ἀναγαλλίς οἰκοιμή, οἱ δὲ χόεχρεν, οἱ δὲ ἀλικάκαβον, οἱ δὲ ἡλίσυρες πλεροῦται νυκτερίτις, αἰγύπτιοι μυκίη, ῥωμαῖοι μεκίατο, ἀφροῖ ἀσίρρισι.

132. b. 9. κίσπος,

οἱ δὲ κίσαρεν, οἱ δὲ κίσαρεν, οἱ δὲ χρυσόκαρπος, οἱ δὲ πωπική, οἱ δὲ κορυμβήθρα, οἱ δὲ κύσσιον, οἱ δὲ διονύσιον, οἱ δὲ ἰδυθίριον, οἱ δὲ πέρις, οἱ δὲ κῆμος, οἱ δὲ ἀσπλινος, ῥωμαῖοι σίκβα μάτρη, οἱ δὲ ἔδερα, γάλλοι σουβίτις.

133. a. 31. μέγα.

οἱ δὲ παυονία, οἱ δὲ κραταιά, οἱ δὲ ἀέβιος, οἱ δὲ γλαύκιος, οἱ δὲ παίδιος ῥίζα, οἱ δὲ φιλομῆδειον, οἱ δὲ ὀδόνιον, ῥωμαῖοι φάβιουμ, γάλλοι θῶνα, αἰγύπτιοι μοδοθ, δακοὶ κρεσάνη, κροκοδείτις.

134. a. 16. κεφαλῆς.

ὁμοίως καὶ τὸ ταύτης ἀφέλημα σὺν μέλιτι ἀναγασσαιζόμενον,

μυόν, κεφαλῇ καὶ αἵρει χυναί-
ως καὶ πάντα τὰ ἐκ σώματος.

134. b. 10. σύψως.

Πρὶ Μυὸς ὠτων.

Μυὸς ὦτα, οἱ δὲ μύωτον, οἱ ὃ
αὐτὸν, οἱ δὲ ἀλσίνην, οἱ δὲ
μυὸς τοχον, οἱ δὲ μυρτίσπληνον,
ῥωμαῖοι μούεις ἀείκουλα, ἀ-
φροὶ λαβαδολαβάτ. ὠνόμασαι
δὲ ἀπὸ τοῦ ἔχειν μυὸς ὠτίοις ὁ-
μοία τὰ φύλλα. ἀλσίνη δὲ διὰ
τὸ σπινθύνει καὶ ἀμμόδεις φι-
λεῖν τόποις. πῶα ὁμοία ἐλξίνη, τα-
πεινότερα δὲ καὶ μικροφυλλο-
τέρα. Διῶαμιν ὃ ἔχει ψυπκὴν,
ἀρμόζουσιν πρὸς φλεγμονὰς
ὀφθαλμῶν, καταπλαπτομένη
μετὰ ἀλφίτων, καὶ πρὸς ὠτων
πύον οὗ χυλὸς αὐτῆς ἐσταζόμε-
νος. καὶ κατόλου διῶαται τὰ
αὐτὰ τῇ ἐλξίνῃ.

134. b. 30. ἡμερος.

οἱ δὲ αὐχινον, οἱ δὲ ἔγνη, πρῶ-
φῆται ἀφροσύον, ῥωμαῖοι ῥῆταμ.

135. a. 7. ἀγρία.

οἱ δὲ ἔγνη μικρά, ῥωμαῖοι ῥοῦ-
ται μινόρεμ, οἱ δὲ ἀγρία ἰσάτης.

135. a. 17. καταπλαπτομένη.

Ἐπιστάτεον τὰ πρὸ ἰσάτεων ὅτι
αἱ ἐκδοσεῖς αὐτὰ τὸ ὀφθαλ-
μῶν ἔχουσι, τό τε γὰρ μύλινον
ἀνθος καὶ τὸν λεπτότερον καὶ
πολυχρῆστει κλάδοις καὶ τὰ ἐξ
ἀκροῦ γλωττοειδῆ θυλάκια, ἐν
οἷς τὸ σπέρμα ἢ ἡμερὲς φέρεται,
ἐμπεριέχεται.

rissatum, caput cunctaque pe-
ctoris vitia purgat.
mordaci.

Auricula muris.

Myosota alii myoton, alii al-
finen, nonnulli myorthochon,
alii myrthosplenon, Latini mu-
ris auriculam vocant, Aphri la-
batholabat. nomen ideo acce-
pit, quod muscutorum aures fo-
liis imitetur. Lucos & fabulo-
sa loca amat, ideo alsine dicta
est. Ea Helxinæ similis, sed hu-
milior ac foliis minor. Vim re-
frigeratoriam habet, oculorum
inflammationibus conuenien-
ter ex polenta illinitur. Suc-
cus eius aurium dolori-
bus instillatus: in to-
tum eadem po-
test quæ exine.

Glastum.

Aliqb^o augiō, aliis egne, Magis
aufiō, Romanis glusta aut gla-
stū dicit.

Quibusdam igne parua, Lati-
nis glastum minus, aliis sylue-
stris ifatis dicitur.

Auxiliatur.

Sed sciendum est, ne tradi-
ta errorem pariant, satiuū gla-
stum, luteū florem, tenuiores,
multifidosq; ramulos proferre,
in cacumine autem folliculos
linguæ speciē repræsentantes,
in quibus

in quibus semen continetur meláthio simile, collémque supra binúm cubitorum altitudinem attolli: syluestre verò nigriora ferre folia, caulem minorem, sed crassiore: florem purpureum, aut ceruleum, fructum cruciformē, asperum, in quo semē, foliis exilibus quinque partitò diuisum.

Telephium,

Aliqui syluestre semperuiuū, alii portulacá syluestre appellát, Romani illecebrá, Ægyptii anoth, Aphri atirtopurin.

Rha.

Aliqui rhiam, Latini rha Póticum vocant.

Gentianæ,

Aliqui centauriá radicē, alii aloën Gallicá, alii narcem, alii chironiό, Dardani aloitin, Romani genus aut cicēdiam, alii ciminalem vocant.

Dactylitis,

Aliis melocarpos, aliis teuxinó, Latine aristolochia herba.

Inferior est.

Appellatur à quibusdā ararisa, & melecaprū, ephestios, lestitis, pyxionyx, Dardanion, iontitis, Gallis theximón, Ægyptiis sopher, Siculis chamæmelon, Italis malum terræ,

Dacis

ἐμπεριέχει ὃ τέτοις σπέρμα μέλαν ἐπικὸς μελανδίω, καὶ ἡ καυλὸν ὃ ὑπερδύπληκτον, ἀλλ' ἔχει ὑπερπύκνον μόνον φέρει. ἢ ὃ ἀγρία μελάσθηρα ταύτης τὰ φύλλα φέρει, καὶ καυλὸν ἐλάττω καὶ παχύρρον ἀνδρος τὸ ἐμπόρευσεν ἢ κυανουῦ, καὶ καρπὸν σαυροειδῆ, βραχὺν ἐν οἷς τὸ σπέρμα φυλλάριοις μικροῖς ἀνὰ πέντε ἴσοις οἰοῖται διελημμένον.

135. a. 18. Τηλεφίον,

οἱ δὲ αἰείζων ἀγριον, οἱ δὲ καὶ ταύτην ἀνδράχην ἀγρίαν καλεῖσιν, ῥωμαῖοι ἰλλέκεβραν, αἰγυπῆιοι ἀνώθ, ἀφροὶ ἀπριτόπωκεις.

136. b. 16. Ρᾶ.

οἱ δὲ ῥίαν ῥωμαῖοι ῥᾶ πόντικον.

137. a. 20. Γενπανή,

οἱ δὲ κενταύρειος ῥίζα, οἱ δὲ ἀλόν γαλλικὴ, οἱ δὲ κάρκη, οἱ δὲ χειράνειον, δάρδανοι ἀλοίπης, ῥωμαῖοι γρυοῦς, οἱ δὲ κικενδία, οἱ δὲ κικινανίς.

138. a. 12. Δακτυλίτις,

οἱ δὲ μυλόκαρπον, οἱ δὲ τυξίον, ῥωμαῖοι ἔρβα ἀειτολόχα.

138. b. 23. περὶ ξημύων.

Καλεῖται δὲ αὕτη καὶ ἀερίζα καὶ μελεκάπερυν, καὶ ἐφίσιος, καὶ λεστῆς καὶ πυξίνον, καὶ δάρδανον, καὶ ἰοντῆς, γάλλοι δὲ καυλοῦσιν αὐτὴν δέξιμον, αἰγυπῆιοι δὲ σφοῖφ, σικελοὶ δὲ χαμαίμυλον, ἰταλοὶ τέρρα μάλας.

δακτι

δακοὶ ἁψίνδιον χροεικὸν γίνεται
εἰς τέπας ὀφθαλμοὺς καὶ θερμὸς καὶ ὁ-
μαλὲς ἢ τραχεῖς καὶ περὶ ὁδοὺς.
πικρὴ δὲ πρὸς πυρετὸν βαρυν-
τικὴ ἀριστολόγχα ἐπ' ἀνδράκων καὶ
παισιν τὸν πυρετὸν τα, καὶ παυθί-
σεται ὁ πυρετὸς· τὰ αὐτὰ τα ἐπι-
πλάσσει ὡς ἡ ἰατρικὴ δὲ κυπρί-
ου καὶ δρακοντίου σπέρματος καὶ
μέλιτος, τοῖς ἐν ῥινὶ καρκινώ-
μασι βοηθεῖ· μετ' ἐλαίῃ δὲ ἢ ὕ-
ειου σέατος ἐψηθεῖσα, ῥίγη συγ-
χρυσίῃν θερμὰ πύξι καὶ κρατύνει
ὁ ῥιζοτομικὸς καὶ χαλκὸς τὰ αὐτὰ
ὡς αὐτῆς εἰρήκεσι καὶ ὅτι τοῖς
ποδαγρικοῖς ὀφελεί.

138. b. 25. Γλυκύρριζα.

οἱ δὲ πεντικῆ, οἱ δὲ γλυκίρα-
τον, οἱ δὲ σύμφυτον, οἱ δὲ λεοντί-
κα, οἱ δὲ γλυκύφυτον, οἱ δὲ σκυ-
θίων, οἱ δὲ ἀδελφον, οἱ δὲ συνίδρα,
οἱ δὲ λιβεστασώ, οἱ δὲ ὁμοιόμοι-
ος, οἱ δὲ πενταδόμοιος, ῥωμαῖοι
δὲ λυκίς ῥάδιξ.

139. a. 19. γάρυκον.

οἱ δὲ λιμνήστον, οἱ δὲ μάρω-
νιν, οἱ δὲ πλεκτρονίαν, οἱ δὲ χει-
ρωναί, οἱ δὲ λίμνηστις, ὡς φηται
αἶμα ἡρακλέους, ῥωμαῖοι φιερεῖ,
οἱ δὲ ἐνεφερά, οἱ δὲ φελιπραί.

139. b. 33. μυχρόν.

οἱ δὲ λιμνήστον, οἱ δὲ ἐλεβρί-
της, οἱ δὲ ἀμάραντον, ὡς φηται
αἶμα ἡρακλέους, ῥωμαῖοι φεύριφε
γάμ, οἱ δὲ ἀνδρομάχη ῥάδιξ,
δακοὶ

Dacis absinthium rusticum: na-
scitur in montibus, & calidis lo-
cis, aut campestribus, & petro-
sis. Ad grauem febrim efficax
est, si nidore subditis carboni-
bus febricitans suffiatur, fe-
bris leuabitur: vulnera im-
pitu sanat: carcinomatis nariū,
cum cypero, & dracunculi se-
mine, & melle prodest: rigo-
ribus medetur, cocta in oleo
aut adipe suillo, illitaque.
Crateus herbarius, & Gal-
lus, eadem de hac tradiderūt,
& præterea podagricis eam
auxiliari.

Radix.

Aliqui pomticam, alii glyce-
raton, quidam symphyton, alii
leonticā, alii glycyphytō, aliq
scythiō, alii adipso, alii sylithrā,
alii libyestafon, alii homœno-
mœō, alii peenthaomœon, La-
tini dulcē radicē appellauere.

Magnū,

Alii limneseon, alii maronem
alii plectroniam, alii chironiā,
alii limnestim, magi Herculis
sanguinem, Romani phieri, &
vneferam, & fel terræ.

Centaurium.

Aliqui limnesion, alii helle-
boritē, alii amarātō, magi Her-
culis sanguinē, Latini febrifu-
giam, alii aurā, multiradicem.

Z

Daci

DIOSCORIDIS

Daci tulbelam appellant.

albus,

Quibusdā chrysisceptrō, aliis
ixia, Romani card^o varin^o, Ægy
ptiis epher dicit^r, aliis ephthofe-
chin. niger,

Pācarpon aliqui, alii vlopho-
non, alii ixiā, alii cynomazon,
alii ocimoides, alii cnidiō coc-
con, alii cynoxylon, Latini car-
dium nigrū, aut vermilaginē,
Ægyptii sobel vocant.

Dipsacum.

Aliqui crocodilion vocāt, alii
chamæleonē, alii onacardion,
alii Veneris lauachrū. Romani
labrum Veneris, alii cardium
Veneris, Ægyptii seseneor, alii
chir, alii meleta, Daci sciamam.

alba:

Aliq agriocinnarā, alii dona-
citin, alii erysisceptrū vocāt, ro-
mani spinam albam aut regiā,
alii cardium ramptarium.

spinam.

aliquibus acanthis, Latinè spi-
na dicitur.

Carduus,

aliās ferula, aliās pyracantha
nominatur, Latinis stiobilon,
Ægyptii cnus.

Poterion,

Aliqui phryniō, aliqui acidotō.

Acanthus,

Quidam melamphyllon,
aliqui

δακοὶ τουλβηλᾶ.

140. b. 21. λευκός,

οἱ δὲ χρυσίσκηπτον, οἱ δὲ ἰξίαν,
ῥωμαῖοι κάρδου σουαρίνης, αἰ-
γύπτιοι ἐφῆρ, οἱ δὲ ἐφθόσεχιν.

141. a. 17. μέλας.

οἱ δὲ πάγκαρπον, οἱ δὲ ἐλό-
φωνον, οἱ δὲ ἰξίαν, οἱ δὲ κυνόμα-
ζον, οἱ δὲ ὠκιμοειδές, οἱ δὲ κνί-
διον κόκκον, οἱ δὲ κυνόξυλον, ῥω-
μαῖοι κάρδου νίχρα, οἱ δὲ ἐρνι-
λαγώ, αἰγύπτιοι σοβέλ.

141. b. 34. δίψακος,

οἱ δὲ κροκοδείλιον, οἱ δὲ χα-
μαιλέων, οἱ δὲ ὄνοκαρδιον, οἱ δὲ
ἀφροδίτης λουτρὸν, ῥωμαῖοι κάρ-
δου βένεεις, οἱ δὲ κάρδου βένε-
ρις, αἰγύπτιοι σεσενέορ, οἱ δὲ χείρ,
οἱ δὲ μελῆτα, δακοὶ σκιαρή.

142. a. 31. λευκὴ,

οἱ δὲ ἀγριοκινναράμ, οἱ δὲ δο-
νακίτις, οἱ δὲ ἐρυσίσκηπτον. ῥω-
μαῖοι σπῖνα ἄλβα, οἱ δὲ ῥήμα, οἱ
δὲ κάρδου ῥαμπάειρα.

142. b. 20. ἀρχεῖκη,

οἱ δὲ ἀρχανδής, ῥωμαῖοι σπῖνα.

142. b. 27. σκόλυμος,

οἱ δὲ φέρετα, οἱ δὲ πυράκαν-
θα, ῥωμαῖοι σούβελεμ, αἰγύπτιοι
χνούς.

143. a. 6. ποτήριον,

οἱ δὲ φρυγίον, οἱ δὲ ἀκιδωτόν.

143. b. 3. ἐρπάκανθα,

οἱ δὲ μελάμφυλλον, οἱ δὲ πιδέ-
ρωτα,

ῥῶτα, οἱ δὲ ἀκανθισοπία, οἱ δὲ
μαμολαία, οἱ δὲ κραίπουλα.

143. 23. ἀκανθίς,

Ακανθα ἀγρία καὶ ῥωμαῖοι
σπίνα ἀγρίστη.

144. a. 19. Λευκάκανθα,

οἱ δὲ πολυγώνατον, οἱ δὲ φύλ-
λον, οἱ δὲ ἰσχιάδα χαλουσί, ῥω-
μαῖοι γηακάροδος, δοῦσκοι σπί-
να ἄλβα.

144. b. 18. Ερύγγιον.

οἱ δὲ ἡρύγγιον, οἱ δὲ ἐρυμνίς,
οἱ δὲ ἔρυον, οἱ δὲ γογγίνιον, οἱ δὲ
ἔρμιον, οἱ δὲ ορίγανον, χλούνιον,
οἱ δὲ μυράκανθον, οἱ δὲ μωλν,
αἰγύπτιοι κρόβυστος, παροφίται σί-
περτος, ῥωμαῖοι καπτιουλεμ μαρ-
δοις, οἱ δὲ κατερεῖ, δακτοί σικε-
πνοῖς, ἰσπανοὶ κιστουκαπτά, ἁ-
φροὶ χερδαν, οἱ δὲ ορείαν χλόνη,
οἱ δὲ χιδά.

145. a. 16. Αλόη,

οἱ δὲ ἀμφίβιον, οἱ δὲ ἡρύγγιον,
οἱ δὲ ἔρμιον, οἱ δὲ τραγόκεως,
ῥωμαῖοι ἀλόαμ, παρὰ βαρβάρ-
οις ἀλόε.

146. a. 16. Ἀψίνδιον,

Αἰγύπτιοι σόμ, ῥωμαῖοι ἀ-
ψίνδικμ ῥέστικμ.

147. a. 17. Σαλδόσιον,

οἱ δὲ σανδονίκην χαλῶση, οἱ δὲ
δέρειφον, ῥωμαῖοι σανδονίκμ.

147. b. 13. Ἀβρότονον,

οἱ δὲ ἀβρότονον, οἱ δὲ ἀψίνδιον,
οἱ δὲ ἡράκλειον, οἱ δὲ χολοποιόν,
οἱ δὲ

aliqui topiariam, alii mamola-
riam, quidā crēpulam vocant.

sylvestris,

Acantha sylvestris, quam La-
tini spinam agrestem vocant.

Leucacantha,

Quidam polygonaton, alii
phyllon, alii ischiada vocant,
Romani cniancarduum, He-
thrusci spinam albam.

Eryggion.

Aliqui eryngē, alii erynerē,
alii caryon, alii gorginion, alii
hermion, alii organum, chlout-
nion, alii myracāthon, alii mo-
ly, Egyptii ctobyson, magi si-
ferton, Romani capitulū Mar-
tis, Daci sicupnoēx, Hispani
cētum capita, Aphri cherdam,
alii oriam chloēm, alii chida
appellant.

Aloēs,

Aliquibus amphibion, aliis
herminion, aliis eryngion, aliis
tragoceros, Romanis aloa, Bar-
baris aloē dicitur.

Abfinthium,

Egyptii somi, Latini apsin-
thium rusticum vocant.

Marinum,

sunt q. sandonicē, sunt q. feri-
phū, Romani sādonicū vocāt.

Abrotonum.

alii abutonon, alii abfinthiū,
alii heraclion, alii cholopœon,

Z ij alij

DIOSCORIDIS

alii abfinthiomenon, alii thelyphthorion, alii procampylon, magi aëura phoenicos, alii cynanchité, Romani abfinthium ponticum, nonnulli thelythamnū, alii glycin ancona vocāt.

Hyssopum,

Latini hyssopū, alii later, alii cassialam, Ægyptii pefalem.

Stachus,

Aliqui syncliopa, alii alcibiadem, alii pancration, nonnulli styphoniā, Ægyptii suphlo, Magi pythonis oculum, Romani sciolebinam vocitant.

Pulegium,

Alii blechron, alii arscenanthon, Latini pulegium vocant, Galli aluolū, Aphri apoleium, quidam galisop sim.

pulegium,

Aliis embactrō, aliis belouacos, alii artemedeion, aliis cretica, quibusdā ephemerō, nonnullis eldia, aliquibus belotocos, aut dorcidion, aut helbunio, Romanis vstilago rustica.

elisphacon.

Alii ciosmin, alii phagnon, Ægyptii becion, Romani saluam vocant.

Mentha.

Latini mentham vocant, alii nepetam, Ægyptii tis, alii pherthrumerthumonthu, alij perxo,

οἱ δὲ θηλυφθόριον, οἱ δὲ ἀβινθιόμενον, οἱ δὲ προκάμπυλον, περὶ φησὶ νεῦρα φοινίκας, οἱ δὲ κυναγχίτιον, ῥωμαῖοι ἀβινθίον. πύπτηκα, πνὲς δὲ αὐτὸ θηλύδαμιον, οἱ δὲ γλυκὺν ἀγκῶνα καλεῖσιν.

148.a.14. Τάσωπος.

ῥωμαῖοι ὑσώπεον, οἱ δὲ λάτρε, οἱ δὲ κασιάλα, αἰγύπτιοι πεσάλεμ.

148.b.8. Σπῆχας,

οἱ δὲ συγκλίσπα, οἱ δὲ ἀλκιβιάδης, οἱ δὲ παγκράτιον, οἱ δὲ συσσηνία, αἰγύπτιοι σουφλὸν, περὶ φησὶ τι ὀφθαλμὸς πύθονος, ῥωμαῖοι σκιολεβίνα.

149.b.33. Γλήχων.

οἱ δὲ βλήχων, οἱ δὲ ἀρτένκατον, ῥωμαῖοι πολέεμ, ἀφροὶ ἀπολείεμ, γάλλοι ἄλβολον, οἱ δὲ γαλίσσψις.

150.a.29. ἀγρίαν.

οἱ δὲ ἐλβάρον, οἱ δὲ βελέακος, οἱ δὲ ἀρτεμεδύιον, οἱ δὲ κρηπκή, οἱ δὲ ἐφήμερον, οἱ δὲ ἐλδύαν, οἱ δὲ βελτοκόκος, οἱ δὲ δορκίδιον, οἱ δὲ ἐλβένιον, ῥωμαῖοι οὐσιλάρο ρούσκα.

151.a.15. σφαγρόν.

οἱ δὲ κίοσμιν, οἱ δὲ φάρον, αἰγύπτιοι βήκιον, ῥωμαῖοι ἀπουσί, οἱ δὲ κούσαλον, οἱ δὲ σάλβια.

151.b.2. μίνθων.

ῥωμαῖοι μάρτα, οἱ δὲ νέπεταμ, αἰγύπτιοι τις, οἱ δὲ φερδουμερθερμυον, οἱ δὲ περξά,

ἄρξω, οἱ δὲ μακκιδό.

151. b. 28. ἡ δὲ οσμὸν,

ὁ ῥωμαῖοι μῦντάστρουμ κα-
λοῦσι.

2. 2. b. 6. Θυμός,

οἱ δὲ θυμός λευκός, οἱ δὲ κε-
φαλωπές, οἱ ὅτι ἐπιθυμῖς, οἱ ὅτι θυρ-
σιον. ῥωμαῖοι θούμικα, αἰγύπτιοι
σεφάνη, δακοὶ μόζελα.

153. a. 10. Ερπύλλος,

οἱ δὲ ξυγὶς ἀγρία, οἱ δὲ πύ-
λιον, αἰγύπτιοι μερσούππος, ῥω-
μαῖοι σερπύλλεμ, οἱ δὲ κερηλα-
πκούμ.

153. b. 7. Σαμφύλον,

οἱ δὲ τείφυλλον, οἱ δὲ ἀμάρα-
κον, οἱ δὲ ἀγαθίδες, οἱ δὲ κνή-
κον, οἱ δὲ ἀκαπνον, Πυθαγόρας
θραμβής, αἰγύπτιοι σοφός, ἀφμέ-
νιοι μύκερν, περσφῆται ὄνος ἰχρε-
ως, οἱ ὅτι ἡκίρονος ἰστέως, ῥωμαῖοι
μαζουράνα.

154. a. 16. ὤσοςον,

οἱ δὲ ορειανίδα καλεῖσιν.

154. b. 2. ἄκονος,

οἱ δὲ ἄχσιον βασιλικόν, ῥω-
μαῖοι ὠκιμάστρουμ.

155. a. 4. ἄρεινον,

οἱ δὲ ῥυτίω ὀρεινῶ, ῥω-
μαῖοι ῥούτα μοντάνα, πήχανον
κηπευτὸν, ῥωμαῖοι ῥούτα ὀρτέν-
σις, αἰγύπτιοι ἐπνεβου, σύρε
ἄρμαλα, οἱ δὲ βηπισὲ, ἀφρεῖ
χουρμά.

156. a. 6. ὀπτελαβής ὄστ.

perxo, alij maceto.

mentha,

quam Latini mentastrum no-
minát.

Thymum.

quidá thymú albú, quidá ce-
phalothó, alii epithymida, alij
thyrsion, Latini thymú, Ægy-
ptii stephanen, Daci mosulá.

Serpyllum,

aliqui Zygin syluestrem, alii
polion vocant, Ægyptii me-
ruopium, Latini serpyllum, aut
cicer erraticum.

Sampsuchum,

aliqui triphyllú, alii nomi-
nant amaracum, alii triphylló,
alii agathides, alii cnecion, alii
acapnó, Pythagoras thrábem,
Ægyptii sopho, Armenii myu-
ron, magi ichrei asinú, aut heci-
goné Ifidis, Latini maioraná.

Marum,

sunt qui origanida appellát.

aconos.

aliis syluestre basilicum, La-
tini ocimastrum.

montana,

aliqui rhytem montaná, La-
tini rutam montanam, peganú
cepeutum Latini rutam hor-
tensem, Ægyptii ephnubum,
Syri harmala, alii besafa. Aphri-
churma vocant.

abdicatur.

Z iii Syluestris

Πρι

DIOSCORIDIS

Sylvestris ruta.

Rutam sylvestrem, aliqui ap-
pellant hypericon, alii andro-
sæmon, alii coron, alii chamæ-
pityn, Romani hederalem, aut
centonalcé, Aphri churma fem-
maced. odor feminis refino-
sus est, ideo chamæpitys aliqui
bus noninatur. Frutex est sur-
culofus, rubescēs, folia rutæ fi-
gura: flores lutei qui digitis tri-
ti sanguineo succo manát, vn-
de andosæmon vocitarūt. Ra-
muli subhirsuti, filiquæ tere-
tes hordei effigie, in quibus fe-
men nigrum refinam olens: gi-
gnitur in cultis & asperis. Vri-
nam ciet, menses appositu tra-

hit, pota cum vino quar-
tana liberat. Folia cum
semine ambustis illitu
medentur, & die-
bus quadraginta
epota ischiadi-
cos fanant.

Moly,

aliq sylvestre leucoion appel-
lant. Ligusticum,

Alii panaceam, alii panaces
vocant.

sylvestris,

Aliqui cerascomen vocát,
Latini carotam, alii pastina-
cam rusticam, Ægyptij babi-
byru, Aphri sicham.

Malsilie-

Πρὶ πηγάς ἀγρίαι.

Πήγανον ἄγριον, οἱ ᾧ ὠφικόν.
οἱ ᾧ ἀνδρόσαιμον, οἱ δὲ κόρον, οἱ
ᾧ χαμαιπίτυ, ῥωμαῖοι ἐδερά-
λις, οἱ δὲ σενιενάλις, ἀφροὶ χούρ-
μα σευμακέδ. διὰ τὸ τὸ ὡσεὶ
τὸ σπέρμα ὀσμὴν εἰκέναι πτυί-
νῃ ῥητίνῃ ὀνόμασαι χαμαιπίτυς.
φύλλα ἔχει πηγῶν παρασκήσα.
θαμνίον φρυγανοειδὲς ὡσφύδρον.
ἀνθος μύλιον, ὃ διαβίβεν ἐν τοῖς
δακτύλοις, αἷμα τῷδε τὸν χυλὸν
ἐκκρίνει ὅθεν καὶ ἀνδρόσαιμον ἐκλή-
θη, κλωνάρια ᾧ ὡσφάστα, περ-
μύκη ἐν τῷ ὡσφρὲ ὁμοιον κρι-
θῆ. ἐν τῷ σπέρμα μέλαν, ῥητίνης ὀ-
ζανφύει) ἐν ἐργασίμοις καὶ βαλάν-
σι χρωεῖσι. Διώαμιν ᾧ ἔχει δι-
ρηπικὴν, καὶ ἐμμήνων ἄλωρον, περ-
σιδέμερον τετραταίου ἀπαλλα-
κτικὴν μετ' οἶνου πινόμενον. τὰ
ᾧ φύλλα σὺν τῷ σπέρματι κα-
ταπλάττομενα, κατακλύματα
ἰῶν) θεραπεύει καὶ ἐκράδαις ἐφ'
ἡμέρας τεσσαράκοντα πινόμενον.

156. b. 19. Μῶλυ,

οἱ δὲ Λευκοῖον ἄγριον καλεῖσι.

158. b. 2. Λιγυστικόν,

οἱ δὲ πανάκειαν καλοῦσιν, οἱ
δὲ πανάκες.

159. a. 10. ἄγριος,

οἱ δὲ κερασκόμην, ῥωμαῖοι κα-
εράμ, οἱ δὲ πασινάκα, ῥούσικα,
αἰγυπῖοι βαβίβυρ, ἀφροὶ α-
χαμ.

159. b.

159.b.3. μασαλιωτικόν,
οἱ δὲ σφάγρον,
159.b.27. σέσελι.
οἱ αἰγύπτιοι κυόνων φρίκλω
καλῶσι.
150.a.15. Τορδύλιον,
οἱ δὲ τέρδυλον,
160.b.5. Ανισον,
οἱ δὲ σῖον, ῥωμαῖοι ἀνισουμ.
161.a.1. Ανήθου,
ἀνηθον τὸ ἐπιόμυον, οἱ δὲ
πόλγιδος, οἱ δὲ ἀνίκητον, θεωρεῖ-
ται γόνος κυνοκεφάλου, ὁμοίως βί-
χης κυνοκεφάλου, οἱ δὲ γόνος
ἐρμου, αἰγύπτιοι ἀραχου, ῥω-
μαῖοι ἀνήθουμ, ἀφροὶ σικκίρια,
δανοὶ πόλτουμ.
161.b.3. ἄρειον,
ῥωμαῖοι κύμινεμ ἀρεῖσεμ, οἱ
δὲ κύμινεμ σιλβάτικουμ.
162.a.2. Αμμι,
ῥωμαῖοι ἀμμινεμ ἀλεξάνδρινεμ.
162.a.25. κοειάνον,
αἰγύπτιοι ὄχρον, ἀφροὶ γοῖδα.
162.b.12. μέγα.
οἱ δὲ συγχρίτιμ, ῥωμαῖοι καμ-
πέχα, ἀφροὶ σιδιλέας.
162.b.28. μικρόν,
οἱ δὲ ἡ το σολχίτην καλῶσιν, οἱ
δὲ ἐνπμον ἄρειον, ῥωμαῖοι ἵνπ-
βουμ ἀρεῖσεμ, ἀφροὶ σιδιλέαδε.
163.a.23. Ορεοσέλινον,
οἱ δὲ πεδινόν, οἱ δὲ ὑδρ-
σέλινον ἄρειον, ῥωμαῖοι ἀπουμ
ῥούστικουμ.

163.a.

Mafsiliense.
sunt qui phagnon vocant.
feseli,
Ægyptij cyonú phricen ap-
pellant.
Tordylion.
nonnullis tordylon.
Anisum,
aliqui sion, Latini anisú dicūt.
Anethum,
Anethum quod estur, aliqui
polgida vocant, alii anicetum,
magi cynocephali genituram,
aut capillos, alii Mercurii se-
men, Latini anethum, Aphri
ficciriam, Ægyptii arachu,
Daci pulpum.
cuminum,
Latini cuminum syluestre,
feu cuminú fyluaticú appellát.
Ammi,
Latini Ammiú alexádrinú.
Corianum,
Ægyptij ochion vocát, Aphri
goed. Magnum,
aliis fonchites, Romanis lá-
puca, Poenis sithileas.
paruum,
aliq. fonchité, alii entimon a-
grion, Romani intybum sylue-
strem vocát, poeni sithilafdem.
Eleoselinum,
à quibusdam pedinon, ab a-
liis hydrose linon agrion, Ro-
manis Apiú rusticú appellatur.
Z iijj Oreο-

DIOSCORIDIS

Oreoselinum.

Aliqui petroselinū sylvestre,
Latini apiū, Ægyptii anonim.
dicitur,

Latinis olus atrum.

Elaphobosco,

aliq elaphicō, alii nephriō, alii
ophigeniō, nōnulli ophiocto-
nō, aliq herpyē, alii lymen vo-
cāt, romani cerui ocellū, Ægy-
ptii chemin, Aphri ascaucau.

hippomarathrum.

aliqui marathin, alii mara-
thrū agriō, Ægyptii sampsoth,
magi thymarnoliō, Latini fœ-
niculum erraticū, aliqui mion,
Galli fistrameor.

Delphinium.

aliis diachysis, aliis diachytos
aliis paralyfis, aliis camarus, a-
liis hyacinth°, aliis delphinias,
aliis neriō, aliis neriadion, aut
fosandron, aut croniō, Roma-
nis bucinus minor vocitatur.

Pyrethrum,

aliqui doryeniō, alii pyrinō,
alii pyrotō, aut pyrothrō, alii
arnonpyriten, magi pyriten,
Romani saliuarem vocant.

Sphondylius,

aliqui arágē vocant, alii pha-
langion, alii asterion, nonnulli
nesyrim, aut sphondylin, qui-
dam chorodanon, aut cenan-
then, Romani herbā rutinalē,
Ægyptii

163. a. 28. Ορεόσελινον,

οἱ ὃ πετροσελινον ἄρειον, ῥω-
μαῖοι ἄπικυ, αἰγύπτιοι ἀνώνιμ.

163. b. 26. χαλῆσι.

ῥωμαῖοι δὲ ἔλκυσ ἄτρεν.

164. b. 24. Ελαφόβοσπον.

οἱ δὲ ἐλαφικόν, οἱ δὲ νέφειον,
οἱ δὲ οφιογόνον, οἱ δὲ οφιοκτό-
νον, οἱ δὲ ἐρπυζή, οἱ δὲ λύμην,
ῥωμαῖοι κερδιοκέλλυμ, αἰγύπτιοι
χημῖς, ἀφοροῖ ἀσκαυκαῖ.

165. b. 3. ὑππομαράθριν.

οἱ ὃ μαράθριν ἄρειον, αἰγύπτιοι
παμ-ῖως, περσῇ ὃ θυμαρνέλιον,
ῥωμαῖοι φανίκελυμ ἑρράπικυ,
οἱ ὃ φανίκελκυσ, οἱ ὃ κύνκυσ, οἱ δὲ
μύκμ, γάλλοι σισραμείρ.

166. a. 18. Δελφίνιον.

οἱ δὲ διάχυσις, οἱ ὃ διαχυτος,
οἱ δὲ παράλκισις, οἱ δὲ κάμαρος,
οἱ δὲ ὑάκινθος, οἱ δὲ δελφινίας,
οἱ δὲ νήρειον, οἱ δὲ νηρείადειον, οἱ
δὲ σώσανδρον, οἱ δὲ κρόνιον, ῥω-
μαῖοι βέκινος μίγορ.

166. b. 7.

οἱ δὲ δορύκκινον, οἱ δὲ πύρενον,
οἱ δὲ πύρεπν, οἱ δὲ πύρεθρον,
οἱ δὲ ἀρνός πνείτης, περσῇται
πνείτης, ῥωμαῖοι σαλίσαεις.

168. a. 2. Σφονδύλιον,

οἱ ὃ ἀράγγιλυ, οἱ ὃ φαλάγγιον,
οἱ ὃ ἀστέριον, οἱ δὲ νίσυεις, οἱ δὲ
σφονδύλκυσ, οἱ δὲ χορέδανον, οἱ δὲ
οἰνάνθη, ῥωμαῖοι ἑρξάρεπνάλκυσ,
αἰγύπτιοι

αἰγύπτιοι ἀφάφει, θεωρῆται ὁ-
σεις.

Ægyptii afapher, magi of-
rin.

168. a. 32. Νάρθηξ,
ῥωμαῖοι φέρουλαμ

Ferula
Latini ferula dicitur.

168. b. 14. Πευκέδανος,
οἱ τ' ἄρειον, οἱ δὲ ἀρειόφυλλον,
θεωρῆτ' ἀγαθὸς δαίμων, οἱ τ' πι-
νασγελέμ, ῥωμαῖοι πατάειον.

Peucedanum,
aliqui agrion vocant, alii a-
griophylló, magi bonú dæmo-
nem, Romani fatariam.

169. b. 6. Μελαίνδιον,
οἱ δὲ καὶ πῦτο μήκωνα ἄρειον
καλοῦσι μέλανα, ῥωμαῖοι παπά-
ξες νίηρουμ.

Gith
alij mecona agrion mela-
na, Romani papauer nigrum
appellant.

173. b. 3. Αμμο-
νιακόν,

πία ὅστιν, ὅθεν τὸ ἀμμωνιακόν
θυμίαμα, οἱ δὲ ἀγάσυλλον, οἱ
δὲ κριόθεος, οἱ δὲ ἡλίουςτρος, ῥω-
μαῖοι γούττα.

Ammoniacum.
herba est ex qua ammonia-
cum fit suffimen, quod thymia-
ma vocant, alii agazylon, a-
lij criotheum, alii heliustrum,
Romani guttam.

175. b. 2. Αλυσον,
οἱ δὲ ἀπιδιον, οἱ δὲ ἀπλό-
φυλλον, οἱ ἀκκύσητον, οἱ δὲ ἀδέ-
σητον,

Alyffon,
aliqui aspidion, alii haplo-
phyllon, alii accyseton, alii a-
dyseton nuncupant.

175. b. 17. Ασκληπίας,
οἱ δὲ κισίον, οἱ δὲ κιστόφυλ-
λον καλοῦσι.

Asclepias
aliqui cission, alii, cissophyl-
lon.

175. b. 13. Ατσαχυλὶς,
οἱ δὲ ἄμυρον, οἱ δὲ κνίκος
ἀγεία, οἱ δὲ ἀπιδιον, θεω-
ρῆται ἄφειδρος. αἰγύπτιοι χι-
νὰ, ῥωμαῖοι πρεσέπιουμ, οἱ δὲ
φουσσύχρεσις, οἱ δὲ κλόνουκα, ρού-
σικα.

Atrachylis,
aliqui amyron vocant, alii
cnicon sylvestré, alii aspidion,
magi aphedron. Ægyptii che-
non, Romani præsepium, ali-
qui fufum agrestem, alii colum-
rusticam.

176. a. 13. Πολύκνημον,
οἱ δὲ κλινοπιδιον, οἱ τ' πολυγό-
νατον, οἱ δὲ διδὸς ἡλακίτη, οἱ δὲ
ἐχέα-

Polycnemon,
quidā clinopedion, alii poly-
gonaton, alii iouis colum, alii
echeo.

DIOSCORIDIS

echeonymon vocant.

bibitur.

Edocuit experientia contritos in vino albo ramulos, iis qui affectibus laborant, quæ violentiæ vocatur, magno esse præsidio.

Clinopodium,

aliqui cleonicon, alii acimoides, alii zopyron vocant.

Leontopetalon,

aliquibus leontopodion, aliis leuceoron, aliis leontion, aliis doris, aut doricteris, aliis lychnis agria, aliis pardale, aliis thorybethron, aliis rhapeion, aliis cornutum papauer, aliis anemone, Romanis patabelclum, aut semen leoninum dicitur.

placet,

aliis teucris.

Chamædrys,

Latinis tripsago minor dicitur.

coronaria,

aliqui athanaton vocant, alii acylonion, alii ballarion, alii geranopodion, quidam corymbion, alii taurion, alii septron, aut maloion, Ægyptii semeon, magi sanguinem apocathemenes, Romani genicularem aut ballariam.

fyluestris,

aliàs tragonaton, aliàs atocion,

ἑχέονυμον, ῥωμαῖοι πευπαλα-
ρον θρία.

176.a. 23. οἶνον.

ἐδίδαξεν ἡ πεῖρα, ὥς ἀποτει-
σουμένη τῶν κλωναίων αὐτοῦ
οἶνον λευκῷ τῶν ἐχονήτοις τοῖς
λεγονήτοις βιασμοῖς μέγα ἐοί-
σημα.

176.a. 25. Κληνοπόδιον,

οἱ δὲ κλεώνικον, οἱ δὲ ὠκίμοι-
δες, οἱ δὲ ζώπυρον καλοῦσι.

176.b. 7. Λεοντοπέταλον,

οἱ δὲ λεοντοπόδιον, οἱ δὲ λευ-
κήρον, οἱ δὲ λεόντιον, οἱ δὲ δω-
εῖς, οἱ δὲ δωεικτεῖς, οἱ δὲ λυχνίς
ἀγρία, οἱ δὲ παρδάλη, οἱ δὲ δο-
ρύβητρον, οἱ δὲ ῥαπῆιον, οἱ δὲ μή-
κων κερσῆτις, οἱ δὲ ἀνέμώνη, ῥω-
μαῖοι πατάβηκλουμ, οἱ δὲ σέμην
κλεόνιουμ.

176.b. 25. χαμαῖδριον,

οἱ δὲ τευκείδα,

177.a. 4. Χαμαίδρις

ῥωμαῖοι τειψάρον μίνον.

177.b. 7. στεφανώματιν,

οἱ δὲ ἀθανάτος, οἱ δὲ ἀκν-
λώνιον, οἱ δὲ βαλλάειον, οἱ δὲ
μερανοπόδιον, οἱ δὲ κορύμβιον,
οἱ δὲ ταύειον, οἱ δὲ σκῆπτρον,
οἱ δὲ μαλοῖον, αἰγύπτιοι σεμεόν,
πρωφῆται αἷμα ἀποκαθημένης,
ῥωμαῖοι χρικουλάεις, οἱ δὲ βαλ-
λάεια.

177.b. 14. ἀγρία,

οἱ δὲ τραγόναντον, οἱ δὲ ἀτό-
κον,

μισ, οἱ δὲ ἱερακοπόδιον, οἱ δὲ
λαμπας, αἰγύπτιοι σεμουρα,
προφῆται ἀποκαθημένους ταύ-
ρος, ῥωμαῖοι ἰντιβουμ ἀγρίσεμ,
οἱ δὲ λάπατον, χαφαζουίνα, οἱ
δὲ στίειδος.

177. b. 24. βασιλικόν,

οἱ δὲ κριναίνθιμον, οἱ δὲ καλλεί-
ειον, προφῆται αἶμα ἄρεως, ὀστά-
νης αὐρα κροκοδείλου, αἰγύπτιοι
συμφαφὸν, οἱ δὲ πύλως, ῥωμαῖοι λί-
ναμ, οἱ δὲ ῥόσα ικώνης, σύρι πασσά,
ἄφρεϊ ἀβίβλαβον.

178. a. 29. προάσιον.

οἱ δὲ νοφθαν, οἱ δὲ νοπιανοσκέ-
μιν, οἱ δὲ νόσπρασσον, οἱ δὲ νωδε-
ρᾶς, οἱ δὲ νοχελίς, οἱ δὲ νοσελίς, οἱ
δὲ νῶφρις, οἱ δὲ γνώδουεις, οἱ δὲ
γνώτρεφ, ῥωμαῖοι ἄπνιμ, οἱ δὲ μέ-
δαταμ, οἱ δὲ ἐλκερέεια, οἱ δὲ μα-
ερούσιουμ, οἱ δὲ κανδουείνουμ, αἰ-
γύπτιοι ἄσφος, οἱ δὲ ἔσκε, προ-
φῆται αἶμα ἰσίωνος.

178. b. 12. χαλοῦσι.

οἱ δὲ μελίψαιον, οἱ δὲ μελίφυλ-
λον, οἱ δὲ ἐρυθρά, οἱ δὲ τημελῆ,
ῥωμαῖοι ὠπασροῦ, οἱ δὲ κιντράγω,
γάλλοι μερσιμώειον.

179. a. 2. Πράσιον,

οἱ δὲ εὐπατώειον, οἱ δὲ φυλ-
λόφαρες, οἱ δὲ τειπέδιλον, οἱ δὲ
χαμυλοπόδιον, οἱ δὲ φιλόφαρες, αἰ-
γύπτιοι ἄσερέπη, προφῆται αἶ-
μα τάνεου, οἱ δὲ ἄφεδρας, γένος
ᾧρου, ῥωμαῖοι μαρρούσιουμ, οἱ δὲ
λαβείωγια

cion, aliâs hieracopodion, aut
lampas vocatur, Ægyptiis fe-
mura, Magis apocathemenes
taurius, Latinis intibum agre-
ste, aliis lapathum, aliis steris.

Lilium,

Crinon basilicon, alii crinā-
themon vocant, alij gallirion,
Magi Martis sanguiné, Osthā-
nes aurem crocodili, Ægyptij
symphæphon, quidā tialon, La-
tini liliū, aliqui rosam iconis,
Syri fasa, Aphri abiblabon.

Vocant.

aliqui nophthan, alii notia-
noscemin, alii nospraffon, alii
nothera, alii nochelim aut no-
stelin, alii nophryn, alii gno-
torim, alii gnotera, Romani a-
pnium, aut medatam, aut vlce-
rariā, aut marrubiū nigrum, a-
lii cāthurinū, Ægyptii asphon,
magi Ifionis sanguinem.

apiastrum,

alii melitæon, alii meliphyl-
lon, alii erythran, alij temele,
Latini apiastrum aut citraginé,
Galli merisimorion vocant.

Marrubium,

alii eupatorion, alii phyllo-
phares, alii tripedilon, alii ca-
melopodion, Ægyptii aftero-
pen, magi tauri sanguiné, ali-
qui aphedron, alii Horu geni-
turam, Latini marrubiū, aliqui
labeo-

DIOSCÓRIDIS

labeoniā, Aphri atierberziam.

Phyllitis,

aliqui phyllin, alii acaulō, alij
fyluestre lapathum vocitant.

Asphaltium,

Latini trifolium, aut trifoliū
acutum odoratum.

Polium.

montanum, aliqui teuthrion,
alii pheuxaspidion, alii acha-
menin, alii ebenitin, alii melo-
mon, nonnulli belion, quidam
leonthocharon vocant.

SCORDIVM,

aliqui scorbion, alij pluritin,
alij dysofmon, alii fyluestre ca-
laminthē, quidā chamedryn, a-
lii mithridanion, magi Podotis
sanguinē, Egyptii apho, Roma-
ni trifaginē palustrē appellant.

Tusfilagini,

Bechion quidā rhichion, alii
petrinā vocāt, alii peganon, a-
lii pithion, alii pagonaton, alii
chamæleucen, alii procheton,
alii arcophyton, chamegeron,
Ægyptii faarthan, Latini tusfi-
laginem, quidam pharphariā
aut pustulaginem, Bessi asa.

Artemisia

quibusdam polyclonos aliis
monoclonos, aliis toxitesia, a-
liis ephesia, aliis anactorios, a-
liis so zusa, aliis leia, aliis lico-
phryx, magis hominis sanguis,
aliis

λαβειώνια, ἀφροί ἀπτερβέρζια.

179.b. 14. Φυλλίτις,

οἱ δὲ φύλλις, οἱ δὲ ἀκαυλον, οἱ
δὲ λάπαθον ἀρειον καλοῦσι.

180.a. 14. κνήκιον,

ῥωμαῖοι τριφύλιον, οἱ δὲ τρι-
φύλιον ἀκύντον ὁδοῦ ἐξέχου.

180.b 17. Πόλιον,

τὸ ὄργειον, οἱ δὲ τεύθριον, οἱ
δὲ φευξασπίδιον, οἱ δὲ ἀχα-
μενίς, οἱ δὲ ἐβενίτις, οἱ δὲ με-
λόσμον, οἱ δὲ βέλιον, οἱ δὲ λεον-
τόχαραν.

181.a. 2. Σκόρδιον,

οἱ δὲ σκόρβιον, οἱ δὲ πλε-
εῖτις, οἱ δὲ δύσοσμον, οἱ δὲ χαλα-
μίνθη ἀγρία, οἱ δὲ χαμαῖδρις,
οἱ δὲ μιθριδαῖος, πρὸς ᾧται αἵ-
μα πόδοντος, αἰγύπτιοι ἀφὸ, ῥω-
μαῖοι φειξάγων παλούστρις.

181.b. 2. Βήχον

οἱ δὲ ῥίχον, οἱ δὲ πετεινὴ, οἱ
δὲ πήχανον, οἱ δὲ πίδιον, οἱ δὲ
παγόνατον, οἱ δὲ χαμαιλεύκη, οἱ
δὲ πρὸς χετον, οἱ δὲ ἀγκόσυντον, οἱ
δὲ χαμαίγειρον, αἰγύπτιοι σααρ-
δά, ῥωμαῖοι τουσιλλάγων, οἱ δὲ
φαρφαρία, οἱ δὲ πουςουλάγων,
βέσσι ἀσά.

181.b. 23. Ἀρτεμισία

οἱ δὲ πολυκλωνος, οἱ δὲ μο-
νόκλωνος, οἱ δὲ τοξήνησις, οἱ δὲ
ἐφεσία, οἱ δὲ ἀνακτίειος, οἱ δὲ σῶ-
ζουσα, οἱ δὲ λεία, οἱ δὲ λυκό-
φρυξ, πρὸς ᾧται αἷμα ἀνδρώπε,
οἱ δὲ

οἱ δὲ χρυσάνθεμον, ῥωμαῖοι ἑα-
λέντια, οἱ δὲ σερπίλλουμ, οἱ δὲ ἑρ-
βα ῥέγια, οἱ δὲ ῥαπίκμ, οἱ δὲ τερ-
τανάγεται, οἱ δὲ ἀρτεμίσιαμ γάλ-
λοι πονέμ, δακοὶ ζουόση.

182. b. 3. Αἰσμισία,
ῥωμαῖοι κάπερουμ σιλβάτικουμ,
οἱ δὲ ἄπιουμ ῥέστικουμ, αἰγύπτιοι
μερσεώ.

182. b. 29. Γεράνιον
οἱ δὲ πελωνίτις, οἱ δὲ τείχα,
οἱ δὲ γερανόγερων, ῥωμαῖοι οὐχ-
νάσουμ, ἀφροὶ ἱέσκε.

182. β. 35. γεράνιον,
οἱ δὲ μερτρυζ, οἱ δὲ μυρρίς, οἱ
δὲ καρδάμων, οἱ δὲ οὐρίανον,
προφῆται ἱεροβρύγκας, ῥωμαῖοι
πυλμυρία, οἱ δὲ κικοτεία, οἱ δὲ
ζουόνα, ἀφροὶ ἱέσκε.

183. a. 8. Γναφάλιον,
οἱ δὲ ἱρὲς, οἱ δὲ ἀμπέτοκος,
οἱ δὲ ἀνάξιτον, οἱ δὲ ἀνα-
φάλις, αἰγύπτιοι σεμεών, γάλ-
λοι γελασσέν, ῥωμαῖοι κέντου-
λουμ, οἱ δὲ τουκούλαεις, οἱ δὲ
αἰλβίνους.

183. b. λεύκανθον,
οἱ δὲ κερασκόμοι.

133. b. ἀμόζει.
Πεὶ κονύζης μεγάλης. Κεφ.
Κόνυζα μεγάλη, οἱ δὲ κονοζε-
μάπτις, οἱ δὲ δαναῖς, οἱ δὲ τα-
νάχον, οἱ δὲ φύκος, οἱ δὲ ἰχὺς,
οἱ δὲ δείροσμος, προφῆται βρεφο-
κτόνος, οἱ δὲ ἀνουβίας, οἱ δὲ ἡ-
δεμίας,

aliis chrysanthemon, Romanis
valentia, aut serpillum, aut her-
ba regia, aut artemisia, aliis ra-
pium, aut tertana, Gallis pona,
Dacis zuoste dicitur.

Ambrosia,
Latini caprum syluaticum,
alii apium rusticum, Aegyptii
merseon.

GERANION,
aliqui Pelonitin, alii tricā, alii
geranogeronta, Romani vchi-
nastrū, Aphri iescen appellant.
alterum,

aliqui mertryga, alii myrrhin,
alii oxyphyllon, alii cardamo-
mon, alii origanū vocāt, magi
hierobryncas, Latini gruinam,
aut pulmonia, aut cicotriam.

GNAPHALII,
alii hires, alii ampetocon, a-
lii anaxiton, alii anaphalim, A-
egyptii semeon, Galli gelafo-
nen, Latini centumculum vo-
cant, quidam tucularem, alii
albinum.

OENANTAE,
alii cerascomium vocant.
conuenit.

conyza magna. Cap.
Conyza magna, aliq^b cyno-
zematitis, aliis danais, aliis ta-
nachiō, aliq^b bus phycos, aliis if-
chys, aliis dynosmos, magis bre-
phoctonos, quibusdā anubias,
nōnullis hede-

DIOSCORIDIS

nonnullis hedemias, Ægyptiis ce-
ti. Romanis intybū, aut milita-
ris, aut deliariū, aut febrifuga,
aliis phragmosa, aliis musteros,
aliis pissa nuncupatur.

fanat.

aliqui conyzam paruiam, alij
panion, alii libanotidem, magi
cronon vocant.

HEMEROCALLIS,

alij hemerocatalactōn, alij
crinon agrion, alii crinanthē-
mon, alii porphyrātes, alij bul-
bum hæmaticon, alii antican-
tharon, Ægyptii iocri, Romani
bulbum, aut lilium syluestre,
aut marinū, Aphri abiblabon
vocant.

Leucoion,

aliqui basilion vocant, Lati-
ni violam albam, aliqui augu-
stiam, nonnulli violam matro-
nalem, aut passarinam, aut po-
lyphuram.

erythraicon,

alii melion aqueum, alii eri-
taticon, alii priapicon, aut saty-
rifcon, aliqui satyri testiculum
appellāt, Latini molorticulum
Veneris.

HORMINON,

Latinis geminalis, Dacis hor-
mia dicitur.

altera.

Nymphæam aliam sunt qui
nym-

δεμίαις, αἰγύπτιοι κέπι, ῥωμαῖοι
ἰνπιβούμ, οἱ δὲ μιλιτάρις μίνα,
οἱ δὲ δελλιδάειον, οἱ δὲ φεβρο-
θύγνα, οἱ δὲ φραγμασός, οἱ δὲ μου-
σεροί, οἱ δὲ πιασάν.

184. a. 12. ἰάται.

οἱ δὲ κόνυζα μικρά, οἱ δὲ πά-
νιος, οἱ δὲ λιβανωπης, περιφί-
ται κρόνος.

184. a. 22. ἡμεροκαλλίς,

οἱ δὲ ἡμεροκατάλαχτον, οἱ δὲ
κρίνον ἀγριον, οἱ δὲ κρινάνθεμον,
οἱ δὲ πορφυρανθές, οἱ δὲ βολβός
ὁ αἱματικός, οἱ δὲ ἀντικάνθα-
ρον, αἰγύπτιοι ἰοκροί, ῥωμαῖοι
βούλευμ, οἱ δὲ ἔλιουμ ἀγέστερι,
οἱ δὲ ἔλιουμ μαρίνουμ, ἀφροί
ἀβίβλαβον.

184. b. 5. Λευκοῖον,

οἱ δὲ βασίλειον, ῥωμαῖοι ὀ-
πουλά ἄλβα, οἱ δὲ βιόλα ἄλβα,
οἱ δὲ αὐγουστία, οἱ δὲ βιόλα ἀν-
τροιάλεμ, οἱ δὲ πασσαεῖνα, οἱ
δὲ πλύφουρα.

186. a. 2. ὀ. ἐρυθραϊκόν

οἱ δὲ μήλιον τὸ ἐν ὕδατι, οἱ
δὲ ἐνταπικόν, οἱ δὲ περιπικόν,
οἱ δὲ σατυρείσκος, οἱ δὲ ὄρχις σα-
τύρου, ῥωμαῖοι μολορτίκουλουμ
εἴνερις.

186. a. 33. ἡμερον,

ῥωμαῖοι γεμινάλις, δακοὶ ὄρ-
μια.

187. b. 12. ἄλλης.

Νυμφαῖα ἄλλη, οἱ δὲ νυμφῶ-
να

να καλοῦσι.

187. b. 24. Ἀνδρόσακες,
οἱ δὲ πικράδα, οἱ δὲ λεύκλω, οἱ
δὲ θαλασσίαν καλοῦσι.

188. a. 4. Πιέρυξ,
οἱ δὲ λογχίτις, οἱ δὲ ἀπούριος,
οἱ δὲ φρυγία, οἱ δὲ φρυγίτις, οἱ
δὲ φιλτροδότης, θεωρεῖται αἵ-
μα γάλης.

188. a. 35. Ἀνθυλλίς,
οἱ δὲ ἀνθυλλον, οἱ δὲ ἀνθε-
μίδα, οἱ δὲ ἐρανθεμῖς, οἱ δὲ λευ-
κανθεμον, οἱ δὲ σπρανθίς, οἱ δὲ
αἴθος πεδινόν, ῥωμαῖοι σολά-
στρον καλοῦσι.

180. b. 27. καλλία, ῥωμαῖοι
μάλιον, ἀφροῖ ἀσπρη-
πφῆ, ἔτεροι δὲ χυσοκόμην.

189. b. 3. λευκαν-
θεμον,
οἱ δὲ ἀνθεμῖς, οἱ δὲ χαμύ-
κων, οἱ δὲ χυσοκόμην, οἱ δὲ
μελάβαθρον, οἱ δὲ αἴθος πεδι-
νόν, ῥωμαῖοι σόλις σέκουλον, οἱ
δὲ μιλεφόλιον, δοῦκοι κα-
τὰν, ἀφροῖ θαμακθ'.

189. b. κάχλαμ,
οἱ δὲ βαλταμύνη, θεωρεῖται
αἵμορρα, οἱ δὲ γόνος ἐρμού, οἱ δὲ
γόνος ἀφθίτος, οἱ δὲ μνησίθεος,
ῥωμαῖοι καππακοραγία, ἀφροῖ
ναράτ.

189. b. 35. πεντόβορον,
παμονία ἄρβω, οἱ δὲ ὀροβελιον,
οἱ δὲ ὀροβῆξ, οἱ δὲ αἵμαγωνόν,
οἱ δὲ

nymphonem appellant.

ANDROSACES,
sunt qui picrada appellant,
alii leucen, alii thalassiam.

Hemionium,
alii lonchitim, alii aturion, a-
lii phrygiam, aut phrygitim, a-
liqui philtrodoten, magi mu-
stela sanguinem.

ANTHYLLIS,
quidam anthyllon, alii an-
themida vocant, alii eranthem-
in, alii leucanthemon, alii fo-
ranthin, alii campestem flore,
Romani solastrum.

Anthemidis,
quam Romani maliū. Aphri
astertiphen appellant.
vocant,

alii anthemida, alii leucathe-
mō, alii chamæmelon, alii chry-
socalin, alii melabathron, nō-
nulli campestem florem, Latini
folis seculum, aliqui millefo-
lium, Hetrusci cantan, Aphri
thamath.

cachlam,
Alii balsamenam, Magi hæ-
morrhā, alii Mercurii geni-
turam, alii aphthitis semen, aut
mnesitheum, Romani cappa-
coraniam, Aphri narat.

dicitur,
aliis orobelion, quibusdam
orobax, aliis hæmagogon, a-
liis

DIOSCORIDIS

liis pæſæden, aliis monog-
nion, aliis meonion, aliis pæo-
nion, aliis panthiceratos.

dactylos,

aliis aglaophotis, aliis theo-
donion, aliis selenion, magis
selenogonon, aliis phthifis. Ro-
manis caſta.

Lithospermon,

alii leontion, alii leoninum
lapidé, alii gorgonion, alii tan-
talitin, alii diosporon, Romani
columbam, Daci gonioletam.

Erythrodanum.

Aliqui euthrion, alii draca-
non, alii cinnabarim, Latini ru-
biam, Hetruſci lappam mino-
rem, Aegyptii ſophobi vo-
cant.

Lonchitis,

aliàs ceſtron aut meduſa di-
ciur, Latine venerea aut lan-
ceola.

dicunt,

Latini longinā, aut calabrinā.
vocat,

quidam althiocon vocant.

ſatiua,

aliqui cannabion, alii ſchino-
ſtrophon, alii aſterion appel-
larunt.

cannabis,

aliqui hydraſtinam, Latini
terminalem, alii cannabem
vocat.

Ana.

οἱ ᾧ παισαίδιον, οἱ ᾧ μονόχυειον,
οἱ δὲ μιλύιον, οἱ δὲ πταιόγιοι, οἱ δὲ
παιδικέρετος.

189.b. 35. δακτύλοις,

οἱ δὲ ἀγλαωφώπιδες, οἱ δὲ θεο-
δόνιοι, οἱ δὲ σελυνίον, περὶ ἧται
σελυνόγονοι, οἱ δὲ φθίσι, ῥωμαῖοι
κάστα.

190.b. 7. ἐξώνυχον,

οἱ ᾧ λέοντιον, οἱ δὲ λίθος λεόν-
πικῆ, οἱ δὲ γερώνιον, οἱ ᾧ παντά-
λίπς, οἱ ᾧ διόσπορον, ῥωμαῖοι κο-
λῶμβαμ, δακοὶ γονολήτα.

191.a. 2. ἐρυθρόδανον.

οἱ δὲ ἐρυθρόδανος ῥίζα, οἱ
δὲ δρέχανος, οἱ δὲ κιννάβα-
ρις, ῥωμαῖοι ῥουβία πασιβία,
δοῦσκοι λάμπα μινώρ, αἰγύπτιοι
σωφοβί.

191.b. 2. λογχίτις,

οἱ δὲ κίερον, ἢ μινδοῦσα, ῥω-
μαῖοι βενέρεα, οἱ δὲ καγκιόλας
παρατηκέρπος.

191.b. 22. τραχείαν,

ῥωμαῖοι λογχινά, οἱ ᾧ καθάβρινάς

191.b. 30. καλῶσι,

οἱ δὲ ἀλθίοκον,

192.b. 17. καννάβις,

οἱ δὲ καννάβιον, οἱ δὲ χι-
νοστροφον, οἱ δὲ ἀστέιον, ῥωμαῖοι
καννάβιμ.

192.b. 28. ἀγρία,

οἱ δὲ ὑδρέστινα, ῥωμαῖοι περ-
μύναρις, οἱ δὲ καννάβις.

193.a.

193. a. 9. ἀκοπον,
οἱ δὲ ἀγνάκοπον.

193. b. 27. Ονοβρυχίς,
οἱ δὲ ὀνοβρόχειλος, οἱ δὲ ἐ-
ρασμένη, οἱ δὲ ὑπέρικον, οἱ δὲ
κόρειον, οἱ δὲ χαμαιπίτυς, ῥω-
μαῖοι ὀπάχα, οἱ δὲ βειχλατά,
οἱ δὲ λόπτα, οἱ δὲ ἰοκινάλην, ῥω-
μαῖοι ἀνιασέξ.

195. a. 13. Χαμαι-
πίτυς,

οἱ δὲ πιτυσάρουσιν, οἱ δὲ ορεί-
ζηλον, οἱ δὲ βειονίαν ἀγρίαν,
προσφῆται αἶμα ἀθωαῖς, ῥω-
μαῖοι κυφριπύμ, ῥωμαῖοι δο-
χελᾶ.

197. b. 8. ἄρρεν,
οἱ δὲ πολυγόνατον, οἱ δὲ κυ-
νοχάλλω, οἱ δὲ ἡράκλειαν, οἱ
δὲ ἀσφαλτον, οἱ δὲ χιλιόφυλ-
λον, οἱ δὲ κλήμα, οἱ δὲ πολύ-
καρπον, οἱ δὲ κερκίνηθρον, οἱ ὃ
πυθαλίδα, οἱ δὲ μυρτοπέτα-
λον, οἱ δὲ κρωπόδιον, οἱ δὲ ζα-
ειδέα, οἱ δὲ πιθάλιον, αἰγύ-
πιοι θεφῖν, οἱ δὲ σεμφῖν, προ-
σφῆται γένος ἡρώος, οἱ δὲ ὄνυξ
μυδός, ῥωμαῖοι σεμινά-
λις, οἱ ὃ σοπίναιχα,
ἀφροῖ χου-
λουί.

198. a. 3. θῆλυ,
ῥωμαῖοι σεμινάλις,

198. a. 31. πολυγόνουειδής,
οἱ δὲ φιλέταιριον,

198. b. 12.

Anagyris,

quidam agnacopū vocant.

Onobrychis,

aliqui onobrochilon, alii ef-
chafmenen, alii hypericon, alii
corion, alii chamæpytin, Ro-
mani opacam, alii brichilatam,
alii loptam, alii iocinalem, Da-
ci aniaffexe appellant.

Aiuga.

aliis pitysoryfis, aliis orize-
lon, iis qui Pontum incolunt
olocyron, aliis bryonia sylue-
stris, magis Mineruæ sanguis,
Latinis aiuga aut cypripum,
Dacis dochela appellatur.

mas,

aliqui polygonatum appel-
lant, alii cynochalam, alii he-
racliā, alii asphalton, alii chi-
liophyllon, alii clema, alii po-
lycarpon, alii carcinethron,
alii teuthalida, alii myrto pe-
talon, alii cnopodion, alii za-
ritheam, alii pedalion Aegy-
ptii tephin, alii stemphin, Ma-
gi genituram herois, alii vn-
guem muriso, Latini semina-
lem, alii stopinacem vocant,
Aphri chulum.

foemina,

Latinis feminalis dicitur.

Clematis,

aliqui philetorium vocant.

Az terre-

terrenis.

Clematis altera. Cap.

clematidá alterá, sunt qui epi-
getidavocét, Ægyptii phylacu-
on, Latini ambuxú. Viticulá ex
se mittit rubentem, vitiliú mo-
do létā. Foliú habet quod acer-
rimú in gustu sit & exulceret.
Circúuoluit se, scandetq; arbo-
res, hederæ quā smilacé vocát
modo. Tritú semé eius in aqua
mulsáve aqua potú, per infer-
na bilem & pituitá trahit. Pel-
lunt lepras folia, emplastri mo-
do ípofita. Ipsa sale cú lepidio
conditur & servatur ad cibos.

pecton,

Latini soldaginem.

Stoebe,

quidá tobion, Latini stipam
appellant.

Clymenum,

Alii calycanthemon, alii pe-
riclymenon, alii heliophyes,
nonnulli hepatitim, alii mila-
cen, alii anatolicon, alii dyti-
con, alii merginem, Latini vo-
lucrum, aliqui volucrum ma-
ius, Ægyptii oxyui, alii clyme-
non, alii clymenion, quod &
agonon nuncupant.

Periclymenon,

Aliqui Æginá, alii clymenon,
alii carpathó, alii splenion, alii
epatitim, alii axinam maiore,
non-

198.b. 12. χέρσις.

Περί κληματίδος ἐτέ-

ρας. Κεφ.

Ετέρῃ κληματίς, οἱ δὲ ὀπι-
γῆτις, αἰγύπτιοι φυλάκουν, ῥω-
μαῖοι ἀμβουξοῦ, κλημα ἀνήκ-
ουσι ὑπερῷον, λυγῶδες, φύλλον
δεινὸν λίαν γευσάμενόν καὶ ἐλ-
κωτικόν, περιελίθεται δὲ τοῖς
δένδρεσιν ὡς σμίλαξ, ταύτης ὁ
καρπὸς λεῖος μετ' ὕδατος ἢ ὑ-
δρομέλιτος ποθεῖς, ἄγει κῆτω
φλέγμα καὶ χολήν, τὰ δὲ φύλ-
λα καταπλαθέντα λέπρας ἀφί-
σσει. τριχέεται ὅ μετὰ τοῦ λε-
πιδίου εἰς βρώσιν.

199.a. 28. πικτὴν,

ῥωμαῖοι σολδάγνεν.

199.b. 31. Στοιβή,

οἱ δὲ πέσιον, ῥωμαῖοι σίπαι,

200.a. 4. Κλύ-

μυρον,

οἱ δὲ χαλυκαίθυμον, οἱ δὲ
περικλύμυρον, οἱ δὲ ἡλιοφυές,
οἱ δὲ ἡπατίτις, οἱ δὲ σμίλαξ, οἱ
δὲ ἀνατολικόν, οἱ δὲ δυτικόν,
οἱ δὲ μερίνη, ῥωμαῖοι οὐόλου-
κερυμ, οἱ δὲ οὐόλουκερυμ μαί-
ους, αἰγύπτιοι ὀξίου, κλύμε-
νον, οἱ δὲ κλυμύριον, ὁ καὶ ἄρ-
γον χαλοῦσι.

200.a. 22. Περικλύμυρον,

οἱ δὲ κίγνη, οἱ δὲ κλύμυρον, οἱ
δὲ κέρπαθον, οἱ δὲ σπληνίον, οἱ
δὲ ἐπατίτις, οἱ δὲ ἀξίνη μείζων,
οἱ δὲ

οἱ δὲ κληματίτις, οἱ δὲ μυρσίνη,
οἱ δὲ χαλκαῖοι θεμιον, περιφῆται πό-
λιον ἀφροδίτης, αἰγύπτιοι τοῦρ-
κον, ῥωμαῖοι οὐόλεκερυμ μαῖος,
ἀφροί λανάθ.

200. b. 14. τείβολος,

οἱ δὲ βουκέφαλος, οἱ δὲ ταυ-
ρόκερος, ῥωμαῖοι τείβολεμ ἀ-
κράτικουμ.

201. a. 12. ἀρῆ.

Πεὶλ Σαρξίφάγου. Κεφ.

Σαρξίφάγον, οἱ δὲ σαρξίφραγ-
ζόν, οἱ δὲ ἐμπετρον, ῥωμαῖοι
σάρξιφράγα. δάμπος ὅτι φρυ-
γανώδης ἐν πέτραις καὶ τραχέσι
τόποις φυόμενος ἐμπερῆς. Δύ-
ναμιν δὲ ἔχει ἐψηθεῖσα ἐν οἴνῳ
καὶ πγομύνη πυρέσσουσι βοηθεῖν,
πραγμοεῖα τὲ καὶ λυγμῶ· λί-
θοις τὲ τοῦ ἐν κύσει δρύπτεν καὶ
οὐρα ἀγειν.

201. a. 14. νευροκίδες,

οἱ δὲ ποταμογείτων, οἱ δὲ λογ-
χίτις, οἱ δὲ ῥαπονονίου, μυσοῖ
μυρδερυτά, σύρι μεούδα, οἱ
δὲ λυκοσέμφυλλον, οἱ δὲ ἐλλέβο-
ροσήματα, οἱ δὲ σκύλλιον, περι-
φῆται λύκου καρδία, ῥωμαῖοι ἐ-
άρτουμ νίχουμ, οἱ δὲ πνίντα-
λουμ τέρρα, γάλλοι ἱεμβαρῶμ,
δακοὶ δάμνα.

201. a. 17. Λαγώποις,

οἱ δὲ λαγῶς κύμνον καλοῦσι.

201. a. 33. Μήδιον,

οἱ δὲ μηδική, οἱ δὲ τείφυλλον, οἱ
δὲ κλη-

nōnulli clematitim, alii myrsi-
nē, alii calycāthemmon, magi po-
lion Veneris, Ægyptii turcon,
Romani volucrum maius, A-
phri lanath appellant.

TRIBULI,

aliquibus bucephalus, aliis
tauroceros, Romani tribulus
aquaticus dicitur.

faciunt.

Sarxiphagon. Cap.

Sarxiphagon, aliqui sarxi-
phrangon, alii empetron, Ro-
mani saxifragiam vocāt: frutex
est furculosus, in petrosis & a-
lperis locis nascens, epithymo
similis. Cocta in vino, mox po-
tus, febricitantibus opitulatur,
stranguriæ prodest: singultum
sedat: calculū in vesica frangit,
& vrinam ciet.

Limonium,

Aliquibus potamogiton ap-
pellatur, aliis lonchitis, aliis ra-
pionion, Myfis mēdruta, Syris
mēda, aliis lycosemphyllon,
aliis helleborosemata, aliis scyl-
lion, magis lupicor, Romanis
viartum nigrū, quibusdam tin-
tinabulū terræ, Gallis iumba-
rum, Dacis dacina.

Lagopus,

aliqui leporis cuminū vocāt.

MEDION,

aliqui medicā appellant, alii

Aa ij triphyllon

DÍOSCÓRIDIS

triphyllon, alii clemation, nõ-
nulli osmon, quidã trigonon,
alii cybellion, alii polyphylló,
Romani trifolium odoratum,
Ægyptii epaphon.

Epimedium,

ab aliis erineos, ab aliis thry-
as, à nonnullis pollyrrhizon, à
Romanis vindicta nominatur.

machæronion,

aliqui anactorion, alii phas-
ganon, alii machæronion, alii
arion vocant, Romani gladio-
lam, quidam genitalem.

Sparganion,

aliqui xiphidion, alii bolon
appellant.

XYRIS,

ab aliquib⁹ iris agria, ab aliis
cacos, à Romanis gladiolus, aut
iris agrestis, à Dacis apr^o diciť.

onocleia,

aliqui catanchusam vocant,
alij libycam, alii archibellion,
alii alcibiadió, alii onophylló,
alii porphyrida, alii mydusam,
alii salyca, alii noneam, Aphri
buinesath.

ECHION.

Latinis alcibacum dicitur.

vocant,

funt & qui echion appellát,
alii scorpiuron, alii sparganon,
alii althæam, alii amaranthi-
dem, alii probatæum, alii cla-
phium,

δὲ κλημάπον, οἱ δὲ ὀσμὸς, οἱ δὲ
τρέγωνος, οἱ δὲ κυβέλλιον, οἱ
δὲ πολύφυλλον, ῥωμαῖοι τριφύ-
λουμ ὀδορέχτουμ, αἰγύπτιοι ἐ-
πάφου.

201.b. II. Επὶμηδῖον,

οἱ δὲ ἔρινος, οἱ δὲ θρυάς,
οἱ δὲ πολύρριζον, ῥωμαῖοι οὐιν-
δικτα.

201.b. 23. μαχαρώνιον,

οἱ δὲ ἀνακτόριον, οἱ δὲ ἄ-
ριον, ῥωμαῖοι γλαδίστολαμ, οἱ δὲ
χρητάλεμ.

202.a 20. Σπαρ-

γάνιον,

οἱ δὲ ξιφίδιον, οἱ δὲ βῶλον
καλλοῦσι.

202.a. 27. Συεῖς,

οἱ δὲ ἱεὺν ἀγρίαν, οἱ δὲ χακὸς,
ῥωμαῖοι γλαδίστολουμ, οἱ δὲ ἱεὺμ
ἀγρέσεμ, δακοὶ ἄπερις.

202.b. 20. ὀνόκλειαν.

οἱ μὲν κατὰ γχουσαν, οἱ δὲ
λιβυκὴν, οἱ δὲ ἀρχιβέλλιον, οἱ
δὲ ἀλκιβιάδιον, οἱ δὲ ὀνόφυλλος,
οἱ δὲ πορφυεῖς, οἱ δὲ μύδουσα,
οἱ δὲ σάλυξ, οἱ δὲ νωγεὰν, ἀπερὶ
βειγεσάθ,

203.b. 19. κισιάδιον,

ῥωμαῖοι ἀλκιβιάκουμ.

204.a. 5. φιλέταιφον,

Οἱ δὲ καὶ ταύτῃν ἔχον κα-
λοῦσιν, οἱ δὲ σκορπίουρον, οἱ δὲ
σπάργανον, οἱ δὲ ἀλθαίαν, οἱ δὲ ἄ-
μαρανθίδα, οἱ δὲ περσικαίαν,
οἱ δὲ ἐλά-

οἱ δὲ ἐλάφιον, οἱ δὲ ἀντίμιμον, οἱ δὲ πορφυρίδα, οἱ δὲ αὐγίον, οἱ δὲ νεμέσιον, οἱ δὲ ὑανόφολον, οἱ δὲ θυρσίτιον, οἱ δὲ θερμούπην, οἱ δὲ μισόπαθος, ῥωμαῖοι ὠκυμάστρουμ.

204. a. 18. Erinus,

οἱ ᾧ ὠκυμοειδές, οἱ ᾧ ὑδρηρόν, ῥωμαῖοι ὠκυμουμ.

204. a. 32. Arzewis,

οἱ δὲ αἰγικόν, οἱ δὲ ἀμαξίτης, αἰγύπτιοι ἀνουφί, ῥωμαῖοι γράμην, οἱ δὲ ἀσφυλίουμ, οἱ δὲ σαγρουνάλεμ, οἱ δὲ οὐνίολαμ, ἰσπανοὶ ἀπαρεία, δακοὶ κοπίατα, ἀφροὶ ἰεβάλ.

205. a. 5. ἡράκλειαν,

πρωφῆται γόνον, οἱ δὲ αἶμα πταίνε, οἱ ᾧ οὐρά σκορπίου, Πυθαγόρας πάριμερον, ἀνδρέας ξανθοφανέα, ὀδάρης βούφθαλμον, αἰγύπτιοι σενδιονάρ, ῥωμαῖοι οὐερτούμουμ, οἱ δὲ σολεάστρουμ, ἀφροὶ ἐδῆδονιν.

205. b. 15. σιδνεῖπν,

οἱ δὲ μυειόμορφον, οἱ δὲ χιλιόφυλλον, οἱ δὲ στραπωπικόν, οἱ δὲ ἡράκλειον, ῥωμαῖοι σουσάρκλιμ βένειε, οἱ ᾧ ἀκρημ σιλάπκουμ, οἱ δὲ μιλιτάρεμ, οἱ δὲ μιλλεφόλιουμ, ἀφροὶ ἀσὴρ χιλλός.

205. b. 34. Βάτος,

οἱ δὲ κυνόςβατον, οἱ δὲ σεληνοείπον, οἱ δὲ ἀσύντροφον, πρωφῆται αἶμα πταίνου, οἱ δὲ αἶμα ἰβίως

phium, alii antimimon, alii porphyridem, alii augion, alii nemefion, alii hyanofopfolon, alii thyrsitem, alii thermutum, alii misopathon, Latini ocimastrum.

Erinus,

aliqui ocymoides, alii hydretion, Latini ocimum vocant.

GRAMEN,

aliqui ægicon, alii amaxitin, Egyptii amphi vocant, Latini gramen, aliqui asuphyllion, alii sanguinalem, alii vniolam, Hispani apariam, Daci cotiatam, Aphri iebal.

hieracleam,

Magi genituram, aut sanguinem Titani, alii scorpionis vrinam, Pythagoras parmiru, Andreas xathophanea, Osthane boephthalmon, Egyptii sendionor, Romani vertemnū, alii soleastrum, Aphri vdedonin.

fideritis,

Aliqui myriomorphon nomenclant, alii chiliophyllon, alii stratioticon, alii heracleon, Latini superciliū Veneris, alii acrofyluaticon, alii militaré, alii millesolium, Aphri stellam chilli.

Rubus,

ab aliis cynofbato, ab aliis felinorition, ab aliis asyntrophos, à magis Titani saguis, ab

Aa iij aliis

DIOSCORIDIS

aliis ibidis fanguis, à Romanis
rubus, ab aliis sentes, à quibus-
dam mora baticana, à Dacis
mantia, ægyptiis hæmoos, aliis
ametros appellatur.

Helxine,

sunt qui elitin, qui canocer-
fēā, qui amelxinē, qui eusinem,
qui amorginé, qui scuthacon,
qui psychuacon, q melāpelō,
qui cittampelō, qui cissanthe-
mon, qui anātetamenō, Latini
bulutulararu, q partheniō, qui
sideritim, qui heracliā, qui a-
griā, Ægyptii hapap, qui clibo-
dion, qui polyonymon vocēt.
Nascitur in septis, parietibus &
vinetis. Coliculoshabet aliquo
rubore coloratos. Folia mercu-
riali herbæ similia & hirsuta.
circa caules veluti exigua semi-
na, aspera, vestibibus hærētia. Ha-
bēt folia refrigerādi & adstrin-
gēdi vim. Eapropter sacris igni-
bus emplastri modo imposita
medētur: ambustis itidē, condy-
lomatis, incipiētibus furūculis,
humoribus, & inflammationi-
bus cūctis. Inunguntur etiam
succo ei⁹ vtiliter addita cerussa
ignes, & quæ Græcè vlcera her-
petas vocāt. Idē hircino adipe
subact⁹ aut ligustrino vngueto
coacta cera podagris vtilis est.
Quinetiā cōtra diutinas tusses
cyathi

ἰβέως, ῥωμαῖοι σέντες, οἱ δὲ ῥοῦ-
βουμ, οἱ δὲ μόρα βαπκαία, δα-
κοὶ μαρτέα, αἰγύπτιοι αἶμοος, οἱ
δὲ ἀμετρος.

206. b. 2. Ελξίνη,

οἱ δὲ ἐλεῖπν, οἱ δὲ κανοκερ-
σαίαν, οἱ δὲ ἀμελξίνην, οἱ δὲ
εὐσύνην, οἱ δὲ ἀμοργίνην, οἱ
δὲ σουκόταχος, οἱ δὲ ψυχούακος,
οἱ δὲ μελάμπελον, οἱ δὲ κιντάμ-
πελον, οἱ δὲ κισσάμεδον, οἱ δὲ ἀνα-
τεταμένηον, ῥωμαῖοι βουλκτουλα-
πάρε, αἰγύπτιοι ἁπάπ, οἱ δὲ παρ-
σέντιον, οἱ δὲ σιδνεῖπν, οἱ δὲ ἡρά-
κλειαν, οἱ δὲ ἀγρίαν, οἱ δὲ κλι-
βώδιον, οἱ δὲ πολυώνυμον καλῶ-
σι. φύεται ἐν φεραγμοῖς καὶ τοί-
χοις καὶ ἀμπέλωσι, καὶ σίτω,
καυλῖα δὲ ὅσιν ὑπερῶδρα. φύλ-
λα ὅμοια λινοζώσσει δασέα, πε-
ρὶ δὲ τῶν καυλοῦς οἰογεί σπερ-
μάτια τραχέα ἀνπλαμβανόμε-
να τῶν ἱματίων. Διῶαμιν δὲ ἔ-
χει τὰ φύλλα ψυκτικὴν, συπι-
κλὴν. ὅσιν κατὰ πλάσσει μύρα ἰα-
ται ἐξωπέλατα, κατὰ κνύμα-
τα, κονδυλώματα, φύγεθλα ἀρ-
χόμενα, καὶ πᾶσαν φλεγμονὴν
καὶ οἰδήματα. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῆς
μυεῖς ψιμμιδίω ἐρυσσιπέλατα καὶ
ἐρπητας ὠφελεῖ κατὰ χροῖόν μιν, καὶ
ποδάγρας σὺν κηρωτῇ κω-
πρὶν ἀναληφθεῖς ἢ τραχέως σέα-
π. ὠφελεῖ καὶ βήσσοντας χροῖώς ὁ
χυλὸς κατὰ ῥροφόμενος ἔσση κύα-
δος

δος ἢ παρεισμίους φλεγμαίνου-
ση ἀναγράφισμα καὶ διάχρισ-
μα ὠφελιμὸν ὅστι, καὶ ὠταλίαν
ἐκ τῶν ῥοδίνων ἐγγερόμενον ὠφελεῖ.

206. b. 22. Εὐπα-

τώριον,

οἱ δὲ ἢ πατώριον, οἱ ᾧ ἢ πατῆτις,
ῥωμαῖοι ἐόλου κρεμμυδαίους.

207. a. 12. Πεντάφυλλον,

οἱ δὲ πενταπέτεδες, οἱ ᾧ πεντάτο-
μιον, οἱ δὲ πενταδάκτυλον, οἱ δὲ
ψευδοτέλειον, οἱ δὲ καλλιπέτα-
λον, οἱ ᾧ ξυλόλωτον, οἱ ᾧ ξυλοπέ-
ταλον, οἱ ᾧ ἀσφαλτον, οἱ δὲ πεντά-
κοινων, οἱ δὲ θυματῆτις, αἰγύπτιοι
ὀρεφίτεβων, οἱ δὲ ἐνωτρων, περ-
φῆται ἰβείως ὄνυξ, οἱ ᾧ πλερὸν ἰβεί-
ως, οἱ δὲ ἐρμωδάκτυλον, ῥωμαῖοι
κηνκεφόλιον, γάλλοι πεμπέδου-
λα, δακοὶ περπεδουλά.

207. b. 26. ἀγρίνωπα,

οἱ ᾧ φοινικόπτερον, οἱ ᾧ ρουῶ σά-
χυος, οἱ ᾧ ὀδαλίην, ῥωμαῖοι παλο-
λεκουπίνιον, αἰγύπτιοι ἄθνον.

208. a. 16. Ροδιά,

οἱ δὲ ῥοδίδα,

208. a. 25. Ἰωπούεις,

οἱ δὲ τειμάχιον, οἱ δὲ ἀνὰ βί-
σις, οἱ ᾧ χερέδρανον, οἱ ᾧ φαίδραν,
οἱ δὲ ἰτανδένδρον, οἱ δὲ ἰγίς, οἱ δὲ
χορινόστροφον, αἰγύπτιοι φερφρά,
περφῆται κέρνου τροφή, ῥωμαῖοι
ἐκνωάλις, οἱ δὲ σάλιξ ἐκνωά-
λις, οἱ δὲ ἀνὰ βίσιον, οἱ ᾧ ἐφύδρον
καλοῦσι.

208. b. 15.

cyathi pondere vtiliter forbe-
tur. Contra inflammatas ton-
sillas etiā gargariffatur, forisq;
inungitur: & aurium doloribus
cum rosaceo instillatur.

Eupatorium,

Alii hepatoriū, aut hepatitis,
Romani volucrum maius.

Quinefolium,

aliq; pétapetes, alii pétatomō,
alii pétadactylō, alii pseudose-
linū, alii callipetalō, alii xylolo-
ton, nōnulli xylopetalō, alii a-
sphaltō, alii pétaccenō, alii thy-
miatitin, Ægyptii orphitebeo-
cen, alii enotrō, magi ibidis vn-
guē, alii ibidis pénam, alii her-
modactylō, Romani quine-
folium, Galli pempedulā, Daci
propedulam appellant.

Phœnix,

alii phœnicopterō, alii rhon-
stachyos, aliis osthalen, Ægy-
ptii athnon nominant.

Rhodia,

alii rhodida nominant.

Equisetum,

alii trimachion, alii anaba-
fin, alii cheredranon, alii Phæ-
dran, alii itiandendron, alii gis,
alii schoenioistrophon vocant,
Ægyptii pherphram, magi Sa-
turni cibum, Romani equina-
lem, alii equi salicem, aut ana-
basion, alii ephydron.

Aa iiij equise-

DIOSCORIDIS

equisetum,

aliqui equition, alii chedran,
alii gynō, romani salicē equinā
appellāt. tragium,

aliqui tragum, alii trago-
ceron, alii scorpion, alii garga-
non, Romani cornulacam, alii
bituensa, Daci saliam, Ægyptii
sober, Aphri achœosim.

Iunci,

aliquibus schoenos leuis, aliis
oxypternos, aliis solis superci-
lium, Romanis iūcus marinus,
aut manualis, Aphris chudua.

Paronychia,

aliquibus adocetus, aliis neu-
ras, aliis phynion, Latinis bui-
nalis dicitur.

Chrysocome,

aliis chryſitis, aliis chrysan-
themon, nonnullis amarāton,
aliis diospogon, Latinis Iouis
barba, Aphris dubath, aliis bur-
chumath dicitur.

Chrysocome,

aliqui chrysoſpermon vocāt,
alii daspin, alii organū, alii ar-
cophthalmon, Latini arilariā.

buphthalmos,

aliqui chalchin vocant, alii
chalcanthon, alii chalcanthe-
mon, Romani acanthā, Hetru-
ſci garuleū, Aphri churfeten.

Verbenaca,

alii trigonion, alii buniō, alii
hiero-

208.b. 15. ἐτέρα.

οἱ δὲ ἐκύποι, οἱ δὲ χέδραν, οἱ
Ἵ γύνων, ῥωμαῖοι σάλιξ ἐκινάλης.

209.a. 22. ἀγίου,

οἱ δὲ τραγός, οἱ δὲ τραγόκε-
ρος, οἱ δὲ σκορπίον, οἱ δὲ γάργα-
νον, ῥωμαῖοι κορνυλάκη, οἱ δὲ βι-
τουένσα, δακοὶ σαλίνα, αἰγυπτιοὶ
σοβέρ, ἀφροὶ ἀχοῖοσίμ.

209.b. 4. Σχίνος,

οἱ δὲ σχίνος λεία, οἱ Ἵ ὀξύπτε-
ρος, οἱ δὲ ὀφρὶς ἡλίς, ῥωμαῖοι ἰου-
κουμ μαρίνουμ, οἱ δὲ ἰουήκουμ
μαρῆαλεμ, ἀφροὶ χούδουα.

210.a. 13. Παρωνυχία,

οἱ δὲ ἀδόκντος, οἱ δὲ νευ-
ράς, οἱ δὲ φρυώνιον, ῥωμαῖοι βυ-
νάλης.

210.a. 20. χρυσκόμη,

οἱ δὲ χρυσῆτις, οἱ δὲ χρυσάιν-
δεμον, οἱ δὲ ἀμαράντον, οἱ δὲ
διδὸς πάγων, ῥωμαῖοι ἰόβις βάρι-
βα, ἀφροὶ δουβάθ, οἱ δὲ βουρ-
χουμάθ.

210.a. 20. Χρυσκόμη,

οἱ δὲ χρυσάπερμον, οἱ δὲ
δάσπιν, οἱ Ἵ δείχανον, οἱ δὲ ἀρκά-
φθαλμον, ῥωμαῖοι ἀειλά-εια.

210.b. 32. βέφθαλμον,

οἱ δὲ χαλκῆτιν, οἱ δὲ χάλχαν-
θον, οἱ δὲ χαλκανῆδεμον, ῥωμαῖοι
ἀκανθάν, δοῦσκοι γαρῆλεουμ, ἀ-
φροὶ χουρῆντα.

211.a. 25. Πειστερεών,

οἱ Ἵ περὶ γώνιον, οἱ Ἵ βήνιον, οἱ Ἵ
ιερά

ἱερὰ βοτάνη, οἱ δὲ φιλτροδότης,
αἰγύπτιοι πεμφεμπίη, ποροφῆ
ἥρας δάκρυον, οἱ δὲ αἶμα γα-
λῆς, οἱ δὲ αἶμα ἐρμού, ῥωμαῖοι
κρίστα γαλλινάκεια, οἱ δὲ φεία, οἱ
δὲ τειξάλις, οἱ δὲ ἐξούπερα, οἱ
δὲ ἔρβα σανζουινάλις.

211. b. 8. ἐκάλεισαν.

οἱ δὲ ἡειχρίον, οἱ δὲ χαμαί-
λυκον, οἱ δὲ σιδιρίπιν, οἱ δὲ κα-
εῖπιν, οἱ δὲ φεροσεφόνιον, οἱ δὲ
διδὸς ἡλακάτιω, οἱ δὲ διχρω-
μον, οἱ δὲ χέλλιπιν, οἱ δὲ ἱπ-
πάεισον, οἱ δὲ διμητειάδα, αἰγύ-
πτιοι πεμφεμπόδαμ, Πυθαγό-
ρας ἐρσίσηκπτον, ῥωμαῖοι κυκι-
νάλις.

212. a. 2. Ασράγαλος,

οἱ δὲ χαμαισύκη, οἱ δὲ ὄνυξ,
οἱ δὲ γατάλις, ῥωμαῖοι πίνουμ
τείβικμ, ὁμοίως φίκουμ τέρραι,
οἱ δὲ γλανδουλαμ, οἱ δὲ πούμ,
οἱ δὲ νωνάειαν.

212. a. 21. Τάκινδος,

οἱ δὲ ἐλώνιδες, οἱ δὲ πορφυ-
ρανίδες, ῥωμαῖοι βάκκουμ, οἱ
δὲ οὐλκίνουμ.

212. b. 3. ροιάς,

οἱ δὲ ὀξύτονον, ῥωμαῖοι πα-
παεράλις, αἰγύπτιοι ναντί.

212. b. 27. ἡμερος,

οἱ δὲ χημαισύκλω, οἱ δὲ
μύκων ροιάς, οἱ δὲ ὀξύτονον,
ῥωμαῖοι παπάβερ, αἰγύπτιοι
ναντί.

214. b.

hierobotanē, alii philtrodotē,
Ægyptij pēsemp̄te, magi Iuno-
nis lachrymā, nōnulli mustelæ
fanguinē, alij sanguinē Mercu-
rij, Romani cristā gallinacē,
alij pheriā, alii trixalidem, alii
exuperā, aliq herbā sāguinalē.

Nominatur,

alii irigenion, alii chamæly-
con, alij fideritin, quidam cu-
ritin, alii persephonion, alii Io-
uis colum, alii dichromon, a-
lij callesin, alii hipparison, nū-
nulli demetriada, Ægyptij pē-
phthenphtham. Pythagoras ery-
fisceptron, Romani cincinnæ-
lem vocant.

Astragalus,

aliqui chamæfycen, alii ga-
talen, alii onycha vocant, Ro-
mani pinum triuiā, aut ficum
terræ, aliqui glādulā, alii tium,
alii nonariam.

Hyacinthus,

aliqui heloniam, alii porphy-
rantes, Romani vaccinium, alii
vlcinum vocant.

erraticum,

nōnulli oxytonō, Romani pa-
paueralē, Ægyptij nati vocāt.
papaueris.

aliqui chamæfycen, alii pa-
pauer rhœada, alii oxytonon
appellant, Romani papauer,
Ægyptij nanti.

Cornícula-

DIOSCORIDIS

Corniculatum,

Latini fabulum marinum,
Aphri sisimacam vocant.

cognitionē.

Qui hoc papauer hauserit,
non alia accident, quàm qui
opium ebiberit. Cui eisdē suc-
curritur auxiliis. Semen æsta-
te dum siccum est, colligi-
tur. Decoctū radicis bi-
bitur cum vino, sanāt-
que dysenteriam.

Hyoscyamus,

quidam dioscyamon, alii py-
thionion, aliqui dioscyamon
vocant, alii adamanta, alii a-
damenon, alii hypnoticon, alij
emmanes, alii atomon, nōnul-
li dithiambrion, magi, Pytha-
goras, & Osthane, xeleo, Zo-
roastres tiphonion, magi rha-
pontiā, Romani inananoēn-
tariam aut apollinarem, Ægy-
ptii saphtho, Hetrusci fabulū,
Galli bilinūciū, Daci dieliam.

Pfyllion,

Aliqui cataphrysin, alii cyno-
cephalion, alii chrysalion, alij
cynomyā, alii psyllerin, alii fi-
celioticō, Sicali comidiin, Ro-
mani herbā puliarē, aut silba-
ciū, Aphri vargugum appellāt.

Solanum,

Latini strūmum vocant, alij
cacubalum, Ægyptii alle-
lo,

214. b. 14. θαλάσσιον,

ῥωμαῖοι φάβουλον μαρίνεμ,
ἀφροῖ σισιμάκη.

215. a. 5. ἐμφέρειαν.

ἐν δὲ τῷ βρωθῆναι ἢ ποθῆναι
ταύτῃ τῇ κερατῇ τὴν μήκωνα, ἐ-
πφέρον ὅσα καὶ τῷ ὁπῶ τῇ μή-
κωνος συμπιῶματα. καὶ τοῖς ἀν-
τοῖς ὑποπίπῃ βοουθήμασι. συν-
άγει ὅ ὁ καρπὸς ἐν θέρῃ ξηρὸς. ἴδ-
δὲ ἀφέψμα τῇ ῥίζῃς πίνεται με-
οῖνε, καὶ θεραπεύει δυσεντερίαν.

215. a. 31. Ὑοσκύαμος,

οἱ δὲ Διοσκύαμος, οἱ δὲ πυθῶ-
νιον, οἱ δὲ ἀδάμαντα, οἱ δὲ ἀ-
δάμνον, οἱ δὲ ὑπνωτικόν, οἱ δὲ
ἐμμανὲς, οἱ δὲ ἄτομον, οἱ δὲ
διδαμνιον. Πυθαγόρας,
Περγῆται, Ὀδανῆς ξηλεόν, Ζω-
ροάστρης τιφώνιον, ῥωμαῖοι ἰνα-
ναοεντάειρα, οἱ δὲ ἀπολλινάρις,
Περγῆται ῥάπον τιχὴν, αἰγύπτιοι
σαφθῶ, θουσκί φαβουλώναν,
γᾶλλοι βιλινουμπίαν, δακοὶ διέ-
λειαν.

216. b. 2. Ψύλλιον,

οἱ δὲ κατάρφισις, οἱ δὲ κυνοκε-
φάλιον, οἱ δὲ χρυσάλιον. οἱ δὲ κυ-
νόμια, οἱ δὲ ψύλλεις, οἱ δὲ σικε-
λιωτικόν, οἱ δὲ σικελοὶ κονιδίς,
ῥωμαῖοι σιλβάκιμ, οἱ δὲ ἔρβα
πυλικάειρα. ἀφροῖ οὐαρζουγίμ.

216. b. 34. καπνίον,

οἱ δὲ ἡμέρον, ῥωμαῖοι ἐρέμιν,
οἱ δὲ κακεβαλὲμ, αἰγύπτιοι ἀλλη-
λῶ,

καὶ γὰρ οἱ σκουβουλουμ, ἀφροῖ
ἀσπισμουσίμ.

217. b. 11. ἀλικακάβον,

οἱ δὲ δίκριον, οἱ δὲ σφύχρον
μανικόν, οἱ δὲ δορύκνιον, οἱ δὲ χαλ-
κιάδα, ῥωμαῖοι ἀπολλινάεις μί-
νον, οἱ δὲ ἔρβα οὐλπιανὰ, οἱ δὲ
δολιάνεμ, δακὰι κυκωλῖδα, ἀφροῖ
κακαβώμ.

218. a. 12. θρύον,

οἱ δὲ ἄνυδρον, οἱ δὲ πεντά-
δρυον, οἱ δὲ ἔνορον, οἱ δὲ ὀρθόγυον.

218. b. 25. κερχσίαν.

οἱ δὲ κίρχαιον, οἱ δὲ ξηράνθη,
οἱ δὲ ἀντίμιον, οἱ δὲ ἀντίμιον,
οἱ δὲ βομβόχυλον, οἱ δὲ μῖνον,
αἰγύπτιοι ἀπεμούμ, Πυθαγόρας
ἀνθρωπόμορφον, οἱ δὲ ἀλοῖτλω,
οἱ δὲ θριδακία, οἱ δὲ χάμμα-
ρον, ξωρόαρις διάμονον ἢ ἀρχί-
νλω, παρρηῖται ἡμίονος, οἱ δὲ
ζονογεῶνος, ῥωμαῖοι μάλα κα-
νίνα, οἱ δὲ μάλα τερέερια.

220. b. 18. λυκακτόνον,

οἱ δὲ κύαμον λευκόν, ῥωμαῖοι
κολομέστριμ.

220. b. 35. κώνειον,

οἱ δὲ αἶγινος, οἱ δὲ ἡδουσα,
οἱ δὲ ἀπολήγουσα, οἱ δὲ δολία,
οἱ δὲ ἀμαυρόσις, οἱ δὲ παρ-
λυσ, οἱ δὲ ἀφρων, οἱ δὲ κρη-
νιον, οἱ δὲ κοίτλω, οἱ δὲ κατε-
χουρίον, οἱ δὲ ἀβίωτον, οἱ δὲ
ἀψευδής, οἱ δὲ ἀγεόμαρον, οἱ
δὲ πιμωρόν, οἱ δὲ πολυανώδυνος,

οἱ δὲ

lo, Galli scubulum, Aphri a-
strismunim.

halicacabon,

aliqui dirciō appellāt, alii stry-
chnō manicō, alii dorycnion,
alii calliada, Romani apollina-
rem minorē, alii vlticanā her-
bam, aut opfaginem, Daci cy-
colidem, Poeni cacabum.

thryon,

alij anydrō, alii pētradriō, alij
enorō, quidā orthogyiō vocāt.

Circæam,

alij circæon, alii xeranthēs, a-
liqui antimniō aut antimion,
alii bēbochylō, nōnulli minō,
Ægyptii apemum, Pythagorās
anthropomorphō, alii aloeten,
alii thridaciā, alii cāmaron, Zo-
roastres diamonō, aut achinē,
magi hemionos, aliqui gono-
geonas, Romani caninum mā-
lum, alii terrestre mālum.

Licoctonon,

alij cyamon leucon, Latini
colomestrum.

Cicula,

Conion, aliquibus æginos,
aliis ethusa, aliis apolegusa, aliis
dolia, aliis amaurosis, aliis para-
lysis, nōnullis aphrō, quibusdā
creidion, aliis coētē, aliis cate-
chomenion, aliis abioton, aliis
apfeudes, aliis ageomorō, aliis
timoron, aliis polianodynos,

aliis

DIOSCORIDIS

aliis dardanis, aliis catapfysis,
Osthani babathy, egyptiis apē
phi, Rom. cicutā appellatur.

cynocrambe,

aliqui cynāchon appellāt, alii
pardaliāches, alii cynomoron,
alii cynoctonō, alii phaleō, alii
cynāchen, alii oligorō, alii hip-
pomanes, alii onistin, alii ophi-
oscorodon, alii cynaricam, alii
elaphocorodon, magi paraly-
fin, Romani brasicā rusticā,
aut caninam.

rhododendron,

Alii spōgiō, alii hēmostarin,
Romani rhododēdrō, Lucani
icmanem, Ægyptii schimphē,
Poeni rhododaphnen dicunt.

bulbum,

Latinis bulbus agrestis.

Helpine,

Aliqui elitim vocāt, alii cano-
cerseā, alii amelxinē, alii eufinē
alii amorginē, alii sucotachos,
alii psychuacos, alii melāpelō,
alii citāpelō, alii cissamethon,
alii anateramenon, Rom. volu-
tum laparon, Ægyptii apap.

ota,

alii anthyllion, alii myorto-
chon, alii myortosplenon, La-
tini muris auriculam, Aphri la
botholabat.

palustris,

alii agriaphacō, alii epiptherō,
Latini

οἱ δὲ δαρδανῆς, οἱ δὲ κατὰ λυξίς,
ὀσθάνης βαβάθυ, αἰγυπῆσιοι ἀπέ-
φι, ῥωμαῖοι κικυῖτα μ.

221. b. 14. κυνοκράμβη,

οἱ δὲ κυνοκτόνον, οἱ δὲ πα-
λεως, οἱ δὲ κυνάγχη, οἱ δὲ ὀλί-
γορος, οἱ δὲ ἱππομανῆς, οἱ δὲ
ὀνίστις, οἱ δὲ ὀσφισκόροδον, οἱ
δὲ κυναρική, οἱ δὲ ἐλα-
φόσκορδον, ἑρροφῆται
παρὰ λισίς, ῥωμαῖοι
βράσικα, ῥέσικα,
οἱ δὲ κανίνα.

221. b. 32. ῥοδόδενδρον,

οἱ δὲ σπόγιος, οἱ δὲ αἰμοστάρης,
ῥωμαῖοι ῥοδανόδρυς, λευκαῖοι ἰκ-
μανή, αἰγυπῆσιοι σκίμφη, ἀφρί-
λῶδοδῶφνη.

222. b. 12. ἄγριον,

ῥωμαῖοι βέλβης ἀγρέσις.

223. a. 18. πολυώνυμον,

οἱ δὲ ἐλεῖτιν, οἱ δὲ κανοχέρ-
σαιαν, οἱ δὲ ἀμελξίνιν, οἱ δὲ
σσυκόταχος, οἱ δὲ λυγούακος,
οἱ δὲ κυτάμπελον, οἱ δὲ κυσά-
μεδον, οἱ δὲ ἀνατεταμύνη, ῥω-
μαῖοι βούλουτον λαπάρεν, αἰ-
γυπῆσιοι ἄπατα.

223. b. 6. ὤτα,

οἱ δὲ ἀνθύλλιον, οἱ δὲ μυόρ-
τοχον, οἱ δὲ μυορτόσπλιων, ῥω-
μαῖοι μούεις ἀκείκουλα, ἀφρί-
λαβοδολαβάτ.

223. b. 22. τεκμαῖων,

οἱ δὲ φακὸς ἄγριος, οἱ δὲ ἐπί-
πτερον,

πλεον, ῥωμαῖοι βιπεράλις, οἱ ὅ
ἰκασμίνδονος.

223. b. 33. μέγα,

οἱ δὲ ἀειθαλῆς, οἱ δὲ ἀμειρό-
σπον, οἱ δὲ χρυσίπερμον, οἱ δὲ
ζωόφθαλμον, οἱ δὲ βυλόφθαλ-
μον, οἱ δὲ στέγνηθρον, οἱ δὲ αἰώ-
νιον, οἱ δὲ αἰχρύσον, οἱ δὲ ὀλέ-
χρυσον, οἱ δὲ χρυσάνθεμον, οἱ ὅ
πρωτόγονον, οἱ ὅ βόρος, οἱ δὲ νό-
πος, πρῶτῃ παρωνυχία, οἱ δὲ
χρυσίτις, ῥωμαῖοι κραινακούσπια,
οἱ δὲ ἰόβις κάρυλις, οἱ δὲ λεα-
πιτῆς, οἱ δὲ στυδεμμουρ, αἰγύ-
πτιοι παμφανής.

224. a. 32. μικρόν,

οἱ δὲ πετροφυῆς, οἱ δὲ βρό-
πον, οἱ δὲ θεοβρόπον, οἱ δὲ κρό-
βυσσον, οἱ δὲ χειμεινῶν, οἱ δὲ
κέρκυρία, ῥωμαῖοι βιτάλις, οἱ
δὲ ἔρβα σέμπερ βίβα, αἰγύπτιοι
ἐπεικελτά.

224. b. 7. πρῶτῃ κηρύω,

Αείζων τὸ λεπτόφυλλον, οἱ
δὲ αείζων τὸ μικρόν, οἱ δὲ πε-
τροφυῆς, οἱ δὲ αείζων ἄγριον,
ῥωμαῖοι σέμπερ βίβα.

224. b. 22. κυμβάλιον,

οἱ δὲ κῆπος ἀφροδίτης, οἱ ὅ
ῆς ὀμφαλός, οἱ δὲ στήλις, οἱ δὲ
στέγνηθρον, ῥωμαῖοι οὐμβίλικουμ
βέργεις.

225. a. 6. ληδόνος,

ὁ πηγὴ κυμβάλιον χαλκῶς,

225. a,

Latini viperalem, alii iceosmig-
donon.

magnum,

aliqui aithales, alii ambrosiō,
alii chrysispermon, alii zooph-
thalmon, alii bulophthalmon,
alii stergethron, alii xonion, a-
lii aichryson, alii holochryson,
nonnulli chysanthemon, alii p-
totonon, alii borō, alii notio:
magi paronychiam, alii chry-
sitin, Romani ceriam cuspiam,
aut Iouis caulem nominant;
alii leapedes, alii sedum maius,
Ægyptij pamphanes.

Paruum,

Alij petrophyes appellant,
alii brotion, alii theobroton,
alii crobysson, alii chimerinē,
alii cerauniam, Latini vitalem,
alii herbam semper viuam, Æ-
gyptii etieckam.

sunt,

Semperuiuū quod tenui cō-
stat folio, aliqui aizoon paruū,
alii petrophyes, alii aizoon syl-
uestre, Latini semperuiuū ap-
pellant.

Veneris,

aliis ortus Veneris, aliis ter-
ræ umbilicus, aliis stœchis, aliis
stergethron, Latinis umbilicus
Veneris dicitur,

eiusdem,

quod aliqui cymbaliū vocant.

Vrticæ,

DIOSCORIDIS

Vrticæ,

alii adicē, Latini vrticā, Egyptii sclepfion, Daci dyn appellāt. Acalyphen etiam alteram, aliqui cniphen, Romani vrticā mollem vocant.

Galiopsis,

aliis galephos, Egyptiis etopi, Latinis vrtica labeo dicitur.

Senecion,

Erigerō à latinis herbulū, aut senecio vocatur, aliās erechthites.

Muscus,

aliqui ballarin, alii iranen, Latini gnomeusilon vocant.

Potamogeton.

aliās stachyites, apud Egyptios ethéchis, Latine fatalis dicitur.

Stratiotes,

Ægyptiis tibus, magis æluri sanguis.

Verbascum,

alii phlonon, Latini verbasum, alii pheminalē vocant.

Personata,

alii apariné, Latini personatam, aut lappam appellant.

helleborine,

alii borion vocant.

Fumaria,

Capnon, aliqui corydalion, aut corion vocāt, alii syuestre corydaliō, alii capnō í hordeis, alii capniten, alij marmarité, alij

224. a. 16. κνίδν,

οἱ δὲ ἀδίκη, ῥωμαῖοι οὐρεπίχα, αἰγύπτιοι σελέφιον, δακοί, δνύ. ἀκαλύφνη τέρεα, οἱ δὲ κνίδν χαλοῦσι, ῥωμαῖοι οὐρεπίχα μόλις.

225. b. 18. γαλέφον,

οἱ δὲ γάλεφος, αἰγύπτιοι αἰδοπι, ῥωμαῖοι οὐρεπίχα λαβωνέμ.

226. a. 18. Ηειρέων,

οἱ δὲ ἐρεχθίτης, ῥωμαῖοι ἐρεβελμ, οἱ δὲ σενέκιεμ.

226. b. 18. θαλάσσιον,

οἱ δὲ βάλλαρις, οἱ δὲ ἱερήνη, ῥωμαῖοι γρωμευσίλα.

227. a. 8. Πόταμογάτων,

οἱ δὲ σταχίτην, ῥωμαῖοι φατόλις, αἰγύπτιοι ἐδέγχης.

227. a. 18. χαλκόν,

αἰγύπτιοι τιβούς, περσῆται αἶμα αἰλέρεα.

227. b. 13. Φλόμος.

οἱ δὲ φλόγον, ῥωμαῖοι βρεβάσκαμ, οἱ δὲ φημιαλί.

228. b. 31. περσώπιον,

οἱ δὲ ἀπαείνλω, ῥωμαῖοι ἀρσωνάκεαν, οἱ δὲ λάππαμ.

229. a. 19. ἐλεβοείνλω,

οἱ δὲ βόειον,

229. a. 24. καπνός,

οἱ δὲ κορυδάλιον ἢ κόειον, οἱ δὲ κορυδάλιον ἄρειον, οἱ δὲ καπνός, ὃ ἐν ταῖς κρινταῖς, οἱ δὲ καπνίτης, οἱ δὲ μαρμαρίτης, οἱ δὲ

οἱ δὲ χαπνογόριον, οἱ δὲ χελιδώ-
νιον μικρόν, οἱ δὲ περистерιον, οἱ
δὲ καθαρὰς, οἱ δὲ χαλκοκρί, ῥω-
μαῖοι ἄπιον, οἱ δὲ φυμαρία, αἰ-
γυπτιοὶ κνύξ, οἱ δὲ τούκιν.

229. b. 2. τείφυλλον,
οἱ δὲ τριπόδιον, οἱ δὲ τριφόλιον κα-
λῶσι. 229. b. 9. λίβυον,

οἱ δὲ τείφυλλον, ῥωμαῖοι τρι-
φόλιον μίνες.

229. b. 25. κύπισος.
οἱ δὲ τηλίνιν, οἱ δὲ λωτὸν μέ-
γαν, οἱ δὲ τείφυλλον, ῥωμαῖοι τρι-
φόλιον μίνες.

230. a. 24. μυειόφυλλον,
οἱ δὲ μυλλόφυλλον, οἱ δὲ τρα-
ποπικόν, οἱ δὲ ἀχίλλειος, ῥωμαῖοι
μυλλόφυλλον, οἱ δὲ συστρόφιον
βένερος, γάλλοι βελιχαχάδας.

230. b. 2. Μύρις,
οἱ δὲ κονίλιον,
231. a. 5. κίρσον.
οἱ δὲ βέγλωσσον μέγα χαλῶ-
σι, ῥωμαῖοι σπινὰ μόλις.

231. a. 21. ἀπικόν,
οἱ δὲ ἀστερίσκος, οἱ δὲ ἀστέ-
ριον, οἱ δὲ βελώνιον, οἱ δὲ ὑπόθαλα-
μιον, ῥωμαῖοι ἐγγινάλις, δακοὶ ῥα-
δίβιδας.

231. b. 3. ὀδυνός,
Γίνεται δὲ μέσον πετρῶν καὶ
τόπων τραχέων, τούτης οἱ ἀστέ-
ρες ἐν νυκτὶ, λάμπουσιν, οἱ γὰρ
μὴ εἰδότες ὅταν αὐτὴν ἴδω-
σι, νομίζουσι φάντασμα εἶναι.
εὐείσιε)

alii capnogorgiō, alii chelido-
nion micron, alii peristerion,
alii cātharida, alii calcocri, Ro-
mani apium aut fumariā, Aegy-
ptiis cnyx, alii tucin.

trifolium,
Alii tripodion, alii tribolion.
Lotus,
alii triphyllon, Latini trifo-
lium minus vocant.

Cytissus,
Aliqui telinen, alii lotum ma-
gnum, alii triphyllon, Romani
trifolium maius appellant.

millefolium,
Alii melophyllō, alii stratio-
ticē, alii achilliō, Latini millefo-
liū vocāt, aliqui superciliū ve-
neris, Galli beliocandas.

Myrrhis,
alii conilem vocant,
Cirsion,
alii buglossum magnū vocāt,
Latini spinam mollem.

Atticus,
alii asteriscum, alii asterium,
alii bubonium, quidam hyp-
thalmum, Latini inguinalem,
Daci rhatibida vocant.

liberat,
Nascitur inter petras & locis
asperis, stellares huius radii no-
ctu splendent, quapropter qui
ignari antea nō viderunt, esse
inane simulacrum arbitrātur.
Mediis

DIO SCORIDIS

Mediis faxis & asperis exit:in-
uenitur autem ab opilionibus.
Crateuas rhizotomus hæc de
ea refert: Si viridis cū axungia
vetere tundatur, contra rabio-
forum morsus, turgétia guttu-
ra, proderit, suffitu quoque fer-
pentes fugat.

Viola,

aliqui dasypodion, alii pria-
peion, alii ion syluestre, alii
cybelion, Romani fetialin, aut
murariam, aut violam purpu-
ream vocant.

Bunium,

aliqui aton, alii actinen, alii
anemosphoró vocát, magi pa-
radacry, Ægyptii erxoën, Ro-
mani scopam regiam, Aphri zi
gar, nonnulli tepso.

Chamæcissos.

alio nomine chamæleuce,
alio cissos acarpos, aut terræ
corona, aut felinitis, Latine he-
dera pluuiatica dicitur.

Buglossum,

magi æluri gonon, Osthā-
nes tzauiuchi, Ægyptii autuen-
rin besor, Romani linguam bu-
bulam, alii libanum, Poeni
asanaph vocant. Nascitur sa-
bulosis, & exæqualis in plani-
niciem locis. Colligitur Iulio
méseferúntq; contra febríu in
accessione cū tremore algo-
res vtilem:

εὐείσκεται δὲ παρὰ βόσκοις
περβάτων· καὶ κρατεύας εἰ-
ζοτόμος ἰσορεῖ· αὐτὴ χλωρὰ
κοπεῖται μετὰ ὄξυγγίς παλαιῆς,
ποιεῖ πρὸς λυσσόδυνκτους καὶ βορ-
ροκηλικούς, ὑποδυμνωμένη δὲ
φυμαδεύει θηρία.

231. b. 17. Ἴον,

οἱ δὲ δασυπόδιον, οἱ δὲ
πριαπίον ἄγριον, οἱ δὲ κυ-
βέλιον, ῥωμαῖοι σεπάλις, οἱ
δὲ μουραεῖα, οἱ δὲ βιόλα
πουρπούρεα.

232. a. 13. Βέκιον,

οἱ δὲ ἄτον, οἱ δὲ ἀκτίνην,
οἱ δὲ ἀνεμόσφορον, περφεῖται
παρὰ δακρυ· αἰγύπτιοι ἐρξώλην,
ῥωμαῖοι σκόπα ῥέμα, ἀφροῖ ζι-
γάρ, οἱ δὲ δεψώ.

232. b. 2. χαμαίχιοςτος,

οἱ δὲ χαμαιλευκή, εἰ δὲ κισ-
σὸς ἄχαρπος, οἱ δὲ γῆς σέφα-
νος, οἱ δὲ σελινίτις, ῥωμαῖοι αἰοῖε-
δερα πλεσιάπηκα.

232. b. 23. Βεγλώσσον.

περφεῖται γόνος αἰλούροιο,
ὁ δὲ αἰγῆς τζαουχει, αἰγύπτιοι αὐ-
τουένειν βέσωρ, ῥωμαῖοι λοῖγαί-
βουμ, οἱ δὲ λεβάνιν, ἀφροῖ ἀν-
σανάφ. γινώσκειται εἰς τοπεύς ὁ-
μαλούς καὶ ἀτμώδεις. συνάγε-
ται δὲ ἐν ἰουδαίῳ ἐλνί· φαν-
οῖ δὲ πρὸς ῥίγη λυσίτελεῖν·
πρὸς

πρὸς μὲν τριταῖον τὸ ἔχοντος
βυγλώτου γ' χαυλοὺς ὅλκω ἀπο
τριπώτας μετὰ τῶν ῥιζῶν, καὶ
τὸ σπέρματος τὴν βοτάνην, δι-
δου πιεῖν, τὸ δὲ τέσσαρας ἔχον-
τος τῷ τεταρτάζοντι· ἡ δὲ ἑ-
ψησις τοῦτων συν ὀίνῳ καὶ πρὸς
ἀποσήματα φάσιν αὐτὸ χρῆσι-
μεύειν.

232. b. 29. Κυνό-

γλωσσον,

οἱ δ' φυτὸν, οἱ δὲ χαβαλλάπον,
οἱ δὲ σπλινεῖον, οἱ δὲ σκόλιμος,
ῥωμάιοι λίγνα καίνε, οἱ δὲ λίγ-
νονα καίνε.

233. a. 12. Λεοντοποδιον,

οἱ δὲ ζώνυχον, οἱ δὲ αἰτώ-
νυχον, οἱ δὲ κῆμος, οἱ δὲ δα-
μναμάρη, οἱ δὲ ἰδιόφυτον, οἱ δὲ
φυτοβασίλα, οἱ δὲ κρόσσιον, οἱ
δὲ κροσόφθον, περιφῆται αἶμα
κροκοδείλου, οἱ δὲ κροκομέριον,
αἰγύπτιοι δαφνοίνης, ῥωμάιοι μι-
νέκιεμ, οἱ δὲ νεοκμάτους,
οἱ δὲ παλλάδιον, οἱ
δὲ φλάμμουλα.

233. a. 26. Υπογλωσσον,

οἱ δὲ καὶ τὸ ἀντίρρινον, οἱ δὲ
ἀνάρρινον, οἱ δὲ καὶ τὴν τὴν λυ-
χνίδα ἀγρίαν καλοῦσι.

233. b. 13. Κατανάγκη,

οἱ δὲ δαμναμάρη, οἱ δὲ διο-
νυσίας, οἱ δὲ θύρσιον, οἱ δὲ
θῆμος, οἱ δὲ κῆμος, οἱ δὲ κρό-
σιον, περιφῆται ἀρχαράς, οἱ δὲ
ἀρχόπας,

res vtilem: non tamen simpli-
citer, sed ad tertianas eam quæ
tres tantum caules protulerit;
totam cum radicibus ad ter-
tiam decoctam bibendā dant:
ad quartanas verò, quæ qua-
tuor quidem etiam decoctum
eius contra abscessus ferunt in
vino vtiliter bibi.

Cynoglossum,

Alii phyton, alij caballatiō,
alii splineion, alii scolymon,
Romani linguam canis, aut ca-
ninam appellant.

Leontopodion.

Aliqui zoonychon vocant,
alii aetonychon, alii cemos,
alii damnamenē, alii idiophy-
ton, nonnulli phytobasilam,
alii crosion, alii crosophi-
thoon, magi sanguinem cro-
codili, alii crocomerion, Ægy-
ptii daphnoenen, Romani mi-
nercium, alii palladiū, alii neu-
matum, alii flammulam.

Hyppoglossum,

Aliqui & id antirrhinō, aliis
anarrhinon, nonnulli lychni-
da agriam vocant.

Catanance.

Catanance aliquibus dāna-
mete, aliis dionysias, aliis thy-
siō, aliis demos, aliis cemos, a-
liis crotiō, magis archaras, aliis

bb

arco-

DIOSCORIDIS

arcopus, Romani herba filicula, aliis datisca, Dacis caropitha dicitur,

Tripolion.

Aliqui psiché, alii merida, alii potamogitona, alii stachyiten, Rom. caliummaré nominant.

Polytrichon,

Alii callitrichon, alii trichomanes, alii ebenotrichon, alii argion, alii corion enygron, Ægyptij epier, Romani cinnannalem, alii terræ capillum, alii superciliū terræ, Daci phithophthethela vocant.

adianton,

Aliqui pterion, alii opteron, Romani capillarem, alii pinulam, alii fidiculā, nonnulli & eam adianton appellant.

Vocant,

Latini lapam.

Ægilops,

aliquib^s sitospelos, aliis siphó, aliis bromos, Rom. auena dicit

Bromus,

aliqui siphonion, alii acrospelon vocāt, Latini auenam.

Aspera,

aliis epapitis, aliis lycathemó, aliis cynosbaton, aliis anicetó, aliis heliophyton, aliis anatolicon, aliis dytricon, aliis helide, Ægyptijs lyisthe, Ro. mergina, Hetruscis radia appellatur.

myrtus,

ἀρκώπης, ῥωμαῖοι ἑρβὰ σπικλά, οἱ δὲ δατίσκα, οἱ δὲ ἰοβισμαδίους, δακοὶ κερωπίθλα.

233. b. 32. Τριπόλιον,

οἱ δὲ ψυχὴ, οἱ δὲ μερίδα, οἱ δὲ ποταμογίτων, οἱ δὲ σαχυίτης, ῥωμαῖοι καλιμαίρης.

234. a. 13. πολύτειχον,

οἱ δὲ καλλίτειχον, οἱ δὲ τετραμαρές, οἱ δὲ ἐβενότειχον, οἱ δὲ ἀργίον, οἱ δὲ κόρειον ἐνυγρον, αἰγυπιοὶ ἐπιέρ, ῥωμαῖοι κυγκινόλις, οἱ δὲ τέρρα καπίλλους, οἱ δὲ σπυρεκίλιουμ τέρρα, δακοὶ φισοφθεθελά.

234. b. 14. ἀγτὸν,

οἱ δὲ πτέρειον, οἱ δὲ ὀπτερον, ῥωμαῖοι καπλάρεμ, οἱ δὲ πινυλαμ, οἱ δὲ φιλικλάμ.

234. b. 27. χαλῶσι,

ῥωμαῖοι λάπα.

235. a. 16. Αἰγίλωψ,

οἱ δὲ σιτόσπελος, οἱ δὲ σίφων, οἱ δὲ βρώμος, ῥωμαῖοι ἀβέννα.

235. a. 26. Βρώμος,

οἱ δὲ σιφώνιον, οἱ δὲ ἀκρόσπελος, ῥωμαῖοι ἀβένναμ.

235. b. 31. Σμίλαξ.

οἱ δὲ ἐπάπιτης, οἱ δὲ λυκαγιδεμον, οἱ δὲ κυνόςβατον, οἱ δὲ ἀνίκωτον, οἱ δὲ ἡλιόφυτον, οἱ δὲ ἀνατολικόν, οἱ δὲ δυτικόν, οἱ δὲ ἐλίδη, αἰγυπιοὶ λυιδῆ, ῥωμαῖοι μεργίνα, δακοὶ ραδία.

236. a.

236. a. 34. ἀγρία,

οἱ δὲ ἱερὸμυρτον, οἱ δὲ ὀξύμυρτον, οἱ δὲ μινθάνδα, οἱ δὲ ἄγονον, οἱ δὲ σκίγκος, οἱ δὲ μίνθη, οἱ δὲ κατὰγγελος, οἱ δὲ ἀνάγγελος, οἱ δὲ ἄκαρον, οἱ δὲ ὀκνηκρόν, οἱ δὲ κίνλυ, οἱ δὲ λειχώνη, οἱ δὲ χαμαίπιπυς, οἱ δὲ χαμαίμυρτη, βοιωτοὶ δὲ γυρλωίας, περιφῆται γόνος ἡράκλειος, ῥωμαῖοι ῥούσκουμ.

236. b. 25. σεφάνη,

οἱ δὲ δάφνος, οἱ δὲ σάμοθρακικὴ, οἱ δὲ μέθριον, οἱ δὲ ὑπογλώσσιον.

237. a. Δαφνοειδές,

ὁμοιον ἀλύπω ἀνδρός ὡς νυμφαίας, καὶ μέσον τούτῳ κώνω ἔμφερές ἐν ᾧ τὸ σπέρμα.

237. a. 26. ἐκάλεσαν,

οἱ δὲ δαφνίτιλ, οἱ δὲ ὑδράγωρον, ῥωμαῖοι λαυρόλα, οἱ δὲ λακτάγω, γάλλοι οὐσουβίμ.

237. b. 6. λευκός,

οἱ δὲ ἀσπίδα, οἱ δὲ ἀτομόν, οἱ δὲ πηγάτόξαις, περιφῆται γόνος ἡράκλειος, οἱ δὲ πολύειδος, οἱ δὲ ἀνάφυτος, αἰγύπτιοι σομφία, οἱ δὲ οὐῖρε, ῥωμαῖοι βεράτρουμ ἄλβεμ, γάλλοι λάγνον, οἱ δὲ ἀνεψά.

238. a. 35. πολυῤῥίζον,

οἱ δὲ περόπον, οἱ δὲ μελανόρριζον, οἱ δὲ κωϊράνιον, περιφῆται ζομαρίτον, αἰγύπτιοι ἰσάια, οἱ δὲ ελαφινὴ, οἱ δὲ κέμελέγ,

myrtus.

aliis hieromyrton, aliis myacantha, aliis agonon, aliis scincos, aliis mintha, aliis catangelos, aliis anangelos, aliis acaron, aliis ocneron, aliis cinen, aliis lichene, aliis chamæpitys, aliis chamæmyrte, Bœotis gyrenia, magis Herculis genitura appellatur, Latinis muscū.

Alexandrina.

alii daphnon, alii samothracicé, alii methrion, alii hypoglossion vocant.

Daphnoides,

Daphnoidei alypo simile, flos ut nymphææ, cuius mediū nuci cypressi nó dissimile, i quo semē.

Chamedaphne,

alii daphniten, alii hydragongon, Romani laureolam, alii laetaginem, Galli vsubim.

album.

aliqui ascida vocāt, alii atomon, quidā pignatoxarii, magis Herculis genituram, alii polyidos, alii anaphyston, Ægyptii somphia, alii ynre, Galli laginum, aliqui anepsa.

nigrum,

aliq melapodiō vocāt, alii ecstomon, alii polyrrhizō, alii pption, alii melanorrhizō alii cyiranion, magis zomaritiō, Ægyptii iscā, alii elaphine, alii ceme

DIOSCORIDIS

leg, Latini veratrum nigrum,
alii faraca, Daci prodiorna.

λέγ, ῥωμαῖοι βεράτρεμ νίγρεμ, οἱ
δὲ σαράκα, δακοὶ προδιόρνα.

Magnum,
aliqui sesamiten, alii sesamin,
alii lycocytalion, alii hellebo-
rum album appellant.

239.b.3. μέγα,
οἱ δὲ σπαμίτης, οἱ ᾧ σπασμῖς,
οἱ ᾧ λυκοκυτάκιον, οἱ ᾧ ἐλλέβο-
ρος λευκός, οἱ δὲ ἀγπικύρικον.

Paruo,
alii coronion, alii sesamon
agrium appellant.

239.b.17. μικρόν,
οἱ δὲ κορώνιον, οἱ δὲ σίσα-
μον ἄγριον καλοῦσι.

fyluestris,
aliqui elaterion vocant, alii
grynon, alii balin, alii syncri-
fin, alii bubalion, alii scopion,
alii pherombron, alii peuce-
danō, alii notion, Romani an-
cetum, alii agrestē, Poeni cusi-
mezar.

239.b.34. ἄγριος,
οἱ δὲ ἐλατήριον, οἱ δὲ χυ-
νον, οἱ δὲ βαλῖς, οἱ δὲ σύκρι-
σις, οἱ δὲ βουβάλιον, οἱ δὲ σκό-
πον, οἱ δὲ φέρμεβρον, οἱ δὲ πευ-
κεδανόν, οἱ δὲ νόπον, ῥωμαῖοι ἀγ-
τέτρεμ, οἱ δὲ ἀγρέτρεμ, ἀφροὶ, κα-
σιμέζαρ.

Pedicularis,
alij triphyllon, alij stesion,
alii astaphida, alii phthirocto-
non, alii phthirion, alii apan-
thron, alii polyides, alii pseu-
dopathes, alii arsenoten, Aegy-
ptii ibefacodem, Romani her-
bam p ediculariam vocant.

241.b. ἀγρία,
οἱ δὲ τείφυλλον, οἱ δὲ σή-
σιον, οἱ δὲ ἀσταφίς, οἱ δὲ φθει-
ροκτόνον, οἱ δὲ φθείριον, οἱ δὲ
ἀπαῖθρον, οἱ δὲ πολυειδής,
οἱ δὲ ψευδοπαθής, οἱ δὲ ἀρσενιο-
τή, αἰγύπτιοι ἰβησαοιδή, ῥωμαῖοι
ἱεβα πεδικουλάεις.

Thapsia,
aliqui hypopyon vocant, alii
pancranon, alii scammonion,
alii thelyterim, Romani feru-
laginem, alij ferulam fyluestrē,
Poeni boeden.

242.a.13. Θάψια.
οἱ δὲ ὑπόπυον, οἱ δὲ πᾶγ-
κρανον, οἱ δὲ σκαμμώνιον, οἱ δὲ
θυλυτέρεις, ῥωμαῖοι φερυλάγω,
οἱ δὲ φερυλα σιλβέρις, ἀφροὶ
βοίδνω.

Spartion,
aliqui lygō, alii lobō appellāt,
Narcifsum,
aliqui narcifson anydrō, alii
autogenes,

243.a.21. Σπαρτίον,
οἱ δὲ λοβόν, οἱ δὲ λύγον καλοῦσι.
244.a.12. Ναρκισσός,
οἱ δὲ νάρκισσος ἀνύδρος, οἱ δὲ
αὐτογενής,

αυτογενές, οἱ δὲ βολβός ἐμεπκός,
οἱ δὲ λείριον, ῥωμαῖοι βούλβους
morbitarius.

244.b.7. Ἱπποφάες.

οἱ δὲ ἵπποφυές, οἱ δὲ ἵππο-
φανές, οἱ δὲ ἵππιον, οἱ δὲ ἐχι-
νιον, οἱ δὲ πελεκίνος, ῥωμαῖοι
λαππάγω, οἱ δὲ λαππολάμερα
χαλῆσιν.

245.a.22. τῶνα,

αἰγύπτιοι σύδαμνα, οἱ δὲ τεί-
ξι, περσῶται αἶμα πυρετῶ, ῥω-
μαῖοι ρικίνεμ, οἱ δὲ λῆπα.

247.b.35. ρίζαν,

ὡ χαλῆσι τῆρπετ.

249.a.12. συκλῶ,

οἱ δὲ μήκιογα ἀφρώδη.

249.b.2. Σκαμμωνία,

οἱ δὲ σκαμβωνίας ρίζα, οἱ
δὲ κολοφωνία, οἱ δὲ δακτύλιον,
ῥωμαῖοι κολοφώνιον, περσῶ-
ται ἀποπλεῦμονος, αἰγύπτιοι
σάγιλουμ.

250.a.35. χνίδειος,

οἱ δὲ χαμελαία μέλινα, οἱ

δὲ ἡράκλειον, οἱ δὲ βδέ-

λυρῶ, ῥωμαῖοι κιτοκά-

κιουμ, οἱ δὲ ἐλεά-

γῶ, οἱ δὲ ὀλοα-

τέλλουμ.

251.a.18. Ἀκτὴ,

οἱ δὲ δένδρον ἄρκτου, οἱ
δὲ ἡμερον, ῥωμαῖοι σαμβού-
κουμ, γάλλοι σκοβίμ, δακοὶ
σέβα.

251.b.

autogenes, alii bulbon emeti-
con, alii lirion, Romani bulbū
morbitarium dicunt.

Hippophaes,

alii hippophyes, alii hippo-
phanes, alii hippion, alii echi-
nion, alii peleciton, Romani
lappaginem vocant, alii lappo-
lam minorem.

croton,

Ægyptii systhāna, aliqui trixin,
magi sanguinem febris, Latini
ricinum, alii lupam.

radice,

quam turpet appellant.

Sycen,

alii mecona aphroden.

Scammonia,

aliquibus scambonia radix,
aliis colophonia, aliis dacty-
lion, Romanis colophonium,
magis apopleumonos, Ægy-
ptij fanilum dicitur.

Chamelæa,

alii chamelæa nigra, alii py-
ros achnen, alii heraction, alii
bdelyram, alii coccon gnidiō,
Romani citocacium, nonnul-
li oleaginem, quidam oleastel-
lum vocant.

Sambuci.

Acten aliqui dendron ar-
ctu, alii hemeron, Latini sambu-
cum, Galli scobiem, Daci sebā
vocant.

Bb iij Vocat,

DIOSCORIDIS

Vocatur.

aliis heliosacte, aliis agria
acte, aliis euboica, Gallis du-
cone, Dacis oliua.

Apios,

Latini radicem syluestre, Poe-
ni thorphathsadæ appellant.

Colocynthis,

Zoroastri thymbra, Ostani
autogenes, Romanis cucurbi-
ta fyluatica, Dacis tutrastra di-
citur.

Epithymon,

alii cedoes, Romani inuolu-
crum vocant.

Vocant,

alii bucranion, Romani ob-
lameniam, alii batanutam, alii
betifalcam, Daci priadelâ, alii
pegrinam, Aphri lauothem.

Filici,

alii pterion, alii pterineon,
alii dasyclonô, alii anasphorô,
alii blechnon, alii polyrrhizon
vocant, magi hermubain, Ro-
mani filicem, alii laculam, alii
filiis fanariam, Ægyptii asini
fanguinem.

Foemina,

Latini linguam ceruinam
vocant.

Filicula,

aliqui scolopédriion, alii pte-
rin, alii polyrrhizon, Latini fi-
liculam vocant.

Dryopte-

251. b. 8. καλεῖται.

οἱ δὲ ἐλιοπακτὴ, οἱ δὲ ἀγρία
ἀκτὴ, οἱ δὲ εὐβοϊκὴ, ῥωμαῖοι ἑβ-
λεμ, γάλλοι δὲ κοντὲ, δακοὶ ὀλμα

252. a. 31. ζώσις,

ῥωμαῖοι ῥάδιξ σιλβέστis, ἀ-
φροὶ πορφαθσαδοί.

252. b. 19. ἀλέξανδρίνη,

ζωρῶστis δὲ μύβρι, ὁ δὲ ἀγνὴς
αὐτογνὴς, ῥωμαῖοι καυκούβρι-
τα σιλβάπικα, δακοὶ τούτσα-
πρα.

253. a. 17. Εὔθυμον,

οἱ δὲ κεδὸς, ῥωμαῖοι ἰμβόλη-
κραμ.

255. a. 5. πέλων,

οἱ δὲ βεκράνιον, ῥωμαῖοι ὀβλα
μύβια, οἱ δὲ βατανέτα, οἱ δὲ βε-
πυάλικα, δακοὶ ποριαδήλα, οἱ δὲ
πεγρίνα, ἀφροὶ λακοθέν.

255. a. 29. λυῖρριζον,

οἱ δὲ πτερίον, οἱ δὲ πτερί-
νεον, οἱ δὲ δασύκλωνον, οἱ δὲ ἀνδ-
σπορον, πορφῆται ἐρμου βάιν,
ῥωμαῖοι φιλισφαναεία. οἱ
δὲ λακῆλλα, οἱ δὲ φιλι-
κὲμ, αἰγύπτιοι αἰ-
μα ὄνου.

255. b. 21. πτερίν.

ῥωμαῖοι λίγγα κερβίνα.

256. a. 8. Πολυπόδιον.

οἱ δὲ σχολόπενδρον, οἱ δὲ πτε-
εῖς, οἱ δὲ πολυῖρριζον, ῥωμαῖοι πο-
λίκελα λίκε τάλις.

υ56. α.

256. a. 28. Δρυοπτέρις,
οἱ δὲ πτερίον, οἱ δὲ νυμφαία
πτέρις.

256. b. 34. Δηόζωσις.
οἱ δὲ ἄργυρος, οἱ δὲ ἀει-
τελλίς, οἱ δὲ χερυσις, αἰγύπτιοι
ἀφλοφός, ῥωμαῖοι ἔρβα μερκυριά-
λις μάσκυλα, οἱ δὲ τρωσκουλά-
τα, ἀφροὶ ἀσουμές.

257. a. 25. Ἄρριον,
ἀφροὶ ἀρμάς, οἱ δὲ ἀσου-
μέσλαβον.

257. b. 3. μέγα.
οἱ δὲ σκορπίουρον, οἱ δὲ ἡ-
λιότροπος, οἱ δὲ διάλιον, οἱ δὲ
ἡλιόπου, οἱ δὲ σκορπιοκτόνον,
οἱ δὲ σήσαμον ἄγειον, οἱ δὲ σκορ-
πίου οὐράν.

258. a. 3. μικρόν,
οἱ δὲ σκορπίουρον.
290. a. 32. Λάβρασον,
οἱ δὲ γυναικείον, οἱ δὲ χαλ-
κηδόνιον.

352. b. 23. τρόπος,
Πρὶ ῥάμνον.
Τὴν ῥάμνον λῦ τις ἀφ' ἐν λῦ-
φοσελῶν καὶ βασιλῆς, ὅφελει
πρὸς φάρμακα καὶ πρὸς ἀνδρώ-
ποις φαύλοις ἁρμόζει δὲ φο-
ρεῖν αὐτὴν δρέμματα καὶ παλ-
οὺς ὡς πίνεσθαι ὅφελει δὲ καὶ
πρὸς πόνον κεφαλῆς καὶ δάκρυ-
μας, καὶ ἐπιπομπάς.

Πρὶ ἀρτεμισίας.
Ἀρτεμισίαν τὴν βοτάνην εἴ τις
ἔχει

Dryopteris,
aliqui pterion, alii nymphæa
pterin nominant.

Linozostis,
alii argyren, alii aritrilin, alij
chrysitin, Ægyptii aphlopho,
Latini mercurialem mascu-
lam, alij tessculatam, Aphri
asumes.

cynocrambe,
Aphris harmas, aliis asumes-
labon dicitur.

Magno,
aliqui scorpiuron vocant,
alii heliotropon, alii dialion, a-
lii heliopon, alii scorpiocto-
non, alii sesamon agrion, alii
scorpij vram.

paruum,
alii scorpiuron vocant.
Platyophthalmon,
alii gynæcion, alij chalce-
donium.

se habent.
De rhamno.
Rhamnum si quis eruat fi-
lente luna, & secum ferat, cō-
tra venena & improbos homi-
nes proderit : pecoribus iu-
uandis appenditur : nauigiis
circumponi solet : va-
let cōtra capitis do-
lores & laruas.

De artemisia,
Artemisiam herbam si quis
Bb iij teneat,

teneat, dum iter facit, lassitudinem discutiet: & si in pedibus ferat, bestias & lemures abiget: si sanguis circa artus coaguluerit, ramulos de rosaceo in olla feruefacito, & locum totum oblinito, cum somno indulgendum est: strangulatus vuluæ mirum in modum auxiliatur: urinæ stillicidia & opisthotonum leuat.

De Pentadactylo,

Pentadactylum si quis circum corpus portet, nullo dolore afficietur: oculos, strumas, callosos tonsillarum tumores, vnam, articulos sub lingua, nervorum dolores & dentes, peroram perniciali fame contristam iuuat: remoratos à partu menses eiicit: infusa manibus ex aqua tepida contra terrores, fascinum, & laraas, mirum in modum commedatur. Vellito herbam, cum luna crescit, oriente sole.

De verbenaca,

Verbenata recta genitale intendit, sed supina exiccat. Recta appesa doloribus oculorum auxiliatur: contra hebetudines eorundem, & capitis dolore efficaç est, trita ex aceto lassitudinem reficit. Strumas, callosos faucium tumores statim discutit: febrium

ἔχει ἐν ὁδῷ, λύει τὸν κάματον καὶ ἐν τοῖς ποσὶν ὁ φορῶν, θηρία δίδωκε καὶ δαίμονας. αἶμα δὲ ἐπὶ τὰ ἄρθρα σκίρρωσιν κλωνία λαβὼν μείζω μετὰ ῥοδίνου, καὶ ποιήσας ζῆσαι εἰς χύτραν, σύγχει τὸ πονοῦντα ὅλον, ὥς ὑπὸ γῆ κοιμᾶσθαι. καὶ ὑστερηαῖς γυναιξὶ πάλιν βοκῶν: σπαραγμοῦ εἰαν παύει, καὶ ὀπίσσω τίνου ῥῆγμα.

Πρὶ πενταδάκτυλου.

Τὴν πενταδάκτυλον εἰ τις φορεῖ, πάλιν τὸ σῶμα, ἀπορος μὲν ἐστὶν, ὁφθαλμοῖς ὠφελεῖ, χοιράδας, ἀντιάδας, αἰσουλὴν, καὶ τὰ ὑπὸ τῷ γλῶσσῳ ἄρθρα τὰ καὶ νεύρων ὀδυνάας καὶ ὀδόντας, ψώραν ἐκλημμοκτονίας. δοχῶν ἐμμένα κατὰ σπασμὸν. ἐν ὕδατι δὲ χλιαρῷ περὶ σκληρομυῖαν εἰς τὰς χεῖρας πρὸς φόβοις καὶ βασανισίας καὶ δαίμονας ὅτι πάνυ καλὴ. διὸ λάμβανε τὴν βοτάνην ὅτε αὐξέει ἡ σελήνη, ἡλίου ἀνατέλλοντος.

Πρὶ περὶ σπασμῶν.

Περὶ σπασμῶν ὁ μὲν ὀρθὸς τεύχει τὸ αἰδοῖον, ὁ δὲ ὑπὸ πῖος ξηραντικὸς ὅστιν. ὠφελεῖ δὲ ὁ ὀρθὸς περὶ σπασμῶν πρὸς πόνους ὁφθαλμῶν. πειρᾷ πρὸς ἀμβλυωπίαν καὶ κεφαλῆς πόνον, καὶ κάματος πάλιν περὶ σπασμῶν μετὰ ὄξους. χοιράδας, ἀντιάδας παραχρῆμα παύει. ὅτε

ὅτι δὲ τις φεικιά, ἀπὸ ταύτης,
κλωπία λαβὼν, κατέναντι στήθω ᾧ
φεικιδόντος μόνον, καὶ ἐνδὺς δε-
ραπύεται.

Πεὶ δίκταμνον,

Τὴν δίκταμνον ξηράνας, τέ-
νον ἐν ταῖς χεραῖς σου, καὶ ὡς δῶφι-
τον, ποιήσας, καὶ βαλὼν σαλευμὲν
οἴνου, ὅτε γὰρ τὸ σῶμα ἴσως παύ-
ται ἢ τὰ ἐρπετὰ ἀρμόζει· ἔλκεα ᾗ
καὶ τὰς σαρκὰς νομὰς πλῆρῃ
παρακαταίρῃ καὶ σκολοπιδήτης
παρατάπλῃ, καὶ ἐνδὺς ὡ-
φελήσεις· πρὸς σπλῆννα δὲ καὶ
τὰ ἐν κρυφίοις τόποις παύει φλεγ-
μαίνοντα, κατὰ πλῆσιν, ὡς ἄλ-
φιτον ποιήσας, αἶρε δὲ τὴν βοτά-
νην ἕξει καὶ ἐν τοῖς καύμασι καὶ
ἐν τῷ φθινοπώρῳ.

Πεὶ ἐλελίσφακον.

Ελελίσφακον λυεῖ ψυχμὸν, βή-
χα· πρὸς πάντα ᾗ τὰ κακὰ ἔλκεα
συν ῥιθίνῳ καὶ κηρῷ κηφθέν ὠφε-
λεῖ. σπλῆνός πόνον καὶ δυσεντε-
ρίαν θεραπεύει πινόμενον μετ' οἴ-
νε λευκοῦ ἐξίσου· πᾶς αἱμοπτοι-
κοὺς παραποτίζόμενον θεραπεύει·
καὶ πρὸς πάντα ποιεῖ λόχα γυναι-
κός· αἱ κήκισται δὲ γυναικὲς πεσ-
σόν ἐξ αὐτῆς ποιήσασαι, πρὸς
δύσιν καὶ ἐκβάρυνσιν ἔμβρυα.

Πεὶ κυπαρίσσου.

Κυπαρίστος βοτάνη ὠφελὲς
πρὸς βρογχίτις καὶ ὀπία, καὶ
αἰτιάδας, καὶ ὑδρωπὶ καὶ ἰσχά-
δας

febrium horrores sanat, si quis
solum ex aduerso stans ramu-
los tenuerit.

De Dictamno.

Dictamnnum siccatum ma-
nibus terito, & redigēs in fari-
nam adiecta vini stilla, cor-
pus tangito: siquidem contra
omnes serpentium iniurias au-
xiliatur: ulcera & putrescentes
nomas præpurgās explet: ada-
ctis corpori aculeis oblitur,
vt præsentī sit auxilio: ad lie-
nem & in abditis locis vitia
inflammatione turgentia, re-
daetum in farinā illinito. Her-
bam vere, magnis æstibus, au-
tumnōque eruito.

De Saluia.

Saluia singultū tussimq; discu-
tit: omnibus malis vlceribus cū
cera & rosaceo sumpta auxi-
liatur: lienis dolorem dysente-
riamq; pota cū vino albo pari-
modo sanat: sanguinē excrean-
tib; potu medetur: ad extrahē-
da vuluæ onera efficax est: pes-
simæ mulieres pessū ex ea sub-
iiciunt, vt partus excutiant.

De cupresso.

Cupressus herba contra rau-
cedines auriculāsque prodest: in-
duratos tonsillarum tumores,
aquam inter cutem, & coxen-
dicum

DIOSCORIDIS

dicum cruciatus perfanat.

De centaurio.

Centauriū contra inflāmata vitia & pulsantes ict^{us} valet: foe minis vuluæ malo laborātibus auxiliatur: stillicidij vrinæ, calculorumq; tormēta leuat. Herbam vere oriente sole legito.

De buphthalgo.

Buphthalmū crescēte luna legere oportet. Facit autē cōtra pauores, laruas, & mala medicamenta, fascinationes, vtpote cum eas auertat. Radicē si quis mandat, dentē expuet, fluxionemq; confestim sistens, auxiliatur: quin & ventrē resoluit.

De pæonia.

Pæonia herba per æstus Caniculæ ante solis ortum vellitur: appensaquē contra venena, fascinum, pauores & laruas prodest: item contra febrem cum horrore venientē, diutinam nocturnāmve, & aduersus tertianam. Proditur lemures à monte, in quo nascebatur, fugassē.

De Moly herba.

Moly herba si secta radice feratur, veneficiorum & fascinationis amuletum est.

De Marina quercu.

Marinā quercum cum rosaceo & oleo misceto, & faciē illinito

δασ δε ραπύει.

Περί κενταυρίου.

Κενταύριον ὠφελεῖ πρὸς φλεγμαίνοντα πάθη, καὶ κρούσιμα πληγῶν· ὑστερικῆς γυναιξὶ βοηθεῖ, σπαραγμοῦ τὰς τε παύει καὶ λιδοῦντας. αἶρε δὲ τὴν βοτάνην ἐν ἔαρι ἡλίου ἀνατέλλοντος.

Περί βουφθαλμοῦ.

Τὴν βέφθαλμον σελήνης ἀυξανούσης λαμβάνειν δεῖ, ποιεῖ δὲ πρὸς φόβους καὶ δαίμονας καὶ βασκοσιύας, καὶ φάρμακα καὶ ταῦτα ἀποσφύουσα. καὶ ὁδόντα εἰ πῖς ποτὶ τὴν ῥίζαν μαροσσιμύκτος ἀποπῆσει, ἐκ τούτου τὸ ρεύμα σέληναι ὠφελεῖ· λύει δὲ καὶ γαστέρα.

Περί παιονίας.

Παιονία βοτάνη αἶρεται ἐν τοῖς κυνόκαρμασι πρὸς τὸν ἥλιον ἀνατεῖλαι, καὶ κρεμάται· καὶ ὠφελεῖ πρὸς φάρμακα καὶ βασκοσιύας καὶ φόβους καὶ δαίμονας, καὶ ἐπιπομπάς· καὶ εἰς πυρετὸν ἐκ φεικισσέως νυκτερινόν τε καὶ ἡμερινόν, καὶ τεταρταῖον. λέγεται δὲ ὅτι ποτὲ ἐν τῷ ὄρει ἔνθα ἦσαν δαίμονες φρεῖσαι, τούτοις ἀπεδίωκεν.

Περί μώλεως.

Μώλυ βοτάνη ῥίζοιο μηδεῖσα καὶ πρὸς τὸ σῶμα φορεμένη, ὠφελεῖ πρὸς φάρμακα καὶ βασκανίαν.

Περί ἐναλίας δρυός.

Τὴν ἐναλίαν δρυῶν ὅταν ἡ σελήνη λήγῃ, μίξον καὶ ῥοδίον καὶ χαῖμα καὶ χεῖρον

χρίσιν σου τὸ πρόσωπον, ὅταν ἐπὶ
 ἀνάγκῃ ἀπέλθῃς, ζῶονεν ἡ
 καὶ παιδίαν ἐκ τῆν κοιλίαν φορε-
 μένη, καὶ πρὸς τοὺς φόβους τοὺς γι-
 νομήτους ἔχει καὶ νύκτα, καὶ πρὸς βα-
 σκανίαν τὴν καὶ ταὶ τὰ κακὰ ὁ-
 φελεῖ, καὶ τὸ σῶμα φυλάσσει· ὅσον
 γὰρ οἱ βασκανοὶ ἀφελήσασιν, μέμ-
 νον, ἐρχομένων δὲ αὐτῶν ἐγγίς,
 ἀνοίγει τὸ χάρος.

Περὶ χρυσανθέμου.

Τὸ χρυσανθέμον εἴθερ' αἴρης ἐκ
 τῆς γῆς πρὸ τῆς ἡλίου ἀναίελλαν καὶ
 ἀεὶ ἀπὸ τῆς τῷ σώματι, καὶ ἐκ τῆς βα-
 σκανίαν ἀποκρημαῖς, ὡφελὲς ἀποσέ-
 φον ταῖς φαρμακίαις γυναικας, καὶ
 πάντας τοὺς βασκανοὺς.

Περὶ ἐρύσιμου.

Ερύσιμον λεῖον μετ' οἶνον πρὸς
 κοιλίας πόνον πινέτω· ἐὰν δὲ κόπ-
 κοὺς ζ' εἰς οἰκίαν βάλῃς, ἀλγυ-
 χία ἔσται.

Περὶ ἐλλεβορίνης.

Ελλεβορίνη, οἱ δὲ ἐπιπακτὴς,
 οἱ δὲ βόειον. Σαμνίσκος ὅτι μι-
 κρὸς, ἐλάττω φύλλα ἔχειν. Πί-
 νεται πρὸς πᾶν θανάσιμον, καὶ
 πρὸς τὰ ἐν ἡπατι πάθη.

illinito, cum ad negotia te con-
 feres vegetiores reddit pueros,
 imo ventri appensa & ad ar-
 cēdos pauores nocturnos ma-
 nu teneto. Contra fascinum,
 & omnia maleficia prodest:
 corpus tuetur: cum enim fasci-
 nantes recedunt, arescentem
 ramulum occludit, & cū pro-
 pius accedunt, aperit.

De Chrysanthemo.

Chrysanthemon si terra an-
 te folis ortum eruatur, & col-
 lo appendatur, veneficas mu-
 lieres, omnesque fascinantes
 amolitur.

De Erysimō.

Erysimon cum vino tritum,
 aduersus ventris dolorem bi-
 bitur: si quis grana septem do-
 mum iniecerit, rixæ & iurgia
 concitabuntur.

De Helleborine.

Helleborine, aliquibus epipa-
 ctis, aliis boion dicitur. Frutex
 est exiguus, minimis foliis con-
 stans. Bibitur cōtra omne ve-
 nenum, & iecinoris vitia.

ΤΕΛΟΣ.

FINIS.

LECTORI.

CUM multum dissidentia inter se quibusdam in locis vetera horum librorum exemplaria inuenerim, nec facile statuere fuerit, quæ potissimum lectio vera sit, satius esse duxi restitutis iam illis locis, quos me tutò emendare posse putavi, hoc quoque in quibus maior scrupulus inest, adnotare, (quanquam in his etiam sunt varietates quædam, quæ parum sententiam immutant) ut omni re cognita possit unusquisque, quod ipsi melius videbitur, sumere. Neque verè codicū tantum in hac diligentia fidem spectavi, verum etiam, quam scripturam sequuti sint, qui olim in Latinum sermonem hos libros cōuerterūt, animaduerti, Pliniū, dico, Serapionē, Veterē interpretē, Hermolaum Barbarū, Marcellum Virgilium, & Ioannem Ruelliū. Et quoniā medici omnes ambitiosè multa ex hoc auctore sumpserunt, legimus etiā eorum commentarios, ut quod exemplar hi sequuti essent videremus. Omnino effecimus, ut multis locis obscuris lux afferretur, & quæ peruersè descripta essent emendarentur. Vale.

Primus numerus folium significat: secundus paginā: tertius versum, in quo est asteriscus. quo indicamus vel locum corruptum, emendatum esse, vel variam huius esse scripturam.

Fol. 4. pag. 1. vers. 12. alter codex manu scriptus *εἴπαντα*, sed leue est discrimen.

4. 1. 20. hæc verba sic leguntur in duobus exemplaribus manu scriptis *δευτέρα δὲ ἡ λευκὴ, λευκὴ κατὰ χροὶαν πικρὰ πρὸς γένεσιν, παλαιούμεναι*, &c. quæ interpretes omnes expresse-
runt.

Fol. & pag. eadē, vers. 28. hic locus sic legitur in veteribus libris, *καθαίρεισι δὲ πᾶσι καὶ χροαὶς ποπιζόμεναι*, &c. Quam scripturam sequuti sunt Hermol. Barbarus, Marcell. Vergilius, & Ruellius. Vetus tamē vocē *πᾶσι* rectè omisisse videtur, quòd ut ego quidem arbitror, si ea vox legatur, perissologia quædā sit,

fit, Nam τὸ πῶν ὑγερῶν παρὰ satis his verbis, quæ paulò superius scripta sunt, καὶ τὰ δυσανάγνωστα ὑγερὰ λεπιοποιεῖσθαι exprimitur. Significat enim auctor, vt Paulus Aegineta interpretatur radices Iridis εὐαναγρῶν ποιεῖν τὰ κατὰ τὴν φύσιν.

5.1.9. alter codex scriptus manu, καὶ εἰς ἐγκρίσιμα ὡς ἱρις περὶ τὰ γυναικεία ἀρμόζει, quā scripturā vetus interpres sequutus est.

Fol. eod. pag. 2. vers. 24. vterque antiq. βονδεῖ.

6.1.1. alter codex hanc scripturam habet ὁ διαμασσηδὲν κρόκωδες εὐείσκειται, quam scripturam Plinius & Hermol. Barbarus retinent.

7.1.19. In vtroq; libro manu scripto hoc loco est ἀγιονάσαι sed opinor legendum in omnibus exemplaribus σαλίονα.

8.1.15. alter codex ἐφ' οἷς τὸ σπέρμα εὐικός γιγάρτω, ἔχον καύλια γυναικεία ὑποβρέα, ἀρὰ δὲ, ῥίζαι, &c. quam scripturam Hermol. Barbarus, non sine iudicio sequutus est, quod omnia hæc in asaro comperiantur.

Fol. & pag. ead. vers. 27. In altero veter. exemplar. scriptum est ἐξείνους, id est, apud Vestinos, quam lectionem probamus, propterea q̃ Dioscoridis tēpore ager Iustinensis nondū erat.

9. 2. 11. veteres libri βλαστὸς μωσυλητικὸς, quæ lectio placuit Hermol. Barbar. In plinij exemplaribus scriptum est Mosisilicus portus, quod cinnamomum conuehitur.

Fol. & pag. ead. vers. 15. Antiq. δάρκα, quod Hermol. probat.

10. 2. 10. hic locus sic legitur in altero codice manu scripto ἔχον ῥίζαν καὶ σίζουσαν, πέμπον τὴν ὀσμὴν, ὑποκίρρον, καὶ περὶ σιμφορῆ τὴν φλοιὸν καὶ σιζὰ πυρρῶν, sed vulgata scriptura verior est.

11. 1. 27. veteres codices, δειγανίζον, quam scripturam vetus interpres & Hermol. expresseferunt.

Fol. eod. pag. 2. vers. 28. alter. ἔχοντα τὰς ἰδίους κλάδους.

13. 2. 24. In altero veter. codic. hic est initium capitis, cuius titulus est περὶ ξυλοβαλσάμου.

14. 2. 20. hic asteriscus debuit præponi his verbis καὶ περὶ τὰς ὀζάνας, vt significetur ea nō esse in vtroque veteri exemplari, quæ etiā vet. interp. & Hermol. Barb. non agnoscunt.

15. 1. 13. vera huius loci scriptura est in altero veteri codice,

in qui

in quo hæc verba legimus καὶ ἀρεσίας, εἰκοὸς θυῖνῳ ξύλῳ, quæ Hermol. placet. Quid sit autem θυῖα lege apud Theophrast. Cap. 5. lib. 5. de histor. plant.

16. 1. 17. variant hic exéplaria: alia enim ἀνελλιπὴς διὰ τῆς ἰ. in tertia syllaba habent. alia verò διὰ τῆς ἡ. vt sit ἀνελλήπις, id est, situm nō olens, quam posteriorem scripturam veram esse ex Plinio facile intelligi potest.

Fol. eodé, pag. 2. vers. 9. In altero exéplari hæc verba hicle-
guntur, θείαυαλος μὲν οὐκ φησὶ μόνον ἐνώδη αὐτὸν, οἱ δὲ καὶ θανάσι-
μοι, εἰ πλείν τις δῶ αὐτῷ < γ'. μεθ' ὕδατος, καὶ δὲ τὸ ἀληθὲς ἔχει δύ-
ναμιν, &c. Quæ verba sic Hermol. cōuertit. Theffalus odoratū
modo croci existimat, sed auctores quoque habentur, qui
venenum id faciant, vtiq; si drachmis tribus ex aqua biba-
tur, Re vera autem emollit, &c.

17. 1. 17. In altero hic locus sic scriptus est τοιοῦτο δ' ἐστὶ ἀπὸ
συνείας. Quam lectionem Serapio & Hermolaus agnoscunt.

19. 1. 17. alter χερῶνται δὲ αὐτῷ αἱ γυναικες ἐπὶ τῷ περὶ σπλάγχνω, quæ lectio placet Hermol.

Fol. eod. pag. 2. vers. 14. Locus hic ita legitur in veteri ἀλλ' καὶ
κοιλίαν ὁ μὲν χυμὸν καὶ χολῶδες. Plinio legisse tātū videt χολῶδες.

21. 2. 9. alter veter codicum. καὶ βρεχομένου ὕδατι θέρμα, quæ
lectio verior est, quam etiam in actuarij lib. . περὶ συνθέσεως
φαρμάκων inuenies.

22. 2. 24. vterque vet. αἰεὶς δὲ ὅσιν ἡ τοιαύτη διάκρισις, quam
scripturam Hermol. sequutus est.

Fol. & pag. eadem, vers. 29. alter συγγυμνασία.

23. 1. 7. In codice quem aldus typis expressit hæc verba
huic loco adscripta sunt ἡ κύπερον λίτταν ἀ. ἐλενίου λίτταν ἀ.
καλάμου λίτταν ἀ. ἐλαίου ξέσας σ'. ῥόδων ξέσας ας', quæ in neutro
codice veteri inueniuntur.

23. 2. 17. veteres cod. . πρὸς τὸ μὴ ὀζειν, quod interpretes re-
cte sequuti sunt. Sal. enim (vt Plinius ait) additur, vt olei na-
tura coërceatur.

24. 1. 17. verior est scriptura in altero codice, ἡ ψοιάδων πα-
λαιά.

Fol.eodem,pag.2.verf.2.legendum est *πινοκάμπας*, vt vetera exemplaria habent.

25.1.3. alter *ἐν δακτύλῳ*.

26.1.23. antiquius alter *κόλποις παλῶν*, sed vulgatam scripturam sequendam arbitror, quam Actuarius in lib. *πὲρ συνδέσεως φαρμάκων* conseruauit.

30.1.22. In altero codice manu scripto hæc verba non leguntur, *χοίνω, χαλάμα, ἡδυναιμόων δὲ ἀμαράκη, κόστα, ἀμόμω, γάρδω, καρποεὶς πάμω*, sed Paul. Aëtius, actuarius, & Nicol. Myrepsicus, qui amaricini descriptionem ex hoc loco sumpserunt, vulgatam scripturam antiquam esse ostendunt.

31.2. alter, hoc loco hæc verba non habet *καὶ ῥήτῃς*, Sed Aëtius & Actuarius ea legisse olim videntur, Id tamē vini in Aëtio Latino factō, in huius vnguenti descriptionem, quod Zingiber pro Smyrna male scriptum sit Qui error ex eo natus est, quod interpretes hanc notā ζζ esse *ζυγμίσσεως* esse putaret, qua tamen medici smyrnam semper exprimunt.

32.2.12. In altero hic caput est *πὲρ ἰασμίνου*.

34.1.14. Scriptus alter *μαφαρὲς*, quā Plinius probauit, & ob id retinendam arbitror.

37.1.7. hæc verba sic leguntur in altero manu scripto, *ὑποπιδέναι ἄδρους ἑτέρους, πρὸ τοῦ τὸν πρῶτον χόνδρον ἀποσβεθῆναι πατελῶς, ἔπειθ' ἐπὶ πρὸς πρήθει*, vt Hermol. legisse videtur, & res ipsa postulat.

37.2.24. alter *παύει*.

39.1.2. in altero manu scripto hic capitis initium est.

Fol.eod.pag.2.verf.29. Scriptura ita distincta est in altero veterum codicum, vt hic capitis initium sit.

40.1.17. hoc caput cum superiore coniunctum est in altero nostrorum codicum..

Fol.& pag.eadem, verf.26. Codices manu scripti hæc verba *τουτέστι ἀπίστων* non habent, propterea quod nihil aliud sunt, quàm huius vocis *ἀκόγιτον* declaratio, quæ ex margine in contextum traducta est.

46.1.15. In antiquis codicibus, capita ita distincta sunt vt caput

IN DIOSCORID.

caput *καὶ ἀγρίου* adscriptum sit capiti *καὶ λεύκης*, vt res ipsa postulat.

Fol. & pag. ead. vers. 12. alter ὕδαπ ψυχρῶ. quam veterē scripturam esse, facile ex Plinio intelligi potest.

46.2.24. alter ὑπόλεπτος καὶ λευκός.

47.1.12. alter δέροςχος.

48.1.6. alter ἐπιμήκη.

Fol. & pag. eadem, vers. 8. hæc verba *ἔστι δὲ καὶ ἑτέρα παρ' αὐτῷ λευκοτέρα* non inueniuntur in altero.

Fol. & pag. eadem, vers. 14. vterq; codex scriptus σφονδυλίω, quæ est veri huius loci scriptura.

Fol. & pag. ead. vers. 18. alter scriptus ἀποκρίνειν, sed leue est discrimen. Nicander idem de hac planta scribens ἀλεξιάρκην eam vocat, id est, incubos nocturnos auertentem, quod intellexit Ouidius in fastis, cuius hi sunt versus,

Hic fauis spinam qua tristes pellere posset

A foribus noxas, hæc erat alba, dedit.

Et paulopost.

Virgæque Ianalis de spina fumitur alba

Qua lucem thalamis parua fenestra dabat.

Ianalis autē virga dicitur, quod Ianus eam Cranæ Nymphæ, (qua potit⁹ erat) cōtra striges nocturnas p^r amuleto dederit.

49.1.27. in altero hæc verba sic leguntur γίνεται καὶ μαλακπικόν νεύρων, ἐν τῷ περὶ σλαμῆάνην πυρῶτι καὶ μύγματα.

50.1.12. alter ὧν φύλλον.

Fol. & pag. eadem, 26. alter αἰμου, sed leue est discrimen.

51.1.5. in altero hæc ita legūtur ἀνδρικῶς πιεῖ, vt legit Her-molaus Barbarus.

53.2.15. alter codicum habet hanc scripturā καὶ πρυφερώτερα *καὶ πλεος* δὲ ἀκαύθης σκολοποιειδὲς, quam puto esse germanam.

60.1.23. liber alter hanc scripturā habet, ῥοδὸς χρῶν καὶ πορφυρῶν.

64.2.29. Locus hic sic mihi ex Plinio legēdus videtur, καὶ πλεος *καὶ πλεος* μετὰ αἰμούλου καὶ ἡδυόσμου, cuius lectionis vestigia quædam extant in lib. antiq.

63.2.20. Lib. veteres hoc loco initium capitis habent.

66.1.15. alter cod. ἐξ αὐτῆ.

69.1. vers. ult. hoc caput non est in veteribus libris.

EX LIB. II.

72.1.3. quidam codex habet *περοκεκολλημένοις ἀχρίοις*, sed nullo sensu.

Fol. & pag. eadem. vers. 25. In altero codice scriptum inuenimus *καταπλασθεῖσα*, sed vulgatam lectionem retinendam censemus.

75.2.12. vox hæc *καταπινόμοι*, in altero codice deest, sed eā Plinius & Hermolaus expresse-
runt.

78. 1. 25. Scriptura sic in veterib. distincta est, vt hic sit initium capitis, cuius hic titulus est *ἀλεκτορίδος τὸ κεραιίδες τὸ ἔγρος*, sed hæc parui momenti sunt.

Fol. eodem, pagi. 2. vers. 26. hoc caput cum superiore coniunctum est in vetustis libris.

79.1.4. *κείμνο*, sed scriptura vulgata verior.

Fol. & pag. eadem, vers. 29. In veteri codice est *ἀστυφράσων*, sed eā scriptura deprauata est.

81.2.2. hoc caput à superiore distinctū est in veteri codice.

82.1.25. codex antiq. *τῆς γάλακτος*, sed nullo sensu, est enim lac ouium γάλακτος, si conferatur cum lacte caprarum, minus tamen crassum quam vaccinum.

83.1.18. In antiq. scriptum inuenio *πρόντες*, quæ scriptura huic loco magis conuenit.

87.2.13. Nulla est hic capitum distinctio in antiquis libris, sed tota tractatio *σεάτων* vno capite comprehensa est.

89.1.10. hæc verba non leguntur in antiquis codicibus, sed interpretes omnes rectè ea expresse-
runt.

90.1.20. hæc verba sic leguntur in vtroq; scripta. *ὡς αὖ τινι δώαται καὶ τινὶ δοτὶν τῶν συμμάχων ἀναλάβῃ*, sed vulgatam scripturam retinendam esse sensus ostendit.

91.1.22. alter hoc loco *ἐρρωμένως* eodem sensu.

IN DIOSCORID.

91.1.vers. vlt. hoc caput coniunctum est cum superioribus in antiquis libris.

Fol.eod.pag.2.27.In altero scriptum est *πρὸς ὅτων*, sed vulgata scriptura melior est.

92.1. 18. vetus scriptura est, & quæ adhuc est in antiquis libris *ἐξοσεύσας*.

95.1.22. antiquus codex τὸ *πρὸς ὅτων* quæ scriptura prior est.

Fol.eod.2.1.hic locus sic descriptus est in manu scripto *καὶ ῥοίζοντες ἐπ' ὀλίγον ἀρχούσῃ καὶ δι' ἀραιὰ κοσμήνου εἰς σανάδια ἀπιδύσιν* quam lectionem Hermol.& Marcell.expresserunt.

Fol.& pag.ead.vers.4.ad finē huius capituli hæc in antiquo codice adscripta *ἀνθρώπων δὲ ξηρὰ συν μέλιτι φουραδεῖσα καὶ σπτεδεῖσα τῷ λάρυγγι, ὡς καὶ ἡ τῆς κυνὸς συναρχυκοῖς βοηθεῖν ἐν ἀρρήτοις εὐρομῃ*, Quæ verba expressa sunt ab Hermol. & ex eo loco ab omnibus ferè medicis descripta.

96.2.vers.vlt. vetus interpres exemplar habuit, in quo hæc verba tantū erant *τὸ δὲ χειμεινὸν παχύτερον ὅν χειρὸν*. Hermolaus Barb.legisse videtur hæc verba, *καὶ εἰσδάκνῃ ὅσον*. in veteribus lib. scriptura est ita deprauata vt non facite sit eam restituere. Ex Plinio tamen intelligi potest hanc fuisse veterē scripturam, *καὶ εἰσείκνῃ ὅσον*.

97.1.2. Tria hæc sequētia capita cū superiore in veteri coniuncta sunt.

99. 1. 12. hæc verba non leguntur in altero codice manu scripto.

103.1. versu vlt. hæc verba non legebantur olim in veteribus codicibus, quemadmodū intelligi potest ex veteri codice, Serapione, interprete antiquo, & Hermolao. quæ autē adscripta sunt, studiosus quispiam ex Galeno in contextum transtulit, in quo scriptore ita leguntur, *κύαμος καὶ ἐκτέρα τῆς μέσης κράσεως ὅστιν ἐγγυτάτω κατὰ τὸ ξηραίνει, καὶ κατὰ τὸ ψύχει*. ex quibus verbis Dioscorides faciliè emendari potest.

106.2.1. alter *ἐκλουρομύων*, sed minus aptè.

107.1.7. alter *βολῶς*, sed vulgata scriptura melior est.

Fol.& pag.eadem, 19. alter *βαφανές*.

108.2.18.

108.2.18. In veteri hic caput est *θεῖ βουλήν*:

111.1.11. antiqui libri *ὁ δαξουμένης* rectius.

115.1.21. In scriptis *ξύσμα*, sed leue est discrimen.

116.1.23. Totus hic locus sic legitur in veteribus libris *καὶ κρὰ δὲ πρὸς τὴν γαῖαν ὁμοίωται δὲ κατὰ ποσὸν τῇ δυνάμει μύκω-
ν, ὅθεν καὶ τὸν ὀπὸν αὐτῆς ἔτιοι μύκωσι τῷ μυκῶντι, καὶ αἰεὶ δὲ μετὰ
ὀξύμηνος, &c.* quā lectionē esse verā, nisi quod *ὀξύκρᾱτε* legen-
dū esse ex Plinio, veteri interprete & Hermol. intelligi potest.

117.1.25. alter *φλέγμονας βροχεῖ πνεύμονος*, quam lectionem
expresserunt Hermol. Bar. & Ruell.

120.1.14. Totum hoc caput sic legitur in veteribus libris,
*σιρόρδον τὸ μὲν ἔστιν ἡμερὴν καὶ κηπεύτον καὶ τὸτο ἐν αἰγύπτῳ μονοκέ-
φαλον ὄντιν, ὡς καὶ τὸ πρὸς τὸν γλυκὺν, ἐμπόφυον, μικρὸν, τὸ δὲ λοιπὸν
πυλὸν κρατὸν, λευκόν. καλοῦσι δὲ τὰς ἐν αὐτῷ ῥάχας ἀγλιδας, ἔστι δὲ καὶ
ἐν τῷ ἀγρῷ ὀφίοσκορδον καλέμνον, δυνάμει δὲ αὐτῶν θειμεῖα περ-
μαίνικη, θηκπικὴ, ἐκκριτικὴ, φυσώδης καὶ κοιλίας ταραντικὴ, ξηραντικὴ
σομάχου, δὲ ψις ποιητικὴ, ἐμπνεύμα τῶσεως ἀησιοτικὴ, καὶ ἐπιθανείας
σωμάτων βιβροσκομήν. τὰ αὐτὰ δὲ ποιεῖ καὶ τὸ ὀφίοσκορδον βιβροσκο-
μήν ὃ καὶ ἐλαφρόσκορδον λέγεται. βιβροσκομήν ἐλμινδας πλατείας
ἐξάγει καὶ ἔρα κατάρχει, ἐκχιδνέτοις τε καὶ αἰμορρῶσιν ἀρμόζει, ὡς οὐδὲν
ἕτερον λαμβανομένης οἷου σωσῶς, ἢ σὺν οἷῳ κεανθὲν καὶ ποτὲν. κατὰ
πλάσσειται δὲ πρὸς τὰ τῶν καὶ ἐπὶ τῶν λυσοδνέτων ὀφθιμῶς, βι-
βροσκομήν δὲ καὶ πρὸς τοὺς ξηνισμοὺς, &c.* Reliqua consentiunt
cum vulgata lectione, Hermolaus Barbarus veterē hāc scri-
pturam expresit:

121.2.13. verba hæc vsq; ad finem capitis nō sunt in Oriba-
sio: interpretes tamen omnes ea reddiderunt, & Dioscoridis
esse facile ex Plinio quisvis intelligere potest.

122.1.5. vet. καὶ θρυκοῖς καὶ τάφροις, sed leue discrimen est.

Fol. eodem, pag. 2. vers. 21. in altero *καπὶ καὶ γῆ* quod ex-
presserunt interpretes.

Fol. & pag. ead. vers. 29. Hæc verba vsq; ad hāc orationē *τὸ
δὲ μέλαν, &c.* non sunt in Oribasio, sed omnes interpretes ea
reddiderunt.

125.1.25. Script. *πρὸς πῆκταν*, quæ est vera lectio.

IN DIOSCORID.

Fol. 126. 1. Sunt in veteri vestigia diuersæ cuiusdam scripturæ, sed vulgata optimum habet sensum, & quam veram esse existimo.

Folio & pag. eadem, 24. alter scriptus κατὰ τὸν μαρτυρῶν, sed hoc leue est.

127. 1. 14. hæc verba non leguntur in manu scripto, sed ea exprimunt interpretes.

127. 2. 24. ver. ἐκπιλομήναις ῥίζαις, quod expressit Barbar.

Fol. & pag. ead. 28. κοφώσσει.

129. 1. 6. alter τμηθεῖσα διαβληθέντος λιναρίου, sed idem est sensus.

131. 1. 20. alter χλοώδη, quam scripturam Hermolaus sequutus est.

Fol. eod. pag. 2. vers. 15. alter ἀγριμίδα.

Fol. & pag. eadem, in altero hæc ita leguntur, ὁ ψαύτερον δὲ αὐταὶ τῶν ἀνεμόνων, sed idem sensus est.

Fol. & pag. eadem, alter ἀγριμόνης, quod Hermol. expressit.

134. 1. 18. hæc verba sic leguntur in veteri τῆς κερατίτιδος μήκωνος χυλὸν οἱ δὲ, &c. sed vulgata scriptura melior est.

135. 1. 19. alter non habet hanc vocem κωανοειδῶν, quam scripturam Plinius expressit.

Fol. & pag. eadem, 22. in altero non est μήλινα, sed vulgata scriptura rectior est, spectatur enim lutei flores in telephio.

EX LIB. III.

136. 1. 15. In veteri exemplari ante hæc verba καὶ ὑστερικῶς πινέξι, hæc leguntur, καὶ ἰκτεριώδεις, sed hæc superuacanea sunt quandoquidem paulò superius eadem verba leguntur.

136. 2. 14. alter ῥᾶ ἢ ῥεῖον.

137. 2. 9. alter, καὶ σπέρματα, quæ lectio sensum rei conuenientem habet.

139. 1. 29. hic locus sic legitur, σφιμεῖα μετὰ ποσὺς σύψως καὶ γλυκύτητος ὑπερδρὸς ὁμοίως, δὲ καὶ ὁ χυλὸς ἑρυθρὸς, quam lectionem Hermol. sequutus est.

Fol. & pagina eadem, vers. 21. hic locus ita legitur in vtroque veteri, ἐπειδὴ πᾶν τὰ τὰ φλεγμαίνοντα πᾶν πᾶν πολυφάρμακος, quæ scriptura ab Hermolao recepta est.

141.1.3. vterque ποδείσαι ὅσον ὀξύδαφου πλῆθος.

Fol. eodem, pag. 2. vers. 20. hic locus sic legitur ἐλαφρόν, δριμύαν, ὑποπλάτω, &c. quæ lectio probata est veteri interprete, & Hermol. Barbar.

142.1.6. in altero est κοῖλα δὲ, &c.

Fol. & pag. eadem, alter ὡς κηρωτῆς πᾶχος λαβεῖν, sed idem est sensus.

142.2.25. vetus codex alter μακρόν, sed vulgata scriptura bona est.

143.1.10. alter λεπτόν.

Fol. & pag. eadem, 12. alter codex ὁλος δὲ ὁ δάμνος πείκεται φλοῖον καὶ πολὺν χρόνόν ἐκείνην, quomodo Hermol. legit.

Fol. & pag. eadem, 13. locus hic omnino ita legendus est, ut est typis expressus ab Aldo καρπὸν τῷ γενομένῳ ἐκείνη καὶ δριμύ, quam lectionem Plinius probavit.

Fol. & pag. eadem, 26. hæc verba ex altero codice huic loco adscribenda sunt καὶ ὡν ἀρχαῖοις ἐστὶ χρόν, quam scripturam interpretes expresserunt.

Fol. eodem, pag. 2. vers. 17. altero ἰσῶσι, sed hoc leue est.

Fol. & pag. eadem, 20. hoc caput est coniunctum cum superiore in veterib. lib.

144.1.8. in altero addita est vox παχέας, sed interpretes non agnoscunt.

Fol. & pagin. eadem, 8. in altero vox θερμαντικὴν deest, sed addenda, ut ex Galeno intelligi potest, & res ipsa ostendit.

Folio & pagina eadem, 13. alter codex habet hæc verba adscripta, τὸ δὲ τῆς ἀφ' ἡμᾶς πινόμενον αἱμορροΐδας θερεπύην πεπίπτει, quam scripturam Hermol. expressit, sed non esse Dioscoridis ex eo coniicere licet, quod Plinius & vet. interpretes eam non agnoscunt.

Fol. & pag. eadem, 16. veteres codices λευκαί δεμον.

Folio & pagina eadem, vers. ultimo, hic asteriscus debuit

IN DIOSCORID.

πρᾶτονι voci πολλὰ vers. 28. vt quo indicatur, in altero codice esse φυλλάρια μικρὰ πολλὰ, sed hoc est leuē.

Fol. eodem, pagina 2. 19. alter παχέα, sed interpretes & res ipsa ostendunt vulgatam scripturam rectam esse.

145. 1. 3. Locus hic legitur in codicibus veteribus δυνάμει δὲ ἔχει θερμαντικὴν ἢ ῥίζα τῆς τῆς, sed Galenus calefaciendi vim toti plantæ tribuit. Interpretes etiam vulgatam scripturam probant.

146. 1. 19. asteriscus hoc loco addendus non fuit.

147. 1. 5. legimus βραχὺν ex veteribus libris.

Fol. & pag. eadem. 27. alter συν ῥοφήματα παχῆς.

148. 2. 16. hic asteriscus frustra adscriptus.

151. 2. 23. hoc caput coniunctum est cum superiore in veterē.

153. 2. 6. in veteribus codicibus Inuenitur hoc loco caput ἐπὶ ἐλαφοσκορδοῦ his verbis.

154. 2. 8. alter βάκχαρις βοτάνη ἐστὶ δαμνώδης, &c.

156. 1. 6. alter ὀρνιθί.

Fol. & pag. eadem, vers. 9. alter ἀλάκμονα, sed fortasse legendum ἀλακομῆμας, ex Strabo. γεωγραφουμένων lib. 7.

Fol. eodem pag. 2. vers. 27. vet. sic legit παῖακες, οἱ δὲ ἡγεκλειον, &c.

157. 1. 7. vet. σμικρότατα.

158. 1. 6. alter παῖακες ἀσκληπιον.

159. 2. 24. vet. μέγας, quod Hermol. expressit.

Fol. & pagin. eadem, vers. vlt. cap. sequens cum superiore coniunctum est in veteribus.

160. 1. 9. alter ἐνωδίστερος.

Folio & pagina eadem, 14. alter ἀχάω, sed vulgata scriptura melior.

Fol. & pagina eadem, vers. 23. In antiquis hæc verba adscripta sunt fini huius capituli ἔχει δὲ κλώνια πολλὰ περισπίζοντα, μυλίζοντα, προσφύειζοντα, καὶ ἐπὶ ἄκρῳ ὅμοια στρογγυλοῦσθαι ἔχοντα ὡς περιμάτια τὰ αἰθνη, quæ Hermol. expressit.

Folio eodem, pagina secunda, vers. 4. alter antiquus non habet et

habet hæc verba vsque ad hunc locum *τὴν μὲν καὶ δόλου, &c.* sed interpretes sequuti sunt vulgatam scripturam.

Folio & pagina eadem, vers. 24. In antiquo utroque hæc verba leguntur, *ὁ καὶ καβαλάδιον λέγεται*, quæ post tempora Dioscoridis huic loco adscripta sunt. Nam recentiores *καὶ ἐν καβαλάδιον* vocare solent.

161. 1. 1. asteriscus his malè præpositus est.

Fol. eodem, pag. 2. 3. *ἀνίησι*, sed hoc leue est.

167. 2. 18. hoc loco vetus alter habet, Caput *πρὸς διελκίου*.

168. 1. 2. alter habet *μαράθρω*, non *πλασάνω*, sed vulgatam scripturam antiquam esse ex Plinio facilè intelligi potest.

169. 2. 10. alter habet *λεπτόν* pro *μικρόν*.

170. 1. 9. utroque hoc loco præter verba vulgata *φυσώδης* habet, quæ vera est huius loci scriptura, ut quiuis ex Galeno intelligere potest.

171. 2. 5. alter *τοῖς περὶ ἀρθρίαν* eodem sensu.

173. 1. 13. alter *διώκει*.

176. 1. 1. utroque *κόμην*.

179. 1. 9. alter *ἐρείπη*, sed vulgata scriptura melior. *ἐρείπος* enim non legitur, sed *ἐρείπον* quod significat *πεπιλωκός, καὶ ὑπὸ γῆς κείμενον*.

180. 1. 23. alter *καράϊαν*, sed vulgata scriptura probata est ab omnibus interpretibus.

Folio & pagin. eadem, 24. Utrouque *σειρά*, quod legisse videtur Hermol.

190. 2. 3. hæc in antiquo utroque fini capitis adscripta sunt, *φύεται δὲ ἐν ὑψιλατάταις ὄρεσι καὶ ἀκροτείαις*, quam scripturam Hermol. expressit.

195. 1. 8. vetus utroque præter vulgatam scripturam in fine capitis habet *ἡ δὲ ῥίζα τούτου συνὸν ὄντω ἐλκεῖται καὶ ποδῶσιν παρὰ τοῖς καλῶς βοιδεῖν πσεύεται· δὲ δὲ τὸν πάχοντα ἐν τῷ πίνειν πεισκέπεται, καλῶς ἰδρῶν γὰρ ὅλον τὸ σῶμα, καὶ τὴν ἐκκυσίαν ἐν τούτου λαμβάνει*, quam lectionem Hermolaus

probauit.

195.2.16. alter *παχυν* quod Hermolaus probat.

199.1.23. in altero vox *ὑποστροφύλλον* deest.

Fol. & pag. ead. 26. in altero *μακράν*.

Fol. & pag. ead. 27. alter *ἐν χαράδραις*, sed Plinius & alii interpretes vulgatam lectionem probant.

204.1.4. in altero hic est titulus *πρὸς ἑτέρου ἐχέει ὁ ἀντιμορφεύς*, quæ scriptura fuit in codice, quem Hermol. sequutus est.

211.2.5. vterque codex hunc titulum *πρὸς ἀντιμορφῶνος ὑποτίθεται*, habet, vt Hermol. legit.

213.1.5. alter *πῆξ*, sed interpretes vulgatam lectionem approbant.

Fol. eod. pag. 2.17. alter *δακτυλίφ.*

Fol. 214.2.5. vterq; *ἐν δυνάμει παλαιᾷ*, quæ scriptura ab interpretibus recepta est.

216.2.2. *ὅς μακρότερος* addendum est ex vtroque antiquo, quod approbatum est ab interpretibus.

Fol. & pag. eadem 9. vterque sic legit *δύναμιν δὲ ἔχει μαλακτικὴν, συπλητικὴν*, sed sequendam vulgatam scripturam arbitror ex Galeno.

Fol. & pag. ead. 9. alter *σπάσματα*.

218.1.1. vterq; *ράγας*, quæ est vera scriptura huius loci.

220.1. vers. vltim. vterque *οἱ δὲ διερρηφόνον*, quæ syncerior est lectio.

Fol. eod. pag. 2.17. legendum *ἐκείνου*, ex altero, vt superius annotauimus.

221.2.10. alter *κυνόμορφον*, sed vulgata scriptura rectior.

222.2.15. alter *ἐπικύρρον*, sed prior lectio melior.

224.1.5. inducendus est asteriscus.

226.2.6. in veteribus hoc loco caput est *πρὸς τύφης*.

228.1.20. Totus hic locus non est in veteri, sed hæc omnia agnoscuntur ab interpretibus.

230.1.20. alter *ὑπόκοιλος* pro *ὑπόκυρρος*, sed scriptura vulgata melior est.

Fol. & pag. ead. 24. alter *διερρηγμύας*, id est limatas, rectius.

230.1.14. alter *σῶζος*.

Fol. & pag. ead. 15. vterq; *πλάτυπτα*, quæ scriptura vera est.

232.1.24. addendum est hic ex veterib; *καὶ κλώμα*, quod interpretes expresse-
runt.

233. 1. 15. alter *τετυμημύα* quam scripturam Hermol. se-
quutus est.

Fol. & pag. ead. 19. Totus hic locus sic legitur in vtroq; *φασὶ δὲ ὅτι ταύτην εὐχρηστον φήσιν περὶ τομῶν καὶ φύματα διαφορεῖν*,
quæ scriptura probata est ab interpretibus.

236.1.29. vterque codex vetus hunc locum sic descriptum
habet *Μυρρίνη ἀγρία ἢ ὀξύμυρρην, ἥς ἀπ' ἀσπράγος νεοδαλὴς ἐστὶν
διεσπικλὸς ὦν, καρπὸν ἔχει περὶ φεῖν ἑρπυλίων ἐν τῷ πεπαιγμένῳ, τὸ ἐν-
τός ἔχοντα ὅσῳ δὲς, κλώμα λυγρὸν, & cæter.* vt sunt descripta in
vulgatis libris, quorum verborum sensus est. Myrtus agrestis
vel oxymyrrhine, id est acuta myrtus, cuius asparagi teneri
comeduntur, propterea quod urinam ducūt, fructum habet
rotundum, rubrum, quum maturescit, atque intus nucleum
osis duritiæ propinquum, &c.

237.2.17. alter *ἀδραυτος*, sed vulgatâlectionem meliorem esse
ex Serapione & interpretib; facile quivis intelligere potest.

Fol. & pag. ead. 23. alter *ἀντικύεινος*, id est ex anticyra.

Fol. & pag. ead. 24. alter *χρινώδης*, quam scripturam Serapio
sequutus est.

Fol. 238.1.16. legendum est ex veteribus lib. & interpretibus
συνὸν περὶ τῶν ῥοφίμων.

239.2.22. hic asteriscus frustra adscriptus est.

240.1.26. addendum ex veteribus *ἦναι παρ' ἡμέρας γ'.*

241.1.14. alter *δδσις*.

242.1.14. legendum *καυλός*.

242.2.10. hic locus sic legitur in altero *φλυκταινῶται τὰ γυ-
ρὰ μέρη τῶν γυμνῶ σώματων*, quomodo Hermol. legisse videtur.

243.2.11. hic est caput *περὶ βόλεως* in antiq. quod alio in loco
in hoc libro inuenies.

244.1.5. hic locus sic legitur in altero *π' δὲ ἐξ αὐτῆς ἐκδιβῆν
ἐκπέσμα*, sed idem sensus est.

IN DIOSCORID.

247.2.vers.vlt.locus ita legitur in altero *ρίζαν λευκὴν παχεῖαν*
ὁσὴν μέσιν, ὡς καλῶς τυρπέτ. quam scripturam etfi Hermol. a-
 gnoscit, additam tamē suspicor à quodam, qui in libris Ara-
 bum versatus sit, qui (vt Actuarius scribit) *πιτυῖσαι* turpetum
 appellant.

248.2.23.alter *κοτύλης*, quam scripturam Hermol. retinet.

249.2.3.alter *ἐμφαίνονταί π δασύπτης.*

Fol.& pag.ead.8.alter *βραχίων*, vt legit Hermol.

250.1.10.alter *ἀλός*, sed vulgata lectio melior.

251.2.3.alter *περιβίνδω*, sed idem est sensus. |

253.1.26.vocem illā restituiimus ex veteri exemplari, quum
 prius legeretur *πλατύκαρπος*.

EX V. LIBRO.

261.1.12.veteres lib. hæc verba habent adscripta fini huius
 capitis *διωάμει δὲ συμπικὸν ἀρμόζον τοῖς βραδείας πέπλοις λευ-*
κόις σομάχοις, καὶ ταῖς κιστώταις γυναιξί, καὶ εἰλεώδεσι, δοκεῖ δὲ
βοηθεῖν καὶ ταῖς λοιμικαῖς καταστάσεσι ροφέμενον, quam lectionem
 Hermol. retinuit.

265.1.17.alter *νομίζεν*, sed vulgata lectio verior.

274.2.5.hic locus ita legitur in veterib⁹ codicib⁹ *μυῖαν ἀφιν-*
δίου εἰς τὸ κερδίμον κατὰσιν, καὶ τῷ μετρητῇ ᾧ γλεύκες ἐμβρέχοισι,
 quæ scriptura ab Hermol. expressa est.

276.1.13.alter *δικτάμνε < ἃ εἰς γλεύκες & cæt.* cui Hermol.
 consentit.

277.1.24.hec ita leguntur in veterib⁹ lib⁹. *ἀγήσου < γ, ταῦτα*
ἐνδύσας, vt Hermol. legit.

278.2.7.alter *δεῖ γδ' ἐκείνου ἐγγίαις ἡ. & cæt.* quam scripturam
 interpretes sequuntur.

279.2.20. hunc locum ita reposuimus ex veteribus libris,
 & interpretibus.

282.1.15. hæc ἐπὶ δὲ *κεφοτάτη* verba nō sunt in veteri altero,
 sed vulgata lectio rectior.

284.1.7. hæc verba *ὅτι δὲ καὶ τῶν παρ' αὐτοῖς ἐχθρόνων* huic loco
 adscribēda

adscribenda sunt, ex veteri libro & interpretibus.

Fol.eod.pag.2.14.hæc verba *χεῖσις δὲ πάντων τῶν εἰρημύων πεποιται*, eis τὰ ἀντιπόδια, addenda sunt ex veteribus libris.

286.2.24.alter *σέμφυλα πρῶστα* sine negatione, cum quo facit Hermol.interpretatio.

288.2.26.hunc locū restituimus ex veterib lib.& interpret.

292.2.26.alter *καταγγίσας*, vt legit Hermol.

293.1.18.alter *τὸ κεραμείου*.

Fol.eod.& pag.2.5. hic locus sic legitur in veteribus *πῆς δὲ κατὰ μέσον τὸ ἀγγεῖον κρεμῶσι ξύλον, καὶ ἐπὶ τὸ καλέμενον ῥίζον ἐπιπείσειν ὥς μὴ λυθῇ τὸ ὄξυς.*

294.2.28.alter *ἐκβλάσημα*.

295.1.15.verba hæc *συνὴ κηρωτῇ* non sunt in altero, quæ etiā Hermol.non agnoscit.

Fol.& pag.ead.19.alter *μυῖω* quā scripturā Hermol.retinet.

296.1.7.quæ sequuntur addenda sunt ex veteribus libris & interpretibus. *ρίνημα δὲ χευστοῦ πινόμενον ὑδραργύρου θαυμαστὸν βόηθημα.*

297.1.4.alter *ἀχέσατον* quam scripturam Hermol. non sine iudicio retinuit.

Fol.& pag.ead.10. alter *συνεχόμενα* quod verbum huic accommodatius est.

Fol.& pag.ead.15.alter *πυκνόν*.

Fol.eod.pag.2.2.alter *ῥυπτικῶν*, vt Ruellius expressit, sed vulgatam scripturam rectam esse, ex Galeno intelligitur.

Fol.& pagina ead.5.alter *σηπόντων*, sed vulgata scriptura bona est.

299.2.21. hic locus sic legitur in veteri *τὸ δὲ ἄλλο βαλανοειδὲς καὶ ἀχροειδὲς, καὶ σανδαλαχοῖσι τῇ χροῇ, καὶ βωλοειδὲς*, vt interpretes expresserunt.

Fol.& pag.ead.11.hæc verba sic leguntur in vtroq; *ὄσρακον κατὰν ἀσφριτάμους*, quæ scriptura purior est.

301.1.25.veteres lib. καὶ *σμίρνη*, quod Hermol.expressit.

303.2.17.alter *ἐυαδίστην*, vt legit Hermol.

304.1.2.alter *λεπίσμων*, quā scripturam Hermol.retinet,

307.1.2. locus ita legitur ἐν τοῖς ὑπὸ κύνια καὶ μαση.

313.1.21. alter ὁπλὰ, sed verior lectio est σύνπλῃα.

316.1.26. alter λαβεῖν, sed leue est discrimen.

320.1.10. in altero codice deest καὶ σέσελι, quam scripturam etiam Hermol. non agnoscit.

321.2. vers. vlt. vterque hunc locum sic scriptum habet ἐνιοι μῆλον καλῶσι, vt Hermol. legit.

324.1.13. locus hic sic legitur in veterib. χρυσόμυθα πορπο-
σιῶ δειγάνω, ἢ παγάνω, ἢ πορποσίω μετ' οἶνε ἢ ἀψινθίω, ἢ ἐνζώμω,
ἢ ἀβροτόνω, ἢ χαμαλαία, ἢ χαμαπίτυ, vt Hermol. legit.

Fol. cod. pag. 2. 11. alter λαλῶσι, quam scripturam Hermol. retinet.

326.1.12. hæc verba ita leguntur in antiq. lib. διδόντες μετα-
ξὺ διάσημα ἐν οἷς δίδομεν πέν γάλα βόειον, sed idem sensus est.

Fol. cod. pag. 2. 25. locus hic ita legendus ex veteribus libris
& interpretibus εἶδε μὴ αἰγείω ἢ βοείω.

329.1.6. verba hæc ita restituenda ex antiquis codicibus &
interpretib. ἢ πορποσίων τὰ ὅσα σὺν κριθῶν ἐψήματι.

Fol. & pag. ead. 15. in altero addita est hæc vox λιφθέντες,
sed hoc leue.

330.2.6. locū hunc ita ex veteribus codicibus restituimus,
cū multa vulgatæ scripturæ deessent.

Fol. & pag. ead. 10. locus hic ita legendus est ex utroque an-
tiquo codice, & interpretibus ὁρμίνε σπέρμα σιύνης < ἢ ἀ-
ψινθιον, ὕσσωπον, σελιώκ σπέρμα.

331.1.25. locus hic ita legitur in veteribus libris καὶ πέντεσι ὁ-
φελέμενοι, τεκμήριον δ' ὅτιν & cæt.

335.1.24. alter εὐχρηστον, quam scripturam rectè Hermol. &
interpretes retinuerunt.

336.2.7. alter διάπασιν, sed res ipsa ostēdit legendum esse
διάτασιν ὅς πεπληγός, vt rectiss. Ruellius legit.

340.2.24. alter προσηλωτέρα, habet pro πλείων, quæ scri-
ptura multò rectior est.

343.2.24. alter sic hunc locum habet αὐτὸς δὲ ὁ τύπος πάλιος
γίνεται, καὶ μέλας τὰ κυκλω.

349.2.27. sic hunc locum ex antiquis restituimus.

350.1.7. in codicib⁹ antiquis hîc est caput *καὶ δὲ ἀκοντος καὶ σκορπίου τῶν ἐν θαλάσσης*, cuius hoc initium est, *γίνονται δὲ ἰώδεις πηλαὶ καὶ ὑπὸ δὲ ἀκοντος καὶ σκορπίου τῶν ἐν θαλάσσης, καὶ πεισθύνει χαλεπὰς φέρονσι, πάντας δὲ ποτὲ νομᾶς, ἀρμόζει δὲ πρὸς ταῖς πηλαῖς.* & cæter. quæ verba Hermol. Marcell. & Ruellius expresserunt.

351.1.11. alter *ἐχιδνήκων*, quæ scriptura rectior est.

352.1.22. Hermol. Barbar. exemplar sequutus est, in quo hæc scriptura videtur fuisse *καὶ ἐξ πυλῶς συν ἀποδέλω, ποτὶ ζῴοντα δὲ παραχρῆμα κενταύεις τῆς ρίζης < β'. συν οἶνε κυάδοις γ', ἢ ἀειστολογίαι ρίζα, ὡς πάντως,* & cæter. cuius vestigia adhuc in veteribus libris extant,

CASTIGATIONVM IN DIOSCORIDEM

FINIS.

QVÆ SEQVVTVR, AB IPSO RVEL
lio ex veteri aliquo codice, quo ille vsus erat, addi-
ta fuerunt prioribus codicibus, quæ cùm Græca
eis respondentia non haberemus, in hunc
locum reiecimus.

Fol. 32. pag. 2. post caput malabathrinum, caput hoc inser-
tum fuit.

Iasminum.

Apud Persas fit quod Iasminum cognominatur, ex albis
floribus violæ: quorum sextās, in Italicum sextarium sesami-
ni olei demittitur, violis, vt in lilino diximus, vicissim permu-
tatis, Apud Persas inter epulandum vsurpatur odoris causa.
Nam toti corpori conuenit præsertim cùm in balneas descen-
sum est. Sed his opitulatur corporibus, quæ calfactionem, la-
xationemque desiderant: grauius enim spirat, quàm vt liberi-
ter à plerisque recipiatur.

Folio 43. pag. 2. in fine capitis Iuniperi hæc adiecta inue-
niebantur, folia acrimoniam habent: ideo tam ipsa, quàm
eorum succus ex vino, contra viperarum morsus illini aut
bibere prodest. Corticis cinis cum aqua illitus lepras eximit, Ra-
menta ligni detiorata interficiunt.

Fol. 96. pag. ead. in calce capitis de vrina lyncis, hæc addita
legimus. Asininæ vrinæ potu renum vitia sanari traduntur.

Fol. 220. pag. ead. versu 18, post ista verba, capite cõstat, sub-
sequebatur hæc: dulce, in purpureū vergens, paruum: reliqua
verò magna & candida, ex plurib⁹ coagmentantur nucleis.

Fol. & pag. eadem, vers. 28. post illa, aciem oculorum esur
hebetat, hæc inserta erant. Eisdem effectus præbet angui-
num, quod & elaphoscorodon dicitur: latas ventris tineas in
cibo sumptum abigit, vrinas detrahit: cõtra viperarum ictus,
& priuatim hæmorrhoi, prodest, ita vt nõ aliud magis, si cum
vino iugiter assumatur, aut tritum in eodem cibatur: con-
tra rabiosorum morsus & illitus, & cibo valet. Magnæ & al-
lio utilitates

Fol. 198. pag. 2. vers. 12. & alterum clematidis genus addatur: verba autem sunt hæc. Est & altera clematis, quæ viticulosum emittit ramulum, rubescentem, lentum: folium gustu admodum acre, ac exulcerans: repit per arbores, vt similax. Semen tritum, pituitam bilémque detrahit, in aqua aut hydromelite potum. Folia eius illita lepras purgant. Cum lepidio conditur ad cibos.

Fol. 232. pag. 2. vers. 23. post capitis verbum primum Buglossum, hæc erât, nascitur in campestribus, & sabulosis. Iulio mense colligitur. Aiunt eam quæ treis thyrsos emittit, cū semine & radice tritam, potámque, contra tertianos horrores prodesse: quæ quatuor, ad quartanos: ea in vino decoquitur. herbam abscessibus vtilem esse volunt

Fol. 351. pag. ead. in fine versus 22. hæc subiiciebantur, inter quæ talia maximè laudantur. Gallinacea cerebella cum vino pota, semen satiuæ brassicæ tritū & acetabuli mensura cum vino potum. Quinetiam bonum est digitum in liquidam picem intingere, deinde vinum quo digitus fuerit elutus, bibere. Hæc sunt quæ contra viperæ ictus auxiliantur.

FINIS.

EXCVDEBAT BENEDICTVS PREVOST
IN VICO FREMENTELLO, SVB SIGNO
STELLÆ AVREÆ, MENSE AVGVSTO,

1549.